

جامعة البصرة

دار الحكمة

# الجبر الخطي

تأليف

الدكتور جورج ضايف السبتي

كلية العلوم

١٩٨٨

## مقدمة

يقدم هذا الكتاب معالجة مبسطة لموضوع الجبر الخطي ومناسبة لطلبة الصف الثاني رياضيات في كليات العلوم. الكتاب يتطلب معرفة بالمواضيع الأساسية في التفاضل والتكامل ( المشتقة، الاستمرارية، التكامل ) وكذلك يتطلب معرفة بالمصفوفات وجبرها وكذلك بالمحددات ( وهذا مادرسه الطالب في موضوع طرق رياضية في الصف الأول ).

لقد كان هذا الكتاب ثمة خبرة تدريسية في موضوع الجبر الخطي للصف الثاني وموضوع الجبر الخطي المتقدم لطلبة الدراسات العليا، فقد درست الموضوع لأكثر من ستة مرات، حيث من خلالها تعرفت على نقاط الضعف والصعوبات التي يواجهها الطالب وحاولت توضيح وتذليل تلك الصعوبات من خلال تعدد الأمثلة الإيجابية ( التي توضح المفهوم ) والأمثلة السلبية ( التي توضح عدم انطباق المفهوم ).

لقد حاولت في هذا الكتاب الجمع بين المفاهيم المعقدة والعامة والشاملة، الجمع بين هذا كله ومجموعة كبيرة من الأمثلة التي تداخلت مع تلك المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها لكي تبدو خالية من التعقيد والصعوبة. ( قارن بين كتب كثيرة في الجبر الخطي وأخرى ستجدها أما قليلة الأمثلة وأما مليئة بالأمثلة الكثيرة دون الخوض في المفاهيم الأساسية بصورة عامة وشاملة ).

لقد جزأت الكتاب الى ستة فصول يتكون كل فصل منها من بنود صغيرة تلى كل منها مجموعة تمارين شاملة ومتنوعة، يقدم الفصل الأول منها مفهوم فضاء المتجهات والفضاءات الجزئية وجبرها. ثم يتعمق في دراسة التركيب الخطي للمتجهات والاستقلال الخطي لمجموعة متجهات وهذا يؤدي الى دراسة الفضاءات

المنتية البعد وقواعدها. لقد كانت معالجتي عامة، اي انني قدمت دراسة فضاءات المتجهات على حقل مجرد وليس حقل الاعداد الحقيقية فقط.

ثم يعالج الفصل الثاني موضوع التحويلات الخطية بين فضاءي متجهات ويدرس خصائصها وعلاقتها بالمصفوفات. لا بد من الاشارة هنا الى استخدامنا المتجهات الصفية ولذلك تختلف نتائجنا عن النتائج في كتب اخرى عندما تستخدم المتجهات العمودية.

وقد قدمت في الفصل الثالث انظمة المعادلات الخطية فقد كان اهتمامي في قابلية حل النظام وعدد الحلول ولم اذكر الطرق العديدة والمتنوعة لحل انظمة المعادلات الخطية وانما اكتفيت بشرح طريقة واحدة وهي طريقة كاوس للحذف. هذا الاهتمام النظري لم يمنع من تقديم امثلة عديدة وتمارين متنوعة.

وكان الهدف الاساسي من الفصل الرابع هو دراسة مسألة تبسيط مصفوفة تحويل خطي على الفضاء نفسه. هذه المسألة لها تطبيقات كثيرة ولغرض دراستها يجب تقديم مفهوم القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للتحويلات الخطية والمصفوفات.

وقد تخصص الفصل الخامس في موضوع اضافة بنية جبرية جديدة على فضاء المتجهات من خلال الضرب الداخلي. فإن اضافة هذه البنية يؤدي الى دراسة الفضاءات الاقليدية التي هي عبارة عن تعميم للفضاء الاقليدي  $R^2$  ( المستوى ) والفضاء الاقليدي  $R^3$  ( الفراغ ) وما يمكن ان نجريه على متجهاتها من قياس للطول وقياس للمسافة وقياس للزوايا بين المتجهات.

اما الفصل السادس فقد حاولت فيه تناول مفهوم الدوال ثنائية الخطية بشكل عموماً تقريماً عاماً يمكن توضيحه على الصيغ التربيعية وخصوصاً تقصيراً تحريضية.

رجو ان اكون قد وفقت في عرض موضوع الجبر الخطي بشكل بسيط وواضح. كما ارجو من زملائي الاساتذة واخواني الطلبة ان لا يترددوا في طرح اي اقتراح او الاشارة الى اي خطأ لكي اتجاوز ذلك في طبعات قادمة. هذا ومن الله التوفيق.

المؤلف

## المحتويات

الصفحة

الموضوع

..... المقدمة

### الفصل الأول

#### فضاءات المتجهات

- ..... (1.1) الزمر والحقول
- ..... (1.2) المتجهات في المستوى والفراغ
- ..... (1.3) فضاء المتجهات
- ..... (1.4) الفضاءات الجزئية
- ..... (1.5) جبر الفضاءات الجزئية
- ..... (1.6) التركيب الخطي
- ..... (1.7) الاستقلال الخطي والارتباط الخطي
- ..... (1.8) القواعد والفضاءات المنتهية البعد
- ..... (1.9) الاحداثيات وتغيير القواعد

### الفصل الثاني

#### التحويلات الخطية

- ..... (2.1) التحويلات الخطية

- ..... (2.2) الرتبة والصفورية
- ..... (2.3) التحويلات النظرية
- ..... (2.4) مصفوفة التحويل الخطي
- ..... (2.5) تغيير القواعد والصيغ الاعتيادية

## الفصل الثالث

### انظمة المعادلات الخطية

- ..... (3.1) الصيغة المصفورية للانظمة الخطية
- ..... (3.2) انظمة المعادلات الخطية المتجانسة
- ..... (3.3) انظمة المعادلات الخطية غير المتجانسة

## الفصل الرابع

### القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

- ..... (4.1) القيم الذاتية والمتجهات الذاتية والمعادلة المميزة
- ..... (4.2) الفضاء الذاتي وقابلية تمثيل تحويل خطي بمصفوفة قطرية
- ..... (4.3) المصفوفات المتشابهة
- ..... (4.4) مبرهنة كيلبي — هاملتون وتطبيقاتها

الفصل الخامس

الفضاءات الاقليدية

- (5.1) الفضاءات الاقليدية.....
- (5.2) الطول والزوايا في الفضاءات الاقليدية.....
- (5.3) القواعد المتعامدة الاحادية — طريقة كرام — شميدت.....
- (5.4) التتمات العمودية.....
- (5.5) التحويلات العمودية.....

الفصل السادس

الصيغ الثنائية الخطية والصيغ التربيعية

- (6.1) الدوال ثنائية الخطية.....
- (6.2) الدوال التربيعية والصيغ التربيعية.....
- المصادر باللغة الانكليزية.....
- المصادر باللغة العربية.....
- معجم المصطلحات ( عربي — انكليزي ).....

# الفصل الاول

## فضاءات المتجهات Vector Spaces

### (1.0) مقدمة:

لقد تعرف الطالب على المتجهات في المستوى والفراغ في الفيزياء ولاسيما عند دراسة القوة المؤثرة على الاجسام. ان العمليات الجبرية الالاسية التي يمكن اجرائها على تلك المتجهات هي عملية الجمع ( جمع المتجهات ) وعملية ضرب عدد في متجه. لقد كانت عملية جمع متجهين تنتج متجهاً وعملية ضرب عدد في متجه هي الاخرى تنتج متجهاً. هاتان العمليتان تحققان خصائص عديدة.

اذا تصورنا المتجه في المستوى عبارة عن نقطة فيه ( التفاصيل في البند الاول ) فهذا يعني ان مجموعة نقاط المستوى تكون — بلغة الجبر — مغلقة تحت عمليتي الجمع والضرب وهما بذلك يحققان خصائص عديدة وكذلك تكون مجموعة نقاط الفراغ. توجد في موضوع الرياضيات مجموعات كثيرة تحقق الخصائص التي ذكرناها مثل مجموعات تحتوي على مصفوفات ومجموعات تحتوي على متعددات حدود لذلك سندرس تلك المجموعات التي لها عمليات جبرية تشبه العمليات التي ذكرناها على المستوى والفراغ، وسنطلق اسم فضاء متجهات عليها.

لغرض الدخول في دراسة تفصيلية لهذه المسألة نقدم تعريف الزمرة وتعريف الحقل وامثلة عليهما وذلك في البند الاول. هذه المقدمة عن الحقول والزمرة هي عبارة عن تذكير للطالب بما درسه بصورة اكثر تفصيلاً في موضوع اسس الرياضيات بالصف الاول. كذلك فإننا سنذكر القارئ بالمتجهات في المستوى والفراغ وما تتمتع

به من خصائص وكيفية جمعها وضربها بأعداد. هذا ماسنقدمه في البند الثاني وسنقدم في البند الثالث مفهوم فضاء المتجهات بشكل عام معتمدين على معرفة الطالب بخصائص المستوى والفرغ.

البند الرابع قد خصص لدراسة تلك المجموعات الجزئية من فضاء المتجهات والتي تكون بحد ذاتها فضاء متجهات بالنسبة للعمليات الموروثة من الفضاء الأم وسنسمي هذه المجموعات الجزئية فضاءات جزئية.

البند الخامس قد خصص لدراسة جبر الفضاءات الجزئية كتقاطعها واتحادها وجمعها.

سنتناول في البند السادس مفهوم التركيب الخطي لانه اداة فاعلة في توليد الفضاءات الجزئية وفي الدخول بدراسة تفصيلية عن فضاء المتجهات.

في البند السابع سنتطرق لمسألة الاستقلال الخطي والارتباط الخطي لمجموعة متجهات في فضاء متجهات حيث ستكون هذه المسألة الحجر الاساس لتطوير دراسة الموضوع.

ان مفهوم قاعدة فضاء المتجهات سيؤدي الى دراسة نوع مهم من فضاء المتجهات هو الفضاء المنتهي البعد. سنتطرق لتلك المفاهيم في البند الثامن.

البند الاخير في هذا الفصل قد خصص لدراسة الاحداثيات وتغيير القواعد.

## (1.1) الزمر والحقول Groups and Fields

يحتوى هذا البند على تعريفى الزمرة والحقل مع امثلة تذكر القارىء وذلك لاننا سنكون بحاجة الى خصائص الحقول في كتابنا هذا. سنبدأ بتعريف الزمرة مع ذكر بعض الامثلة.



تعريف :

لتكن  $S$  مجموعة غير خالية ولتكن  $*$  عملية ثنائية معرفة عليها، فإن الثنائي  $(S, *)$  يسمى زمرة اذا وفقط اذا توفرت الشروط الاتية :

1 \_ الخاصية التجميعية :

$$a, b, c \in S \quad \forall \quad a * (b * c) = (a * b) * c$$

2 \_ وجود العنصر المحايد :

يوجد عنصر  $e \in S$  بحيث

$$\forall a \in S, e * a = a * e = a$$

3 \_ وجود نظير العناصر :

لكل  $a \in S$  يوجد  $b \in S$  بحيث

$$a * b = b * a = e$$

( بهذه الحالة نكتب  $b = a^{-1}$  ) .

مثال (1) :

اذا كانت  $Z$  مجموعة الاعداد الصحيحة فإن  $(Z, +)$  تكون زمرة لكن  $(Z, \cdot)$  ليست زمرة وذلك لعدم وجود نظير للعنصر  $0 \in Z$ .

مثال (2) :

اذا كانت  $R$  مجموعة الاعداد الحقيقية فإن  $(R, +)$  تكون زمرة .

مثال (3) :

اذا كانت  $S$  مجموعة المصفوفات ذات الدرجة  $2 \times 2$  والعناصر المأخوذة من مجموعة الاعداد الصحيحة فإن  $S$  تكون زمرة تحت عملية جمع المصفوفات .

تعريف :

اذا كانت  $(S, *)$  زمرة فيقال بأنها تبادلية اذا وفقط اذا كان :

$$\forall a, b \in S, a * b = b * a$$

مثال (4) :

جميع الزمر المعرفة في الامثلة (1) , (2) , (3) اعلاه تكون زمراً تبادلية .

مثال (5) :

ان مجموعة المصفوفات المربعة ذات الدرجة  $3 \times 3$  وذات العناصر المأخوذة من مجموعة الاعداد الحقيقية والتي يكون محدد كل منها ليساوي صفر تكون زمرة غير تبادلية تحت عملية ضرب المصفوفات .

تعريف :

لتكن  $S$  مجموعة غير خالية ولتكن كل من  $*$  ،  $\#$  عملية ثنائية معرفة على  $S$  ، فإن الثلاثي  $(S, *, \#)$  يسمى حقلاً اذا وفقط اذا توفرت الشروط الاتية :

(1)  $(S, *)$  زمرة تبادلية .

(2)  $(S - \{0\}, \#)$  زمرة تبادلية ، حيث  $0 \in S$  هو العنصر المحايد بالنسبة للعملية  $*$

$$\forall a, b, c, \in S, a \# (b * c) = (a \# b) * (a \# c) \quad (3)$$

والخاصية اعلاه تسمى خاصية التوزيع .

مثال (6) :

الثلاثي  $(R, +, \cdot)$  هو حقل ويسمى حقل الاعداد الحقيقية .

مثال (7) :

الثلاثي  $(C, +, \cdot)$  هو حقل ويسمى حقل الاعداد العقدية .

ملاحظة :

سوف نرمز دائماً للعنصر المحايد بالنسبة للعملية الاولى  $*$  بالرمز  $O$


وسوف نرسم للعنصر المحايد بالنسبة للعملية الثانية # بالرمز I وذلك في أي حقل من الحقول (F, \*, #).


## Vectors in Plane and Space (1-2) المتجهات في المستوى والفراغ

في الفيزياء توجد مفاهيم كالقوة والازاحة والسرعة والتعجيل يحتاج وصفها إلى كمية واتجاه. لقد جرت العادة على تمثيل المفاهيم أعلاه بأسهم ذات أطوال ترمز للكمية ورأس السهم يرمز إلى الاتجاه.

في المستوى والفراغ يمكن وصف أي متجه على أنه زوج مرتب من النقاط (P, Q) وهذا يمثل متجه من P إلى Q ويرمز له بالرمز  $\vec{PQ}$  بهذه الحالة P تسمى نقطة البداية و Q تسمى نقطة النهاية.

سوف نقول بأن المتجهين متساويان إذا تساويا في الطول وكان لهما نفس الاتجاه ( انظر الشكل (2-1) ).






شكل (2-1) (ب)

في الشكل اعلاه، المتجهان  $\vec{PQ}$  و  $\vec{RS}$  متساويان ويمثلان نفس المتجه  $\vec{OT}$

هذا المفهوم للتساوي يمكننا ان نختار نقطة ثابتة  $O$  في المستوى او الفراغ ونعتبرها نقطة بداية لكل المتجهات وبهذا يمكننا ان نختصر المتجه  $\vec{OT}$  الى  $\vec{T}$ .  
 $\vec{T}$  يسمى متجه الموضع للنقطة  $T$  بالنسبة لنقطة الاصل  $O$ .

إن المتجهات التي تمثل القوى في الفيزياء يمكن جمعها لتنتج قوة جديدة تسمى محصلة القوى وذلك كالآتي:—

لو كان لدينا متجهان  $\vec{P}$ ,  $\vec{Q}$  فإن جمعهما كما مبين في الشكل (2-2).



شكل (2-2)

اي اننا نكمل متوازي الاضلاع الناشئ من النقاط الثلاث O,P,Q ونرمز للرأس الرابع بالرمز R ثم نضع  $\vec{P} + \vec{Q} = \vec{R}$  . يمكن التحقق من القوانين الثلاثة الاتية ببساطة .

$$(1) \vec{P} + \vec{Q} = \vec{Q} + \vec{P}$$

$$(2) (\vec{P} + \vec{Q}) + \vec{R} = \vec{P} + (\vec{Q} + \vec{R})$$

$$(3) \vec{P} + \vec{O} = \vec{O} + \vec{P} = \vec{P}$$


كذلك بالامكان تعريف ضرب متجه بعدد كالآتي :

لنفترض ان  $\vec{P}$  متجهاً وان  $a$  عدداً حقيقياً .

اذا كان  $a > 0$  فنعرف المتجه  $a\vec{P}$  على انه متجه باتجاه  $\vec{P}$  لكن طوله يساوي طول  $\vec{P}$  مضروب في  $a$  ( انظر الشكل 2-3 )

اذا كان  $a < 0$  فنعرف المتجه  $a\vec{P}$  على انه متجه بعكس اتجاه  $\vec{P}$  لكن طوله يساوي طول  $\vec{P}$  مضروب في  $-a$  ( انظر الشكل 2-3 ) .

اذا كان  $a = 0$  فنعرف  $a\vec{P}$  على انه يساوي  $\vec{O}$  ( المتجه الصفري ) .



شكل (2-3)

بذلك يمكن تحقيق القوانين التالية :


- (4)  $\vec{P} + (-1)\vec{P} = \vec{O}$
- (5)  $a(\vec{P} + \vec{Q}) = a\vec{P} + a\vec{Q}$
- (6)  $(a + b)\vec{P} = a\vec{P} + b\vec{P}$
- (7)  $(ab)\vec{P} = a(b\vec{P})$
- (8)  $0\vec{P} = \vec{O}, 1.\vec{P} = \vec{P}$

لاحظ ان القانون (6) يسمح بتوزيع المتجهات على الاعداد كما سمح

القانون (5) بتوزيع الاعداد على المتجهات، كما ان (+) ذكرت في (5) و (6) مرتين احدهما تعني الجمع الاعتيادي للاعداد والاخرى تعني جمع المتجهات.

الآن نستحدث احداثيات في المستوى بحيث ان كل نقطة  $P$  في المستوى تكتب على شكل  $P(x,y)$  واحداثيات في الفراغ بحيث ان كل نقطة  $P$  في الفراغ تكتب على شكل  $P(x,y,z)$  حيث  $x,y,z$  اعدادا حقيقية.

اعتبر ان  $\vec{A}$  هو اي متجه في المستوى وافرض، كما في الشكل (2.4) ان  $\vec{A}$  قد وضع بحيث تكون نقطة بدايته عند نقطة الاصل لنظام الاحداثيات والنقطة  $A(a,b)$  تكون نقطة نهايته، عندئذ نكتب:  $\vec{A} = (a,b)$ . (اي ان  $\vec{A}$  هو متجه الموضع للنقطة  $A$ ).



شكل (2.4)

إذا وضع متجهان متساويان  $\vec{A}, \vec{B}$  بحيث تقع نقطتا بدايتهما عند نقطة الأصل فإنه من الواضح ان نقطتي نهايتهما يجب ان تنطبقا ( لان المتجهين لهما نفس الطول والاتجاه ) . ولهذا يكون للمتجهين الاحداثيات نفسها . وبالوضوح نفسه فإن المتجهات التي لها الاحداثيات نفسها يجب ان يكون لها الطول نفسه والاتجاه نفسه ومن ثم تكون متساوية وملخص ذلك هو ان المتجهين

$$\vec{B} = (b_1, b_2), \vec{A} = (a_1, a_2)$$

يكونان متساويين اذا فقط اذا كان :

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2$$

ويمكن بسهولة اجراء عمليات جمع المتجهات والضرب في اعداد بدلالة الاحداثيات وذلك كما يلي : اذا كان  $\vec{B} = (b_1, b_2), \vec{A} = (a_1, a_2)$  فإن :

$$\vec{A} + \vec{B} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

واذا كان  $\vec{A} = (a_1, a_2)$  و  $r$  اي عدد حقيقي فإنه بالامكان اثبات ان :

$$r\vec{A} = (ra_1, ra_2)$$

فمثلاً اذا كان  $\vec{B} = (-3, 0), \vec{A} = (1, 2)$  فإن

$$\vec{A} + \vec{B} = (1, 2) + (-3, 0) = (1-3, 2+0) = (-2, 2)$$

$$5\vec{A} = 5(1, 2) = (5.1, 5.2) = (5, 10)$$

ومثال آخر على العمليات الجبرية على المتجهات في الفراغ :

اذا كان  $\vec{B} = (2, -1, 3), \vec{A} = (0, 1, 2)$  فإن


$$(1/2)\vec{A} - \vec{B} = (1/2)(0, 1, 2) + (-1)(2, -1, 3)$$

$$= (0, 1/2, 1) + (-2, 1, -3)$$

$$= (-2, 3/2, -2)$$

تظهر في بعض الاحيان متجهات نقطة بدايتها ليست عند نقطة الأصل . لاجراء احداثيات متجه  $\vec{A}$  نقطة بدايته هي  $P_1(x_1, y_1)$  ونقطة نهايته  $P_2(x_2, y_2)$  فإننا نكون متجهاً مساوياً نقطة بدايته عند نقطة الأصل . في شكل (2.5) ،  $\vec{Q} = \vec{OQ}$  ، هو هذا المتجه . وان مركبات  $\vec{A} = \vec{P_1P_2}$  هي الاحداثيات  $(a, b)$  للنقطة  $Q$  .





شكل (2.5)

من شكل (2.5)  $\vec{OQ} + \vec{OP}_1 = \vec{OP}_2$  او بدلالة الاحداثيات

$$(a, b) + (x_1, y_1) = (x_2, y_2)$$

$$\text{أو } (a + x_1, b + y_1) = (x_2, y_2)$$

بمساواة المركبات المتناظرة والحل بالنسبة الى  $a, b$  نحصل على ان الاحداثيات للمتجه  $\vec{A} = \vec{P}_1\vec{P}_2$  تعطى كما يلي:

$$a = (x_2 - x_1), b = (y_2 - y_1)$$

وبالطريقة نفسها بالنسبة الى المتجهات في الفراغ.

مثال (1) :

المتجه الذي نقطة بدايته  $P_1(3,4)$  ونقطة نهايته  $P_2(-5,7)$  هو  $\vec{A} = P_2 - P_1 = (-5-3, 7-4) = (-8, 3)$

نستنتج مما تقدم ان عناصر المستوى والفراغ يمكن جمعها بحيث ان الجمع يحقق القوانين (1), (2), (3) ويمكن ضربها بأعداد حقيقية بحيث تتحقق القوانين (4), (5), (6), (7), (8) اعلاه .

هنالك مجموعات كثيرة لها الخصائص نفسها التي توفرت بالمستوى  $R^2$  والفراغ  $R^3$  وسوف نطلق على كل مجموعة تحقق القوانين اعلاه اسم فضاء متجهات . ولكي نضع التعريف العام سوف نقدم مفهوم فضاء المتجهات على اي حقل وذلك في البند القادم .

### تمارين (1.2)

1 — إذا كان  $\vec{C} = (0,3)$ ,  $\vec{B} = (-1,4)$ ,  $\vec{A} = (1,2)$

(أ) جد المتجه  $2\vec{A} - \sqrt{2}\vec{B} + (1/3)\vec{C}$

(ب) جد اعداد حقيقية  $a, b$  تحقق المعادلة  $\vec{C} = a\vec{A} + b\vec{B}$

(ج) جد المتجه  $\sqrt{3}\vec{A} - \vec{B} - \vec{C}$

(د) ارسم المتجه  $\vec{B}$  ثم ارسم المتجهين  $2\vec{B}$ ,  $-3\vec{B}$  ولاحظ علاقتهما بالمتجه  $\vec{B}$ .

(هـ) جد الاعداد الحقيقية  $x, y$  التي تحقق المعادلة

$$x\vec{A} + y\vec{C} = \vec{O}$$

حيث ان  $\vec{O} = (0,0)$

(و) جد اعداد حقيقية  $x, y, z$  تحقق المعادلة (1) والشرط (2) أدناه .

$$x\vec{A} + y\vec{B} + z\vec{C} = \vec{O} \dots\dots (1)$$

$$xyz \neq 0 \dots\dots (2)$$

2 — جد متجهاً بدايته  $P(1,2)$  ويكون باتجاه المتجه  $\vec{Q} = (-2,3)$

3 — جد متجهاً بعكس اتجاه المتجه  $P(2,1,5)$  ونقطة نهايته في  $Q(-1,0,2)$

- 4 — اوجد مجموع المتجهين  $\vec{PQ}, \vec{RS}$  عندما  $P = (0,1,1)$   
 $S = (2,2,2), R = (1,0,-1), Q = (1,0,0)$
- 5 — لتكن  $S = (1,-1), R = (-2,3), Q = (2,3), P = (1,1)$   
 جد  $\vec{PQ} + \vec{RS}, \vec{PQ} - \vec{RS}$ .
- 6 — اكتب المتجه  $P(2,7,1)$  كحاصل جمع متجهين احدهما يوازي المستوى  $xy$  والآخر يوازي محور  $z$ .

### (1-3) فضاء المتجهات — Vector Space

لاحظنا في البند السابق امكانية تعريف عملية الجمع على كل من  $R^3$  و  $R^2$ ، وكذلك امكانية تعريف ضرب المتجهات في كل من  $R^3$  و  $R^2$  بأعداد حقيقية ( عناصر تنتمي الى حقل الاعداد الحقيقية  $R$  ).

ان العمليتين اعلاه تحققان الشروط 1-8 السالفة الذكر .

في هذا البند سنعرف فضاء المتجهات على حقل  $F$  ليس بالضرورة ان يكون حقل الاعداد الحقيقية .

تعريف:

بفضاء متجهات على الحقل  $F$  نقصد مجموعة  $V$  عناصرها تسمى متجهات بمعية عمليتين . العملية الاولى هي عملية جمع المتجهات والتي تعين لكل زوج من المتجهات  $A, B$  في  $V$  متجه وحيد  $A+B$  في  $V$  .

العلمية الثانية هي عملية الضرب القياسي والتي تعين لكل متجه  $A$  في  $V$  ولكل عدد  $x$  في الحقل  $F$  متجه يرمز له بالرمز  $xA$  يسمى الضرب القياسي للعدد  $x$  بالمتجه  $A$  . العمليتان اعلاه يجب ان تحققان الشروط التالية :

- 1 —  $A+B=B+A$  لكل زوج من المتجهات  $A, B$  ( القانون الابدالي ) .  
 2 —  $(A+B) + C = A + (B+C)$  لكل ثلاثي من المتجهات  $A, B, C$  .  
 ( القانون التجميعي ) .

3 — يوجد متجه وحيد  $O$  يسمى المتجه الصفري يحقق  $A + O = A$  لكل  $A$  في  $V$ .

4 — لكل متجه  $A$  في  $V$  يوجد متجه  $-A$  في  $V$  يحقق  $A + (-A) = O$ .

5 —  $x(A + B) = xA + xB$  لكل زوج من المتجهات  $A, B$  ولكل عدد  $x$  في  $F$ .

6 —  $(x + y)A = xA + yA$  لكل متجه  $A$  ولكل زوج من العناصر  $x, y$  في  $F$ .

7 —  $(xy)A = x(yA)$  لكل متجه  $A$  ولكل زوج من العناصر  $x, y$  في  $F$ .

8 —  $1.A = A$  لكل متجه  $A$  في  $V$ .

ان عناصر الحقل  $F$  تسمى اعداداً قياسية.

لقد لاحظنا ان كلاً من  $R^2$  و  $R^3$  (المستوى، الفراغ) على التوالي يكون فضاء متجهات على حقل الاعداد الحقيقية. لكن هنالك فضاءات كثيرة ليست ذات طبيعة هندسية ولكن لها نفس البنية الرياضية والخصائص الجبرية كالفضاءات  $R^2$  و  $R^3$ .

ملاحظة:

لقد عرفنا فضاء المتجهات على اي حقل معين لكي يكون تناولنا للمادة شاملاً وعماماً لكننا سوف نركز في امثلتنا على حقلين فقط هما حقل الاعداد الحقيقية  $R$  وحقل الاعداد العقدية  $C$ . في بعض المسائل نتطرق الى حقل الاعداد النسبية.

امثلة متنوعة على فضاء المتجهات

1 — لتكن  $V$  مجموعة المصفوفات  $2 \times 2$  عناصرها اعداد حقيقية.

اذا كان:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

فإن الجمع يعرف كالاتي :

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

$$xA = \begin{bmatrix} xa_{11} & xa_{12} \\ xa_{21} & xa_{22} \end{bmatrix}$$

ونعرف عملية الضرب القياسي كالاتي :  
لكل عدد حقيقي  $x$ .

إن  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $R$  بالنسبة للعملياتين اعلاه ويمكن تحقيق ذلك كالاتي :

الشروطان (1)، (2) يتحققان بدون عناء وذلك لان جمع الاعداد الحقيقية يكون ابدالياً وتجميعياً.

بالنسبة للشروط (3) نأخذ

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A + O = A$$

وبذلك يمكن تحقيق

$$A \in V$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in V \quad \text{بالنسبة للشرط (4)، لكل}$$

$$-A = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & -a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{يعرف -A بالآتي:}$$

$$A + (-A) = O \quad \text{بذلك يكون لدينا:}$$

الشروط الأخرى يمكن تحقيقها بسهولة.

2 — بصورة عامة إذا كان  $F$  حقلاً فإن مجموعة المصفوفات  $m \times n$  على الحقل  $F$  والتي يرمز لها بالرمز  $M_{mn}(F)$  تكون فضاء متجهات على الحقل  $F$  بالنسبة لعملية جمع المصفوفات وعملية ضرب المصفوفات بأعداد.

3 — إذا كان  $F$  حقلاً وكان  $n$  عدداً طبيعياً فإن المجموعة  $F^n$  تعرف بالآتي:

$$F^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in F\}$$

وتكون فضاء متجهات على الحقل  $F$  بالنسبة لعملية الجمع المعروفة بـ

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

وعملية الضرب القياسي المعروفة بـ

$$r(x_1, \dots, x_n) = (rx_1, \dots, rx_n)$$

ملاحظة:

الفضاء  $F^n$  في المثال أعلاه هو تعميم للفضائين  $R^2$  و  $R^3$  فعندما  $F = R$

و  $n = 2$  نحصل على الفضاء  $R^2$  وعندما  $F = R$  و  $n = 3$  نحصل على الفضاء  $R^3$ .

4 — لاي عدد طبيعي  $n$  ولاي حقل  $F$  نعرف المجموعة

$$P_n(F) = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n : a_i \in F\}$$

اي ان  $P_n(F)$  مجموعة متعددا الحدود بـ  $x$  ذات الدرجة التي لاتتعدى  $n$  ومعاملاتها عناصر في الحقل  $F$ .  $P_n(F)$  تكون فضاء متجهات على الحقل  $F$  بالنسبة لعملية الجمع المعروفة بـ

$$(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) =$$

$$(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n$$

وعملية الضرب القياسي المعروفة بـ

$$r(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = (ra_0) + (ra_1)x + \dots + (ra_n)x^n$$

نشير هنا الى ان متعددة الحدود الصفرية

$$0 = 0 + 0x + \dots + 0x^n$$

تكون المتجه الصفرى وإن نظير اى متجه  $A = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$

$$-A = (-a_0) + (-a_1)x + \dots + (-a_n)x^n$$

المثال التالي يوضح تعدد فضاءات المتجهات .

٤ — لتكن  $(a, b)$  الفترة المفتوحة والتي تحتوي على جميع الاعداد الحقيقية  $x$  التي

$$a < x < b$$

لتكن :  $C(a, b) = \{f : f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \text{ دالة مستمرة} \}$

اي ان  $C(a, b)$  تمثل مجموعة الدوال الحقيقية والمستمرة والمعروفة على الفترة المفتوحة  $(a, b)$ .

$C(a, b)$  تكون فضاء متجهات على حقل الاعداد الحقيقية  $\mathbb{R}$  بالنسبة لعمليتي الجمع والضرب القياسي المعرفين كما يلي :

$$f, g \in C(a, b), (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$r \in \mathbb{R}, f \in C(a, b), (rf)(x) = rf(x)$$

بما ان جمع الدوال اعلاه معرف بواسطة جمع الاعداد الحقيقية فإن الشروط (1) ، (2) تتحقق ( لاحظ ان  $f + g$  تكون دالة مستمرة وان  $rf$  تكون دالة مستمرة لأي  $f, g \in C(a, b)$  ولأي عدد حقيقي  $r$  .

ان المتجه الصفري في  $C(a, b)$  يكون الدالة  $O: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

المعرفة بـ  $O(x) = 0$  لكل  $x \in (a, b)$

كما ان نظير  $f$  هو  $-f$  ويعرف كما يلي  $(-f)(x) = -f(x)$

$$\begin{aligned} (O + f)(x) &= O(x) + f(x) && \text{بما ان} \\ &= O + f(x) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

فيكون:  $O + f = f$

لكل  $f \in C(a, b)$  اي ان الشرط (3) يتحقق ولتحقيق الشرط (4) نلاحظ:

$$\begin{aligned} (f + (-f))(x) &= f(x) + (-f)(x) \\ &= f(x) - f(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

إذن:  $f + (-f) = 0$  لكل  $f \in C(a, b)$  . لتحقيق الشرط (5) نلاحظ:

$$\begin{aligned} (r(f + g))(x) &= r(f + g)(x) \\ &= r(f(x) + g(x)) \\ &= rf(x) + rg(x) \\ &= (rf)(x) + (rg)(x) \\ &= (rf + rg)(x) \end{aligned}$$

فيكون:

$$r(f + g) = rf + rg$$



لكل  $r \in \mathbb{R}$  ولكل  $f, g \in C(a, b)$ . يمكن تخمين الشروط (6), (7), (8) بصورة مماثلة.

ملاحظة:

ان نوع العملية مهم جداً في بناء فضاء المتجهات والمثال الآتي يوضح ذلك.

6 — لتكن  $\mathbb{R}^2$  مجموعة نقاط المستوى. انظر الى العمليتين

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$r(x, y) = (rx, y)$$

ان  $\mathbb{R}^2$  لا تكون فضاء متجهات بالنسبة للعمليتين اعلاه. وذلك لانه عند اخذ:

$$\text{فإن } A = (1, 1), r_2 = -2, r_1 = 1$$

$$(r_1 + r_2) A = (1-2) A = (-1) (1, 1) = (-1, 1)$$

$$r_1 A = (1, 1), r_2 A = (-2, 1)$$

$$r_1 A + r_2 A = (1, 1) + (-2, 1) = (-1, 2) \neq (-1, 1)$$

اي ان  $r_1 A + r_2 A \neq (r_1 + r_2) A$ .

امتد حسابية

1 — في الفضاء  $M_{23}(\mathbb{R})$  على الحقل  $\mathbb{R}$ ، اذا كان

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & \sqrt{3} \\ 2 & 7 & 1/2 \end{bmatrix}$$

فاحسب كل من:  $2A + 5B, 3B, 2A$

الحل: بمراجعة مثال (2) يتضح أن

$$\sqrt{2}A = \sqrt{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 3\sqrt{2} & 5\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$3B = 3 \begin{bmatrix} 0 & -1 & \sqrt{3} \\ 2 & 7 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3\sqrt{3} \\ 6 & 21 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

$$2A + 5B = 2 \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 & -1 & \sqrt{3} \\ 2 & 7 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & 0 & 2 \\ -2 & 6 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -5 & 5\sqrt{3} \\ 10 & 35 & 5/2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & -5 & 2+5\sqrt{3} \\ 8 & 41 & 25/2 \end{bmatrix}$$

2 — في الفضاء  $C^3$  على الحقل  $C$  حقل الأعداد العقدية، إذا كان

$$A = (i, 1 + i, 5), B = (2 + i, 1 + 3i, -i)$$

فاحسب كلاً من:  $iA - (2 + 3i)B, (1 + i)B, 2A$   
بمراجعة مثال (3) يتضح ان:

$$2A = 2(i, 1 + i, 5) = (2i, 2 + 2i, 10)$$

$$(1 + i)B = (1 + i)(2 + i, 1 + 3i, -i)$$

$$= ((1 + i)(2 + i), (1 + i)(1 + 3i), (1 + i)(-i))$$

$$= (1 + 3i, -2 + 4i, 1 - i)$$

$$iA - (2 + 3i)B = (-1, -1 + i, 5i) - (1 + 8i, -7 + 9i, 3 - 2i)$$

$$= (-2 - 8i, 6 - 8i, -3 + 7i)$$

3 — في الفضاء  $P_2(\mathbb{R})$  على الحقل  $\mathbb{R}$ ، إذا كان

$$A = 2 + 3x - x^2, B = 5, C = \sqrt{2}x$$

فاحسب كلاً من:  $A + B + 3C, (1/2)A$

الحل: بمراجعة مثال (4) يتضح ان:

$$(1/2)A = (1/2)(2 + 3x - x^2) = 1 + (3/2)x - (1/2)x^2$$

$$A + B + 3C = (2 + 3x - x^2) + (5) + 3(\sqrt{2}x)$$

$$= 7 + 3(1 + \sqrt{2})x - x^2$$

4 — في الفضاء  $C(-1, 3)$  على الحقل  $\mathbb{R}$ ، إذا كان

$$f: (-1, 3) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 5x - 2$$

$$g: (-1, 3) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \sin \pi x$$

فاحسب كلاً من:  $2f - 4g, (1/3)g, -f$

الحل: بمراجعة المثال (5) يتضح ان:

$$-f: (-1, 3) \rightarrow \mathbb{R}, (-f)(x) = -f(x)$$

$$(-f)(x) = -(5x-2)$$

$$= -5x + 2$$

اي ان:

$$(1/3)g: (-1, 3) \rightarrow \mathbb{R}, ((1/3)g)(x) = (1/3)g(x)$$

$$((1/3)g)(x) = (1/3)\sin \pi x$$

$$(2f-4g)(x) = 2f(x)-4g(x)$$

$$= 2(5x-2)-4\sin \pi x$$

$$= 10x-4-4\sin \pi x$$

بعد استعراض امثلة متنوعة على مفهوم فضاء المتجهات وقبل الدخول في مفهوم الفضاء الجزئي سندكر المبرهنة التالية.

مبرهنة (1.3.1):

ليكن  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$ . وليكن  $A \in V$  متجهاً و

$x \in F$  عدداً قياسياً فإن:

$$0A = O \quad 1$$

$$(-1)A = -A \quad 2$$

$$x.O = O \quad 3$$

البرهان:

1 — من خصائص فضاء المتجهات يكون لدينا:

$$0A = (0+0)A$$

$$= 0A + 0A$$

$$0A = 0A + O \quad \text{لكن}$$

$$0A + O = 0A + 0A$$

إذن:

بإضافة  $(-oA)$  الى طرفي المعادلة اعلاه نحصل على

$$-(oA) + (oA + O) = -(oA) + (oA + oA)$$

$$(-oA) + oA + O = (-oA) + oA + oA$$

$$O + O = O + oA$$

$$O = oA$$

$$(1 + (-1))A = 1A + (-1)A$$

— 2

$$oA = A + (-1)A$$

$$O = A + (-1)A$$

$$(-1)A = -A$$

وعليه يكون لدينا

$$x(O + O) = xO + xO$$

— 3

$$xO = xO + xO$$

$$O + xO = xO + xO$$

بإضافة  $(xO)$  الى طرفي المعادلة اعلاه واجراء خطوات مماثلة لتلك التي اجريناها في برهان (1) نحصل على النتيجة المطلوبة.

( و . ه . م . )

### تمارين (1.3)

1 — اكتب الفضاء الذي ينتمي اليه كل من المتجهات التالية ووضح على اي حقل ممكن ان يكون .

$$(1,2,-1), (2,2+i,5), (1,1,-1,i), -6, 4+2i$$

$$(1/2,1), (\sqrt{2},1/3), \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} i + 2x - (1+i)x^2$$

$$f(x) = e^x, \quad f: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$$

2- (م) في الفضاء  $M_{23}(\mathbb{C})$  على الحقل  $\mathbb{C}$ ، جد ناتج كلا مما يلي:

$$2i \begin{pmatrix} 1 & 0 & -i \\ 1+i & -5 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ i & i & -i \end{pmatrix} + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1/2 & 2-i & 7+i \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix}$$

(ب) في الفضاء  $P_3(\mathbb{R})$  على الحقل  $\mathbb{R}$ ، جد ناتج مايلي:

$$\sqrt{3}(2+x-x^2)-4x^3+(2-7x+4x^2)$$

(ج) جد قيم  $a, b$  التي تحقق المعادلة:

$$a \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 11/2 & 0 \end{pmatrix}$$

وذلك في الفضاء  $M_2(\mathbb{R})$  على حقل الاعداد الحقيقية.

3- ليكن  $F$  حقلاً و  $S$  مجموعة غير خالية. لتكن  $V$  مجموعة كل الدوال من  $S$

الى  $F$ . نعرف جمع اي دالتين  $f, g \in V$  على انه الدالة  $f+g \in V$  المعرفة

كما يلي:  $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ . ونعرف حاصل ضرب عدد قياسي

$r \in F$  بالدالة  $f \in V$  على انه الدالة  $rf$  المعرفة كما يلي:

$$(rf)(x) = rf(x)$$

إثبت ان  $V$  تكون فضاء متجهات على الحقل  $F$  وذلك بالنسبة للعملياتين اعلاه.

4 — لتكن  $V = \mathbb{R}^+$  مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة . نعرف الجمع والضرب بأعداد قياسية من الحقل  $\mathbb{R}$  كما يلي :

$$x + y = xy$$

$$rx = x^r$$

وذلك لأي  $x, y \in V$  ولأي عدد حقيقي  $r$  .

إثبت أن  $V$  فضاء متجهات بالنسبة للعمليات أعلاه .

5 — اثبت أن مجموعة حلول نظام المعادلات المتجانسة :

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$

تكون فضاء متجهات على الحقل  $F$  علماً بأن  $a_{ij} \in F$  لكل  $i, j$  .

6 — لتكن  $V = \mathbb{R}^2$  . نعرف عمليتي جمع وضرب قياسي كالآتي :

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (3y_1 + 3y_2, -x_1 - x_2)$$

$$r(x, y) = (3ry, -rx)$$

هل أن  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $\mathbb{R}$  ؟

7 — لتكن  $V = \mathbb{R}^2$  . برهن على أن  $V$  ليست فضاء متجهات على  $\mathbb{R}$  بالنسبة

إلى كل من عمليتي الجمع والضرب القياسي التالية

$$(i) (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2); r(x, y) = (x, 2ry)$$

$$(ii) (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1, y_1); r(x, y) = (rx, ry)$$

$$(iii) (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2); r(x, y) = (r^2x, r^2y)$$

8 — برهن على أن  $\mathbb{C}^n$  يكون فضاء متجهات على حقل الأعداد الحقيقية

أيضاً، وذلك لأي  $n$  .

9 — اثبت أن المعادلة :

$$x(1 + i, 1 - i) + y(2, 5 + 2i) = (7 + i, 21 + 9i)$$

قابلة للحل في الفضاء  $C^2$  على الحقل  $C$ ، لكن غير قابلة للحل في الفضاء  $C^2$  على الحقل  $R$ .

#### (1.4) الفضاءات الجزئية Subspaces

إذا كان  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$  فإن بعض المجموعات الجزئية من الفضاء  $V$  تكون بدورها فضاءات متجهات بالنسبة الى عمليتي جمع المتجهات والضرب في اعداد قياسية المعرفتين على  $V$ . سوف ندرس في هذا البند مثل هذه المجموعات الجزئية بالتفصيل.

تعريف:

اي مجموعة جزئية  $M$  من فضاء متجهات  $V$  على الحقل  $F$  تسمى فضاءاً جزئياً من  $V$  اذا كانت  $M$  فضاء متجهات بالنسبة الى عمليتي الجمع والضرب بأعداد قياسية المعرفتين على  $V$ .

لو رجعنا الى تعريف فضاء المتجهات لعرفنا مايلي:

حتى تكون المجموعة  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$  يجب ان يعرف عملية جمع على  $V$ ، اي انه لاي زوج من العناصر  $A, B$  في  $V$  يجب ان يكون حاصل الجمع  $A + B$  عنصراً في  $V$  كذلك فإنه يجب ان تعرف عملية ضرب قياسي، اي لاي عنصر  $A$  في  $V$  ولاي عدد  $x$  في الحقل  $F$  يجب ان يكون حاصل الضرب القياسي  $x \cdot A$  عنصراً في  $V$ . بالاضافة الى الشروط الثانية الواردة في التعريف.

الان لو اعطيت لنا مجموعة جزئية  $M$  من فضاء متجهات  $V$  على الحقل  $F$  وطلب منا ان نحقق فيما اذا كانت  $M$  فضاءاً جزئياً من  $V$  فيجب علينا ان نحقق مايلي:

(أ) لاي زوج من العناصر  $A, B$  في  $M$  يجب ان يكون  $A + B$  عنصراً في  $M$  (عندئذ نقول بأن  $M$  مغلقة تحت عملية الجمع).



(ب) لاي عنصر  $A$  في  $M$  ولاي عدد قياسي  $x$  في  $F$  يجب ان يكون  $xA$  عنصراً في  $M$  ( عندئذ نقول بأن  $M$  مغلقة تحت عملية الضرب القياسي ).

هذا بالاضافة الى تحقيق الشروط من (1) الى (8) الواردة في تعريف فضاء المتجهات .

على الرغم من ذلك، اذا كانت  $M$  مجموعة جزئية من مجموعة اكبر  $V$  التي تكون بالفعل فضاء متجهات، فإن بعض الشروط لا تحتاج الى تحقيق للفضاء  $M$  لانها تورث من  $V$ . فمثلاً لا توجد حاجة للتأكد من ان  $A+B = B+A$  ( الشرط (1) ) للفضاء  $M$  لانها تتحقق لجميع المتجهات في  $V$  ومن ثم جميع المتجهات في  $M$ .

بهذا تكون بقية الشروط الموروثة من  $V$  الى  $M$  هي (2)، (5)، (6)، (7)، (8). اما الشرطان (3)، (4) فيمكن استنتاجهما من الشرطين (أ)، (ب) كما يوضحهما برهان المبرهنة الآتية:

## مبرهنة (1-4-1):

اذا كانت  $M$  مجموعة جزئية غير خالية من فضاء المتجهات  $V$  على الحقل  $F$  فإن  $M$  تكون فضاء متجهات اذا وفقط اذا تحققت الشروط التالية:

(أ) اذا كان  $A, B$  متجهين في  $M$  فإن  $A+B$  ايضاً في  $M$ .

(ب) اذا كان  $x$  اي عدد قياسي وكان  $A$  اي متجه في  $M$  فإن  $xA$  ايضاً في  $M$ .

## البرهان:

اذا كان  $M$  فضاءً جزئياً فإن جميع الشروط تتحقق وبالاخص الشرطين (أ)، (ب) اعلاه.

بالعكس نفرض تحقق الشرطين (أ)، (ب) اعلاه. حتى يكون  $M$

فضاءاً جزئياً نحتاج فقط الى ان نحقق بقية الشروط وكما وضعنا اعلاه نحتاج فقط الى ان نحقق الشرطين (3)، (4) لان بقية الشروط تورث من  $V$  الى  $M$ .

اعتبر  $A$  اي متجه في  $M$ . من الشرط (ب) اعلاه يكون  $x_A$  في  $M$  لاي عدد قياسي  $x$ . بوضع  $x=0$  ينتج ان  $0A=0$  موجود في  $M$ ، وبوضع  $x=-1$  ينتج ان  $A = -A$  موجود في  $M$ .

( و . ه . م . )

لكل فضاء متجهات  $V$  يوجد على الاقل فضاءان جزئيان. يكون  $V$  نفسه فضاءاً جزئياً والمجموعة  $\{0\}$  المكونة فقط من المتجه الصفري تكون فضاءاً جزئياً يسمى بالفضاء الجزئي الصفري. الامثلة الآتية تتناول حالات للفضاءات الجزئية اقل بداهة من الفضاءين الجزئيين اعلاه.

مثال (1):

برهن على ان المجموعة:  $M = \{(x, y) : y = 2x\}$  تكون فضاءاً جزئياً من فضاء المتجهات  $R^2$  على الحقل  $R$ .

الحل: خذ  $A = (x_1, y_1)$  و  $B = (x_2, y_2)$  اي متجهين في  $M$  و  $k$  اي عدد قياسي ( $k$  عدد حقيقي)، فيكون:  $kA = (kx_1, ky_1)$ ،  $A + B = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 &= 2x_1 + 2x_2 \\ &= 2(x_1 + x_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ky_1 &= k(2x_1) \\ &= 2(kx_1) \end{aligned}$$

لذلك فإن:  $A + B \in M, kA \in M$

لقد برهننا على ان  $M$  مجموعة مغلقة تحت عمليتي الجمع والضرب القياسي فبذلك تكون  $M$  فضاءاً جزئياً من  $R^2$ .

مثال (2):

برهن على ان المجموعة:

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix} : a, b \text{ اعداد حقيقية} \right\}$$

تكون فضاءاً جزئياً من فضاء المتجهات  $M_{22}(R)$  على الحقل  $R$  (فضاء المصفوفات  $2 \times 2$  التي عناصرها اعداد حقيقية).

$$\text{الحل: خذ } B = \begin{bmatrix} 0 & a_2 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{bmatrix}$$

اي متجهين في  $M$  و  $x$  اي عدد حقيقي، فيكون:

$$A+B = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_2 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & a_1+a_2 \\ b_1+b_2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$xA = x \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & xa_1 \\ xb_1 & 0 \end{bmatrix}$$

وعليه يكون  $A+B \in M$  و  $xA \in M$  بذلك تكون  $M$  فضاءً جزئياً.

مثال (3) :

برهن على ان المجموعة :

$$M = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + 3x_4 = 0 \text{ و } x_2 = x_3\}$$

تكون فضاءً جزئياً من فضاء المتجهات  $R^4$  على الحقل  $R$ .

الحل : نخذ  $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$  ،  $B = (b_1, b_2, b_3, b_4)$  ،

اي متجهين في  $M$  و  $k$  اي عدد حقيقي .

$$a_1 + 3a_4 = 0, a_2 = a_3$$

نستنتج من ذلك ان :

$$b_1 + 3b_4 = 0, b_2 = b_3$$

$$A + B = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, a_4 + b_4)$$

الان

$$(a_1 + b_1) + 3(a_4 + b_4) = (a_1 + 3a_4) + (b_1 + 3b_4)$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

$$a_2 + b_2 = a_3 + b_3$$

$$A + B \in M$$

وعليه يكون

$$kA = (ka_1, ka_2, ka_3, ka_4)$$

$$ka_1 + 3ka_4 = k(a_1 + 3a_4) = k \cdot 0 = 0$$

$$ka_2 = ka_3$$

$kA \in M$  وعليه يكون

بذلك يكون  $M$  فضاءً جزئياً من الفضاء  $R^4$  على الحقل  $R$

مثال (4) :

برهن على ان المجموعة :

$$M = \{a + bx + cx^2 : a + 2b - c = 1\}$$

ليست فضاءً جزئياً من الفضاء  $P_2(R)$  على الحقل  $R$ .

الحل : لو اخذنا :  $A = a_1 + b_1x + c_1x^2$

$B = a_2 + b_2x + c_2x^2$  اي متجهين في  $M$ .

$$a_2 + 2b_2 - c_2 = 1, a_1 + 2b_1 - c_1 = 1$$

لاستنتجنا بأن

$$A + B = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)x^2$$

لكن

$$(a_1 + a_2) + 2(b_1 + b_2) - (c_1 + c_2) =$$

نلاحظ ان

$$(a_1 + 2b_1 - c_1) + (a_2 + 2b_2 - c_2)$$

$$= 1 + 1 = 2 \neq 1$$

$$A + B \notin M$$

من هذا نستنتج على ان

اي ان  $M$  مجموعة ليست مغلقة تحت عملية الجمع . وبذلك لا يمكن لـ  $M$  ان تكون فضاءً جزئياً .

مثال (5) :

فيما يلي مجموعات جزئية من فضاء الدوال  $C(1,5)$  ( راجع مثال (5) في

البند (1.3) ) . اختر كل مجموعة من حيث كونها فضاءً جزئياً .

$$M_1 = \{f: 3f(4) = f(2)\}$$

$$M_2 = \{f: f(x) > 0 \text{ لجميع قيم } x \text{ في الفترة } (1,5)\}$$

$$M_3 = \{f: f(x) \leq 0 \text{ لجميع قيم } x \text{ في الفترة } (1,5)\}$$

$$M_4 = \{f: f(x) = f(6-x) \text{ لجميع قيم } x \text{ في الفترة } (1,5)\}$$

الحل : إختبار  $M_1$  :

خذ  $f$  ،  $g$  اي متجهين في  $M_1$  وخذ  $k$  اي عدد حقيقي :

$$3g(4) = g(2), 3f(4) = f(2)$$

$$3(f+g)(4) = 3(f(4) + g(4))$$

الان :

$$= 3f(4) + 3g(4)$$

$$= f(2) + g(2)$$

$$= (f+g)(2)$$

بذلك يكون:  $f + g \in M_1$

$$\begin{aligned} 3(kf)(4) &= 3(kf(4)) \\ &= k(3f(4)) \\ &= k(f(2)) \\ &= (kf)(2) \end{aligned}$$

بذلك يكون:  $kf \in M_1$

وعليه فإن  $M_1$  فضاء جزئي من  $C(1,5)$ .

اختبار  $M_2$ : ان الشرط الموضوع على الدوال التي تنتمي الى  $M_2$  هو ان هذه الدوال تكون موجبة لجميع قيم المجال  $(1,5)$ . انه لمن الواضح ان حاصل جمع اي دالتين موجبتين يكون دالة موجبة وبذلك تكون  $M_2$  مغلقة تحت عملية الجمع. لكن  $M_2$  ليست مغلقة تحت عملية الضرب القياسي لانه لو كان  $k$  عدداً حقيقياً سالباً فإنه لاي  $f \in M_2$  يكون لدينا:

$$\begin{aligned} \text{لاي } (kf)(x) = kf(x) < 0, x \in (1,5) \\ \text{( لأن } f(x) > 0 \text{ و } k < 0 \text{ )} \end{aligned}$$

بذلك نستنتج على ان  $M_2$  ليست فضاءً جزئياً من فضاء الدوال  $C(1,5)$  على الحقل  $R$ .

إختبار  $M_3$ :  $M_3$  ليست فضاءً جزئياً وذلك لانها غير مغلقة تحت عملية الضرب القياسي والتوضيح مماثل الى حالة  $M_2$ .

إختبار  $M_4$ :  $M_4$   $f, g$  اي متجهين في  $M_4$  وخذ  $k$  اي عدد حقيقي.

$$g(x) = g(6-x), f(x) = f(6-x) \quad \text{يكون عندنا:}$$

$$\begin{aligned} (f+g)(x) &= f(x) + g(x) \\ &= f(6-x) + g(6-x) \\ &= (f+g)(6-x) \end{aligned}$$

بذلك يكون  $f+g \in M_4$

$$(kf)(x) = kf(x) = kf(6-x) \\ = (kf)(6-x)$$

بذلك يكون  $kf \in M_4$

نستنتج من هذا على ان  $M_4$  تكون فضاءً جزئياً من الفضاء  $C(1,5)$  على الحقل  $R$ .

#### تمارين (1.4)

1 — حدد اي مما يلي يكون فضاءً جزئياً من  $R^n, n \geq 3$ .

- (أ) جميع المتجهات  $A = (x_1, \dots, x_n)$ ، حيث  $x_1 > 0$ .  
 (ب) جميع المتجهات  $A = (x_1, \dots, x_n)$ ، حيث  $x_1 + 5x_2 = x_3$ .  
 (ج) جميع المتجهات  $A = (x_1, \dots, x_n)$ ، حيث  $x_1 x_n = 0$ .  
 (د) جميع المتجهات  $A = (x_1, \dots, x_n)$ ، حيث  $x_2 = 2x_1^3$ .

2 — حدد اي مما يلي يكون فضاءً جزئياً من  $M_{22}(R)$ .

- (أ) جميع المصفوفات  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، حيث  
 (ب) جميع المصفوفات  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، حيث  $a, b, c, d$  اعداد صحيحة.

$$a - b + 2c = 0$$

- (ج) جميع المصفوفات  $A$  ذات الدرجة  $2 \times 2$  بحيث يكون  $A^T = A$ .  
 (د) جميع المصفوفات  $A$  ذات الدرجة  $2 \times 2$  بحيث يكون  $\det(A) = 0$ .

3 — حدد اي مما يلي يكون فضاءً جزئياً من  $C^3$  على الحقل  $C$ .

- (أ) جميع المتجهات  $A = (z_1, z_2, z_3)$ ، حيث  $z_1 - z_2 + z_3 = 0$ .  
 (ب) جميع المتجهات  $A = (z_1, z_2, z_3)$ ، حيث  $z_1 = 5$ .

(ج) جميع المتجهات  $A = (z_1, z_2, z_3)$  ، حيث  $z_1 = \bar{z}_2$  .

(د) جميع المتجهات  $A = (z_1, z_2, z_3)$  حيث  $|z_3| = 4$  .

4 — حدد اي مما يلي يكون فضاءً من  $P_3(\mathbb{R})$  .

(أ) جميع متعددات الحدود  $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$  ، حيث  $a_2 = 0$  .

(ب) جميع متعددات الحدود  $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$  ، حيث

$$a_0 - a_1 + a_3 = 0$$

(ج) جميع متعددات الحدود  $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$  ،

$$a_1 + a_2 = 1$$

5 — حدد اي مما يلي فضاءً جزئياً من فضاء الدوال  $C[0,1]$  المعرفة على الفترة

المغلقة  $[0,1]$  .

(أ) جميع الدوال  $f$  التي تحقق  $f(1) = 0$  .

(ب) جميع الدوال  $f$  التي تحقق  $f(x) \leq 0$  لكل  $x \in [0,1]$  .

(ج) جميع الدوال  $f$  التي تحقق  $f(1/2) = (f(0) + f(3/4))/2$  .

(د) جميع الدوال الثابتة .

(هـ) جميع الدوال  $f$  التي يمكن كتابتها  $f(x) = a + bx$  حيث  $a, b$  اعداداً

حقيقية .

### (1-5) جبر الفضاءات الجزئية Algebra of Subspaces

إذا كان كل من  $M_1$  و  $M_2$  فضاءً جزئياً من فضاء المتجهات  $V$  على

الحقل  $F$  فإنه بالإمكان تكوين المجموعتين

$$M_1 \cup M_2 = \{A \in V : A \in M_2 \text{ أو } A \in M_1\}$$

$$M_1 \cap M_2 = \{A \in V : A \in M_2 \text{ و } A \in M_1\}$$

سنبين في هذا البند ان الاتحاد  $M_1 \cup M_2$  لا يكون دائماً فضاءً جزئياً من

$V$  ، في حين ان التقاطع  $M_1 \cap M_2$  يكون دائماً فضاءً جزئياً ثم نعطي امثلة على

كيفية حساب تقاطع فضاءين جزئيين . سنتطرق كذلك الى جمع الفضاءات الجزئية

وخصائصها .



مبرهنه (1.5.1):

إذا كان كل من  $M_1$  و  $M_2$  فضاءاً جزئياً من فضاء المتجهات  $V$  على الحقل  $F$  فإن

(أ)  $M_1 \cap M_2$  يكون فضاءاً جزئياً.

(ب)  $M_1 \cup M_2$  يكون فضاءاً جزئياً إذا وفقط إذا كانت

$M_2 \subset M_1$  أو  $M_1 \subset M_2$ .

البرهان: (أ)

خذ  $A, B$  اي متجهين في  $M_1 \cap M_2$  وخذ  $k$  اي عدد قياسي في  $F$ .

يجب البرهنة على ان  $A+B \in M_1 \cap M_2$  و  $kA \in M_1 \cap M_2$

من الفرض نستنتج على ان  $A \in M_1$  و  $B \in M_1$  و  $A \in M_2$  و  $B \in M_2$ .

بما ان كل من  $M_1, M_2$  فضاءاً جزئياً فنحصل على:

$$A+B \in M_2 \text{ و } A+B \in M_1$$

$$\text{و } kA \in M_2 \text{ و } kA \in M_1$$

$$A+B \in M_1 \cap M_2 \quad \text{بذلك يكون لدينا}$$

$$kA \in M_1 \cap M_2$$

(ب) افرض أن  $M_1 \cup M_2$  فضاء جزئي من  $V$ .

لو كان  $M_1 \not\subset M_2$  و  $M_2 \not\subset M_1$  لاستنتجنا انه:

$$\text{يوجد } A \in M_1 \text{ و } A \notin M_2$$

$$\text{ويوجد } B \in M_2 \text{ و } B \notin M_1$$

على اي حال يكون لدينا

$$A \in M_1 \cup M_2 \text{ و } B \in M_1 \cup M_2$$

بما ان  $M_1 \cup M_2$  فضاء جزئي نستنتج:—

$$A+B=C \in M_1 \cup M_2$$

$$A = C - B \dots (1) \quad \text{الآن :}$$

$$B = C - A \dots (2)$$

فإذا كان  $C \in M_1$  فإن (2) تعطي  $B \in M_1$  وذلك لأن  $A \in M_1$  وكون  $M_1$  فضاءاً جزئياً ينتج أن  $-A \in M_1$  وبذلك يكون  $(B = C - A = C + (-A)) \in M_1$ . وهذا غير ممكن. أما إذا كان  $C \in M_2$  فإن (1) تعطي  $A \in M_2$  وهذا غير ممكن.

$$\text{اذن : } C \notin M_1 \text{ و } C \notin M_2$$

$$\text{اي ان : } C \notin M_1 \cup M_2$$

وهذا تناقض

$$\text{اذن } M_2 \subset M_1 \text{ أو } M_1 \subset M_2$$

على العكس لو افترضنا أن

$$M_2 \subset M_1 \text{ أو } M_1 \subset M_2$$

$$\text{فإن } M_1 \cup M_2 = M_1 \text{ أو } M_1 \cup M_2 = M_2$$

وبأي حالة يكون  $M_1 \cup M_2$  فضاءاً جزئياً.

( و . ه . م . ٠ )

فيما يلي نعطي مثلاً يوضح ان  $M_1 \cup M_2$  لا يكون فضاءاً جزئياً بصورة

عامة .

مثال (1) :

في الفضاء  $R^2$  على الحقل  $R$ ، كل من

$$M_1 = \{(x, y) : x + 2y = 0\}$$

$$M_2 = \{(x, y) : 5x + y = 0\}$$

يكون فضاءاً جزئياً من  $R^2$ .

$$\text{لاحظ ان } A = (2, -1) \in M_1 \text{ و } B = (-1, 5) \in M_2$$

$$\text{اي : } A \in M_1 \cup M_2 \text{ و } B \in M_1 \cup M_2$$

$$A + B = (1, 4)$$

$$\text{نلاحظ ان } A + B \notin M_1 \text{ و } A + B \notin M_2$$

$$\text{بذلك يكون } A + B \notin M_1 \cup M_2$$

اي ان  $M_1 \cup M_2$  ليست مجموعة مغلقة تحت عملية الجمع من هذا نستنتج على ان  $M_1 \cup M_2$  ليست فضاءاً جزئياً .

مثال (2) :

احسب تقاطع الفضاءين الجزئيين :—

$$M_1 = \{(x, y, z) : 2x - y + 3z = 0\}$$

$$M_2 = \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$$

وذلك في الفضاء  $R^3$  على الحقل  $R$  .

الحل : لنفرض ان المتجه  $A = (x, y, z)$  ينتمي الى التقاطع  $M_1 \cap M_2$  .

يكون لدينا عندئذ معادلتين :

$$2x - y + 3z = 0 \dots (1)$$

$$x + y - z = 0 \dots (2)$$

بضرب المعادلة (2) في -2 وجمعها مع المعادلة (1) نحصل على :

$$-3y + 5z = 0 \dots (3)$$

$$y = (5/3)z$$

اي ان :

بالتعويض في المعادلة (1) نحصل على

$$x = (-2/3)z$$

بذلك يكون حل المعادلتين اعلاه كالآتي :

$$x = (-2/3)z, y = (5/3)z, z = z$$

اذا يمكن وصف التقاطع كالآتي :

$$M_1 \cap M_2 = \{(x, y, z) : x = (-2/3)z, y = (5/3)z, z = z\}$$

مثال (3) :

في الفضاء  $P_2(\mathbb{R})$  على الحقل  $\mathbb{R}$  ، احسب التقاطع  $M \cap N$  اذا علمت

بأن :

$$M = \{a + bx + cx^2 : a + 2b - c = 0\}$$

$$N = \{a + bx + cx^2 : b = 0, a + 3c = 0\}$$

الحل : افرض ان المتجه  $A = a + bx + cx^2$  ينتمي الى التقاطع  $M \cap N$  .

يكون لدينا عندئذ ثلاث معادلات :

$$a + 2b - c = 0 \dots(1)$$

$$b = 0 \dots(2)$$

$$a + 3c = 0 \dots(3)$$

عند حل المعادلات اعلاه نحصل على :  $a = b = c = 0$  . نرى من هذا ان

التقاطع يحتوي على متجه واحد فقط هو  $A = 0 + 0x + 0x^2 = 0$

اي متعددة الحدود الصفرية . اذا يمكن وصف التقاطع كالآتي :

$$M \cap N = \{0\}$$

جمع الفضاءات الجزئية :

اذا كان كل من  $M$  و  $N$  فضاءاً جزئياً من فضاء المتجهات  $V$  على الحقل

$F$  فإنه بلامكان ان نكون المجموعة الآتية :

$$M + N = \{A + B : A \in M, B \in N\}$$

اي ان  $M + N$  يحتوي على جميع المتجهات في  $V$  التي يمكن كتابتها كحاصل جمع

متجهين أحدهما في  $M$  والآخر في  $N$  . المبرهنة ادناه توضح ان المجموعة الجزئية

$M + N$  تكون فضاءاً جزئياً يحتوي على كل من  $M$  و  $N$  .

مبرهنة (1.5.2):

إذا كان  $V$  فضاء متجهات على حقل  $F$  وكان كل من  $M$  و  $N$ ، فضاءاً جزئياً من  $V$  فإن  $M+N$  يكون فضاءاً جزئياً من  $V$  يحتوي على كل من  $M$  و  $N$ .

البرهان:

خذ  $A_1 \in M+N$  و  $A_2 \in M+N$  أي متجهين في  $M+N$  و  $x \in F$  أي عدد قياسي. يجب ان نحقق:

$$A_1 + A_2 \in M+N \quad (\text{أ})$$

$$xA_1 \in M+N \quad (\text{ب})$$

بما ان  $A_1 \in M+N$  و  $A_2 \in M+N$ . اذا يوجد  $B_1 \in M$  و  $C_1 \in N$  بحيث  $A_1 = B_1 + C_1$ .

كذلك يوجد  $B_2 \in M$  و  $C_2 \in N$  بحيث  $A_2 = B_2 + C_2$

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= (B_1 + C_1) + (B_2 + C_2) \\ &= (B_1 + B_2) + (C_1 + C_2) \end{aligned}$$

نلاحظ ان  $B_1 + B_2 \in M$  و  $C_1 + C_2 \in N$  وذلك لان كل من  $M$  و  $N$  فضاء جزئي من  $V$ .

من تعريف  $M+N$  ينتج ان  $A_1 + A_2 \in M+N$

$$xA_1 = x(B_1 + C_1)$$

$$= xB_1 + xC_1$$

و  $xB_1 \in M$  و  $xC_1 \in N$  وذلك لان كل من  $M$  و  $N$  فضاء جزئي من  $V$ .

$$xA_1 \in M+N \quad \text{إذا:}$$

الآن اذا كان  $A \in M$  فإنه بالامكان كتابة  $A$  على الشكل:

$$A = A + O$$

أي ان  $A$  يمكن كتابته كحاصل جمع متجهين احدهما  $A \in M$  والاخر  $O \in N$

بذلك يكون  $M \subset M+N$ . بنفس الطريقة فإن كل متجه  $B \in N$  يمكن كتابته على الشكل:

$$B = 0 + B$$

اي ان  $B \in M+N$  تنتج  $B \in N$

بذلك يكون:  $N \subset M+N$

نرى من هذا ان  $M+N$  فضاء جزئي من  $V$  يحتوي على كل من  $M$  و

$N$ .

( . م . ه . م . )

نطلق على الفضاء الجزئي  $M+N$  إسم مجموع الفضاءين  $M$  و  $N$  او

جمع الفضاءين  $M$  و  $N$ .

الآن نتناول بعض الامثلة التي توضح فكرة جمع الفضاءات الجزئية.

مثال (4):

في الفضاء  $R^2$  على الحقل  $R$ ، اذا كان

$$M = \{(x,0) : x \in R\}$$

$$N = \{(0,y) : y \in R\}$$

فاحسب:  $M+N$

الحل: ليكن  $A$  متجهاً في  $M+N$  من التعريف، يوجد متجه  $B=(x,0)$  في  $M$  ومتجه اخر  $C=(0,y)$  في  $N$  بحيث:

$$A = B + C$$

$$A = (x,y)$$

$$M+N = \{(x,y) : x,y \in R\}$$

$$M+N = R^2$$

اي ان


إذا

اي ان

يمكن توضيح المثال هندسياً كالآتي:

الفضاء الجزئي  $M$  يمثل محور السينات في المستوى  $R^2$

الفضاء الجزئي  $N$  يمثل محور الصادات في المستوى  $R^2$   
 حاصل جمع  $M$  و  $N$  اي الفضاء الجزئي  $M + N$   
 يساوي كل المستوى  $R^2$ . انظر الشكل (5.1) أدناه



شكل (5.1)

مثال (5):

في الفضاء  $R^4$  على الحقل  $R$ ، اذا كان:

$$M = \{(0, y, z, 0) : y, z \in R\}$$

$$N = \{x, 0, z, w\} : x, z, w \in R \}$$

فاحسب  $M + N$

الحل : خذ  $A = (0, y_1, z_1, 0)$  اي متجه في  $M$  وخذ  $B = (x_2, 0, z_2, w_2)$  اي متجه في  $N$ .

$$A + B = (x_2, y_1, z_1 + z_2, w_2)$$

$$M + N = \{(x, y, z, w) : x, y, w \in \mathbb{R}\} \quad \text{اذن}$$

وذلك لان اي متجه في  $\mathbb{R}^4$   $A = (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$

يمكن كتابته كحاصل جمع متجهين احدهما في  $M$  والآخر في  $N$  كالآتي :

$$A = (0, y, z/2, 0) + (x, 0, z/2, w)$$

نود هنا ان نبين ان المتجهات في  $\mathbb{R}^4$  يمكن ان نكتب بطرق مختلفة كحاصل جمع متجهات في  $M$  ومتجهات في  $N$  فمثلاً :

$$\begin{aligned} (1, 2, 3, 10) &= (0, 2, 3, 0) + (1, 0, 0, 10) \\ &= (0, 3/2, 0) + (1, 0, 3/2, 10) \\ &= (0, 2, 2, 0) + (1, 0, 1, 10) \end{aligned}$$

في كل مرة كتبنا المتجه  $(1, 2, 3, 10)$  كحاصل جمع متجهين الاول في  $M$  والآخر في  $N$  لكن بطرق مختلفة.

في بعض الاحيان لايمكننا عمل ذلك ، ولغرض التمييز نورد التعريف الآتي :

تعريف :

نقول عن فضاء المتجهات  $V$  انه جمع مباشر لفضائيه الجزئيين  $M$  و  $N$

ويرمز له :

$$V = M \oplus N$$

اذا كان كل متجه  $A \in V$  يمكن ان يكتب بطريقة واحدة وواحدة فقط على النحو  $A = B + C$  حيث  $A \in N, B \in M$ . لو نظرنا الى الامثلة السابقة لرأينا ان المثال

$$(4) \text{ يعطي } \mathbb{R}^2 = M \oplus N$$



اما المثال (5) فيوضح ان

$$R^4 = M + N \text{ لكن } R^4 \neq M \oplus N$$

هذا يحفزنا على التفكير بضرورة وجود علاقة ما او شرط ما يجعل من الجمع الاعتيادي جمعاً مباشراً. المبرهنة ادناه توضح ذلك .

**مبرهنة (1.5.3) :**

يكون الفضاء  $V$  جمعاً مباشراً لفضائيه الجزئيين  $M$  و  $N$  اذا فقط اذا

كان :

$$V = M + N \text{ ( أ )}$$

$$M \cap N = \{0\} \text{ ( ب )}$$

البرهان :

افرض ان  $V$  يكون جمعاً مباشراً للفضائين الجزئيين  $M$  و  $N$  اي ان

$$V = M \oplus N$$

اذاً كل متجه  $A$  في  $V$  يمكن ان يكتب بطريقة واحدة وواحدة فقط على النحو

$$A = B + C \text{ حيث } B \in M \text{ و } C \in N$$

هذا يعني ان  $V = M + N$

الان لو كان  $M \cap N \neq \{0\}$  لوجد متجه  $A \in M \cap N$  و  $A \neq 0$

اي  $A \in M$  و  $A \in N$  و  $A \neq 0$

عندئذ يمكن كتابة  $A$  بأكثر من طريقة واحدة فمثلاً :

$$A = A + 0 \text{ ( لان } A \in M \text{ و } 0 \in N \text{ )}$$

$$A = 0 + A \text{ ( لان } 0 \in M \text{ و } A \in N \text{ )}$$

وهذا يناقض كون  $V$  جمعاً مباشراً.

اذاً  $V = M + N$  و  $M \cap N = \{0\}$ ، على العكس لو كان

$$V = M + N \text{ و } M \cap N = \{0\}$$

خذ اي متجه  $A \in V$  وافرض انه بالامكان كتابته بطريقتين مختلفتين

$$A = B_2 + C_2 \text{ و } A = B_1 + C_1$$

$$C_1, C_2 \in N \text{ و } B_1, B_2 \in M$$

$$B_1 + C_1 = B_2 + C_2$$

$$B_1 - B_2 = C_2 - C_1$$

بما ان كل من  $N$  و  $M$  فضاء جزئي فيكون :

$$C_2 - C_1 \in N \text{ و } B_1 - B_2 \in M$$

$$B_1 - B_2 = C_2 - C_1 \quad : \quad \text{لكن المعادلة}$$

تنتج :  $B_1 - B_2 \in N$  لانه يساوي  $C_2 - C_1$  المنتمي الى  $N$  ،  $C_2 - C_1 \in M$  لانه يساوي

$B_1 - B_2$  المنتمي الى  $M$  . نستنتج من هذا ان

$$C_2 - C_1 \in M \cap N, B_1 - B_2 \in M \cap N$$

$$M \cap N = \{0\} \quad \text{لكن}$$

$$C_2 - C_1 = 0 \text{ و } B_1 - B_2 = 0 \quad \text{وعليه يكونا لدينا}$$

$$C_1 = C_2 \text{ و } B_1 = B_2 \quad \text{اي أن}$$

من هذا ينتج ان  $A$  قد كتب بطريقة واحدة وواحدة فقط .

( . و . ه . م . )

### تمارين (1.5)

1 \_ اذا كان  $M = \{(x, y, z) : x = 0\}$  و  $N = \{(x, y, z) : y + z = 0\}$  فضاءين

جزئيين من  $R^3$  . جد الفضاءين الجزئيين  $M + N, M \cap N$  .

2 \_ اذا كان  $M = \{(x, y, z, w) : x + 2z - w = 0\}$

$N = \{(x, y, z, w) : x + y + z + w = 0\}$

فضائين جزئيين من  $R^4$  . جد الفضاءين الجزئيين  $M + N, M \cap N$  .

3 — اذا كان  $N = \{(y, y) : y \in \mathbb{R}\}$  و  $M = \{(2x, x) : x \in \mathbb{R}\}$  فضائين جزئيين من  $\mathbb{R}^2$ ، فبرهن على ان  $\mathbb{R}^2 = M \oplus N$ .

4 — اذا كان  $M = \{(z_1, z_2, z_3) : z_2 = z_1 - z_3\}$   
 $N = \{(z_1, z_2, z_3) : 2z_1 - z_2 = 0\}$

فضائين جزئيين من الفضاء  $\mathbb{C}^3$  على الحقل  $\mathbb{C}$ ، فجد  $M \cap N$  ثم برهن على ان  $\mathbb{C}^3 = M + N$  وأوجد متجهاً في  $\mathbb{C}^3$  واكتبه بثلاث طرق مختلفة كحاصل جمع متجه في  $M$  واخر في  $N$ .

5 — اذا كان  $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} : a + c = b \right\}$

$N = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a = 3c \right\}$

فضائين جزئيين من  $M_2(\mathbb{R})$  فجد  $M \cap N$  و  $M + N$ .

6 — ليكن  $V$  فضاء المتجهات المتكون من المصفوفات المربعة  $n \times n$  على حقل الاعداد الحقيقية وليكن:

$$M = \{A \in V : A^T = A\}$$

$$N = \{A \in V : A^T = -A\}$$

حيث ان  $A^T$  تمثل مدورة المصفوفة  $A$ . برهن على ان كلا من  $M$  و  $N$  يكون فضاءً جزئياً من  $V$  بحيث  $V = M \oplus N$ .

7 — اذا كان  $M, N, L$  فضاءات جزئية من فضاء المتجهات  $V$  على الحقل  $F$  فبرهن على ان

$$(M \cap N) + (M \cap L) \subset M \cap (N + L)$$

جد فضاءات جزئية من  $\mathbb{R}^2$  لاتصلح من اجلها هذه المساواة.

8 — لتكن  $M, N, L$  الفضاءات الجزئية التالية من  $\mathbb{R}^3$ :

$$L = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\} \quad \text{و} \quad N = \{(x, y, z) : x = z\}$$

$$M = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\} \quad \text{برهن مايلي:}$$

(i)  $\mathbb{R}^3 = M + N$  (ii)  $\mathbb{R}^3 = M + L$  (iii)  $\mathbb{R}^3 = N + L$  متى يكون الجمع مباشراً.

9 — اذا كانت  $M, N, N'$  فضاءات جزئية من فضاء متجهات  $V$  على الحقل  $F$  بحيث ان:  $M + N = M + N'$  و  $M \cap N = M \cap N'$  و  $N \subset N'$ .  
برهن ان  $N = N'$ .

## (1.6) التركيب الخطي Linear Combination

سنبحث في هذا البند المسألة التالية:

اذا كانت لدينا مجموعة جزئية معينة  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  من متجهات تنتمي الى فضاء متجهات  $V$  على حقل  $F$  فهل يوجد فضاء جزئي يحتوي على المجموعة  $S$ . وما هو اصغر تلك الفضاءات الجزئية التي تحتوي على المجموعة  $S$ .

إنه لمن المهم جداً ان نعرف اصغر فضاء جزئي يحتوي على مجموعة جزئية معطاة لان الفضاء  $V$  نفسه يعتبر فضاءً جزئياً من  $V$  ودائماً يحتوي على اي مجموعة جزئية معطاة.

يقدم لنا التعريف الاتي الاداة الرئيسية لبناء مثل هذه الفضاءات الجزئية.

تعريف:

يسمى المتجه  $A$  بتركيب خطي من المتجهات  $B_1, \dots, B_k$  اذا امكن التعبير عنه بالصورة

$$A = x_1 B_1 + \dots + x_k B_k$$

حيث :  $x_1, \dots, x_k$  اعداداً قياسية .

مثال (1) :

إذا كان  $A = (1, 5, 0)$  ،  $B = (2, 0, -1)$  متجهين في  $R^3$  فبين ان  $C = (3, -5, -2)$  يكون تركيباً خطياً من  $A, B$  . وان  $D = (-2, 20, 7)$  لا يكون تركيباً خطياً من  $A$  و  $B$  .

الحل : لكي يكون  $C$  تركيباً خطياً من  $A$  و  $B$  يجب ان توجد اعداد قياسية  $x_1, x_2$  بحيث يكون  $C = x_1A + x_2B$  اي ان

$$(3, -5, -2) = x_1(1, 5, 0) + x_2(2, 0, -1)$$

أو

$$(3, -5, -2) = (x_1 + 2x_2, 5x_1, -x_2)$$

بمساواة المركبات المتناظرة نحصل على

$$x_1 + 2x_2 = 3$$

$$5x_1 = -5$$

$$-x_2 = -2$$

حل هذا النظام يعطي  $x_1 = -1$  و  $x_2 = -2$

اي ان  $C = -A + 2B$

بالمثل بالنسبة الى  $D$  لكي لا يكون تركيباً خطياً يجب ان لا توجد اعداد قياسية  $x_1, x_2$

بحيث :  $D = x_1A + x_2B$  ، فلو وضعنا  $D = x_1A + x_2B$  ، لحصلنا على :

$$(-2, 20, 7) = x_1(1, 5, 0) + x_2(2, 0, -1)$$

$$(-2, 20, 7) = (x_1 + 2x_2, 5x_1, -x_2)$$

مساواة المركبات المتناظرة تعطي :

$$x_1 + 2x_2 = -2$$

$$5x_1 = 20$$

$$-x_2 = 7$$

$$x_2 = -7, x_1 = 4$$

المعادلتان الثانية والثالثة تعطيان

لكن هذه القيم لا تحقق المعادلة الاولى اي ان النظام اعلاه غير متوافق، واذن لا توجد مثل هذه الاعداد القياسية. ومن ثم D ليس تركيباً خطياً من A و B.

مثال (2) :

إذا كان :  $A = 1 + x$  ،  $B = x^2 - 3$  ،  $C = 2 - x + x^3$  ، متجهات في الفضاء  $P_3(\mathbb{R})$  على حقل الاعداد الحقيقية R فهل ان المتجه  $D = 1 - x + x^2$  يكون تركيباً خطياً من A, B, C.

الحل : لكي يكون D تركيباً خطياً من A و B و C يجب ان توجد اعداد قياسية  $a_1, a_2, a_3$  بحيث

$$D = a_1A + a_2B + a_3C$$

$$1 - x + x^2 = a_1(1 + x) + a_2(x^2 - 3) + a_3(2 - x + x^3) \quad \text{او}$$

$$1 - x + x^2 = (a_1 - 3a_2 + 2a_3) + (a_1 - a_3)x + a_2x^2 + a_3x^3$$

بمساواة معاملات  $x^k$  في كلا الطرفين ( $k = 0, 1, 2, 3$ ) نحصل على :

$$a_1 - 3a_2 + 2a_3 = 1 \dots\dots(1)$$

$$a_1 - a_3 = -1 \dots\dots(2)$$

$$a_2 = 1 \dots\dots(3)$$

$$a_3 = 0 \dots\dots(4)$$

ان المعادلات (2) , (3) , (4) تعطي

$$a_1 = -1 , a_2 = 1 , a_3 = 0$$

لكن هذه القيم لا تحقق المعادلة (1) اي ان النظام اعلاه غير متوافق وبالتالي لا توجد اعداد قياسية  $a_1, a_2, a_3$  تحقق

$$D = a_1A + a_2B + a_3C$$

وهذا يعني ان  $D$  لا يكون تركيباً خطياً من  $C, B, A$  . لنفرض الآن ان  $S$  مجموعة جزئية غير خالية من فضاء متجهات  $V$  على الحقل  $F$  ولتكن

$$[S] = \{x_1A_1 + \dots + x_nA_n : x_i \in F, A_i \in S, n \in \mathbb{N}\}$$

حيث  $N =$  مجموعة الاعداد الطبيعية .

ان المجموعة  $[S]$  اعلاه تمثل مجموعة المتجهات في  $V$  التي يكون كل منها تركيباً خطياً لعناصر مجموعة جزئية منتهية من المجموعة  $S$  . سوف نطلق إسم مجموعة التركيبات الخطية لعناصر  $S$  على المجموعة  $[S]$  . المبرهنة التالية تجيب على التساؤلات التي طرحناها في مقدمة هذا البند .

### مبرهنة (1.6.1) :

ليكن  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$  و  $S$  مجموعة جزئية غير خالية من  $V$  . ان مجموعة التركيبات الخطية لعناصر  $S$  والتي يرمز لها بالرمز  $[S]$  تكون اصغر فضاء جزئي يحتوي على  $S$  .

البرهان : نبرهن اولاً على ان المجموعة  $[S]$  تكون فضاءً جزئياً ، ولهذا الغرض نأخذ

$$B = y_1B_1 + \dots + y_mB_m , A = x_1A_1 + \dots + x_nA_n$$

اي متجهين في  $[S]$  حيث ان  $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m$  متجهات في  $S$  و  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m$  اعداد قياسية في  $F$

$$A + B = x_1A_1 + \dots + x_nA_n + y_1B_1 + \dots + y_mB_m$$

وهذا ايضاً تركيب خطي لعدد محدود من عناصر  $S$  وبالتالي يكون عنصراً في  $[S]$  ، اي ان  $[S]$  مغلقة تحت عملية الجمع .

والآن نأخذ  $k \in F$  اي عدد قياسي ونلاحظ

$$\begin{aligned} kA &= k(x_1A_1 + \dots + x_nA_n) \\ &= (kx_1)A_1 + \dots + (kx_n)A_n \end{aligned}$$

نستنتج من هذا ان  $kA$  يكون تركيباً خطياً لعناصر من  $S$  وبالتالي يكون عنصراً في  $[S]$ ، اي ان  $[S]$  مغلقة بالنسبة لعملية الضرب القياسي وبالتالي تكون  $[S]$  فضاءً جزئياً.

لكي نبرهن على ان  $[S]$  يحتوي على  $S$  اي ان

$$S \subset [S]$$

نأخذ  $A \in S$ ، ونلاحظ ان:  $A = 1.A$

لكن  $1 \in F$ . اذن  $A$  يكون تركيباً خطياً لعناصر من  $S$  وبالتالي  $A \in [S]$

لو كان  $M$  فضاءً جزئياً يحتوي على  $S$ ، اي ان

$$S \subset M$$

فيجب ان يكون  $[S] \subset M$

$$B = x_1B_1 + \dots + x_nB_n$$

عنصراً في  $[S]$ ، حيث  $B_i \in S$  و  $x_i \in F$

لاستنتجنا مايلي: لكل  $i = 1, \dots, n$

$$B_i \in M \text{ تنتج } B_i \in M \text{ ( لان } (S \subset M) \text{ و } B_i \in M \text{ و } x_i \in F \text{ تنتج } x_i B_i \in M$$

( لان  $M$  فضاءً جزئياً )، هذا يعني ان المتجه  $B = x_1B_1 + \dots + x_nB_n$  ايضاً.

ينتمي الى  $M$ . بذلك يكون  $[S]$  اصغر فضاء جزئياً يحتوي على المجموعة الجزئية  $S$ .

( و . ه . م . )

اذا كان  $V$  فضاء متجهات على حقل  $F$  و  $S$  مجموعة جزئية غير خالية

من  $V$  فإن الفضاء الجزئي  $[S]$  يسمى الفضاء الجزئي المولد من قبل المجموعة الجزئية  $S$

ويقال عن المجموعة  $S$  بأنها مجموعة مولدة للفضاء الجزئي  $[S]$ .



مثال (3) :

بين ان المجموعة الجزئية  $S = \{(1,0), (0,1)\}$  تولد الفضاء  $R^2$ .

الحل : يجب ان نبين على ان  $[S] = R^2$  اي ان كل متجه  $A = (x,y)$  في  $R^2$  يمكن ان يكتب كتركيب خطي من متجهات في  $S$ . وهذا يمكن ملاحظته اذا كتبنا

$$A = (x,y) = x(1,0) + y(0,1)$$

مثال (4) :

ما هو اصغر فضاء جزئي يحتوي على المجموعة الجزئية

$$S = \{(x,y,z) : 2x - y + z = 0\}$$

من الفضاء  $R^3$ .

الحل : نلاحظ بأن المجموعة الجزئية  $S$  اعلاه تكون بحد ذاتها فضاءً جزئياً من  $R^3$  وبالتالي يكون  $[S] = S$  اي ان اصغر فضاء جزئي يحتوي على  $S$  هو  $S$ .

مثال (5) :

$$S = \{A, B\}$$

$$B = (1,2,0), A = (0,2,2)$$

فأثبت ان المجموعة  $S$  تولد الفضاء الجزئي

$$M = \{(x,y,z) : 2x - y + z = 0\}$$

الحل : المطلوب اثباته هنا ان  $[S] = M$

نلاحظ أولاً ان  $A \in M$  و  $B \in M$  اي ان  $S \subset M$ .

وبما ان  $[S]$  هو اصغر فضاء جزئي يحتوي على  $S$  فنستنتج ان  $[S] \subset M$ .

من ناحية اخرى لو اخذنا  $C = (x,y,z) \in M$  وحاولنا كتابة  $C$  كتركيب خطي لمتجهات في  $S$ ، اي ان

$$C = (x,y,z) = a(0,2,2) + b(1,2,0)$$

فسيكون لدينا :

$$b = x \dots (1)$$

$$2a + 2b = y \dots (2)$$

$$2a = z \dots (3)$$

بما ان  $(x, y, z) \in M$

$$2x - y + z = 0$$

$$y = 2x + z$$

المعادلات (1) , (3) تعطي  $a = z/2, b = x$  وهذه القيم تحقق المعادلة (2) وذلك لان

$$2a + 2b = z + 2x = y$$

نستنتج من هذا على ان اي متجه  $C = (x, y, z)$  في  $M$  يمكن كتابته على الشكل :

$$C = (x, y, z) = (z/2)(0, 2, 2) + x(1, 2, 0)$$

كتركيب خطي لمتجهات في  $S$ .

وبذلك يكون لدينا :  $M \subset [S]$

$$M = [S]$$

ملاحظة :

المفاهيم والتسميات التي طرحناها في هذا البند تنص على مايلي :

حتى تكون المجموعة  $S$  مولدة للفضاء الجزئي  $M$  يجب الافتراض مسبقاً بأن  $S$  مجموعة جزئية من  $M$  وبما ان  $[S]$  هو اصغر فضاء جزئي يحتوي على  $S$  فاذا  $M \subset [S]$ .

اي انه عندما يطلب منا ان نثبت ان مجموعة ماتكون مجموعة مولدة لفضاء جزئي معين يجب فقط ان نثبت ان كل متجه في ذلك الفضاء الجزئي يمكن كتابته كتركيب خطي من متجهات تلك المجموعة .

مثال (6) :

في فضاء متجهات  $V$  على حقل  $F$  ، اذا كان  $S = \{A_1, A_2, A_3\}$  و  $B$

متجه في  $V$  بحيث  $B \in [S]$  فبرهن على ان المجموعة  $T = [A, A_2, A_3, B]$  تولد نفس الفضاء الجزئي  $[S]$ ، بعبارة اخرى برهن على ان  $[S] = [T]$ .

الحل : خذ  $A \in [S]$

إذن توجد اعداد قياسية  $x_1, x_2, x_3$  بحيث

$$A = x_1 A_1 + x_2 A_2 + x_3 A_3$$

$A$  يمكن كتابته بالصيغة

$$A = x_1 A_1 + x_2 A_2 + x_3 A_3 + 0 \cdot B$$

وهذه الصيغة تعني ان  $A \in [T]$ ، لان  $A$  كتب كتركيب خطي من متجهات المجموعة  $T$ .

اذن  $[S] \subset [T]$

لنأخذ الان  $A \in [T]$

إذن توجد اعداد قياسية  $y_1, y_2, y_3, y_4$  بحيث

$$A = y_1 A_1 + y_2 A_2 + y_3 A_3 + y_4 B \dots (1)$$

لكن بالفرض  $B \in [S]$  اي انه توجد اعداد قياسية مثل  $x_1, x_2, x_3$  بحيث :

$$B = x_1 A_1 + x_2 A_2 + x_3 A_3$$

$$A = y_1 A_1 + y_2 A_2 + y_3 A_3 + y_4 (x_1 A_1 + x_2 A_2 + x_3 A_3)$$

$$= (y_1 + y_4 x_1) A_1 + (y_2 + y_4 x_2) A_2 + (y_3 + y_4 x_3) A_3$$

وهذا يعني ان  $A$  يمكن كتابته كتركيب خطي لمتجهات في  $S$  وبذلك

$A \in [S]$  يكون

اي ان  $[T] \subset [S]$

عندئذ يكون لدينا  $[S] = [T]$

ملاحظة :

المثال اعلاه مهم جداً ويعني انه لو اضفنا الى مجموعة معينة متجهاً يمكن كتابته اصلاً كتركيب خطي من متجهات المجموعة المعنية فإن المجموعة الجديدة

الناجمة من اضافة ذلك المتجه تولد الفضاء الجزئي نفسه . الكلام اعلاه نفسه يمكن ان تعاد صياغته بلغة حذف متجه .

تمارين (1.6)

1 — اي من المتجهات التالية يكون تركيباً خطياً من المتجهين  $A = (2, 3, -5)$  ،  $B = (7, 0, 1)$  وذلك في الفضاء  $R^3$  على حقل الاعداد الحقيقية .

( أ )  $(1, 1, 1)$  ، ( ب )  $(-2, 0, 4)$

( ج )  $(5, -3, 6)$  ، ( د )  $(0, 0, 1)$

- ( هـ )  $(11/2, 3, -9/2)$  ( و )  $(2, 0, 7\sqrt{2})$

2 — اي من المتجهات التالية يكون تركيباً خطياً من المتجهات :

$A = 1 + x$  ،  $B = x - x^2 + x^4$  ،  $C = 5 + x^3$

وذلك في الفضاء  $P_4(R)$  على حقل الاعداد الحقيقية .

( أ )  $1 + x + x^2 + x^3 + x^4$

( ب )  $4 + x^3 - x^2 + x^4$

( ج )  $x^2$

( د )  $7$

( هـ )  $17 + x + x^2 + 3x^3 - x^4$

( و )  $-5 + x^3$

3 — في الفضاء  $M_2(R)$  على حقل الاعداد الحقيقية، عبر عما يلي كتركيب خطي من المتجهات :

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  ،  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  ،  $C = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$  ( ج ) ،  $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & -8 \end{pmatrix}$  ( ب ) ،  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$  ( أ )

$$\begin{pmatrix} 2\sqrt{2}-3 & \sqrt{2}-3 \\ -1 & 8 \end{pmatrix} \quad (د)$$

- 4 — في كل مما يلي، حدد فيما اذا كانت المتجهات المعطاة تولد الفضاء  $R^3$ .
- (أ)  $A_1 = (1, 1, 1), A_2 = (2, 5, 3), A_3 = (-1, 0, 4)$
- (ب)  $A_1 = (3, 0, 1), A_2 = (-1, -2, 5), A_3 = (2, -2, 6)$
- (ج)  $A_1 = (2, 0, 0), A_2 = (0, 5, 4), A_3 = (3, 1, 7)$
- 5 — اعتبر  $C$  فضاء متجهات على حقل الاعداد الحقيقية ثم برهن على ان  $C$  يولدان  $z_2 = 2 + 3i, z_1 = 1 - 2i$ .
- 6 — برهن على ان المتجهات:
- $P_3(R)$  تولد الفضاء  $A_1 = 1, A_2 = 1-x, A_3 = (1-x)^2, A_4 = (1-x)^3$
- 7 — حدد اي مما يلي يقع في الفضاء الجزئي المولد من  $A = \cos^2 x, B = \sin^2 x$  وذلك في فضاء الدوال  $C(0,1)$  على حقل الاعداد الحقيقية.
- (أ)  $\cos 2x$ ، (ب)  $3-x^2$ ، (ج)  $\sin x$ .
- 8 — جد الفضاء الجزئي المولد من قبل المتجهين  $A = (2, 1, -5), B = (4, 3, 7)$  وذلك في الفضاء  $R^3$ .
- 9 — جد معادلة المستقيم المولد من قبل المتجه  $A = (2, 0, -3)$  وذلك في الفضاء  $R^3$ .
- 10 — ليكن  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$ ، ولتكن  $A, B, C$  ثلاثة متجهات في  $V$  بحيث  $aA + bB + cC = 0$  و  $ac \neq 0$  (  $a, b, c$  اعداد قياسية من الحقل  $F$  ) برهن على ان المجموعتين  $\{A, B\}$  و  $\{A, C\}$  تولدان الفضاء الجزئي نفسه من  $V$ .
- 11 — اثبت ان مجموعتي المتجهات:  $\{A = (1, 1, 0), B = (0, 0, 1)\}$

{C=(1,1,1), D=(-1,-1,1)} تولدان الفضاء الجزئي نفسه من الفضاء  $R^3$ .

12 — اثبت ان اي متجه غير صفري يولد الفضاء F على الحقل F.

13 — في الفضاء  $R^3$  على الحقل R، اذا كانت

$$T = \{(0,3,-3)\}, S = \{(1,0,0), (0,2,0)\}$$

(أ) جد  $[T], [S]$  الفضاءين الجزئيين المولدين من قبل T,S على التوالي.

(ب) هل ان المتجه (5,-3,0) ينتمي الى  $[S]$ ؟

(ج) هل ان المتجه (3,2,1) ينتمي الى  $[S]$ ؟

(د) هل ان المتجه (2,1,1) ينتمي الى  $[T]$ ؟

(و) ماهي المتجهات التي تنتمي الى  $[S] \cap [T]$

14 — اذا كان M,N فضاءين جزئيين من فضاء المتجهات V على الحقل F

فبرهن على ان:  $M+N = [M \cup N]$  (راجع البند (1.5))

15 — اذا كانت S,T مجموعتين جزئيتين من فضاء المتجهات V على الحقل F

فبرهن:

(أ) اذا كان  $S \subset T$  فإن  $[S] \subset [T]$ .

(ب)  $[S \cap T] \subset [S] \cap [T]$ .

(ج)  $[S \cup T] = [S] + [T]$ .

16 — اعط مثلاً على فضاء متجهات ومجموعتين جزئيتين S, T بحيث لايتساوى

صُرفاً (ب) اعلاه.

17 — اذا كان V فضاء متجهات على الحقل F و S, T مجموعتان جزئيتان من V

بحيث ان  $[S] \subset [T]$ ، فهل ان  $S \subset T$ ؟

18 — لاي متجهين غير صفريين A,B في فضاء متجهات V على حقل F،

برهن على ان  $[A] = [B]$  اذا وفقط اذا  $B = rA$  لبعض  $r \in F$ .

## (1.7) الاستقلال الخطي والارتباط الخطي

### Linear Independence and Linear Dependence

سنناقش في هذا البند مسألة الاستقلال والارتباط الخطي التي بدورها ستكون مدخلاً لدراسة قواعد فضاءات المتجهات .

تعريف :

يقال بأن المجموعة الجزئية  $S$  من فضاء المتجهات  $V$  على الحقل  $F$  مجموعة من المتجهات مرتبطة خطياً إذا وفقط إذا وجدت اعداد قياسية  $x_1, \dots, x_n$  ليست جميعها مساوية للصفر وكذلك وجدت متجهات مختلفة  $A_1, \dots, A_n$  في  $S$  بحيث

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n = 0$$

مثال (1) :

المجموعة:  $S = \{(1,2), (2,5), (0,1)\}$ .

تكون مجموعة مرتبطة خطياً من المتجهات في الفضاء  $R^2$  وذلك لان :

$$2(1,2) + (1)(0,1) + (-1)(2,5) = (0,0)$$

مثال (2) :

في الفضاء  $P_2(R)$  على الحقل  $R$ ، برهن على ان المجموعة

$$S = \{5, 2+x, x^2, 1+4x-x^2\}$$

مرتبطة خطياً .

الحل : لكي نبرهن على ان المجموعة اعلاه مجموعة مرتبطة خطياً يجب ايجاد اعداد حقيقية  $a_1, a_2, a_3, a_4$  ليست جميعها مساوية للصفر وتحقق :

$$a_1(5) + a_2(2+x) + a_3(x^2) + a_4(1+4x-x^2) = 0$$

بعد تبسيط الطرف الأيسر للمعادلة أعلاه نحصل على

$$(5a_1 + 2a_2 + a_4) + (a_2 + 4a_4)x + (a_3 - a_4)x^2 = 0$$

ولكي تكون متعددة الحدود في الطرف الأيسر مساوية لمتعددة الحدود الصفرية/يجب ان تكون جميع المعادلات تساوي صفر وبهذا نحصل على المعادلات:

$$5a_1 + 2a_2 + a_4 = 0 \dots\dots(1)$$

$$a_2 + 4a_4 = 0 \dots\dots(2)$$

$$a_3 - a_4 = 0 \dots\dots (3)$$

حل هذه المعادلات يكون:

$$. a_3 = a_4, a_2 = -4a_4, a_1 = (1/5)a_4$$

وهذا يعني ان نظام المعادلات أعلاه لديه عدة حلول ولغرض الحصول على

حل غير صفري نضع على سبيل المثال  $a_4 = 1$  وبهذا نحصل على:

$$a_1 = 1/5, a_2 = -4, a_3 = 1, a_4 = 1$$

وهذا يعني ان:

$$(1/5)(5) + (-4)(2+x) + (1)(x^2) + (1)(1+4x-x^2) = 0$$

اي ان المجموعة S مرتبطة خطأً.

تعريف:

يقال بأن المجموعة الجزئية S مستقلة خطأً اذا فقط اذا S مجموعة غير

مرتبطة خطأً.

التعريف أعلاه يكافئ مايلي:

اذا كان اي تركيب خطي لتجهات في S مساوياً للصفر فيجب على جميع المعاملات

بأن تساوي صفر. فإذا كانت المجموعة S منتهية. اي ان:  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  فإن

S تكون مستقلة خطأً اذا كان الحل الوحيد للمعادلة.

$$x_1A_1 + \dots + x_nA_n = 0$$

هو الحل الصفري، اي  $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$



مثال (3) :

برهن على ان المجموعة الجزئية

$$S = \{(1,1,1), (0,10,1), (0,0,1)\}$$

من الفضاء  $R^3$  تكون مجموعة مستقلة خطياً .

الحل : يجب ان نبرهن على ان الحل الوحيد للمعادلة

$$x_1(1,1,1) + x_2(0,1,1) + x_3(0,0,1) = (0,0,0)$$

هو الحل الصفري ، اي ان :  $x_1 = x_2 = x_3 = 0$

تصبح المعادلة اعلاه بعد التبسيط

$$(x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3) = (0,0,0)$$

بذلك نحصل على :

$$x_1 = 0, x_1 + x_2 = 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

من هذا نرى ان الحل الوحيد هو

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$$

مثال (4) :

لتكن :  $S = \{(1,i), (i,-1)\}$  مجموعة جزئية من الفضاء  $C^2$  على الحقل  $C$

. هل ان  $S$  مستقلة خطياً ام مرتبطة خطياً؟

الحل : لغرض الاجابة على السؤال اعلاه يجب ان نحدد فيما اذا كان للمعادلة

$$z_1(1,i) + z_2(i,-1) = (0,0)$$

حل غير صفري ، حيث ان  $z_1, z_2$  عدداً عقديان . المعادلة اعلاه تكافئ المعادلة .

$$(z_1 + iz_2, iz_1 - z_2) = (0,0)$$

بهذا نحصل على معادلتين أنيتين بمجهولين  $z_1, z_2$  هما :

$$z_1 + iz_2 = 0 \dots (1)$$

$$iz_1 - z_2 = 0 \dots (2)$$

نلاحظ انه لو ضربنا المعادلة (1) في العدد العقدي  $i$  حصلنا على المعادلة

(2) . اي ان المعادلة (2) ليست جديدة وبهذا تبقى معادلة واحدة هي :

$$z_1 + iz_2 = 0$$

حل المعادلة اعلاه يكون :  $z_1 = -iz_2$

بأخذ  $z_2 = 1$  نحصل على  $z_1 = -i$

اي انه يوجد حل غير صفري . ومن هذا نستنتج على ان المجموعة  $S$  مجموعة مرتبطة خطياً .

مثال (5) :

برهن على ان المجموعة الجزئية  $\{1+x, 1-x, x^2, 3x^3\}$  من الفضاء  $P_3(\mathbb{R})$  تكون مجموعة مستقلة خطياً .

الحل : نلاحظ المعادلة :

$$a(1+x) + b(1-x) + c(x^2) + d(3x^3) = 0$$

ونحاول ان نبرهن على ان الحل الوحيد هو الحل الصفري ، حيث ان

$a, b, c, d$  اعداداً حقيقية .

المعادلة اعلاه تكافئ المعادلة

$$(a+b) + (a-b)(x) + c(x^2) + 3d(x^3) = 0$$

$$a+b=0$$

والتي منها نستنتج على ان :

$$a-b=0$$

$$c=0$$

$$3d=0$$

ومن هذا النظام البسيط للمعادلات نستنتج على ان  $a = 0, b = 0, c = 0, d = 0$  وهذا يعني ان المجموعة  $S$  مجموعة مستقلة خطياً.

مثال (6) :

إذا كان  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $R$  وكانت  $E = \{A, B, C\}$  مجموعة مستقلة خطياً من المتجهات في  $V$  فبرهن على ان المجموعة  $S = \{A + B, B + C, A + C\}$  مجموعة مستقلة خطياً من المتجهات في  $V$ .

الحل : نأخذ المعادلة

$$x_1(A + B) + x_2(B + C) + x_3(A + C) = 0$$

ونحاول ان نبرهن على ان الحل الوحيد هو الحل الصفري . تبسيط المعادلة

اعلاه ينتج

$$(x_1 + x_3)A + (x_1 + x_2)B + (x_2 + x_3)C = 0$$

بما ان المتجهات  $A, B, C$  تكون مجموعة مستقلة خطياً بالفرض اذن يجب ان يكون الحل الوحيد للمعادلة اعلاه هو الحل الصفري اي :

$$x_1 + x_3 = 0, x_1 + x_2 = 0, x_2 + x_3 = 0$$

وهذه المعادلات الثلاثة تنتج :

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$$

سوف نذكر بعض المبرهنات والنتائج التي تساعدنا كثيراً في معرفة فيما اذا كانت مجموعة ما من المتجهات مستقلة خطياً ام مرتبطة خطياً.

مبرهنة (1.7.1) :

ليكن  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$  ولتكن  $S$  مجموعة جزئية من  $V$ . اذا كانت المجموعة الجزئية  $S$  تحتوي على المتجه الصفري  $0$  فإنها تكون مرتبطة خطياً.

البرهان : بما ان :  $1.O=O$

إذا بوضع :  $x_1=1, A_1=O, S, n=1$

نكون قد حققنا ماورد في تعريف المجموعة المرتبطة خطياً .

( و . ه . م . )

نتيجة (1.7.2) :

إذا كان  $M$  فضاءاً جزئياً من فضاء المتجهات  $V$  على اي حقل  $F$  فإن  $M$  يكون مجموعة مرتبطة خطياً .

البرهان :

كل فضاء جزئي يجب ان يحتوي على المتجه الصفري  $O$  .

( و . ه . م . )

تعريف :

يقال بأن المتجه  $A$  يعتمد خطياً على المجموعة  $S$  اذا فقط اذا كان :

$A \in [S]$

« اي ان  $A$  يمكن كتابته كتركيب خطي من متجهات تنتمي للمجموعة  $S$  » .

مبرهنة (1.7.3) :

المجموعة  $S$  تكون مرتبطة خطياً اذا فقط اذا وجد متجه  $A$  في  $S$  يعتمد

خطياً على باقي المتجهات في  $S$  .

البرهان :

لنفترض ان المجموعة  $S$  مرتبطة خطياً. هذا يعني انه توجد اعداد قياسية

$x_1, \dots, x_n$  ومتجهات مختلفة  $A_1, \dots, A_n$  في  $S$  بحيث

$$x_1 A_1 + \dots + x_n A_n = 0$$

وليست جميع الأعداد  $x_1, \dots, x_n$  تكون مساوية للصفر. بتغيير الترتيب ان اقتضت الضرورة يمكننا دائماً أن نفترض على أن  $x_1 \neq 0$ . بهذا يمكننا ان نكتب

$$A_1 = (-x_2/x_1) A_2 + \dots + (-x_n/x_1) A_n$$

اي ان  $A_1$  يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات  $A_2, \dots, A_n$  المنتمية الى  $S$  وهذا يعني ان  $A_1$  يعتمد خطياً على باقي المتجهات في  $S$ .

على العكس لو افترضنا بأنه يوجد متجه  $A \in S$  يعتمد خطياً على باقي متجهات  $S$  لكان بأستطاعتنا ان نجد متجهات مختلفة  $B_1, \dots, B_k$  في  $S$  (تختلف عن  $A$ ) بحيث:

$$A = x_1 B_1 + \dots + x_k B_k$$

اي ان:

$$x_1 B_1 + \dots + x_k B_k + (-1)A = 0$$

والمعادلة اعلاه تعني وجود متجهات مختلفة في  $S$  هي:  $A, B_1, \dots, B_k$  واعداد قياسية  $-1, x_1, \dots, x_k$  تحقق المعادلة. بما ان  $0 \neq (-1)$ . اذن الأعداد القياسية اعلاه ليست جميعها مساوية للصفر. بهذا تكون المجموعة  $S$  مرتبطة خطياً.

(و. ه. م.)

مبرهنة (1.7.4):

لتكن  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  مجموعة منتهية من المتجهات.  $S$  تكون مرتبطة خطياً اذاً فقط اذا وجد متجه  $A_k \in S$  ( $k \leq n$ ) يكتب كتركيب خطي من المتجهات التي تسبقه اي ان:

$$A_k = a_1 A_1 + \dots + a_{k-1} A_{k-1}$$

البرهان:

افرض ان  $S$  مجموعة مرتبطة خطياً. عندئذ توجد اعداد قياسية  $a_1, \dots, a_n$  ليست جميعها مساوية للصفر بحيث ان

$$a_1 A_1 + a_2 A_2 + \dots + a_n A_n = 0 \quad \dots (1)$$

الآن افرض ان  $m$  هو اكبر عدد بين  $1$  و  $n$  بحيث  $a_m \neq 0$ . هذا يعني ان  $a_{m+1} = \dots = a_n = 0$  وبهذا يمكننا ان نكتب المعادلة (1) على الشكل

$$a_1 A_1 + \dots + a_m A_m = 0$$

وبذلك يمكننا ان نكتب  $A_m = (-a_1/a_m)A_1 + \dots + (-a_{m-1}/a_m)A_{m-1}$

وهذا يبرهن على ان  $A_m$  يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات التي تسبقه. على العكس لو افترضنا وجود متجه  $A_m \in S$  يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات التي تسبقه لاصبح  $A_m$  يعتمد خطياً على  $S$ ، اي ان  $S$  مجموعة مرتبطة خطياً.

(و. ه. م.)

ملاحظة:

المبرهنة اعلاه تختلف عن المبرهنة (1.7.3) بنقطتين الاولى هي انها تتحدث عن مجموعة منتية من المتجهات، في حين أن (1.7.3) تتحدث عن اي مجموعة. النقطة الثانية هي تنظيمية حيث ان المتجه المراد كتابته كتركيب خطي من الاخرى يعاد ترقيمه بحيث يكون ترتيبه في آخر مجموعة المتجهات التي يعتمد عليها.

### تمارين (1.7)

1 — بمجرد النظر الى كل فرع مما يلي اشرح اسباب كون مجموعة المتجهات مرتبطة خطياً.

(أ)  $A_2 = (-4, 0)$ ,  $A_1 = (2, 0)$  في  $R^2$ .

(ب)  $A_2 = -2-2x$ ,  $A_1 = 1+x$  في  $P_1(R)$ .

(ج)  $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ ,  $A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$  في  $M_2(R)$ .

2 — اي من المجموعات الجزئية التالية من المتجهات في  $R^3$  تكون مرتبطة خطياً.

- ( أ )  $(1,2,3), (0,4,-1), (2,8,5)$   
 ( ب )  $(1,2,1), (-1/2,-1,-1/2), (7, \sqrt{2}, 3)$   
 ( ج )  $(1,1,0), (0,1,1)$   
 ( د )  $(1,2,1), (4,0,1), (2,1,3), (0,0,1)$

3 – اختبر كلاً من المجموعات الجزئية التالية من المتجهات في  $R^4$  من ناحية الارتباط الخطي والاستقلال الخطي .

- ( أ )  $(1,1,0,1), (-1,2, \sqrt{2}, 0), (0,3, \sqrt{2}, 1)$   
 ( ب )  $(-2,0,0,0), (0,1/2,1,1), (1,1,0,0), (0,3,1,0)$   
 ( ج )  $(1,2,1,0), (4,0,1,0), (2,1,3,0), (0,0,1,0)$   
 ( د )  $(2,-3,1,0), (4,0,7,2)$

4 – اي من المجموعات الجزئية التالية من المتجهات في  $P_2(R)$  تكون مستقلة خطياً .

- ( أ )  $1+x, x-x^2, -2+x^2, 3$   
 ( ب )  $-1/2 + \sqrt{2}x + x^2, x-3x^2, 1+x+x^2$   
 ( ج )  $2x+x^2, 1-x+x^2$   
 ( د )  $1+x-x^2, 2x + \sqrt{2}x^2, 2+4x + (\sqrt{2}-2)x^2$

5 – اي من المجموعات الجزئية التالية من المتجهات في  $C^2$  على الحقل  $C$  تكون مرتبطة خطياً .

- ( أ )  $(i, 1-2i), (1, -3), (0, 1+i)$   
 ( ب )  $(1+i, 0), (0, 1-i)$   
 ( ج )  $(0, 1), (-1, 0)$   
 ( د )  $(1+i, 2), (-1+i, 2i)$

6 – اي من المجموعات الجزئية التالية من المتجهات في  $C^2$  على الحقل  $R$  تكون مرتبطة خطياً .

- ( أ )  $(i, 1-2i), (1, -3), (0, 1+i)$

(ب)  $(1+i, 2), (-1+i, 2i)$  .

(ج)  $(1, 0), (0, i), (2i, 0), (1+i, 1-i)$  .

(د)  $(1+i, 2-3i), (1, 0), (0, i), (2i, 0), (0, 7)$  .

7 — برهن على ان مجموعة المتجهات  $S$  في  $R^3$

$$S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)\}$$

تكون مجموعة مرتبطة خطياً لكن اي مجموعة جزئية منها مكونة من ثلاث متجهات تكون مستقلة خطياً .

8 — تحت اي شرط على العددين الحقيقيين  $a, b$  يكون المتجهان  $(1, a)$  و  $(1, b)$

مستقلين خطياً في  $R^2$  .

9 — لاي قيم  $a$  الحقيقية تكون المتجهات التالية مجموعة مرتبطة خطياً في  $R^3$  .

$$A_1 = (a, -1, -1), A_2 = (-1, a, -1), A_3 = (-1, -1, a)$$

10 — هل ان المجموعة الجزئية من  $R^2$

$$S = \{(x, y): x^2 + y^2 = 1\}$$

مجموعة مرتبطة خطياً ام مستقلة خطياً .

11 — افرض ان  $V$  هو فضاء المتجهات المتكون من جميع الدوال ذات القيم

الحقيقية والمعرفة على المستقيم الحقيقي بأكمله . اي من المجموعات الجزئية

التالية من المتجهات في  $V$  تكون مرتبط خطياً .

$$(أ) \{3, -\sin^2 x, 2\cos^2 x\}$$

$$(ب) \{2x, \cos x\}$$

$$(ج) \{-4, \sin x, \sin 2x\}$$

$$(د) \{\cos 2x, \sin^2 x, \cos^2 x\}$$

$$(هـ) \{(1+x)^2, x^2 + 2x, -2\}$$

$$(و) \{0, x, x^2, x^3\}$$

12 — اثبت ان اي مجموعة جزئية مكونة من ثلاث متجهات او اكثر في  $P_1(R)$

تكون مرتبطة خطياً .



13 — إفترض ان  $V$  هو فضاء المتجهات المكون من الدوال ذات القيم الحقيقية والمعرفة على المستقيم الحقيقي بأكمله. اذا كانت  $h, g, f$  متجهات في  $V$  بحيث تكون قابلة للاشتقاق مرتين، فإن الدالة  $w$  المعرفة بواسطة:

$$w(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ f''(x) & g''(x) & h''(x) \end{vmatrix}$$

تسمى رونسكيان  $h, g, f$ . اثبت ان  $h, g, f$  تكون مجموعة مستقلة خطياً من المتجهات اذا فقط اذا لم يكن الرونسكيان هو المتجه الصفري في  $V$  ( اي ان  $w(x)$  لا تساوي الصفر تطابقاً ).

14 — استخدم الرونسكيان ( تمرين 13 ) لاثبات ان مجموعات المتجهات التالية تكون مستقلة خطياً.

( أ )  $\{1, x, e^x\}$ .

( ب )  $\{\sin x, \cos x, x \sin x\}$ .

( ج )  $\{e^x, xe^x, x^2 e^x\}$ .

( د )  $\{1, x, x^2\}$ .

### (1.8) القواعد والفضاءات المنتهية البعد

## Bases and Finite Dimensional vector Spaces

لاحظنا في البند (1.6) وجود مجموعات جزئية من فضاءات المتجهات بأستطاعتها توليد تلك الفضاءات، اي ان كل متجه في الفضاء يمكن كتابته كتركيب خطي من متجهات تلك المجموعة، فمثلاً المجموعة الجزئية  $S = \{(1,0), (0,1), (2,4)\}$  من الفضاء  $R^2$  على الحقل  $R$  تولد ذلك الفضاء.

بعض الفضاءات مثل فضاء متعددات الحدود ذات المعاملات الحقيقية ومن اي درجة لايمكن توليدها من قبل مجموعة منتهية من المتجهات . سنركز في هذا الكتاب فقط على الفضاءات التي يمكن توليدها من قبل مجموعة منتهية من المتجهات وسنطلق اسماً معيناً على تلك الفضاءات ، ثم نطلق اسم « قاعدة » على اصغر تلك المجموعات ، ونناقش هذه المسألة بإسهاب .

تعريف :

ليكن  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$  . يقال بأن  $V$  فضاء منتهي البعد اذاً فقط اذا وجدت مجموعة جزئية منتهية  $S$  من  $V$  بحيث ان  $V = [S]$  اي ان  $S$  تكون مجموعة مولدة الى  $V$  .

مثال (1) :

الفضاء  $R^n$  على الحقل  $R$  يكون فضاءً منتهي البعد ، وذلك لان المجموعة

الجزئية :

$$S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} = \{(1,0,0,\dots,0), (0,1,0,\dots,0), \dots, (0,0,\dots,0,1)\}$$

منتهية وتولد  $R^n$  .

فمثلاً عندما  $n=3$  ، تكون .

$$S = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

وان اي متجه  $A = (a_1, a_2, a_3)$  يمكن كتابته كتركيب خطي من

متجهات المجموعة  $S$  كلاتي :

$$A = a_1(1,0,0) + a_2(0,1,0) + a_3(0,0,1)$$

ملاحظة :

اذا كان الفضاء منتهي البعد فإنه توجد أكثر من مجموعة جزئية منتهية

ومولدة للفضاء فمثلاً المجموعة

$$S = \{(2,0,0), (0,3,0), (0,0,-1), (4,2,7)\}$$

تكون ايضاً مولدة الى  $R^3$

مثال (2) :

ليكن  $P_{\infty}(R)$  فضاء المتجهات على الحقل  $R$  الذي يحتوي على جميع متعددات الحدود بـ  $x$ . ان  $P_{\infty}(R)$  ليس فضاءً منتهي البعد. فإذا افترضنا ان المجموعة الجزئية  $S = \{A_1(x), \dots, A_n(x)\}$  تولد الفضاء لحصلنا على تناقض لان متعددة الحدود

$$B(x) = xA_n(x)$$

تكون متعددة حدود ذات درجة  $(n+1)$  ولا يمكن كتابتها كتركيب خطي من  $A_1(x), \dots, A_n(x)$ .

في ضوء الملاحظة اعلاه نذكر المبرهنة التالية :

مبرهنة (1.8.1) :

إذا كان  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد فإنه توجد مجموعة جزئية منتهية ومستقلة خطياً  $S$  بحيث  $V = [S]$ ، (اي ان  $V$  يولد من قبل مجموعة منتهية ومستقلة خطياً).

البرهان :

بما ان  $V$  فضاء منتهي البعد فعليه توجد مجموعة جزئية منتهية  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  بحيث  $V = [S]$ .

إذا كانت  $S$  مجموعة مستقلة خطياً فإنه لا يوجد شيء يستحق البرهان. اما إذا كانت  $S$  مجموعة مرتبطة خطياً فحسب المبرهنة (1.7.3)، يوجد متجه  $A_k \in S$  يعتمد خطياً على بقية المتجهات. بإعادة الترتيب ان اقتضت الضرورة يمكننا ان نفترض ان  $A_n$  يمكن كتابته كتركيب خطي من بقية المتجهات  $A_1, \dots, A_{n-1}$ . لكن  $S_1 = \{A_1, \dots, A_{n-1}\}$ . نلاحظ الآن ان  $[S] = [S_1]$  إذا كانت  $S_1$  مستقلة

خطياً فإنتهى البرهان، اما اذا كانت مرتبطة خطياً فنحذف المتجه الذي يعتمد خطياً على بقية المتجهات ونحصل على مجموعة  $S_2$  تحقق:  $[S_1] = [S_2]$  وهكذا الى ان نصل الى مجموعة جزئية  $S_k \subset S$  تكون مستقلة خطياً وتحقق

$$[S_k] = [S_{k-1}] = \dots = [S_1] = [S] = V$$

( و . ه . م . )

ان المجموعات الجزئية التي تتصف بكونها مولدة ومستقلة خطياً مهمة جداً، واسباسية في تطوير دراسة الموضوع، لذلك نقدم التعريف الاتي:

تعريف:

يقال بأن المجموعة الجزئية  $S$  من فضاء المتجهات  $V$  قاعدة الى  $V$  اذا وفقط اذا كانت  $S$  مجموعة مولدة ومستقلة خطياً.

بما اننا اعطينا امثلة كثيرة في البندين (1.6)، (1.7) على مسألتي توليد الفضاء والاستقلال الخطي فإننا سنكتفي بذكر بعض القواعد لبعض الفضاءات دون التحقيق.

مثال (3):

المجموعة  $S = \{(1,0,\dots,0), (0,1,0,\dots,0), (0,0,\dots,0,1)\}$

المتكونة من  $n$  من المتجهات تكون قاعدة للفضاء  $F^n$  على الحقل  $F$  وذلك لاي عدد طبيعي  $n$  ولاي حقل  $F$ . هذه القاعدة تسمى القاعدة الطبيعية.

نود الاشارة هنا الى انه بالامكان تواجد قواعد عديدة مختلفة للفضاء نفسه، كما في المثال أدناه.

مثال (4):

المجموعات  $S_1 = \{(2,0), (0,-1)\}$ ,  $S_2 = \{(1,4), (2,3)\}$   
 $S_3 = \{(2,5), (0,1)\}$  تعتبر قواعد مختلفة للفضاء  $R^2$  على الحقل  $R$ .

مثال (5) :

المجموعة

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

تكون قاعدة للفضاء  $M_2(\mathbb{R})$  على الحقل  $\mathbb{R}$ ، وتسمى بالقاعدة الطبيعية.

مثال (6) :

المجموعة:  $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$  تكون قاعدة للفضاء  $P_n(\mathbb{F})$  وذلك لاي عدد طبيعي  $n$  ولاي حقل  $\mathbb{F}$ . هذه القاعدة تسمى بالقاعدة الطبيعية. راجع مثال (4) من البند (1.3).

مثال (7) :

المجموعة  $S = \{(1,0), (0,1)\}$  تكون قاعدة للفضاء  $\mathbb{C}^2$  على الحقل  $\mathbb{C}$ . لكنها لاتصلح بأن تكون قاعدة للفضاء  $\mathbb{C}^2$  على الحقل  $\mathbb{R}$ ، وذلك لكونها غير مولدة لذلك الفضاء ولرؤية ذلك نلاحظ بأن المتجه  $(2i,0)$  لايمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهين  $(1,0)$ ،  $(0,1)$  خصوصاً وان اعدادنا القياسية هي اعداد حقيقية.

المجموعة:  $S = \{(1,0), (i,0), (0,1), (0,i)\}$  تكون قاعدة للفضاء  $\mathbb{C}^2$  على الحقل  $\mathbb{R}$ .

الامثلة الاتية تبين كيفية ايجاد القواعد لبعض الفضاءات الجزئية.

مثال (8) :

جد قاعدة للفضاء الجزئي  $M = \{(x,y,z) : 2x-y+z=0\}$  من فضاء المتجهات  $\mathbb{R}^3$  على الحقل  $\mathbb{R}$ .

الحل : بعد التعويض عن احد المتغيرات وليكن  $z$  مثلاً بدلالة المتغيرين الاخرين ، يمكننا وصف الفضاء الجزئي  $M$  كالآتي :

$$M = \{(x,y,z): x=x, y=y, z=y-2x\}$$

وبذلك كتبنا جميع المتغيرات بدلالة المتغيرين الحرين  $y, x$  بأخذ  $x=1$  و  $y=0$  تكون  $z=-2$  وبذلك نحصل على المتجه  $(1,0,-2)$  وعند اخذ  $x=0$  و  $y=1$  تكون  $z=1$  فنحصل على المتجه  $(0,1,1)$  وبذلك حصلنا على متجهين اذا  $A_1 = (1,0,-2)$  ،  $A_2 = (0,1,1)$  مستقلين خطياً ومولدين للفضاء  $M$  وذلك لانه اذا اخذنا اي متجه في  $M$  وليكن:  $A = (x,y,z)$  بحيث  $2x-y+z=0$  فإنه بالامكان كتابة  $A$  كتركيب خطي من  $A_1$  و  $A_2$  على النحو التالي :

$$A = xA_1 + yA_2$$

عليه تكون المجموعة  $S = \{A_1, A_2\}$  قاعدة للفضاء الجزئي  $M$ .

مثال (9) :

جد قاعدة للفضاء الجزئي :

$$M = \{a + bx + cx^2 + dx^3 : a + b = c - 2d = 0\}$$

من الفضاء  $P_3(\mathbb{R})$ .

الحل : نلاحظ هنا ان  $b = -a$  و  $c = 2d$  عندئذ يمكننا وصف الفضاء الجزئي  $M$  كالآتي :

$$M = \{a + bx + cx^2 + dx^3 : a = a, b = -a, c = 2d, d\}$$

كتبنا جميع المتغيرات بدلالة المتغيرين  $d, a$  عند التعويض :  $d = 0$  ,  $a = 1$  ، تكون قيمة  $b = -1$  و  $c = 0$  وبذلك نحصل على المتجه :

$$A_1 = 1 + (-1)x + 0.x^2 + 0.x^3 = 1 - x$$

وعند التعويض :  $d = 1$  ,  $a = 0$  ، تكون قيمة  $b = 0$  و  $c = 2$  وبذلك نحصل على المتجه :

$$A_2 = 0 + 0.x + 2.x^2 + 1.x^3 = 2x^2 + x^3$$

المتجهان  $A_1, A_2$  مستقلان خطياً ومولدان للفضاء  $M$  وذلك لأن أي متجه في  $M$  وليكن  $A = a + bx + cx^2 + dx^3$  بحيث  $b = -a, c = 2d$  يمكن كتابته كتركيب خطي من  $A_1$  و  $A_2$  على النحو التالي:  $A = aA_1 + dA_2$   
 عليه تكون المجموعة  $S = \{A_1, A_2\}$  قاعدة للفضاء الجزئي  $M$ .

مثال (10):

جد قاعدة للفضاء الجزئي  $M = \{(x,y) : y = ix\}$  من الفضاء  $C^2$  على الحقل  $C$ ، ثم اعتبر  $M$  فضاءً جزئياً من الفضاء  $C^2$  على الحقل  $R$  وجد قاعدة له.

الحل: نلاحظ هنا وجود متغير واحد حر وهو  $x$ ، ففي حالة كون  $M$  فضاءً جزئياً من الفضاء  $C^2$  على الحقل  $C$  نعوض عن  $x=1$  ونحصل على متجه واحد  $A = (1, i)$  الذي بدوره يكون قاعدة الى  $M$ . اما في حالة كون  $M$  فضاءً جزئياً من الفضاء  $C^2$  على الحقل  $R$ ، فنعوض مرة عن  $x=1$  ونحصل على  $A_1 = (1, i)$  ومرة عن  $x=i$  ونحصل على  $A_2 = (i, -1)$  وبذلك تكون المجموعة  $S = \{A_1, A_2\}$  عبارة عن قاعدة الى  $M$ ، والسبب هو انه في حالة كون الفضاء  $C^2$  على الحقل  $R$  فإن معاملات التركيب الخطي تكون اعداداً حقيقية فلو اخذنا  $A = (x,y) \in M$  بحيث  $y = ix$  ولو كتبنا  $x = a + ib$  لا تضح بأن  $y = -b + ia$  وبهذه الحالة يمكننا كتابة:

$$A = a(1, i) + b(i, -1) = aA_1 + bA_2$$

اي ان المجموعة  $S$  تكون مولدة للفضاء الجزئي  $M$  من الفضاء  $C^2$  على الحقل  $R$ . وبما انها مجموعة مستقلة خطياً فإنها ستكون قاعدة الى  $M$ .

بعد اعطاء عدد لأبأس به من الامثلة على القواعد، نود الان مناقشة الامور النظرية المتعلقة بهذا الموضوع، حيث اننا لاحظنا في المبرهنة (1.8.1) ان اي فضاء منتهي البعد عنده قاعدة مكونة من عدد منتهى من المتجهات. السؤال هنا، هل توجد قاعدتان مختلفتان في عدد متجهاتهما؟ الاجابة بالنفي وسنذكر البرهان بعد ذكر بعض النتائج التي تؤدي اليه.

مبرهنة (1.8.2) :

لتكن  $B = \{A_1, \dots, A_n\}$  مجموعة مولدة للفضاء الجزئي  $M$  من الفضاء  $V$  على الحقل  $F$ ، ولتكن  $S = \{C_1, \dots, C_m\}$  مجموعة مستقلة خطياً من المتجهات في  $M$ ، عندئذ يكون  $m \leq n$ .

البرهان :

لننظر الى المجموعة  $B_1 = \{C_1, A_1, \dots, A_n\}$  بما ان  $C_1 \in M$  والمجموعة  $B = \{A_1, \dots, A_n\}$  مجموعة مولدة للفضاء  $M$ ، فيكون المتجه  $C_1$  معتمداً خطياً على المجموعة  $B$  وبذلك تكون المجموعة  $B_1$  مرتبطة خطياً حسب المبرهنة (1.7.3). الان حسب المبرهنة (1.7.4)، احد المتجهات في  $B_1$  يمكن ان يكتب كتركيب خطي من المتجهات التي تسبقه. بإعادة ترقيم المتجهات  $A_1, \dots, A_n$  ان اقتضت الضرورة، يمكننا ان نفترض ان المتجه  $A_n$  يكتب كتركيب خطي من المتجهات التي تسبقه. نحذف  $A_n$  ونلاحظ ان المجموعة  $H_1 = \{C_1, A_1, \dots, A_{n-1}\}$  تولد الفضاء الجزئي  $M$ .

وللاسباب السابقة نفسها نلاحظ ان المجموعة  $B_2 = \{C_2, C_1, A_1, \dots, A_{n-1}\}$  تكون مجموعة مرتبطة خطياً وبذلك يمكننا حذف المتجه  $A_{n-1}$  والحصول على المجموعة  $H_2 = \{C_2, C_1, A_1, \dots, A_{n-2}\}$  المولدة للفضاء الجزئي  $M$ . نستمر هكذا، ففي كل مرة ندخل متجه  $C_k$  ونحذف متجه  $A_j$ ، فإذا كانت  $m > n$  فإننا سنصل للمجموعة  $H_n = \{C_n, \dots, C_1\}$  المولدة للفضاء الجزئي  $M$ . بذلك تكون المجموعة  $B_{n+1} = \{C_{n+1}, C_n, \dots, C_1\}$  مرتبطة خطياً وهذا تناقض لان المجموعة  $\{C_m, C_{n+1}, C_n, \dots, C_1\}$  مجموعة مستقلة بالفرض. إذن  $m \leq n$ .

(و . ه . م . :)

مبرهنة (1.8.3) :

كل فضاء متجهات  $V$  منتهي البعد عنده قاعدة، واي قاعدتين تحتويان على نفس العدد من المتجهات.



البرهان :

المبرهنة (1.8.1) وتعريف القاعدة الذي يليها ينصان على ان لكل فضاء متجهات منتهي البعد توجد قاعدة . لنفرض الآن ان

$$G = \{A_1, \dots, A_n\}, H = \{B_1, \dots, B_m\}$$

قاعدتان الى  $V$  . بما ان  $H$  مجموعة مولدة الى  $V$  و  $G$  مجموعة مستقلة خطياً فيكون لدينا حسب المبرهنة (1.8.2)  $n \leq m$  .

بما ان  $G$  مجموعة مولدة الى  $V$  و  $H$  مجموعة مستقلة خطياً فيكون لدينا للاسباب نفسها  $m \leq n$  بذلك يكون  $m = n$  .

( و . ه . م . )

على ضوء المبرهنة (1.8.3) يمكننا ان نقدم التعريف التالي :

تعريف :

ليكن  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد . يسمى عدد عناصر قاعدة  $V$  بعد  $V$  ويرمز له بالرمز  $\dim(V)$  .  
 $\dim(V) = \text{dimension of } V$

مثال (11) :

لاحظ ان بعد  $R^n$  في المثال (1) هو  $n$  اي ان

$$\dim(R^n) = n$$

مثال (12) :

ليكن  $V$  هو الفضاء  $C^n$  على الحقل  $C$  بذلك يكون

$$\dim V = n$$

اما اذا اعتبرنا  $V$  هو الفضاء  $C^n$  على الحقل  $R$  فإن

$$\dim V = 2n$$

قارن هذا المثال بالمثال رقم (7) .

مثال (13) :

$\dim (M_2(\mathbb{R})) = 4$  . قارن هذا المثال بالمثال (5) .

مثال (14) :

$\dim (P_n(\mathbb{R})) = n + 1$  ، قارن هذا المثال بالمثال (6) .

ملاحظة :

على ضوء المبرهنة (1.8.2) لا يمكن لاي فضاء ان يكون فضاءً منتهي البعد، اذا احتوى على مجموعة لانهاية من المتجهات المستقلة خطياً . لتطبيق هذه الفكرة نورد المثال التالي :

مثال (15) :

لقد لاحظنا في مثال (2) ان الفضاء  $P_{\infty}(\mathbb{R})$  ليس فضاءً منتهي البعد . نلاحظ هذا من خلال الملاحظة اعلاه . متعددات الحدود

$$A_1(x) = x, A_2(x) = x^2, \dots, A_n(x) = x^n, \dots$$

تكوّن مجموعة مستقلة خطياً ولانهاية وبذلك وحسب الملاحظة اعلاه لا يمكن للفضاء  $P_{\infty}(\mathbb{R})$  المحتوى على تلك المتعددات بأن يكون منتهي البعد .

مبرهنة (1.8.4) :

لتكن  $B = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة لفضاء المتجهات المنتهي البعد  $V$  . ان اي متجه  $A \in V$  يمكن كتابته بطريقة واحدة وواحدة فقط كتركيب خطي :

$$A = a_1 A_1 + \dots + a_n A_n$$

البرهان :

بما ان B قاعدة الى V فإن المتجه  $A \in V$  يكون تركيباً خطياً لعناصرها  $A_1, \dots, A_n$  ولنفرض انه بالصيغة :

$$A = a_1 A_1 + \dots + a_n A_n \\ = \bar{a}_1 A_1 + \dots + \bar{a}_n A_n$$

اي ان A كتب بطريقتين مختلفتين . بذلك نحصل على

$$(a_1 - \bar{a}_1) A_1 + \dots + (a_n - \bar{a}_n) A_n = 0$$

بما ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_n\}$  مستقلة خطياً، فعليه يكون :

$$a_1 - \bar{a}_1 = \dots = a_n - \bar{a}_n = 0$$

من هذا نستنتج على ان  $a_1 = \bar{a}_1, \dots, a_n = \bar{a}_n$  اي ان A يكتب بطريقة واحدة فقط كتركيب خطي من متجهات القاعدة B .

( و . ه . م . )

مبرهنة (1.8.5) :

ليكن V فضاء متجهات منتهي البعد ولتكن  $A_1, \dots, A_m$  متجهات مستقلة خطياً في V . توجد متجهات  $B_1, \dots, B_n$  في V بحيث ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n\}$  تكون قاعدة الى V .

البرهان :

اذا كان  $[A_1, \dots, A_m] = V$  ، اي ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m\}$  تولد V فأنها ستكون قاعدة الى V ولا يوجد شيء يبرهن . بخلاف ذلك فإنه يوجد متجه  $B_1 \in V$  لا يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات  $A_1, \dots, A_m$  .

بذلك نستنتج على ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1\}$  تكون مجموعة مستقلة خطياً لأنه لو كانت مرتبطة خطياً لأمكن لاحد متجعاتها ان يكتب كتركيب خطي من المتجهات التي تسبقه ( مبرهنة 1.7.4 ) .

هذا المتجه لا يمكن ان يكون  $A_k$  ( $1 \leq k \leq m$ ) لان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m\}$

مستقلة خطياً، ولا يمكن ان يكون  $B_1$  وذلك بالفرض. الان اذا كانت المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1\}$  مولدة الى  $V$  فإن البرهان قد انتهى، بخلافه يوجد متجه  $B_2 \in V$  لا يمكن ان يكتب كتركيب خطي من المتجهات  $A_1, \dots, A_m, B_1$  وبذلك نستنتج بأن المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1, B_2\}$  مستقلة خطياً للأسباب السابقة نفسها وهكذا. فإذا كانت مولدة انتهى البرهان وان لم تكن فنضيف متجهاً جديداً. بما ان  $V$  فضاء منتهي البعد، فإن هذه العملية لا بد لها من نهاية ولا بد ان نصل الى مجموعة مولدة بعد اضافة عدد محدود من المتجهات  $B_1, \dots, B_n$ .

( و . ه . م . )

ملاحظة :

المبرهنة اعلاه تنص على انه بإمكان اي مجموعة جزئية مستقلة خطياً من فضاء متجهات منتهي البعد ان تكون مجموعة جزئية من قاعدة لذلك الفضاء. بهذه الحالة نقول بأن تلك المجموعة الجزئية قد وسعت الى قاعدة لذلك الفضاء.

مثال (16) :

وسّع المجموعة  $\{(1,2)\}$  الجزئية من  $R^2$  الى قاعدة الى  $R^2$ .

الحل : بما ان  $\dim(R^2) = 2$ . إذن اي قاعدة الى  $R^2$  يجب ان تحتوي على متجهين. نلاحظ بأن المتجه  $(1,0)$  لا يمكن ان يكتب كتركيب خطي من المتجه  $(1,2)$ . بذلك تكون المجموعة  $\{(1,2), (1,0)\}$  قاعدة الى  $R^2$ . المجموعة  $\{(1,2), (3,5)\}$  تكون قاعدة أخرى وهكذا.

مثال (17) :

جد قاعدة للفضاء  $P_3(R)$  على الحقل  $R$  تحتوي على مجموعة المتجهات  $\{x+1, 2x^2\}$  المسألة خطياً.

الحل : يجب اضافة متجهين للمجموعة اعلاه وذلك لان اي قاعدة الى  $P_3(R)$  تحتوي

على اربعة متجهات بسبب ان  $\dim(P_3(\mathbb{R})) = 4$ . للسهولة نتبع الخطوات التالية في جميع المسائل من هذا النوع.

الخطوة الاولى : نضيف متجهات القاعدة الطبيعية للمجموعة المعطاة. بهذه الحالة يكون لدينا :  $x+1, 2x^2, 1, x, x^2, x^3$ .

الخطوة الثانية : نحذف ابتداء من اليسار كل متجه يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات التي تسبقه .

المتجه 1 لا يمكن ان يكتب كتركيب خطي من المتجهات  $x+1, 2x^2$

$$\text{بما ان : } 1 = 1 \cdot (x+1) + 0 \cdot (2x^2) + (-1) \cdot x$$

نحذف  $x$  وننظر للمجموعة  $\{x+1, 2x^2, 1, x^2, x^3\}$  هذه المجموعة مستقلة خطياً ومولدة للفضاء  $P_3(\mathbb{R})$  وبذلك تكون قاعدة محتوية على المجموعة المستقلة  $\{x+1, 2x^2\}$ .

نورد الان بعض النتائج للمبرهنات التي ذكرناها .

**نتيجة (1.8.6) :**

في اي فضاء متجهات ذي بعد  $n$ ، اي مجموعة جزئية تحتوي على  $n+1$  من المتجهات تكون مرتبطة خطياً.

**البرهان :**

لو كانت المجموعة الجزئية مستقلة خطياً لاصح بالامكان وحسب (مبرهنة 1.8.5) ايجاد قاعدة تحتوي عليها وبذلك يكون عدد متجهات تلك القاعدة اكبر او يساوي  $n+1$ ، اي ان بعد الفضاء يكون اكبر او مساوياً الى  $n+1$ ، وهذا تناقض .

( و . ه . م . )

نتيجة (1.8.7):

إذا كان  $M$  فضاءً جزئياً من فضاء المتجهات  $V$  فإن  $\dim M \leq \dim V$  ،  
بالإضافة إلى ذلك فإنه إذا كان  $\dim M = \dim V$  فإن  $M = V$  .

البرهان:

ان اي قاعدة الى  $M$  تكون مستقلة خطياً وبذلك تكون جزء من قاعدة الى  $V$  ، وعليه يكون عدد متجهات تلك القاعدة الى  $V$  اكبر او مساوي الى عدد متجهات قاعدة  $M$  نستنتج من هذا على ان  $\dim M \leq \dim V$  .  
إذا كان  $\dim M = \dim V$  فإن اي قاعدة الى  $M$  تكون قاعدة الى  $V$  وبذلك يكون  $M = V$  .

( و . ه . م . )

نتيجة (1.8.8):

إذا كان  $V$  فضاء متجهات ذا بعد  $n$  فإن:

- 1 — اي مجموعة جزئية من  $V$  متكونة من  $n$  من المتجهات تكون قاعدة الى  $V$  اذا كانت مستقلة خطياً .
- 2 — اي مجموعة جزئية من  $V$  متكونة من  $n$  من المتجهات تكون قاعدة الى  $V$  ، اذا كانت تولد  $V$  .

البرهان:

1 — لتكن  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  مجموعة جزئية من  $V$  مستقلة خطياً . حسب المبرهنة (1.8.5) ، ان لم تكن  $S$  قاعدة فإنه توجد متجهات  $B_1, \dots, B_m$  بحيث ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m\}$  تكون قاعدة الى  $V$  . لكن بهذه الحالة يكون  $\dim V = m + n \neq n$  وهذا تناقض .

2 — لتكن  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  مجموعة جزئية تولد  $V$  حسب المبرهنة (1.8.1) ، توجد مجموعة جزئية  $T \subset S$  بحيث ان  $T$  مستقلة خطياً و

لكن  $V = [S] = [T]$   $\dim [T] \leq \dim [S]$  وبهذا نحصل على تناقض في حالة عدم كون S قاعدة الى V .

( و . ه . م . )

ملاحظة :

النتيجة اعلاه مفيدة لانه اذا عرفنا بعد الفضاء فيكفي للمجموعة الجزئية المتكونة من عدد من المتجهات مساوي الى بعد الفضاء بأن تكون قاعدة اذا كانت مستقلة خطياً او مولدة لذلك الفضاء .

اذا كان كل من M و N فضاءاً جزئياً من فضاء المتجهات V فإنه بالامكان تعريف الفضاء الجزئي  $M+N$  ( راجع البند 1.5 ) . المبرهنة التالية تحسب لنا بعد  $M+N$  .

مبرهنة (1.8.9) :

$$\dim(M+N) = \dim(M) + \dim(N) - \dim(M \cap N)$$

البرهان :

لتكن  $\{A_1, \dots, A_r\}$  قاعدة الى  $M \cap N$  ، على فرض ان  $M \cap N \neq \{0\}$  .

بما ان  $M \cap N \subset M$  و  $M \cap N \subset N$  ، فعليه يمكننا ان نوسع المجموعة  $\{A_1, \dots, A_r\}$  الى قاعدة  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s\}$  الى M وقاعدة  $\{A_1, \dots, A_r, C_1, \dots, C_t\}$  الى N وذلك حسب المبرهنة (1.8.5) . بذلك يكون لدينا

$$\dim(M \cap N) = r, \dim M = r+s, \dim N = r+t$$

لكي نثبت المبرهنة بقي ان نبرهن على ان  $\dim(M+N) = r+s+t$  لهذا الغرض ، ننظر للمجموعة  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s, C_1, \dots, C_t\}$  ونحاول ان نثبت بأنها قاعدة للفضاء الجزئي  $M+N$  وبما ان عدد متجهاها يساوي  $r+s+t$  فعليه يكون  $\dim(M+N) = r+s+t$  وبذلك يكتمل البرهان في حالة

$M \cap N = \{O\}$ . نبرهن أولاً ان المجموعة اعلاه مجموعة مولدة الى  $M+N$ . لهذا  
الغرض نأخذ اي متجه  $A \in M+N$  ونكتب  $A$  بالصيغة  $A=B+C$ ، حيث  
 $B \in M$  و  $C \in N$ . بما ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s\}$  تكون قاعدة الى  $M$   
فعليه توجد اعداد قياسية  $x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s$  بحيث ان المتجه  $B \in M$  يكتب  
كتركيب خطي على الشكل:

$$B = x_1 A_1 + \dots + x_r A_r + y_1 B_1 + \dots + y_s B_s$$

بما ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_r, C_1, \dots, C_t\}$  تكون قاعدة الى  $N$  فعليه توجد اعداد  
قياسية  $z_1, \dots, z_r, w_1, \dots, w_t$  بحيث ان المتجه  $C \in N$  يكتب كتركيب خطي  
على الشكل:

$$C = z_1 A_1 + \dots + z_r A_r + w_1 C_1 + \dots + w_t C_t$$

بهذا يكون لدينا:

$$A = B + C = (x_1 + z_1)A_1 + \dots + (x_r + z_r)A_r + y_1 B_1 + \dots + y_s B_s + \\ w_1 C_1 + \dots + \dots + w_t C_t$$

اي ان  $A$  أمكن كتابته كتركيب خطي من متجهات المجموعة  
 $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s, C_1, \dots, C_t\}$  وهذا يعني انها مجموعة مولدة للفضاء  
الجزئي  $M+N$ . نبرهن الان على ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s, C_1, \dots, C_t\}$   
مستقلة خطياً.

ليكن:

$$x_1 A_1 + \dots + x_r A_r + y_1 B_1 + \dots + y_s B_s + z_1 C_1 + \dots + \dots + z_t C_t = O$$

تركيباً خطياً مساوياً للصفر. المطلوب برهانه هنا ان جميع الاعداد القياسية  
 $x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s, z_1, \dots, z_t$  تكون مساوية للصفر. بالامكان كتابة المعادلة  
اعلاه بالصيغة:

$$x_1 A_1 + \dots + x_r A_r + y_1 B_1 + \dots + y_s B_s = -z_1 C_1 - z_t C_t$$

الطرف الايسر للمعادلة اعلاه عبارة عن متجه في  $M$  وذلك لانه تركيب خطي من  
متجهات قاعدة  $M$  وهو يساوي الطرف الايمن الذي يعتبر متجهاً في  $N$  لانه تركيب



خطي من متجهات متممة الى  $N$ . بذلك ينتمي كلا الطرفين الى كل من  $M$  و  $N$ ، اي الى التقاطع  $M \cap N$ . بهذه الحالة يمكن كتابة كل من الطرفين كتركيب خطي:  $w_1 A_1 + \dots + w_r A_r$  من متجهات قاعدة  $M \cap N$ ، وبذلك نحصل على

$$x_1 A_1 + \dots + x_r A_r + y_1 B_1 + \dots + y_s B_s = w_1 A_1 + \dots + w_r A_r$$

$$-z_1 C_1 - \dots - z_t C_t = w_1 A_1 + \dots + w_r A_r$$

بالامكان كتابة المعادلتين اعلاه بالصيغة التالية:

$$(x_1 - w_1) A_1 + \dots + (x_r - w_r) A_r + y_1 B_1 + \dots + y_s B_s = 0$$

$$w_1 A_1 + \dots + w_r A_r + z_1 C_1 + \dots + z_t C_t = 0$$

المعادلتان اعلاه تمثلان تركيبين خطيين مساويين للصفر لمجموعتي متجهات مستقلتين خطياً، بذلك نستنتج على ان جميع المعاملات تكون مساوية للصفر، اي ان:

$$x_1 - w_1 = 0, \dots, x_r - w_r = 0, y_1 = 0, \dots, y_s = 0, w_1 = 0, \dots, w_r = 0,$$

$$z_1 = 0, \dots, z_t = 0$$

هذا يعني ان  $x_1 = 0, \dots, x_r = 0, y_1 = 0, \dots, y_s = 0, z_1 = 0, \dots, z_t = 0$

وبذلك تكون المجموعة  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s, C_1, \dots, C_t\}$  مستقلة خطياً. في

حالة كون  $M \cap N = \{0\}$  فإثبات المبرهنة يسير على النحو التالي:

نفرض ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m\}$  تكون قاعدة الى  $M$  والمجموعة  $\{B_1, \dots, B_n\}$  تكون

قاعدة الى  $N$  ونحاول ان نبرهن على ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n\}$  تكون

قاعدة الى  $M + N = M \oplus N$ . المجموعة اعلاه مجموعة مولدة الى  $M + N$  وذلك

يمكن برهنه بسهولة وبطريقة مماثلة للحالة الاولى ( $M \cap N \neq \{0\}$ ) للبرهنة على ان

المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n\}$  مستقلة خطياً. نأخذ تركيباً خطياً مساوياً

للصفر:

$$x_1 A_1 + \dots + x_m A_m + y_1 B_1 + \dots + y_n B_n = 0$$

ونكتبه بالصيغة:

$$x_1 A_1 + \dots + x_m A_m = (-y_1) B_1 + \dots + (-y_n) B_n$$

الطرف الايسر متجه في M ويساوي الطرف الايمن الذي بدوره يكون متجهاً في N وبالتالي ينتمي كلا الطرفين الى كل من M و N اي الى التقاطع  $M \cap N$ . لكن  $M \cap N = \{0\}$  بالفرض. إذن

$$x_1 A_1 + \dots + x_m A_m = \vec{0}$$

$$(-y_1) B_1 + \dots + (-y_n) B_n = \vec{0}$$

بما ان المجموعتين  $\{A_1, \dots, A_m\}$ ،  $\{B_1, \dots, B_n\}$  مستقلتان خطياً، فعليه نستنتج:

$$x_1 = 0, \dots, x_m = 0, y_1 = 0, \dots, y_n = 0$$

بذلك تكون المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n\}$  مستقلة خطياً. هذا يثبت ان  $\dim(M \oplus N) = m + n$  وهذا يتفق مع النتيجة العامة في حالة كون  $M \cap N = \{0\}$  أي ان  $\dim(M \cap N) = 0$ .

(و . ه . م .)

مثال (18):

جد بعد الفضاء الجزئي  $M + N$  من  $R^3$  اذا علمت ان  $N = \{(x, y, z) : 2x + 5y = 0\}$ ،  $M = \{(x, y, z) : x - 2y + z = 0\}$ .  
 $M + N = R^3$

الحل: بتطبيق المبرهنة (1.8.9) نلاحظ ان

$$\dim(M + N) = \dim M + \dim N - \dim(M \cap N)$$

لذلك نحاول ان نجد ابعاد الفضاءات الجزئية  $M, N, M \cap N$ . بالامكان وصف

$M, N$  بالصيغة التالية:

$$M = \{(x, y, z) : x = x, y = y, z = -x + 2y\}$$

$$N = \{(x, y, z) : x = x, y = (-2/5)x, z = z\}$$

وكما وضحنا في الامثلة السابقة فإنه بالامكان اختيار المجموعتين :

$$C = \{(1, -2/5, 0), (0, 0, 1)\}, B = \{(1, 0, -1), (0, 1, 2)\}$$

كقواعد الى كل من M و N على الترتيب . بذلك يكون لدينا :

$$\dim N = 2, \dim M = 2$$

لحساب  $M \cap N$  نفترض ان المتجه  $(x, y, z) \in M \cap N$  بذلك يكون لدينا  
عند التعويض نحصل على :  $z = -x + 2y$  و  $y = (-2/5)x$

$$z = -x + 2(-2/5)x = (-9/5)x$$

عندئذ يمكن وصف التقاطع بالصيغة :

$$M \cap N = \{(x, y, z) : x = x, y = (-2/5)x, z = (-9/5)x\}$$

وهذا يكون لدينا متغير واحد حر وهو x وبأختيار القيمة  $x = 5$  نحصل على المتجه  $(5, -2, -9)$  الذي بدوره يكون قاعدة الى  $M \cap N$ .

هذا يعني ان  $\dim(M \cap N) = 1$ . المعادلة المذكورة في البرهنة

(1.8.9) تنتج :

$$\dim(M + N) = 2 + 2 - 1 = 3$$

اي أن  $\dim(M + N) = \dim(R^3)$

وبما ان  $M + N$  فضاء جزئي من  $R^3$  فعليه وحسب نتيجة (1.8.7) يكون :  
 $M + N = R^3$ .

## تمارين (1.8)

1 — اي من المجموعات الجزئية التالية تكون قاعدة الى  $R^3$ .

$$E = \{(-1, 2, 0), (0, 1, 0), (1, 2, 3)\}$$

$$F = \{(1, 2, 0), (0, 5, 7), (-1, 1, 3)\}$$

$$G = \{(-1, 1, 4), (0, 2, 0), (1, 1, 1), (0, 2, 5)\}$$

$$H = \{(0, 5, 7), (-1, 2, -3), (-2, 9, 1)\}$$

2 — اي من المجموعات الجزئية التالية تكون قاعدة للفضاء  $P_2(\mathbb{R})$  على الحقل  $\mathbb{R}$ .

$$E = \{-1, 1-x, -2x^2\}$$

$$F = \{1, (x-2), (x-2)(x+1)\}$$

$$G = \{1+x-x^2, 2-x+3x^2, 1-2x+4x^2\}$$

$$H = \{1+x+x^2, x^2, x^2-2\}$$

3 — جد قاعدة لفضاء المصفوفات  $2 \times 2$ ,  $M_2(\mathbb{C})$  على الحقل  $\mathbb{C}$  ، ثم اعتبر  $M_2(\mathbb{C})$  فضاءً على حقل الأعداد الحقيقية  $\mathbb{R}$  وجد قاعدة له .

4 — في الفضاء  $\mathbb{C}^4$  على الحقل  $\mathbb{C}$  ، برهن على ان كل من المجموعتين :

$$M = \{(a, 0, 0, b) : a, b \in \mathbb{C}\}$$

$$N = \{(c, 0, d, 0) : c, d \in \mathbb{C}\}$$

تكون فضاءً جزئياً ثم جد قاعدة له . جد قاعدة الى كل من  $M \cap N$  و  $M + N$  ثم حقق معادلة البعد في (1.8.9) .

5 — جد قاعدة الى كل من الفضاءات الجزئية التالية من  $\mathbb{R}^3$ .

$$M = \{(x, y, z) : x + y = 0\}$$

$$N = \{(x, y, z) : 2x + y - z = 0\}$$

$$V = \{(x, y, z) : x = 0, y - 2z = 0\}$$

$$W = \{(x, y, z) : x = y - 3z\}$$

6 — جد قاعدة الى كل من الفضاءات الجزئية التالية من  $P_3(\mathbb{R})$ .

$$M = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 : 2a_1 + a_2 - a_3 = 0\}$$

$$N = \{P(x) : d/dx P(x) = 0\}$$

$$V = \{P(x) : P(-x) = -P(x)\}$$

$$W = \{P(x) : P(0) = 0\}$$

$$Z = \{P(x): P(x) = a_0 + a_2x^2\}$$

- 7 — جد بعد جميع الفضاءات الجزئية في التمارين (5)، (6).
- 8 — ليكن كل من  $M = \{(a,0,0)\}$ ،  $N = \{(0,b,b)\}$  فضاءً جزئياً من  $R^3$ . جد قاعدة الى  $M+N$ .
- 9 — تحت اي شرط على العدد الحقيقي  $a$  تكون مجموعة المتجهات  $(0,1,a)$ ،  $(1,a,0)$ ،  $(1,0,a)$  مرتبطة خطياً.
- 10 — اعتبر  $V$  هو الفضاء الجزئي المولد من قبل المتجهات:  
 $A_1(x) = 2$ ,  $A_2(x) = \sin^2x$ ,  $A_3(x) = \cos 2x$   
 وذلك في فضاء الدوال الحقيقية المعرفة على المستقيم الحقيقي بأكمله.  
 (أ) اثبت ان  $S = \{A_1, A_2, A_3\}$  ليست قاعدة الى  $V$ .  
 (ب) جد قاعدة للفضاء الجزئي  $V$ .

- 11 — اعتبر  $\{A_1, A_2, A_3\}$  قاعدة للفضاء  $V$  ثم برهن على ان  $\{B_1, B_2, B_3\}$  ايضاً قاعدة، حيث:

$$B_1 = A_1, B_2 = A_1 + A_2, B_3 = A_1 + A_2 + A_3$$

- 12 — برهن على ان:  $\dim(M_{mn}(R)) = mn$ ،  $\dim(M_n(C)) = n^2$  عندما  $M_n(C)$  يكون فضاء متجهات على الحقل  $C$ . و  $\dim(M_n(C)) = 2n^2$  عندما  $M_n(C)$  يكون فضاء متجهات على الحقل  $R$ .

- 13 — اذا كان  $M = \{(x,y,z): x+2y-z=0\}$  فضاءً جزئياً من  $R^3$ ، فجد فضاءً جزئياً  $N$  بحيث يكون  $M \cap N = \{O\}$  و  $M+N = R^3$ .  
 (ارشاد: اختار قاعدة الى  $M$  ثم وسعها الى قاعدة الى  $R^3$ .)

(1.9) الاحداثيات وتغيير القواعد

Coordinates and change of bases

إذا كان  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى الحقل  $F$ ، وإذا كانت  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة الى  $V$  فإن اي متجه  $A \in V$  يمكن كتابته بطريقة واحدة فقط كتركيب خطي من متجهات تلك القاعدة ( مبرهنة 1.8.4 ). اي ان  $A = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$  حيث  $x_1, \dots, x_n \in F$  اعداد قياسية وحيدة .

من الان فصاعداً، سوف نهتم بترتيب المتجهات في القاعدة، اي اننا سنتعامل مع قواعد مرتبه، لكن لسهولة التعبير، سنطلق فقط اسم قاعدة ويفهم من ذلك انها قاعدة مرتبة. فمثلاً القاعدة  $\{A_1 = (1,0), A_2 = (0,1)\}$  للفضاء  $R^2$  سوف تختلف عن القاعدة  $\{A_1 = (0,1), A_2 = (1,0)\}$  على الرغم من كونهما مجموعتين متساويتين، لكن الاختلاف هنا بترتيب المتجهات .  
نرجع الان للفضاء  $V$  اعلاه، ونأخذ  $A \in V$  اي متجه .

تعريف :

بمتجه احداثيات  $A \in V$  بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$ ، نقصد المتجه  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ، حيث ان  $x_1, \dots, x_n \in F$  هي الاعداد القياسية الوحيدة التي تحقق  $A = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$  .

مثال (1) :

في الفضاء  $R^2$ ، جد متجه احداثيات المتجه  $A = (5,6)$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية ثم بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1 = (1,2), A_2 = (-1,4)\}$  .

الحل : ان القاعدة الطبيعية الى  $R^2$  هي  $\{A_1 = (1,0), A_2 = (0,1)\}$

$$\begin{aligned} \text{بما ان : } A = (5,6) &= 5(1,0) + 6(0,1) \\ &= 5A_1 + 6A_2 \end{aligned}$$

اذن يكون متجه احدائيات  $A = (5,6)$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية مساوياً للمتجه نفسه ، اي  $X = (5,6)$  .

لايجاد متجه احدائيات  $A = (5,6)$  بالنسبة للقاعدة  $S$  اعلاه ، نكتب :

$$\begin{aligned} A = (5,6) &= x_1 A_1 + x_2 A_2 \\ &= x_1 (1,2) + x_2 (-1,4) \\ &= (x_1 - x_2, 2x_1 + 4x_2) \end{aligned}$$

بعد حل المعادلات نحصل على  $x_1 = 13/3, x_2 = -2/3$  .

هذا يعني ان متجه احدائيات  $A = (5,6)$  بالنسبة للقاعدة  $S$  هو  $X = (13/3, -2/3)$  .

مثال (2) :

في الفضاء  $P_2(\mathbb{R})$  ، جد متجه احدائيات المتجه  $A = 1 - x^2$  بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1 = 3, A_2 = -1 + x, A_3 = x^2\}$  .

الحل : نكتب :

$$\begin{aligned} A = 1 - x^2 &= a(3) + b(-1 + x) + c(x^2) \\ &= (3a - b) + bx + cx^2 \end{aligned}$$

فنجعل على المعادلات :

$$3a - b = 1, b = 0, c = -1$$

$$a = 1/3, b = 0, c = -1 \text{ اي}$$

عندئذ يكون متجه احدائيات المتجه  $A = 1 - x^2$  بالنسبة للقاعدة  $S$  هو  $X = (1/3, 0, -1)$  .

لقد لاحظنا ان متجه احدائيات اي متجه يعتمد كلياً على المتجه والقاعدة ، فإذا تغيرت القاعدة ، تغير متجه الاحدائيات . سوف ندرس العلاقة بين احدائيات متجه بالنسبة لقاعدتين مختلفتين ، لكن قبل ذكر العلاقة بصورة عامة سنحاول دراستها من خلال المثال التالي .

مثال (3) :

إذا كانت  $S = \{A_1, A_2\}$  قاعدة الى  $R^2$  و  $S^* = \{A^*_1, A^*_2\}$  قاعدة جديدة الى  $R^2$  بحيث ان

$$A_2 = cA^*_1 + dA^*_2, A_1 = aA^*_1 + bA^*_2$$

إذا كان

$X = (x, y)$  هو متجه احداثيات المتجه  $A \in R^2$  بالنسبة للقاعدة  $S$  فجد  $X^* = (x^*, y^*)$  ، متجه احداثيات  $A$  بالنسبة للقاعدة الجديدة  $S^*$ .

الحل :

$$A = xA_1 + yA_2$$

$$= x(aA^*_1 + bA^*_2) + y(cA^*_1 + dA^*_2)$$

$$= (xa + yc)A^*_1 + (xb + yd)A^*_2$$

$$\text{أذن : } x^* = xa + yc, y^* = xb + yd$$

اي ان :

$$X^* = (x^*, y^*) = (xa + yc, xb + yd)$$

$$= (x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ ، فإن العلاقة اعلاه}$$

لو وضعنا :

تصبح

$$X^* = XP$$

الصف الاول للمصفوفة  $P$  هو متجه احداثيات  $A_1$  بالنسبة للقاعدة الجديدة .  
والصف الثاني هو متجه احداثيات  $A_2$  بالنسبة للقاعدة الجديدة .

سنسمي المصفوفة  $P$  اعلاه مصفوفة الانتقال من القاعدة  $S$  الى

القاعدة  $S^*$ .



بصورة عامة، اذا كانت  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة الى  $V$  و  $S^* = \{A_1^*, \dots, A_n^*\}$  قاعدة جديدة الى  $V$  فإنه بالامكان كتابة كل متجه في  $S$  كتركيب خطي من متجهات  $S^*$  وعلى النحو التالي:

$$A_1 = P_{11}A_1^* + P_{12}A_2^* + \dots + P_{1n}A_n^*$$

$$A_2 = P_{21}A_1^* + P_{22}A_2^* + \dots + P_{2n}A_n^*$$

$\vdots$

$$A_n = P_{n1}A_1^* + P_{n2}A_2^* + \dots + P_{nn}A_n^*$$

عندئذ تسمى المصفوفة

$$P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1} & P_{n2} & \dots & P_{nn} \end{pmatrix}$$

مصفوفة الانتقال من القاعدة  $S$  الى القاعدة  $S^*$

لاحظ ان الصف  $k$  للمصفوفة  $P$  هو متجه احدائيات  $A_k \in S$  بالنسبة للقاعدة الجديدة  $S^*$ . اي ان مصفوفة الانتقال من  $S$  الى  $S^*$  هي المصفوفة التي تنتج من كتابة متجهات  $S$  بدلالة متجهات  $S^*$  على الترتيب.

مثال (4):

جد مصفوفة الانتقال من القاعدة  $S = \{A_1 = (2,1), A_2 = (0,3)\}$  الى القاعدة  $S^* = \{A_1^* = (-1,0), A_2^* = (3,3)\}$ .

الحل: نكتب

$$A_1 = (2,1) = p_{11}A_1^* + p_{12}A_2^*$$

$$A_2 = (0,3) = p_{21}A_1^* + p_{22}A_2^*$$

بذلك نحصل على :

$$(2,1) = p_{11}(-1,0) + p_{12}(3,3) = (-p_{11} + 3p_{12}, 3p_{12})$$

$$(0,3) = p_{21}(-1,0) + p_{22}(3,3) = (-p_{21} + 3p_{22}, 3p_{22})$$

اي ان

$$-p_{11} + 3p_{12} = 2, 3p_{12} = 1$$

$$-p_{21} + 3p_{22} = 0, 3p_{22} = 3$$

والحل يكون

$$p_{11} = -1, p_{12} = 1/3, p_{21} = 3, p_{22} = 1$$

عندئذ تكون مصفوفة الانتقال من القاعدة S الى القاعدة S\* هي

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1/3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

مبرهنة (1.9.1) :

اذا كانت S قاعدة لفضاء المتجهات المنتهي البعد V و S\* قاعدة جديدة الى V بحيث ان مصفوفة الانتقال من S الى S\* هي P، واذا كان X هو متجه احداثيات المتجه A ∈ V بالنسبة للقاعدة S فإن X\* = XP يكون متجه احداثيات A بالنسبة للقاعدة S\*.

البرهان :

لنفرض ان بعد n = V ولنفرض ان S = {A<sub>1</sub>, ..., A<sub>n</sub>} و S\* = {A\*<sub>1</sub>, ..., A\*<sub>n</sub>}. بما ان X = (x<sub>1</sub>, ..., x<sub>n</sub>) هو متجه احداثيات A ∈ V بالنسبة للقاعدة S. اذن

$$A = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$$

بما ان  $P = (p_{ij})$  هي مصفوفة الانتقال من  $S$  الى  $S^*$ . اذن

$$\begin{aligned} A_1 &= p_{11}A_1^* + \dots + p_{1n}A_n^* \\ \vdots & \\ A_n &= p_{n1}A_1^* + \dots + p_{nn}A_n^* \end{aligned}$$

بالتعويض نحصل على

$$\begin{aligned} A &= x_1A_1 + \dots + x_nA_n \\ &= x_1(p_{11}A_1^* + \dots + p_{1n}A_n^*) + \dots + \\ &\quad x_n(p_{n1}A_1^* + \dots + p_{nn}A_n^*) \\ &= (x_1p_{11} + x_2p_{21} + \dots + x_np_{n1})A_1^* + \dots + \\ &\quad (x_1p_{1n} + x_2p_{2n} + \dots + x_np_{nn})A_n^* \end{aligned}$$

اذا كان  $X^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$  متجه احدائيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $S^*$  فنحصل على العلاقات التالية.

$$\begin{aligned} x_1^* &= x_1p_{11} + x_2p_{21} + \dots + x_np_{n1} \\ x_2^* &= x_1p_{12} + x_2p_{22} + \dots + x_np_{n2} \\ \vdots & \\ x_n^* &= x_1p_{1n} + x_2p_{2n} + \dots + x_np_{nn} \end{aligned}$$

بمراجعة ضرب المصفوفات، يمكن كتابة المعادلات اعلاه بالصيغة

$$(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

اي ان:  $X^* = XP$

(و. ه. م.)

مثال (5) :

إذا علمت بأن  $X = (1, 2, -1)$  هو متجه احدائيات المتجه  $A$  بالنسبة للقاعدة  $S = \{1/2, -x, 2x^2\}$  الى  $P_2(R)$  فجد  $A$ . وإذا علمت بأن

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

هي مصفوفة الانتقال من  $S$  الى القاعدة

$S^* = \{A^*_1, A^*_2, A^*_3\}$  فجد متجه احدائيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $S^*$ .

$$A = (1)(1/2) + (2)(-x) + (-1)(2x^2)$$

الحل :

$$= 1/2 - 2x - 2x^2$$

ليكن  $X^* = (a^*_1, a^*_2, a^*_3)$  متجه احدائيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $S^*$  اذن .

$$X^* = XP$$

$$= (1, 2, -1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= (4, 2, -1)$$

مثال (6) :

إذا علمت بأن مصفوفة الانتقال من القاعدة

$S = \{A_1 = (2, 1), A_2 = (0, 3)\}$  الى  $R^2$  الى القاعدة  $S^* = \{A^*_1, A^*_2\}$  هي

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

فجد  $A^*_1, A^*_2$  ثم جد مصفوفة الانتقال من  $S^*$  الى  $S$ .

الحل: من تعريف مصفوفة الانتقال نحصل على

$$A_1 = (2,1) = 1/\sqrt{5} A^*_1 + 2/\sqrt{5} A^*_2 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$A_2 = (0,3) = -2/\sqrt{5} A^*_1 + 1/\sqrt{5} A^*_2 \quad \dots\dots\dots(2)$$

بضرب المعادلة الاولى في 2 وجمعها مع المعادلة الثانية، نحصل على

$$(4,5) = 5/\sqrt{5} A^*_2 = \sqrt{5} A^*_2$$

$$A^*_2 = (4/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}) \text{ . اذن}$$

من المعادلة الاولى نحصل على

$$\begin{aligned} 1/\sqrt{5} A^*_1 &= (2,1) - 2/\sqrt{5} A^*_2 \\ &= (2,1) - 2/\sqrt{5} (4/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}) \\ &= (2,1) - (8/5, 2/5) = (2/5, 3/5) \end{aligned}$$

$$A^*_1 = (2/\sqrt{5}, 3/\sqrt{5}) \text{ : اذن}$$

لنفرض ان

$$Q = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{bmatrix}$$

هي مصفوفة الانتقال من القاعدة  $S^*$  الى القاعدة  $S$ ، فيكون لدينا

$$A^*_1 = q_{11} A_1 + q_{12} A_2$$

$$A^*_2 = q_{21} A_1 + q_{22} A_2$$

$$\text{اي ان : } (2/\sqrt{5}, 3/\sqrt{5}) = q_{11} (2,1) + q_{12} (0,3)$$

$$(4/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}) = q_{21} (2,1) + q_{22} (0,3)$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

وحل المعادلات اعلاه نحصل على

$$Q = P^{-1}$$

مبرهنة (1.9.2):

إذا كانت

$S^* = \{A^*_{1}, \dots, A^*_{n}\}$  ،  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$   
 $S^{**} = \{A^{**}_{1}, \dots, A^{**}_{n}\}$  قواعد للفضاء  $V$  وكانت  $P$  هي مصفوفة  
 الانتقال من  $S$  إلى  $S^*$  و  $Q$  هي مصفوفة الانتقال من  $S^*$  إلى  $S^{**}$  فإن  $PQ$  تكون  
 مصفوفة الانتقال من  $S$  إلى  $S^{**}$ .

البرهان:

تمرين بسيط بضرب المصفوفات ويترك للقارىء.

نتيجة (1.9.3):

إذا كانت  $P$  مصفوفة الانتقال من قاعدة  $S$  إلى قاعدة  $S^*$  فإن  $P^{-1}$   
 تكون مصفوفة الانتقال من  $S^*$  إلى  $S$ .

البرهان:

ان مصفوفة الانتقال من  $S$  إلى  $S$  هي المصفوفة المحايدة . فإذا كانت  $Q$   
 مصفوفة الانتقال من  $S^*$  إلى  $S$  فإن  $PQ$  تكون مصفوفة الانتقال من  $S$  إلى  $S$  ،  
 أي

$$PQ = I$$

وبذلك يكون  $Q = P^{-1}$ .

(و . ه . م .)

مثال (7):


جد المتجه  $A$  في  $P_2(\mathbb{R})$  الذي متجه احداثياته بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1 = -1, A_2 = 1+x, A_3 = 2x^2\}$  هو المتجه  $X = (-2, 0, 1)$ .

الحل: من تعريف متجه الاحداثيات نحصل على:

$$\begin{aligned} A &= (-2)A_1 + (0)A_2 + (1)A_3 \\ &= (-2)(-1) + (0)(1+x) + (1)(2x^2) \\ &= -2 + 2x^2 \end{aligned}$$

ملاحظة:

المخطط التالي يساعد الطالب في تذكر ماورد في مبرهنة (1.9.1)



مصفوفة الانتقال من  $S$  الى  $S^*$   
(اكتب  $S$  بدلالة  $S^*$ )

## تمارين (1,9)

1 — جد متجه احداثيات كل من المتجهات التالية في  $\mathbb{R}^2$  وذلك بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1 = (2, -1), A_2 = (3, 0)\}$ .

$$A = (2, -1), B = (0, 0), C = (0, 1), D = (a, b)$$

2 — جد متجه احداثيات كل من المتجهات التالية في  $M_2(C)$  على الحقل  $C$  بالنسبة للقاعدة:

$$S = \left\{ A_1 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1+i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right.$$

$$\left. , A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-i \end{bmatrix} \right\}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1+i \\ 1-i & 2+3i \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2-5i & 0 \\ 0 & 7+i \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1+i & -i \\ i & i \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 1 & 2i \\ -5i & 3 \end{bmatrix}$$

3 — جد متجه احداثيات كل من المتجهات التالية في  $P_2(R)$  وذلك بالنسبة للقاعدة:

$$S = \{1-x, 1+x, 2-x^2\}$$

$$A = \sqrt{2} + x - (1/3)x^2, B = 2x + 7x^2, C = 3$$

— 4

(أ) اعتبر  $C^2$  فضاء متجهات على الحقل  $C$  وجد متجه احداثيات  $A = (1, -i)$  بالنسبة للقاعدة:

$$S = \{A_1 = (-1, 0), A_2 = (0, 2+3i)\}$$

(ب) اعتبر  $C^2$  فضاء متجهات على الحقل  $R$  وجد متجه احداثيات  $A = (1, -i)$  بالنسبة للقاعدة:

$$S = \{A_1 = (-1, 0), A_2 = (1+i, 0), A_3 = (0, 2i), A_4 = (1, 1+i)\}$$

حد مصفوفة الانتقال من القاعدة  $\{A_1 = (1, 2), A_2 = (2, 3)\}$  الى القاعدة

$$S^* = \{A_1^* = (-1, 0), A_2^* = (1, -2)\}$$



6 — جد مصفوفة الانتقال من القاعدة

$$S = \{A_1 = 2, A_2 = 1-x+x^2, A_3 = 2x+3x^2\}$$

للفضاء  $P_2(\mathbb{R})$  الى القاعدة

$$S^* = \{A^*_1 = 1+x, A^*_2 = x^2, A^*_3 = 3+4x+5x^2\}$$

7 — اعتبر  $V$  هو الفضاء المولد من قبل المتجهين

$$A_2(x) = \text{Cos}x, A_1(x) = \text{Sin}x$$

$$B = \{B_1(x) = 2\text{Sin}x + \text{Cos}x, B_2(x) = 3\text{Cos}x\}$$

اثبت ان  $B$  تكون قاعدة للفضاء  $V$ .

(ب) جد مصفوفة الانتقال من القاعدة  $A = \{A_1, A_2\}$  الى القاعدة

$$B = \{B_1, B_2\}$$

(ج) جد متجه احدائيات  $C(x) = -2\text{Sin}x + 3\text{Cos}x$  بالنسبة للقاعدة

$$B = \{B_1, B_2\}$$

وذلك بالاعتماد على مبرهنة (1.9.1) ثم تأكد من عملك بحساب ذلك المتجه بصورة مباشرة.

(د) جد مصفوفة الانتقال من القاعدة  $B = \{B_1, B_2\}$  الى القاعدة

$$A = \{A_1, A_2\}$$

8 — اذا علمت بأن مصفوفة الانتقال من القاعدة  $S = \{A_1, A_2\}$  الى  $\mathbb{R}^2$

$$S^* = \{A^*_1 = (-7,5), A^*_2 = (2,1)\}$$

هي المصفوفة

$$P = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

فجد متجهات القاعدة  $S$ .

9 — اذا علمت بأن مصفوفة الانتقال من القاعدة  $S = \{A_1 = 1+x, A_2 = 1-x\}$

للفضاء  $P_1(\mathbb{R})$  الى القاعدة  $S^* = \{A^*_1, A^*_2\}$  هي المصفوفة

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

فجد متجهات القاعدة  $S^*$ .

10 — جد المتجه A في  $M_2(\mathbb{R})$  الذي متجه احدائياته بالنسبة للقاعدة

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$$

هو المتجه  $X = (1, 2, 0, 4)$ .

11 — جد المتجه A في  $P_2(\mathbb{C})$  على الحقل C الذي متجه احدائياته بالنسبة للقاعدة:

$$S = \{i, 1 + (1-i)x, (1+i)x^2\} \text{ هو المتجه } X = (-1+i, -i, 3)$$

## الفصل الثاني


### التحويلات الخطية : Linear Transformations

#### (2.0) مقدمة :

في موضوع الجبر الخطي، توجد تطبيقات عديدة على موضوع فضاء المتجهات والدوال بين فضاءات المتجهات، ومن اهم هذه التطبيقات التي تستعمل في الفيزياء والعلوم الهندسية والعلوم الاجتماعية، والافرع المختلفة من الرياضيات هي التحويلات الخطية، وهي عبارة عن دوال مجالها ومجالها المقابل عبارة عن فضاءي متجهات بحيث تنقل كل تركيب خطي لمتجهات في الفضاء الاول ( المجال ) الى التركيب الخطي نفسه لمتجهات اخرى في الفضاء الثاني ( المجال المقابل ) .

من الامثلة الهندسية على تلك التحويلات هي تدوير المستوى  $R^2$  بزاوية معينة  $\theta$  فإذا رمزنا للتدوير بالرمز  $R_\theta$  فإنه يمكن اعتبار  $R_\theta$  دالة من  $R^2$  الى  $R^2$ ، اي  $R_\theta: R^2 \rightarrow R^2$ ، هذا التدوير ينقل متوازي الأضلاع ذا الضلعين  $A, B$  الى متوازي أضلاع آخر ذي ضلعين  $R_\theta(A), R_\theta(B)$  بحيث ان القطر  $A + B$  ينتقل الى القطر  $R_\theta(A) + R_\theta(B)$ ، اي بمعنى ان  $R_\theta(A + B) = R_\theta(A) + R_\theta(B)$ .

انظر الشكل رقم (1).



شكل (1)

كذلك فإنه اذا كان  $r$  اي عدد حقيقي فإن الدالة  $R_{\theta}$  تحقق  $R_{\theta}(rA) = rR_{\theta}(A)$ .

هذا تحويل خطي من المستوى الى نفسه، وفي البند (2.1) سوف نذكر التعريف العام للتحويلات الخطية ثم نعطي امثلة توضح فكرتها. البند (2.2) سوف يركز على الامور النظرية، ويعطي خصائص التحويلات الخطية، وعلاقتها بالفضاءات الجزئية والابعاد. في البند (2.3) سنتناول دراسة تركيب التحويلات الخطية والتحويلات النظرية اما البند (2.4) فقد خصص لدراسة العلاقة بين المصفوفات والتحويلات الخطية، تلك العلاقة الوطيدة التي تمكن من معرفة وبرهنة خصائص المصفوفات بأستعمال التحويلات الخطية وبالعكس. البند (2.5) سيتناول دراسة تغيير القواعد وعلاقة ذلك بمصفوفة التحويل الخطي. ويجب على تساؤلات تطرح في البند (2.4).

## (2.1) التحويلات الخطية (Linear Transformations)

تعريف:

ليكن  $W, V$  فضاءي متجهات على الحقل  $F$  نفسه، ولتكن  $T: V \rightarrow W$

دالة تحقق

$$(i) T(A + B) = T(A) + T(B)$$

$$(ii) T(rA) = rT(A)$$

وذلك لاي متجهات  $A, B \in V$  ولاي عدد قياسي  $r \in F$ . بهذه الحالة نسمي  $T$  تحويلاً خطياً من  $V$  الى  $W$ .

مثال (1):

ليكن  $W = R^2$  و  $V = R^3$  ولتكن  $T: R^3 \rightarrow R^2$  دالة معرفة بالصيغة:

$$T(x, y, z) = (x + y, z)$$

إن  $T$  تكون تحويلاً خطياً من  $R^3$  الى  $R^2$ ، ولبرهنة ذلك نأخذ،  $A = (a_1, a_2, a_3)$  و  $B = (b_1, b_2, b_3)$  بهذا يكون

$$\begin{aligned} T(A + B) &= T(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3) \\ &= ((a_1 + b_1) + (a_2 + b_2), (a_3 + b_3)) \\ &= (a_1 + a_2, a_3) + (b_1 + b_2, b_3) \\ &= T(A) + T(B) \end{aligned}$$

لو كان  $r \in R$  اي عدد حقيقي فإنه:

$$\begin{aligned} T(rA) &= T(ra_1, ra_2, ra_3) \\ &= (ra_1 + ra_2, ra_3) \\ &= (r(a_1 + a_2), ra_3) \\ &= r(a_1 + a_2, a_3) \\ &= rT(A) \end{aligned}$$

نستنتج من هذا ان الدالة  $T$  تحقق الشرطين اعلاه وعليه تكون تحويلاً خطياً.

مثال (2):

الدالة  $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$  المعرفة بالصيغة

$$T(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a-2b & 0 \\ 0 & a+c \end{pmatrix}$$

تكون تحويلاً خطياً والتحقق كما في مثال (1)

مثال (3):

إذا كان  $V$  و  $W$  أي فضاءي متجهات على الحقل  $F$ ، فإن الدالة الثابتة  $T: V \rightarrow W$  والمعرفة بالصيغة  $T(A) = 0$  لكل  $A \in V$  تكون تحويلاً خطياً، يسمى بالتحويل الصفري (Null Transformation). نترك الإثبات على أن  $T$  تحويلاً خطياً كتمرين.

مثال (4):

إذا كان  $V$  أي فضاء متجهات فإن الدالة  $T: V \rightarrow V$  المعرفة بالصيغة  $T(A) = A$  لكل  $A \in V$  تكون تحويلاً خطياً، يسمى بالتحويل المحايد (Identity transformation). الإثبات تمرين.

مثال (5):

برهن على أن الدالة  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  المعرفة بالصيغة

$$T(x, y) = xy + 1$$

ليست تحويلاً خطياً.

البرهان :

ليكن  $A = (a_1, a_2)$  ،  $B = (b_1, b_2)$  .

$$\begin{aligned} T(A+B) &= T(a_1 + b_1, a_2 + b_2) \\ &= (a_1 + b_1)(a_2 + b_2) + 1 \\ &= a_1a_2 + b_1b_2 + a_1b_2 + b_1a_2 + 1 \end{aligned}$$

لكن

$$\begin{aligned} T(A) + T(B) &= (a_1a_2 + 1) + (b_1b_2 + 1) \\ &= a_1a_2 + b_1b_2 + 2 \end{aligned}$$


وبهذا اصبح واضحاً ان  $T(A+B) \neq T(A) + T(B)$  عندما يكون  $A, B$  اي زوج من المتجهات في  $R^2$  .

مثال (6) :

الدالة  $T: R^2 \rightarrow R$  المعرفة بالصيغة

$$T(x, y) = 2x$$

تكون تحويلاً خطياً . والتحقق مشابه تماماً للمثال (1) . انظر الشكل رقم (2) الذي يوضح التحويل T اعلاه هندسياً .



شكل (2)

المبرهنة التالية تعطي بعض الخصائص البسيطة للتحويلات الخطية .

مبرهنة (2.1.1) :

إذا كان  $T:V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً بين الفضاءين  $W, V$  على الحقل  $F$

فإن

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \quad (\text{أ})$$

(ب) لأي مجموعة متجهات  $A_1, A_2, \dots, A_n \in V$  ولأي مجموعة اعداد قياسية  $x_1, x_2, \dots, x_n \in F$  يكون لدينا

$$T(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n) = x_1 T(A_1) + x_2 T(A_2) + \dots + x_n T(A_n)$$

البرهان :

(أ) بما ان  $\mathbf{0} \cdot A = \mathbf{0}$  لأي متجه  $A \in V$ ، عليه يكون  $\mathbf{0} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ ، وبالتالي وحسب الشرط (2) من تعريف التحويل الخطي يكون لدينا:

$$T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0} \cdot \mathbf{0}) = \mathbf{0} \cdot T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

(ب) حسب الشرط (1) من تعريف التحويل الخطي نستنتج

$$T(x_1 A_1 + \dots + x_n A_n) = T(x_1 A_1) + \dots + T(x_n A_n)$$

اما الشرط الثاني من التعريف فيعطي النتيجة المطلوبة لأن

$$T(x_k A_k) = x_k T(A_k)$$

لكل  $k: 1, 2, \dots, n$ .

( و . ه . م . )

المبرهنة التالية توضح لنا كيف انه بالامكان معرفة التحويل الخطي بمجرد معرفة قيمته على عناصر اي قاعدة كانت .



مبرهنة (2.1.2):

إذا كان  $V$  فضاء متجهات منتهى البعد وكانت  $\{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة الى  $V$ ، فإنه لأي مجموعة  $\{B_1, \dots, B_n\}$  متكونة من  $n$  من المتجهات العشوائية في  $W$ . يوجد تحويل خطي وحيد  $T: V \rightarrow W$  يحقق:

$$T(A_1) = B_1, \dots, T(A_n) = B_n$$

ولأي اعداد قياسية  $x_1, \dots, x_n$  يكون:

$$T(x_1 A_1 + \dots + x_n A_n) = x_1 B_1 + \dots + x_n B_n$$

البرهان:

سنبرهن أولاً بأنه يوجد تحويل خطي  $T: V \rightarrow W$  يحقق الشرطين اعلاه. لهذا الغرض نأخذ  $A \in V$  اي متجه. بما ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_n\}$  تكون قاعدة الى  $V$  بالفرض. إذن توجد اعداد قياسية وحيدة  $x_1, \dots, x_n$  بحيث

$$A = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$$

$$\downarrow T(A) = x_1 B_1 + \dots + x_n B_n$$

لنكون قد عرفنا دالة  $T: V \rightarrow W$  ولغرض التحقق من ان الدالة اعلاه تكون تحويلاً خطياً نأخذ  $A, C$  اي متجهة في  $V$  ولنفرض ان  $A = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$ ،  $C = y_1 A_1 + \dots + y_n A_n$  بذلك يكون:

$$A + C = (x_1 + y_1) A_1 + \dots + (x_n + y_n) A_n$$

ومن تعريف الدالة  $T$  اعلاه نحصل على:

$$\begin{aligned} T(A + C) &= (x_1 + y_1) B_1 + \dots + (x_n + y_n) B_n \\ &= x_1 B_1 + y_1 B_1 + \dots + x_n B_n + y_n B_n \\ &= (x_1 B_1 + \dots + x_n B_n) + (y_1 B_1 + \dots + y_n B_n) \\ &= T(A) + T(C) \end{aligned}$$

ليكن الان  $r$  اي عدد قياسي

$$rA = (rx_1) A_1 + \dots + (rx_n) A_n$$

اذن:

وعليه يكون

$$\begin{aligned} T(rA) &= (rx_1)B_1 + \dots + (rx_n)B_n \\ &\doteq r(x_1B_1 + \dots + x_nB_n) \\ &= rT(A) \end{aligned}$$

بهذا نكون قد برهننا على ان الدالة T اعلاه تكون تحويلاً خطياً محققاً الشروط المذكورة. مثل هذا التحويل يكون وحيداً، لانه لو كان  $S:V \rightarrow W$  اي تحويلاً خطياً محققاً للشروط.

$$S(A_1) = B_1, \dots, S(A_n) = B_n$$

فإن

$$\begin{aligned} S(x_1A_1 + \dots + x_nA_n) &= x_1S(A_1) + \dots + x_nS(A_n) \\ &= x_1B_1 + \dots + x_nB_n \end{aligned}$$

وبالتالي يحقق S الشرط الثاني ويكون مساوياً الى T.

( و . ه . م . )

المثال التالي يوضح ماجاء في المبرهنة اعلاه.

مثال (7):

اعتبر المجموعة  $\{A_1 = (1,0), A_2 = (2,7)\}$  قاعدة الى  $R^2$ . ثم جد تحويلاً خطياً  $T:R^2 \rightarrow P_2(R)$  يحقق:

$$T(A_1) = 1+x, T(A_2) = -1+x-3x^2$$

الحل: المطلوب ايجاد  $T(A)$  لاي متجه  $A = (a,b) \in R^2$  نحاول اولاً ايجاد اعداد قياسية  $x_1, x_2$  تحقق

$$A = x_1A_1 + x_2A_2$$

اي ان المطلوب حل المعادلة

$$\begin{aligned} (a,b) &= x_1(1,0) + x_2(2,7) \\ &= (x_1 + 2x_2, 7x_2) \end{aligned}$$

بهذا نحصل على معادلتين :

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= a \\ 7x_2 &= b \end{aligned}$$

والحل يكون

$$x_1 = a - (2b/7) , x_2 = b/7$$

الآن نعرف  $T: R^2 \rightarrow P_2(R)$  بالصيغة التالية :

$$\begin{aligned} T(A) = T(a,b) &= x_1(1+x) + x_2(-1+x-3x^2) \\ &= (a-2b/7)(1+x) + (b/7)(-1+x-3x^2) \\ &= (a-3b/7) + (a-b/7)x + (-3b/7)x^2 \end{aligned}$$

ملاحظة :

المبرهنة (2.1.2) توضح ان التحويلات الخطية ليست دوالاً عادية وكذلك فإن قواعد فضاءات المتجهات ليست مجموعات جزئية عادية. فمجرد معرفتنا لقيم التحويل الخطي على عناصر القاعدة نكون قد حددنا التحويل الخطي وعرفنا قيمته على جميع عناصر الفضاء.

مثال (8) :

هل يوجد تحويل خطي واحد فقط  $T: R^2 \rightarrow R^3$  يحقق

$$T(1,2) = (0,3,0)$$

الحل: نلاحظ هنا ان المعروف فقط قيمة  $T$  على متجه واحد وهو  $(1,2)$  وبما ان المجموعة  $\{(1,2)\}$  لا تصلح بأن تكون قاعدة الى  $R^2$  فعليه نتوقع وجود اكثر من تحويل واحد.

الآن اذا كان  $T$  تحويلاً خطياً بحيث  $T(1,2) = (0,3,0)$  فإن

$$\begin{aligned} T(x,2x) &= T(x(1,2)) = xT(1,2) \\ &= x(0,3,0) = (0,3x,0) \end{aligned}$$

هذا يعني اننا سنعرف قيم  $T$  على جميع المتجهات ذات الصيغة  $(x, 2x)$  فمثلاً المتجه  $(2,3)$  لا يكون بالصيغة اعلاه وبالتالي لانعرف اين يرسله  $T$  لكن لو اعطينا اي قيمة الى  $T(2,3)$  مثل

$$T(2,3) = (1,1,0)$$

لاصبح بالامكان معرفة  $T(a,b)$  لاي متجه  $(a,b)$  من  $R^2$  وذلك كما في المثال (7). هذا يعني وجود تحويلات كثيرة ترسل المتجه  $(1,2)$  الى المتجه  $(0,3,0)$  لكنها تختلف بكيفية ارسالها للمتجهات ذات الصيغة  $(a,b)$  حيث  $b \neq 2a$ . الان نعرف جمع التحويلات الخطية وضربها بأعداد قياسية.

تعريف :

لأي فضاءي متجهات  $V$  و  $W$  على الحقل  $F$  نفسه، ولأي تحويلين خطيين  $S, T: V \rightarrow W$  يمكن تعريف دالة .

$$S + T: V \rightarrow W$$

بالصيغة

$$(S + T)(A) = S(A) + T(A)$$

كذلك فإنه لأي عدد قياسي  $r \in F$  يمكن تعريف دالة

$$rT: V \rightarrow W$$

بالصيغة

$$(rT)(A) = rT(A)$$

مثال (9) :

إذا كان  $S, T: R^2 \rightarrow R^2$  تحويلين خطيين معرفين بالصيغتين :

$$S(x,y) = (x, 2y), T(x,y) = (y, 0)$$

فجد الدوال التالية :

$$2S, -5T, S+T, 2S-5T$$

الحل : من التعريف اعلاه ينتج

$$(2S)(x,y) = 2 S(x,y) = (2x,4y)$$

$$(-5T)(x,y) = (-5) T(x,y) = (-5y,0)$$

$$\begin{aligned} (2S-5T)(x,y) &= 2S(x,y) + (-5T)(x,y) \\ &= (2x,4y) + (-5y,0) \\ &= (2x-5y,4y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (S+T)(x,y) &= S(x,y) + T(x,y) \\ &= (x,2y) + (y,0) = (x+y,2y) \end{aligned}$$

مدهنة (2.1.3) :

لأي تحويلين خطيين  $S, T: V \rightarrow W$  ولأي عدد قياسي  $r$  تكون كل من الدالتين  $rT, S+T$  تحويلاً خطياً

البرهان :

نأخذ  $A, B$  اي متجهين في  $V$  ونحسب كما يلي :

$$\begin{aligned} (S+T)(A+B) &= S(A+B) + T(A+B) \\ &= S(A) + S(B) + T(A) + T(B) \\ &= S(A) + T(A) + S(B) + T(B) \\ &= (S+T)(A) + (S+T)(B) \end{aligned}$$

ولأي عدد قياسي  $x$  يكون

$$\begin{aligned} (S+T)(xA) &= S(xA) + T(xA) \\ &= x S(A) + x T(A) \\ &= x(S(A) + T(A)) \\ &= x((S+T)(A)) \end{aligned}$$

بذلك تكون الدالة  $S+T$  تحويلاً خطياً.

بالنسبة الى  $rT$  فإن البرهان مماثل ونتركه كتمرين.

( و . ه . م )

مبرهنة (2.1.4)

إذا كان كل من  $W, V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$  فإن مجموعة جميع التحويلات الخطية من  $V$  الى  $W$  والتي يرمز لها بالرمز  $L(V, W)$  تكون فضاء متجهات على الحقل  $F$ .  
البرهان:

المبرهنة (2.1.3) تفيد بأنه بالإمكان تعريف جمع التحويلات الخطية وضربها بأعداد قياسية وبالنسبة لهاتين العمليتين تتحقق جميع الشروط المذكورة في البند الأول حول تعريف فضاء المتجهات ونترك التفاصيل للطالب.

( و . ه . م )

مثال (10):

إذا كان  $V$  فضاء متعددات الحدود بـ  $x$  من أي درجة وذات المعاملات من أي حقل  $F$  فإن  $V$  يكون فضاء متجهات على الحقل  $F$ .  
لتكن  $S: V \rightarrow V$  دالة معرفة بالصيغة:

$$S(P(x)) = P'(x), (P(x) \text{ مشقة})$$

و  $T: V \rightarrow V$  دالة معرفة بالصيغة:

$$T(P(x)) = x P(x)$$

فبرهن على أن كل من  $T, S$  يكون تحويلاً خطياً. ثم جد

$$T(x + x^2 - 2x^3), S(2 - x + x^3)$$

الحل:

$$\begin{aligned} S(p(x) + q(x)) &= (p(x) + q(x))' \\ &= p'(x) + q'(x) = S(p(x)) + S(q(x)) \end{aligned}$$

$$S(rp(x)) = (rp(x))' = rp'(x) = rS(p(x))$$

عليه يكون  $S$  تحويلاً خطياً.

$$T(P(x) + q(x)) = x(P(x) + q(x))$$

$$= xP(x) + xq(x) = T(P(x)) + T(q(x))$$

$$\begin{aligned} T(rp(x)) &= x(rp(x)) = r(xp(x)) \\ &= rT(p(x)) \end{aligned}$$

عليه يكون  $T$  تحويلاً خطياً ايضاً. والآن

$$S(2-x+x^3) = (2-x+x^3)$$

$$= -1 + 3x^2$$

$$T(x+x^2-2x^5) = x(x+x^2-2x^5)$$

$$= x^2 + x^3 - 2x^6$$

### تمارين (2.1)

1 — اي من الدوال التالية يكون تحويلاً خطياً.

$$\cdot T(x,y) = (x-2y, 3y), T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ (أ)}$$

$$\cdot T(x,y) = (x^2, xy), T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ (ب)}$$

$$\cdot T(x) = (x, 2x, 0), T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ (ج)}$$

$$\cdot T(a+bx) = (2a, b+1), T: P_1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ (د)}$$

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y \\ 0 \\ z+w \end{pmatrix}, T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ (هـ)}$$

2 — برهن على ان كل من الدوال التالية تكون تحويلاً خطياً.

$$\cdot T(z_1, z_2) = (iz_1, z_1 - z_2, -iz_2), T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^3 \text{ (أ)}$$

$$\cdot T(a, b) = a - bx + (a+b)x^2, T: \mathbb{R}^2 \rightarrow P_2(\mathbb{R}) \text{ (ب)}$$

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+2y-z \\ a+(2b-c)x \end{pmatrix}, T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \text{ (ج)}$$

$$\cdot T(x, y, z) = x + 2y - z, T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \text{ (د)}$$

3 — اذا كان  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة

$$T(x, y) = (x+y, x-y, 2x)$$

و  $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة

$$S(x,y) = (0, 0, 2x + 3y)$$

فجد كل مما يلي :

$$. T - S, 2T + 3S, \sqrt{2}T + 4S$$

4 — جد التحويل الخطي  $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$  الذي يحقق

$$T(2,0) = (1,1,1,1), T(1+i,0) = (0,0,1,0)$$

$$T(0,-2i) = (0,1,-1,0), T(0,1) = (0,0,0,0)$$

حيث ان  $\mathbb{C}^2$  هو فضاء متجهات على حقل  $\mathbb{R}$ .

5 — جد تحويلين خطيين مختلفين  $T_1, T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  يحققان

$$. T_1(1,-5) = T_2(1,-5) = (2,4,0)$$

6 — اذا كانت  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  دالة تحقق

$$f(1,1,0) = (2,3), f(1,0,1) = (-1,2)$$

$$f(2,1,1) = (1,3), \text{ فهل يمكن لـ } f \text{ ان تكون تحويلاً خطياً؟ .}$$

7 — ( أ ) اعتبر  $\mathbb{C}^2$  فضاء متجهات على الحقل  $\mathbb{C}$  ثم جد تحويلاً خطياً  $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$

$$\text{يحقق } T(-1,0) = (i,1-i), T(0,3) = (0,1+i)$$

(ب) اعتبر  $\mathbb{C}^2$  فضاء متجهات على الحقل  $\mathbb{R}$  ثم جد تحويلاً

$$S: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2 \text{ خطياً}$$

$$. S(-1,0) = (i,1-i), S(0,3) = (0,1+i)$$

(ج) برهن على وجود تحويل خطي واحد فقط في ( أ ) واكثر من واحد في

(ب).

8 — ليكن  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً ولتكن  $\{A_1, \dots, A_n\}$  مجموعة متجهات

في  $V$ . اذا كانت  $\{T(A_1), \dots, T(A_n)\}$  مجموعة مستقلة خطياً من

المتجهات في  $W$  فبرهن على ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_n\}$  تكون ايضاً

مستقلة خطياً.



9 — اذا كان  $T_1, T_2: V \rightarrow R$  تحويلين خطيين على فضاء متجهات  $V$  على الحقل  $R$  فبرهن على ان الدالة

$$S: V \rightarrow R^3$$

المعرفة بالصيغة

$$S(A) = (T_1(A), 0, T_2(A))$$

تكون تحويلاً خطياً .

— 10

(أ) ليكن  $T: R \rightarrow R$  تحويلاً خطياً . برهن على وجود عدد  $t$  يعتمد على

$$T$$
 بحيث  $T(x) = tx$  لجميع قيم  $x \in R$  .

(ب) اذا كان  $T: R \rightarrow R$  تحويلاً خطياً بحيث  $T(5) = -2$  فاحسب

$$T(-\sqrt{3})$$

## (2.2) الرتبة والصفرية (Rank and Nullity)

تعريف :

لأي تحويل خطي  $T: V \rightarrow W$  بين فضاءي متجهات ، يمكن تعريف

مايلي :

1 — صورة  $T$  (Image of  $T$ ) ويرمز لها بالرمز  $ImT$  وتعرف كالآتي :

$$Im(T) = \{ B \in W : B = T(A), A \in V \}$$

2 — نواة  $T$  (kernel of  $T$ ) ويرمز لها بالرمز  $KerT$  وتعرف كالآتي :

$$KerT = \{ A \in V : T(A) = 0 \}$$

لاحظ أن  $KerT \subset V$  و  $ImT \subset W$  .

مثال (1) :

إذا كان  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة :

$$T(x,y,z) = (x+2y, 0, 3z)$$

فجدد المجموعات الجزئية  $\text{Im}T$  ,  $\text{Ker}T$

الحل : لأيجاد  $\text{Ker}T$  ، نحاول حل المعادلة  $T(x,y,z) = (0,0,0)$  التي بدورها تعطي ثلاث معادلات

$$x + 2y = 0$$

$$0 = 0$$

$$3z = 0$$

عندئذ يكون :  $x = -2y$  و  $z = 0$  حلاً لتلك المعادلات . بهذا يمكن وصف  $\text{Ker}T$  كالآتي :

$$\text{Ker}T = \{(x,y,z): x = -2y \text{ و } y = y, z = 0\}$$

أما بالنسبة إلى  $\text{Im}T$  فإننا نبحث عن جميع المتجهات  $B = (a,b,c) \in \mathbb{R}^3$  التي تحقق :  $T(x,y,z) = B$  ، أي ان

$$x + 2y = a$$

$$0 = b$$

$$3z = c$$

نلاحظ هنا بأن  $b = 0$  ، أما بالنسبة إلى  $a, c$  فلا يوجد شرط يحدد قيمهما ولا توجد علاقة تربطهما ، وبالتالي يمكن وصف  $\text{Im}T$  كالآتي :

$$\text{Im}T = \{(a,b,c): a = a, b = 0, c = c\}$$

وبهذا نلاحظ ان  $T(a,0,c/3) = (a,0,c)$  ، أي انه لأي متجه

$(a,0,c) \in \text{Im}T$  يوجد  $(a,0,c/3) \in \mathbb{R}^3$  يحقق  $T(a,0,c/3) = (a,0,c)$  .

مبرهنة (2.2.1) :

لأي تحويل خطي  $T: V \rightarrow W$  . يكون لدينا

- 1 \_ KerT فضاء جزئي من V .  
2 \_ ImT فضاء جزئي من W .

البرهان :

1 \_ لبرهنة ان KerT هو فضاء جزئي، يجب ان نبرهن انه مغلق بالنسبة للجمع والضرب في اعداد قياسية . نأخذ  $A_1, A_2$  متجهين في KerT و r اي عدد قياسي . فيكون

$$T(A_1 + A_2) = T(A_1) + T(A_2) \\ = 0 + 0 = 0$$

اذن  $A + B \in \text{KerT}$  ايضاً .

$$T(rA_1) = rT(A_1) = r \cdot 0 = 0$$

اي ان  $rA_1$  في KerT .

2 \_ نأخذ الان  $B_1, B_2$  في ImT و r اي عدد قياسي . لبرهنة ان ImT هو فضاء جزئي من W ، يجب البرهنة على ان  $B_1 + B_2$  في ImT و  $rB_1$  في ImT ، اي اننا يجب ان نجد متجهين A , C في V يحققان  $T(C) = rB_1$  و  $T(A) = B_1 + B_2$  .

حيث ان  $B_1, B_2$  في ImT فيوجد متجهان  $A_1, A_2$  في V بحيث يكون  $T(A_2) = B_2$  ,  $T(A_1) = B_1$  . نعتبر الان  $A = A_1 + A_2$  و  $C = rA_1$  فيكون

$$T(A) = T(A_1 + A_2) = T(A_1) + T(A_2) = B_1 + B_2$$

وايضاً

$$T(C) = T(rA_1) = rT(A_1) = rB_1$$

اي ان  $rB_1 \in \text{ImT}$  .

هذا يعني ان كل من KerT , ImT يكون فضاءً جزئياً .

( و . ه . م )

على ضوء المبرهنة اعلاه نقدم التعريف الآتي :

تعريف :

بصفية T (Nullity of T) نقصد بُعد الفضاء الجزئي KerT اي  $\dim(\text{Ker}T)$  ،  
ورتبة T (Rank of T) نقصد بُعد الفضاء الجزئي ImT ، اي  $\dim(\text{Im}T)$  .

مثال (2) :

جد صفية ورتبة التحويل الخطي T المعرف في المثال (8) .

الحل : من المثال (8) نلاحظ ان

$$\text{Ker}T = \{(x,y,z) : x = -2y, y = y, z = 0\}$$

$$\text{Im}T = \{(a,b,c) : a = a, b = 0, c = c\}$$

عندئذ تكون المجموعة  $S = \{(-2,1,0)\}$  قاعدة الى KerT ، والمجموعة  $H = \{(1,0,0), (0,0,1)\}$  قاعدة الى ImT ، وبالتالي يكون :

$$\dim(\text{Ker}T) = 1, \dim(\text{Im}T) = 2$$

اي ان صفية T = 1 ، رتبة T = 2 .

المبرهنة ادناه تعتبر من المبرهنات المهمة في موضوع الجبر الخطي وهي تربط بعد مجال التحويل الخطي بأبعاد نواته وصورته .

مبرهنة (2.2.2) :

اذا كان  $T:V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً فإن رتبة T + صفية T = بعد V .

$$\dim V = \dim(\text{Ker}T) + \dim(\text{Im}T)$$

البرهان :

لنفرض ان  $\dim(\text{Ker}T) = k, \dim V = n$  . بما ان KerT فضاءً جزئياً من V ، فعليه يكون  $k \leq n$  . نأخذ قاعدة  $\{A_1, \dots, A_k\}$  الى KerT وحسب

مبرهنة (1.8.5) فإنه توجد متجهات  $A_{k+1}, \dots, A_n$  بحيث ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_k, A_{k+1}, \dots, A_n\}$  تكون قاعدة الى  $V$ . لننظر الى المجموعة  $\{B_1 = T(A_{k+1}), \dots, B_{n-k} = T(A_n)\}$  المتكونة من  $n-k$  من المتجهات في  $W$ . هذه المجموعة تكون مجموعة مولدة الى الفضاء الجزئي  $\text{Im}T$  وذلك لانه لو اخذنا  $B \in \text{Im}T$ ، لوجد متجه  $A \in V$  بحيث  $T(A) = B$ . بما ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_k, A_{k+1}, \dots, A_n\}$  قاعدة الى  $V$  والمتجه  $A \in V$  فعليه يمكن كتابة  $A$  كتركيب خطي بالصيغة:

$$A = x_1 A_1 + \dots + x_k A_k + x_{k+1} A_{k+1} + \dots + x_n A_n$$

عندئذ يكون:

$$\begin{aligned} B = T(A) &= x_1 T(A_1) + \dots + x_k T(A_k) + x_{k+1} T(A_{k+1}) + \dots + x_n T(A_n) \\ &= x_1 \cdot 0 + \dots + x_k \cdot 0 + x_{k+1} B_1 + \dots + x_n B_{n-k} \\ &= x_{k+1} B_1 + \dots + x_n B_{n-k} \end{aligned}$$

وهذا يعني انه بالامكان كتابة اي متجه  $B \in \text{Im}T$  كتركيب خطي من المتجهات  $B_1, \dots, B_{n-k}$ ، اي بمعنى ان المجموعة  $\{B_1, \dots, B_{n-k}\}$  تكون مجموعة مولدة الى  $\text{Im}T$ . بالاضافة الى ماتقدم فإن المجموعة  $\{B_1, \dots, B_{n-k}\}$  يجب ان تكون مجموعة مستقلة خطياً. ولرؤية ذلك نأخذ تركيباً خطياً مساوياً للصفر لمتجهات تلك المجموعة مثل:

$$y_1 B_1 + \dots + y_{n-k} B_{n-k} = 0$$

وعند التعويض نحصل على

$$y_1 T(A_{k+1}) + \dots + y_{n-k} T(A_n) = 0$$

اي ان

$$T(y_1 A_{k+1} + \dots + y_{n-k} A_n) = 0$$

وهذا يعني ان المتجه  $y_1 A_{k+1} + \dots + y_{n-k} A_n \in \text{Ker}T$  وبالتالي يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات  $A_1, \dots, A_k$  التي تكون قاعدة الى  $\text{Ker}T$  اي ان:

$$y_1 A_{k+1} + \dots + y_{n-k} A_n = x_1 A_1 + \dots + x_k A_k$$

المعادلة اعلاه يمكن ان تكتب بالصيغة

$$x_1 A_1 + \dots + x_k A_k - y_1 A_{k+1} - \dots - y_{n-k} A_n = 0$$

وهذا تركيباً خطياً مساوياً للصفر لمجموعة متجهات مستقلة خطياً، وعليه فإن

$$x_1 = 0, \dots, x_k = 0, y_1 = 0, \dots, y_{n-k} = 0$$

وعليه تكون المجموعة  $\{B_1, \dots, B_{n-k}\}$  مستقلة خطياً، وبما انها مولدة الى  $\text{Im}T$  فتكون قاعدة له. وبما ان عدد المتجهات في تلك القاعدة يساوي  $n-k$  نستنتج على ان

$$\dim(\text{Im}T) = n-k$$

وهذا يكمل البرهان .

( و . ه . م )

مثال (3):

جد رتبة و صفرية التحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  المعرف بالصيغة

$$T(x, y, z) = (y, z)$$

الحل: التحويل اعلاه يكون دالة شاملة وعليه فإن  $\text{Im}T = \mathbb{R}^2$  اذن رتبة  $T = 2$  وتطبيق المبرهنة (2.2.2) نحصل على

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker}T) &= 3 - \dim(\text{Im}T) \\ &= 3 - 2 = 1 \end{aligned}$$

مثال (4):

برهن على ان اي تحويل شامل  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  يجب ان يكون متبايناً .

البرهان:

بما ان  $T$  شامل . اذن  $\text{Im}T = \mathbb{R}^n$  وعليه تكون رتبة  $T$  مساوية الى  $n$ . بتطبيق مبرهنة (2.2.2) نحصل على ان

$$\dim(\text{Ker}T) = n - n = 0$$

هذا يعني ان  $\text{Ker}T = \{0\}$  . الان لو كان  $T(A) = T(B)$  فإن :

$$T(A - B) = 0$$

وهذا يعني ان  $A - B \in \text{Ker}T$  . اي ان  $A - B = 0$  وبالتالي فإن  $A = B$  إذن  $T$  متباين .

جزء من فكرة المثال اعلاه عبارة عن نتيجة هامة لا بد من تدوينها .

مبرهنة (2.2.3) :

اذا كان  $T:V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً فإن :

( أ )  $T$  متباين اذا فقط اذا  $\text{Ker}T = \{0\}$  .

( ب )  $T$  شامل اذا فقط اذا  $\text{Im}T = W$  .

( و . ه . م )

البرهان :

( أ ) مبرهن في مثال (4) و ( ب ) نتيجة مباشرة للتعريف .

مثال (5) :

جد تحويلاً خطياً  $T:R^3 \rightarrow R^2$  بحيث ان المجموعة  $A_1 = (1, -1, 0)$  ،  $A_2 = (2, 0, 1)$  تكون قاعدة لنواته .

الحل : التحويل المطلوب يجب ان يحقق :

$$T(A_1) = T(1, -1, 0) = (0, 0)$$

$$T(A_2) = T(2, 0, 1) = (0, 0)$$

المبرهنة (2.1.2) تضمن لنا ايجاد التحويل بعد معرفتنا لقيمه على عناصر اي قاعدة كانت . لناخذ المتجه  $A_3 = (0, 0, 1)$  ونلاحظ ان المجموعة

$$\{A_1 = (1, -1, 0), A_2 = (2, 0, 1), A_3 = (0, 0, 1)\}$$

تكون قاعدة إلى  $R^3$ . لترسل المنتج  $A_3$  بواسطة  $T$  إلى أي منتج غير صفري في  $R^2$  وليكن

$$T(A_3) = T(0, 0, 1) = (1, -1)$$

( عند وضع  $T(A_3) = (0, 0)$  فإن  $A_3$  سوف ينتمي إلى  $\text{Ker}T$  وبذلك يكون  $\text{Ker}T = R^3$  والتحويل  $T$  لن يكون التحويل المطلوب ).

الآن إذا كان

$$(x, y, z) = aA_1 + bA_2 + cA_3$$

فإن

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= aT(A_1) + bT(A_2) + cT(A_3) \\ &= a(0, 0) + b(0, 0) + c(1, -1) \\ &= c(1, -1) \end{aligned}$$

اذن المطلوب إيجاد  $c$ . المعادلة

$$(x, y, z) = aA_1 + bA_2 + cA_3$$

تؤدي إلى

$$(x, y, z) = (a + 2b, -a, b + c)$$

اذن

$$a + 2b = x$$

$$-a = y$$

$$b + c = z$$

حل هذه المعادلات يؤدي إلى

$$a = -y, b = (1/2)(x + y), c = z - (1/2)(x + y)$$

اذن

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= c(1, -1) \\ &= (z - (1/2)x - (1/2)y, (1/2)x + (1/2)y - z) \end{aligned}$$



والآن الطالب مدعو لتحقيق ان نواة T لها القاعدة المعطاة .

مثال (6) :

جد تحويلاً خطياً  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  بحيث ان المجموعة  $\{B_1 = (1,1,0), B_2 = (-2,1,3), B_3 = (0,0,0)\}$  تكون قاعدة لصورته .

الحل : لو راجعنا اثبات المبرهنة (2.2.2) مع ماتنص عليه المبرهنة (2.1.2) لوجدنا ان الحل يكمن باختيار قاعدة الى  $\mathbb{R}^3$  وارسال متجهين منها بواسطة T الى المتجهين المعطيين  $B_1, B_2$  وارسال الثالث الى متجه يعتمد خطياً على  $B_1, B_2$  وليكن المتجه الصفري  $B_3 = (0,0,0)$  .

لنأخذ

$$S = \{A_1 = (1,0,0), A_2 = (0,1,0), A_3 = (0,0,1)\}$$

القاعدة الطبيعية الى  $\mathbb{R}^3$  . وليكن T التحويل الخطي الذي يحقق

$$T(A_1) = T(1,0,0) = B_1 = (1,1,0)$$

$$T(A_2) = T(0,1,0) = B_2 = (-2,1,3)$$

$$T(A_3) = T(0,0,1) = B_3 = (0,0,0)$$

ليكن  $A = (x,y,z)$  اي متجه في  $\mathbb{R}^3$  . اذن

$$A = (x,y,z) = xA_1 + yA_2 + zA_3$$

اذن

$$T(A) = xB_1 + yB_2 + zB_3$$

( راجع إثبات المبرهنة (2.1.2) . بالتعويض نحصل على )

$$T(A) = x(1,1,0) + y(-2,1,3) + z(0,0,0)$$

$$= (x-2y, x+y, 3y)$$

اذن

$$T(x,y,z) = (x-2y, x+y, 3y)$$

## تمارين (2.2)

- 1 — جد قاعدة الـ  $\text{Ker}T$  و قاعدة الـ  $\text{Im}T$  في كل مما يلي :
  - ( أ )  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  و  $T(x,y,z) = (2x, y+z)$
  - ( ب )  $T: P_1(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$  و  $T(a_0 + a_1x) = 2a_0 - ia_1$
  - ( ج )  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  و  $T(x,y) = (x, 2x, 3x)$
  - ( د )  $T: M(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$  ،  $T \left[ \begin{array}{cc} x & y \\ z & w \end{array} \right] = (x-w, y+2z)$
- 2 — جد صفرية ورتبة جميع التحويلات في تمرين (1).
- 3 — اذا كان  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ،  $S$  ، تحويلين خطيين معرفين بالصيغة  $T(x,y,z) = (x,y)$  و  $S(x,y,z) = (x, 2x)$  فجد رتبة و صفرية كل من التحويلات التالية :
  - .  $T, S, 2T + S, T-5S$
- 4 — اذا كان  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى الحقل  $F$  وكان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً متبايناً فبرهن على ان  $T$  يجب ان يكون شاملاً . ( ارشاد : استخدم المبرهنتين (2.2.2) ، (2.2.3) ).
- 5 — اذا كان  $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$  تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة  $T(p(x)) = P'(x)$  فجد رتبة و صفرية  $T$ .
- 6 — جد رتبة و صفرية التحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  الذي يحقق  $T(1,-2) = (-\sqrt{3}, -\sqrt{2})$  ،  $T(1,1) = (\sqrt{2}, \sqrt{3})$
- 7 — ليكن  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً وليكن  $B \in W$  و  $A_0 \in V$  متجهاً يحقق  $T(A_0) = B$  . برهن على ان اي حل للمعادلة  $T(X) = B$  يجب ان يكون بالصيغة  $X = A_0 + C$  ما  $C \in \text{Ker}T$ .
- 8 — ليكن  $M_n(\mathbb{R})$  فضاء المصفوفات  $n \times n$  على حقل الاعداد الحقيقية  $\mathbb{R}$  . لتكن  $T: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$  دالة معرفة بالصيغة

$$T(A) = (A - A^T)/2$$

حيث  $A^T$  تساوي مدورة المصفوفة  $A$  (transpose)

(أ) برهن على ان  $T$  تكون تحويلاً خطياً .

(ب) صف  $\text{Ker} T$  وجد بعده .

9 — اذا كانت  $S: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$  دالة معرفة بالصيغة

$$S(A) = (A + A^T)/2$$

فبرهن على ان  $S$  تكون تحويلاً خطياً ثم برهن على ان

$$\text{Im} S = \text{Ker} T$$

حيث  $T$  هو التحويل الخطي المعرف في تمرين (8) .

$$10 — \text{ لتكن } M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ وليكن } T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$$

$$T(A) = AM - MA \text{ تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة :}$$

جد قاعدة الى نواة  $T$  ( $\text{Ker} T$ ) .

11 — جد تحويلاً خطياً  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  بحيث ان صورة  $T$  ( $\text{Im} T$ ) تتولد من قبل

$$\text{المتجهين } B_1 = (1, 0, 2, -3), B_2 = (-1, 1, 0, 0)$$

12 — جد تحويلاً خطياً  $T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$  بحيث ان المجموعة

$$S = \left\{ A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

تكون قاعدة لنواته .

13 — اعتبر  $\mathbb{C}^2$  فضاء متجهات على الحقل  $\mathbb{R}$  ثم جد تحويلاً خطياً

$$S = \{A_1 = (i, 1), A_2 = (0, -i)\}$$

المجموعة  $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow P_2(\mathbb{R})$  بحيث ان المجموعة

$$H = \{B_1 = 1 + x, B_2 = -2x^2\}$$

تكون قاعدة لنواته والمجموعة

قاعدة لصورته .

### (2.3) التحويلات النظرية Inverse transformations

سندرس في هذا البند تركيب التحويلات الخطية والتي سنعتمد عليها في

تعريف التحويلات النظرية . ستؤدي هذه الدراسة الى معرفة خصائص اضافية

للتحويلات الخطية وكذلك تؤدي الى تصنيف فضاءات المتجهات .

تعريف :

اذا كان كل من  $W, V, U$  فضاء متجهات على الحقل  $F$ ، واذا كان كل من  $T: V \rightarrow W, S: U \rightarrow V$  تحويلاً خطياً . فإنه بالامكان تعريف دالة :

$$\text{ToS}(A) = T(S(A)) \quad : \quad \text{الصيغة } T \circ S: U \rightarrow W$$

هذه الدالة تسمى تركيب الدالتين  $T, S$  (Composition of  $S, T$ ) .

مثال (1) :

جد تركيب الدالتين  $T: R^3 \rightarrow R, S: R^2 \rightarrow R^3$  المعرفتين بالصيغتين  
 $T(x, y, z) = x - y + z, S(x, y) = (2x, y, 0)$

الحل : التركيب  $\text{ToS}$  يكون دالة من  $R^2$  الى  $R$  معرفة بالصيغة

$$\begin{aligned} \text{ToS}(x, y) &= T(S(x, y)) \\ &= T(2x, y, 0) \\ &= (2x) - (y) + (0) \\ &= 2x - y \end{aligned}$$

ملاحظة :

في المثال اعلاه، التركيب  $\text{SoT}$  لا يكون معرفاً وذلك لان المجال المقابل للدالة  $T$  لا يساوي مجال الدالة  $S$  .

مبرهنة (2.3.1) :

لاي تحويلين خطيين  $T: V \rightarrow W, S: U \rightarrow V$  يكون التركيب  $\text{ToS}: U \rightarrow W$  ايضاً تحويلاً خطياً .

البرهان :

لنأخذ  $A_1, A_2$  اي متجهين في  $r, U$  اي عدد قياسي ، فيكون لدينا :

$$\begin{aligned} \text{ToS}(A_1 + A_2) &= T(S(A_1 + A_2)) \\ &= T(S(A_1) + S(A_2)) \\ &= T(S(A_1)) + T(S(A_2)) \\ &= \text{ToS}(A_1) + \text{ToS}(A_2) \end{aligned}$$

كذلك يكون لدينا

$$\begin{aligned} \text{ToS}(rA_1) &= T(S(rA_1)) = T(rS(A_1)) \\ &= rT(S(A_1)) = r \text{ToS}(A_1) \end{aligned}$$

بذلك تكون الدالة  $\text{ToS}$  تحويلاً خطياً .

( و . ه . م )

لقد ذكرنا في مثال (4) من البند (2.1) ان الدالة المحايدة على فضاء متجهات تكون تحويلاً خطياً على ذلك الفضاء . سوف نرسم لتلك الدالة برمز خاص في التعريف التالي :

تعريف :

لاي فضاء متجهات  $V$  على حقل  $F$  . التحويل  $I_V: V \rightarrow V$  المعروف بالصيغة :  $I_V(A) = A$  ، لجميع المتجهات  $A \in V$  ، يسمى بالتحويل المحايد على  $V$  . (Identity transformation on  $V$ ) .

تعريف :

اذا كان كل من  $T: V \rightarrow W$  ،  $S: W \rightarrow V$  تحويلاً خطياً فنعرف النظر الايمن واليسر كما يأتي :

(أ) اذا كان  $SoT = I_V$  فإن  $S$  يسمى نظير ايسر الى  $T$  .  
(left inverse)

(ب) اذا كان  $ToS = 1_w$  فإن  $S$  يسمى نظير ايمن الى  $T$ .  
(right inverse)

ملاحظة :

اذا كان  $S$  نظيراً يسارياً الى  $T$  فإن  $T$  يكون نظيراً يمينياً الى  $S$  كذلك فإنه اذا كان  $S$  نظيراً يمينياً الى  $T$  فإن  $T$  يكون نظيراً يسارياً الى  $S$ .

مثال (2) :

اذا كان  $T: R^2 \rightarrow R^3$  التحويل الخطي المعرف بالصيغة :

$$T(x,y) = (x, x+2y, x-y)$$

فبرهن على ان التحويل الخطي  $S: R^3 \rightarrow R^2$  المعرف بالصيغة :

$$S(x,y,z) = (x, y-2x+z)$$

يكون نظيراً يسارياً الى  $T$ ، لكن لا يكون نظيراً يمينياً.

الحل : المطلوب برهانه هو ان  $SoT = 1_{R^2}$ ، اي ان  $SoT(x,y) = (x,y)$ .

$$\begin{aligned} SoT(x,y) &= S(T(x,y)) = S(x, x+2y, x-y) \\ &= (x, (x+2y) - 2(x) + (x-y)) \\ &= (x, y) \end{aligned}$$

الان :  $ToS: R^3 \rightarrow R^3$  يكون معرفاً بالصيغة .

$$\begin{aligned} ToS(x,y,z) &= T(S(x,y,z)) = T(x, y-2x+z) \\ &= (x, x+2(y-2x+z), x-(y-2x+z)) \\ &= (x, -3x+2y+2z, 3x-y-z) \end{aligned}$$

من هنا نلاحظ ان  $ToS(x,y,z) \neq (x,y,z)$ ، اي ان  $ToS \neq 1_{R^3}$  وبذلك لا يمكن لـ  $S$  ان يكون نظيراً يمينياً.

تعريف :

إذا كان كل من  $S:W \rightarrow V$  ،  $T:V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً فإن  $S$  يسمى نظيراً الى  $T$  (Inverse) إذا فقط اذا كان  $S$  نظيراً يمينياً ويسارياً الى  $T$ .

ملاحظة :

إذا كان  $S$  نظيراً الى  $T$  فإن  $T$  يكون نظيراً الى  $S$ .

مثال (3) :

إذا كان  $T:M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^4$  التحويل الخطي المعرف بالصيغة :

$$T \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = (-b, a, (1/5)c, (1/2)d)$$

فبرهن على ان التحويل الخطي  $S:\mathbb{R}^4 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$  المعرف بالصيغة :

$$S(x,y,z,w) = \begin{bmatrix} y & -x \\ 5z & 2w \end{bmatrix}$$

يكون نظيراً الى  $T$ .

الحل : يجب ان نبرهن على ان  $S$  يكون نظيراً يسارياً ويمينياً الى  $T$ . هذا يعني انه يجب

البرهنة على ان  $ToS = I_{\mathbb{R}^4}$  ،  $SoT = I_{M_2(\mathbb{R})}$

$$\begin{aligned} SoT \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &= S \left( T \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) \\ &= S(-b, a, (1/5)c, (1/2)d) \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} a & -b \\ 5(1/5)c & 2(1/2)d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

اذن  $SoT = I_{M_2(R)}$  . الان نبرهن ان  $SoT = I_{R^4}$  .

$$SoT(x,y,z,w) = S(T(x,y,z,w))$$

$$= S \begin{bmatrix} y & -x \\ 5z & 2w \end{bmatrix}$$

$$\equiv (-(-x), y, (1/5)(5z), (1/2)(2w))$$

$$\equiv (x, y, z, w)$$

مبرهنة (2.3.1):

ليكن  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً. اذا امتلك  $T$  نظيراً يسارياً ونظيراً يمينياً فيجب عليهما التساوي. اي انه اذا وجد تحويلين  $S, S'; W \rightarrow V$  بحيث  $SoT = I_W$  و  $ToS' = I_V$  فان  $S = S'$ .

البرهان:

$$S = So I_W = So(ToS') \\ = (SoT)oS' = I_VoS' = S'$$

( و . هـ . م )

تعريف:

يسمى تحويل خطي  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً غير معتاداً (non - Singular) و تشاكل (Isomorphism) اذا وميض اذا وجد تحويلاً خطياً  $S: W \rightarrow V$  تحقق  $SoT = I_W$  و  $ToS = I_V$ . عندئذ نكتب  $S = T^{-1}$  ونسميه نظير  $T$ .

البرهنة (2.3.1) تضمن وجود نظير واحد فقط ان وجد.



تعريف :

إذا وجد تشاكل  $T:V \rightarrow W$  بين الفضاءين  $V, W$  فنقول بأن الفضاء  $V$  يشاكل الفضاء  $W$  . (  $V$  is isomorphic to  $W$  ) .

قبل اعطاء امثلة على مفهوم التشاكل ، سوف نذكر بعض المبرهنات التي تفيدنا في انشاء التشاكلات ، وفي تحقيق بعض ماسنديه في الامثلة .

مبرهنة (2.3.2) :

ليكن  $T:V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً . اذا وجدت دالة  $S:W \rightarrow V$  تحقق :  $SoT = 1_V$  و  $ToS = 1_W$  ، فيجب على  $S$  ان تكون تحويلاً خطياً .

البرهان :

لنأخذ  $B_1, B_2$  اي متجهين في  $W$  ،  $r$  اي عدد قياسي ، المطلوب برهانه

ان :

$$S(B_1 + B_2) = S(B_1) + S(B_2)$$

$$S(rB_1) = rS(B_1)$$

ضع :  $S(B_2) = A_2, S(B_1) = A_1$  ، ثم لاحظ

$$B_1 = 1_W(B_1) = ToS(B_1) = T(S(B_1)) = T(A_1)$$

وبالطريقة نفسها نحصل على  $B_2 = T(A_2)$  . وذلك لان  $ToS = 1_W$  بالفرض .  
العلاقات :  $SoT = 1_V, B_2 = T(A_2), B_1 = T(A_1)$  تنتج مايلي :

$$S(B_1 + B_2) = S(T(A_1) + T(A_2))$$

$$= S(T(A_1 + A_2))$$

$$= SoT(A_1 + A_2)$$

$$= 1_V(A_1 + A_2) = A_1 + A_2$$

$$= S(B_1) + S(B_2)$$

$$S(rB_1) = S(rT(A_1)) = S(T(rA_1)) = SoT(rA_1)$$

$$= 1_V(rA_1) = rA_1 = rS(B_1)$$

بذلك تكون الدالة S تحويلاً خطياً.

(و. ه. م)

المبرهنة التالية تفيدنا في المسائل العملية وتدلنا على الطريقة لايجاد النظير الايمن والنظير الايسر للتحويل الخطي بين الفضاءات المنتهية البعد.

مبرهنة (2.3.3):

إذا كان  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً بين الفضاءين المنتهين البعد  $V$  و  $W$

فإن:

- (أ) يوجد الى  $T$  نظير ايمن اذا فقط اذا كان  $T$  شاملاً.  
 (ب) يوجد الى  $T$  نظير ايسر اذا فقط اذا كان  $T$  متبايناً.

البرهان:

(أ) لنفرض ان  $V \rightarrow W$  نظير ايمن الى  $T$ . عندئذ يكون لدينا  $ToS = 1_W$ . يجب ان نبرهن على ان  $T$  يكون تحويلاً شاملاً. لهذا الغرض نأخذ  $B \in W$  اي متجه ونضع  $A = S(B)$  ونلاحظ ان:

$$T(A) = T(S(B)) = ToS(B) = 1_W(B) = B$$

اذن يكون  $T$  تحويلاً شاملاً. على العكس لنفرض ان  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً شاملاً. يجب علينا ايجاد تحويل خطي  $V \rightarrow W$  يحقق  $ToS = 1_W$ .

ليكن  $\dim(V) = m, \dim W = n$ . بما ان  $T$  تحويل شامل، اذن:

$$\dim(\text{Im}T) = \dim W = n \quad \text{المبرهنة (2.2.2) تنتج ان:}$$

$$\dim(\text{Ker}T) = \dim(V) - \dim(\text{Im}T) = m - n$$

وعليه نأخذ قاعدة الى  $\text{Ker}T$  ولتكن  $\{A_1, \dots, A_{m-n}\}$  ونوسعها الى قاعدة ,  $\{A_1, \dots, A_{m-n}, B_1, \dots, B_n\}$  الى  $V$ .

ضع:  $C_1 = T(B_1), \dots, C_n = T(B_n)$  ولاحظ ان  $\{C_1, \dots, C_n\}$  تكون قاعدة الى  $W = \text{Im}T$  (راجع اثبات المبرهنة (2.2.2)). نعرف الآن التحويل الخطي

$S: W_1 \rightarrow V$  على عناصر القاعدة ومن ثم نعرف قيمته على اي متجه في  $W$  كما في

مبرهنة (2.1.2).

$$S(C_1) = B_1, \dots, S(C_n) = B_n$$

$$B = y_1 C_1 + \dots + y_n C_n$$

ولأي متجه  $B \in W$  نكتب

$$S(B) = y_1 B_1 + \dots + y_n B_n$$

ويكون:

والآن نبرهن على ان التحويل  $S$  اعلاه يكون نظيراً يمينياً الى  $T$ . لأي متجه  $B = y_1 C_1 + \dots + y_n C_n$  في  $W$ ، يكون لدينا:

$$\begin{aligned} T \circ S(B) &= T(S(B)) = T(y_1 B_1 + \dots + y_n B_n) \\ &= y_1 T(B_1) + \dots + y_n T(B_n) \\ &= y_1 C_1 + \dots + y_n C_n \\ &= B \end{aligned}$$

هذا يكمل برهان (أ).

(ب) لنفرض ان  $S: W \rightarrow V$  نظير ايسر الى  $T$ .

عندئذ يكون:  $1_V \circ S = T$ . يجب البرهنة على ان  $T$  يكون متبايناً.

لنفرض ان  $T(A_1) = T(A_2)$ . بتطبيق  $S$  على الطرفين نحصل على:

$$S(T(A_1)) = S(T(A_2))$$

$$S \circ T(A_1) = S \circ T(A_2)$$

$$1_V(A_1) = 1_V(A_2)$$

$$A_1 = A_2$$

لنفرض الان ان  $T$  تحويلاً متبايناً. ولنفرض ان  $\dim(V) = m$ ,  $\dim(W) = n$ .

بتطبيق المبرهنة (2.2.3) نحصل على ان  $\text{Ker } T = \{O\}$  وعليه فإن المبرهنة (2.2.2)

تنتج:

$$\dim(\text{Im } T) = \dim(V) - \dim(\text{Ker } T) = m - 0 = m$$

نختار قاعدة  $\{A_1, \dots, A_m\}$  الى  $V$  ثم نضع:

$$B_1 = T(A_1), \dots, B_m = T(A_m)$$

مجموعة المتجهات  $\{B_1, \dots, B_m\}$  تكون مجموعة مستقلة خطياً وذلك لانه اذا اخذنا

$$y_1 B_1 + \dots + y_m B_m = O$$

فالتعويض نحصل على:

$$y_1 T(A_1) + \dots + y_m T(A_m) = O$$

$$T(y_1 A_1 + \dots + y_m A_m) = O$$

هذا يعني ان  $y_1 A_1 + \dots + y_m A_m \in \text{Ker } T$ ، لكن  $T$  متباين وهذا يعني ان  $\text{Ker } T = \{O\}$  كما ذكرنا سابقاً. أذن

$$y_1 A_1 + \dots + y_m A_m = O$$

لكن  $\{A_1, \dots, A_m\}$  مجموعة مستقلة خطياً من المتجهات وذلك لكونها قاعدة الى  $V$ . اذن  $y_1 = y_2 = \dots = y_m = 0$ . الان  $\{B_1, \dots, B_m\}$  مجموعة مستقلة خطياً من المتجهات في  $W$ . نوسعها الى قاعدة  $\{B_1, \dots, B_m, C_1, \dots, C_{n-m}\}$  الى  $W$

نعرف الان التحويل الخطي  $S: W \rightarrow V$  على عناصر القاعدة اعلاه وذلك

$$S(B_1) = A_1, \dots, S(B_m) = A_m \quad \text{بأخذ .}$$

$$S(C_1) = O \quad \dots, \quad S(C_{n-m}) = O$$

ولمعرفة قيمة  $S$  على اي متجه  $B \in W$ ، نكتب:

$$B = x_1 B_1 + \dots + x_m B_m + y_1 C_1 + \dots + y_{n-m} C_{n-m}$$

وكما في مبرهنة (2.1.2) يكون

$$\begin{aligned} S(B) &= x_1 A_1 + \dots + x_m A_m + y_1 O + \dots + y_{n-m} O \\ &= x_1 A_1 + \dots + x_m A_m \end{aligned}$$

الان نبرهن على ان  $S$  يكون نظيراً يسارياً الى  $T$ . اي ان  $SoT = 1_V$ .

لنأخذ  $A = r_1 A_1 + \dots + r_m A_m$  اي متجه في  $V$ . بأستخدام تعريف  $S$  اعلاه نحصل على:

$$\begin{aligned} SoT(A) &= S(T(A)) = S(r_1 T(A_1) + \dots + r_m T(A_m)) \\ &= S(r_1 B_1 + \dots + r_m B_m) \\ &= r_1 A_1 + \dots + r_m A_m = A \end{aligned}$$

هذا يكمل برهان (ب).

(و. ه. م)

نتيجة (2.3.4):

إذا كان  $T:V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً بين فضاءين منتهيين البعد فإن  $T$  يكون تحويلاً غير معتل (تساكل) إذا وفقط إذا كان  $T$  متبايناً ( $\text{Ker}T = \{0\}$ ) وشاملاً ( $\text{Im}T = W$ ).

البرهان:

افرض ان  $T$  تحويل غير معتل. عندئذ يوجد تحويل خطي  $S:W \rightarrow V$  يحقق  $S \circ T = 1_V$  و  $T \circ S = 1_W$ . العلاقة الأولى تنص على ان  $S$  نظير ايسر وبالتالي فإن  $T$  يكون متبايناً حسب المبرهنة (2.3.3) والعلاقة الثانية تنص على ان  $S$  نظير ايمن الى  $T$  وبالتالي فإن  $T$  يكون شاملاً.

على العكس اذا كان  $T$  متبايناً وشاملاً فإن المبرهنة (2.3.3) تنص على وجود نظير ايسر وآخر ايمن الى  $T$  وبالتالي وحسب المبرهنة (2.3.1) نستنتج على تساوي النظيرين وبالتالي يكون  $T$  تحويلاً غير معتل.

( و . ه . م )

المبرهنة (2.3.3) تفيد بمعرفة وجود التحويلات النظرية وكذلك فإنها تعطي الطريقة العملية لايجادها. سوف نذكر الان عدة امثلة على الافكار التي طرحناها في هذا البند.

مثال (4):

برهن على وجود نظير ايمن للتحويل الخطي  $T:R^3 \rightarrow R^2$  المعروف بالصيغة:

$$T(x,y,z) = (x+y, 2x-z)$$

ثم جد واحداً.

الحل: اذا كان  $T$  شاملاً فسوف يوجد له نظير ايمن وذلك حسب مبرهنة (2.3.3). نلاحظ اولاً.

$$T(x,y,z) = x(1,2) + y(1,0) + z(0,-1)$$

وهذا يعني ان  $\text{Im}T$  يولد من قبل مجموعة المتجهات  $\{(1,2), (1,0), (0,-1)\}$  وبما

أن هذه المجموعة تحتوي على المجموعة المستقلة خطياً  $\{(1,0), (0,-1)\}$  فإن  $\dim(\text{Im}T) = 2$  وبذلك يكون  $T$  تحويلاً شاملاً.

لايجاد نظير ايمن تتبع الخطوات التي وردت في برهان مبرهنة (2.3.3) (أ)

أولاً: نجد قاعدة الى  $\text{Ker}T$ . لهذا الغرض ضع

$$T(x,y,z) = (x+y, 2x-z) = (0,0)$$

$$x+y=0 \quad \text{فحصل على المعادلتين:}$$

$$2x-z=0$$

والحل سيكون:  $x=x, y=-x, z=2x$  وبأخذ  $x=1$  نحصل على المتجه  $A_1 = (1,-1,2)$  الذي يكون قاعدة الى  $\text{Ker}T$ . نوسع هذه القاعدة الى قاعدة الى  $R^3$  فمثلاً المجموعة  $\{A_1 = (1,-1,2), B_1 = (1,0,0), B_2 = (0,1,0)\}$  ستكون قاعدة الى  $R^3$ .

$$C_1 = T(B_1) = T(1,0,0) = (1,2) \quad \text{ثانياً نضع:}$$

$$C_2 = T(B_2) = T(0,1,0) = (1,0)$$

والآن نحاول كتابة المتجه العام  $(x,y) \in R^2$  كتركيب خطي من متجهات القاعدة  $\{C_1, C_2\}$  الى  $R^2$ .

$$(x,y) = a(1,2) + b(1,0) \\ = (a+b, 2a)$$

$$b = x - (1/2)y, a = (1/2)y \quad \text{فحصل على:}$$

والآن نعرف التحويل الخطي  $S: R^2 \rightarrow R^3$  كالآتي:

$$S(x,y) = (1/2)y(B_1) + (x - (1/2)y)B_2 \\ = (1/2)y(1,0,0) + (x - (1/2)y)(0,1,0) \\ = ((1/2)y, x - (1/2)y, 0)$$

والآن القارئ مدعو لتحقيق كون  $S$  نظيراً يمينياً للتحويل  $T$ .

ملاحظة:

في حل المثال اعلاه كان اختيار  $B_1, B_2$  عشوائياً بشرط ان تكون المجموعة  $\{A_1, B_1, B_2\}$  قاعدة الى  $R^3$ . كذلك فإن اي اختيار آخر سيؤدي الى نظير امين اخر.

مثال (5):

برهن على وجود نظير ايسر للتحويل الخطي  $T: P_1(R) \rightarrow R^3$  بالمصيغة.

$$T(a + bx) = (a, -b, 2a)$$

ثم جد واحداً.

الحل: لكي يوجد نظيراً يسارياً للتحويل  $T$  يجب ان يكون متبايناً وهذا يكافئ كون  $\text{Ker } T = \{0\}$ . فاذا وضعنا

$$T(a + bx) = (a, -b, 2a) = (0, 0, 0)$$

فنحصل على  $b = 0, a = 0$ . بذلك يكون  $\text{Ker } T = \{0\}$ .

لايجاد نظير ايسر نتبع خطوات البرهان للمبرهنة (2.3.3) (ب). نختار قاعدة الى  $P_1(R)$  ولتكن القاعدة الطبيعية  $\{A_1 = 1, A_2 = x\}$ . ضع

$$B_1 = T(A_1) = T(1) = (1, 0, 2)$$

$$B_2 = T(A_2) = T(x) = (0, -1, 0)$$

الان المجموعة  $\{B_1 = (1, 0, 2), B_2 = (0, -1, 0)\}$  تكون مجموعة مستقلة خطياً من المتجهات في  $R^3$ . نوسعها الى قاعدة  $\{B_1, B_2, C_1 = (0, 0, 1)\}$  الى  $R^3$ .

بذلك نعرف التحويل الخطي  $S: R^3 \rightarrow P_1(R)$  على عناصر القاعدة

$$S(B_1) = A_1 = 1$$

$$S(B_2) = A_2 = x$$

$$S(C_1) = 0$$

ولإيجاد  $S(y_1, y_2, y_3)$ ، نكتب  $(y_1, y_2, y_3)$  كتركيب خطي من المتجهات  $C_1, B_2, B_1$  فنحصل على:

$$(y_1, y_2, y_3) = a(1,0,2) + b(0,-1,0) + c(0,0,1)$$

$$= (a, -b, 2a + c)$$

والحل سيكون:  $a = y_1, b = -y_2, c = y_3 - 2y_1$  وعليه نحصل على

$$S(y_1, y_2, y_3) = aA_1 + bA_2 + C \cdot 0$$

$$= a(1) + b(x)$$

$$= y_1 + (-y_2)x$$

$$= y_1 - y_2 x$$

والقارىء مدعو لتحقيق كون  $S$  نظيراً يسارياً إلى  $T$ .

مثال (6):

برهن على ان الفضاءين  $P_n(\mathbb{R})$  و  $\mathbb{R}^{n+1}$  متشاكلان وذلك لاي عدد طبيعي  $n$ .

الحل: نعرف التحويل الخطي  $T: P_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$  بالصيغة

$$T(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$$

ثم نبرهن على ان  $T$  يكون تشاكلاً ولهذا الغرض نعرف التحويل الخطي بالصيغة  $S: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow P_n(\mathbb{R})$

$$S(b_1, \dots, b_{n+1}) = b_1 + b_2x + \dots + b_{n+1}x^n$$

والان القارىء مدعو لتحقيق ان  $S = T^{-1}$ ، اي ان  $S$  نظير  $T$ .

ان فكرة تشاكل الفضاءات بسيطة، فمثلاً الفضاءات  $P_3(\mathbb{R}), P_2(\mathbb{R}), \mathbb{R}^4$  تكون عناصرها بالصيغة:

$$a + bx + cx^2 + dx^3 \in P_3(\mathbb{R}), (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$$



نلاحظ ان كل متجه من هذه المتجهات  $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$  يتحدد بأربعة اعداد حقيقية  $a, b, c, d$  مرتبة بصيغة معينة. من الامثلة السابقة نلاحظ ان بعد كل من هذه الفضاءات يساوي 4، وبالتالي تشترك بصفة واحدة. ويكون اي اثنين منهما متشاكلين.

المبرهنة التالية تصنف الفضاءات المنتهية البعد وعلى الحقل نفسه.

### مبرهنة (2.3.5):

اذا كان كل من  $V, W$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى الحقل  $F$  نفسه فإن  $V$  يشاكل  $W$  اذا وفقط اذا  $\dim V = \dim W$ .

البرهان:

لنفرض ان  $V$  يشاكل  $W$ . اذن يوجد تشاكل  $T: V \rightarrow W$ . النتيجة (2.3.4) تؤدي الى  $\text{Ker} T = \{0\}$  و  $\text{Im} T = W$ . والمبرهنة (2.2.2) تؤدي الى:

$$\begin{aligned} \dim(V) &= \dim(\text{Ker} T) + \dim(\text{Im} T) \\ &= 0 + \dim(W) = \dim W \end{aligned}$$

على العكس لنفرض ان  $n = \dim(V) = \dim(W)$ . نختار قواعد الى كل من  $V$  و  $W$  ولتكن  $\{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة الى  $V$  و  $\{B_1, \dots, B_n\}$  قاعدة الى  $W$ . المبرهنة (2.1.2) تنص على وجود تحويل خطي فقط  $T: V \rightarrow W$  يحقق:

$$T(A_1) = B_1, \dots, T(A_n) = B_n$$

ولأي متجه  $A = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$  في  $V$  يكون

$$T(A) = x_1 B_1 + \dots + x_n B_n$$

هذا التحويل الخطي يجب ان يكون تشاكلاً وذلك لانه بالامكان تعريف

$$S: W \rightarrow V$$

$$S(B) = S(y_1 B_1 + \dots + y_n B_n) = y_1 A_1 + \dots + y_n A_n$$

وبالتالي يكون  $S$  نظيراً الى  $T$ .

(و. ه. م.)

مراجعة بعد. الفضاءات نحصل على النتائج التالية .

مثال (7)

- (أ) الفضاءان  $R^n$  ،  $M_n(R)$  متشاكلين وذلك لاي عدد طبيعي  $n$  .  
 (ب) الفضاء  $C^n$  على الحقل  $R$  يشاكل الفضاء  $R^{2n}$  الذي بدوره يشاكل  
 الفضاء  $P_{2n-1}(R)$  . وذلك لاي عدد طبيعي  $n$  .  
 (ج) الفضاء  $C^{n+1}$  على الحقل  $C$  يشاكل الفضاء  $P_n(C)$  على الحقل  
 $C$  وذلك لأي عدد طبيعي  $n$  .

مثال (8) :

اختبر التحويلين الخطيين التاليين من ناحية التشاكل . ثم جد نظير التشاكل .

$$T_1: R^3 \rightarrow R^3 \quad , \quad T_1(x, y, z) = (x, y, z-x)$$

$$T_2: R^3 \rightarrow R^3 \quad , \quad T_2(x, y, z) = (x, y, x+y)$$

الحل : نعلم على نتيجة (2.3.4) في الاجابة . نحاول حساب  $\text{Ker}T_2$  ,  $\text{Ker}T_1$  حسابات بسيطة كالسابق تظهر ان :

$$\text{Ker}T_1 = \{0\}, \text{Ker}T_2 = \{(x, y, z): x=0, y=0, z=z\}$$

عليه فان  $T_2$  لا يكون تشاكلاً في حين ان مبرهنة (2.2.2) تنص على ان :

$$\dim(\text{Im}T_1) = 3 - \dim \text{Ker}T_1 = 3 - 0 = 3$$

وبالتالي يكون  $T_1$  متبايناً وشاملاً وعليه يكون تشاكلاً .

لايجاد نظير  $T_1$  ، نتبع احدى الطرق في مثال (5) او مثال (4) وذلك لان

اي نظير ايسر الى  $T_1$  . سوف يساوي اي نظير ايمن وذلك حسب مبرهنة (2.3.1) .  
 نأخذ اولاً قاعدة مثل القاعدة الطبيعية .

$$\{A_1 = (1, 0, 0), A_2 = (0, 1, 0), A_3 = (0, 0, 1)\}$$

نضع

$$B_1 = T_1(A_1) = T_1(1,0,0) = (1,0,-1)$$

$$B_2 = T_1(A_2) = T_1(0,1,0) = (0,1,0)$$

$$B_3 = T_1(A_3) = T_1(0,0,1) = (0,0,1)$$

والآن نكتب  $(x,y,z)$  كتراكيب خطي من  $B_1, B_2, B_3$

$$(x,y,z) = a(1,0,-1) + b(0,1,0) + c(0,0,1)$$

$$= (a, b, c-a)$$

$$a = x, b = y, c = z + x$$

نعرف التحويل الخطي  $S: R^3 \rightarrow R^3$  بالصيغة

$$S(x,y,z) = aA_1 + bA_2 + cA_3$$

$$= xA_1 + yA_2 + (z+x)A_3$$

$$= x(1,0,0) + y(0,1,0) + (z+x)(0,0,1)$$

$$= (x, y, z+x)$$

هذا هو نظير  $T_1$ ، اي يمكننا ان نكتب

$$T_1^{-1}(x,y,z) = (x,y,z+x)$$

مبرهنة (2.3.6):

اذا كان كل من  $T_2: V \rightarrow W, T_1: U \rightarrow V$  تشاكلاً فإن التراكيب  $T_2 \circ T_1: U \rightarrow W$  يكون تشاكلاً و  $(T_2 \circ T_1)^{-1} = T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$ .

البرهان:

توجد تحويلات نظيرة  $S_2: W \rightarrow V, S_1: V \rightarrow U$  بحيث ان  $S_1 \circ T_1 = 1_U$  و  $T_1 \circ S_1 = 1_V$  و  $S_2 \circ T_2 = 1_W$  و  $T_2 \circ S_2 = 1_V$ .

$$S = S_1 \circ S_2: W \rightarrow V \quad \text{ضع:}$$

لاحظ ان S تحويلاً خطياً وبحقق

$$\begin{aligned}(T_2 \circ T_1) \circ S &= (T_2 \circ T_1) \circ (S_1 \circ S_2) \\ &= T_2 \circ (T_1 \circ S_1) \circ S_2 \\ &= T_2 \circ (1_v \circ S_2) = T_2 \circ S_2 = 1_w\end{aligned}$$

وبالطريقة نفسها اعلاه يمكن البرهنة على ان  $So (T_2 \circ T_1) = 1_U$  عندئذ يكون S نظير الى  $T_2 \circ T_1$  وهذا يعني ان  $T_2 \circ T_1$  يكون تشاكلاً .

ان  $S_1 = T_1^{-1}$  و  $S_2 = T_2^{-1}$  نظير الى  $T_2 \circ T_1$  ، اذن .

$$(T_2 \circ T_1)^{-1} = S = S_1 \circ S_2 = T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$$

( و . ه . م )

### تمارين (2.3)

1 - جد جميع التركيبات الممكنة في كل ممايلي :

$$= \begin{bmatrix} -x & y-z \\ z & 2x \end{bmatrix}$$

( أ )  $S: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  ،  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$  حيث

$$. S(t) = (2t, -t, 0) ، T(x, y, z)$$

( ب )  $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ،  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$. S(x, y) = (0, -x + 3y) ، T(x, y) = (x + y, 2x - 3y)$$

( ج )  $S: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$  ،  $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow P_1(\mathbb{C})$

$$. S(z_1, z_2) = (z_1 + z_2, iz_1) ، T(z_1, z_2) = 2z_1 - iz_1x$$

( د )  $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  ،  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$. S(x, y) = (x - 2y, 3x, 2y) ، T(x, y, z) = (0, x + y - z)$$

2 - اذا كان  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد و  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً

فبرهن على ان  $\text{Ker} T \subset \text{Ker} T^2$  و  $\text{Im} T \supset \text{Im} T^2$  حيث

$$T^2 = T \circ T$$

3 - اذا كان كل من  $S: U \rightarrow V$  و  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً بحيث

$$. \text{Ker} (ToS) = \{0\} ، \text{Ker} T = \{0\} ، \text{Ker} S = \{0\}$$

4 - اذا كان  $V$  فضاء متجهات و  $T_1, T_2: V \rightarrow V$  تحويلين خطيين على  $V$  ،

بحيث :

( أ ) ( التحويل المحايد )  $T_1 + T_2 = I$

( ب )  $T_2 \circ T_1 = O$  و  $T_1 \circ T_2 = O$

( ج )  $T_2 \circ T_2 = T_2$  و  $T_1 \circ T_1 = T_1$

برهن على ان  $V = \text{Im}T_1 \oplus \text{Im}T_2$

5 — اذا كان  $T: R^2 \rightarrow R^2$  تحويلاً خطياً بحيث  $T \neq O$  لكن

$ToT = O$  فبرهن على وجود قاعدة  $\{A, B\}$  الى  $R^2$  بحيث  $T(B) = O$  و

$T(A) = B$

6 — جد ان امكن نظير ايمن او نظير ايسر لكل من التحويلات الخطية التالية  
وقرر فيما اذا كان التحويل غير معتلاً.

( أ )  $T(x,y,z) = (x+y, y-2z)$  ،  $T: R^3 \rightarrow R^2$

( ب )  $T(a+bx) = (a, b, -2b, a+b)$  ،  $T: P_1(R) \rightarrow R^4$

( ج )  $T(x,y,z) = (x+y, 2x+2y-3z, 15z)$  ،  $T: R^3 \rightarrow R^3$

( د )  $T(z_1, z_2) = (iz_1, 2z_1 - z_2)$  ،  $T: C^2 \rightarrow C^2$  . اعتبر  $C^2$  فضاء

متجهات على الحقل  $C$

7 — جد نظير كل من التحويلات التالية:

( أ )  $T(x,y,z) = (x-y, x+z, x+y+2z)$  ،  $T: R^3 \rightarrow R^3$

( ب )  $T(x,y,z) = (2x-y+z, x+y, 3x+y+z)$  ،  $T: R^3 \rightarrow R^3$

8 — اذا كان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً بحيث  $T^2 = ToT = O$  فبرهن على ان

$T - I = O$  . ( التحويل المحايد ،  $I = O$  )

( التحويل الصفري ) .

9 — اذا كان  $T: V \rightarrow \bar{V}$  تحويلاً خطياً بحيث  $T^2 - T + I = O$  فبرهن على ان

$T^{-1}$  موجود ويساوي  $I - T$  .

10 — اذا كان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً بحيث  $T^2 + 2T + I = O$  . فجد

$T^{-1}$

11 — اذا كان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً بحيث  $T^2 = T$  واذا كان

$V = M \oplus N$  فبرهن على ان  $N = \text{Ker}T$  ،  $M = \text{Im}T$

( ارشاد: لكي نبرهن على ان  $V = M + N$  ، اكتب متجه  $A \in V$  بالصيغة  $A = A - T(A) + T(A)$  . )

## (2.4) مصفوفة التحويل الخطي

### Matrix of a Linear transformation

يوضح هذا البند العلاقة بين التحويلات الخطية والمصفوفات وسنفترض لدى القارئ الملم بجبر المصفوفات وخصائصها الرئيسية .

اذا كان كل من  $V$  و  $W$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى الحقل  $F$  نفسه بحيث ان  $\dim V = m$  و  $\dim W = n$  ، واذا كان  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً فإنه بالإمكان إيجاد مصفوفة  $m \times n$  عناصرها من الحقل  $F$  وتعتمد اعتماداً كلياً على التحويل الخطي  $T$  وعلى القواعد المختارة الى كل من  $V$  و  $W$  وعلى النحو التالي .

لنفرض ان  $H = \{A_1, \dots, A_m\}$  قاعدة الى  $V$  وان  $S = \{B_1, \dots, B_n\}$  قاعدة الى  $W$  . الآن لكل  $i: 1, \dots, m$  يكون  $T(A_i)$  متجهاً في  $W$  وبالتالي يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات  $B_1, \dots, B_n$  وبطريقة واحدة فقط . اذا وضعنا:

$$T(A_1) = a_{11}B_1 + \dots + a_{1n}B_n$$

$$T(A_2) = a_{21}B_1 + \dots + a_{2n}B_n$$

(2.4.1)

$$T(A_m) = a_{m1}B_1 + \dots + a_{mn}B_n$$

$$M_T = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

فنتحصل على مصفوفة :

علاقة هذه المصفوفة بالتحويل الخطي  $T$  والقواعد  $H$  و  $S$  موضحة في

المبرهنة التالية :

مبرهنة (2.4.2) :

إذا كان  $X = (x_1, \dots, x_m)$  متجه احداثيات  $A \in V$  بالنسبة للقاعدة  $H = \{A_1, \dots, A_m\}$  و  $Y = (y_1, \dots, y_n)$  متجه احداثيات  $T(A)$  بالنسبة للقاعدة  $S = \{B_1, \dots, B_n\}$  فإن مصفوفة التحويل الخطي  $T: V \rightarrow W$  بالنسبة للقواعد  $H$  و  $S$  والمستخرجة في (2.4.1) تحقق :

$$Y = X M_T$$

البرهان :

إذا كان  $X = (x_1, \dots, x_m)$  متجه احداثيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $H = \{A_1, \dots, A_m\}$  فإن  $A = x_1 A_1 + \dots + x_m A_m$ . بما ان  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً فعليه يكون  $T(A) = x_1 T(A_1) + \dots + x_m T(A_m)$ . الان نعوض عن كل  $T(A_k)$   $k: 1, \dots, m$  بما يساويه وحسب (2.4.1) اعلاه فنحصل على :

$$T(A) = x_1 \left( \sum_{j=1}^n a_{1j} B_j \right) + \dots + x_m \left( \sum_{j=1}^n a_{mj} B_j \right) \\ = \sum_{j=1}^n \left( \sum_{k=1}^m x_k a_{kj} \right) B_j$$

لكن  $Y = (y_1, \dots, y_n)$  يمثل متجه احداثيات  $T(A)$  بالنسبة للقاعدة  $S = \{B_1, \dots, B_n\}$  اي ان  $T(A) = y_1 B_1 + \dots + y_n B_n$ . إذن :  $\sum_{j=1}^n y_j B_j = \sum_{j=1}^n \left( \sum_{k=1}^m x_k a_{kj} \right) B_j$

بما ان كل متجه في  $W$  يمكن كتابته بطريقة واحدة فقط كتركيب خطي من متجهات القاعدة  $S$ ، فعليه نستنتج على ان :

$$y_j = \sum_{k=1}^m x_k a_{kj} \quad j = 1, \dots, n$$

الاجابة : جعة ضرب المصفوفات نحصل من النتيجة اعلاه على العلاقة

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_m) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

وهذا يعني ان  $Y = XM_T$ .

( و . ه . م )

ملاحظة:

1 — في المبرهنة اعلاه اعتبرنا المتجهات  $X$  و  $Y$  على انها مصفوفات  $1 \times m$  و  $1 \times n$

على التوالي .

2 — بما ان متجه الاحداثيات بالنسبة لقاعدة معينة يعين المتجه بصورة كلية فإن المبرهنة (2.4.2) توضح ان معرفة مصفوفة التحويل الخطي تعني معرفة التحويل كلياً وكما موضح في الامثلة أدناه .

مثال (1):

ليكن  $T: R^2 \rightarrow R^3$  تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة:

$$T(x, y) = (x, x + y, 2x - y)$$

جد مصفوفة  $T$  بالنسبة للقواعد الطبيعية الى كل من  $R^2$  و  $R^3$ .

الحل: القاعدة الطبيعية الى  $R^2$  تتكون من المتجهات  $A_1 = (1, 0)$ ,  $A_2 = (0, 1)$  والقاعدة الطبيعية الى  $R^3$  تتكون من المتجهات  $B_1 = (1, 0, 0)$ ,  $B_2 = (0, 1, 0)$ ,  $B_3 = (0, 0, 1)$ .

لغرض حساب مصفوفة التحويل الخطي  $T$  نتبع الخطوات المذكورة في (2.4.1).

$$T(A_1) = T(1, 0) = (1, 1, 2) = (1) B_1 + (1) B_2 + (2) B_3$$

$$T(A_2) = T(0, 1) = (0, 1, -1) = (0) B_1 + (1) B_2 + (-1) B_3$$



بذلك تكون مصفوفة T بالنسبة للقواعد الطبيعية كما يلي :

$$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

مثال (2) :

إذا كان  $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$  تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة :

$$T(a + bx + cx^2) = (2a, b - c)$$

فجد مصفوفة T بالنسبة للقاعدة  $H = \{A_1 = 5, A_2 = 2x, A_3 = x^2\}$  الى  $P_2(\mathbb{R})$  والقاعدة  $S = \{B_1 = (-1, 0), B_2 = (0, 3)\}$  الى  $\mathbb{R}^2$ .

الحل :

$$T(A_1) = T(5) = (10, 0) = (-10) B_1 + (0) B_2$$

$$T(A_2) = T(2x) = (0, 2) = (0) B_1 + (2/3) B_2$$

$$T(A_3) = T(x^2) = (0, -1) = (0) B_1 + (-1/3) B_2$$

بذلك تكون مصفوفة T بالنسبة للقواعد اعلاه كما يلي :

$$M_T = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & 2/3 \\ 0 & -1/3 \end{bmatrix}$$

مثال (3) :

جد التحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$  الذي مصفوفته بالنسبة للقاعدة

$$H = \{A_1 = (2, 0), A_2 = (1, 1)\} \text{ والقاعدة } B = \{B_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\}$$

$$M_T = \begin{bmatrix} 11 & -10 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

الحل: نستخلص طريقة الحل من المبرهنة (2.4.2). المطلوب إيجاد  $T(a,b)$ . نحاول أولاً حساب متجه احداثيات  $(a,b)$  بالنسبة للقاعدة  $H$  ولهذا الغرض نكتب:

$$(a,b) = x(2,0) + y(1,1)$$

فنحصل على المعادلتين:

$$2x + y = a$$

$$y = b$$

وهذا يكون:  $y = b$ ,  $x = (1/2)(a-b)$ .

وعليه فإن متجه احداثيات  $(a,b)$  بالنسبة للقاعدة  $H$  يكون

$$X = ((1/2)(a-b), b)$$

بضرب هذا المتجه في المصفوفة  $M_T$  نحصل على متجه احداثيات  $T(a,b)$

بالنسبة للقاعدة  $S$  وكما يلي:

$$Y = XM_T = ((1/2)(a-b), b) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= ((1/2)(a+5b), (1/2)(a-b), (-1/2)(a-b), 2b)$$

بمعرفة متجه الاحداثيات بالنسبة الى قاعدة معينة يمكننا معرفة المتجه وكما يلي:

$$T(a,b) = (1/2)(a+5b)B_1 + (1/2)(a-b)B_2 - (1/2)(a-b)B_3 + 2bB_4$$

$$= (1/2)(a+5b) \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + (1/2)(a-b) \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - (1/2)(a-b) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + 2b \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a+5b & (3/2)(a-b) \\ (1/2)(a-b) & b \end{bmatrix}$$

مثال (4) :

جد مصفوفة التحويل الخطي  $T: P_1(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$  المعرف بالصيغة :

$$T(a+bx) = ax + bx^2$$

أولاً: بالنسبة للقواعد الطبيعية ثم بالنسبة لقاعدة  $P_1(\mathbb{R})$  المكونة من المتجهات  $B_1 = -1, B_2 = 3x, B_3 = -2x^2$  وقاعدة  $P_2(\mathbb{R})$  المكونة من المتجهات  $A_1 = 2, A_2 = 1-x, A_3 = -2x^2$ .

الحل :

$$T(1) = 1.x = 0 + 1.x + 0.x^2$$

$$T(x) = x^2 = 0 + 0.x + 1.x^2$$

بذلك تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للقواعد الطبيعية كما يلي :

$$M_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

نستخرج مصفوفة  $T$  بالنسبة للقواعد الجديدة كما يلي :

$$T(A_1) = T(2) = 2x = 0.B_1 + (2/3)B_2 + 0.B_3$$

$$T(A_2) = T(1-x) = x - x^2 = 0.B_1 + (1/3)B_2 + (1/2)B_3$$

بذلك تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للقواعد المعطاة كما يلي :

$$M_T = \begin{bmatrix} 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/2 \end{bmatrix}$$

المبرهنة التالية تحسب مصفوفة تركيب تحويلين خطيين .

مبرهنة (2.4.3):

إذا كان كل من  $W, V, U$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى الحقل  $F$  نفسه وإذا كانت  $G = \{A_1, \dots, A_m\}$  قاعدة إلى  $U$  و  $H = \{B_1, \dots, B_n\}$  قاعدة إلى  $V$  و  $J = \{C_1, \dots, C_p\}$  قاعدة إلى  $W$ . إذا كان كذلك  $S: V \rightarrow W$  و  $T: U \rightarrow V$  تحويلين خطيين بحيث أن مصفوفة  $T$  بالنسبة للقواعد  $G$  و  $H$  تكون  $M_T$  ومصفوفة  $S$  بالنسبة للقواعد  $J$  و  $H$  تكون  $M_S$ . عندئذ تكون مصفوفة التركيب  $SoT$  بالنسبة للقواعد  $G$  و  $J$  عبارة عن حاصل الضرب  $M_{SoT} \cdot M_S$ ، أي أن

$$M_{SoT} = M_T \cdot M_S$$

البرهان:

لنفرض أن  $M_S = (b_{ij})$ ،  $M_T = (a_{ij})$  عليه يكون لدينا:

$$S(B_j) = \sum_{l=1}^p b_{jl} C_l, T(A_k) = \sum_{i=1}^n a_{ki} B_i$$

لغرض حساب مصفوفة التركيب  $SoT$  يتوجب علينا حساب  $SoT(A_k)$  وذلك لكل  $k: 1, \dots, m$

$$\begin{aligned} SoT(A_k) &= S(T(A_k)) = S\left(\sum_{i=1}^n a_{ki} B_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ki} S(B_i) \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ki} \left(\sum_{l=1}^p b_{il} C_l\right) \\ &= \sum_{l=1}^p \left(\sum_{i=1}^n a_{ki} b_{il}\right) C_l \end{aligned}$$

الآن لو وضعنا  $c_{kl} = \sum_{i=1}^n a_{ki} b_{il}$  لاصبحت المصفوفة المتكونة من العناصر  $c_{kl}$  عبارة عن مصفوفة التركيب  $SoT$  بالنسبة للقواعد  $G$  و  $J$ . لكن أعلاه يمثل العنصر في الموقع  $kl$  الحاصل ضرب  $M_T \cdot M_S$  عليه يكون  $M_{SoT} = M_T \cdot M_S$ .

( و . ه . م )

مثال (5):

مصفوفة التحويل  $M_T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$  إذا كانت الخطي

مصفوفة  $M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$  و  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$

التحويل الخطي  $S: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  وذلك بالنسبة للقواعد الطبيعية الى كل من  $\mathbb{R}^3$ ،  $\mathbb{R}^4$ ،  $\mathbb{R}^2$  فجد مصفوفة التحويل  $SoT: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ .

الحل: حسب المبرهنة (2.4.3)، يتوجب علينا فقط ضرب المصفوفتين

$$M_T \circ M_S = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -5 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -5 & 3 & 16 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

عليه تكون مصفوفة التركيب  $SoT$  بالنسبة للقواعد الطبيعية.

$$M_{\text{SoT}} = \begin{bmatrix} -5 & 3 & 16 \\ 2 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

نتيجة (2.4.4) :

إذا كان كل من  $V$  و  $W$  فضاء متجهات منتهي البعد فإن أي تحويل خطي  $W \rightarrow T:V$  يكون تشاكلاً إذا وفقط إذا كانت مصفوفة  $T$  بالنسبة لأي زوج من القواعد مربعة وقابلة للقلب .

البرهان :

لنفرض ان  $W \rightarrow T:V$  يكون تشاكلاً بهذه الحالة فإن المبرهنة (2.3.5) تنتج ان  $\dim V = \dim W$  وبذلك تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة لأي زوج من القواعد مصفوفة مربعة . لنأخذ  $\{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة إلى  $V$  و  $\{B_1, \dots, B_n\}$  قاعدة إلى  $W$  . لنفرض ان  $M$  مصفوفة  $T$  بالنسبة لزوج القواعد  $F, E$  . بما ان  $T$  تشاكلاً . عليه يوجد تحويل خطي  $S: W \rightarrow V$  يحقق :

$$\text{SoT} = I_w \text{ و } \text{ToS} = I_v$$

لتكن  $N$  مصفوفة  $S$  بالنسبة لزوج القواعد  $F, E$  من المبرهنة (2.4.3) ينتج مايلي :

(أ) مصفوفة التركيب  $V \rightarrow \text{SoT}: V$  بالنسبة لزوج القواعد  $E, E$  تساوي  $MN$  .

(ب) مصفوفة التركيب  $W \rightarrow \text{ToS}: W$  بالنسبة لزوج القواعد  $F, F$  تساوي  $NM$  . بما ان  $\text{SoT} = I_w$  ، اذن .

$$\text{SoT}(A_k) = A_k = 0A_1 + \dots + 0A_{k-1} + 1.A_k + 0A_{k+1} + \dots + 0.A_n$$

وذلك لكل  $k: 1, \dots, n$  . عليه تكون مصفوفة  $\text{SoT}$  بالنسبة لزوج القواعد  $E, E$  مساوية للمصفوفة المحايدة  $I$  . أي ان  $MN = I$  . وبالطريقة نفسها، العلاقة  $\text{ToS} = I_w$  تنتج  $NM = I$  وعليه تكون المصفوفة  $M$  قابلة للقلب و  $M^{-1} = N$  .

لنفرض العكس، اي ان مصفوفة التحويل الخطي  $T: V \rightarrow W$  بالنسبة لزوج من القواعد  $E, F$  عبارة عن مصفوفة مربعة  $M$  قابلة للقلب ولنفرض ان  $N$  مصفوفة تحقق  $NM = I$  و  $MN = I$ .

ليكن  $S: W \rightarrow V$  تحويلاً خطياً ناتجاً عن المصفوفة  $N$  بأستعمال زوج القواعد  $F, E$  بذلك تكون مصفوفة التركيب  $SoT: V \rightarrow V$  بالنسبة لزوج القواعد  $E$  و  $E$  مساوية للمصفوفة المحايدة  $I$  وعليه اذا اخذنا اي متجه  $A \in V$  وفرضنا ان متجه احدائياته بالنسبة للقاعدة  $E$  هو المتجه  $X$  فإن متجه احدائيات  $SoT(A)$  بالنسبة للقاعدة  $E$  يكون:

$$X(MN) = X \cdot I = X$$

اي ان  $SoT(A) = A$ . وبالطريقة نفسها نبرهن على ان  $ToS(B) = B$  لاي متجه  $B \in W$ . هذا يعني ان  $SoT = 1_V$  و  $ToS = 1_W$ ، اي ان  $T$  يكون تشاكلاً.

( و . ه . م )

من النتائج الاخرى للمبرهنة (2.4.3) هي الحصول على خاصية لضرب المصفوفات والتي يكون برهانها صعباً وطويلاً اذا استخدمنا خصائص المصفوفات فقط.

نتيجة (2.4.5):

اذا كانت كل من  $M$  و  $N$  مصفوفة مربعة ذات رتبة  $n \times n$  وعلى الحقل  $F$  وكان  $MN = I$  فإن  $NM = I$  ( هذا يعني انه في حالة اختبار كون المصفوفة  $N$  نظيرة للمصفوفة  $M$  نكون بحاجة فقط لاختبار احد الشرطين  $MN = I$ ،  $NM = I$  ).

البرهان:

ليكن  $T, S: F^n \rightarrow F^n$  تحويلين خطيين ناتجين عن المصفوفتين  $N, M$  على التوالي وبالنسبة لزوج القواعد الطبيعية  $E, E$  بحيث

$E = \{A_1 = (1, 0, \dots, 0), A_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, A_n = (0, \dots, 0, 1)\}$   
 اي ان :  $M_S = M$  ،  $M_T = N$  بما ان  $MN = I$  ، عليه يكون  $ToS = I_{F^n}$   
 (= التحويل المحايد ) من هذه العلاقة يمكننا ان نعرفن على ان التحويل  $S$  يكون  
 تشاكلاً وعلى النحو التالي : لنفرض ان  $B \in \text{Ker } S$  ، اي ان  $S(B) = O$  عليه  
 ينتج :  $O = T(O) = T(S(B)) = ToS(B) = I(B) = B$  هذا يعني ان  
 $\text{Ker } S = \{O\}$  وبالتالي يكون لدينا :

$$n = \dim F^n = \dim(\text{Im } S) + \dim(\text{Ker } S) = \dim(\text{Im } S)$$

اي ان  $\text{Im } S = F^n$  . الان نتيجة (2.3.4) تنتج ان  $S$  يكون تشاكلاً . عليه يوجد  
 تحويل خطي  $P: F^n \rightarrow F^n$  يحقق  $SoP = I_{F^n}$  . هذا يعني ان  $P$  نظير ايمن الى  $S$   
 وبما ان  $T$  نظير ايمن الى  $S$  ، فيجب ان يكون  $P = T$  وذلك حسب المبرهنة  
 (2.3.1) . اذن حصلنا على :

$$SoT = I_{F^n} \text{ و } ToS = I_{F^n} \text{ بالرجوع للمصفوفات نحصل على :}$$

$$I = M_{I_{F^n}} = M_{SoT} = M_T \cdot M_S = NM$$

( و . ه . م )

حيث ان البرهان اعلاه يبدو صعباً او معقداً بعض الشيء فإننا ندعو  
 القارئ الى ان يجرب برهنة النتيجة اعلاه بالحسابات المباشرة ( حتى الحالة  $3 \times 3$   
 تكون طويلة جداً ) .

لغرض دراسة التحويلات الخطية سوف نلجأ دائماً الى تمثيل التحويل  
 الخطي بمصفوفة وذلك لبرهنة بعض النتائج او عمل بعض الحسابات . ان التمثيل  
 المصفوفي للتحويل الخطي  $T: V \rightarrow W$  يعتمد اعتماداً كلياً على اختيار القواعد الى  
 كل من  $V$  و  $W$  . فلو كان اختيارنا للقواعد عشوائياً لربما حصلنا على مصفوفة  
 معقدة لاتعكس خصائص  $T$  بسهولة فعلية نغير القواعد في كل من  $V$  و  $W$   
 للحصول على مصفوفة ابسط ان امكن وذلك لان تغير القواعد لا يؤثر على التحويل  
 الخطي وانما يؤثر على متجه الاحداثيات لمتجهات  $V$  و  $W$  . عليه فإن الاسئلة التالية  
 تطرح نفسها .



- 1 — هل يمكن إيجاد قاعدة الى  $V$  وقاعدة الى  $W$  بحيث تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة لذلك الزوج من القواعد بأبسط صيغة .
  - 2 — ماعلاقة مصفوفتين تمثلان التحويل الخطي نفسه لكن بالنسبة لزوجين مختلفين من القواعد .
  - 3 — لو اعطينا مصفوفتين  $M$  و  $N$  لهما نفس الدرجة فمتى وتحت اي شرط يمكننا ان نقول بأن هاتين المصفوفتين تمثلان تحويلاً خطياً واحداً بالنسبة لقواعد مختلفة .
- الاجابة على الاسئلة اعلاه تمثل مادة البند التالي .

#### تمارين (2.4)

- 1 — جد مصفوفة كل من التحويلات التالية وذلك بالنسبة للقواعد الطبيعية .

$$T(x,y) = (x-2y, 0), T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (\text{أ})$$

$$T(a+bx) = (a-b, 2b-a, 3b), T: P_1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (\text{ب})$$

$$T \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = (a-b, c+d), T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (\text{ج})$$

$$T(x) = (x, 2x, 0), T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (\text{د})$$

$$T(z_1, z_2) = (2z_1, z_1 - z_2, z_1 + z_2), T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^3 \quad (\text{هـ})$$

- 2 — في كل مما يلي، جد التحويل الخطي  $T$  الذي مصفوفته بالنسبة للقواعد المعطاة تكون:

$$G = \text{النسبة للقاعدة } M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (\text{أ})$$

$$H = \{B_1 = (1, 2, 0)\} \text{ والقاعدة } \mathbb{R}^2 \text{ الى } \{A_1 = (1, 2), A_2 = (-3, 1)\}$$

$$\dots, B_2 = (0, 1, 1), B_3 = (0, 0, 1)\}$$

$$M = \text{النسبة للقاعدة } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (\text{ب})$$

$$G = \left\{ A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \right. \\ \left. A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \right\}$$

و القاعدة  $H = \{B_1 = (1, -1), B_2 = (0, 3)\}$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 7 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad , T: R^3 \rightarrow P_2(R) \text{ (ج)}$$

للقاعدة الطبيعية الى  $R^3$  والقاعدة  $H = \{A_1 = 2, A_2 = 1+x, A_3 = -x^2\}$

$$M = \begin{pmatrix} i & -i & 1+i \\ -2 & 1 & -1+2i \end{pmatrix} \quad , T: C^2 \rightarrow C^3 \text{ (هـ)}$$

للقاعدة الطبيعية الى  $C^3$  والقاعدة  $G = \{(1, 2), (i, 0)\}$

فضاءات على الحقل  $(C)$ .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & 0 & c \end{pmatrix} \quad \text{حيث } a, b, c \in R \text{ اذا كانت}$$

فبرهن على ان  $A^3 = O$  بدون استخدام ضرب المصفوفات.

(ارشاد: جد التحويل الخطي  $T: R^3 \rightarrow R^3$  الذي مصفوفته بالنسبة للقواعد الطبيعية تكون  $A$ ).

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{اعتبر } A_1 = (1, 3), A_2 = (-1, 4) \text{ واعتبر ان}$$

مصفوفة التحويل  $T: R^2 \rightarrow R^2$  بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1, A_2\}$ .

(أ) جد متجه احدائيات كل من  $T(A_1)$ ,  $T(A_2)$  بالنسبة للقاعدة  $S$ .

(ب) جد  $T(A_1)$  و  $T(A_2)$ .

(ج) جد  $T(7, 4)$ .

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{اعتبر 5}$$

للقاعدة  $S = \{A_1, A_2, A_3\}$  بالنسبة للقاعدة  $T: P_2(R) \rightarrow P_2(R)$  حيث

$$A_1 = 3x + 3x^2, A_2 = -1 + 3x + 2x^2, A_3 = 3 + 7x + 2x^2$$

(أ) جد متجه احدائيات كل من  $T(A_1)$ ,  $T(A_2)$ ,  $T(A_3)$  بالنسبة

للقاعدة  $S$ .

(ب) جد  $T(A_3)$  ،  $T(A_2)$  ،  $T(A_1)$

(ج) جد  $T(1+x)$

6 — اذا كانت  $S = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$  قاعدة لفضاء متجهات  $V$  على حقل  $F$ ، فجد المصفوفة بالنسبة الى  $S$  للتحويل الخطي  $T: V \rightarrow V$  المعرف بواسطة:

$$T(A_3) = A_4, T(A_2) = A_3, T(A_1) = A_2, T(A_4) = A_1$$

7 — اذا كان  $D: P_2(R) \rightarrow P_2(R)$  التحويل الخطي المعرف بواسطة  $D(P) = P'$  ( مشتقة  $P$  ) . في الجزأين ( أ ) ، ( ب ) اوجد مصفوفة  $D$  بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1, A_2, A_3\}$

$$(أ) A_1 = 1, A_2 = x, A_3 = x^2$$

$$(ب) A_1 = 2, A_2 = 2-3x, A_3 = 2-3x + 8x^2$$

(ج) استخدم مصفوفة الجزء ( أ ) لحساب  $D(6-6x+24x^2)$

(د) كرر المطلوب في الجزء (ج) باستخدام مصفوفة الجزء (ب).

8 — في كل جزء،  $S = \{f_1, f_2, f_3\}$  هي قاعدة فضاء جزئي  $V$  من فضاء المتجهات الذي يحتوي على الدوال ذات القيم الحقيقية المعرفة على المستقيم الحقيقي. اوجد المصفوفة بالنسبة الى  $S$  للتحويل الخطي  $D: V \rightarrow V$  (تحويل المشتقة).

$$(أ) f_1 = 1, f_2 = \sin x, f_3 = \cos x$$

$$(ب) f_1 = 2, f_2 = e^x, f_3 = e^{2x}$$

$$(ج) f_1 = e^{2x}, f_2 = xe^{2x}, f_3 = x^2e^{2x}$$

9 — لتكن  $N = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$  وليكن  $T: M_2(R) \rightarrow M_2(R)$  التحويل الخطي

$$T(A) = AN - NA$$
 المعرف بالصيغة:

$$(أ) جد  $T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$  بصورة مباشرة.$$

(ب) جد مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية.

(ج) جد مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة:

$$S = \{A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\}$$

(د) جد متجه احدائيات (2 4) (1 1) A = ثم جد  $T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

بأستخدام المصفوفة في الجزء (ج) وتتحقق من الناتج من الجزء (أ).

10 — ليكن  $T: M_3(\mathbb{R}) \rightarrow M_3(\mathbb{R})$  التحويل الخطي المعرف بالصيغة:

$$T(A) = (A - A^T)/2$$

حيث  $A^T$  تساوي مدورة المصفوفة A (transpose of A) جد مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية.

## (2.5) تغيير القواعد والصيغ الاعتيادية

### Change of Bases & Normal forms

تقد طرحنا في نهاية البند السابق ثلاثة اسئلة. الاجابة على السؤال الاول ستكون في المبرهنة (2.5.1) ادناه. السؤالين الثاني والثالث تكون الاجابة عليهما في المبرهنة (2.5.2).

مبرهنة (2.5.1):

اذا كان كل من V و W فضاء متجهات متتهي البعد بحيث ان  $\dim w = n$ ،  $\dim V = m$ . واذ كان  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً ذا رتبة تساوي r فإنه بالامكان دائماً إيجاد قاعدة لـ V وقاعدة لـ W بحيث ان مصفوفة T بالنسبة لذلك الزوج من القواعد تكون بالصيغة:

$$M_T = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## مكتبة الفريد الإلكترونية

حيث ان  $I_r$  تمثل المصفوفة الموحدة  $r \times r$ . هذه الصيغة تسمى الصيغة الاعتيادية.

البرهان :

بما ان رتبة  $T$  تساوي  $r$ ، عليه تكون صفرية  $I_r$  دية الى  $m-r$ . نختار قاعدة الى  $\text{Ker } T$  مثل  $\{B_1, \dots, B_{m-r}\}$  ثم نوسعها الى قاعدة  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_{m-r}\}$  الى  $V$ . الان مجموعة المتجهات  $\{C_1 = T(A_1), \dots, C_r = T(A_r)\}$  تكون مستقلة خطياً ولغرض برهنة ذلك نأخذ تركيباً خطياً من تلك المتجهات ونساويه بالصفر.

$$y_1 C_1 + \dots + y_r C_r = 0$$

$$y_1 T(A_1) + \dots + y_r T(A_r) = 0$$

بما ان  $T$  تحويلاً خطياً فينتج

$$T(y_1 A_1 + \dots + y_r A_r) = 0$$

عليه نستنتج على ان :  $y_1 A_1 + \dots + y_r A_r \in \text{Ker } T$

هذا يعني انه توجد اعداد قياسية  $x_1, \dots, x_{m-r}$  تحقق :

$$y_1 A_1 + \dots + y_r A_r = x_1 B_1 + \dots + x_{m-r} B_{m-r}$$

وهذا يعني ان :

$$y_1 A_1 + \dots + y_r A_r - x_1 B_1 - \dots - x_{m-r} B_{m-r} = 0$$

وبما ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_{m-r}\}$  مستقلة خطياً فينتج ان :

$$y_1 = 0, \dots, y_r = 0, x_1 = 0, \dots, x_{m-r} = 0$$

وبالتالي تكون المجموعة  $\{C_1, \dots, C_r\}$  مستقلة خطياً نوسع هذه المجموعة الى قاعدة  $\{C_1, \dots, C_r, D_1, \dots, D_{n-r}\}$  الى  $W$ . بذلك يكون لدينا :

$$T(A_1) = C_1 = 1 \cdot C_1 + 0 \cdot C_2 + \dots + 0 \cdot C_r + 0 \cdot D_1 + \dots + 0 \cdot D_{n-r}$$

⋮

$$T(A_r) = C_r = 0 \cdot C_1 + \dots + 0 \cdot C_{r-1} + 1 \cdot C_r + 0 \cdot D_1 + \dots + 0 \cdot D_{n-r}$$

$$T(B_1) = O = o.C_1 + \dots + o.C_r + o.D_1 + \dots + oD_{n-r}$$

$$T(B_{m-r}) = O = \delta.C_1 + \dots + o.C_r + o.D_1 + \dots + o.D_{n-r}$$

عليه تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة  $\{A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_{m-r}\}$  الى القاعدة  $\{C_1, \dots, C_r, D_1, \dots, D_{n-r}\}$  الى  $V$  والمقاعدة  $W$  بالصيغة:

$$M_T = \begin{pmatrix} \overbrace{100 \dots 0}^r & \overbrace{0 \dots 0}^{n-r} \\ \overbrace{010 \dots 0} & \vdots \\ \overbrace{0 \dots 01} & \overbrace{0 \dots 0} \\ \hline \overbrace{0 \dots 0} & \overbrace{0 \dots 0} \\ \vdots & \vdots \\ \overbrace{0 \dots 0} & \overbrace{0 \dots 0} \end{pmatrix}$$

وهذه المصفوفة يمكن ان تكتب بالصيغة القالبية على الشكل

$$M_T = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

(و. ه. م.)

نوضح فكرة البرهان اعلاه بالمثال التالي:

مثال (1):

جد قاعدة الى  $R^4$  وقاعدة الى  $R^3$  لكي تكون مصفوفة التحويل الخطي  $T: R^4 \rightarrow R^3$  بالصيغة الاعتيادية، حيث ان

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2 - x_3, 2x_3)$$

الحل: نحاول أولاً إيجاد قاعدة الـ  $\text{Ker}T$ . لهذا الغرض نضع  $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$  ونحصل على المعادلات

$$x_1 + x_2 = 0$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

$$2x_3 = 0$$

والتي بدورها تؤدي الى:  $x_1 = -x_2, x_3 = 0$ . بذلك يكون

$$\text{Ker}T = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = -x_2, x_3 = 0, x_4 = x_4\}$$

بذلك تكون المجموعة  $\{B_1 = (-1, 1, 0, 0), B_2 = (0, 0, 0, 1)\}$  قاعدة الى  $\text{Ker}T$

يمكننا الان اضافة المتجهين  $A_1 = (1, 0, 0, 0), A_2 = (0, 0, 1, 0)$  لكي تكون

المجموعة  $\{A_1, A_2, B_1, B_2\}$  قاعدة الى  $R^4$ .

الان نضع

$$C_1 = T(A_1) = T(1, 0, 0, 0) = (1, 1, 0)$$

$$C_2 = T(A_2) = T(0, 0, 1, 0) = (0, -1, 2)$$

يمكننا الان اضافة المتجه  $D_1 = (1, 0, 0)$  لكي تصبح المجموعة  $\{C_1, C_2, D_1\}$  قاعدة

الى  $R^3$ . الان تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للقواعد اعلاه بالصيغة

$$M_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

وهذه هي الصيغة الاعتيادية المطلوبة.

ملاحظة:

ان اضافة المتجهين  $A_1, A_2$  عملية اختيارية فلو اخترنا متجهين آخرين

مثل  $\{A'_1, A'_2, B_1, B_2\}$  حيث ان المجموعة

تكون قاعدة الى  $R^4$  لما تغيرت المصفوفة وعليه توجد قواعد كثيرة الى  $R^4$  و  $R^3$  التي

تجعل مصفوفة  $T$  بالنسبة لها بالصيغة الاعتيادية.

نحيب الآن على السؤالين المطروحين في نهاية البند السابق حول مسألة تغير القواعد وستكون الاجابة في المبرهنة التالية :

مبرهنة-(2.5.2) :

افرض ان كل من  $M$  و  $M^*$  مصفوفة ذات درجة  $m \times n$ ، وان  $V$  فضاء متجهات ذا بعد  $m$  و  $W$  فضاء متجهات ذا بعد  $n$ . عندئذ تمثل المصفوفتان  $M$  و  $M^*$  التحويل الخطي نفسه  $T:V \rightarrow W$  بالنسبة الى (ربما) زوجين مختلفين من القواعد اذا وقفنا اذا وجدت مصفوفتين قابلتين للقلب  $P$  و  $Q$  بحيث ان :

$$M^* = PMQ^{-1}$$

( لاحظ ان  $P$  مصفوفة  $m \times m$  و  $Q$  مصفوفة  $n \times n$  ).

على وجه الخصوص تكون  $P = Q$  في حالة كون  $V = W$ .

البرهان :

لنفرض اولاً ان المصفوفتين  $M$  و  $M^*$  تمثلان التحويل الخطي نفسه  $T:V \rightarrow W$ . بالنسبة الى (ربما) زوجين مختلفين من القواعد. بذلك تكون لدينا قاعدة  $G = \{A_1, \dots, A_m\}$  الى  $V$  وقاعدة  $H = \{B_1, \dots, B_n\}$  الى  $W$  بحيث ان مصفوفة  $T$  بالنسبة لتلك القواعد تكون  $M$ ، وكذلك يكون لدينا قاعدة  $H^* = \{B_1^*, \dots, B_n^*\}$  الى  $V$  وقاعدة  $G^* = \{A_1^*, \dots, A_m^*\}$  الى  $W$  بحيث ان مصفوفة  $T$  بالنسبة لتلك القواعد تكون  $M^*$ .

المطلوب إيجاد مصفوفتين قابلتين للقلب  $P$  و  $Q$  بحيث ان

$$M^* = PMQ^{-1}$$

لتكن  $P$  مصفوفة الانتقال من القاعدة  $G^*$  الى القاعدة  $G$  و  $Q$  مصفوفة الانتقال من القاعدة  $H^*$  الى القاعدة  $H$ . ليكن  $A$  اي متجه في  $V$  وليكن  $X$  متجه احدائيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $G$  و  $X^*$  متجه احدائيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $G^*$ . الان المبرهنة (1.9.1) والنتيجة (1.9.3) تنصان على ان :

$$X^* = XP^{-1}$$



المبرهنة (2.4.2) تنص على ان متجه احداثيات  $T(A)$  بالنسبة للقاعدة  $H$  يكون  $XM$  ، ومتجه احداثياته بالنسبة للقاعدة  $H^*$  سوف يكون مساوياً الى  $X^*M^*$  . بما ان  $Q$  هي مصفوفة الانتقال من القاعدة  $H^*$  الى القاعدة  $H$  . اذن المبرهنة (1.9.1) والنتيجة (1.9.3) تنصان على ان :

$$XM = X^*M^*Q$$

بالتعويض عن  $X^*$  نحصل على العلاقة :

$$XM = X P^{-1}M^*Q$$

العلاقة اعلاه صحيحة لجميع المتجهات  $X$  . هذا يعني تساوي المصفوفتين :

$$M = P^{-1}M^*Q$$

أو

$$M^* = PMQ^{-1}$$

بما ان كل من  $P, Q$  مصفوفة انتقال فعليه تكون كل منها قابلة للقلب . على العكس لو فرضنا ان  $M^* = PMQ^{-1}$  ، حيث ان كل من  $P, Q$  مصفوفة قابلة للقلب . علينا ان ننشئ تحويلاً خطياً  $W \rightarrow T: V \rightarrow W$  وزوجين من القواعد الى  $V$  و  $W$  بحيث ان  $M$  تمثل  $T$  بالنسبة لزوج و  $M^*$  تمثل  $T$  بالنسبة للزوج الآخر . لهذا الغرض نختار اولاً اي قاعدة  $G = \{A_1, \dots, A_m\}$  الى  $V$  وأي قاعدة  $H = \{B_1, \dots, B_n\}$  الى  $W$  . ليكن الان  $T: V \rightarrow W$  ذلك التحويل الخطي الذي مصفوفته بالنسبة لزوج القواعد اعلاه تكون  $M$  .

( راجع مثال 3 من البند 2.4 ) . الان نستخدم المصفوفتين  $Q, P$

للحصول على قواعد جديدة

$$H^* = \{B_1^*, \dots, B_n^*\}, G^* = \{A_1^*, \dots, A_m^*\}$$

بحيث تكون  $P$  مصفوفة الانتقال من القاعدة  $G^*$  الى القاعدة  $G$  (  $G^*$  تكتب بدلالة  $G$  ) و  $Q$  مصفوفة الانتقال من القاعدة  $H^*$  الى القاعدة  $H$  (  $H^*$  تكتب بدلالة  $H$  ) .

المطلوب الان ان نبرهن على ان المصفوفة  $M^*$  التي تساوي المصفوفة  $PMQ^{-1}$  بالفرض ، هي مصفوفة التحويل الخطي  $T$  الذي انشأناه لكن بالنسبة لزوج القواعد الجديد  $G^*$  الى  $V$  و  $H^*$  الى  $W$  . لنفرض اولاً ان مصفوفة  $T$  بالنسبة لزوج

القواعد  $G^*$  ،  $H^*$  تكون  $N$  . حسابات مماثلة للتي اجريناها في الجزء الاول من البرهان تظهر ان :  $N = PMQ^{-1}$  .

- بما ان  $M^* = PMQ^{-1}$  بالفرض . اذن  $M^* = N$  وعليه تكون  $M^*$  مصفوفة التحويل الخطي  $T$  بالنسبة لزوج القواعد  $G^*$  ،  $H^*$  .

( و . ه . م . ٠ ) مثال (2) :

اذا كان  $T: R^3 \rightarrow R^2$  تحويلاً خطياً معرّفاً بالصيغة .

$$T(x, y, z) = (x - y, y + 3z)$$

فجد كل مما يلي :

- ( أ ) المصفوفة  $M$  التي تمثل  $T$  بالنسبة للقواعد الطبيعية .
- ( ب ) المصفوفة  $M^*$  التي تمثل  $T$  بالنسبة للقاعدة  $\{(1,1,0), (1,-1,0)\}$  الى  $R^2$  والقاعدة  $\{(1,2), (2,1)\}$  الى  $R^3$  .
- ( ج ) مصفوفتان قابلتان للقلب  $P, Q$  بحيث ان  $M^* = PMQ^{-1}$  .

الحل :

( أ ) القاعدة الطبيعية الى  $R^3$  تتكون من المتجهات :

$$A_1 = (1,0,0), A_2 = (0,1,0), A_3 = (0,0,1)$$

والقاعدة الطبيعية الى  $R^2$  تتكون من المتجهات :

$$B_1 = (1,0), B_2 = (0,1)$$

لايجاد المصفوفة  $M$  نلاحظ :

$$T(A_1) = T(1,0,0) = (1,0) = (1) B_1 + (0) B_2$$

$$T(A_2) = T(0,1,0) = (-1,1) = (-1) B_1 + (1) B_2$$

$$T(A_3) = T(0,0,1) = (0,3) = (0) B_1 + (3) B_2$$

عليه تكون المصفوفة  $M$  كما يلي :

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

(ب) ضع

$$A_1^* = (1,1,0), A_2^* = (1,-1,0), A_3^* = (0,0,1)$$

$$B_1^* = (1,2), B_2^* = (2,1)$$

عليه يكون لدينا:

$$T(A_1^*) = T(1,1,0) = (0,1) = (2/3)B_1^* + (-1/3)B_2^*$$

$$T(A_2^*) = T(1,-1,0) = (2,-1) = (-4/3)B_1^* + (5/3)B_2^*$$

$$T(A_3^*) = T(0,0,1) = (0,3) = (2)B_1^* + (-1)B_2^*$$

اذن تكون مصفوفة T بالنسبة لزوج القواعد  $\{A_1^*, A_2^*, A_3^*\}$ ,

كما يلي  $\{B_1^*, B_2^*\}$ :

$$M^* = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -4/3 & 5/3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

(ج) لغرض ايجاد المصفوفتين P، Q اللتين تحققان  $M^* = PMQ^{-1}$  نراجع

برهان المبرهنة (2.5.2) فنرى على ان:

P مصفوفة الانتقال من القاعدة الجديدة  $\{A_1^*, A_2^*, A_3^*\}$  الى

القاعدة القديمة (القاعدة الطبيعية).

Q تكون مصفوفة الانتقال من القاعدة الجديدة  $\{B_1^*, B_2^*\}$  الى

القاعدة القديمة (القاعدة الطبيعية).

وعليه يكون لدينا:

$$A_1^* = (1,1,0) = (1) A_1 + (1) A_2 + (0) A_3$$

$$A_2^* = (1,-1,0) = (1) A_1 + (-1) A_2 + (0) A_3$$

$$A_3^* = (0,0,1) = (0) A_1 + (0) A_2 + (1) A_3$$

اذن

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

وليجاد Q نكتب القاعدة  $\{B_1^*, B_2^*\}$  بدلالة القاعدة الطبيعية

$$B_1^* = (1,2) = (1) B_1 + (2) B_2$$

$$B_2^* = (2,1) = (2) B_1 + (1) B_2$$


$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

واذن


$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{bmatrix}$$

الان حسابات بسيطة تظهر ان  $M^* = PMQ^{-1}$ .

المخطط التالي يذكر الطالب بالنتائج التي حصلنا عليها.




المخطط اعلاه يؤدي الى المخططين المتكافئين :



يعتبر من G بأنه لا يسهل الحصول على العلاقة

$$M = P^{-1} M^* Q$$



يعتبر من G\* باتجاه الأسهم تحصل على العلاقة

$$M^* = P M Q^{-1}$$

- 1 — تذكر دائماً انه اذا كانت لديك مصفوفة انتقال من قاعدة رقم (1) الى قاعدة رقم (2). فإن مقلوب تلك المصفوفة تكون مصفوفة الانتقال من قاعدة رقم (2) الى قاعدة رقم (1).
- 2 — لا يمكنك بصورة عامة عكس اسهم  $M^*$ ,  $M$  وذلك لانها بصورة عامة مصفوفات غير قابلة للقلب.

تمارين (2.5)

1 — جد قواعد تجعل مصفوفة كل من التحويلات الخطية التالية مصفوفة بالصيغة الاعتيادية .

.  $T(x,y,z) = (x + 2y, -z + 5x)$  ،  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ( أ )

.  $T(x,y) = \begin{pmatrix} x+y & -x \\ -y & x-y \end{pmatrix}$  ،  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$  ( ب )

.  $T(z_1, z_2) = (z_1 - z_2, 2z_1 - 2z_2, 0)$  ،  $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^3$  ( ج )

.  $T(a + bx + cx^2) = (a + b)x^3$  ،  $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$  ( د )

2 — اذا كان  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$  تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة :

$T(x,y) = (x + y, 2x - y, 3x + 4y, 0)$

( أ ) جد المصفوفة  $M$  التي تمثل  $T$  بالنسبة للقواعد الطبيعية .

( ب ) جد قاعدة الى  $\mathbb{R}^2$  وقاعدة الى  $\mathbb{R}^4$  بالنسبة لهما تكون مصفوفة  $T$  ولتكن  $M^*$  بالصيغة العمودية .

( ج ) جد مصفوفتين  $P, Q$  قابلتين للقلب تحققان  $M^* = PMQ^{-1}$  .

3 — جد مصفوفات قابلة للقلب  $P, Q$  بحيث تكون  $PMQ^{-1}$  بالصيغة

، حيث  $I_r$  المصفوفة المحايدة .  $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 3 & 4 & 11 & 2 \end{pmatrix}$  ( ب ) ،  $M = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -1 & -3 & 8 \\ 4 & -3 & -7 \\ 1 & 12 & -3 \end{pmatrix}$  ( أ )

4 \_ اذا كان  $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_4(\mathbb{R})$  التحويل الخطي المعرف بالصيغة:

$$T(a + bx + cx^2) = ax^2 + bx^3 + cx^4$$

- (أ) جد المصفوفة  $M$  التي تمثل  $T$  بالنسبة للقواعد الطبيعية .  
(ب) جد قواعد تجعل من مصفوفة  $T$  بالنسبة لها بالصيغة الاعتيادية .  
(ج) جد مصفوفتين  $P, Q$  قابلتين للقلب تحققان  $PMQ^{-1}$  تكون بالصيغة الاعتيادية .

## الفصل الثالث

### انظمة المعادلات الخطية

### Systems of Linear Equations

#### (3.0) مقدمة

ان انظمة المعادلات الخطية اداة معبرة في كثير من المواضيع كالفيزياء والهندسة الكهربائية والعلوم الاقتصادية بالاضافة الى اهميتها الكبيرة في الرياضيات . يمكن كتابة نظام للمعادلات الخطية بالصيغة :-

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

(\*)

$$\begin{array}{c} \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}$$

حيث ان  $x_1, \dots, x_n$  تمثل المجاهيل التي يتوجب ايجادها . الاعداد  $a_{ij}$  ,  $i: 1, \dots, m, j: 1, \dots, n$  من الممكن ان تكون اعدادا في اي حقل لكننا سنعتبرها اعداداً حقيقية وذلك للسهولة لكن القاري المهتم يستطيع ان يضع جميع النتائج التي سنحصل عليها باللغة العامة عندما تكون  $a_{ij}$  عناصراً في اي حقل كان . هذه الاعداد تسمى معاملات النظام (\*). كذلك فان  $b_1, \dots, b_m$  تكون اعداداً حقيقية .



ان اي حل للنظام (\*) اعلاه عبارة عن قوس مرتب  $(S_1, \dots, S_n)$  من الاعداد تحقق جميع المعادلات في النظام، اي ان :

$$a_{11}S_1 + \dots + a_{1n}S_n = b_1$$

$$a_{21}S_1 + \dots + a_{2n}S_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}S_1 + \dots + a_{mn}S_n = b_m$$

ان عبارة حل نظام المعادلات (\*) تعني ايجاد جميع الحلول الممكنة. المثال التالي يذكرنا بما كنا نمارسه في المدارس الثانوية والمراحل الاولى من الجامعة.

مثال (1) :

حل النظام الخطي :

$$x_1 - x_2 + x_3 = 2$$

$$3x_1 + x_2 - x_3 = 1$$

$$x_1 + 3x_2 - 3x_3 = -3$$

الحل : من معلوماتنا السابقة يتضح ان احدى طرق الحل تكون كما يلي :  
اولاً نرقم المعادلات

$$x_1 - x_2 + x_3 = 2 \quad (1)$$

$$3x_1 + x_2 - x_3 = 1 \quad (2)$$

$$x_1 + 3x_2 - 3x_3 = -3 \quad (3)$$

نضرب المعادلة الاولى في  $(-3)$  ونضيفها الى المعادلة الثانية لنحصل على المعادلة (2) ثم نطرح المعادلة الاولى من المعادلة الثالثة لنحصل على المعادلة (3).

$$x_1 - x_2 + x_3 = 2 \quad (1)$$

$$4x_2 - 4x_3 = -5 \quad (2)'$$

$$4x_2 - 4x_3 = -5 \quad (3)'$$

بحذف المعادلة (3) التي تساوي المعادلة (2) نحصل على :

$$x_1 - x_2 + x_3 = 2$$

$$x_2 - x_3 = -5/4$$

$$x_1 = x_2 - x_3 + 2 \quad \text{وهذا يكفيء :}$$

$$x_2 = x_3 - 5/4$$

$$x_1 = 3/4 \quad \text{او}$$

$$x_2 = x_3 - 5/4$$

عندئذ تكون الحلول بالصيغة :  $(3/4, x_3 - 5/4, x_3)$ ، حيث ان  $x_3$  تتغير عشوائياً .  
فمثلاً :  $(3/4, 0, 5/4), (3/4, -1/4, 1)$  تعتبر حلولاً لكن  $(1, 2, 3)$  و  $(3/4, 2, 1)$  ليست حلولاً .

ليست جميع الانظمة الخطية قابلة للحل فمثلاً النظام :

$$x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

$$2x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 5$$

غير قابل للحل وذلك لأنه بعد ضرب المعادلة الاولى في 2 نحصل على الطرف الايسر من المعادلة الثانية وهذا يؤدي الى ان  $5 = 2$  وهذا غير ممكن . لذلك يجب علينا معرفة الشروط التي تجعل النظام الخطي قابلاً للحل وبعدها نظور طرقاً لايجاد الحلول وهذا ماسندرسه في البندين (3,1) و (3,2) .

### (3.1) الصيغة المصفوية للانظمة الخطية

## Matrix Form For Linear Equations

لنكتب المصفوفات التالية :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

المصفوفة A تسمى مصفوفة المعاملات للنظام الخطي (\*) والمصفوفة B تسمى مصفوفة الثوابت. عندئذ يمكننا كتابة النظام الخطي (\*) بصيغة بسيطة كمعادلة مصفوفية:

$$AX = B \quad \dots \dots \quad (\#)$$

هذه الصيغة تعرف بالصيغة المصفوفية للنظام الخطي (\*).

الآن نوضح كيف ان المعادلة (#) تعطينا تحويلاً خطياً  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  ويدراسة ذلك التحويل الخطي نستطيع معرفة معلومات عن قابلية حل النظام الخطي (\*).

لنأخذ مدورة طرقي المعادلة (#) فنحصل على

$$X^T A^T = B^T$$

وبالتفصيل نحصل على المعادلة:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (b_1, \dots, b_m) (\#)^T$$

باعتبار المصفوفة  $A^T$  ذات الدرجة  $n \times m$  مصفوفة تحويل خطي  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  بالنسبة للقواعد الطبيعية نحصل على البرهنة التالية.

مبرهنة (3.1.1) :

النظام الخطي (\*) يكون قابلاً للحل اذا فقط اذا كان المتجه  $(b_1, \dots, b_m)$  متتمياً الى صورة التحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  الناتج من المصفوفة  $A^T$  بالنسبة للقواعد الطبيعية . اي اذا فقط اذا  $(b_1, \dots, b_m) \in \text{Im}T$  .

البرهان :

نلاحظ اولاً انه باستعمال القاعدة الطبيعية الى  $\mathbb{R}^k$  فان كل متجه يساوي متجه احداثياته وذلك لكل  $k$  .  
بمراجعة المبرهنة (2.4.2) نحصل على مايلي :

اذا كان  $Z = (x_1, \dots, x_n)$  متجهاً في  $\mathbb{R}^n$  فان متجه احداثياته بالنسبة للقاعدة الطبيعية يكون مساوياً له وبالتالي يكون متجه احداثيات  $T(Z)$  مساوياً الى  $ZA^T$  ( تذكر ان  $A^T$  مصفوفة  $T$  بالنسبة للقواعد الطبيعية ) . لكن متجه احداثيات  $T(Z)$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية يكون مساوياً له . اي ان

$$T(Z) = ZA^T$$

لكن النظام الخطي (\*) هو نفسه المعادلة  $\#$  واي حل للمعادلة  $\#$  يكون حلاً للمعادلة  $(\#)^T$  وبالعكس . هذا يعني ان النظام (\*) يكون قابلاً للحل اذا فقط اذا وجد متجه  $Z = (x_1, \dots, x_n)$  في  $\mathbb{R}^n$  يحقق  $ZA^T = (b_1, \dots, b_m)$  ، اي ان

$$T(Z) = (b_1, \dots, b_m)$$

هذا يعني ان النظام (\*) يكون قابلاً للحل اذا فقط اذا  $(b_1, \dots, b_m) \in \text{Im}T$

( و . هـ . م )

المبرهنة اعلاه تبدو جيدة لكن من الناحية النظرية حيث انه كيف يمكننا معرفة ما اذا كان المتجه  $(b_1, \dots, b_m)$  متتمياً الى  $\text{Im}T$  ام غير منتم وذلك برؤية مصفوفة المعاملات  $A$  . الحقيقة ان الاجابة بسيطة . لنحاول اولاً ادخال بعض الرموز . ضع

$$A_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})$$

$$A_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})$$

هذه عبارة عن  $n$  من المتجهات في  $R^m$  وهي تمثل اعمدة المصفوفة  $A$ .  
اي انها تمثل صفوف المصفوفة  $A^T$  وبما ان  $A^T$  اعتبرت مصفوفة تحويل خطي  
 $T: R^n \rightarrow R^m$  بالنسبة للقواعد الطبيعية فذلك يحتم الحصول على :

$$T(E_1) = A_1$$

$$T(E_2) = A_2$$

$$\vdots$$

$$T(E_n) = A_n$$

حيث ان  $E_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$  متجهات القاعدة الطبيعية . الان  
نلاحظ ان مجموعة المتجهات  $\{T(E_1), \dots, T(E_n)\}$  تولد  $ImT$  وذلك لان  
 $\{E_1, \dots, E_n\}$  قاعدة الى  $R^n$  و  $T$  تحويلاً خطياً . عليه فان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_n\}$  تولد  
 $ImT$  وحتى يكون المتجه  $(b_1, \dots, b_m)$  منتماً الى  $ImT$  يجب ان يكون تركيباً خطياً  
من المتجهات  $A_1, \dots, A_n$ .

ماتوصلنا اليه ، يمكن التعبير عنه بصورة افضل بعد تقديم التعريف التالي .

تعريف :

اذا كانت  $A = (a_{ij})$  مصفوفة ذات درجة  $m \times n$  فان فضاء الاعمدة (Column Space) للمصفوفة  $A$  يكون ذلك الفضاء الجزئي من  $R^m$  المولد من قبل اعمدة المصفوفة :

$$A_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})$$

$$A_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2})$$

$$A_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})$$

التي تعتبر  $n$  من المتجهات في  $R^m$ .

مثال (1) : ماهي المتجهات التي تمثل اعمدة المصفوفة :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

وما هو فضاء الاعمدة للمصفوفة اعلاه .

الحل : المتجهات التي تمثل اعمدة المصفوفة هي المتجهات :

$$A_1 = (2, -1, 0, 4)$$

$$A_2 = (1, 1, 1, 0)$$

في  $R^4$ . ان فضاء الاعمدة للمصفوفة  $A$  هو الفضاء الجزئي من  $R^4$  الذي يحتوي على كل التركيبات الخطية للمتجهين اعلاه . اي

$$aA_1 + bA_2 = (2a + b, -a + b, b, 4a)$$

وهذا يعني ان فضاء الاعمدة الذي نرمز له بالرمز  $N$  يكون :

$$N = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = (1/2)x_4 + x_3, x_2 = (-1/4)x_4 + x_3 \}$$

$$N = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) : 2x_1 - x_4 - 2x_3 = 0, 4x_2 + x_4 - 4x_3 = 0 \}$$

من النقاش اعلاه يمكننا الان تدوين النتائج التي حصلنا عليها بالمبرهنة

التالية .

مبرهنة (3.1.1) :

افرض ان

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

نظام معادلات خطية . ضع

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

عندئذ يكون النظام اعلاه قابلاً للحل اذا وفقط اذا كان المتجه  $B = (b_1, \dots, b_m)$  في فضاء الاعمدة للمصفوفة  $A$ ، اي ان المتجه  $B$  يمكن أن يكتب كتركيب خطي من المتجهات التي تمثل اعمدة المصفوفة  $A$ .

مثال (2) :

قرر فيما اذا كان النظام

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 1$$

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = -3$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2$$

قابلاً للحل .

الحل : ان قابلية النظام اعلاه للحل تعتمد على مدى امكانية كتابة المتجه  $(1, -3, 2)$  كتركيب خطي من المتجهات التي تمثل اعمدة مصفوفة النظام

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

والتي تكون :

$$A_1 = (1, -1, 1), A_2 = (1, 1, 3), A_3 = (2, -2, 2), A_4 = (-1, -1, -3)$$

لاحظ ان  $A_3 = 2A_1$  و  $A_4 = -A_2$  وبالتالي يكون فضاء الاعمدة مولداً من قبل المتجهين  $A_1, A_2$ . فاذا كان

$$(1, -3, 2) = a(1, -1, 1) + b(1, 1, 3)$$

$$a + b = 1 \quad \text{فان}$$

$$-a + b = -3$$

$$a + 3b = 2$$

نلاحظ أن ما يحقق المعادلتين الأولىين اعلاه لا يحقق الثالثة وهذا يناقض مفهوم الحل الذي ذكرناه. اذن النظام اعلاه غير قابل للحل.

بعد هذا الاستعراض العام نجريء دراستنا للمعادلات الخطية الى جزئين فنناقش أولاً أنظمة المعادلات المتجانسة ثم أنظمة المعادلات غير المتجانسة.

(3.2) : أنظمة المعادلات الخطية المتجانسة.

## Systems of Homogeneous Linear Equations

تعريف

نظام المعادلات الخطية  $AX = B$  (مكتوب بالصيغة المصفوية) يسمى نظاماً متجانساً اذا فقط اذا كان



$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

سنناقش في هذا البند حلول النظام المتجانس .

مبرهنة (3.2.1) :

افرض ان  $AX=0$  نظام معادلات خطية متجانس حيث ان  $A$  مصفوفة ذات درجة  $n \times m$  و  $X$  مصفوفة المجاهيل ذات الدرجة  $1 \times n$ . عندئذ تكون مجموعة الحلول  $S = \{(S_1, \dots, S_n)\}$  لهذا النظام عبارة عن فضاء جزئي من  $R^n$  واذا كان  $T: R^n \rightarrow R^m$

التحويل الخطي الذي مصفوفته بالنسبة للقواعد الطبيعية تكون  $A^T$  فان

$$S = \text{Ker } T$$

البرهان :

اذا كان  $X_1$  و  $X_2$  حلاً للنظام  $AX=0$  فان  $A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = 0 + 0 = 0$  واذا كان  $r$  اي عدد حقيقي فان

$$A(rX_1) = rAX_1 = r \cdot 0 = 0$$

عليه يكون كل من  $X_1 + X_2$  و  $rX_1$  حلاً للنظام وبالتالي تكون مجموعة حلول النظام عبارة عن فضاء جزئي من  $R^n$ .

اذا لاحظنا ان  $AX=0$  اذا فقط اذا  $X^T A^T = 0$  فيكون  $X^T = (S_1, \dots, S_n)$  حلاً للنظام  $X^T A^T = 0$  اذا فقط اذا كان  $T(S_1, \dots, S_n) = (0, \dots, 0)$ ، اي ان المتجه  $(S_1, \dots, S_n)$  ينتمي الى  $\text{Ker } T$  (راجع المبرهنة (3.1.1)).

( و . ه . م )

ندرج النتيجة البديهية التالية

نتيجة (3.2.2) :

المتجه الصفري  $(0,0,\dots,0)$  يكون دائماً حلاً لأي نظام متجانس . وهذا الحل يسمى بالحل التافه (Trivial Solution) .  
بذلك يكون من المهم البحث عن حلول غير تافهة (Non - Trivial Solutions) لانظمة المعادلات الخطية المتجانسة . وسوف نلخص حل هذه المسألة بالبرهنة التالية .

مبرهنة (3.2.3) :

النظام المتجانس

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

⋮

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$

الذي يحتوي على  $m$  من المعادلات و  $n$  من المجاهيل لديه دائماً الحل التافه  $(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0)$  وإذا كانت  $r =$  بعد فضاء الأعمدة لمصفوفة النظام فإن النظام اعلاه يمتلك  $n-r$  من الحلول المستقلة خطياً والتي تكون حلولاً غير تافهة .

( تذكر دائماً ان اي حل لأي نظام معادلات خطية عبارة عن متجه في  $R^n$  ) وعلى وجه الخصوص ، اذا كانت  $r = n$  فإن للنظام فقط الحل التافه .

البرهان :

الجزء الاول حول الحل التافه فبديهي . بمراجعة المبرهنة (3.1.1) يتضح أن فضاء الأعمدة الذي هو فضاء " جزئي " من  $R^m$  يساوي تماماً صورة التحويل الخطي  $T: R^n \rightarrow R^m$  الذي مصفوفته بالنسبة للقواعد الطبيعية تكون  $A^T$  حيث ان  $A$

هي مصفوفة النظام. هذا يعني ان  $r = \dim(\text{Im}T)$ ، اي ان  $r$  تساوي رتبة التحويل الخطي  $T$ . لكن

$$r = \dim(\text{Im}T) = \dim(\text{Ker}T) + \dim(\text{Im}T) = n - r + r = n$$

$$r = n - r \Rightarrow 2r = n \Rightarrow r = \frac{n}{2}$$

لكن صفرية  $T = \dim(\text{Ker}T) = n - r$  و  $\text{Ker}T = \text{فضاء الحلول للنظام المتجانس حسب المبرهنة (3.2.1)}$ .

اذن يكون هنالك  $n - r$  من الحلول غير التافهة وهو ما يساوي بعد فضاء الحلول. عندما  $n = r$  فان  $\text{Ker}T = \{0\}$  وبذلك يكون الحل التافه هو الحل الوحيد.

( و . هـ . م )

نتيجة (3.2.4) :

اذا كان  $m < n$ ، اي ان عدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل فيجب وجود حلول غير تافهة للنظام البرهان :

بما ان التحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  فان

$$r = \dim(\text{Im}T) \leq m$$

عليه يكون  $n > m \geq r$  وبالتالي يكون  $n - r$  عدداً موجباً وهذا يعني وجود حلول غير تافهة.

( و . هـ . م )

نتيجة (3.2.5) :

اذا كان  $m = n$ ، فان النظام لديه حل غير تافه اذا فقط اذا كانت مصفوفته  $A$  مصفوفة غير قابلة للقلب.

البرهان :

يكون للنظام  $AX=O$  حل غير تافه اذا فقط اذا كان  $\text{Ker}T \neq \{O\}$  وذلك حسب المبرهنة (3.2.3). الان  $R^n \rightarrow T:R^n$  ( تذكر  $m=n$  ). بذلك يكون  $\text{Ker} \neq \{O\}$  اذا فقط اذا لم يكن  $T$  تشاكلاً وذلك حسب النتيجة (2.3.4) وهذا يكافئ كون مصفوفة  $T$  بالنسبة لاي زوج من القواعد مصفوفة غير قابلة للقلب وذلك حسب النتيجة (2.4.4). اي ان  $A^T$  مصفوفة غير قابلة للقلب وعليه تكون  $A$  مصفوفة غير قابلة للقلب .

( و . ه . م )

ملاحظة

1 — نذكر القاريء بان المصفوفة المربعة  $A$  تكون غير قابلة للقلب اذا فقط اذا  $|A|=0$  . كذلك فان  $|A^T|=|A|$  .

2 — ان الحالة التي يكون بها عدد المعادلات اكبر من عدد المجاهيل ( $m > n$ ) تختم على ان ( $m-n$ ) من المعادلات ليست جديدة وانما تعتمد خطياً على باقي المعادلات وذلك لانه لايمكننا الحصول على اكثر من  $m$  من المتجهات المستقلة خطياً في  $R^m$  .

ان جميع النتائج اعلاه عبارة عن وصف لمجموعة حلول النظام المتجانس ، لكن كيف يمكننا « ايجاد » جميع الحلول لنظام متجانس يُعطى لنا ؟ . الطريقة الاساسية تسمى طريقة كاوس للحذف (Gauss elimination) وتتلخص باختزال النظام الى نظام اخر مكافئ له ( اي لديه الحلول نفسها ) لكن هذا النظام المكافئ يكون بسيطاً ويمكن رؤية الحلول بسهولة .

المفتاح للطريقة اعلاه يكون بملاحظة ان اجراء احدى العمليات التالية على اي نظام معادلات خطية سوف ينتج نظاماً مكافئاً ، بغض النظر ان كان النظام متجانساً ام غير متجانس .

1 — استبدال معادلتين .

2 — جمع مضاعف معادلة مع معادلة اخرى .

3 — ضرب معادلة بعدد غير صفري .

انه لمن الواضح ان عملية من نوع (1) اعلاه لا تؤثر على مجموعة حلول النظام . ان عملية من نوع (2) لا تؤثر على مجموعة حلول اي نظام خطي مثل :

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \quad (*)$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

فلو افترضنا ان المعادلة  $i$  ضربت بالعدد  $t$  ثم جمعت مع المعادلة  $j$  لتحول النظام اعلاه الى النظام :

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$(a_{j1} + ta_{i1})x_1 + \dots + (a_{jn} + ta_{in})x_n = b_j + tb_i \quad (\#)$$

$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

واضح ان اي حل للنظام (\*) يكون حلاً للنظام (#) ( اضافة مقادير متساوية لآخرى متساوية تنتج متساوية ) . على العكس لو كان  $X = (S_1, \dots, S_n)$  حلاً للنظام (#) كتحقق كل معادلة من معادلات (\*) ماعدا ربما المعادلة  $j$  . تحقيق  $X$  للمعادلتين  $j$  و  $i$  من النظام (#) ينتج :

$$a_{i1}S_1 + \dots + a_{in}S_n = b_i$$

$$(a_{j1} + ta_{i1})S_1 + \dots + (a_{jn} + ta_{in})S_n = b_j + tb_i$$

الان لو ضربنا المعادلة الاولى بـ  $(-t)$  وجمعنا الناتج مع المعادلة الثانية لحصلنا على

$$a_{j1}S_1 + \dots + a_{jn}S_n = b_j$$

وبذلك يحقق  $X = (S_1, \dots, S_n)$  المعادلة  $Z$  في النظام (\*) .

ان برهنة كون عملية من النوع (3) لاتغير حلول النظام تترك للطالب

كتمرين .

يمكن تلخيص طريقة كاوس بالخطوات التالية :

الخطوة الاولى : بأعادة ترتيب المعادلات ان اقتضت الضرورة اجعل المعادلة الاولى

معادلة محتوية على  $x_1$  .

الخطوة الثانية : اضرب المعادلة الاولى في معكوس معامل  $x_1$  لكي تجعل معامل  $x_1$

مساوياً للواحد في المعادلة الاولى الجديدة .

الخطوة الثالثة : احذف  $x_1$  من بقية المعادلات .

الخطوة الرابعة : ثبت المعادلة الاولى واعد الخطوات الثلاثة اعلاه بالنسبة الى  $x_2$  .

الخطوة الخامسة : استمر هكذا الى ان تتوقف العملية .

يمكن توضيح الطريقة اعلاه بالمثال التالي :

مثال (1) : ناقش حلول النظام المتجانس :

$$2x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$2x_1 + x_2 + 5x_3 = 0$$

$$-x_1 + 4x_2 + x_3 = 0$$

الحل . نلاحظ هنا ان المعادلة الاولى لا تحتوي على  $x_1$  لذلك نعيد ترتيب المعادلات ومن

الافضل اختيار المعادلة التي يكون بها معامل  $x_1$  مساوياً للواحد .

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \dots\dots (1)$$

$$2x_2 - x_3 = 0 \dots\dots (2)$$

$$2x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \dots\dots(3)$$

$$-x_1 + 4x_2 + x_3 = 0 \dots(4)$$

نبدأ الآن بتطبيق الخطوة الثالثة وهي حذف  $x_1$  من بقية المعادلات .

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \dots\dots (1)$$

$$2x_2 - x_3 = 0 \dots\dots (2)$$

$$5x_2 - x_3 = 0 \dots\dots (3)' = -2(1) + (3)$$

$$2x_2 + 4x_3 = 0 \dots\dots (4)' = (1) + (4)$$

حيث ان  $(3)' = -2(1) + (3)$  تعني ان المعادلة الثالثة الجديدة حصلنا عليها بعد ضرب المعادلة الاولى في -2 وجمعها مع المعادلة (3) . بضرب المعادلة الثانية في 1/2 نحصل على النظام .

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \dots\dots(1)$$

$$x_2 - (1/2)x_3 = 0 \dots\dots(2)$$

$$5x_2 - x_3 = 0 \dots\dots(3)$$

$$2x_2 + 4x_3 = 0 \dots\dots(4)$$

نبدأ الآن بحذف  $x_2$  من المعادلتين (3) و (4) فنحصل على النظام

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \dots (1)$$

$$x_2 - (1/2)x_3 = 0 \dots (2)$$

$$(3/2)x_3 = 0 \dots -5(2) + (3)$$

$$5x_3 = 0 \dots -2(2) + (4)$$

المعادلتان الاخيرتان تؤديان الى  $x_3 = 0$  وبالتعويض في المعادلة الثانية نحصل على  $x_2 = 0$  وبالتعويض في المعادلة الاولى نحصل على  $x_1 = 0$  . هذا يعني ان النظام يمتلك فقط الحل التافه ( الحل الصفري ) .

مثال (2) :

اوجد قاعدة لفضاء الحلول للنظام المتجانس

$$x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \dots\dots(1)$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_4 = 0 \dots(2)$$

$$-x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \dots (3)$$

الحل: نلاحظ هنا ان عدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل وعليه فان النتيجة (3.2.4) تؤكد وجود حلول غير تافهة للنظام اعلاه.

نحذف  $x_1$  من المعادلتين الثانية والثالثة فنحصل على النظام المكافئ

$$x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \dots (1)$$

$$x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \dots -2(1) + (2)$$

$$4x_2 + 4x_3 = 0 \dots (1) + (2)$$

الآن نثبت المعادلتين الاولى والثانية ثم نحذف  $x_2$  من المعادلة الثالثة فنحصل على النظام المكافئ.

$$x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \dots (1)$$

$$x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \dots (2)$$

$$-4x_3 + 12x_4 = 0 \dots (3)$$

عملية الحذف تتوقف الان . من المعادلة الاخيرة نحصل على  $x_3 = 3x_4$  وبالتعويض في المعادلة الثانية نحصل على :

$$x_2 = -2x_3 + 3x_4 = -2(3x_4) + 3x_4 = -3x_4$$

وبالتعويض في المعادلة الاولى نحصل على :

$$x_1 = -x_2 + x_3 - x_4 = -(-3x_4) + 4x_4 - x_4 = 5x_4$$

نلاحظ هنا ان جميع المتغيرات قد كتبت بدلالة المتغير  $x_4$  . عليه يمكن وصف فضاء الحلول كما يلي :

$$S = \{(5x_4, -3x_4, 3x_4, x_4) : x_4 \in \mathbb{R}\}$$

عند التعويض عن  $x_4$  باي قيمة غير صفرية ولتكن مثلاً  $x_4 = 1$  نحصل على الحل  $X = (5, -3, 3, 1)$  الذي يكون قاعدة للفضاء  $S$ .



تمارين (3.2)

1 — جد فضاء الحلول لكل من الأنظمة المتجانسة التالية :

$$x-2y+z=0 \quad : (أ)$$

$$-3x+4y-2z+w=0$$

$$y+3z-4w=0$$

$$x+2y+3z=0 \quad : (ب)$$

$$2x-y-5z=0$$

$$x+7y+14z=0$$

$$x-8y-19z=0$$

$$3x_1+2x_2+x_3-x_4-x_5=0 \quad : (ج)$$

$$x_1-7x_2+x_3+x_4-3x_5=0$$

$$2x_1+3x_2-5x_3+x_4+2x_5=0$$

$$x-2y+4z+w=0 \quad : (د)$$

$$3x+4y-z-2w=0$$

$$x+8y-5z-4w=0$$

$$-3x+y-2w=0$$

2 — جد قيم k التي تجعل النظام التالي يمتلك حلاً غير تافهاً .

$$x-2y+z=0$$

$$2x+y-z=0$$

$$-x+ky-4z=0$$

3 — ناقش حلول النظام :

$$x+y+z=0$$

$$x+y-kz=0$$

$$kx - y - z = 0$$

$$x - ky + z = 0$$

وذلك لقيم مختلفه الى k .

4 — جد فضاء الحلول للنظام :

$$2x_1 - 3x_2 - x_3 + x_4 = 0$$

$$3x_1 + 4x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0$$

$$17x_2 - 5x_3 - 9x_4 = 0$$

برهن على وجود حل واحد فقط من الحلول اعلاه يحقق ايضاً نظام المعادلات :

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1$$

$$x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 3$$

5 — جد بعد فضاء الحلول لكل من الانظمة التالية :

$$x + 2y - z = 0$$

( أ )

$$x - y = 0$$

$$3x - 2y + 4z = 0$$

( ب )

$$x - 2y + z + 3w = 0$$

( ج )

$$2x + z - w = 0$$

$$3x + 4z - y + w = 0$$

6 — جد مجموعة حلول كل من الانظمة المتجانسة التالية :

$$x - y + z = 0$$

( أ )

$$x + y = 0$$

$$x + y + z = 0$$

$$2x + 6y - z + w = 0$$

( ب )

$$x - y + z - w = 0$$

$$-x - 3y + 3z + 2w = 0$$

$$\begin{aligned} 3x + y - z &= 0 & (ج) \\ -x + y + z &= 0 \\ 2x - y - 3z &= 0 \\ x - 2y - z &= 0 \end{aligned}$$

### (3.3) انظمة المعادلات الخطية غير المتجانسة Systems of non - homogeneous equations

تعريف :

نظام المعادلات الخطية  $AX=B$  ( مكتوب بالصيغة المصفوفية ) يسمى نظاماً غير متجانساً اذا فقط اذا كان  $B \neq O$ .

لقد لاحظنا في البند (3.2) وعلى وجه التحديد في مبرهنة (3.2.1) ان مجموعة حلول اي نظام متجانس مكون من  $m$  من المعادلات بـ  $n$  من المجاهيل تكون فضاءاً جزئياً من  $R^n$  وهذا يعني ان جمع اي حلين يعطي حلاً جديداً وضرب اي حل بعدد يعطي حلاً. السؤال هنا حول طبيعة حلول النظام غير المتجانس. المبرهنة (3.3.1) ادناه تعطي مايشبه مبرهنة (3.2.1)، حول طبيعة مجموعة حلول النظام غير المتجانس.

مبرهنة (3.3.1) :

اذا كان  $X_0 = (s_1, \dots, s_n)$  حلاً ثابتاً للنظام غير المتجانس  $AX=B$  فان اي حل آخر يجب ان يكون بالصيغة  $X_0 + Y$  حيث  $Y$  اي حل للنظام  $AX=O$ .

البرهان :

بما ان  $X_0$  يكون حلاً للنظام  $AX=B$  اذن  $AX_0=B$ . افرض ان  $Y$  حل للنظام  $AX=O$ . اذن  $AY=O$ . عليه يكون :

$$A(X_0 + Y) = AX_0 + AY = B + O = B$$

بذلك يكون  $X_0 + Y$  حلاً للنظام  $AX = B$ .

هذا يعني ان جمع حل للنظام غير المتجانس مع حل للنظام المتجانس التابع له ينتج حلاً جديداً للنظام غير المتجانس.

لنفرض الان ان  $X_1$  يكون حلاً آخر للنظام  $AX = B$  سوف نبرهن على ان  $X_1 = X_0 + Y$  لبعض  $Y$  حل للنظام  $AX = O$  أولاً لاحظ ان

$$X_1 = X_0 + (X_1 - X_0)$$

$$\text{ضع } Y = X_1 - X_0 \text{ ولاحظ ان}$$

$$AY = A(X_1 - X_0) = AX_1 - AX_0 = B - B = O$$

بذلك يكون  $Y$  حلاً للنظام  $AX = O$  ويحقق  $X_1 = X_0 + Y$ .

(و . هـ . م)

المبرهنة اعلاه تنص على ان ايجاد حل واحد فقط للنظام غير المتجانس  $AX = B$  وليكن  $X_0$  وايجاد جميع حلول النظام المتجانس التابع له  $AX = O$  يتيح لنا وصف جميع حلول النظام غير المتجانس بالصورة:

$$S = \{X_0 + Y : AY = O, AX_0 = B\}$$

$X_0$  يسمى حلاً خاصاً (Particular Solution).  $Y$  يسمى الحل العام للنظام المتجانس (General Solution). عليه فان الحل العام للنظام غير المتجانس يساوي حاصل جمع حل خاص مع حل عام للنظام المتجانس التابع له.

مثال (1):

جد الحل العام للنظام غير المتجانس:

$$x_1 + x_3 + x_5 = 1$$

$$x_2 + x_3 + 2x_5 + x_6 = 2$$

$$x_4 + 3x_5 = 3$$

الحل : لدينا ثلاث معادلات بست متغيرات وهذه المعادلات ببسط صيغة من حيث طريقة كاوس، اي ان  $x_1$  محذوف من المعادلتين الثانية والثالثة و  $x_2$  محذوف من المعادلة الثالثة . بذلك نستطيع ان نجد الحل مباشرة وذلك بكتابة :

$$x_4 = 3 - 3x_5$$

$$x_2 = 2 - x_3 - 2x_5 - x_6$$

$$x_1 = 1 - x_3 - x_5$$

بوضع  $x_3 = x_5 = x_6 = 0$  نحصل على حل خاص وهو

$$X_0 = (1, 2, 0, 3, 0, 0)$$

الآن نحاول إيجاد الحل العام للنظام المتجانس التابع للنظام المعطى .

$$x_1 + x_3 + x_5 = 0$$

$$x_2 + x_3 + 2x_5 + x_6 = 0$$

$$x_4 + 3x_5 = 0$$

$$x_4 = -3x_5$$

الحل يكون

$$x_2 = -x_3 - 2x_5 - x_6$$

$$x_1 = -x_3 - x_5$$

بذلك يكون المتجهات الثلاثة

$$A_1 = (-1, -1, 1, 0, 0, 0)$$

$$A_2 = (-1, -2, 0, -3, 1, 0)$$

$$A_3 = (0, -1, 0, 0, 0, 1)$$

قاعدة لفضاء الحلول للنظام المتجانس . عليه فان الحل العام للنظام غير المتجانس يكون بالصيغة

$$(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6) = (1, 2, 0, 3, 0, 0) + aA_1 + bA_2 + cA_3$$

وهذا يعني ان اي حل للنظام يمكن الحصول عليه باختيار قيم مناسبة

للاعداد  $a, b, c$  .

مثال (2) :

جد الحل العام للنظام غير المتجانس

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 + 2x_5 &= 1 \\2x_1 + 6x_2 - 4x_3 - 2x_4 + 4x_5 &= 2 \\x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 &= -1 \\2x_1 + 6x_2 + x_3 + -x_4 &= 4\end{aligned}$$

الحل: نطبق طريقة كاوس لتبسيط النظام اعلاه. نحذف  $x_1$  من المعادلات الثانية والثالثة والرابعة فنحصل على النظام المكافئ.

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 + 2x_5 &= 1 \\0 &= 0 \\2x_4 - 2x_5 &= -2 \\5x_3 + x_4 - 4x_5 &= 2\end{aligned}$$

والآن نستبدل المعادلة الثانية بالرابعة ونضرب المعادلة الثانية الجديدة بـ  $1/5$  ثم نحذف  $x_3$  من المعادلة الأولى. نتيجة هذا كله تكون:

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 - (3/5)x_4 + (2/5)x_5 &= 9/5 \\x_3 + (1/5)x_4 - (4/5)x_5 &= 2/5 \\2x_4 - 2x_5 &= -2 \\0 &= 0\end{aligned}$$

الآن نضرب المعادلة الثالثة بـ  $1/2$  ثم نستخدم المعادلة الناتجة لحذف  $x_4$  من بقية المعادلات:

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 - (1/5)x_5 &= 6/5 \\x_3 - (3/5)x_5 &= 3/5 \\x_4 - x_5 &= -1 \\0 &= 0\end{aligned}$$

الطريقة تتوقف الآن. لغرض الحصول على حل خاص نعوض عن  $x_5$  بأي قيمة فنحصل على  $x_4$  من المعادلة الثالثة و  $x_3$  من المعادلة الثانية. والآن تعويض آخر عن  $x_2$  بأي قيمة يعطي  $x_1$  من المعادلة الأولى. فعلى سبيل المثال لو اخذنا  $x_5 = 2$  و  $x_4 = -1 + x_5 = 1$   $x_2 = 0$  حصلنا على

$$x_3 = 3/5 + (3/5)x_5 = 9/5$$

$$x_1 = (6/5) - 3x_2 + (1/5)x_5 \\ = 8/5$$

وبذلك يكون  $(8/5, 0, 9/5, 1, 2)$  حلاً خاصاً. ان النظام المتجانس التابع للنظام المعطى والمبسط بطريقة كاوس هو

$$x_1 + 3x_2 - (1/5)x_5 = 0$$

$$x_3 - (3/5)x_5 = 0$$

$$x_4 - x_5 = 0$$

$$x_4 = x_5$$

والحل العام يكون

$$x_3 = (3/5)x_5$$

$$x_1 = -3x_2 + (1/5)x_5$$

بذلك تكون المتجهات

$$A_1 = (-3, 1, 0, 0, 0)$$

$$A_2 = (1/5, 0, 3/5, 1, 1)$$

قاعدة لفضاء حلول النظام المتجانس وعليه يكون الحل العام .

$$(S_1, S_2, S_3, S_4, S_5) = (8/5, 0, 9/5, 1, 2) + aA_1 + bA_2 \\ = (8/5 - 3a + (1/5)b, a, 9/5 + (3/5)b, 1 + b, 2 + b)$$

كما رأينا فان حل اي نظام يتطلب حسابات كثيرة . يمكننا تقليل الجهد الى حد معين بملاحظة انه لاضرورة ولا حاجة لنقل المتغيرات في مراحل طريقة كاوس . الصيغة المصفوفية تسهل هذه العملية .

لو اعطينا نظاماً خطياً  $AX = B$ ، فيمكننا تكوين مصفوفة جديدة

. [A:B]

وذلك باضافة عمود جديد هو B على يمين المصفوفة A وبذلك نحصل

على مصفوفة جديدة تسمى المصفوفة المصعدة للنظام  $(Augmented AX = B)$  Matrix

الآن، العمليات الثلاث السابقة الذكر والتي نستخدمها لتبسيط انظمة المعادلات

سوف تقابل العمليات التالية على المصفوفة المصعدة .

- (1) : استبدال صفين .
- (2) : جمع مضاعف صف مع صف آخر .
- (3) : ضرب صف بعدد غير صفري .

مثال (3)

المصفوفة المصعدة للنظام الخطي في مثال (2) تكون

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & -2 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & -4 & -2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & 1 & -1 & 0 & 4 \end{array} \right]$$

سنحاول اجراء عمليات مماثلة لتلك التي اجريناها في مثال (2) لكن على صفوف المصفوفة المصعدة .

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & -2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - R_1 \\ R_4 - 2R_1 \end{array}$$

حيث ان  $R_2 - 2R_1$  تعني الصف الثاني مضاف اليه (-2) في الصف الاول

وهكذا . نستبدل الصف الثاني بالرابع ثم نقسم الثاني الجديد على 5 .

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & -2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/5 & -4/5 & 2/5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 \\ 1/5 R_4 \\ R_3 \\ R_2 \end{array}$$



$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & -3/5 & 2/5 & 9/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/5 & -4/5 & 2/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 + 2R_2 \\ R_2 \\ (1/2)R_3 \\ R_4 \end{array}$$

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 0 & -1/5 & 6/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3/5 & 3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 + (3/5)R_3 \\ R_2 - (1/5)R_3 \\ R_3 \\ R_4 \end{array}$$

ان النظام الخطي الذي يقابل هذه المصفوفة سيكون

$$x_1 + 3x_2 - (1/5)x_5 = 6/5$$

$$x_3 - (3/5)x_5 = 3/5$$

$$x_4 - x_5 = -1$$

$$0 = 0$$

وهذا هو النظام المبسط نفسه الذي حصلنا عليه في مثال (2) لكن بجهد

اقل حيث اننا لم نكتب المتغيرات في كل مرة .

مثال (4) :

ناقش حلول النظام

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$$

$$-2x_1 - 3x_2 - x_3 = -11$$

$$x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 21$$

الحل : الصفوفة المصعدة للنظام اعلاه

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ -2 & -3 & -1 & -11 \\ 1 & 4 & 4 & 21 \end{array} \right]$$

والان نحري العمليات الصفية : بضرب الصف الاول في (2) و اضافته للصف الثاني ثم ضرب الصف الاول في (-1) و اضافته للصف الثالث نحصل على :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 13 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 + 2R_1 \\ R_3 - R_1 \end{array}$$

بضرب الصف الثاني في (-2) و اضافته للصف الاول ثم للصف الثالث نحصل على

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 - 2R_2 \\ R_2 \\ R_3 - 2R_2 \end{array}$$

بضرب الصف الثالث في (-1) و اضافته الى الصف الثاني ثم جمع الصف الثالث مع الاول نحصل على :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 + R_3 \\ R_2 - R_3 \\ R_3 \end{array}$$

ان النظام الذي يقابل هذه المصفوفة المبسطة يكون

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 3$$

وهذا يعني ان للنظام غير المتجانس حل واحد فقط هو

$$x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$$

مثال (5) :

ناقش حلول النظام الخطي :

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 13$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = -2$$

$$x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 7$$

الحل : المصفوفة المصعدة للنظام اعلاه تكون

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 13 \\ 2 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 4 & 7 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array}$$

بضرب الصف الاول في (-2) واضافته للصف الثاني ثم ضرب الصف الاول في (-1) واضافته الى الصف الثالث نحصل على :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 13 \\ 0 & -5 & 7 & -28 \\ 0 & -5 & 7 & -6 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - R_1 \end{array}$$

بضرب الصف الثاني في (-1) ثم اضافة الصف الثاني الجديد الى الصف الثالث وضرب الصف الثاني الجديد في (-2/5) واضافته للصف الاول نحصل على :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1/5 & 9/5 \\ 0 & 5 & -7 & 28 \\ 0 & 0 & 0 & 22 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 + (2/5)R_2 \\ -R_2 \\ R_3 - R_2 \end{array}$$

ان نظام المعادلات الذي يقابل هذه المصفوفة المبسطة هو :

$$x_1 - (1/5)x_3 = 9/5$$

$$5x_2 - 7x_3 = 28$$

$$0x_3 = 22$$

نلاحظ هنا ان المعادلة الثالثة تعني ان  $0 = 22$  وهذا تناقض . هذا يعني ان النظام غير قابل للحل .

في البند الاول ذكرنا مبرهنة (3.1.1) التي اعطت شرطاً ضرورياً وكافياً لكي يكون اي نظام خطي قابلاً للحل . جميع الانظمة المتجانسة تمتلك حلولاً لكن النظام غير المتجانس  $AX = B$  يكون قابلاً للحل اذا فقط اذا كان المتجه  $B$  متممياً الى فضاء اعمدة المصفوفة  $A$  . ان عملية تبسيط المصفوفة المصعدة  $[A:B]$  بعمليات صفيه تكشف عن عدم انتماء  $B$  الى فضاء اعمدة  $A$  وذلك بالوصول الى تناقض كالذي وصلنا اليه في مثال (5) اعلاه . سوف لن ندخل في تفاصيل البرهان العام لان ذلك يتطلب منا الدخول في مفاهيم جديدة كرتبة المصفوفة واختزال المصفوفات .

### تمارين (3.3)

1 - اوجد مجموعة الحلول لكل من الانظمة الخطية غير المتجانسة التالية :

$$x - y + z = 2$$

(أ)

$$x + y = 1$$

$$x + y + z = 3$$

$$2x + 6y - z + w = 3 \quad (\text{ب})$$

$$x - y + z - w = 2$$

$$-x - 3y + 3z + 2w = 0$$

$$3x + y - z = 10 \quad (\text{ج})$$

$$-x + y + z = 0$$

$$2x - y - 3z = 7$$

$$x - 2y - z = -2$$

$$x + y - z - w = -1 \quad (\text{د})$$

$$3x + 4y - z - 2w = 3$$

$$x + 2y + z = 5$$

2 — اوجد قيم  $k$  التي تجعل النظام التالي قابلاً للحل ثم اوجد مجموعة الحلول في تلك الحالة :

$$x + ky - z = 1$$

$$2x + y + 2z = 5k + 1$$

$$x - y + 3z = 4k + 2$$

$$x - 2ky + 7z = 10k - 1$$

3 — برهن على ان النظام :

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = k_1$$

$$2x_1 - 5x_2 - 2x_3 + 12x_4 = k_2$$

$$7x_1 + x_2 + 8x_3 + 5x_4 = k_3$$

يكون قابلاً للحل إذا فقط اذا  $37k_1 + 13k_2 - 9k_3 = 0$  اوجد جميع الحلول عندما  $k_3 = 7, k_2 = 2, k_1 = 1$ .

## الفصل الرابع

### القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

#### Eigenvalues and Eigenvectors

##### (4.0) مقدمة:

إذا كان كل من  $V$  و  $W$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى الحقل نفسه، وكان  $T: V \rightarrow W$  تحويلاً خطياً، فقد برهنا في الفصل الثاني (مبرهنة (2.5.1)) أنه بالإمكان دائماً إيجاد قاعدة إلى كل من  $V$  و  $W$  بحيث تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة لذلك الزوج من القواعد بالصيغة الاعتيادية، أي بصيغة بسيطة. عندما يكون  $\dim V = \dim W$  فإن مصفوفة  $T$  تكون مصفوفة قطرية.

وفي حالة كون  $V = W$  فإنه ليس من الضروري أن نستطيع إيجاد قاعدة واحدة إلى  $V$  تستخدم في المجال والمجال القابل للتحويل  $T: V \rightarrow V$  بحيث أن مصفوفة  $T$  بالنسبة لتلك القاعدة تكون قطرية وكما موضح في المثال التالي.

لنأخذ  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  تحويلاً خطياً معروفاً بالصيغة:  $T(x,y) = (-y,x)$ . لو أردنا إيجاد القواعد التي تجعل مصفوفة  $T$  بالنسبة لها بالصيغة الاعتيادية (صيغة قطرية بهذه الحالة) لطبقنا الطريقة التي وردت في برهان المبرهنة (2.5.1) والموضحة في المثال (1) من البند (2.5). نلاحظ أن:

$$\begin{aligned} \text{Ker}T &= \{(x, y) : (-y, x) = (0, 0)\} \\ &= \{(0, 0)\} \end{aligned}$$

نكمل الى قاعدة الى  $R^2$  ( المجال ) ولتكن تلك القاعدة المكونة من :

$$A_1 = (1, 0), A_2 = (0, 1)$$

$$B_1 = T(A_1) = (0, 1), B_2 = T(A_2) = (-1, 0) \quad \text{ضع :}$$

بهذه الحالة يمكننا ان نستخدم القاعدة  $\{A_1, A_2\}$  في المجال والقاعدة  $\{B_1, B_2\}$  في المجال المقابل، لكي تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للزوج اعلاه من القواعد بالصيغة الاعتيادية :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

لكن لاحظ ان  $B_2 \neq A_2, B_1 \neq A_1$ .

المسألة المراد دراستها في هذا الفصل هي المسألة التالية :

اذا كان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً على فضاء متجهي البعد  $n$  وتحت اي شروط يمكن ايجاد قاعدة واحدة الى  $V$  تستخدم في المجال والمجال المقابل لكي تكون مصفوفة  $T$  مصفوفة قطرية ( ليس من الضروري ان تكون جميع عناصر القطر مساوية الى 1 ).

المثال اعلاه يوضح انه ليست جميع التحويلات تتمتع بهذه الخاصية . وذلك لانه في حالة وجود قاعدة مكونة من المتجهين

$$A_1 = (x_1, y_1), A_2 = (x_2, y_2)$$

بحيث ان مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة اعلاه تكون قطرية .

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

فانه يتوجب على  $T$  ان يحقق :

$$T(A_1) = a_1 A_1 + 0 A_2 = a_1 A_1$$

$$T(A_2) = 0 A_1 + a_2 A_2 = a_2 A_2$$

وهذا يعني أن :

$$(-y_1, x_1) = a_1 (x_1, y_1)$$

$$(-y_2, x_2) = a_2 (x_2, y_2)$$

عند حل المعادلتين اعلاه ينتج :

$$-y_1 = a_1 x_1, x_1 = a_1 y_1$$

$$-y_2 = a_2 x_2, x_2 = a_2 y_2$$

$$-y_1 = a_1^2 y_1, -y_2 = a_2^2 y_2 \quad \text{اذن :}$$

في حالة  $y_1 \neq 0$  نحصل على  $a_1^2 = -1$  وهذا تناقض ، كذلك فإنه في حالة  $y_2 \neq 0$  نحصل أيضاً على تناقض في المعادلة  $a_2^2 = -1$ .

لكن في حالة كون  $y_1 = 0$  و  $y_2 = 0$  فإن المتجهين  $A_1, A_2$  يصبحان بالصيغة :

$$A_1 = (x_1, 0), A_2 = (x_2, 0)$$

وبهذه الحالة لا يكونان قاعدة الى  $R^2$ .

نستنتج من هذا استحالة وجود قاعدة الى  $R^2$  تجعل من مصفوفة

$T: R^2 \rightarrow R^2$  المعرف اعلاه مصفوفة قطرية في حالة استخدام تلك القاعدة في المجال والمجال المقابل وهذا يوضح عدم بدهاة أو بساطة المسألة المطروحة والتي سنحاول الاجابة عليها من خلال بنود هذا الفصل. كذلك فإن عملية تمثيل تحويل خطي  $T: V \rightarrow V$  بمصفوفة قطرية تنطوي عليها كثير من التطبيقات وتسهل كثيراً من المسائل كما سنرى في الامثلة المقبلة. سوف نرى ان حل المسألة اعلاه يعتمد على وجود متجهات  $A \in V$  غير صفرية واعداد قياسية  $\lambda$  تحقق  $T(A) = \lambda A$  هذا النوع من المتجهات يطلق عليه اسم المتجهات الذاتية وتلك الاعداد القياسية ستسمى قيم ذاتية للتحويل الخطي  $T$ . سندرس هذا في البند (4.1) ثم نناقش في البند (4.2) مسألة تمثيل التحويلات الخطية بمصفوفات قطرية. اما البندين (4.4)



(4.3) فقد خصصنا لدراسة المصفوفات المتشابهة لبرهنة نظرية مهمة في الجبر الخطي تسمى مبرهنة كيلبي — هاملتون .

## (4.1) القيم الذاتية والمتجهات الذاتية والمعادلة المميزة

### Eigenvalues and Eigenvectors and The Characteristic equation

إذا كان  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى الحقل  $F$  فنعرّف مايلي :

تعريف :

المتجه غير الصفري  $A \neq 0$  ( $A \in V$ ) يسمى متجهاً ذاتياً (Eigenvector) للتحويل الخطي  $T: V \rightarrow V$ ، إذا وفقط إذا وجد عدد قياسي  $\lambda \in F$  بحيث :

$$T(A) = \lambda A$$

تعريف :

العدد القياسي  $\lambda \in F$  يسمى قيمة ذاتية (Eigenvalue) للتحويل  $T: V \rightarrow V$ ، إذا وفقط إذا وجد متجه  $A \neq 0$  في  $V$  بحيث :

$$T(A) = \lambda A$$

ملاحظة :

حسب التعريفين اعلاه نلاحظ ان المتجه الذاتي يجب ان يكون متجهاً غير صفري لكن لاشيء يجبر القيمة الذاتية بأن تكون غير مساوية للصفر .

عندما يكون  $A \in V$  متجهاً غير صفري و  $\lambda \in F$  اي عدد قياسي

بحيث

$$T(A) = \lambda A$$

فنقول بأن  $A$  متجه ذاتي للتحويل الخطي  $T$  تابعاً للقيمة الذاتية .

ليس من الضروري ان تتواجد متجهات وقيم ذاتية لاي تحويل خطي ، كما في المثال ادناه .

مثال (1) :

التحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  المعروف بالصيغة :

$$T(x,y) = (-y, x)$$

ليس لديه متجهات ذاتية ولا قيم ذاتية ، وذلك لانه اذا كان

$$T(x,y) = \lambda(x,y)$$

$$(-y,x) = \lambda(x,y) \quad \text{فإن :}$$

$$\lambda x = -y \quad \text{اي :}$$

$$\lambda y = x$$

بالتعويض نحصل على المعادلتين :

$$(\lambda^2 + 1)x = 0, (\lambda^2 + 1)y = 0$$

وبما ان  $\lambda^2 + 1 \neq 0$  فعليه نحصل على

$$x = 0, y = 0$$

هذا يعني عدم وجود متجهات غير صفرية  $(x,y)$  تحقق  $T(x,y) = \lambda(x,y)$  .

مثال (2) :

جد القيم والمتجهات الذاتية للتحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ، المعروف

$$. T(x,y) = (x + 2y, 3x + 2y) \text{ بالصيغة :}$$

الحل: لغرض إيجاد القيم والمتجهات الذاتية للتحويل T، علينا إيجاد تلك الأعداد الحقيقية  $\lambda$  التي تحقق:

$$T(A) = \lambda A$$

حيث ان  $A \neq 0$ . اذا كان  $A = (x, y)$ ، فإن

$$T(x, y) = \lambda (x, y)$$

$$(x + 2y, 3x + 2y) = (\lambda x, \lambda y) \quad \text{اي:}$$

هذا يعني انه يتوجب علينا معرفة متى يكون لنظام المعادلات

$$x + 2y = \lambda x$$

$$3x + 2y = \lambda y$$

حلاً غير تافه. النظام اعلاه يكافئ النظام المتجانس:

$$(1 - \lambda)x + 2y = 0$$

$$3x + (2 - \lambda)y = 0$$

وهذا النظام المتجانس يمتلك حلاً غير تافه اذا وفقط اذا كانت مصفوفة النظام، مصفوفة غير قابلة للقلب وذلك حسب (نتيجة 3.2.5).

اي ان:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 3 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

لكن:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 3 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(2 - \lambda) - 6$$

$$= 2 - 3\lambda + \lambda^2 - 6$$

$$= \lambda^2 - 3\lambda - 4$$

$$= (\lambda - 4)(\lambda + 1)$$

اذن تكون القيم الذاتية الى T تلك القيم التي تحقق المعادلة

$$(\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0$$

اي:

$$\lambda = 4, \lambda = -1$$

الان يجب ايجاد المتجهات الذاتية التابعة لتلك القيم.

هذا يعني حل النظام المتجانس:

$$-3x + 2y = 0$$

$$3x - 2y = 0$$

في حالة  $\lambda = 4$ . وحل النظام المتجانس:

$$2x + 2y = 0$$

$$3x + 3y = 0$$

في حالة  $\lambda = -1$ .

$$y = (3/2)x$$

النظام الاول يكون حله:

$$y = -x$$

والنظام الثاني يكون حله:

وبأخذ  $x = 2$  في النظام الاول و  $x = 1$  في النظام الثاني نحصل على:

المتجه  $A = (2, 3)$  يكون متجهاً ذاتياً تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda = 4$ .

المتجه  $B = (-1, 1)$  يكون متجهاً ذاتياً تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda = -1$ .

بذلك تكون القيم الذاتية للتحويل T عبارة عن 4 و -1، وان جميع المتجهات الذاتية

التابعة الى  $\lambda = 4$  تكون مضاعفات للمتجه  $A = (2, 3)$ ، اما المتجهات الذاتية

التابعة الى  $\lambda = -1$  فهي مضاعفات للمتجه  $B = (-1, 1)$ .

يبدو ان عملية حساب القيم الذاتية لتحويل خطي  $T: V \rightarrow V$  عملية

طويلة ومتشعبة لكن الحقيقة عكس ذلك وذلك لانه لا توجد لدينا في الوقت الحاضر

اي طرق لايجادها وانما استخدمنا التعريف فقط.

المبرهنة التالية عبارة عن الخطوة الاولى لايجاد طريقة سريعة لحساب القيم الذاتية.

مبرهنة (4.1.1):

إذا كان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً وكانت  $M$  مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة  $G = \{A_1, \dots, A_n\}$  و  $M^*$  مصفوفة  $T$  بالنسبة لقاعدة أخرى  $G^* = \{A_1^*, \dots, A_n^*\}$  فإن:

$$\det(M - \lambda I) = \det(M^* - \lambda I)$$

وذلك لأي عدد قياسي  $\lambda$ .  $I$  تمثل المصفوفة المحايدة.

البرهان:

بما أن  $M$  و  $M^*$  مصفوفتان لتحويل خطي واحد لكن بالنسبة لقواعد مختلفة، فعليه توجد مصفوفة قابلة للقلب  $P$  تحقق  $M^* = PMP^{-1}$  وذلك حسب المبرهنة (2.5.2).

الآن نلاحظ:

$$\begin{aligned} \det(M^* - \lambda I) &= \det(PMP^{-1} - \lambda I) \\ &= \det(PMP^{-1} - \lambda PIP^{-1}) \\ &= \det[P(M - \lambda I)P^{-1}] \\ &= \det(P) \cdot \det(M - \lambda I) \cdot \det(P^{-1}) \\ &= \det(M - \lambda I) \cdot \det(P) \cdot \det(P^{-1}) \\ &= \det(M - \lambda I) \cdot 1 \\ &= \det(M - \lambda I) \end{aligned}$$

(و. ه. م.)

إذا كانت  $M = (a_{ij})$  مصفوفة التحويل الخطي  $T: V \rightarrow V$  بالنسبة إلى قاعدة معينة فإن

$$\det(M - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

وبفك المحدد اعلاه نحصل على :

$$\det(M - \lambda I) = (-1)^n \lambda^n + b_1 \lambda^{n-1} + \dots + b_{n-1} \lambda + b_n$$

المبرهنة (4.1.1) تنص على ان متعددة الحدود اعلاه لاتتغير عندما M تستبدل بالمصفوفة  $M^*$  التي هي مصفوفة التحويل الخطي T نفسه ، لكن بالنسبة الى قاعدة اخرى . هذا يمكننا من وضع التعريف التالي .

تعريف :

اذا كان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً على فضاء المتجهات المنتهي البعد  $V$  ، حيث  $\dim V = n$  ، وكانت  $M$  مصفوفة  $T$  بالنسبة لأي قاعدة كانت فإن متعددة الحدود :

$$\Delta(t) = (-1)^n t^n + b_{n-1} t^{n-1} + \dots + b_1 t + b_0 = \det(M - tI)$$

تسمى متعددة الحدود المميزة (Characteristic Polynomial) للتحويل الخطي  $T$  .

حيث ان  $t$  متغير ، والمعاملات  $b_0, \dots, b_{n-1}$  تكون من الحقل  $F$  ، حقل الفضاء  $V$  .

مثال (3) :

جد متعددة الحدود المميزة للتحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  المعروف

$$T(x, y) = (2x - y, 4x)$$

بالصيغة :

الحل: أولاً نحاول حساب مصفوفة T بالنسبة لأي قاعدة. أبسط القواعد هي القواعد الطبيعية. كما في البند (2.4)، يتضح ان المصفوفة.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

تكون مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية.

$$\begin{aligned} \Delta(t) &= \det(M - tI) \\ &= \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 2-t & 1 \\ -1 & -t \end{pmatrix} \\ &= (2-t)(-t) - (1)(-1) \\ &= t^2 - 2t + 1 \end{aligned}$$

عليه تكون متعددة الحدود المميزة للتحويل الخطي T اعلاه.

$$\Delta(t) = t^2 - 2t + 1$$

مثال (4):

جد متعددة الحدود المميزة للتحويل الخطي T:  $C^2 \rightarrow C^2$  المعرف

بالصيغة:

$$T(Z_1, Z_2) = (Z_1 - iZ_2, (1+i)Z_1 - 3iZ_2)$$

( اعتبرنا هنا ان  $C^2$  فضاء متجهات على الحقل C ، حقل الاعداد العقدية ).

الحل : مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية تكون :

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1+i \\ -i & -3i \end{bmatrix}$$

عليه تكون متعددة الحدود المميزة :

$$\begin{aligned} \Delta(t) &= \det(M - tI) \\ &= \begin{vmatrix} 1-t & 1+i \\ -i & -3i-t \end{vmatrix} \\ &= (1-t)(-3i-t) - (1+i)(-i) \\ &= t^2 + (-1+3i)t - (1+3i) \end{aligned}$$

نرجع الان لمسألة القيم الذاتية للتحويل الخطي  $T:V \rightarrow V$ .

مبرهنة (4.1.2) :

إذا كان  $T:V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً على فضاء متجهات منتهي البعد وبعده يساوي  $n$  وكانت  $\Delta(t)$  المعادلة المميزة الى  $T$  فإن  $\lambda$  تكون قيمة ذاتية للتحويل  $T$  اذا وفقط اذا كانت  $\lambda$  جذراً للمعادلة  $\Delta(\lambda) = 0$ ، اي  $\Delta(\lambda) = 0$ .

البرهان :

لنفرض ان  $\lambda$  قيمة ذاتية للتحويل  $T$ . عليه يوجد متجهاً غير صفري  $A \in V$  يحقق :

$$T(A) = \lambda \cdot A = \lambda I(A)$$

حيث ان  $I:V \rightarrow V$  يمثل التحويل المحايد. بمراجعة جمع التحويلات الخطية وضربها بأعداد قياسية نستنتج ان

$$(T - \lambda I)A = 0$$



وهذا يعني ان :  $A \in \text{Ker}(T - \lambda I)$  . لكن  $A \neq 0$  . اذن  $\text{Ker}(T - \lambda I) \neq \{0\}$  .  
وعليه فإن نتيجة (2.3.4) تنص على ان التحويل  $T - \lambda I: V \rightarrow V$  لا يكون  
تشاكلاً. الان النتيجة (2.4.4) تنتج ان مصفوفة  $T - \lambda I$  بالنسبة لاي قاعدة كانت  
تكون مصفوفة غير قابلة للقلب . فاذا كانت  $M$  تمثل مصفوفة  $T$  بالنسبة لأي قاعدة  
فإن  $M - \lambda I$  تمثل مصفوفة  $T - \lambda I$  بالنسبة لتلك القاعدة . اي ان المصفوفة  $M - \lambda I$   
غير قابلة للقلب . وهذا يعني ان محدها يكون مساوياً للصفر . اي ان :

$$\Delta(\lambda) = \det(M - \lambda I) = 0$$

على العكس لو كان  $\Delta(\lambda) = 0$  فإن المصفوفة  $M - \lambda I$  ستكون غير قابلة للقلب  
وعليه سوف لا يكون التحويل  $T - \lambda I$  تشاكلاً وبالتالي يكون  $\text{Ker}(T - \lambda I) \neq \{0\}$   
وبهذا يوجد متجه  $A \neq 0$  في  $V$  بحيث ان :  $A \in \text{Ker}(T - \lambda I)$  .

$$(T - \lambda I)A = 0 \quad \text{وهذا يعني ان}$$

$$T(A) - \lambda I(A) = 0$$

$$T(A) - \lambda A = 0$$

$$T(A) = \lambda A \quad \text{اي}$$

اي بمعنى ان  $\lambda$  تكون قيمة ذاتية للتحويل الخطي  $T$  .

( و . ه . م )

المعادلة  $\Delta(t) = 0$  تسمى بالمعادلة المميزة للتحويل الخطي  $T$  والمبرهنة  
اعلاه تنص على ان القيم الذاتية للتحويل الخطي  $T$  هي جذور المعادلة المميزة .

مثال (5) :

جد القيم الذاتية للتحويل الخطي  $R^2 \rightarrow R^2$  :  $T: R^2 \rightarrow R^2$  المعرف في المثال (2) من

هذا البند .

الحل :

بمراجعة المثال (2) يتضح ان

$$T(x,y) = (x + 2y, 3x + 2y)$$

مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية تكون

$$\dot{M} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

المعادلة المميزة الى T تكون

$$\Delta(t) = \det(M - tI) = \det \begin{bmatrix} 1-t & 3 \\ 2 & 2-t \end{bmatrix} = 0$$

$$(1-t)(2-t) - 6 = 0$$

اي ان

$$t^2 - 3t - 4 = 0$$

$$(t-4)(t+1) = 0$$

أو

اذن تكون القيم الذاتية الى T عبارة عن قيمتان  $t = -1, t = 4$ .

مثال (6) :

جد القيم الذاتية للتحويل الخطي  $T: P_1(\mathbb{R}) \rightarrow P_1(\mathbb{R})$  المعروف

$$T(a + bx) = -b + ax$$

بالصيغة

الحل : مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية  $\{1, x\}$  تكون

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

عليه تكون المعادلة المميزة الى T

$$\det(M - tI) = \det \begin{pmatrix} -t & 1 \\ -1 & -t \end{pmatrix} = 0$$

$$t^2 + 1 = 0$$

لكن هذه المعادلة غير قابلة للحل على حقل الأعداد الحقيقية وعليه ليس لها جذور وبالتالي لا توجد قيم ذاتية للتحويل اعلاه .

مثال (7) :

$T: P_1(\mathbb{C}) \rightarrow P_1(\mathbb{C})$  جد القيم والمتجهات الذاتية للتحويل الخطي

$$T(a + bx) = -b + ax$$

المعرف بالصيغة :

الحل : مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية  $\{1, x\}$  تكون

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

وكما في المثال (6) اعلاه ، تكون المعادلة المميزة الى T :

$$t^2 + 1 = 0$$

وبما ان الحقل بهذه الحالة هو حقل الأعداد العقدية C ، فعليه يكون للمعادلة اعلاه حلان هما i و -i . بهذا توجد قيمتان ذاتيتان هما  $\lambda = i$  و  $\lambda = -i$  .  
( لاحظ هنا ان الفرق بين هذا المثال والمثال (6) هو تغير الحقل ، اما التحويل الخطي

$\lambda$  فهو بالصيغة نفسها، بمجرد تغير الحقل تحولت حالة  $T$  من عدم امتلاك قيم ذاتية الى امتلاكها .

لغرض إيجاد المتجهات الذاتية التابعة للقيمة الذاتية  $\lambda$  ، نلاحظ انه لأي قيمة ذاتية يوجد متجه ذاتي غير صفري  $A$  يحقق

$$(T - \lambda I) A = 0$$

فإذا افترضنا ان المتجه  $A = a + bx$  فإن متجه احدائيات  $A$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية  $\{1, x\}$  هو المتجه  $X = (a, b)$  وعليه يمكن كتابة المعادلة أعلاه بالصيغة المصفوفية بالشكل:

$$X(M - \lambda I) = 0$$

حيث ان  $M$  مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية .

عندما  $\lambda = i$  نحصل على المعادلة

$$(a, b) \begin{bmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{bmatrix} = 0$$

$$-ia - b = 0 \quad \text{اي:}$$

$$a - ib = 0$$

هاتان المعادلتان عبارة عن معادلة واحدة على حقل الاعداد العقدية حيث ان المعادلة الثانية عبارة عن  $i$  مضروبة في المعادلة الاولى . عليه يكون الحل:

$$b = -ia$$

عند وضع  $a = 1$  نحصل على  $b = -i$  وبالتالي المتجه

$$X = (1, -i)$$

الذي يمثل متجه احدائيات  $A \in P_1(C)$  . اذن  $A = 1 - ix$  وان اي مضاعف لهذا المتجه يكون ايضاً متجهاً ذاتياً تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda = i$  .

بالطريقة نفسها نحصل على المتجه  $B = 1 + ix$  كمتجه ذاتي تابع للقيمة الذاتية  $\lambda = -i$  .

تمارين (4.1)

1 — اوجد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لكل من التحويلات الخطية الآتية:

$$T(x, y) = (3x + 3y, x + 5y), T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ (أ)}$$

$$T(x, y, z) = (x + y + z, 2y + z, 2y + 3z), T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ (ب)}$$

$$T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R}) \text{ (ج)}$$

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (5a_0 + 6a_1 + 2a_2) - (a_1 + 8a_2)x + (a_0 - 2a_2)x^2$$

$$T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R}) \text{ (د)}$$

$$T \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c & a+c \\ b-2c & d \end{bmatrix}$$

$$T(z_1, z_2) = (z_1 - z_2, 2z_1), T: C^2 \rightarrow C^2 \text{ (هـ)}$$

( اعتبر  $C^2$  فضاءاً على حقل الأعداد العقدية ) .

2 — يعرف اثر (trace) المصفوفة المربعة على انه مجموع العناصر في القطر الرئيسي. اثبت ان المعادلة المميزة لأي تحويل خطي  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  تكون من النوع:

$$t^2 - \text{tr}(M)t + \det(M) = 0$$

حيث ان  $M$  مصفوفة  $T$  بالنسبة لأي قاعدة .

3 — برهن على ان الحد الثابت في متعددة الحدود المميزة لأي تحويل خطي

يساوي محدد مصفوفة التحويل بالنسبة لأي قاعدة كانت .

4 — برهن على ان التحويل الخطي  $T: V \rightarrow V$  يكون تحويلاً معتلاً اذا وفقط

اذا كانت  $\lambda = 0$  قيمة ذاتية الى  $T$  .

5 — اذا كان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً غير معتل و  $A \in V$  متجه ذاتي الى  $T$  تابعاً

للقيمة الذاتية  $\lambda$  فبرهن على ان  $A$  يكون متجهاً ذاتياً الى  $T^{-1}$  تابعا للقيمة الذاتية  $1/\lambda$ .

6 — اذا كان  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً بحيث  $T^k = T \circ T \circ \dots \circ T = O$  لعدد صحيح موجب  $k$  فبرهن على ان جميع القيم الذاتية الى  $T$  تكون مساوية للصفر.

7 — اذا كان  $A \in V$  متجهاً ذاتياً للتحويل الخطي  $T: V \rightarrow V$  تابعا للقيمة الذاتية  $\lambda$  فبرهن على ان  $A$  يكون متجهاً ذاتياً الى  $T^n$  تابعا للقيمة الذاتية  $\lambda^n$  وذلك لأي عدد طبيعي  $n$ .

8 — اذا كان كل من  $S, T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً بحيث ان  $TS = ST$ ، واذا كان  $A \in V$  متجهاً بحيث  $T(A) = \lambda A$ . اذا كان كذلك  $S(A) \neq 0$  فبرهن على ان  $S(A)$  يكون متجهاً ذاتياً للتحويل  $T$  تابعا للقيمة الذاتية  $\lambda$ .

9 — اذا كان  $T: R^3 \rightarrow R^3$  تحويلاً خطياً معرفاً بالصيغة:

$$T(x, y, z) = (0, x, y)$$

فجد متعددة الحدود المميزة الى كل من  $T^3, T^2, T$ .

10 — جد تحويلاً خطياً  $T: R^2 \rightarrow R^2$  يمتلك  $A = (1, 2)$  كمتجه ذاتي تابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 5$ .

11 — جد تحويلاً خطياً  $T: P_2(R) \rightarrow P_2(R)$  يمتلك  $A = 1 + x$  كمتجه ذاتي تابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 2$  و  $B = -2x^2$  كمتجه ذاتي تابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 4$ .

12 — اذا كان  $V$  فضاء متجهات على الحقل  $F$  و  $A \in V$  متجه ذاتي لكل من التحويلين  $S, T: V \rightarrow V$  فبرهن على ان  $A$  يكون متجهاً ذاتياً للتحويل  $aS + bT$  وذلك لأي عددين قياسيين  $a, b \in F$ .

(4.2) الفضاء الذاتي وقابلية تمثيل تحويل خطي بمصفوفة قطرية

**Eigen Space and Diagonalization of a linear transformation**

لاحظنا من خلال الأمثلة السابقة انه بتحديد قيمة ذاتية لتحويل خطي  $T:V \rightarrow V$  فإنه يوجد أكثر من متجه ذاتي تابع لتلك القيمة الذاتية. فإذا كانت قيمة ذاتية للتحويل الخطي  $T:V \rightarrow V$  فنعرّف:

$$V_\lambda = \{A \in V: T(A) = \lambda A\}$$

أي ان  $V_\lambda$  عبارة عن تلك المجموعة المحتوية على جميع المتجهات الذاتية التابعة للقيمة الذاتية  $\lambda$  بمعنى المتجه الصفري. يمكن بسهولة التحقق من ان المجموعة  $V_\lambda$  تكون فضاءاً جزئياً من  $V$ . هذا الفضاء الجزئي يسمى الفضاء الذاتي التابع للقيمة الذاتية  $\lambda$ .

مثال (1):

جد القيم الذاتية والفضاءات الذاتية التابعة لها، للتحويل الخطي

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$T(x, y, z) = (x, y, -2z)$$

المعرف بالصيغة:

الحل: ان مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية تكون

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

عليه تكون المعادلة المميزة الى T كالآتي :

$$\begin{vmatrix} M-t & & \\ 1-t & 0 & 0 \\ 0 & 1-t & 0 \\ 0 & 0 & -2-t \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta(t) = (1-t)^2(-2-t) = 0$$

بذلك توجد قيمتان ذاتيتان مختلفتان

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$$

( لاحظ ان القيمة الذاتية  $\lambda_1 = 1$  مكررة مرتين ) .

لايجاد الفضاء الذاتي  $V_1$  يجب علينا حل نظام المعادلات

$$(x, y, z) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} = (0, 0, 0)$$

وهذا يؤدي الى ان  $z = 0$  .

هذا يعني انه حتى يكون المتجه  $A = (x, y, z)$  غير الصفري، متجهاً ذاتياً تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda = 1$ ، يجب ان يكون  $z = 0$ . بهذا يمكن وصف الفضاء الذاتي  $V_1$  كالآتي :

$$V_1 = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

لغرض ايجاد الفضاء الذاتي  $V_2$  التابع للقيمة الذاتية  $\lambda = -2$  يجب حل نظام المعادلات :

$$(x, y, z) (M + 2I) = (0, 0, 0)$$



$$(x, y, z) \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, 0)$$

وهذا النظام يؤدي الى معادلتين هما

$$x=0, y=0$$

هذا يعني ان

$$V_{-2} = \{(0,0,z): z \in \mathbb{R}\}$$

نلاحظ من المثال اعلاه ان القيم الذاتية يمكن ان تتكرر لذلك نضع التعريف التالي .

تعريف :

اذا كان  $T:V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً، وكانت  $\lambda$  قيمة ذاتية للتحويل  $T$ ، فبتكرار  $\lambda$  الجبري نقصد اس الحد  $(t-\lambda)$  في متعددة الحدود المميزة بعد تحليلها الى عواملها الاولى. وبتكرار  $\lambda$  الهندسي نقصد بعد الفضاء الذاتي  $V_{\lambda}$ ، اي  $\dim V_{\lambda}$ .

ملاحظة :

اذا كان تكرار  $\lambda$  الجبري  $n$  فإن متعددة الحدود المميزة الى  $T$  تكون بالصيغة  $\Delta(t) = (t-\lambda)^n g(t)$ ، حيث ان  $g(t)$  متعددة حدود بحيث ان  $\lambda$  لا تكون جذراً لها.

مثال (2) :

جد التكرار الجبري والهندسي لكل قيمة ذاتية ظهرت في المثال (1).

$$\Delta(t) = (1-t)^2 (-2-t) \quad \text{الحل: متعددة الحدود المميزة كانت}$$

بهذا يكون التكرار الجبري للقيمة الذاتية  $\lambda = 1$  يساوي 2. اما التكرار الجبري للقيمة الذاتية  $\lambda = -2$  فيساوي 1. لايجاد التكرارات الهندسية يجب علينا معرفة بعد كل من الفضاءين  $V_1, V_2$ . نلاحظ بأن المتجهين  $A_1 = (1, 0, 0)$  و  $A_2 = (0, 1, 0)$  يكونان قاعدة الى  $V_1$  وبذلك يكون  $\dim V_1 = 2$ .

اما  $V_2$  فهو فضاء احادي البعد. اي  $\dim V_2 = 1$ .

اذن: تكرار  $\lambda = 1$  الهندسي = 2

تكرار  $\lambda = -2$  الهندسي = 1.

المبرهنة التالية تعطي العلاقة بين التكرارين الجبري والهندسي.

مبرهنة (4.2.1):

لأي تحويل خطي  $T: V \rightarrow V$  على فضاء متجهات منتهي البعد  $V$  ولأي قيمة ذاتية  $\lambda$  لذلك التحويل يكون:

$$\text{تكرار } \lambda \text{ الجبري} \leq \text{تكرار } \lambda \text{ الهندسي}$$

البرهان:

نفرض ان تكرار  $\lambda$  الهندسي يساوي  $k$ . هذا يعني ان اي قاعدة الى  $V_\lambda$  تتكون من  $k$  من المتجهات. لنختار المتجهات  $A_1, \dots, A_k$  كقاعدة الى  $V_\lambda$ . بذلك يكون

$$T(A_i) = \lambda A_i, (i: 1, \dots, k)$$

نكمل المجموعة  $\{A_1, \dots, A_k\}$  الى قاعدة  $\{A_1, \dots, A_k, A_{k+1}, \dots, A_n\}$  الى  $V$  (افترضنا ان بعد  $n = V$ ) بذلك تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة اعلاه بالصيغة:

$$M = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & & 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & & & & \\ 0 & \dots & & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \hline a_{k+1,1} & a_{k+1,2} & \dots & a_{k+1,k} & \dots & a_{k+1,n} \\ \hline a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,k} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

يمكن تجزئة المصفوفة اعلاه الى قوالب وكتابتها بالصيغة

$$M = \begin{bmatrix} \lambda I_k & O \\ B & C \end{bmatrix}$$

حيث ان  $I_k$  تمثل المصفوفة المحايدة  $k \times k$ ,  $B$  مصفوفة ذات درجة  $(n-k) \times k$  و  $C$  مصفوفة ذات درجة  $(n-k) \times (n-k)$  و  $O$  مصفوفة صفرية ذات درجة  $k \times (n-k)$ .

المعادلة المميزة للتحويل  $T$  تكون:

$$\Delta(t) = \det(M - tI)$$

$$\begin{aligned} &= \det \begin{bmatrix} \lambda I_k & O \\ B & C \end{bmatrix} - t \begin{bmatrix} I_k & O \\ O & I_{n-k} \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} (\lambda - t) I_k & O \\ B & C - tI_{n-k} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \det (\lambda - t)I_k \cdot \det (C - tI_{n-k})$$

$$= (\lambda - t)^k \det (C - tI_{n-k})$$

بهذا يكون  $(\lambda - t)^k$  عامل من عوامل متعددة الحدود المميزة  $\Delta(t)$  وعليه فإن تكرار  $\lambda$  الجبري يكون أكبر أو مساوياً إلى  $k$ .

( و . ه . م )

نحن الآن في موقع يسمح لنا بالإجابة على السؤال الذي طرحناه في بداية هذا الفصل ولغرض ان نعيد طرح السؤال بلغة اسهل نقدم التعريف التالي :

تعريف :

إذا كان  $T:V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً على فضاء متجهات متبني البعد وإذا وجدت قاعدة إلى  $V$  تستخدم في المجال والمجال المقابل بحيث ان مصفوفة  $T$  بالنسبة لتلك القاعدة تكون مصفوفة قطرية فنقول بأن  $T$  قابل للاقطار (Diagonalizable).

السؤال الذي طرحناه في بداية هذا الفصل هو : تحت اي شروط يكون التحويل الخطي  $T$  قابلاً للاقطار .

الجواب يكمن في المبرهنة (4.2.3) دعه ولغرض البرهان سوف نكون بحاجة الى المبرهنة التالية :

**مبرهنة (4.2.2) :**

ليكن  $T:V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً . لتكن  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  قيماً ذاتية مختلفة إلى  $T$  ولتكن  $A_1, \dots, A_m$  متجهات ذاتية تابعة للقيم الذاتية  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  على التوالي . عندئذ تكون المتجهات  $A_1, \dots, A_m$  مستقلة خطياً .

البرهان :

لنفرض ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m\}$  مرتبطة خطياً . عندئذ يمكن كتابة احد المتجهات كتركيب خطي من المتجهات التي تسبقه وذلك حسب المبرهنة (1.7.4) بتطبيق هذه الفكرة عدة مرات يمكننا ان نفترض على ان المتجه  $A_k$  يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات المستقلة خطياً  $A_1, \dots, A_{k-1}$  . اي ان .

$$A_k = x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_{k-1} A_{k-1} \dots (1)$$

عندئذ يكون :

$$T(A_k) = x_1 T(A_1) + x_2 T(A_2) + \dots + x_{k-1} T(A_{k-1})$$

بما ان  $A_i$  يكون متجهاً ذاتياً تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda_i$  وذلك لكل  $1 \leq i \leq k$  فاذن

$$\lambda_k A_k = x_1 \lambda_1 A_1 + \dots + x_{k-1} \lambda_{k-1} A_{k-1} \dots (2)$$

بضرب المعادلة (1) في  $\lambda_k$  ينتج :

$$\lambda_k A_k = x_1 \lambda_k A_1 + \dots + x_{k-1} \lambda_k A_{k-1} \dots (3)$$

ب طرح المعادلة (2) من المعادلة (3) ينتج :

$$0 = (x_1 \lambda_k - x_1 \lambda_1) A_1 + \dots + (x_{k-1} \lambda_k - x_{k-1} \lambda_{k-1}) A_{k-1}$$

بما ان المتجهات  $A_1, \dots, A_{k-1}$  مستقلة خطياً بالفرض . اذن

$$x_1 (\lambda_k - \lambda_1) = x_2 (\lambda_k - \lambda_2) = \dots = x_{k-1} (\lambda_k - \lambda_{k-1}) = 0$$

بما ان  $\lambda_i \neq \lambda_j$  لكل  $i \neq j$  ، بالفرض فإن

$$\lambda_k - \lambda_1 \neq 0, \lambda_k - \lambda_2 \neq 0, \dots, \lambda_k - \lambda_{k-1} \neq 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_{k-1} = 0$$

عليه فإن

بالتعويض في المعادلة (1) نستنتج ان  $A_k = 0$  .

لكن  $A_k$  متجه ذاتي ولا يمكن ان يكون مساوياً للصفر .

هذا التناقض نتج من الفرضية القائلة بأن المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m\}$  مرتبطة خطياً وعليه يجب ان تكون مستقلة خطياً.

( و . ه . م )

### مبرهنة (4.2.3)

ليكن  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً على فضاء المتجهات المتني البعد  $V$  وليكن  $\dim V = n$  عندئذ يكون  $T$  قابلاً للاقطار اذا فقط اذا تحقق الشرطان التاليان: —

1 — متعددة الحدود المميزة الى  $T$  تتحلل الى حاصل ضرب عوامل خطية، اي

$$\Delta_T(t) = (t - \lambda_1)^{r_1} (t - \lambda_2)^{r_2} \dots (t - \lambda_k)^{r_k}.$$

2 — لكل قيمة ذاتية  $\lambda$  الى  $T$  يكون

تكرار  $\lambda$  الجبري = تكرار  $\lambda$  الهندسي

( اي ان هنالك عدداً من المتجهات الذاتية المستقلة خطياً والتابعة للقيمة

الذاتية  $\lambda$  مساوياً الى تكرار  $\lambda$  الجبري ) .

البرهان:

لنفرض ان  $T$  يكون قابلاً للاقطار . هذا يعني انه توجد قاعدة  $\{A_1, \dots, A_n\}$  الى  $V$  بحيث ان مصفوفة  $T$  بالنسبة لتلك القاعدة تكون مصفوفة قطرية:

$$D = \begin{bmatrix} \underbrace{a_1 \dots a_1}_{r_1} & & & \\ & \underbrace{a_2 \dots a_2}_{r_2} & & \\ & & \dots & \\ & & & \underbrace{a_k \dots a_k}_{r_k} \\ & & & & \dots & & & 0 \end{bmatrix}$$

حيث ان  $r_1 + r_2 + \dots + r_k = n$ .

هذه الحالة تكون متعددة الحدود المميزة الى T .

$$\Delta(t) = (a_1 - t)^{r_1} (a_2 - t)^{r_2} \dots (a_k - t)^{r_k}$$

وهذا عبارة عن حاصل ضرب عوامل خطية. بذلك اثبتنا الشرط الأول. ولإثبات الشرط الثاني نلاحظ ان المصفوفة D تعطينا مايلي :

$$T(A_{r_1}) = a_1 A_{r_1}, \dots, T(A_{r_1}) = a_1 A_{r_1}$$

$$T(A_{r_1+r_2}) = a_2 A_{r_1+r_2}, \dots, T(A_{r_1+r_2}) = a_2 A_{r_1+r_2}$$

⋮

$$T(A_{r_1+\dots+r_k}) = a_k A_{r_1+\dots+r_k}, \dots, T(A_{r_1+\dots+r_k}) = a_k A_{r_1+\dots+r_k}$$

هذا يعني ان

مجموعة المتجهات  $A_{r_1}, \dots, A_{r_1}$  تكون متجهات ذاتية تابعة للقيمة الذاتية  $\lambda = a_1$ .

مجموعة المتجهات  $A_{r_1+r_2}, \dots, A_{r_1+r_2}$  تكون متجهات ذاتية تابعة للقيمة الذاتية  $\lambda = a_2$ .

وهكذا . حتى نصل الى :

مجموعة المتجهات  $A_{r_1+\dots+r_k}, \dots, A_{r_1+\dots+r_k}$  تكون متجهات ذاتية تابعة للقيمة الذاتية  $\lambda = a_k$ .

بما ان مجموعة المتجهات  $A_{r_1}, \dots, A_{r_1}$  تكون مجموعة مستقلة خطياً . اذن

كل من المجموعات الجزئية اعلاه تكون مستقلة خطياً وبهذا يكون لدينا

$$\text{تكرار } a_j \text{ الجبري} = r_j = \dim V_{a_j} = \text{تكرار } a_j \text{ الهندسي.}$$

وذلك لكل  $j = 1, \dots, k$ .

وبما ان  $a_1, \dots, a_k$  هو كل ما يوجد من قيم ذاتية .

اذن تحقق الشرط الثاني .

على العكس، لنفرض ان الشرطين الأول والثاني يتحققان. المطلوب ان نبرهن على ان  $T$  يكون قابلاً للاقطار.

الشرط الأول ينتج ان متعددة الحدود المميزة الى  $T$  تكون بالصيغة

$$\Delta(t) = (t - \lambda_1)^{r_1} (t - \lambda_2)^{r_2} \dots (t - \lambda_k)^{r_k}$$

حيث ان  $\lambda_i \neq \lambda_j$  عندما يكون  $i \neq j$ .

هذا يعني ان كل من  $\lambda_i$  تكون قيمة ذاتية الى  $T$  بتكرار جبري يساوي  $r_i$  وذلك لكل  $i = 1, \dots, k$ .

الشرط الثاني ينتج ان: تكرار  $\lambda_i$  افنديسي  $r_i$ .

هذا يعني :-  $\dim V_{\lambda_i} = r_i$  و  $(i = 1, \dots, k)$

اي انه توجد  $r_1$  من المتجهات الذاتية  $A_{r_1}, \dots, A_1$  المستقلة خطياً والتابعة للقيمة الذاتية  $\lambda_1$ .

وتوجد  $r_2$  من المتجهات الذاتية  $A_{r_1+r_2}, \dots, A_{r_1+1}$  المستقلة خطياً والتابعة للقيمة الذاتية  $\lambda_2$ . وهكذا حتى نصل الى وجود  $r_k$  من المتجهات الذاتية  $A_{n-r_k+1}, \dots, A_n$  المستقلة خطياً والتابعة للقيمة الذاتية  $\lambda_k$ . حيث اننا استخدمنا العلاقة

$$r_1 + r_2 + \dots + r_k = n$$

الآن المجموعة:

$$\{A_1, \dots, A_{r_1}, A_{r_1+1}, \dots, A_{r_1+r_2}, \dots, A_{n-r_k+1}, \dots, A_n\}$$

تكون مستقلة خطياً وذلك حسب المبرهنة (4.2.2) لانها متجهات ذاتية تابعة لقيم ذاتية مختلفة. بما ان عدد المتجهات في المجموعة اعلاه يساوي  $n$ ، فعليه تكون قاعدة للفضاء  $V$  وذلك لان بعد  $V$  يساوي  $n$  بالفرض. الان نحسب مصفوفة  $T$  بالنسبة لهذه القاعدة.

$$T(A_1) = \lambda_1 A_1$$

$$T(A_2) = \lambda_1 A_2$$



$$\begin{aligned} & \vdots \\ T(A_{r_1}) &= \lambda_1 A_{r_1} \\ T(A_{r_1+1}) &= \lambda_2 A_{r_1+1} \\ & \vdots \\ T(A_{r_1+r_2}) &= \lambda_2 A_{r_1+r_2} \\ & \vdots \\ T(A_{n-r_k+1}) &= \lambda_k A_{n-r_k+1} \\ & \vdots \\ T(A_n) &= \lambda_k A_n \end{aligned}$$

عليه تكون مصفوفة T بالصيغة

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \lambda_1 & & & & \\ & & \lambda_2 & & & \\ & & & \lambda_2 & & \\ & & & & \lambda_k & \\ & & & & & \lambda_k \end{bmatrix}$$

اي انها مصفوفة قطرية .

( و . ه . م )

ملاحظة :

نستخلص من البرهان اعلاه النتيجة التالية :

نتيجة (4.2.4) :

التحويل الخطي  $T: V \rightarrow V$  يكون قابلاً للاقطار اذا فقط اذا وجدت قاعدة الى  $V$  مكونة من متجهات ذاتية الى  $T$  .  
 سنذكر فيما يلي نتيجة لها فائدة كبيرة في مسألة معرفة قابلية الاقطار لأي تحويل خطي .

نتيجة (4.2.5):

إذا كان للتحويل الخطي  $V \rightarrow V$  قيم ذاتية مختلفة ومساوية بالعدد لبعدها الفضاء  $V$  فإن  $T$  يكون قابلاً للاقطار.

البرهان:

القيم الذاتية المختلفة تعطي متجهات ذاتية مستقلة خطياً وذلك حسب المبرهنة (4.2.2)، عدد هذه المتجهات المستقلة خطياً يساوي بعد الفضاء  $V$  وبالتالي تكون المتجهات الذاتية إلى  $T$  قاعدة إلى  $V$  والان النتيجة (4.2.4) تعطي المطلوب.

(و. ه. م.)

مثال (3):

قرر فيما إذا كان التحويل الخطي  $T: R^3 \rightarrow R^3$ ، المعرف بالصيغة

$$T(x, y, z) = (-x, 6x - 13y - 9z, -12x + 30y + 20z)$$

قابلاً للاقطار.

الحل: مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية تكون كما يلي

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -12 \\ 0 & -13 & 30 \\ 0 & -9 & 20 \end{bmatrix}$$

المعادلة المميزة الى T تكون كما يلي

$$\Delta(t) = \det(M - tI) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -1-t & 6 & -12 \\ 0 & -13-t & 30 \\ 0 & -9 & 20-t \end{vmatrix} = 0$$

عند نشر المحدد اعلاه ينتج  $(t+1)(t-2)(t-5) = 0$  اذن تكون القيم الذاتية للتحويل اعلاه كما يلي

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$$

وهذه قيم ذاتية مختلفة وعددها يساوي 3 الذي هو بعد الفضاء  $R^3$ . اذن حسب النتيجة (4.2.5) يكون T قابلاً للاقطار .

ان النتيجة (4.2.5) تعطي شرطاً كافياً لكي يكون التحويل الخطي قابلاً للاقطار لكن هذا الشرط ( وجود قيم ذاتية مختلفة مساوية بالعدد لبعدها الفضاء ) ليس ضرورياً كما موضح في المثال التالي :

مثال (4) :

قرر فيما اذا كان التحويل الخطي  $T: R^3 \rightarrow R^3$  المعرف بالصيغة

$$T(x, y, z) = (x - 2z, 0, -2x + 4z)$$

قابلاً للاقطار .

الحل : مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية تكون كما يلي :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

المعادلة المميزة الى T تكون كما يلي :

$$-t^3 + 5t^2 = 0$$

$$t^2(-t + 5) = 0$$

القيم الذاتية الى T هي :  $\lambda_2 = 5, \lambda_1 = 0$

هنا يكون عدد القيم الذاتية المختلفة غير مساوٍ الى بعد الفضاء . لذلك نلجأ الى المبرهنة (4.2.3) ومنها نجد ان T يكون قابلاً للاقطار اذا فقط اذا كان :

$$\dim V_5 = 1, \dim V_0 = 2$$

هذا الغرض نحاول حساب الفضاءات الذاتية  $V_5, V_0$  بطريقة مماثلة للمثال (1) من هذا البند نجد ان :

$$V_0 = \{(2z, y, z) : y, z \in \mathbb{R}\}$$

وهذا يعني ان  $V_0$  له قاعدة مكونة من متجهين ذاتيين مثل  $(2, 0, 1)$  و  $(0, 1, 0)$  أي  $\dim V_0 = 2$  .

بما ان لكل قيمة ذاتية يوجد متجه ذاتي على الأقل فإن  $\dim V_5 = 1$  والان نستطيع القول بأن T قابل للاقطار .

مثال (5) :

جد القيم والفضاءات الذاتية للتحويل الخطي  $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$  المعرف بالصيغة :

$$T(a + bx + cx^2) = 2a + (a + b + 2c)x + (-b + 4c)x^2$$

ثم قرر فيما اذا كان T قابلاً للاقطار .

الحل : مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية  $\{1, x, x^2\}$  تستخرج كما يلي :

$$T(1) = 2 + x = 2(1) + 1(x) + 0(x^2)$$

$$T(x) = x - x^2 = o(1) + 1(x) + (-1)(x^2)$$

$$T(x^2) = 2x + 4x^2 = o(1) + 2(x) + (4)(x^2)$$

بهذا تكون مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية كما يلي .

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

المعادلة المميزة الى T تكون :

$$\Delta(t) = -(t-2)^2(t-3) = 0$$

بهذا تكون  $\lambda = 2$  ،  $\lambda = 3$  قيم ذاتية الى T .

بحيث ان تكرار  $\lambda = 2$  الجبري = 2 ، تكرار  $\lambda = 3$  الجبري = 1 .

لايجاد الفضاءات الذاتية يجب علينا حل النظام الخطي ادناه .

$$(a, b, c) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} = (0,0,0)$$

وذلك بالنسبة للقيمة الذاتية  $\lambda = 2$  ، وحل النظام الخطي

$$(a, b, c) \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = (0,0,0)$$

وذلك بالنسبة للقيمة الذاتية  $\lambda = 3$  .

النظام الاول يؤدي الى المعادلتين

$$a - b + 2c = 0$$

$$-b + 2c = 0$$

الحل بهذه الحالة يكون:  $a = 0$  و  $b = 2c$

( تذكر بأننا سنحصل على متجه احداثيات المتجه الذاتي )، بذلك يكون الفضاء الذاتي التابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 2$ ، كما يلي.

$$V_2 = \{a + bx + cx^2 : a = 0, b = 2c\}$$

$$= \{2cx + cx^2 : c \in \mathbb{R}\}$$

من هنا نلاحظ ان المتجه  $A = 2x + x^2$  يكون قاعدة الى  $V_2$  وعليه فإن التكرار الهندسي للقيمة الذاتية ( $\lambda = 2$ )  $\dim V_2 = 1$ . النظام الخطي الثاني يؤدي الى المعادلات

$$-a = 0$$

$$a - 2b + 2c = 0$$

$$-b + c = 0$$

$$a = 0, b = c$$

والحل بهذه الحالة يكون:  
اي ان.

$$V_1 = \{a + bx + cx^2 : a = 0, b = c\}$$

$$= \{bx + bx^2 ; b \in \mathbb{R}\}$$

من هنا نلاحظ ان المتجه  $B = x + x^2$  يكون قاعدة الى  $V_1$ .

بما ان تكرار  $\lambda = 2$  الهندسي اصغر من تكرارها الجبري فنستخلص من ان  $T$  غير قابل للاقطار.

مثال (6) :

جد قاعدة الى  $R^3$  بحيث تكون مصفوفة التحويل الخطي  $T: R^3 \rightarrow R^3$ ، المعرف في المثال (3) من هذا البند مصفوفة قطرية .

الحل : لقد كانت مصفوفة T بالنسبة للقاعدة الطبيعية كالآتي :

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 6 & -12 \\ 0 & -13 & 30 \\ 0 & -9 & 20 \end{pmatrix}$$

وكانت  $\lambda_3 = 5$  ،  $\lambda_2 = 2$  ،  $\lambda_1 = -1$  .

على ضوء النتيجة (4.2.4) ، قاعدة  $R^3$  التي تجعل من مصفوفة T بالنسبة لها قطرية يجب ان تكون مكونة من متجهات ذاتية الى T .

عليه يجب علينا ايجاد متجهات ذاتية تابعة للقيم الذاتية 5 ، 2 ، -1 .

عندما  $\lambda = -1$  يجب حل النظام الخطي

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} 0 & 6 & -12 \\ 0 & -12 & 30 \\ 0 & -9 & 21 \end{pmatrix} = (0,0,0)$$

الذي يؤدي الى المعادلات :

$$2x - 6y - 3z = 0$$

$$-12x + 30y + 21z = 0$$

وهذا نظام من المعادلات يكافئ النظام

$$2x - 6y - 3z = 0$$

$$-6y + 3z = 0$$

حل النظام اعلاه كالآتي: —

$$x = 3z, y = (1/2)z, z = z$$

بهذا يمكننا اخذ المتجه  $A = (6, 1, 2)$  كمتجه ذاتي تابع للقيم الذاتية  $\lambda = -1$ .

وبالطريقة نفسها يكون المتجه  $B = (0, -3, 5)$  متجهاً ذاتياً تابعاً للقيمة

الذاتية  $\lambda = 2$ . والمتجه  $C = (0, -1, 2)$  متجه ذاتي تابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 5$ .

الآن بالنسبة للقاعدة

$\{A_1 = (6, 1, 2), A_2 = (0, -3, 5), A_3 = (0, -1, 2)\}$  تكون مصفوفة T قطرية  
وكالآتي.

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

ملاحظة:

ان خلاصة ماتوصلنا اليه من خلال المبرهنات والامثلة تكون كما يلي: اذا كان لدينا تحويلاً خطياً  $V \rightarrow T:V$  و اردنا معرفة ان كانت هنالك قاعدة الى  $V$  بحيث تكون مصفوفة T بالنسبة لها قطرية. يجب علينا اتباع الخطوات التالية:

اولاً: نحسب مصفوفة T بالنسبة لاي قاعدة والافضل حسابها بالنسبة للقاعدة الطبيعية وذلك للسهولة والسرعة. لتكن تلك المصفوفة M.

ثانياً: نحسب متعددة الحدود المميزة  $\Delta(t)$  وذلك بفك المحددة  $\det(M - tI)$  ثم نحللها الى عواملها الاولى. ونلاحظ الحالتين التاليتين: —

الحالة (أ): عدد جذور المعادلة المميزة بحساب التكرار كذلك، لا يساوي بعد الفضاء V. ( هذا يكفيء عدم تحلل المعادلة المميزة الى حاصل ضرب



عوامل خطية ) عندئذ نقول بأن  $T$  غير قابل للاقطار اي انه لا توجد قاعدة الى  $V$  تجعل من مصفوفة  $T$  قطرية .

الحالة (ب): عدد جذور المعادلة المميزة بحساب التكرار كذلك ، يساوي بعد الفضاء  $V$  . ( هذا يكفيء تحلل المعادلة المميزة الى حاصل ضرب عوامل خطية ) .

عندئذ يكون هنالك املاً بأن يكون  $T$  قابلاً للاقطار وهذا الامل يعتمد على المتجهات الذاتية وهي خطوة جديدة .

ثالثاً :

( أ ) ان كان المطلوب فقط معرفة قابلية  $T$  للاقطار فنحسب بعد الفضاء الذاتي ( الذي يساوي التكرار الهندسي ) للقيم الذاتية المكررة اكثر من مرة ، اي نحسب التكرار الهندسي لكل قيمة ذاتية تكرارها الجبري اكبر من واحد وهنا يكون لدينا حالتان :

( أ )  $1$  : عند وجود قيمة ذاتية تكرارها الهندسي اصغر من تكرارها الجبري فنقول بأن  $T$  غير قابل للاقطار .

( أ )  $2$  : بخلافه يكون  $T$  قابلاً للاقطار .

(ب) في حالة كون  $T$  قابلاً للاقطار والمطلوب ايجاد قاعدة للفضاء  $V$  تجعل من مصفوفة  $T$  قطرية فيجب حساب كل المتجهات الذاتية وسوف تكون القاعدة المطلوبة .

(ج) تكون العناصر القطرية عبارة عن القيم الذاتية للتحويل  $T$  وترتيبها يرتبط بترتيب المتجهات الذاتية في القاعدة .

سنختم بندنا هذا بمجموعة من الامثلة المتنوعة .

مثال (7) :

اذا كان  $V \rightarrow T:V$  تحويلاً خطياً ، بحيث  $T^2 = T \circ T = I$  اي ان  $T^2$  يساوي التحويل المحايد فيبرهن على ان  $\lambda = -1, \lambda = 1$  هي القيم الذاتية الوحيدة لـ  $T$  .

الحل: افرض بأن  $\lambda$  قيمة ذاتية و  $A$  متجه ذاتي تابع لها. اذن  $T(A) = \lambda A$  من هذه المعادلة ينتج

$$A = I(A) = T^2(A) = T(\lambda A) = \lambda T(A) = \lambda^2 A$$

$$(1 - \lambda^2)A = 0 \quad \text{اذن}$$

وبما ان  $A$  متجه ذاتي فإن  $A \neq 0$  وعليه يكون  $1 - \lambda^2 = 0$  ومن هذه المعادلة نستنتج على ان  $\lambda = 1, \lambda = -1$  هي القيم الذاتية الوحيدة.

مثال (8):

افرض بأن  $\lambda$  قيمة ذاتية للتحويل الخطي  $T: V \rightarrow V$  وان  $A$  متجه ذاتي لها. برهن على ان  $\lambda^n$  تكون قيمة ذاتية للتحويل  $T^n = T \circ T \circ \dots \circ T$  وان  $A$  يكون متجهها ذاتياً تابعاً لها وذلك لاي عدد صحيح موجب  $n$ .

$$T(A) = \lambda A \quad \text{الحل: عندنا}$$

بأخذ  $T$  لطرفي المعادلة اعلاه وملاحظة ان  $T$  تحويل خطي، نحصل على

$$T^2(A) = T(T(A)) = T(\lambda A) = \lambda T(A)$$

$$T^2(A) = \lambda (\lambda A) = \lambda^2 A \quad \text{وبالتعويض نحصل على}$$

هذا يعني ان المتجه  $A$  يكون متجهاً ذاتياً للتحويل الخطي  $T^2$  تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda^2$ . وبالاستقراء الرياضي نحصل على النتيجة المطلوبة.

مثال (9):

جد تحويلاً خطياً  $T: R^2 \rightarrow R^2$  يمتلك قيمة ذاتية  $\lambda = 1$  ومتجهاً ذاتياً  $A = (1, -1)$  وقيمة ذاتية اخرى  $\lambda = 0$  ومتجهاً ذاتياً  $B = (2, 3)$ .

الحل: من تعريف القيم والمتجهات الذاتية ينتج

$$T(A) = T(1, -1) = 1(1, -1) = (1, -1)$$

$$T(B) = T(2, 3) = 0(2, 3) = (0, 0)$$

المطلوب إيجاد  $T(x,y)$  . لهذا الغرض نكتب

$$(x,y) = a(1, -1) + b(2,3)$$

$$(x,y) = (a + 2b, -a + 3b)$$

ينتج

هذا يؤدي الى المعادلتين :

$$a + 2b = x$$

$$-a + 3b = y$$

$$a = (1/5)(3x - 2y), b = (1/5)(x + y)$$

والحل يكون :

$$T(x, y) = aT(1, -1) + bT(2,3)$$

اذن :

$$= (1/5)(3x - 2y)(1, -1) + (1/5)(x + y)(0,0)$$

$$= (1/5)(3x - 2y, 2y - 3x)$$

مثال (10) :

ليكن  $T: P_1(C) \rightarrow P_1(C)$  التحويل الخطي المعرف بالصيغة :

$$T(a + bx) = 2a + (5a - b)x$$

جد قاعدة للفضاء  $P_1(C)$  بالنسبة اليها تكون مصفوفة  $T$  قطرية .

الحل : نتبع الارشادات التي وردت سابقاً ونجد مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية  $\{1, x\}$  . هذه المصفوفة تحسب كما في الامثلة السابقة .

$$T(1) = 2 + 5x$$

$$T(x) = -x$$

عليه تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية كما يلي

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

القيم الذاتية ستكون  $\lambda = 2$  ,  $\lambda = -1$  . القاعدة المطلوبة ستكون مؤلفة من المتجهات الذاتية . هنالك متجه  $5x + 3$  تابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 2$  ومتجه  $x$  تابع للقيمة الذاتية  $\lambda = -1$  . بالنسبة للقاعدة  $\{A_1 = 3 + 5x, A_2 = x\}$  تكون مصفوفة T قطرية بالصيغة  $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  . اما بالنسبة للقاعدة  $A_1 = x, A_2 = 3 + 5x$  تكون

مصفوفة T قطرية بالصيغة  $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  ، ( لاحظ الترتيب ! ) .

## تمارين (4.2)

1 — اوجد القيم الذاتية وقواعد للفضاءات الذاتية لكل من التحويلات الخطية التالية :

- ( أ )  $T(x,y) = (y, 2x)$  ،  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
  - ( ب )  $T(x,y,z) = (3x-z, y-x+2z, 4z)$  ،  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
  - ( ج )  $T(x, y, z, w) = (x+y, y, 2z, y+2z+2w)$  ،  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$
  - ( د )  $T(P(x)) = x \cdot d/dx (P(x))$  ،  $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$
  - ( هـ )  $T(P(x)) = d/dx (x p(x))$  ،  $T: P_2(\mathbb{C}) \rightarrow P_2(\mathbb{C})$
- ( اعتبر  $P_2(\mathbb{C})$  فضاءً على الحقل  $\mathbb{C}$  ) .

2 — قرر فيما اذا كان كل تحويل في التمرين (1) قابلاً للاقطار .

3 — قرر فيما اذا كانت التحويلات التالية قابلة للاقطار .

- ( أ )  $T(x, y, z) = (2x + y, y - z, 2y + 4z)$  ،  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
  - ( ب )  $T(x, y, z) = (x - 2z, 0, -2x + 4z)$  ،  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
  - ( ج )  $T(x, y, z) = (0, x, y)$  ،  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
  - ( د )  $T(x, y, z) = (-x, -z, y)$  ،  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
  - ( هـ )  $T(u, v, w) = (-u, -w, v)$  ،  $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$
- ( اعتبر  $\mathbb{C}^3$  فضاءً على الحقل  $\mathbb{C}$  )

( و )  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$

$$T(x, y, z, w) = (x, 2x + 5y + 6z + 7w, 3x + 8z + 9w, 4x + 10w)$$

4 — جد قاعدة لمجال كل تحويل خطي قابل للاقطار في تمرين (3) تجعل من مصفوفة ذلك التحويل بالنسبة لها قطرية .

5 — اذا كان  $V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً، بحيث  $T^2 = T$ . بين ان  $T$  يكون قابلاً للاقطار .

6 — اذا كان  $V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً غير معتلاً وقابلاً للاقطار فبرهن على ان  $V \rightarrow V$  يكون ايضاً قابلاً للاقطار .

### (4.3) المصفوفات المتشابهة Similar Matrices

لقد ناقشنا في البند السابق مسألة وجود قاعدة للفضاء  $V$  بالنسبة اليها تكون مصفوفة التحويل الخطي  $V \rightarrow V$  مصفوفة قطرية . فإذا كانت مصفوفة التحويل  $T$  بالنسبة لقاعدة معينة هي  $M$  فإن المسألة اعلاه تكافئ السؤال عن وجود تغيير للقاعدة بحيث تكون المصفوفة الجديدة قطرية . من المبرهنة (2.5.2)، المصفوفة الجديدة للتحويل  $T$  ستكون  $PMP^{-1}$  بحيث ان  $P$  هي مصفوفة قابلة للقلب . هذا يؤدي بنا الى الصياغة التالية بالمصفوفات للمسألة اعلاه .

مسألة: اذا اعطينا مصفوفة مربعة  $M$ ، فهل توجد مصفوفة قابلة للقلب  $P$  بحيث تكون  $PMP^{-1}$  قطرية؟ .

هذا يوحى بالتعريف التالي :

تعريف :

اذا كانت  $M, N$  مصفوفتين مربعيتين من الدرجة نفسها فنقول بأن  $M$  تشابه  $N$  اذا فقط اذا وجدت مصفوفة  $P$  قابلة للقلب بحيث ان  $N = PMP^{-1}$  .  
انه لمن السهل البرهنة على المبرهنة التالية .

مبرهنة (4.3.1):

علاقة تشابه المصفوفات تكون علاقة تكافؤ اي ان  $M$  تشابه  $M$  لاي مصفوفة  $M$  واذا كانت  $M$  تشابه  $N$  فإن  $N$  تشابه  $M$  واذا كانت  $M$  تشابه  $N$  و  $N$  تشابه  $Q$  فإن  $M$  تشابه  $Q$ .

ويمكن طرح المسألة اعلاه بلغة جديدة.

مسألة: اذا اعطينا مصفوفة مربعة  $M$  فمتى تكون مشابهة الى مصفوفة قطرية.  
سنكون بحاجة لهذه المسألة في الفصل السادس، ولغرض حل المسألة اعلاه سنقدم التعاريف التالية.

تعريف:

اذا كانت  $M$  مصفوفة  $n \times n$  عناصرها مأخوذة من حقل  $F$  فإن العدد القياسي  $r \in F$  يسمى قيمة ذاتية للمصفوفة  $M$  اذا فقط اذا وجد متجهاً  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  في  $F^n$  غير صفري ويحقق  $XM = rX$ .

بهذه الحالة نقول بأن المتجه  $X$  متجه ذاتي تابع للقيمة الذاتية  $r$ .

لاحظنا في البند السابق ان القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للتحويلات الخطية كانت تستخرج من مصفوفة التحويل الخطي وعليه يمكن ان نعرف ونستخرج مايلي:

- 1 — المعادلة المميزة لاي مصفوفة مربعة  $M$  تكون  $|M - tI| = 0$ .
- 2 — القيم الذاتية للمصفوفة المربعة تكون جذور المعادلة المميزة.
- 3 — المصفوفات المتشابهة لها متعددة الحدود المميزة نفسها.

الاجابة على المسألة المطروحة في بداية بندنا هذا تكمن في المبرهنة التالية:

مبرهنة (4.3.2):

المصفوفة المربعة  $M$  ذات الدرجة  $n \times n$  تكون مشابهة لمصفوفة قطرية اذا فقط اذا امتلكت  $n$  من المتجهات الذاتية المستقلة خطياً.

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & & 0 \\ 0 & d_2 & \\ & \dots & \\ 0 & & d_n \end{bmatrix}$$

البرهان :

افرض ان M تشابه المصفوفة القطرية

بهذه الحالة وحسب تعريف التشابه فإنه توجد مصفوفة قابلة للقلب P

بحيث

$$PMP^{-1} = D$$

$$PM = DP$$

وهذا يعني ان

الان افرض ان  $P_k$  هو الصف k في المصفوفة P، بذلك يمكن رؤية المصفوفة P كالآتي:

$$P = \begin{pmatrix} P_1 \\ \vdots \\ P_n \end{pmatrix}$$

عليه يكون:

$$PM = \begin{pmatrix} P_1 M \\ \vdots \\ P_n M \end{pmatrix}, \quad DP = \begin{pmatrix} d_1 P_1 \\ \vdots \\ d_n P_n \end{pmatrix}$$

وبما ان  $PM = DP$  فنستنتج من ان:

$$P_1 M = d_1 P_1, P_2 M = d_2 P_2, \dots, P_n M = d_n P_n$$

عندئذ يكون كل من  $P_1, \dots, P_n$  متجهاً ذاتياً للمصفوفة M تابعاً للقيمة الذاتية  $d_1, \dots, d_n$  على التوالي.

بما ان P مصفوفة قابلة للقلب فإن صفوفها تكون مستقلة خطياً اي ان

المتجهات الذاتية  $P_1, \dots, P_n$  تكون مستقلة خطياً.

على العكس، لو افترضنا وجود  $n$  من المتجهات الذاتية المستقلة خطياً  
 للمصفوفة  $M$  وليكن:  $X_1, \dots, X_n$  تابعة للقيم الذاتية:  $r_1, \dots, r_n$  على التوالي،  
 فنضع

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} r_1 & & 0 \\ & r_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & r_n \end{bmatrix}$$

بذلك تتكون لدينا مصفوفة مربعة  $X$  ذات درجة  $n \times n$  وتكون هذه  
 المصفوفة قابلة للقلب وذلك للاستقلال الخطي لمصفوفاتها.

الآن يمكن التحقق بسهولة على أن  $XM = DX$  أي

$$XM X^{-1} = D$$

اذن  $M$  تكون مشابهة لمصفوفة قطرية  $D$ .

(و. ه. م.)

مثال (1):

جد ان امكن مصفوفات قطرية مشابهة لكل من المصفوفات التالية:

$$M_1 = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -12 \\ 0 & -13 & 30 \\ 0 & -9 & 20 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = \begin{bmatrix} 17 & -10 & -5 \\ 45 & -28 & -15 \\ -30 & 20 & 12 \end{bmatrix}, M_4 = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



**الحل: (1)** المعادلة المميزة للمصفوفة  $M_1$  تكون:

$$\begin{vmatrix} -1-t & 6 & -12 \\ 0 & -13-t & 30 \\ 0 & -9 & 20-t \end{vmatrix} = 0$$

ويفتح المحدد اعلاه تنتج المعادلة  $(t+1)(t-2)(t-5) = 0$ .

وبذلك تكون القيم الذاتية للمصفوفة  $M_1$  كالآتي:

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$$

بما ان هذه القيم الذاتية مختلفة فستنتج على ان المتجهات الذاتية التابعة لها تكون مستقلة خطياً وبذلك تكون المصفوفة  $M_1$  مشابهة الى المصفوفة القطرية:

$$D = \begin{bmatrix} -1 & & 0 \\ & 2 & \\ 0 & & 5 \end{bmatrix}$$

القارئ يجب ان يحقق على ان المتجهات:

$$A_1 = (1, -1, 2), A_2 = (0, 3, -5), A_3 = (0, 0, 2)$$

تكون متجهات ذاتية تابعة للقيم الذاتية  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  على التوالي وعليه اذا وضعنا:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

فإنه بالإمكان التحقق من ان:  $PM_1P^{-1} = D$ .

2 — ناقش الآن المعادلة المميزة للمصفوفة  $M_2$ .

$$\begin{vmatrix} 2-t & -1 & 0 \\ 1 & -t & 0 \\ 0 & 0 & 3-t \end{vmatrix} = 0$$

$$(3-t)(t-1)^2 = 0 \quad \text{اي ان :}$$

القيم الذاتية للمصفوفة  $M_2$  تكون :  $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$

لغرض حساب المتجهات الذاتية التابعة للقيمة الذاتية 1 علينا إيجاد حل للمعادلة :

$$(x, y, z) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = (0,0,0)$$

$$x + y = 0 \quad \text{وهذه تؤدي الى :}$$

$$2z = 0$$

$$x = -y, y = y, z = 0 \quad \text{والحل يكون :}$$

وبهذا نحصل على متجه ذاتي مثل  $(-1, 1, 0)$  وجميع المتجهات الذاتية الأخرى تكون بالصيغة  $r(-1, 1, 0)$  حيث  $r$  عدد حقيقي. عليه سوف يوجد متجهان ذاتيان مستقلان خطياً أحدهما يتبع القيمة الذاتية  $\lambda_2 = 1$  والأخر يتبع القيمة الذاتية  $\lambda_1 = 3$  وبالتالي وحسب المبرهنة (4.3.2) فإن المصفوفة  $M_2$  لا تكون مشابهة لمصفوفة قطرية.

(3) المعادلة المميزة للمصفوفة  $M_3$  تكون :

$$(t+3)(t-2)^2 = 0$$

عليه يكون للمصفوفة  $M_3$  قيمتان ذاتيتان هما  $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$

لغرض حساب المتجهات الذاتية التابعة للقيمة الذاتية 2، علينا إيجاد حل للمعادلة :

$$(x, y, z) \begin{bmatrix} 15 & -10 & -5 \\ 45 & -30 & -15 \\ -30 & 20 & 10 \end{bmatrix} = (0,0,0)$$

$$x + 3y - 2z = 0$$

وهذه تؤدي الى :

اما بقية المعادلات فتكون معتمدة على المعادلة اعلاه .  
عليه يكون الحل كالآتي :

$$x = 2z - 3y, y = y, z = z$$

بذلك يمكن الحصول على متجهين ذاتيين مستقلين خطياً مثل :

$$A_1 = (-3, 1, 0), A_2 = (2, 0, 1)$$

والطريقة نفسها نحصل على المتجه  $A_3 = (-3, 2, 1)$  كمتجه ذاتي تابع للقيمة الذاتية  $\lambda_1 = -3$ .

اذا وضعنا :

$$P = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

فانه بالامكان التحقق من ان :

$$PM_3P^{-1} = D$$

عليه فان  $M_3$  تشابه مصفوفة قطرية .

$$(4) \text{ المعادلة المميزة للمصفوفة } M_4 \text{ تكون : } t^2 + 4 = 0$$

بما انه لا يوجد حل للمعادلة اعلاه على حقل الاعداد الحقيقية فانه لا توجد قيم ذاتية للمصفوفة  $M_4$  وذلك على حقل الاعداد الحقيقية ، اي انه لا يمكن للمصفوفة  $M_4$  ان تكون مشابهة لمصفوفة قطرية ذات عناصر قطرية حقيقية .

اذا اردنا استخدام اعداد عقدية فانه توجد قيمتان ذاتيتان هما  $\lambda_1 = 2i$  ،  $\lambda_2 = -2i$  وبالتالي يتبعهما متجهان ذاتيان مستقلان خطياً وعليه تكون المصفوفة

$$D = \begin{bmatrix} -2i & 0 \\ 0 & 2i \end{bmatrix} \text{ المقارىء } M_4 \text{ مشابه للمصفوفة القطرية}$$

مدعو الآن لايجاد المصفوفة P التي تحقق  $PM_4P^{-1} = D$ .

مثال (2):

برهن على ان المصفوفتين M و N متشابهتان، حيث

$$M = \begin{bmatrix} 12 & -7 \\ 14 & -9 \end{bmatrix} \text{ و } N = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -14 & 5 \end{bmatrix}$$

الحل: يجب علينا ايجاد مصفوفة P تحقق  $PMP^{-1} = N$ ، وهذا حله صعب بالطريقة المباشرة. لذلك نحاول ان نستخدم القيم الذاتية والمتجهات الذاتية.

المعادلة المميزة الى M تكون:  $(t-5)(t+2) = 0$

وعليه فإنه يوجد متجهان ذاتيان مستقلان خطياً للمصفوفة M. اذن تكون M مشابهة لمصفوفة قطرية  $D_1$ ، اي انه توجد مصفوفة  $P_1$  تحقق  $P_1MP_1^{-1} = D_1$

المعادلة المميزة الى N تكون:  $(5-t)(-2-t) = 0$  وبالطريقة نفسها فإنه توجد مصفوفة  $P_2$  تحقق  $P_2NP_2^{-1} = D_2$  حيث ان  $D_2$  مصفوفة قطرية.

الآن نلاحظ ان العناصر القطرية لكل من المصفوفتين  $D_1$ ،  $D_2$  عبارة عن القيم الذاتية للمصفوفتين M و N على التوالي.

عليه يكون:

$$D_1 = D_2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

وذلك لان القيم الذاتية للمصفوفة M تكون القيم الذاتية للمصفوفة

.N

$$P_1MP_1^{-1} = P_2NP_2^{-1}$$

اذن

$$(P_2^{-1}P_1)M(P_1^{-1}P_2) = N \quad \text{وعليه يكون}$$

وبوضع  $P = P_1^{-1}P_2$  نحصل على  $PMP^{-1} = N$  وعليه تكون  $M$  مشابهة الى  $N$ .

ملاحظة:

إذا طلب منا إيجاد  $P$  فيتوجب علينا إيجاد كل من  $P_2, P_1$  وذلك حسب الطريقة في المثال (1).

### تمارين (4.3)

1 — جد مصفوفات قطرية مشابهة للمصفوفات التالية:

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix} \text{ (ج) } \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \text{ (ب) } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (أ)}$$

2 — أوجد لكل من المصفوفات التالية كل القيم الذاتية والمتجهات الذاتية.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

3 — أوجد مصفوفات قابلة للقلب  $P_1, P_2, P_3$  بحيث تكون كل من  $P_3CP_3^{-1}$  و  $P_2BP_2^{-1}$  و  $P_1AP_1^{-1}$  مصفوفة قطرية. حيث ان  $A, B, C$  هي مصفوفات تمرين 2.

4 — كرر المطلوب في التمرينين 2,3 على المصفوفات

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad , B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5 — جد القيم والمتجهات الذاتية للمصفوفات

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

وذلك على حقل الاعداد العقدية.

6 — قرر فيما اذا كانت كل من المصفوفات التالية مشابهة الى مصفوفة قطرية وذلك على حقل الاعداد الحقيقية.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -6 & -6 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

7 — اذا كان  $a \neq 0$  عدداً عقدياً فبرهن على ان المصفوفة

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8 — اذا كانت  $A$  مصفوفة مربعة و  $A^T$  مدورة المصفوفة  $A$  فبرهن على ان  $A, A^T$  لهما متعددة الحدود المميزة نفسها.

9 — برهن على ان للمصفوفتين  $A, A^T$  قيمتان ذاتيتان متساويتان. اورد مثلاً تبين منه ان للمصفوفتين  $A, A^T$  متجهان ذاتيان مختلفان.

10 — اذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} -25 & -36 \\ 18 & 26 \end{bmatrix}$$

فجد مصفوفة  $H$  تحقق  $HAH^{-1}$  تكون قطرية، ثم جد  $A^{12}$ .

11 — برهن على ان المصفوفتين A, B متشابهتان ، حيث :

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -14 & 0 \end{bmatrix} , \quad B = \begin{bmatrix} 12 & -7 \\ 14 & -9 \end{bmatrix}$$

12 — اذا كانت A مصفوفة مربعة  $n \times n$  على حقل الاعداد الحقيقية واذا كانت  $\lambda$  قيمة ذاتية الى A فبرهن على ان  $\lambda^k$  تكون قيمة ذاتية الى  $A^k$  ، وذلك لاي عدد صحيح موجب k . استنتج من ذلك ان  $P(\lambda)$  تكون قيمة ذاتية الى  $P(A)$  ، حيث P متعددة حدود معاملاتها اعداد حقيقية .

13 — جد القيم الذاتية للمصفوفة  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$

وحقق مباشرة ان القيم الذاتية للمصفوفة  $A^2$  تكون مربعات القيم الذاتية للمصفوفة A .

14 — جد القيم والمتجهات الذاتية للمصفوفة  $M = \begin{bmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 2-2i & 1-i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

على حقل الاعداد العقدية C ثم قرر فيما اذا كانت مشابهة لمصفوفة قطرية .

15 — اذا كانت A مصفوفة مربعة  $n \times n$  قابلة للقلب ومتعددة حدودها المميزة

$$|A - tI| = (-1)^n t^n + b_{n-1}t^{n-1} + \dots + b_1t + b_0$$

فبرهن على ان متعددة الحدود المميزة للمصفوفة  $A^{-1}$  تكون

$$(-1)^n [t^n + (b_1 / |A|)t^{n-1} + \dots + (b_{n-1} / |A|)t + (-1)^n / |A|]$$

(4.4) مبرهنة كيلي — هاملتون وتطبيقاتها

(Cayley - Hamilton Theorem)

نخصص هذا البند لبرهنة نتيجة هامة في موضوع الجبر الخطي لها تطبيقات كثيرة في الاحصاء وبقية فروع الرياضيات وهي مبرهنة كيلي — هاملتون . هذه المبرهنة تنص على ان اي مصفوفة مربعة تحقق معادلتها المميزة ولتوضيح ذلك نفرض ان المعادلة المميزة للمصفوفة المربعة  $M$  ذات الدرجة  $n \times n$  تكون: —

$$t^n + a_1 t^{n-1} + a_2 t^{n-2} + \dots + a_{n-1} t + a_n = 0$$

الناجئة من فتح المحدد في المعادلة  $|M - tI| = 0$

ان مبرهنة كيلي هاملتون تنص على ان

$$M^n + a_1 M^{n-1} + \dots + a_{n-1} M + a_n I = 0 \dots (*)$$

حيث ان  $0$  في الطرف الايمن للمعادلة (\*) يمثل المصفوفة الصفرية  $n \times n$ .

مبرهنة (4.4.1) ( كيلي — هاملتون )

اي مصفوفة مربعة تحقق معادلتها المميزة .

البرهان :

لتكن  $M$  مصفوفة مربعة  $n \times n$  عناصرها من الحقل  $F$  ومعادلتها المميزة

$$t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_{n-1} t + a_n = 0$$

$$N = \text{Adj}(M - tI) \quad \text{لتكن:}$$

ان العنصر  $N_{ij}$  عبارة عن المحدد الناتج من حذف الصف  $j$  والعمود  $i$  في المصفوفة  $M - tI$  وهذا المحدد مضروب في  $(-1)^{i+j}$ .

بذلك تكون عناصر  $N$  عبارة عن متعددات حدود في  $t$  ذات درجة لا تتعدى  $n-1$ . بذلك يمكننا ان نكتب  $N$  بالصيغة



$$N = t^{n-1} N_{n-1} + t^{n-2} N_{n-2} + \dots + tN_1 + N_0$$

حيث ان:  $N_0, N_1, \dots, N_{n-1}$  مصفوفات مربعة  $n \times n$  عناصرها ثابتة من الحقل  $F$ .

ان المصفوفة  $N$  تحقق مايلي:

$$(M - tI) N = \det(M - tI) \cdot I$$

والمعادلة اعلاه يمكن التحقق منها من تعريف  $N$  ومن خصائص اخذت في معظم كتب التفاضل والتكامل.

بهذا يكون لدينا المعادلة التالية:

$$(M - tI) (t^{n-1} N_{n-1} + t^{n-2} N_{n-2} + \dots + tN_1 + N_0) = (t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_{n-1} t + a_n) I$$

بمقارنة معاملات  $t^k$  في طرفي المعادلة اعلاه وذلك لكل  $0 \leq k \leq n$ .

نحصل على

$$-N_{n-1} = I$$

$$-N_{n-2} + MN_{n-1} = a_1 I$$

$$-N_{n-3} + MN_{n-2} = a_2 I$$

⋮

$$MN_0 = a_n I$$

بضرب هذه المعادلات في  $M^n, M^{n-1}, \dots, M, I$  على التوالي وجمعها ينتج مايلي:

$$M^n + a_1 M^{n-1} + \dots + a_{n-1} M + a_n I = O$$

( و . ه . م )

نورد الآن تطبيقين للمبرهنة اعلاه.

**التطبيق (I):** حساب معكوس مصفوفة مربعة.

افرض ان  $M$  مصفوفة مربعة قابلة للقلب. بهذه الحالة تكون المعادلة المميزة الى  $M$  بالصيغة

$$t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_{n-1} t + a_n = 0$$

بمبث ان  $a_n \neq 0$ . فلو كان  $a_n = 0$  لكان  $t = 0$  احد جذور المعادلة المميزة وبالتالي يكون قيمة ذاتية للمصفوفة  $M$ . لكن المعادلة المميزة جاءت من المعادلة

$$\det(M - tI) = 0$$

$t = 0$  تحقق المعادلة اعلاه تنتج،  $\det M = 0$  وعليه لا تكون  $M$  قابلة للقلب اذن  $a_n \neq 0$  تطبيق مبرهنة كيلبي — هاملتون ينتج

$$M^n + a_1 M^{n-1} + \dots + a_{n-1} M + a_n I = O$$

بما ان  $a_n \neq 0$  اذن

$$I = (-1/a_n)(M^n + a_1 M^{n-1} + \dots + a_{n-1} M)$$

بضرب طرفي المعادلة اعلاه في  $M^{-1}$  نحصل على:

$$M^{-1} = (-1/a_n)(M^{n-1} + a_1 M^{n-2} + \dots + a_{n-1} I)$$

**مثال (I):**

بتطبيق مبرهنة كيلبي هاملتون، جد  $M^{-1}$  اذا علمت بأن:

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 6 & -12 \\ 0 & -13 & 30 \\ 0 & -9 & 20 \end{pmatrix}$$

الحل: المعادلة المميزة الى  $M$  تكون كما يلي:

$$t^3 - 6t^2 + 3t + 10 = 0$$

مبرهنة كيلبي — هاملتون تنص على ان  $M$  تحقق المعادلة اعلاه، اي

$$M^3 - 6M^2 + 3M + 10I = O$$

$$M^{-1} = (-1/10)(M^2 - 6M + 3I) \quad \text{اذن :}$$

$$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 24 & -48 \\ 0 & -101 & 210 \\ 0 & -63 & 130 \end{bmatrix} \quad \text{الان :}$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 6/5 & -12/5 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 9/10 & -13/10 \end{bmatrix} \quad \text{عليه يكون}$$

التطبيق (2) :

التعبير عن  $(k \geq n)M^k$  بدلالة  $M^i$  ( $i \leq n$ )  
 يمكن التعبير عن  $(k \geq n)M^k$  كمتعددة حدود في  $M$  ذات درجة غير  
 متعدية الى  $n-1$  وذلك على النحو التالي :

$M$  تحقق معادلتها المميزة، اي ان

$$M^n + a_1M^{n-1} + \dots + a_{n-1}M + a_nI = O$$

عندما  $k \geq n$ ، نضرب المعادلة اعلاه في  $M^{k-n}$  فنحصل على :

$$M^k + a_1M^{k-1} + \dots + a_{n-1}M^{k-n+1} + a_nM^{k-n} = O$$

هذا يعني انه بالامكان كتابة  $M^k$  كمتعددة حدود بدرجة اقل او تساوي  
 $k-1$ . وبتطبيق ذلك عدة مرات نتوصل الى ان  $M^k$  يمكن كتابته كمتعددة حدود  
 بدرجة لا تتعدى  $n-1$  وكما موضح في المثال التالي .

مثال (2) :

جد  $M^7$  اذا علمت بأن

$$M = \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

الحل : المعادلة المميزة الى M تكون :

$$t^2 - t - 2 = 0$$

بتطبيق مبرهنة كيلى — هاملتون نحصل على

$$M^2 - M - 2I = 0$$

اذن  $M^2 = M + 2I$  وعليه يكون  $M^3 = M^2 + 2M$  وبالتعويض عن  $M^2$  نحصل على  $M^3 = (M + 2I) + 2M$  وهكذا نحصل على

$$M^7 = 21M^2 + 22M = 43M + 42I$$

$$= 43 \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} + 42 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -130 & 258 \\ -129 & 257 \end{bmatrix}$$

يمكن اجراء عملية الحساب كالآتي : بضرب المعادلة  $M^2 = M + 2I$  في  $M^5$  نحصل :

$$M^7 = M^6 + 2M^5$$

$$= (M^5 + 2M^4) + 2M^5 = 3M^5 + 2M^4$$

$$= 3(M^4 + 2M^3) + 2M^4 = 5M^4 + 6M^3$$

$$= 5(M^3 + 2M^2) + 6M^3 = 11M^3 + 10M^2$$

$$= 11(M^2 + 2M) + 10M^2 = 21M^2 + 22M$$

$$= 21(M + 2I) + 22M = 43M + 42I$$

ان التطبيقين اعلاه يكونان مفيدان في حالة كون درجة M كبيرة وهذا يقلل من عدد الخطوات ومن زمن الحاسبة الالكترونية ان استخدمت .

تمارين (4.4)

1 - جد المعادلة المميزة للمصفوفة  $A = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$  ثم استخدم مبرهنة كيلي - هاملتون

2 - إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ، فجد المعادلة المميزة الى  $A$  ثم جد  $A^{-1}$  باستخدام مبرهنة كيلي - هاملتون.

3 - إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & i \end{bmatrix}$ ، فجد المعادلة المميزة الى  $A$  ثم احسب  $A^{-1}$  و  $A^5$ .

4 - جد  $A^{-1}$  باستخدام مبرهنة كيلي هاملتون.

$$A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2i \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## الفصل الخامس

### الفضاءات الاقليدية

#### Euclidean Vector Spaces

##### (5.0) مقدمة

لقد تعرف الطالب في مواضيع التفاضل والتكامل والفيزياء وغيرها على الضرب الداخلي او الضرب النقطي (dot product) لمتجهين  $A, B$  في المستوى  $R^2$  وفي الفراغ  $R^3$ . ان لهذا الضرب اهمية كبيرة في معرفة الزوايا بين المتجهات ومعرفة خصائص هندسية كثيرة.

ان الضرب القياسي اعلاه كان معرّفاً على النحو التالي

$$A \cdot B = \|A\| \|B\| \cos \theta$$

حيث ان  $\|A\|$  يمثل طول المتجه  $A$  و  $\theta$  هي الزاوية بين المتجهين  $A$  و  $B$ . ان التعريف اعلاه يبدو معقولاً في الفضاءين  $R^2$  و  $R^3$  وذلك لان اطوال المتجهات تعرف بسهولة وكذلك فان الزوايا يمكن قياسها وذلك للوضوح الهندسي لهذين الفضاءين.

في الدراسة التجريدية للجبر الخطي، حيث نناقش فضاء المتجهات من خلال بديهيات معينة، تكون الطريقة اعلاه في تعريف الضرب الداخلي غير معقولة وذلك لاننا مثلاً نقول فضاء المصفوفات  $2 \times 2$  فماذا يعني عندئذٍ طول مصفوفة او الزاوية بين مصفوفتين.

سيكون هدفنا في هذا الفصل مناقشة هذه المسألة، حيث نبدأ في البند (5.1) بتعريف الضرب الداخلي (Inner product) على فضاء المتجهات من خلال طرح مجموعة من البديهيات.

في البند (5.2) سندرس أطوال المتجهات والزوايا بين المتجهات في الفضاءات المعرف عليها ضرباً داخلياً. سنطلق اسم فضاء اقليدي على أي فضاء متجهات منتهي البعد وعلى حقل الأعداد الحقيقية ومعرف عليه ضرباً داخلياً. سنرى كيف ان ماسنطرحه بالشكل العام ينطبق على ما هو معروف عن الضرب الداخلي والطول في المستوي  $R^2$  والفراغ  $R^3$ . سندرس في البند (5.3) تعامد المتجهات وكيفية إيجاد قاعدة متعامدة من المتجهات لفضاء اقليدي. البند الأخير خصص لدراسة الفضاءات المتسمة العمودية.

## (5-1) الفضاءات الاقليدية (Euclidean Vector Spaces)

ليكن  $V$  فضاء متجهات على حقل الأعداد الحقيقية.

تعريف :

بضرب داخلي (Inner product) على  $V$  نقصد دالة

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow R$$

تخصص لكل زوج من المتجهات  $A, B$  في  $V$ ، عدداً حقيقياً يرمز له بالرمز  $\langle A, B \rangle$  وهذا يحقق الخصائص التالية :

$$1 - \langle A, B \rangle = \langle B, A \rangle \text{ وذلك لكل } A \in V \text{ ولكل } B \in V.$$

$$2 - \langle rA, B \rangle = r \langle A, B \rangle = \langle A, rB \rangle \text{ وذلك لكل } A \in V \text{ ولكل } B \in V$$

$$3 - r \in R \text{ ولكل عدد حقيقي } r.$$

— 3

$$(أ) \langle A+B, C \rangle = \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle$$

$$(ب) \langle A, B+C \rangle = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$$

وذلك لكل  $A, B, C \in V$

4 — لكل متجه  $AEV$  يكون

$$\langle A, A \rangle \geq 0 \quad (\text{أ})$$

$$\langle A, A \rangle = 0 \quad (\text{ب}) \text{ اذا فقط اذا } A = 0.$$

بالامكان تعريف الضرب الداخلي على فضاء متجهات على حقل الاعداد العقدية لكن بطريقة تختلف عن الطريقة اعلاه لكننا سنركز اهتمامنا على الفضاءات المعرفة على حقل الاعداد الحقيقية .

لاحظ ان الضرب النقطي (dot product) المعروف على كل من  $R^2$  و  $R^3$  بالطريقة  $A \cdot B = \|A\| \|B\| \cos \theta$  ، يحقق جميع الخصائص الاربعة اعلاه وبالتالي نكون قد عممنا التعريف الى فضاءات ، متجهاتها تجريدية وربما لا تحمل تصور هندسي .

سنوضح فكرة الضرب الداخلي بالامثلة التالية :

مثال (1) :

الضرب الداخلي الاعتيادي على  $R^n$  .

اذا كان  $A = (a_1, \dots, a_n)$  ،  $B = (b_1, \dots, b_n)$  متجهان في  $R^n$  فنعرف :

$$\langle A, B \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

ان الدالة  $\langle \cdot, \cdot \rangle : R^n \times R^n \rightarrow R$  المعرفة اعلاه تكون ضرباً داخلياً على  $R^n$  ولغرض التحقق من ذلك يجب علينا فحص البديهيات الاربعة التي وردت في التعريف . الان بما ان ضرب الاعداد الحقيقية يكون ابدالياً فعليه ينتج

$$\langle A, B \rangle = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = b_1 a_1 + \dots + b_n a_n = \langle B, A \rangle$$

وهذا تكون البديهية (1) قد تحققت .

$$\begin{aligned} \langle rA, B \rangle &= (ra_1)b_1 + \dots + (ra_n)b_n \\ &= r(a_1 b_1 + \dots + a_n b_n) = r \langle A, B \rangle \\ &= a_1 (rb_1) + \dots + a_n (rb_n) = \langle A, rB \rangle \end{aligned}$$

وهذا تكون البديهية (2) قد تحققت ايضاً . لتحقيق البديهية (أ ، 3) نجري الحسابات التالية :



$$\begin{aligned} \langle A+B, C \rangle &= (a_1 + b_1)c_1 + \dots + (a_n + b_n)c_n \\ &= a_1c_1 + b_1c_1 + \dots + a_nc_n + b_nc_n \\ &= a_1c_1 + \dots + a_nc_n + b_1c_1 + \dots + b_nc_n \\ &= \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle \end{aligned}$$

تحقيق ( ب ، 3 ) يكون مماثلاً . أخيراً نلاحظ

$$\langle A, A \rangle = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$$

وبما ان حاصل جمع مربعات اعداد حقيقية يكون دائماً عدداً حقيقياً موجباً او صفراً، ويكون مساوياً للصفر فقط في حالة كون جميع الحدود مساوية للصفر فعليه تكون البديهية (4) قد تحققت . بهذا يكون  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  ضرباً داخلياً على  $R^n$ .

ملاحظة :

إن الضرب الداخلي المعرف اعلاه ينطبق على تعريف الضرب النقطي (dot product) في حالة كون  $n=2$  او  $n=3$ .

مثال (2) :

إذا كان  $A = (a_1, a_2)$ ,  $B = (b_1, b_2)$  متجهين في  $R^2$  فإن

$$\langle A, B \rangle = 5a_1b_1 + 2a_2b_2$$

يعرف ضرباً داخلياً على  $R^2$ . لاثبات ذلك، لاحظ أولاً أنه إذا أبدلنا في هذه المعادلة  $B, A$  فإن الطرف الايمن يبقى كما هو . وعليه

$$\langle A, B \rangle = \langle B, A \rangle$$

إذا كان  $C = (c_1, c_2)$  فإن

$$\begin{aligned} \langle A+B, C \rangle &= 5(a_1 + b_1)c_1 + 2(a_2 + b_2)c_2 \\ &= 5a_1c_1 + 5b_1c_1 + 2a_2c_2 + 2b_2c_2 \\ &= (5a_1c_1 + 2a_2c_2) + (5b_1c_1 + 2b_2c_2) \\ &= \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle \end{aligned}$$

وهذا يحقق البديهية (أ، 3) وتحقيق (ب، 3) يكون مماثلاً . وايضاً، إذا كان  $r$  عدداً حقيقياً فإن

$$\begin{aligned}\langle rA, B \rangle &= 5(ra_1)b_1 + 2(ra_2)b_2 \\ &= r(5a_1b_1 + 2a_2b_2) = r\langle A, B \rangle \\ &= 5a_1(rb_1) + 2a_2(rb_2) = \langle A, rB \rangle\end{aligned}$$

وهذا يحقق البديهية الثانية. وأخيراً

$$\langle A, A \rangle = 5a_1^2 + 2a_2^2$$

واضح ان  $\langle A, A \rangle \geq 0$  وان  $\langle A, A \rangle = 0$  اذا وفقط اذا كان  $A = (a_1, a_2) = 0$ . لذلك فان البديهية الرابعة متحققة.

يختلف الضرب الداخلي في هذا المثال عن الضرب الداخلي الاعتيادي على  $R^2$  في المثال الاول وهذا يبين ان فضاء المتجهات يمكن ان يكون له اكثر من ضرب داخلي واحد.

سنوضح الان كيفية وجود ضرب داخلي على فضاءات مثل فضاء متعددات الحدود وذات الدرجة التي لاتتعدى  $n$ ,  $P_n(R)$ . وفضاء المصفوفات  $M_{mn}(R)$ ، وغيرها.

مثال (3) :

ضرب داخلي على  $P_n(R)$ .

$$A(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

اذا كانت

$$B(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$$

متعددتي حدود في الفضاء  $P_n(R)$  فنعرف

$$\langle A(x), B(x) \rangle = \int_0^1 A(x) \cdot B(x) dx.$$

المعادلة اعلاه تعرف ضرباً داخلياً على  $P_n(R)$ . لاثبات ذلك، لاحظ اولاً تحقق البديهية (1) بسهولة.

خصائص التكامل تنتج مايلي :

$$\begin{aligned}\langle rA(x), B(x) \rangle &= \int_0^1 (rA(x))B(x)dx \\ &= r \int_0^1 A(x)B(x)dx = r \langle A(x), B(x) \rangle \\ &= \int_0^1 A(x)(rB(x))dx = \langle A(x), rB(x) \rangle\end{aligned}$$

هذا يعني تحقق البديهية الثانية .

$$\begin{aligned}\langle A(x) + B(x), C(x) \rangle &= \int_0^1 (A(x) + B(x))C(x)dx \\ &= \int_0^1 (A(x)C(x) + B(x)C(x))dx \\ &= \int_0^1 A(x)C(x)dx + \int_0^1 B(x)C(x)dx \\ &= \langle A(x), C(x) \rangle + \langle B(x), C(x) \rangle\end{aligned}$$

وهذا يعني تحقق البديهية الثالثة ( أ ) وتحقيق ( ب ، 3 ) مماثل .

$$\langle A(x), A(x) \rangle = \int_0^1 (A(x))^2 dx$$

الآن  $(A(x))^2$  دالة موجبة او صفر ومن مبرهنات التفاضل والتكامل

نستنتج من ان

$$\int_0^1 (A(x))^2 dx \geq 0$$

وان  $\int_0^1 (A(x))^2 dx = 0$  اذا وفقط اذا  $A(x) = 0$  لجميع قيم  $x \in [0, 1]$  . لكن

المعادلة  $A(x) = 0$  تنتج على الاكثر  $n$  من الجذور وبما ان  $A(x) = 0$  لجميع قيم  $x \in [0, 1]$  ( اي مالا نهاية من الجذور ) . اذن يجب على متعددة الحدود  $A(x)$  ان

تكون متعددة الحدود الصفرية ( جميع معاملاتها تساوي صفر ) .

وهذا يعني تحقق البديهية الرابعة .

مثال (4)

$$A(x) = 2 - x$$

$$B(x) = x + 3x^2$$

اذا كانت

فجد  $\langle A(x), B(x) \rangle$  ، كما معرف في المثال (3) الحل

$$\begin{aligned} \langle A(x), B(x) \rangle &= \int_0^1 A(x)B(x)dx \\ &= \int_0^1 (2-x)(x+3x^2)dx \\ &= \int_0^1 (-3x^3 + 5x^2 + 2x)dx \\ &= 23/12 \end{aligned}$$

مثال (5) :

الضرب الداخلي الاعتيادي على فضاء المصفوفات  $M_{mn}(\mathbb{R})$  .  
 نذكر القاريء بان الفضاء  $M_{mn}(\mathbb{R})$  هو فضاء المصفوفات ذات الدرجة  $m \times n$  . اذا كانت  $B = (b_{ij})$ ,  $A = (a_{ij})$  مصفوفتين فان المعادلة :

$$\langle A, B \rangle = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij} b_{ij}$$

تعرف ضرباً داخلياً على  $M_{mn}(\mathbb{R})$  والتحقق مشابه للامثلة السابقة .

مثال (6) :

اذا كانت

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

مصنفين في  $M_{23}(B)$  نجد  $\langle A, B \rangle$  كما معرف في المثال (5).

الحل :

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= (1)(0) + (0)(2) + (-1)(5) + (0)(1) + (2)(2) + (3)(-2) \\ &= -7 \end{aligned}$$

مثالنا الأخير يوضح طريقة عامة وبسيطة لتعريف ضرب داخلي على أي فضاء متجهات منتهي البعد.

مثال (7) :

الضرب الداخلي الناشئ من الاحداثيات .

لنفرض ان  $V$  فضاء متجهات على حقل الاعداد الحقيقية  $R$ ، منتهي البعد وبعده يساوي  $n$ . افرض ان  $G = \{A_1, \dots, A_n\}$  تكون قاعدة الى  $V$ . اذن لأي متجهين  $A, B$  في  $V$  توجد اعداد قياسية وحيدة  $x_1, \dots, x_n$  و  $y_1, \dots, y_n$  تحقق :

$$A = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$$

$$B = y_1 A_1 + \dots + y_n A_n$$

نعرف :

$$\langle A, B \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

يمكن التحقق بسهولة من ان التعريف اعلاه يمثل ضرباً داخلياً على  $V$  ونترك الاثبات للطالب. لاحظ بان الضرب الداخلي اعلاه يعتمد على القاعدة المختارة فمثلاً لو اخترنا القاعدة الطبيعية للفضاء  $R^2$  حصلنا على الضرب الداخلي الاعتيادي اما اذا اخترنا القاعدة المكونة من المتجهين  $A_1 = (1, 0)$ ،  $A_2 = (1, 1)$  حصلنا على  $\langle A, B \rangle = a_1 b_1 - a_1 b_2 - b_1 a_2 + 2a_2 b_2$

$$B = (b_1, b_2), A = (a_1, a_2)$$

وللتحقق من ذلك نلاحظ :

$$A = (a_1, a_2) = (a_1 - a_2)(1, 0) + a_2(1, 1)$$

$$B = (b_1, b_2) = (b_1 - b_2)(1, 0) + b_2(1, 1)$$

وعليه يكون  $\langle A, B \rangle$  كما في التعريف كلائي

$$\begin{aligned}\langle A, B \rangle &= (a_1 - a_2)(b_1 - b_2) + a_2 b_2 \\ &= a_1 b_1 - a_1 b_2 - a_2 b_1 + 2a_2 b_2\end{aligned}$$

لقد سمى الضرب الداخلي اعلاه بالضرب الناشئ من الاحداثيات لانه يعتمد على احداثيات المتجهات بالنسبة لقاعدة معينة .

نعتقد باننا اوردنا عدداً لا بأس به من الأمثلة ونرجع الان لطرح مفاهيم

اخرى .

تعريف :

بفضاء متجهات اقليدي (Euclidean Vector Space) نقصد فضاء

متجهات  $V$  على حقل الاعداد الحقيقية ومنتهي البعد، بمعية ضرب داخلي  $\langle , \rangle$  معرف عليه . ونرمز له بالرمز  $(V, \langle , \rangle)$

مثال (8) :

اذا كان  $\langle , \rangle_1$  هو الضرب الداخلي الاعتيادي على  $R^2$  و  $\langle , \rangle_2$  هو الضرب الداخلي المعرف في المثال (2) فان كل من  $(R^2, \langle , \rangle_1)$  و  $(R^2, \langle , \rangle_2)$  يكون فضاءً اقليدياً لكنهما غير متساويين كفضاءين اقليديين وذلك لاختلاف الضرب الداخلي على كل منهما . نذكر الان متباينة مهمة تسمى بمتباينة كوشي — شوارتز (Cauchy-Schwartz Inequality)

مبرهنة (5.1.1) :

اذا كان  $A, B$  اي زوج من المتجهات في اي فضاء اقليدي  $(V, \langle , \rangle)$  فان

$$\langle A, B \rangle^2 \leq \langle A, A \rangle \langle B, B \rangle$$

البرهان :

اذا كان  $B = 0$  فان  $\langle A, B \rangle = 0$  و  $\langle B, B \rangle = 0$  وهذه الحالة تكون المتباينة متحققة . افرض ان  $B \neq 0$  وضع

$$C = B/\sqrt{\langle B, B \rangle}$$

$$\begin{aligned} \langle C, C \rangle &= \langle B/\sqrt{\langle B, B \rangle}, B/\sqrt{\langle B, B \rangle} \rangle \\ &= (1/\langle B, B \rangle) \cdot \langle B, B \rangle \\ &= 1 \end{aligned}$$

عليه يكون :

$$r = \langle A, C \rangle$$

الآن ضع

من خصائص الضرب الداخلي نحصل على :

$$0 \leq \langle A - rC, A - rC \rangle$$

$$\leq \langle A, A \rangle - \langle A, rC \rangle - \langle rC, A \rangle + \langle rC, rC \rangle$$

$$\leq \langle A, A \rangle - 2r \langle A, C \rangle + r^2 \langle C, C \rangle$$

$$\leq \langle A, A \rangle - 2r^2 + r^2$$

( لان  $\langle C, C \rangle = 1$  )

$$\leq \langle A, A \rangle - r^2$$

$$r^2 \leq \langle A, A \rangle$$

اذن :

بالتعويض عن  $r = \langle A, C \rangle$  ،  $C = B/\sqrt{\langle B, B \rangle}$  ، نحصل على

$$r^2 = (\langle A, C \rangle)^2 = (\langle A, B/\sqrt{\langle B, B \rangle} \rangle)^2 = \langle A, B \rangle^2 / \langle B, B \rangle$$

$$\langle A, B \rangle^2 / \langle B, B \rangle \leq \langle A, A \rangle$$

اذن

$$\langle A, B \rangle^2 \leq \langle A, A \rangle \langle B, B \rangle$$

وعليه

( و . ه . م )

### تمارين (5.1)

1 - احسب  $\langle A, B \rangle$  باستخدام الضرب الداخلي الاعتيادي على  $R^2$ .

( أ )  $A = (0, 2)$  ،  $B = (1, -3)$  ، ( ب )  $A = (-1, 7)$  ،  $B = (2, 3)$

( ج )  $A = (1/2, 3)$  ،  $B = (0, 0)$  ، ( د )  $A = (1, 4)$  ،  $B = (1, 4)$

2 - كرر تمرين (1) باستخدام الضرب الداخلي المعروف في مثال (2).

3 - احسب  $\langle A, B \rangle$  باستخدام الضرب الداخلي الاعتيادي على  $R^4$ .

( أ )  $A = (2, -1, 2, -1)$  ،  $B = (2, -1, 2, -1)$

( ب )  $A = (3, \sqrt{2}, 0, 1/2)$  ،  $B = (-1, 0, 7, 2)$

( ج )  $A = (1, 1, 0, 1)$  ،  $B = (-2, 3, 5, 6)$

3 — احسب  $\langle A, B \rangle$  باستخدام الضرب الداخلي على  $P_2(\mathbb{R})$  والمعرف في مثال (3).

$$B = x + 2x^2, \quad A = -1 + x - x^2 \quad (\text{أ})$$

$$B = \sqrt{3} + 4x + 5x^2, \quad A = \sqrt{3} + 4x + 5x^2 \quad (\text{ب})$$

4 — احسب  $\langle A, B \rangle$  باستخدام الضرب الداخلي على  $M_{mn}(\mathbb{R})$  والمعرف في مثال (5).

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{أ})$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 7 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{ب})$$

$$B = \begin{pmatrix} -3 \\ -7 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{ج})$$

5 — ليكن  $B = (x_2, y_2)$ ,  $A = (x_1, y_1)$ . حدد أي مما يلي يكون ضرباً داخلياً على  $\mathbb{R}^2$ . في الحالات التي لا يكون فيها الضرب داخلياً اذكر الشروط التي لا تتحقق.

$$\langle A, B \rangle = x_1x_2 + 7y_1y_2 \quad (\text{أ})$$

$$\langle A, B \rangle = x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 \quad (\text{ب})$$

$$\langle A, B \rangle = 3x_1x_2 + 2x_1y_2 + 3x_2y_1 + 4y_1y_2 \quad (\text{ج})$$

$$\langle A, B \rangle = x_1x_2 - y_1y_2 \quad (\text{د})$$

$$\langle A, B \rangle = 2x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3y_1y_2 \quad (\text{هـ})$$

6 — برهن على ان  $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^T)$  تعرف ضرباً داخلياً على الفضاء



$M_2(\mathbb{R})$  حيث  $\text{tr}(X)$  هو اثر المصفوفة  $X$  ويساوي حاصل جمع العناصر على القطر الرئيسي .

7 — لتكن  $B = B(x)$ ,  $A = A(x)$  متعددي حدود في  $P_2(\mathbb{R})$  فبرهن على ان  
 $\langle A, B \rangle = A(0)B(0) + A(1/2)B(1/2) + A(1)B(1)$   
 يكون ضرباً داخلياً على  $P_2(\mathbb{R})$ .

8 — احسب  $\langle A, B \rangle$  باستخدام الضرب الداخلي في مثال (7).

$$B = x + 4x^2, A = 2 - x + 5x^2 \quad (\text{أ})$$

$$B = -6 + 7x, A = 1 + (1/2)x + x^2 \quad (\text{ب})$$

وذلك بالنسبة للقاعدة  $\{A_1 = 2, A_2 = 2 + x, A_3 = -x^2\}$  للفضاء  $P_2(\mathbb{R})$ .

9 — حقق متباينة كوشي — شوارتز لكل من :

(أ)  $B = (0, 3)$ ,  $A = (-1, -1)$  باستخدام الضرب الداخلي الاعتيادي

(ب)  $B = (2, 6)$ ,  $A = (1, 3)$  باستخدام الضرب الداخلي في مثال (7)

بالنسبة للقاعدة  $\{A_1 = (1, 3), A_2 = (-1, 5)\}$  الى  $\mathbb{R}^2$ .

(ج)  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$  باستخدام الضرب

الداخلي في مثال (5)

10 — احسب  $\langle A, B \rangle$  باستخدام الضرب الداخلي في مثال (7).

$$B = x + 4x^2, A = 2 - x + 5x^2 \quad (\text{أ})$$

$$B = x + x^2, A = -3 + 2x \quad (\text{ب})$$

$$B = -1 + 3x - 7x^2, A = 2 - x + 4x^2 \quad (\text{ج})$$

11 — اثبت انه في متباينة كوشي — شوارتز يتحقق التساوي اذا كان  $A, B$  مرتبطين خطياً.

12 — ليكن  $B = (x_2, y_2, z_2)$ ,  $A = (x_1, y_1, z_1)$  اثبت ان

$$\langle A, B \rangle = (x_1 + y_1)(x_2 + y_2) + y_1 y_2 + (y_1 + 2z_1)(y_2 + 2z_2)$$

يكون ضرباً داخلياً على  $\mathbb{R}^3$ .

## (5.2) الطول والزاوية في الفضاءات الاقليدية .

نستخدم في هذا البند متباينة كوشي — شوارتز لتطوير مفاهيم الطول والزاوية في الفضاءات الاقليدية مثل فضاء المصفوفات او فضاء متعددات حدود وغيرها . بما ان  $\langle A, A \rangle \geq 0$  وذلك لاي متجه  $A$  في فضاء اقليدي فعليه يمكننا ان نعرف الطول والمسافة على النحو التالي :

تعريف :

اذا كان  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  فضاءاً اقليدياً فان طول المتجه  $A$  يرمز له بالرمز  $\|A\|$  ويعرف بواسطة :

$$\|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle}$$

كذلك فانه لاي زوج من المتجهات  $A, B$  في  $V$  نرمز للمسافة بين  $A$  و  $B$  بالرمز  $d(A, B)$  وتعرف بواسطة :

$$d(A, B) = \|A - B\|$$

مثال (1) :

اذا كان  $A = (a_1, \dots, a_n)$ ,  $B = (b_1, \dots, b_n)$  متجهين في  $R^n$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي ( راجع مثال (1) في البند (5.1) ) فان

$$\|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

$$d(A, B) = \|A - B\| \quad \text{وايضاً}$$

$$= \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2}$$

لاحظ ان هذين هما بالضبط صيغتنا الطول والمسافة الاعتيادية التي عرفناها في دروس الفيزياء والتفاضل والتكامل .

مثال (2) :

نفرض ان  $R^2$  له الضرب الداخلي المعرف في المثال (2) من البند السابق

$$\langle A, B \rangle = 5a_1b_1 + 2a_2b_2 \quad \text{اي :}$$

وذلك عندما  $A = (a_1, a_2)$  و  $B = (b_1, b_2)$ .

اذا كان  $A = (2, 3)$  ,  $B = (0, -1)$  , فجد طول كل من  $B, A$  ثم جد المسافة بينهما .

الحل :

$$\|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle} = \sqrt{5(2)(2) + 2(3)(3)} = \sqrt{38}$$

$$\|B\| = \sqrt{\langle B, B \rangle} = \sqrt{5(0)(0) + 2(-1)(-1)} = \sqrt{2}$$

$$d(A, B) = \|A - B\| = \|(2, 4)\| = \sqrt{5(2)(2) + 2(4)(4)} = \sqrt{52}$$

من المهم ان نتذكر دائماً ان كل من الطول والمسافة يعتمد على الضرب

الداخلي المستخدم . ففي المثال (2) اعلاه كان طول المتجه  $A = (2, 3)$  يساوي 38

في حين ان طوله الاعتيادي ( الطول الناشيء من الضرب الداخلي الاعتيادي ) يساوي

$13 = (2)^2 + (3)^2$  ، كذلك فان المسافة الاعتيادية بين  $B, A$  تساوي

$$20 = (2)^2 + (4)^2$$

مثال (3) :

جد طول المصفوفة  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  وذلك بالاعتماد على الضرب الداخلي

على الفضاء  $M_{23}(R)$  المعرف في المثال (5) من البند (5.1) .

$$-1 \ 0 \ 1$$

$$\|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle}$$

الحل :

$$= \sqrt{(1)(1) + (2)(2) + (0)(0) + (-1)(-1) + (0)(0) + (1)(1)} = 7$$

مثال (4) :

جد المسافة بين متعددي الحدود

$$A(x) = 2x-1, B(x) = x+2$$

وذلك بالنسبة للضرب الداخلي على الفضاء  $P_1(\mathbb{R})$  المعرف في المثال (3) من البند (5.1)

$$d(A(x), B(x)) = \|A(x) - B(x)\|$$

$$= \|x-3\|$$

$$= \sqrt{\langle x-3, x-3 \rangle}$$

$$\langle x-3, x-3 \rangle = \int_0^1 (x-3)(x-3) dx$$

$$= \int_0^1 (x^2 - 6x + 9) dx$$

$$= 19/3$$

$$d(A(x), B(x)) = \sqrt{19/3}$$

اذن :

قبل البدء باعطاء خصائص الطول والمسافة سنذكر الصورة البديلة لمتباينة كوشي - شوارتز التي برهناها في البند السابق .

بما ان :  $\|A\|^2 = \langle A, A \rangle$  ,  $\|B\|^2 = \langle B, B \rangle$  وذلك في اي فضاء

اقليدي  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  . عليه بأخذ الجذر التربيعي لطرفي المتباينة

$$\langle A, B \rangle^2 \leq \langle A, A \rangle \langle B, B \rangle$$

$$|\langle A, B \rangle| \leq \|A\| \|B\|$$

وهذه هي صيغة متباينة كوشي - شوارتز بدلالة الطول .

المبرهنتان التاليتان تعطيان الخصائص الاساسية للطول والمسافة .

### مبرهنة (5.2.1)

اذا كان  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  فضاء متجهات اقليدي، فان الطول  $\| \cdot \|$

يحقق مايلي

- 1 — لكل  $A \in V$ ,  $\|A\| \geq 0$  و  $\|A\| = 0$  اذا فقط اذا  $A = 0$ .
- 2 — لاي عدد حقيقي  $r$  ولاي متجه  $A \in V$  يكون  $\|rA\| = |r| \|A\|$  حيث ان  $|r|$  هي القيمة المطلقة للعدد الحقيقي  $r$ .
- 3 — لاي زوج من المتجهات  $A, B$  يكون
 
$$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

( المتباينة اعلاه تسمى بالمتباينة المثلثية (Triangle inequality) )

مبرهنة (5.2.2) :

اذا كان  $(V, \langle, \rangle)$  فضاء متجهات اقليدي، فان المسافة  $d$  تحقق

مايلي :

- 1 —  $d(A, B) \geq 0$  و  $d(A, B) = 0$  اذا فقط اذا  $A = B$ .
- 2 —  $d(A, B) = d(B, A)$  وذلك لاي زوج من المتجهات  $A, B$ .
- 3 — لاي ثلاثة متجهات  $A, B, C$  في  $V$  يكون
 
$$d(A, B) \leq d(A, C) + d(C, B)$$
 ( المتباينة اعلاه تسمى ايضاً بالمتباينة المثلثية )

ان برهان الخصائص اعلاه سهل جداً ويعتمد على التعاريف بشكل مباشر

ماعد المتباينة المثلثية التي سنذكر برهانها.

برهان المتباينة المثلثية للطول :

$$\begin{aligned} \|A+B\|^2 &= \langle A+B, A+B \rangle \\ &= \langle A, A \rangle + 2\langle A, B \rangle + \langle B, B \rangle \\ &\leq \langle A, A \rangle + 2|\langle A, B \rangle| + \langle B, B \rangle \end{aligned}$$

بأستخدام متباينة كوشي — شوارتز نحصل على


$$\begin{aligned} \|A+B\|^2 &\leq \langle A, A \rangle + 2\|A\|\|B\| + \langle B, B \rangle \\ &= \|A\|^2 + 2\|A\|\|B\| + \|B\|^2 \\ &= (\|A\| + \|B\|)^2 \end{aligned}$$

$$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

أخذ الجذر التربيعي يعطي

(و. ه. م)

المتباينة أعلاه سميت بالمتباينة المثلثية للسبب التالي .  
في المستوى  $R^2$  ، لدينا الصورة التالية :



عند ابدال  $B$  بـ  $-B$  في المتباينة المثلثية ، نحصل على

$$\|A-B\| \leq \|A\| + \|-B\| = \|A\| + \|B\|$$

وهذا يعني ان حاصل جمع طولي اي ضلعين في مثلث يكون اكبر او مساوياً لطول الضلع الثالث ( حقيقة معروفة في الهندسة المستوية ) من هذا نرى ان معظم الخصائص الهندسية للطول والمسافة قد تعمدت الى فضاءات مجردة ( الفضاءات الاقليدية ) .

تعريف :

إذا كان  $B, A$  متجهين غير صفريين في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  فإن الزاوية بين  $A$  و  $B$  تعرف بالمعادلة :

$$\cos \theta = \frac{\langle A, B \rangle}{\|A\| \|B\|}$$

حيث :  $0 \leq \theta \leq \pi$

ملاحظة : من متباينة كوشي — شوارتز التي تنص على ان

$$|\langle A, B \rangle| \leq \|A\| \|B\|$$

$$\frac{|\langle A, B \rangle|}{\|A\| \|B\|} \leq 1 \quad \text{وهذا يعني ان} \quad -1 \leq \frac{\langle A, B \rangle}{\|A\| \|B\|} \leq 1$$

من هذا تتضح شرعية التعريف، اي انه توجد زاوية وحيدة  $\theta$  بحيث يكون  $\cos \theta = \langle A, B \rangle / \|A\| \|B\|$  و  $0 \leq \theta \leq \pi$ .

مثال (5) :

جد الزاوية بين المتجهين  $A = (1, 0)$  و  $B = (0, 1)$  وذلك في الفضاء  $R^2$  المعرف عليه الضرب الداخلي الاعتيادي.

$$\text{الحل : } \langle A, B \rangle = (1)(0) + (0)(1) = 0, \|A\| = 1, \|B\| = 1, \text{ اذن } \cos \theta = 0/1.1 = 0, \text{ عليه تكون } \theta = \pi/2$$

مثال (6) :

جد جيب تمام الزاوية بين المصفوفتين  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$  و  $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  وذلك في الفضاء  $M_2(R)$  المعرف عليه الضرب الداخلي الذي نوقش في المثال (5) من البند (5.1).

$$\langle A, B \rangle = (1)(-1) + (0)(2) + (2)(0) + (-1)(3) = -4 \quad \text{الحل :}$$

$$\|A\| = \sqrt{(1)^2 + (0)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = 6$$

$$\|B\| = \sqrt{(-1)^2 + (2)^2 + (0)^2 + (3)^2} = 10$$

$$\cos \theta = \frac{-4}{\sqrt{6} \sqrt{10}} = \frac{-2}{\sqrt{15}}$$

اذن :

تعريف :

في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$ ، يكون المتجهان  $B, A$  متجهين متعامدين اذا كان  $\langle A, B \rangle = 0$ .

من هذا التعريف ومن تعريف الزاوية فان المتجهين  $B, A$  يكونان متعامدين اذا فقط اذا كانت الزاوية بينهما تساوي  $\pi/2$ .

مثال (7) :

برهن على ان المتجهين  $A=1$  ,  $B=x-1/2$  يكونان متعامدين وذلك

في الفضاء  $P_1(R)$  المعروف عليه الضرب الداخلي :  $\langle A, B \rangle = \int_0^1 A(x)B(x)dx$

الحل :  $\langle A, B \rangle = \int_0^1 (1)(x-1/2)dx$

$$= \int_0^1 (x-1/2) dx = (x^2/2 - (1/2)x) \Big|_0^1 = 0$$

المبرهنه الثانيه تعمم نظرية فيثاغورس المعروفة .

مبرهنة (5.2.3) :

اذا كان  $A$  و  $B$  متجهين متعامدين في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  فان

$$\|A+B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2.$$

$$\|A+B\|^2 = \langle A+B, A+B \rangle$$

البرهان :

$$= \langle A, A \rangle + 2\langle A, B \rangle + \langle B, B \rangle$$


$$= \|A\|^2 + \|B\|^2$$



وذلك لأن  $\langle A, B \rangle = 0$

( و . ه . م )

لاحظ أن في  $R^2$  أو  $R^3$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي تحتل هذه المبرهنة الى نظرية فيثاغورس لعادية . لاحظ الشكل التالي :



في نهاية هذا البند نذكر القاريء بان مفاهيم الطول والمسافة والزواية تعتمد على الضرب الداخلي المعرف على الفضاء وبما انه يمكن تعريف اكثر من ضرب داخلي واحد، فعليه يمكن ايجاد اكثر من طول واحد مثلاً للمتجه ونرجو ان هذه المسألة لاتسبب تشتت في ذهن الطالب . الطول يكون واحداً وثابتاً عندما يثبت الضرب الداخلي، وهكذا.

### تمارين (5.2)

1 — ليكن  $R^2$  له الضرب الداخلي  $\langle A, B \rangle = 5x_1y_1 + x_2y_2$  حيث  $A = (x_1, y_1)$   $B = (x_2, y_2)$  اوجد  $\|A\|$ ,  $\|B\|$ ,  $d(A, B)$  في كل مما يلي :

( أ )  $B = (0, 3)$ ,  $A = (2, 1)$

( ب )  $B = (2, 2)$ ,  $A = (-1, -1)$

( ج )  $B = (4, 0)$ ,  $A = (0, 4)$

2 — كرر تمرين (1) باستخدام الضرب الداخلي الاعتيادي .

3 — احسب  $\|A\|$ ,  $\|B\|$ ,  $d(A, B)$  باستخدام الضرب الداخلي على  $P_3(R)$

والمعرف في مثال (3) من البند (5.1) .

( أ )  $B = 2 + x - x^2$ ,  $A = 1 - x^3$

( ب )  $B = x - x^2 - x^3$ ,  $A = 4 + x^2 - (1/2)x^3$

4 - احسب  $\|A\|$ ,  $\|B\|$ ,  $d(A,B)$  باستخدام الضرب الداخلي على  $M_{mn}(R)$  المعرف في مثال (5) من البند (5.1).

(أ)  $M_2(R)$  في الفضاء  $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ \sqrt{2} & -1 \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

(ب)  $M_{23}(R)$  في الفضاء  $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ ,  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ .

5 - اوجد جيب تمام الزاوية بين  $A, B$  في كل جزء من التمارين 1, 2, 3, 4.

6 - برهن على ان :  $\|A-B\|^2 + \|A+B\|^2 = 2(\|A\|^2 + \|B\|^2)$  وذلك لاي متجهين  $A, B$  في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$ .

7 - برهن على ان :  $\|A-B\| \leq \|A\| - \|B\|$  وذلك لاي متجهين  $A, B$  في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$ .

8 - برهن على ان :  $\langle A, B \rangle = 1/4(\|A+B\|^2 - \|A-B\|^2)$  وذلك لاي متجهين  $A, B$  في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$ .

9 - برهن على ان :

$$\|A-B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 - 2\|A\|\|B\|\cos\theta$$

هي الزاوية بين  $A, B$ . وذلك في اي فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$ .

10 - اذا كان  $A, B$  متجهين في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  بحيث ان  $\|A\| = \|B\|$  فبرهن على ان  $A+B$  يكون عمودياً على  $A-B$ .

11 - ليكن  $A, B$  متجهين غير صفرين في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$ . اوجد اقصر متجه  $C = A + tB$ . هل ان  $C$  يكون عمودياً على  $B$  ؟

( ارشاد : احسب طول  $C$  ثم استخدم افكار التفاضل والتكامل ).

12 - ليكن  $R^2$  له الضرب الداخلي الاعتيادي. لاي من قيم  $r$  يكون  $A, B$  متعامدين ؟

(أ)  $A = (1, 2, 1-r)$ ,  $B = (-1, 3, 5)$

(ب)  $A = (2r, 7, 2)$ ,  $B = (r/2, -r, 3)$

13 — اذا كان  $V = C[0,1]$  فضاء الدوال الحقيقية والمستمرة والمعروفة على الفترة المغلقة  $[0,1]$ ، فان :  $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$  يكون ضرباً داخلياً على  $V$ .

(أ) هل ان الدالتين  $f(x) = \sin 2\pi x$ ,  $g(x) = \cos 2\pi x$  متعامدتان ؟  
 (ب) هل ان الدالتين  $f(x) = \sin 2\pi mx$ ,  $g(x) = \cos 2\pi nx$  متعامدتان ؟

(ج) اوجد متعددة حدود من الدرجة الثانية تكون عمودية على كل من الدالتين  $f(x) = 1$ ,  $g(x) = x$ .

14 — برهن الاجزاء (1), (2) في مبرهنة (5.2.1) والاجزاء (1), (2), (3) في مبرهنة (5.2.2).

15 — في الفضاء الاقليدي  $R^2$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي، اوجد المحل الهندسي لجميع المتجهات  $A$  التي تحقق  $\|A\| = 1$ . ارسم شكلاً.

### (5.3) القواعد المتعامدة الاحادية — طريقة كرام — شميدت

#### Orthonormal bases and Gram - Schmidt process

لاحظنا في الفصل الاول ان كل فضاء متجهات منتهي البعد يكون له قاعدة. بالحقيقة توجد اكثر من قاعدة واحدة والمسائل التي تطرح تحدد نوعية القاعدة المطلوبة. في معظم هذه المسائل نحاول دائماً ايجاد قاعدة بسيطة المتجهات. في الفضاءات الاقليدية، تكون الحالة غالباً ان افضل اختيار للقاعدة هو الاختيار الذي تكون فيه جميع المتجهات متعامدة كل على الآخر. سنبين في هذا البند كيف يمكن بناء مثل هذه القواعد.

تعريف :

لتكن  $S$  مجموعة جزئية من المتجهات في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$ . يقال بان  $S$  مجموعة متعامدة اذا وفقط اذا كان اي متجهين مختلفين في  $S$  متعامدين.

المجموعة المتعامدة تسمى مجموعة متعامدة احادية اذا فقط اذا كان طول كل متجه فيها مساوياً الى 1 .

مثال (1) :

المجموعة  $\{(1,1,1), (0,0,0)\}$  تكون مجموعة متعامدة في الفضاء  $R^3$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي، لكنها ليست مجموعة متعامدة احادية وذلك لان  $\|(1,1,1)\| = \sqrt{3}$  .

مثال (2) :

المجموعة المتكونة من المتجهات

$$A_1 = (0,1,0), A_2 = (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}), A_3 = (1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2})$$

تكون مجموعة متعامدة احادية في الفضاء  $R^3$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي . وذلك لان

$$\langle A_1, A_2 \rangle = \langle A_1, A_3 \rangle = \langle A_2, A_3 \rangle = 0$$

$$\|A_1\| = \|A_2\| = \|A_3\| = 1 \quad \text{وايضاً}$$

مثال (3) :

$$\{A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\}$$

ليست مجموعة متعامدة وذلك لان  $\langle A_1, A_2 \rangle \neq 0$  .  
وذلك في الفضاء  $M_2(R)$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي .

لنفترض الان ان  $A$  متجه غير صفري في فضاء متجهات اقليدي

$$B = (1/\|A\|) A \quad \text{فان المتجه } \langle \cdot, \cdot \rangle$$

يكون متجهاً احادي الطول وذلك لان

$$\|B\| = \|(1/\|A\|)A\| = (1/\|A\|)\|A\| = 1$$

اذن يمكن دائماً ايجاد متجه احادي الطول من متجه غير صفري . اهمية ايجاد قاعدة متعامدة احادية لفضاء اقليدي تكمن جزئياً بالبرهنة التالية التي توضح انه من البساطة بدرجة غير عادية ان نعبّر عن متجه في الفضاء كتركيب خطي من متجهات تلك القاعدة .

مبرهنة (5.3.1) :

اذا كانت  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة متعامدة احادية لفضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  ، وكان  $A$  اي متجه في  $V$  ، فان

$$A = \langle A, A_1 \rangle A_1 + \langle A, A_2 \rangle A_2 + \dots + \langle A, A_n \rangle A_n$$

البرهان : بما ان  $S$  قاعدة الى  $V$  . اذن يمكن للمتجه  $A$  ان يكتب كتركيب خطي من متجهات  $S$  ، ليكن

$$A = x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n$$

لكل متجه  $A_k$  في  $S$  يكون

$$\begin{aligned} \langle A, A_k \rangle &= \langle x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + \dots + x_n A_n, A_k \rangle \\ &= x_1 \langle A_1, A_k \rangle + \dots + x_k \langle A_k, A_k \rangle + \dots + x_n \langle A_n, A_k \rangle \end{aligned}$$

بما ان المجموعة  $S$  متعامدة احادية ، عليه يكون  $\langle A_i, A_j \rangle = 0$  عندما  $i \neq j$  اذن نحصل من المعادلة اعلاه على مايلي :

$$\langle A, A_k \rangle = x_k$$

وذلك لكل :  $k = 1, 2, \dots, n$  ، اي ان

$$A = \langle A, A_1 \rangle A_1 + \dots + \langle A, A_n \rangle A_n$$

( و . ه . م )

مثال (4) : ليكن

$$A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} A_3 = \begin{bmatrix} 3/5 & 0 \\ 4/5 & 0 \end{bmatrix} A_2 = \begin{bmatrix} -4/5 & 0 \\ 3/5 & 0 \end{bmatrix} A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

من السهل التأكد من ان المجموعة  $S = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$  تكون قاعدة متعامدة احادية للفضاء  $M_2(\mathbb{R})$  بالنسبة للضرب الداخلي الاعتيادي . عبر عن المتجه  $A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  كتراكيب خطي من المتجهات في  $S$  . ثم اكتب متجه احدائيات  $A$  .

$$\langle A, A_1 \rangle = (6)(0) + (-5)(1) + (1)(0) + (0)(0) = -5$$

الحل :

$$\langle A, A_2 \rangle = (6)(-4/5) + (-5)(0) + (1)(3/5) + (0)(0) = -21/5$$

$$\langle A, A_3 \rangle = (6)(3/5) + (-5)(0) + (1)(4/5) + (0)(0) = 22/5$$

$$\langle A, A_4 \rangle = (6)(0) + (-5)(0) + (1)(0) + (0)(1) = 0$$

اذن من مبرهنة (5.3.1)

$$A = -5A_1 - (21/5)A_2 + (22/5)A_3$$

هذا المثال يوضح فائدة المبرهنة (5.3.1) ، حيث انه اذا كانت القاعدة ليست متعامدة احادية فإنه يتوجب علينا حل نظام من المعادلات لكي نعبر عن المتجه بدلالة القاعدة ( راجع الفصل الاول ) .

ان متجه احدائيات  $A$  اعلاه يكون  $X = (-5, -21/5, 22/5, 0)$  .

يمكن ايضاً معرفة احدائيات المتجهات بالنسبة الى قاعدة متعامدة ، فاذا كانت  $S = \{B_1, \dots, B_n\}$  قاعدة متعامدة للفضاء الاقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  وكان  $A \in V$  اي متجه فان :

$$A = (\langle A, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1 + \dots + (\langle A, B_n \rangle / \|B_n\|^2) B_n$$

والبرهان مماثل تماماً لبرهان المبرهنة (5.3.1) ويترك كتتمرين .

مبرهنة (5.3.2) :

اذا كانت  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  مجموعة متعامدة من المتجهات غير الصفرية في فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  فان  $S$  تكون مستقلة خطياً .

البرهان : افرض ان  $x_1A_1 + x_2A_2 + \dots + x_nA_n = 0$  لكل  $k:1,2,\dots,n$  يكون لدينا

$$\begin{aligned} 0 &= \langle A_k, 0 \rangle = \langle A_k, x_1A_1 + \dots + x_nA_n \rangle \\ &= x_1 \langle A_k, A_1 \rangle + \dots + x_k \langle A_k, A_k \rangle + \dots + x_n \langle A_k, A_n \rangle \\ &= x_k \langle A_k, A_k \rangle \end{aligned}$$

وذلك لأن

$\langle A_i, A_j \rangle = 0$  لكل  $i \neq j$ . بما ان متجهات  $S$  غير صفرية، عليه ينتج  $\langle A_k, A_k \rangle \neq 0$  وبالتالي فان  $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$  بهذا تكون المجموعة  $S$  مستقلة خطياً.

( و . ه . م )

مثال (5) :

اذا كان  $A_1 = (1,1,1)$ ,  $A_2 = (0,1,-1)$ ,  $A_3 = (-2,1,1)$  فبرهن على ان المجموعة  $S = \{A_1, A_2, A_3\}$  تكون قاعدة الى  $R^3$  ثم عبر عن المتجه  $A = (1,-1,1)$  كتركيب خطي من متجهات  $S$ .

الحل: أن السؤال اعلاه يمكن حله بالطرق المطروحة في الفصل الاول لكنها طرق طويلة. هنا نلاحظ ان المجموعة  $S$  تكون متعامدة وبالتالي وحسب المبرهنة (5.3.2) نستنتج من ان  $S$  مستقلة خطياً وبما ان عدد متجهاتها يساوي بعد الفضاء  $R^3$  فانها حتماً ستكون قاعدة. لغرض كتابة المتجه  $A = (1,-1,1)$  نستخدم الملاحظة التي تلت مثال (4). اي

$$A = \frac{\langle A, A_1 \rangle}{\|A_1\|^2} A_1 + \frac{\langle A, A_2 \rangle}{\|A_2\|^2} A_2 + \frac{\langle A, A_3 \rangle}{\|A_3\|^2} A_3$$

الان عمليات حسابية بسيطة تظهر

$$\langle A, A_1 \rangle = 1, \langle A, A_2 \rangle = -2, \langle A, A_3 \rangle = -2$$

$$\|A_1\|^2 = 3, \|A_2\|^2 = 2, \|A_3\|^2 = 6$$

عليه يكون لدينا :

$$A = (1/3)A_1 - A_2 - (1/3)A_3$$

القواعد المتعامدة الاحادية تفيد ايضاً لمعرفة الضرب الداخلي بسرعة وكما  
موضح في المبرهنة التالية :

### مبرهنة (5.3.3)

إذا كانت  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة متعامدة احادية لفضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  وكان

$$A = a_1 A_1 + \dots + a_n A_n$$

$$B = b_1 A_1 + \dots + b_n A_n$$

$$\langle A, B \rangle = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$$

فان

$$\langle A, B \rangle = \langle a_1 A_1 + \dots + a_n A_n, b_1 A_1 + \dots + b_n A_n \rangle$$

البرهان

$$= \sum_{i,j} a_i b_j \langle A_i, A_j \rangle$$

$$= a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$$

$$\langle A_i, A_j \rangle = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

وذلك لان

( و . ه . م )

ناقشنا في البند (1.9) من الفصل الاول مسألة الاحداثيات وقلنا بانه اذا كانت المجموعة  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة الى فضاء متجهات  $V$  على الحقل  $F$ ، فيوجد لاي متجه  $A \in V$  متجه وحيد  $X = (x_1, \dots, x_n) \in F^n$  يسمى بمتجه احداثيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $S$ .

في حالة كون  $V$  فضاءً اقليدياً فانه حتماً وحسب التعريف سيكون فضاءً على حقل الاعداد الحقيقية . بذلك تكون متجهات احداثيات متجهات  $V$



واقعة في  $R^n$ . المبرهنة اعلاه تنص على ان الضرب الداخلي لاي متجهين في فضاء متجهات اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  يساوي الضرب الداخلي الاعتيادي في  $R^n$  لمتجهي احداثياتهما بالنسبة لاي قاعدة متعامدة احادية الى  $V$ . المثال الاتي يوضح مانقصده.

مثال (6):

برهن على ان  $S = \{ 1/\sqrt{2}, (\sqrt{3}/\sqrt{2})x \}$  تكون قاعدة متعامدة احادية للفضاء  $P_1(R)$  المعرف عليه الضرب الداخلي

$$\langle A, B \rangle = \int_{-1}^1 A(x)B(x)dx$$

ثم جد الضرب الداخلي للمتجهين  $A = 2-x, B = 3 + 5x$

الحل: ضع  $A_2 = \sqrt{3}/\sqrt{2}x, A_1 = 1/\sqrt{2}$

$$\langle A_1, A_2 \rangle = \int_{-1}^1 (\sqrt{3}/2) x dx = 0$$

بما ان  $\langle A_1, A_2 \rangle = 0$  عليه فان  $S$  تكون مجموعة متعامدة. الان

$$\|A_1\|^2 = \langle A_1, A_1 \rangle = \int_{-1}^1 (1/2) dx = 1$$

$$\|A_2\|^2 = \langle A_2, A_2 \rangle = \int_{-1}^1 (3/2)x^2 dx = 1$$

بما ان  $\dim(P_1(R)) = 2$  و  $S$  مجموعة مستقلة خطياً لانها متعامدة وبما

ان طول كل متجه فيها يساوي 1 فان  $S$  قاعدة متعامدة احادية الى  $P_1(R)$ .

يمكننا ايجاد الضرب الداخلي  $\langle 2-x, 3+5x \rangle$  باستخدام التعريف أي

$$\langle 2-x, 3+5x \rangle = \int_{-1}^1 (2-x)(3+5x) dx = 26/3$$

لكن لو اردنا تطبيق ماورد في المبرهنة (5.3.3) والملاحظة التي تليها

فيجب علينا ان نجد قيمة احداثيات كل من  $2-x$ ,  $3+5x$  بالنسبة للقاعدة  $S$ .  
نلاحظ مايلي

$$3+5x=3\sqrt{2}(1/\sqrt{2})+(5\sqrt{2}/\sqrt{3})(\sqrt{3}/\sqrt{2})(x)$$

$$2-x=2\sqrt{2}(1/\sqrt{2})+(-\sqrt{2}/\sqrt{3})(\sqrt{3}/\sqrt{2})(x)$$

اذن يكون متجه احداثيات  $3+5x$  بالنسبة للقاعدة  $S$ ,  $X=(3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}/\sqrt{3})$  ويكون متجه احداثيات  $2-x$  بالنسبة للقاعدة  $S$ ,  $Y=(2\sqrt{2}, -\sqrt{2}/\sqrt{3})$  الان الضرب الداخلي للاعتيادي للمتجهين  $Y, X$  في  $R^2$  يكون

$$\begin{aligned}\langle X, Y \rangle &= (3\sqrt{2})(2\sqrt{2}) + (5\sqrt{2}/\sqrt{3})(-\sqrt{2}/\sqrt{3}) \\ &= 12 - 10/3 = 26/3\end{aligned}$$

$$\langle 3+5x, 2-x \rangle = 26/3 \quad \text{اذن :}$$

بعد ان استعرضنا فوائد القواعد المتعامدة الاحادية في الفضاءات الاقليدية، نتجه الان الى محاولة معرفة كيفية ايجاد تلك القواعد. نبدأ بالمبرهنة التالية التي ترينا كيفية ايجاد قاعدة متعامدة احادية، اذا عرفنا قاعدة متعامدة.

#### مبرهنة (5.3.4):

اذا كانت  $S=\{A_1, \dots, A_n\}$  مجموعة متعامدة من المتجهات الغير الصفريية في فضاء إقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  فان المجموعة  $H=\{A_1/\|A_1\|, \dots, A_n/\|A_n\|\}$  تكون مجموعة متعامدة احادية وتولد الفضاء الجزئي المولد نفسه من قبل المجموعة  $S$ ، اي  $[S]=[H]$ .

البرهان :

انه لمن الواضح ان اطوال متجهات  $H$  مساوية للواحد. الان بما ان

$$\langle A_i / \|A_i\|, A_j / \|A_j\| \rangle = (1 / (\|A_i\| \|A_j\|)) \langle A_i, A_j \rangle$$

$$= \frac{1}{\|A_i\| \|A_j\|} \quad 0=0$$

وذلك لكل  $i \neq j$ .

اذن تكون المجموعة  $H$  متعامدة احادية. لنأخذ  $A \in [S]$ ، عليه توجد اعداد حقيقية  $a_1, \dots, a_n$  تحقق

$$A = a_1 A_1 + \dots + a_n A_n$$

المعادلة اعلاه يمكن ان تكتب بالصيغة

$$A = (a_1 \|A_1\|) A_1 / \|A_1\| + \dots + (a_n \|A_n\|) A_n / \|A_n\|$$

وعليه يكون  $A$  قد كتب كتركيب خطي من متجهات  $H$  وبالتالي يكون  $A \in [H]$ . اذن يكون  $[S] \subset [H]$ . اما اذا كان  $B \in [H]$  فانه توجد اعداد حقيقية  $b_1, \dots, b_n$  تحقق

$$B = b_1 (A_1 / \|A_1\|) + \dots + b_n (A_n / \|A_n\|)$$

$$= (b_1 / \|A_1\|) A_1 + \dots + (b_n / \|A_n\|) A_n$$

واذن  $B \in [S]$ . من هذا نستنتج على ان  $[H] \subset [S]$  وبالتالي يكون  $[S] = [H]$ .

(و. ه. م.)

مبرهنة (5.3.5): (طريقة كرام — شمدت للتعامد الاحادي)

لكل فضاء جزئي من فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  توجد قاعدة متعامدة احادية.

البرهان :

لنفرض ان  $M$  فضاء جزئي من  $V$  . بما ان  $V$  فضاء منتهي البعد فان  $M$  يكون فضاءاً منتهي البعد وعليه توجد قاعدة الى  $M$  ولتكن  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  وذلك حسب المبرهنة (1.8.3). سوف نطبق طريقة معينة لبناء قاعدة متعامدة احادية الى  $M$  وذلك باستخدام القاعدة  $S$  كإداة اولية. هذه الطريقة تعرف بطريقة كرام — شممت .

$$B_1 = A_1 \quad \text{ضع}$$

$$B_2 = A_2 - (\langle B_2, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

$$B_n = A_n - (\langle A_n, B_{n-1} \rangle / \|B_{n-1}\|^2) B_{n-1} - \dots - (\langle A_n, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

يجب علينا برهنة مايلي :

1 —  $\|B_i\| \neq 0$  وذلك لكل  $i = 1, 2, \dots, n$ . عندئذ يحق لنا القسمة على  $\|B_i\|$  في المعادلات اعلاه .

2 — المجموعة  $H = \{B_1, \dots, B_n\}$  تكون مجموعة متعامدة .

3 — المجموعة  $H$  اعلاه تكون قاعدة الى  $M$  .

عندئذ يمكننا ايجاد قاعدة متعامدة احادية الى  $M$  وذلك باستخدام

المبرهنة (5.3.4) التي تقسم المتجهات على اطوالها .

لبرهنة (1) اعلاه نلاحظ انه في حالة وجود  $k$  بحيث  $\|B_k\| = 0$  فإن خصائص الطول تحتم على ان  $B_k = 0$  وعند تعويض ذلك في المعادلة التي تعرف  $B_k$  نحصل على :

$$0 = A_k - (\langle A_k, B_{k-1} \rangle / \|B_{k-1}\|^2) B_{k-1} - \dots - (\langle A_k, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

اي ان

$$A_k = (\langle A_k, B_{k-1} \rangle / \|B_{k-1}\|^2) B_{k-1} + \dots + (\langle A_k, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

لكن عند التعويض عن كل من  $B_1, B_2, \dots, B_{k-1}$  بدلالة  $A_1, \dots, A_{k-1}$  نحصل على ان  $A_k$  يكون تركيباً خطياً من  $A_1, \dots, A_{k-1}$  وهذا تناقض لان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_n\}$  مستقلة خطياً.

اذن  $B_k \neq 0$  لكل  $k: 1, 2, \dots, n$

سوف نبين (2) اعلاه بالاستقراء الرياضي وكما يلي :

اولاً : المجموعة  $B_1, B_2$  متعامدة وذلك لان

$$\begin{aligned} \langle B_1, B_2 \rangle &= \langle A_1, A_2 - (\langle A_2, A_1 \rangle / \|A_1\|^2) A_1 \rangle \\ &= \langle A_1, A_2 \rangle - (\langle A_2, A_1 \rangle / \|A_1\|^2) \langle A_1, A_1 \rangle \\ &= \langle A_1, A_2 \rangle - (\langle A_2, A_1 \rangle / \|A_1\|^2) \|A_1\|^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ثانياً : لنفرض ان المجموعة  $\{B_1, B_2, \dots, B_k\}$  متعامدة . عندئذ ستكون المجموعة  $\{B_1, B_2, \dots, B_k, B_{k+1}\}$  متعامدة ايضاً وذلك لانه لكل  $i = 1, 2, \dots, k$  يكون لدينا

$$\begin{aligned} \langle B_{k+1}, B_i \rangle &= \langle A_{k+1} - (\langle A_{k+1}, B_k \rangle / \|B_k\|^2) B_k - \dots - (\langle A_{k+1}, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1, B_i \rangle \\ &= \langle A_{k+1}, B_i \rangle - \sum_{j=1}^k (\langle A_{k+1}, B_j \rangle / \|B_j\|^2) \langle B_j, B_i \rangle \end{aligned}$$

بما ان مجموعة متعامده بالفرض، لهذا يكون  
 $\langle B_j, B_i \rangle = 0$  وذلك لكل  $i \neq j$ . بالتعويض نحصل على :

$$\langle B_{k+1}, B_i \rangle = \langle A_{k+1}, B_i \rangle - (\langle A_{k+1}, B_i \rangle / \|B_i\|^2) \langle B_i, B_i \rangle = 0$$

نستنتج من الاستقراء الرياضي على ان المجموعة  $\{B_1, \dots, B_n\}$  تكون مجموعة متعامدة. بما ان كل مجموعة متعامدة من المتجهات غير الصفرية تكون مستقلة خطياً (مبرهنة 5.3.2) فعليه تكون  $\{B_1, \dots, B_n\}$  قاعدة الى  $M$  وذلك لاحتوائها على عدد من المتجهات المستقلة خطياً مساوياً لبعث الفضاء الجزئي  $M$  وذلك حسب نتيجة (1.8.8). بعد حصولنا على قاعدة متعامدة  $\{B_1, \dots, B_n\}$  نحصل على قاعدة متعامدة احادية  $\{C_1, \dots, C_n\}$  وذلك بأخذ  $C_k = B_k / \|B_k\|$   $n, \dots, 1 = k,$

(و. هـ. م)

مثال (7) :

جد قاعدة متعامدة احادية للفضاء الجزئي

$$M = \{(x, y, z, w) : x + y - 2w = 0\}$$

س الفضاء الاقليدي  $R^4$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي.  
الحل :

نحاول اولاً ايجاد اي قاعدة الى  $M$  ثم نبني القاعدة المتعامدة الاحادية منها.

لايجاد قاعدة الى  $M$  نكتب  $M$  بالصيغة

$$M = \{(x, y, z, w) : x = 2w - y = y, z = z, w = w\}$$

المتجهات  $A_1 = (-1, 1, 0, 0)$ ,  $A_2 = (0, 0, 1, 0)$ ,  $A_3 = (2, 0, 0, 1)$  تكون قاعدة الى  $M$ . الان نطبق طريقة كرام — شمدت لاستخراج قاعدة متعامدة احادية. ضع

$$B_1 = A_1 = (-1, 1, 0, 0)$$

$$B_2 = A_2 - (\langle A_2, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

$$B_3 = A_3 - (\langle A_3, B_2 \rangle / \|B_2\|^2) B_2 - (\langle A_3, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

$$\langle A_2, B_1 \rangle = 0$$

الآن

$$\|B_1\|^2 = (-1)^2 = (1)^2 = 2$$

$$B_2 = (0, 0, 1, 0) - (0/2)(-1, 1, 0, 0)$$

اذن

$$= (0, 0, 1, 0)$$

الآن :

$$\langle A_3, B_2 \rangle = 0, \langle A_3, B_1 \rangle = -2, \|B_2\|^2 = 1$$

بالتعويض نحصل على

$$B_3 = (2, 0, 0, 1) - (2/2)(-1, 1, 0, 0)$$

$$= (2, 0, 0, 1) + (-1, 1, 0, 0)$$

$$= (1, 1, 0, 1)$$

$$\|B_1\| = \sqrt{2}, \|B_2\| = 1, \|B_3\| = \sqrt{3}$$

اذن

$$C_1 = B_1 / \|B_1\| = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, 0)$$

بأخذ

$$C_2 = B_2 / \|B_2\| = (0, 0, 1, 1)$$

$$C_3 = B_3 / \|B_3\| = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 0, 1/\sqrt{3})$$

نكون قد حصلنا على قاعدة متعامدة احادية للفضاء الجزئي  $M$ ، مكونة من المتجهات  $C_1, C_2, C_3$ .

مثال (8) :

جد قاعدة متعامدة للفضاء الاقليدي  $P_2(\mathbb{R})$  مع الضرب الداخلي

$$\langle A, B \rangle = \int_0^1 A(x)B(x)dx$$

الحل : نبدأ بالقاعدة الطبيعية المكونة من المتجهات

$$A_1 = 1, A_2 = x, A_3 = x^2$$

ونطبق طريقة كرام — شمادت وذلك بأخذ

$$B_1 = 1$$

$$B_2 = x - (\langle x, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

$$B_3 = x^2 - (\langle x^2, B_2 \rangle / \|B_2\|^2) B_2 - (\langle x^2, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

$$\|B_1\|^2 = \langle B_1, B_1 \rangle = \int_0^1 (1)(1)dx = 1$$

$$\langle x, B_1 \rangle = \langle x, 1 \rangle = \int_0^1 x dx = 1/2$$

$$\langle x^2, B_1 \rangle = \langle x^2, 1 \rangle = \int_0^1 x^2 dx = 1/3$$

$$B_2 = x - 1/2$$



$$\|B_2\|^2 = \langle B_2, B_2 \rangle = \int_0^1 (x-1/2)^2 dx = 1/12$$

$$\langle x^2, B_2 \rangle = \int_0^1 x^2(x-1/2) dx = 1/12$$

بالتمويض نحصل على

$$B_3 = x^2 - (1/12)/(1/12)(x-1/2) - ((1/3)/1)(1)$$

$$= x^2 - x + 1/6$$

بما ان اي فضاء متجهات يمكن اعتباره كفضاء جزئي من نفسه وبما أنه يمكن دائماً ايجاد قاعدة متعامدة احادية لاي فضاء جزئي من فضاء اقليدي، اذن نكون قد حصلنا على مايلي .

نتيجة (5.3.6) :

لكل فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  توجد قاعدة متعامدة احادية .

### تمارين (5.3)

1 — ليكن  $R^2$  له الضرب الداخلي الاعتيادي . اي مما يلي يكون مجموعة متعامدة من المتجهات .

- (أ)  $(0, 3), (-1, 0)$  ، (ب)  $(4, 5), (-1, 2)$   
 (ج)  $(0, \sqrt{2}), (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$  ، (د)  $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$   
 (هـ)  $(1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5}), (-1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$

اي من المجموعات اعلاه يكون مجموعة متعامدة احادية ؟

2 — ليكن  $R^3$  له الضرب الداخلي الاعتيادي. اي مما يلي يكون مجموعة متعامدة احادية من المتجهات .

( أ )  $(1,1,0), (-1,1,0), (0,0,1)$

( ب )  $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0), (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0), (0,0,1)$

( ج )  $(2/3, -2/3, 1), (2/3, 1/3, -2/3), (1/3, 2/3, 2/3)$

( د )  $(1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}, -2/\sqrt{6}), (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0)$

3 — ليكن  $P_3(R)$  له الضرب الداخلي المعرف في مثال (3) من البند (5.1). اي مما يلي يكون مجموعة متعامدة من المتجهات ؟.

( أ )  $1, x-1/2$  ، ( ب )  $1, x-1$

( ج )  $x, x^2-1$  ، ( د )  $x, 3x^2-2, 2x^3$

4 — اذا كان  $A = (1/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$  و  $B = (2/\sqrt{30}, 3/\sqrt{30})$

فبرهن على ان المجموعة  $\{A, B\}$  متعامدة احادية اذا كان  $R^2$  له الضرب الداخلي  $\langle A, B \rangle = 3x_1y_1 + 2x_2y_2$  ولا تكون متعامدة احادية في حالة الضرب الداخلي الاعتيادي .

5 — اثبت ان :

$A_1 = (2, 0, 0, 3), A_2 = (-3, 2, -1, 2), A_3 = (0, 3, 6, 0)$

$A_4 = (-6, -52/5, 26/5, 4)$ .

تكون مجموعة متعامدة من المتجهات في  $R^4$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي . بجعل طول كل من هذه المتجهات يساوي واحد ، احصل على مجموعة متعامدة احادية .

6 — اوجد متجه احدائيات المتجه  $A = (1, -5, 7, 6)$  بالنسبة للقاعدة المتعامدة الى  $R^4$  الموجودة في تمرين (5) . ( استخدم الملاحظة التي تلي مثال (4) ) .

7 — أوجد متجه احدائيات المتجه  $C = (-2, 1)$  بالنسبة للقاعدة المتعامدة الاحادية الى  $R^2$  الموجودة في تمرين (4). ( استخدم مبرهنة (5.3.1) .

8 — ليكن  $R^2$  له الضرب الداخلي الاعتيادي. استخدم طريقة كرام — شميدت لتحويل القاعدة  $\{A, B\}$  الى قاعدة متعامدة احادية .

( أ )  $B = (4, 1), A = (1, 4)$  و ( ب )  $B = (1, 0), A = (5, -2)$

( ج )  $B = (-3, 6), A = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$  ، ( د )  $A = (1, 0)$  ،  $B = (0, 7)$  .

9 — ليكن  $P_2(R)$  له الضرب الداخلي المعرف في مثال (3) من البند (5.1) استخدم طريقة كرام — شميدت لتحويل القاعدة الطبيعية  $\{1, x, x^2\}$  الى قاعدة متعامدة احادية .

10 — ليكن  $R^3$  له الضرب الداخلي  $\langle A, B \rangle = x_1x_2 + 3y_1y_2 + 5z_1z_2$  حيث  $B = (x_2, y_2, z_2), A = (x_1, y_1, z_1)$  استخدم طريقة كرام شميدت لتحويل المجموعة :

$$\{A_1 = (1, 2, 3), A_2 = (-2, 1, 0), A_3 = (0, -3, 0)\}$$

الى مجموعة متعامدة أحادية .

11 — ليكن  $R^4$  له الضرب الداخلي الاعتيادي . أوجد قاعدة متعامدة أحادية للفضاء الجزئي المولّد من قبل المجموعة :

$$\{A_1 = (1, 1, 2, 2), A_2 = (-1, 1, 2, 2), A_3 = (0, 1, 3, 5)\}$$

12 — اذا كانت المجموعة  $S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  قاعدة متعامدة احادية للفضاء الاقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  ، فإثبت انه اذا كان  $A$  متجهاً في  $V$  فان :

$$\|A\|^2 = \langle A, A_1 \rangle^2 + \langle A, A_2 \rangle^2 + \dots + \langle A, A_n \rangle^2$$

13 — اذا كانت  $A, B, C$  ثلاثة متجهات مستقلة خطياً في فضاء إقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  فبرهن على انه بالامكان دائماً إيجاد متجه بالصيغة :

$$A + tB + sC$$

بحيث يكون عمودياً على كل من B و C .

#### (5.4) التتمات العمودية Orthogonal Compliments

ناقشنا في البند الخامس من الفصل الاول مسألة الجمع المباشر للفضاءات الجزئية . فاذا كان V اي فضاء متجهات منتهي البعد وعلى اي حقل F ، وكان M اي فضاء جزئي من V فانه دائماً بالامكان ايجاد فضاء جزئي آخر مثل N بحيث ان  $V = M \oplus N$  ( مبرهنة 5.4.1 ) ادناه . ان وجود N يعتمد على القواعد المختارة ويمكن تواجد فضاءات جزئية كثيرة مختلفة عندما تجمع مع M تعطي V ، هذا ماسنراه من خلال الامثلة القادمة . في الفضاءات الاقليدية يمكن ان نعرف مايسمى بالفضاء المتم العمودي لاي فضاء جزئي وهذا عندما يجمع مع الفضاء الجزئي المعطى ينتج كل الفضاء .

تعريف :

اذا كان V اي فضاء متجهات على اي حقل F وكان M فضاءاً جزئياً من V ، فنقول بان N فضاءً متمم الى M اذا فقط اذا كان N فضاءاً جزئياً من V محققاً الى  $V = M \oplus N$  .

مبرهنة (5.4.1) :

لأي فضاء جزئي M من اي فضاء متجهات منتهي البعد V ، يوجد فضاء متمم .

البرهان :

نختار اي قاعدة الى M ولتكن  $\{A_1, \dots, A_m\}$  . هذه عبارة عن مجموعة مستقلة خطياً من المتجهات في V . عليه وحسب المبرهنة (1.8.5) ، فانه توجد مجموعة متجهات  $\{B_1, \dots, B_n\}$  بحيث ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n\}$  تكون

قاعدة الى  $V$  . اذا كان  $N$  هو الفضاء الجزئي المولد من قبل مجموعة المتجهات  $\{B_1, \dots, B_n\}$  فان  $V = M \oplus N$  .

( و . هـ . م )


مثال (1) :

اذا كان  $M = \{(x, y) : x - 2y = 0\}$  فجد فضاءين جزئيين مختلفين كل منهما يكون متمماً الى  $M$  .

الحل : المجموعة  $\{A = (2, 1)\}$  تكون قاعدة الى  $M$  . ضع :  $B_2 = (1, 2)$  ,  $B_1 = (0, 1)$

لاحظ ان المجموعة  $\{A, B_1\}$  تكون قاعدة الى  $R^2$  والمجموعة  $\{A, B_2\}$  تكون قاعدة اخرى وهكذا فانه يمكننا اختيار متجهات مختلفة تحقق الخاصية التالية : عند وضعها مع  $A$  تنتج قاعدة الى  $R^2$  .

فاذا كان  $N_1$  هو الفضاء الجزئي المولد من قبل المتجه المضاف  $B_1$  و  $N_2$  هو الفضاء الجزئي المولد من قبل المتجه المضاف  $B_2$  فان  $R^2 = M \oplus N_1$  و  $R^2 = M \oplus N_2$  . الشكل التالي يوضح الفكرة .



وهذا يعني ان اي مستقيم مار بنقطة الاصل وغير منطبق مع  $M$  يكون فضاءاً متمماً الى المستقيم  $M$ .

ان فكرة إيجاد فضاء متمم فكرة سهلة وتعتمد على اختيار قاعدة للفضاء الجزئي وتوسيعها الى قاعدة لكل الفضاء وهذا النوع من الامثلة قد نوقش سابقاً في الفصل الأول. ان هدفنا في هذا البند مناقشة نوع خاص من المتممات سنسميه المتممات العمودية.

نركز اهتمامنا الان على فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  ونأخذ  $M \subset V$ ، اي فضاء جزئي من  $V$ . نعرف المجموعة الجزئية:

$$M^\perp = \{A \in V : \langle A, B \rangle = 0, \forall B \in M\}$$

اي ان  $M^\perp$  هي تلك المجموعة الجزئية التي تحتوي على المتجهات التي تكون عمودية على كل متجه في  $M$ . نلاحظ مايلي:

مبرهنة (5.4.2):

اذا كان  $M$  فضاءً جزئياً من الفضاء الاقليدي  $(V, \langle, \rangle)$ .

فان:

$$1 - M^\perp \text{ يكون فضاءً جزئياً.}$$

$$2 - M \cap M^\perp = \{0\}$$

$$3 - V = M \oplus M^\perp$$

$$4 - (M^\perp)^\perp = M$$

البرهان:

1 - افرض ان  $A, B \in M^\perp$ . المطلوب ان نبرهن على ان  $A+B \in M^\perp$ . لهذا الغرض نأخذ  $C$  اي متجه في  $M$  فنلاحظ

$$\langle C, A+B \rangle = \langle C, A \rangle + \langle C, B \rangle$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

اذن يكون  $A+B$  عمودياً على اي متجه في  $M$  وبالتالي يكون  $A+B \in M^\perp$  بالطريقة نفسها، لو كان  $A \in M^\perp$  و  $r$  اي عدد حقيقي و  $C$  اي متجه في  $M$  فان  $\langle rA, C \rangle = r \langle A, C \rangle = r \cdot 0 = 0$  وعليه  $rA \in M^\perp$  وهذا يعني ان  $M^\perp$  يكون فضاءاً جزئياً من  $V$ .

2 — خذ  $A \in M \cap M^\perp$ ، عليه ومن التعريف ينتج

$$\langle A, A \rangle = 0$$

ومن خصائص الضرب الداخلي نحصل على  $A=0$  واذن

$$M \cap M^\perp = \{0\}$$

3 — لكي نبرهن ان  $V = M \oplus M^\perp$ ، يجب ان نبرهن انه لكل متجه  $A \in V$  يوجد  $B \in M$  و  $C \in M^\perp$  بحيث ان  $A = B + C$ . لهذا الغرض نختار قاعدة متعامدة احادية الى  $M$  ولتكن  $\{A_1, \dots, A_m\}$ . ( طريقة كرام — شمدت ).

$$B = \langle A, A_1 \rangle A_1 + \dots + \langle A, A_m \rangle A_m \quad \text{ضع :}$$

انه لمن الواضح ان  $B \in M$ . ضع  $C = A - B$  بهذا يكون لدينا  $A = B + C$  فاذا برهننا على ان  $C \in M^\perp$  نكون قد اكملنا البرهان.

نلاحظ اولاً ان  $C$  يكون عمودياً على كل متجه في قاعدة  $M$ ، اي

$$\begin{aligned} \langle C, A_k \rangle &= \langle A - B, A_k \rangle \\ &= \langle A, A_k \rangle - \langle B, A_k \rangle \\ &= \langle A, A_k \rangle - \left\langle \sum_{i=1}^m \langle A, A_i \rangle A_i, A_k \right\rangle \\ &= \langle A, A_k \rangle - \sum_{i=1}^m \langle A, A_i \rangle \langle A_i, A_k \rangle \end{aligned}$$

بما ان المجموعة  $\{A_1, \dots, A_m\}$  متعامدة احادية فان  $\langle A_i, A_k \rangle = 0$  لكل  $i \neq k$  و  $\langle A_k, A_k \rangle = 1$  بالتعويض نحصل على

$$\langle C, A_k \rangle = \langle A, A_k \rangle - \langle A, A_k \rangle \langle A_k, A_k \rangle$$

$$= \langle A, A_k \rangle - \langle A, A_k \rangle = 0$$

اذن لكل  $D \in M$  يكون  $D = \sum_{i=1}^m r_i A_i$  وهذا نحصل على

$$\begin{aligned} \langle D, C \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{\infty} r_i A_i, C \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} r_i \langle A_i, C \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} r_i \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

عليه يكون  $C$  عمودياً على كل متجه في  $M$  وبالتالي يكون  $C \in M^\perp$ .

4 - لغرض برهنة  $M = (M^\perp)^\perp$ ، نأخذ  $A \in M$  ونلاحظ  $\langle A, B \rangle = 0$  لكل  $B \in M^\perp$  إذا فقط إذا  $A \in (M^\perp)^\perp$ .

(و. ه. م.)

تعريف :

إذا كان  $(V, \langle, \rangle)$  فضاءاً اقليدياً و  $M$  فضاءاً جزئياً من  $V$  فان الفضاء الجزئي  $M^\perp$  يسمى الفضاء المتمم العمودي الى  $M$ .

الآن لو اعطيت لنا فضاءً جزئياً  $M$  من فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  وطلب منا إيجاد  $M^\perp$  فنتبع الخطوات التالية :

- 1 - نجد اي قاعدة الى  $M$  ولتكن  $\{A_1, \dots, A_m\}$ .
- 2 - نوسع القاعدة اعلاه الى قاعدة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n\}$ .
- 3 - نطبق طريقة كرام - شمدت للحصول على قاعدة متعامدة  $\{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n\}$  الى  $V$ .

عندئذ ستكون المجموعة  $\{B_1, \dots, B_n\}$  قاعدة متعامدة الى  $M$  وذلك لان كل متجه فيها يكون عمودياً على كل متجه في  $M$ .

مثال (2) :

جد الفضاء المتمم العمودي للفضاء الجزئي

$$M = \{(x, y) : x - 2y = 0\}$$



وذلك في الفضاء الاقليدي  $R^2$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي .

الحل : لاحظنا في المثال (1) من هذا البند ان  $\{A = (2,1)\}$  تكون قاعدة الى  $M$  .  
 نأخذ  $\{A = (2,1), B = (0,1)\}$  كقاعدة الى  $R^2$  الان نطبق طريقة كرام  
 \_ شمدت

$$A' = A = (2,1)$$

$$B' = B - (\langle B, A' \rangle / \|A'\|^2) A'$$

$$= (0,1) - 1/5(2,1) = (-2/5, 4/5)$$

ليكن  $M^\perp$  الفضاء المولد من قبل المتجه  $B' = (-2/5, 4/5)$   
 اذن :  $M^\perp = \{a(-2/5, 4/5) : a \in \mathbb{R}\}$

$$= \{(x,y) : 2x + y = 0\}$$

لاحظ ان  $M^\perp$  عبارة عن مستقيم عمودي على المستقيم  $M$  .

اذا كان  $M$  فضاءاً جزئياً من فضاء اقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  فان  
 $V = M \oplus M^\perp$  وذلك حسب المبرهنة (5.4.2) . اذن يمكن لاي متجه  $A \in V$  ان  
 يكتب بطريقة واحدة فقط كحاصل جمع متجه في  $M$  ومتجه في  $M^\perp$  .

تعريف :

اذا كان  $A \in V$  بحيث  $A = B + C$  ,  $B \in M$  , و  $C \in M^\perp$  فان المتجه  $B$   
 يسمى مسقط (Projection) المتجه  $A$  على الفضاء الجزئي  $M$  .

مثال (3)

جد مسقط المتجه  $A = (3,4)$  على الفضاء الجزئي  
 $M = \{(x,y) : x - 2y = 0\}$

وذلك في الفضاء الاقليدي  $R^2$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي .

الحل : لقد لاحظنا في المثال (2) ان المجموعة

$$\{A_1 = (2,1), A_2 = (-2/5, 4/5)\}$$

تكون قاعدة متعامدة الى  $R^2$  . بتطبيق مبرهنة (5.3.4) نحصل على

$$\{A'_1 = (2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}), A'_2 = (-1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})\}$$

كقاعدة متعامدة احادية الى  $R^2$  بحيث ان  $A_1$  قاعدة الى  $M$  و  $A_2$  قاعدة الى  $M$  .

المبرهنة (5.3.1) تعلمنا كيف نكتب  $A = (3,4)$  كتراكيب خطي من  $A'_1, A'_2$  .

$$A = (3,4) = \langle A, A'_1 \rangle A'_1 + \langle A, A'_2 \rangle A'_2$$

$$= 2\sqrt{5}(2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}) + \sqrt{5}(-1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$$

$$= (4,2) + (-1,2)$$

نلاحظ هنا ان  $(4,2) \in M$  و  $(-1,2) \in M^\perp$  وعليه يكون المتجه  $B = (4,2)$  مسقط

على  $M$  .  $A = (3,4)$

نلاحظ هنا ان ايجاد قاعدة متعامدة احادية الى الفضاء الجزئي  $M$  يكفي

لايجاد مسقط اي متجه على  $M$  وذلك بتطبيق المبرهنة (5.3.1) . الشكل 1

يوضح فكرة المسقط على فضاء جزئي .


يمكننا ان نلخص طريقة ايجاد المساقط على فضاء جزئي  $M$  من فضاء

اقليدي  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  كالآتي :

1 — جد قاعدة متعامدة احادية الى  $M$  ولتكن  $\{A_1, \dots, A_m\}$  .

2 — ان مسقط اي متجه  $A \in V$  على  $M$  يكون :

$$B = \langle A, A_1 \rangle A_1 + \dots + \langle A, A_m \rangle A_m$$



شكل (1)

مثال (4) :

جد مسقط المتجه  $A = (2,1,0,1)$  على الفضاء الجزئي  
 $M = \{(x,y,z,w) : x+y-z=0, z+2w=0\}$  وذلك في الفضاء  $R^4$  مع الضرب  
 الداخلي الاعتيادي .

الحل : نكتب  $M$  بالصيغة

$$M = \{(x, y, z, w) : x = -y - 2w, z = -2w\}$$

عليه يمكننا اخذ  $\{A_2 = (-2, 0, -2, 1), A_1 = (-1, 1, 0, 0)\}$  كقاعدة الى  $M$ . الان نستخرج قاعدة متعامدة احادية وذلك بأخذ

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 - (\langle A_2, B_1 \rangle / \|B_1\|^2) B_1$$

$$= (-2, 0, -2, 1) - (2/2)(-1, 1, 0, 0)$$

$$= (-1, -1, -2, 1)$$

$$C_1 = B_1 / \|B_1\| = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, 0)$$

$$C_2 = B_2 / \|B_2\| = (-1/\sqrt{7}, -1/\sqrt{7}, -2/\sqrt{7}, 1/\sqrt{7})$$

اذن تكون المجموعة  $\{C_1, C_2\}$  قاعدة متعامدة احادية الى  $M$ ، وعليه يكون مسقط المتجه  $A = (2, 1, 0, 1)$  على  $M$  مساوياً الى

$$B = \langle A, C_1 \rangle C_1 + \langle A, C_2 \rangle C_2$$

$$= (-1/\sqrt{2})(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, 0) + (-2/\sqrt{7})(-1/\sqrt{7}, -1/\sqrt{7}, -2/\sqrt{7}, 1/\sqrt{7})$$

$$= (1/2, -1/2, 0, 0) + (2/7, 2/7, 4/7, -2/7)$$

$$= (11/14, -3/14, 4/7, -2/7)$$

#### تمارين (5.4)

1 - اعتبر  $R^2$  له الضرب الداخلي الاعتيادي. عبر عن  $A = (2, 3)$  بالصورة

$A = B + C$  حيث  $B$  يقع في الفضاء الجزئي  $M$  المولد من قبل

$A_1 = (-1, 4)$  و  $C$  يكون عمودياً على  $M$ .

2 — أوجد الفضاء المتمم العمودي  $M^\perp$  إذا علمت بان

$$M = \{(x, y, z) : x + 2y - z = 0\}$$

وذلك في الفضاء  $R^3$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي . اوجد مسقط المتجه  $A = (1, 1, 1)$  على  $M$ .

3 — اذا كان  $M$  هو الفضاء الجزئي من  $R^4$  مع الضرب الداخلي الاعتيادي

والمولد من قبل مجموعة المتجهات  $\{A_1 = (1, 2, 2, 0), A_2 = (0, 1, 5, 4), A_3 = (1, 1, 3, 4)\}$  فاوجد  $M^\perp$ .

اوجد كذلك مسقط المتجه  $B = (5, -11, 13, 9)$  على  $M$ .

4 — كرر التمرين (3) مع الفضاء الجزئي  $M$  المولد من قبل مجموعة المتجهات

$$\{A_1 = (1, -2, 3, 5), A_2 = (0, 1, 1, 4)\} . B = (-1, -1, 0, 0)$$

5 — ليكن  $M_2(R)$  له الضرب الداخلي

$$\langle A, B \rangle = a_1 b_1 + 2a_2 b_2 + 3a_3 b_3 + 4a_4 b_4$$

$$B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix}$$

حيث

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix} : a_4 = 0, a_1 - a_2 + a_3 = 0 \right\} \quad \text{ليكن}$$

أوجد  $M^\perp$  . اوجد مسقط كل من المتجهات التالية على  $M$ .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

عبر عن كل من المتجهات اعلاه كحاصل جمع متجهين احدهما في  $M$  والاخر يكون عمودياً على  $M$ .

6 — ليكن كل من  $M$  و  $N$  فضاءاً جزئياً من الفضاء الاقليدي  $(V, \langle, \rangle)$   
 $(M+N)^\perp = M^\perp \cap N^\perp$  برهن على ان :

$$(M \cap N)^\perp = M^\perp + N^\perp$$

### (5.5) : التحويلات العمودية (Orthogonal transformations)

عند دراسة الدوال بين الزمر، تدرس تلك الدوال التي تحفظ البنية الجبرية، اي الدوال التي تحفظ العملية الثنائية وهذه الدوال تسمى تماثلات (homomorphisms). عند دراستنا للدوال بين فضاءات المتجهات، درسنا التحويلات الخطية التي كل منها يحفظ الجمع ويحفظ الضرب القياسي. الفضاءات الاقليدية هي عبارة عن فضاءات متجهات منتهية البعد وعلى حقل الاعداد الحقيقية لكن معرف عليها بنية جبرية اضافة وهي الضرب الداخلي، لذلك فمن الطبيعي ان ندرس تلك التحويلات الخطية التي تحفظ الضرب الداخلي، لكننا سندرس حالة خاصة وهي ان المجال يساوي المجال المقابل.

تعريف :

اذا كان  $(V, \langle, \rangle)$  فضاءاً اقليدياً فان اي تحويل خطي  $T: V \rightarrow V$  يسمى تحويلاً عمودياً (orthogonal transformation) اذا وقف اذا كان  
 $\langle T(A), T(B) \rangle = \langle A, B \rangle$   
 وذلك لاي زوج من المتجهات  $A, B \in V$ .

مثال (1) :

برهن على ان التحويل الخطي  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ، المعرف بالصيغة ،  
 $T(x, y) = ((1/\sqrt{2})x - (1/\sqrt{2})y, (1/\sqrt{2})x + (1/\sqrt{2})y)$   
 يكون تحويلاً عمودياً وذلك بالنسبة للضرب الداخلي الاعتيادي على  $\mathbb{R}^2$ .

الحل : نأخذ اي زوج من المتجهات

$$A_1 = (x_1, y), A_2 = (x_2, y_2)$$

ونلاحظ مايلي

$$\langle A_1, A_2 \rangle = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$\langle T(A_1), T(A_2) \rangle = ((1/\sqrt{2})x_1 - (1/\sqrt{2})y_1) ((1/\sqrt{2})x_2 - (1/\sqrt{2})y_2) + ((1/\sqrt{2})x_1 + (1/\sqrt{2})y_1) ((1/\sqrt{2})x_2 + (1/\sqrt{2})y_2)$$

$$= (1/2)(x_1 x_2 - x_1 y_2 - y_1 x_2 + y_1 y_2) + (1/2)(x_1 x_2 + x_1 y_2 + y_1 x_2 + y_1 y_2)$$

$$= (1/2)(2x_1 x_2 + 2y_1 y_2)$$

$$= x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$\langle A_1, A_2 \rangle = \langle T(A_1), T(A_2) \rangle$$

اذن

لهذا يكون T تحويلاً عمودياً .

مبرهنة (5.5.1) :

إذا كان (V, <, >) فضاءاً اقليدياً و  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً خطياً فان

العبارات التالية تكون متكافئة .

1 \_ T تحويل عمودي .

2 \_ T يحفظ اطوال المتجهات ، بعبارة اخرى ، لكل  $A \in V$  ، يكون

$$\|T(A)\| = \|A\|$$

3 \_ لكل متجه احادي الطول  $A \in V$  ، يكون المتجه  $T(A)$  احادي الطول ايضاً .

البرهان :-

لنفرض ان  $T:V \rightarrow V$  تحويل عمودي . لكل  $A \in V$  يكون لدينا :  
 $\|T(A)\|^2 = \langle T(A), T(A) \rangle = \langle A, A \rangle = \|A\|^2$   
 عليه فان  $T$  يحفظ اطوال المتجهات . الان نبهن العكس .  
 لنفرض ان  $T$  يحفظ اطوال المتجهات . لاي زوج من المتجهات  $A, B \in V$  .  
 نلاحظ ،

$$\langle T(A+B), T(A+B) \rangle - \langle T(A-B), T(A-B) \rangle$$

$$= 4 \langle T(A), T(B) \rangle \quad (1)$$

الطرف الايسر للمعادلة اعلاه يساوي :

$$\|T(A+B)\|^2 - \|T(A-B)\|^2$$

لكن  $T$  يحفظ اطوال المتجهات ، عليه يكون الطرف الايسر مساوياً الى

$$\|A+B\|^2 - \|A-B\|^2$$

يمكننا كتابة المقدار اعلاه بالصيغة :

$$\langle A+B, A+B \rangle - \langle A-B, A-B \rangle$$

عند التبسيط نحصل على ان المقدار اعلاه يكون مساوياً الى

$$4 \langle A, B \rangle$$

بالرجوع الى المعادلة (1) نحصل على :

$$4 \langle T(A), T(B) \rangle = 4 \langle A, B \rangle$$

$$\langle T(A), T(B) \rangle = \langle A, B \rangle \quad \text{اي ان}$$

بذلك يكون  $T$  تحويلاً عمودياً . بهذا نكون قد برهنا على ان العبارة (1)

تكافئ العبارة (2) ونترك تكافؤ العبارتين (2) و (3) وتكافؤ العبارتين (3) و (1) للقارئ .

( و . ه . م )



المبرهنة اعلاه تنتج ان التحويل العمودي  $V \rightarrow V$  يحفظ الزاوية بين المتجهات .

مبرهنة (5.5.2) :

إذا كان  $T:V \rightarrow V$  تحويلاً عمودياً فإن  $T$  يكون تحويلاً غير معتل (تشاكلاً) .

• البرهان :

سنبرهن أولاً على ان  $\text{Ker}T = \{0\}$  . لهذا الغرض نفرض ان  $A \in V$  بحيث  $T(A) = 0$  . من خصائص الضرب الداخلي وتعريف التحويل العمودي نحصل على ان  $\langle A, A \rangle = \langle T(A), T(A) \rangle = 0$  . بما ان  $V$  فضاءً اقليدي . فانه يكون منتهي البعد . الان المبرهنة (2.2.3) تنص على ان

$$\dim(\text{ker}T) + \dim \text{Im}(V) = \dim(V)$$

بما ان  $\text{ker}T = \{0\}$  ، عليه نحصل على  $\dim(\text{Im}(V) = \dim(V))$  وبذلك يكون  $T$  تشاكلاً حسب المبرهنة (2.3.3) .

(و . هـ . م)

مبرهنة (5.5.3) :

تركيب اي تحويلين عموديين يكون تحويلاً عمودياً .

البرهان :

إذا كان كل من  $T:V \rightarrow V$  ،  $S:V \rightarrow V$  تحويلاً عمودياً فانه لاي متجه  $A \in V$  يكون لدينا

$$\|S \circ T(A)\| = \|S(T(A))\| = \|T(A)\| = \|A\|$$

المبرهنة (5.5.1) تنص على ان التحويل يكون عمودياً اذا فقط اذا حفظ اطوال

المتجهات . بما ان  $SoT$  يحفظ اطوال المتجهات كما مبين اعلاه فانه يكون تحويلاً عمودياً .

(و . هـ . م)

ان مصفوفة التحويل العمودي بالنسبة لقاعدة متعامدة احادية تكون مصفوفة خاصة ، سنوضح خصائصها في المبرهنة التالية .

مبرهنة (5.5.4) :

اذا كانت  $S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  قاعدة متعامدة احادية للفضاء الاقليدي  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  و  $T: V \rightarrow V$  تحويلاً عمودياً على  $V$  ، مصفوفته بالنسبة للقاعدة  $S$  هي  $M$  ، فان

1 — كل صف من صفوف  $M$  يكون احادي الطول ، وذلك باعتباره متجهاً في  $R^n$  بالنسبة للضرب القياسي الاعتيادي .

2 — صفوف  $M$  تكون مجموعة متعامدة من المتجهات .

3 —  $M^{-1} = M^T$  ، وعليه فان العبارتين (1)، (2) اعلاه تتحققان بالنسبة لاعمدة  $M$  .

البرهان :

لنفرض ان  $M = (a_{ij})$  . من تعريف مصفوفة التحويل الخطي بالنسبة لقاعدة معينة ، نحصل على :

$$T(A_i) = a_{i1}A_1 + a_{i2}A_2 + \dots + a_{in}A_n$$

وذلك لكل  $i: 1, \dots, n$  . بذلك نحصل على

$$\langle A_i, A_j \rangle = \langle T(A_i), T(A_j) \rangle$$

$$\begin{aligned}
 &= \left\langle \sum_{k=1}^n a_{ik} A_k, \sum_{l=1}^n a_{il} A_l \right\rangle \\
 &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{ik} a_{jl} \langle A_k, A_l \rangle \\
 &= \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk}
 \end{aligned}$$

حيث اننا استخدمنا العلاقة  $\langle A_k, A_l \rangle = 0$  عندما  $k \neq l$  و  $\langle A_k, A_k \rangle = 1$  وذلك لان القاعدة  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  متعامدة احادية .

لو وضعنا :  $X_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$   
 لاصبح المتجه  $X_i \in \mathbb{R}^n$  ، يمثل الصف  $i$  للمصفوفة  $M$  . ومن العلاقة اعلاه نحصل على ان

$$\begin{aligned}
 \langle X_i, X_j \rangle &= \langle A_i, A_j \rangle \\
 \langle X_i, X_i \rangle &= \|X_i\|^2 = 1 \quad \text{بذلك نحصل على :} \\
 \langle X_i, X_j \rangle &= 0 \quad \text{و}
 \end{aligned}$$

وذلك لكل  $i \neq j$  . هذا يبرهن (1), (2) .

لبرهنة (3) نلاحظ انه عند حساب  $MM^T$  فان العنصر في الصف  $i$  والعمود  $j$  للمصفوفة اعلاه عبارة عن الضرب الداخلي للصف  $i$  في المصفوفة  $M$  مع العمود  $j$  في المصفوفة  $M^T$  الذي يساوي الصف  $j$  للمصفوفة  $M$  ومن (1), (2) اعلاه نحصل على ان  $MM^T = I$  وبالتالي يكون  $M^{-1} = M^T$  .

(و . هـ . م)

مثال (2) :

جد مصفوفة التحويل العمودي  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ، المعرف بالصيغة  
 $T(x, y) = ((1/\sqrt{2})x - (1/\sqrt{2})y, (1/\sqrt{2})x + (1/\sqrt{2})y)$

وذلك بالنسبة للقاعدة المتعامدة الاحادية  $S = \{A_1, A_2\}$  حيث  
 $A_2 = (-2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$ ,  $A_1 = (1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$ . ثم حقق الخصائص التي  
 وردت في المبرهنة (5.5.4).

الحل :  $T(A_1) = (1/\sqrt{10}, 3/\sqrt{10}) = (1/\sqrt{2})A_1 + (1/\sqrt{2})A_2$

$T(A_2) = (-3/\sqrt{10}, -1/\sqrt{10}) = (-1/\sqrt{2})A_1 + (1/\sqrt{2})A_2$

عليه ، تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة اعلاه

$$M = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

نلاحظ ان طول كل صف وكل عمود يساوي واحد ، كذلك فان صفي  
 المصفوفة  $M$  متعامدين ، وكذلك فان  $MM^T = I$  وبالتالي يكون  $M^T = M^{-1}$

تعريف :

اذا كانت  $M$  مصفوفة مربعة على حقل الاعداد الحقيقية فان  $M$  تسمى  
 مصفوفة عمودية اذا فقط اذا  $MM^T = I$

المبرهنة (5.5.4) تنص على ان مصفوفة التحويل العمودي بالنسبة لاي  
 قاعدة متعامدة احادية تكون مصفوفة عمودية . ان العكس يكون صحيحاً ايضاً ،  
 اي ان المصفوفة العمودية تؤدي الى تحويل عمودي كما في المبرهنة التالية .

مبرهنة (5.5.5) :

اذا كانت  $M$  مصفوفة عمودية ذات درجة  $n \times n$  واذا كانت  
 $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة متعامدة احادية للفضاء الاقليدي  $(V, \langle, \rangle)$  . فانه  
 يوجد تحويل عمودي  $T: V \rightarrow V$  ، مصفوفته بالنسبة للقاعدة  $S$  تساوي  $M$  .

البرهان :

ليكن  $T:V \rightarrow V$  التحويل المعرف كما يلي :

إذا كان  $A = x_1A_1 + \dots + x_nA_n$  فان

$$T(A) = y_1A_1 + \dots + y_nA_n$$

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)M \quad \text{حيث :}$$

واضح ان  $T$  يكون تحويلاً خطياً والان نبرهن على انه تحويلاً عمودياً . أولاً لاحظ ان

$$\|T(A)\|^2 = \langle T(A), T(A) \rangle$$

$$= y_1^2 + \dots + y_n^2$$

وذلك حسب المبرهنة (5.3.3) لان  $S$  قاعدة متعامدة احادية . عليه نحصل على :

$$\|T(A)\|^2 = (y_1, y_2, \dots, y_n)(y_1, y_2, \dots, y_n)^T$$

$$= (x_1, \dots, x_n)MM^T(x_1, \dots, x_n)^T$$

$$= (x_1, \dots, x_n)I(x_1, \dots, x_n)^T$$

$$= x_1^2 + \dots + x_n^2$$

$$= \|A\|^2$$

بذلك يكون  $T$  تحويلاً عمودياً . نترك تحقيق ان  $M$  تكون مصفوفة  $T$  بالنسبة للقاعدة  $S$  ، للقارئ

( و . ه . م )

مثال (3)

جد التحويل العمودي  $R^3 \rightarrow R^3$ ، الذي مصفوفته بالنسبة للقاعدة الطبيعية ( المتعامدة الاحادية ) تكون المصفوفة العمودية :

$$M = \begin{bmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & -2/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

الحل : لتأخذ  $A = (x_1, x_2, x_3)$  كأى متجه في  $R^3$ . لتكن :

$$A_1 = (1, 0, 0), A_2 = (0, 1, 0), A_3 = (0, 0, 1)$$

عناصر القاعدة الطبيعية. اذن

$$A = x_1 A_1 + x_2 A_2 + x_3 A_3$$

$$(y_1, y_2, y_3) = (x_1, x_2, x_3) M$$

ضع

$$= (1/3)(2x_1 - 2x_2 + x_3, 2x_1 + x_2 - 2x_3, x_1 + 2x_2 + 2x_3)$$

اذن

$$T(A) = T(x_1, x_2, x_3) = y_1 A_1 + y_2 A_2 + y_3 A_3$$

$$= (1/3)(2x_1 - 2x_2 + x_3, 2x_1 - x_2 - 2x_3, x_1 + 2x_2 + 2x_3)$$

مثال (4) :

جد مصفوفة عمودية  $3 \times 3$ ، صفها الاول يكون المتجه

$$X_1 = (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})$$

الحل : بما ان صفوف المصفوفة العمودية عبارة عن متجهات متعامدة واحادية الطول فعلينا ايجاد متجهين  $Y_2, Y_3$  متعامدين وكل منهما يكون احادي الطول وعمودي على  $X_1$ . هذه المسألة تكافئ ايجاد قاعدة متعامدة احادية الى  $R^3$ ، متجهها الاول هو  $X_1$ . نطبق طريقة كرام — شمدت على المتجهات.

$$X_1 = (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}), A_2(1, 0, 0), A_3 = (0, 1, 0)$$

$$B_2 = A_2 - (\langle A_2, X_1 \rangle / \|X_1\|^2) X_1 \quad \text{ضع}$$

$$B_3 = A_3 - (\langle A_3, B_2 \rangle / \|B_2\|^2) B_2 - (\langle A_3, X_1 \rangle / \|X_1\|^2) X_1$$

بعد اجراء عمليات حسابية مماثلة للامثلة السابقة، نحصل على

$$B_2 = (1, 0, 0) - (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}) = (1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2})$$

$$B_3 = (0, 1, 0)$$

$$Y_2 = B_2 / \|B_2\| = (1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2}) \quad \text{ضع}$$

$$Y_3 = B_3 = (0, 1, 0)$$

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{المصفوفة :}$$

تكون مصفوفة عمودية وتحقق المطلوب .

### تمارين (5.5)

1 — ليكن  $R^2$  له الضرب الداخلي الاعتيادي . برهن على ان التحويل  $T: R^2 \rightarrow R^2$  المعرف بالصيغة :

$$T(x, y) = (x \cos \theta + y \sin \theta, -x \sin \theta + y \cos \theta)$$

يكون تحويلاً عمودياً وذلك لاي قيمة الى  $\theta$  .

2 — اي من التحويلات التالية يكون تحويلاً عمودياً .

$$T(x, y, z) = (y, 2x, z), \quad T: R^3 \rightarrow R^3 \quad (\text{أ})$$

$$T(x, y, z) = (x, -y, -z), \quad T: R^3 \rightarrow R^3 \quad (\text{ب})$$

$$T: P_2(R) \rightarrow P_2(R) \quad (\text{ج})$$

$$T(a + bx + cx^2) = a + ((b + c)/\sqrt{2})x + ((-b + c)/\sqrt{2})x^2$$

$$T: P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R}) \quad (د)$$

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = -b + ax + dx^2 - cx^3$$

3 — اذا كانت  $\lambda$  قيمة ذاتية للمصفوفة العمودية  $M$  فبرهن على ان  $1/\lambda$  تكون ايضاً قيمة ذاتية الى  $M$ .

4 — برهن على ان كل من المصفوفات التالية تكون مصفوفة عمودية.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = (1/1 + 2a^2) \begin{pmatrix} 1 & -2a & 2a^2 \\ 2a & 1-2a^2 & -2a \\ 2a^2 & 2a & 1 \end{pmatrix} \quad \text{— 5 برهن على ال المصفوفة}$$

تكون مصفوفة عمودية لاي قيمة للعدد الحقيقي  $a$ .

6 — اذا كانت  $B$  مصفوفة حقيقية مربعة ومتناظرة متخالفة ( $B^T = -B$ ) فبرهن على ان المصفوفة  $I+B$  تكون مصفوفة قابلة للقلب وان المصفوفة  $A = (I-B)(I+B)^{-1}$  تكون مصفوفة عمودية.

$$7 \text{ — بأخذ } B = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \text{ ، اوجد } A \text{ في تمرين (6) ثم حقق}$$

كونها مصفوفة عمودية.

8 — اوجد مصفوفة عمودية يكون صفها الاول  $(5/13, 12/13, 0)$

9 — اوجد مصفوفة عمودية يكون صفها الاول  $(2/3, -2/3, 1)$  وصفها الثاني  $(1/3, 2/3, 2/3)$ .



10 — اوجد مصفوفة عمودية يكون عموداها الاول والثاني كما يلي

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ \sqrt{2}/3 \\ -1/3\sqrt{2} \\ \sqrt{2}/3 \end{pmatrix}$$

11 — اذا كانت كل من A,B مصفوفة عمودية  $n \times n$  فبرهن على ان AB تكون ايضاً مصفوفة عمودية .

12 — اذا كانت A مصفوفة عمودية فبرهن على ان :  $\det(A) = |A| = \pm 1$

## الفصل السادس

### الصيغ ثنائية الخطية والصيغ التربيعية

#### (Bilinear and Quadratic Forms

##### 6.0 مقدمة

الضرب الداخلي  $\langle A, B \rangle$  لتجهين في فضاء اقليدي  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  كان قد عرف بواسطة دالة  $R \rightarrow V \times V \rightarrow \langle \cdot, \cdot \rangle$  تحقق اربعة شروط ( راجع البند 5.1 ).

الشروط الثلاثة الاولى تنص على ان تلك الدالة تكون خطية في كل متغير . سندرس في هذا الفصل تلك الدوال التي تحقق الشروط الثلاثة الاولى وليس بالضرورة ان تحقق الشرط الرابع وسنطلق عليها اسم الدوال ثنائية الخطية . هذه الدراسة ستؤدي بنا الى دراسة الصيغ التربيعية . فمثلاً الطرف الايسر للمعادلة

$$x^2 + 2xy + y^2 = 3$$

عبارة عن صيغة تربيعية بالمتغيرين  $x, y$  . في التفاضل والتكامل هذا النوع من المعادلات يمثل قطع مخروطي ، لكن وجود الحد « $2xy$ » كان عائق في معرفة نوعية القطع المخروطي ، لذلك كنا نلجأ الى مسألة تدوير المحاور وكتابة المعادلة اعلاه بمتغيرات جدد من دون ان يكون بها حد ضرب تقاطعي (Cross product

term) . ان مسألة تحويل صيغة تربيعية الى صيغة بسيطة ( قطرية ) هي موضوع دراستنا في هذا الفصل حيث سنستخدم معظم المفاهيم السابقة التي درسناها للبرهنة على ان اي صيغة تربيعية بأي عدد من المتغيرات يمكن ان تتحول الى صيغة قطرية بمتغيرات جدد بعد ذلك نقدم الامثلة التطبيقية في معرفة القطوع المخروطية .

لقد جزأنا هذا الفصل الى بندين الاول يناقش الدوال ثنائية الخطية وخصائصها والثاني يناقش الدوال التربيعية والصيغ التربيعية وتطبيقاتها .

### (6.1) الدوال ثنائية الخطية Bilinear maps

تعريف :

اذا كان  $V$  فضاء متجهات على حقل  $F$  ، فدالة ثنائية الخطية على  $V$  ،

نقصد دالة :

$$f: V \times V \rightarrow F$$

تتحقق مايلي

$$f(A_1 + A_2, B) = f(A_2, B) + f(A_1, B) \quad 1$$

$A_2, B \in V$

$$f(A, B_1 + B_2) = f(A, B_1) + f(A, B_2) \quad 2$$

$B_1, B_2 \in V$

$$f(rA, B) = rf(A, B) = f(A, rB) \quad 3$$

ولأي عدد قياسي  $r \in F$  .

مثال (1) :

$$F = R, V = R^n$$

$$f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(A, B) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \quad \text{بالصيغة}$$

وذلك لأي زوج من المتجهات  $A = (a_1, \dots, a_n)$ ,  $B = (b_1, \dots, b_n)$  الدالة  $f$  اعلاه تكون دالة ثنائية الخطية لأنها تعرف الضرب الداخلي الاعتيادي على  $\mathbb{R}^n$  (راجع مثال (1) من البند (5.1)).

مثال (2):

بصورة عامة، اذا كان  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  فضاءاً اقليدياً فإن دالة الضرب

الداخلي

$$f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

تكون دالة ثنائية الخطية. (راجع تعريف الضرب الداخلي في الفصل الخامس).

مثال (3):

اذا كانت  $M = (a_{ij})$  مصفوفة  $n \times n$  على الحقل  $F$  فإنه يمكن تعريف دالة ثنائية الخطية على  $F^n$  كالآتي:

$$f: F^n \times F^n \rightarrow F$$

$$f(X, Y) = XMY^T$$

حيث ان  $Y = (y_1, \dots, y_n)$ ,  $X = (x_1, \dots, x_n)$

$$Y^T = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

عند حساب الصيغة اعلاه نحصل على:

$$f(X, Y) = \sum_j \sum_i x_i a_{ij} y_j$$

سوف نوضح كيف ان كل دالة ثنائية الخطية تعطي مصفوفة وبالعكس.

مبرهنة (6.1.1) :

ليكن  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى الحقل  $F$ ، ولتكن

$S = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة ثابتة الى  $V$ ، فإن :

1 - كل دالة ثنائية الخطية  $F$   $f: V \times V \rightarrow F$  على  $V$  تعين مصفوفة  $M(f)$  بالنسبة للقاعدة  $S$  بحيث ان

$$f(A, B) = X M(f) Y^T$$

حيث ان  $X = (x_1, \dots, x_n)$ ،  $Y = (y_1, \dots, y_n)$  هي متجهات احداثيات  $A, B$  على التوالي، وذلك بالنسبة للقاعدة  $S$ .

2 - كل مصفوفة  $M$  ذات درجة  $n \times n$  على الحقل  $F$  تعين دالة ثنائية الخطية  $f: V \times V \rightarrow F$  بحيث ان  $M(f) = M$ .

البرهان: (1) لتكن

$$M(f) = \begin{bmatrix} f(A_1, A_1) & f(A_1, A_2) \dots & f(A_1, A_n) \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ f(A_n, A_1) & f(A_n, A_2) & \dots f(A_n, A_n) \end{bmatrix}$$

ليكن  $A, B$  اي متجهين في  $V$  بحيث ان  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  هو متجه احداثيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $S$  و  $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  هو متجه احداثيات  $B$  بالنسبة للقاعدة  $S$  هذا يعني ان :

$$A = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$$

$$B = y_1 A_1 + \dots + y_n A_n$$

بأستخدام خصائص الدوال ثنائية الخطية يمكننا ان نجري الحسابات التالية :

$$f(A, B) = f(x_1 A_1 + \dots + x_n A_n, y_1 A_1 + \dots + y_n A_n)$$

$$= y_1 f(x_1 A_1 + \dots + x_n A_n, A_1) + \dots + y_n f(x_1 A_1 + \dots + x_n A_n, A_n)$$

$$= y_1 \sum_{i=1}^n x_i f(A_i, A_1) + \dots + y_n \sum_{i=1}^n x_i f(A_i, A_n)$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_i y_j f(A_i, A_j)$$

لكن  $f(A_i, A_j)$  هو العنصر في الصف  $i$  والعمود  $j$  للمصفوفة  $M(f)$ ، عليه بمراجعة ضرب المصفوفات نرى بأن الصيغة اعلاه مساوية الى  $XM(f)Y^T$ . هذا يبرهن (1).

2 — لنفرض اننا اعطينا مصفوفة  $M$  ذات درجة  $n \times n$  وعلى الحقل  $F$ . نعرف دالة ثنائية الخطية.

$$f: V \times V \rightarrow F$$

$$f(A, B) = XMY^T \quad \text{بالصيغة}$$

حيث ان  $X$  هو متجه احدائيات  $A$ ,  $Y$  هو متجه احدائيات  $B$ . بهذه الحالة يكون لدينا  $M(f) = M$  وذلك لان متجه احدائيات  $A_j$  بالنسبة للقاعدة  $S$  يكون المتجه  $(0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$  (1 في المكان  $i$ ) ومتجه احدائيات  $A_j$  بالنسبة للقاعدة  $S$  يكون  $(0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$  (1 في المكان  $j$ ). عليه فان

$$f(A_i, A_j) = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0) M \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = m_{ij}$$

حيث ان  $m_{ij}$  هو العنصر في الصف  $i$  و العمود  $j$  للمصفوفة  $M$ .

( و . ه . م )

مثال (4) :

جد مصفوفة الدالة ثنائية الخطية

$$f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

المعرفة بالصيغة :

$$f: ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 - 3x_1y_2 + 4x_2y_1 - x_2y_2$$

وذلك بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1 = (1, -1), A_2 = (2, 1)\}$

الحل :

$$M(f) = \begin{bmatrix} f(A_1, A_1) & f(A_1, A_2) \\ f(A_2, A_1) & f(A_2, A_2) \end{bmatrix}$$

$$f(A_1, A_1) = f((1, -1), (1, -1)) = 2 + 3 + 4 - 1 = 8$$

$$f(A_1, A_2) = f((1, -1), (2, 1)) = 4 - 3 - 8 + 1 = -6$$

$$f(A_2, A_1) = f((2, 1), (1, -1)) = 4 + 6 + 4 + 1 = 15$$

$$f(A_2, A_2) = f((2, 1), (2, 1)) = 8 - 6 + 8 - 1 = 9$$

لذا تكون مصفوفة  $f$  هي المصفوفة التالية :

$$M(f) = \begin{bmatrix} 8 & -6 \\ 15 & 9 \end{bmatrix}$$

مثال (5):

جد الدالة ثنائية الخطية

$$f: P_2(\mathbb{R}) \times P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

التي تنتج من المصفوفة

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

وذلك بالنسبة للقاعدة الطبيعية  $S = \{1, x, x^2\}$  الى  $P_2(\mathbb{R})$ .

الحل: ليكن:

$$A = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$B = b_0 + b_1x + b_2x^2$$

اي متجهين في  $P_2(\mathbb{R})$  . عليه يكون متجه احدائيات A هو  $(a_0, a_1, a_2)$  ومتجه احدائيات B هو المتجه  $(b_0, b_1, b_2)$  وذلك بالنسبة للقاعدة S . بمراجعة

مبرهنة (6.1.1) نحصل على

$$f(A, B) = (a_0, a_1, a_2) M \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$f(A, B) = (a_0, a_1, a_2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$



$$= (a_0 + 2a_2, a_0 - a_2, -a_0 + a_1) \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$= (a_0 + 2a_2)b_0 + (a_0 - a_2)b_1 + (-a_0 + a_1)b_2$$

$$= a_0 b_0 + 2a_2 b_0 + a_0 b_1 - a_2 b_1 - a_0 b_2 + a_1 b_2$$

لنرى الان تأثير تغير القاعدة على مصفوفة الدوال ثنائية الخطية .

مبرهنة (6.1.2) :

إذا كانت  $f: V \times V \rightarrow F$  دالة ثنائية الخطية على فضاء المتجهات

المتتهي البعد  $V$  . لتكن  $M(f)$  مصفوفة  $F$  بالنسبة للقاعدة  $\{A_1, \dots, A_n\}$   $S =$  و  $M^*(f)$  مصفوفة  $f$  بالنسبة للقاعدة  $\{A_1^*, \dots, A_n^*\}$   $S^* =$  . بهذه الحالة ، توجد مصفوفة  $n \times n$  قابلة للقلب  $P$  بحيث ان :

$$M^*(f) = PM(f)P^T$$

البرهان :

لتكن  $P$  مصفوفة الانتقال من القاعدة  $S^*$  الى القاعدة  $S$  . فإذا كانت

$$P = (p_{ij})$$

$$A_k^* = \sum_{j=1}^n p_{kj} A_j, \quad k = 1, \dots, n$$

ليكن الان  $A$  ،  $B$  اي متجهين في  $V$  وليكن :

$X$  متجه احدائيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $S$  .

$X^*$  متجه احدائيات  $A$  بالنسبة للقاعدة  $S^*$  .

$Y$  متجه احدائيات  $B$  بالنسبة للقاعدة  $S$  .

$Y^*$  متجه احداثيات  $B$  بالنسبة للقاعدة  $S^*$ .

من البرهنة (1.9.1) نحصل على مايلي

$$Y = Y^*P \text{ و } X = X^*P$$

والمصفوفة  $P$  تكون مصفوفة قابلة للقلب . ( تذكر بأن مصفوفة الانتقال من  $S$  الى  $S^*$  تساوي  $P^{-1}$  ).

بتطبيق مبرهنة (6.1.1) نحصل على

$$f(A, B) = X M(f) Y^T \dots(1)$$

وذلك لاي زوج من المتجهات  $A, B$  في  $V$  بالنسبة للقاعدة  $S$  لكن  $M^*(f)$  هي مصفوفة  $f$  بالنسبة للقاعدة  $S^*$ ، اذن

$$f(A, B) = X^* M^*(f) Y^{*T} \dots(2)$$

عند التعويض عن  $Y = Y^*P, X = X^*P$  في (1) اعلاه ينتج

$$f(A, B) = (X^*P) M(f) (Y^*P)^T$$

$$= X^* (PM(f)P^T) Y^{*T}$$

بالمقارنة مع (2) نحصل على

$$X^*PM(f)P^T Y^{*T} = X^*M^*(f) Y^{*T}$$

وذلك لأي  $X^*, Y^*$  في  $F^n$ . من هذا نحصل على

$$M^*(f) = PM(f)P^T$$

( و . ه . م )

يوجد نوع مهم من الدوال ثنائية الخطية وهو مايسمى بالدوال ثنائية الخطية المتناظرة .

تعريف :

الدالة  $f: V \times V \rightarrow F$  الثنائية الخطية تسمى متناظرة (Symmetric)

إذا وفقط إذا كان

$$f(A, B) = f(B, A)$$

وذلك لأي زوج من المتجهات  $A, B$  في  $V$ .

مثال (6) :

$$f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

المعرفة بالصيغة :

$$f((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = x_1x_2 - y_1y_2$$

تكون دالة متناظرة وذلك لأن

$$f((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = f((x_2, y_2), (x_1, y_1))$$

مثال (7) :

$$g: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

المعرفة بالصيغة :

$$g((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = x_1y_2 - y_1x_2$$

تكون دالة غير متناظرة وذلك لأن

$$g((x_2, y_2), (x_1, y_1)) = x_2y_1 - y_2x_1$$

$$g(A, B) \neq g(B, A)$$

أي ان

ان مصفوفات الدوال ثنائية الخطية المتناظرة تكون مصفوفات متناظرة

وذلك بالنسبة لأي قاعدة .

مثال (8) :

جد مصفوفة الدالة ثنائية الخطية المتناظرة والمعروفة في المثال (6) اعلاه وذلك بالنسبة للقاعدة  $S = \{(1,2), (-1,0)\}$  الى  $R^2$ .

الحل : ضع  $A_2 = (-1,0)$  ،  $A_1 = (1,2)$  . الان

$$f((1,2), (1,2)) = (1)(1) - (2)(2) = -3$$

$$f((1,2), (-1,0)) = (1)(-1) - (2)(0) = -1$$

$$f((-1,0), (1,2)) = (-1)(1) - (0)(2) = -1$$

$$f((-1,0), (-1,0)) = (-1)(-1) - (0)(0) = 1$$

عليه تكون مصفوفة الدالة المتناظرة  $f$  بالنسبة للقاعدة  $S$  اعلاه

$$M(f) = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

لاحظ كيف انها مصفوفة متناظرة .

ان النتيجة الاساسية في هذا الفصل والتي سنطبقها في البند اللاحق تكمن في المبرهنة التالية .

مبرهنة (6.1.3) :

اذا كانت  $f: V \times V \rightarrow R$  دالة ثنائية الخطية متناظرة على فضاء متناهي

البعاد  $V$  على حقل الاعداد الحقيقية  $R$  فإنه توجد قاعدة  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$

الى  $V$  ، بحيث ان مصفوفة  $F$  بالنسبة لها تكون قطرية ، اي ان  $f(A_i, A_j)$

$= 0$  عندما  $i \neq j$ .

بمراجعة المبرهنة (6.1.2) وملاحظة كون مصفوفة الدالة ثنائية الخطية المتناظرة تكون مصفوفة متناظرة، يمكننا ان نعبر عن المبرهنة اعلاه بصيغة المصفوفات وكما يلي :

## مبرهنة (6.1.4) :

لأي مصفوفة متناظرة  $M$  على حقل الاعداد الحقيقية، توجد مصفوفة قابلة للقلب  $P$ ، بحيث تكون  $PMP^{-1}$  مصفوفة قطرية. ( اي ان كل مصفوفة حقيقية متناظرة تكون مشابهة الى مصفوفة قطرية ).

لفرض برهنة المبرهنة اعلاه سنكون بحاجة لبضعة نتائج سوف نسمي كل منها مبرهنة تمهيدية، لكن قبل البدء بهذه المبرهنات التمهيدية سنذكر القارئ ببعض الامور التي سنكون بحاجة لها في البراهين .

لأي مصفوفة حقيقية  $M$  ذات درجة  $n \times n$ .

1 — نقول بأن العدد الحقيقي  $r$  يكون قيمة ذاتية الى  $M$  اذا فقط اذا وجد

متجه غير صفري  $X = (x_1, \dots, x_n)$  في  $R^n$ ، يحقق

$$XM = rX$$

عندئذ يسمى  $X$  متجهاً ذاتياً تابعاً للقيمة الذاتية  $r$ .

2 — لأي متجهين  $X = (x_1, \dots, x_n)$ ،  $Y = (y_1, \dots, y_n)$  في  $R^n$ ، يمكن

للتعبير عن الضرب الداخلي الاعتيادي :

$$\langle X, Y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$$

بالصيغة المصفوفية وكما يلي .

$$\langle X, Y \rangle = XY^T$$

$$= (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$$

3 — تسمى  $M$  مصفوفة عمودية اذا فقط اذا كان  $MM^T = I$  وهذا يؤدي الى كون صفوف المصفوفة  $M$  عبارة عن  $n$  من متجهات  $R^n$  متعامدة وأحادية الطول. قبل البدء بالبرهنة التمهيدية، لابد من ذكر الخاصية المهمة للمتجهات الذاتية التابعة لقيم ذاتية مختلفة لمصفوفة حقيقية متناظرة.

مبرهنة (6. 1. 5) :

اذا كانت  $M$  مصفوفة حقيقية متناظرة وكانت  $\lambda_1, \lambda_2$  قيمتين ذاتيتين مختلفتين للمصفوفة  $M$  وكان  $X_1, X_2$  متجهين ذاتيين تابعين للقيمتين  $\lambda_1, \lambda_2$  على التوالي فإن  $X_1$  يكون عمودياً على  $X_2$  اي ان  $\langle X_1, X_2 \rangle = X_1 X_2^T = 0$

البرهان :

عندنا العلاقات التالية

$$X_1 M = \lambda_1 X_1 \quad \dots (1)$$

$$X_2 M = \lambda_2 X_2 \quad \dots (2)$$

بأخذ مدورة طرفي المعادلة (2) نحصل على :

$$M^T X_2^T = \lambda_2 X_2^T$$

لكن  $M = M^T$  وهذا يعني ان  $M = M^T$ .

اذن

$$M X_2^T = \lambda_2 X_2^T$$

بضرب هذه المعادلة في  $X_1$  من اليسار، نحصل على :

$$X_1 M X_2^T = \lambda_2 X_1 X_2^T$$

بالتعويض عن  $X_1 M$  بما يساويه من المعادلة (1) نحصل على :

$$\lambda_1 X_1 X_2^T = \lambda_2 X_1 X_2^T$$

$$(\lambda_1 - \lambda_2) X_1 X_2^T = 0$$

اي

لكن  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  وذلك لان  $0 \neq \lambda_1 - \lambda_2$ .

$$. X_1 X_2^T = 0 \text{ اذن}$$

( و . ه . م )

المبرهنة اعلاه تنص على ان المتجهات الذاتية التابعة الى قيم ذاتية مختلفة تكون متعامدة وذلك لأي مصفوفة حقيقية متناظرة.

مبرهنة تمهيدية (1):

اذا كانت  $M$  مصفوفة حقيقية متناظرة فإن كل قيمة ذاتية الى  $M$  تكون عدداً حقيقياً وكل متجه ذاتي يكون متجهاً في  $R^n$ . (  $n =$  درجة المصفوفة  $M$  ).

البرهان:

افرض ان  $\lambda$  هي قيمة ذاتية للمصفوفة  $M$  وان  $X$  متجهاً ذاتياً تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda$ .

$$XM = \lambda X \quad \dots (1)$$

نحن نحوف من كون  $\lambda$  عدد عقدي وأحد مركبات المتجه  $X = (x_1, \dots, x_n)$  يكون عدداً عقدياً. لذلك سوف نبرهن على ان  $\bar{\lambda} = \lambda$  و  $\bar{x}_i = x_i$  حيث ان  $\bar{\lambda}$  هو مرافق العدد العقدي  $\lambda$ ، عندئذ يكون  $\lambda$  عدداً حقيقياً و  $X$  متجهاً في  $R^n$ . بأخذ مرافق طرفي المعادلة اعلاه، نحصل على:

$$\overline{XM} = \overline{\lambda X}$$

حيث ان  $\overline{X} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$  وعناصر  $\overline{M}$  هي مرافقات عناصر  $M$ . لكن مصفوفة حقيقية ومرافق اي عدد حقيقي يساوي نفسه، وعليه  $M = \overline{M}$ . اذن

$$\overline{X} M = \overline{\lambda} \overline{X} \quad \dots (2)$$

بأخذ مدورة طرفي المعادلة (1) وملاحظة ان  $M^T = M$  ، نحصل على :

$$MX^T = \lambda X^T$$

بضرب المعادلة اعلاه في  $X$  من اليسار نحصل على :

$$XMX^T = \lambda X X^T \quad \dots\dots (3)$$

بضرب المعادلة (2) من اليمين في  $X^T$  ، نحصل على :

$$\bar{X}MX^T = \bar{\lambda} \bar{X} X^T \quad \dots (4)$$

بطرح (4) من (3) نحصل على

$$0 = (\lambda - \bar{\lambda}) \bar{X} X^T$$

$$\bar{X} X^T = \bar{x}_1 x_1 + \dots + \bar{x}_n x_n = \|X\|^2 \neq 0 \quad \text{لكن:}$$

وذلك لان  $X \neq 0$  متجه ذاتي .

اذن  $\lambda - \bar{\lambda} = 0$  وعليه  $\lambda = \bar{\lambda}$  وبذلك يكون  $\lambda$  عدداً حقيقياً . الان المتجه  $X$  ، نحصل عليه من حل المعادلات المتأتية من المعادلة المصفوفية :  $X(M - \lambda I) = 0$

بما ان معاملات تلك المعادلات تأتي من المصفوفة الحقيقية  $M - \lambda I$  فعليه تكون الحلول حقيقية وبالتالي تكون جميع مركبات المتجه  $X$  حقيقية وعليه يكون  $X \in \mathbb{R}^n$  .

( و . ه . م )

مبرهنة تمهيدية (2) :

لكل مصفوفة متناظرة حقيقية ذات درجة  $n \times n$  ، توجد  $n$  من القيم الذاتية الحقيقية . ( ليس بالضرورة ان تكون مختلفة ) .



البرهان :

لننظر الى المعادلة المميزة للمصفوفة  $M$ ، ولتكن

$$|M - \lambda I| = (-1)^n \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

لو نظرنا الى حلول المعادلة اعلاه في حقل الاعداد العقدية لوجدنا ان لتلك المعادلة  $n$  من الحلول ولتكن  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  وذلك ماتنص عليه المبرهنة الاساسية في الجبر.

لكن المبرهنة التمهيدية (1) تنص على ان جميع تلك الحلول تكون اعداداً حقيقية.

( و . ه . م )

المبرهنة التالية تنتج المبرهنة (6.1.4) ومنها المبرهنة (6.1.3).

مبرهنة (6.1.6) :

لأي مصفوفة حقيقية متناظرة  $M$ ، توجد مصفوفة عمودية  $P$  بحيث ان  $PMP^T$  تكون مصفوفة قطرية.

البرهان :

لتكن  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  القيم الذاتية الحقيقية للمصفوفة  $M$  ( هذا مانصت عليه المبرهنة التمهيدية 12 ).

اختار  $X_1$  متجهاً ذاتياً للمصفوفة  $M$  تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda$  بحيث ان  $\|X_1\|^2 = 1$ . سوف نفترض بأن القارىء يفهم الضرب القالبى (Block Multiplication) للمصفوفات.

إختار قاعدة متعامدة احادية الى  $R^n$  متجهها الاول هو  $X_1$  ولتكن : —

$$\{X_1, Y_2, \dots, Y_n\}$$

عند ترتيب عناصر القاعدة اعلاه نحصل على مصفوفة

$$Q_1 = \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$$

$Q_1$  تكون مصفوفة عمودية وذلك لان  $Q_1 Q_1^T = I$  . الان

$$Q_1 M Q_1^T = \begin{pmatrix} X_1 M \\ Y_2 M \\ \vdots \\ Y_n M \end{pmatrix} (X_1^T \ Y_2^T \ \dots \ Y_n^T)$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 X_1 \\ Y_2 M \\ \vdots \\ Y_n M \end{pmatrix} (X_1^T \ Y_2^T \ \dots \ Y_n^T)$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 X_1 X_1^T & \vdots & \lambda_1 X_1 Y_2^T & \dots & \lambda_1 X_1 Y_n^T \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (Y_2 M X_1^T) & \vdots & Y_2 M Y_2^T & \dots & Y_2 M Y_n^T \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (Y_n M X_1^T) & \vdots & Y_n M Y_2^T & \dots & Y_n M Y_n^T \end{bmatrix}$$

بما ان  $\{X_1, Y_2, \dots, Y_n\}$  قاعدة متعامدة احادية، عليه نحصل على ان

$$X_1 Y_j^T = \langle X_1, Y_j \rangle = 0 \text{ و } X_1 X_1^T = \|X_1\|^2 = 1$$

ج:  $2, \dots, n$  كذلك فإن تدوير طرفي المعادلة:

$$X_j M = \lambda_j X_j$$

ينتج :

$$MX_1^T = \lambda_1 X_1^T$$

وذلك لان M مصفوفة متناظرة. بذلك نلاحظ على ان

$$Y_j M X_1^T = Y_j \lambda_1 X_1^T =$$

$$= \lambda_1 Y_j X_1^T = \lambda_1 \langle Y_j, X_1 \rangle$$

$$= \lambda_1 \cdot 0 = 0$$

وذلك لكل  $j: 2, \dots, n$ .

بالتعويض نحصل على :

$$Q_1 M Q_1^T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \vdots & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \vdots & B_1^{(n-1) \times (n-1)} & \vdots \end{pmatrix}$$

المصفوفة  $B_1$  عبارة عن مصفوفة ذات درجة  $(n-1) \times (n-1)$ . كذلك فإن

1 —  $B_1$  مصفوفة متناظرة.

2 — القيم الذاتية للمصفوفة  $B_1$  تكون  $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ .

نكرر العملية نفسها على المصفوفة  $B_1$  كالأتي :

اختر متجهاً ذاتياً احادي الطول وليكن  $X_2$  تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda_2$

للمصفوفة  $B_1$  اي ان

$$X_2 B_1 = \lambda_2 X_2$$

( لاحظ ان  $X_2 \in \mathbb{R}^{n-1}$  ). بتطبيق الفكرة اعلاه فإنه توجد مصفوفة عمودية  $Q_2$

ذات درجة  $(n-1) \times (n-1)$  تحقق

$$Q_2^{-1} B_1 Q_2^T = \begin{pmatrix} \lambda_2 & \vdots & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \vdots & B_2 & \vdots \end{pmatrix}$$

# مكتبة الفريد الإلكترونية

حيث ان  $B_2$  مصفوفة ذات درجة  $(n-2) \times (n-2)$  متناظرة وقيمها الذاتية تكون  $\lambda_3, \dots, \lambda_n$ .

$$Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & Q_2 \end{bmatrix} \quad \text{ضع}$$

$Q_2$  مصفوفة عمودية ذات درجة  $n \times n$ . الان لاحظ :

$$\begin{aligned} Q_2(Q_1 M Q_1^T) Q_2^T &= \begin{bmatrix} 1 & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & Q_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & B_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & Q_2^{-T} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & Q_2^{-T} B_1 Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \vdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots & B_2^{(n-1) \times (n-1)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

نكرر العملية نفسها على المصفوفة  $B_2$  فنحصل على مصفوفة عمودية  $Q_3$  ومصفوفة  $B_3$  ذات درجة  $(n-3) \times (n-3)$  متناظرة وتحقق :

$$Q_3(Q_2 Q_1 M Q_1^T Q_2^T) Q_3^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 & \vdots & 0 \\ & \lambda_2 & & \vdots & \\ 0 & & \lambda_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & B_3^{(n-2) \times (n-2)} \end{bmatrix}$$

وهكذا الى ان نحصل على  $Q_{n-1}$  بحيث ان :

$$Q_{n-1} (Q_{n-2} \dots Q_1 M Q_1^T \dots Q_{n-2}^T) Q_{n-1}^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

٣٤٣

$$P = Q_{n-1} Q_{n-2} \cdots Q_2 Q_1 \quad \text{ضع}$$

$$P^T = Q_1^T Q_2^T \cdots Q_{n-2}^T Q_{n-1}^T \quad \text{اذن}$$

$$PMP^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad \text{وعليه يكون لدينا: -}$$

اي ان  $PMP^T$  مصفوفة قطرية . بما ان  $P$  حاصل ضرب مصفوفات عمودية فأذن تكون مصفوفة عمودية .

( و . ه . م )

بما ان كل مصفوفة عمودية عبارة عن مصفوفة قابلة للقلب فإن هذا يبرهن المبرهنة (6.1.4) .

الان المبرهنة (6.1.4) تنص على ان كل مصفوفة حقيقية متناظرة تكون مشابهة الى مصفوفة قطرية .

بالرجوع الى المبرهنة (4.3.2) نلاحظ مايلي :

اذا كانت  $M$  مصفوفة متناظرة حقيقية فإن العلاقة :

$$PMP^{-1} = D$$

حيث ان  $D$  مصفوفة قطرية ، تنتج ان صفوف المصفوفة  $P$  تكون متجهات ذاتية الى  $M$  وعناصر المصفوفة القطرية تكون قيماً ذاتية الى  $M$  .

ان خلاصة ماتقدم تكمن في مايلي :

اذا كانت  $M$  مصفوفة متناظرة حقيقية فإن  $M$  يكون لها  $n$  من القيم الذاتية ولتكن  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  ربما بعضها مكررة واذا كانت  $X_1, X_2, \dots, X_n$  متجهات ذاتية متعامدة واحادية الطول تابعة للقيم الذاتية اعلاه على التوالي للمصفوفة  $M$  فإن المصفوفة  $P$  التي صفوفها مكونة من المتجهات الذاتية اعلاه تكون مصفوفة عمودية . اي انه اذا كانت

$$P = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

فإن P مصفوفة عمودية وتحقق

$$PMP^{-1} = PMP^T = D$$

ملاحظة:

ان الحصول على مجموعة متجهات ذاتية متعامدة واحادية الطول يتم بتطبيق طريقة كرام — شمدت .

يمكن توضيح ماجاء اعلاه بالمثال التالي :-

مثال (9):

جد مصفوفة عمودية P، تحقق  $PAP^T$  تكون مصفوفة قطرية، حيث ان A مصفوفة متناظرة .

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

الحل: المعادلة المميزة للمصفوفة A هي

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 & 2 \\ 2 & 4 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 (\lambda - 8) = 0$$

عندئذ تكون القيم الذاتية للمصفوفة  $A: \lambda = 2, \lambda = 8$ . يمكن  
بالطرق المستخدمة في الفصل الرابع اثبات ان المتجهين:

$$A_1 = (-1, 1, 0), A_2 = (-1, 0, 1)$$

يكونان قاعدة للفضاء الذاتي التابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 2$ . تطبيق طريقة كرام -  
شمدت على  $\{A_1, A_2\}$  يؤدي الى مجموعة متعامدة أحادية من المتجهات  
الذاتية التالية (حقق ذلك).

$$B_1 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) \text{ و } B_2 = (-1/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6})$$

الفضاء الذاتي التابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 8$  له القاعدة

$$A_3 = (1, 1, 1)$$

تطبيق طريقة كرام - شمدت على  $A_3$  يؤدي الى المتجه الاحادي الطول

$$B_3 = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$$

اخيراً بأستخدام  $B_1, B_2, B_3$  كصفوف نحصل على المصفوفة

$$P = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

التي تحول المصفوفة  $A$  الى مصفوفة قطرية

اي ان  $PAP^T = D$  والقارىء مدعو لتحقيق ذلك.

الان نبرهن المبرهنة (6.1.3).

برهان المبرهنة (6.1.3):

اختر اي قاعدة  $H = \{B_1, \dots, B_n\}$  الى  $V$  لتكن  $M$  مصفوفة  
الدالة ثنائية الخطية المتناظرة

$$f: V \times V \rightarrow R$$

بالنسبة للقاعدة  $H$  اعلاه .

$M$  مصفوفة متناظرة حقيقية، عليه توجد مصفوفة عمودية  $P$  تحقق

$$PMP^T = D$$

حيث ان  $D$  مصفوفة قطرية . ( ذلك بتطبيق المبرهنة (6.1.6) ) . نستخدم  $P$  لتغيير  
القاعدة والحصول على قاعدة جديدة:

$$S = \{A_1, \dots, A_n\}$$

حيث:

$$\begin{aligned} A_1 &= P_{11} B_1 + \dots + P_{1n} B_n \\ &\vdots \\ A_n &= P_{n1} B_1 + \dots + P_{nn} B_n \end{aligned}$$

اي ان  $P$  مصفوفة الانتقال من القاعدة  $S$  الى القاعدة  $H$  . المبرهنة (6.1.2) تنص  
على ان مصفوفة الدالة  $f$  بالنسبة للقاعدة  $S$  تكون

$$PMP^T = D$$

( و . ه . م )

مثال (10):

جد قاعدة للفضاء  $R^2$  تجعل من مصفوفة الدالة ثنائية الخطية

$$f: R^2 \times R^2 \rightarrow R$$



المعرفة بالصيغة :

$$f((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = x_1x_2 + 2y_1x_2 + 2x_1y_2 + y_1y_2$$

مصفوفة قطرية .

الحل : لتكن  $S = \{ A_1 = (1,0), A_2 = (0,1) \}$  القاعدة الطبيعية الى  $\mathbb{R}^2$  .  
ان مصفوفة  $f$  بالنسبة لهذه القاعدة .

$$M(f) = \begin{bmatrix} f(A_1, A_1) & f(A_1, A_2) \\ f(A_2, A_1) & f(A_2, A_2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

لاحظ ان هذه المصفوفة متناظرة لكن ليست قطرية . لغرض تحويلها الى مصفوفة قطرية يجب علينا ايجاد القيم الذاتية .

المعادلة المميزة للمصفوفة  $M(f)$  تكون

$$\begin{vmatrix} M(f) - tI \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-t & 2 \\ 2 & 1-t \end{vmatrix} = 0$$

$$t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1 \quad \text{القيم الذاتية :}$$

لغرض الحصول على المتجهات الذاتية التابعة للقيمة الذاتية  $\lambda_1 = 3$  علينا حل المعادلة المصفوفية:

$$(x,y) \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} = (0,0)$$

التي تؤدي الى معادلة خطية واحدة:

$$-2x + 2y = 0$$

$$y = x$$

لذلك فإن  $X_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$  يكون متجهاً ذاتياً احادي الطول تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda_1 = 3$  وبالطريقة نفسها نحصل على  $X_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$  كمتجه ذاتي احادي الطول تابع للقيمة الذاتية  $\lambda_2 = -1$ . لذلك نحصل على مصفوفة عمودية.

$$P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

هذه المصفوفة تحقق:

$$PMP^T = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

نستخدم هذه المصفوفة لتغيير القاعدة S الى قاعدة مكونة من المتجهين  $B_1, B_2$  حيث:

$$B_1 = (1/\sqrt{2})A_1 + (1/\sqrt{2})A_2 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$$

$$B_2 = (-1/\sqrt{2})A_1 + (1/\sqrt{2})A_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$$

ان مصفوفة f بالنسبة للقاعدة اعلاه ستكون قطرية مساوية الى :

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

### تمارين (6.1)

1 — اذا كان  $A = (x_1, y_1)$  ،  $B = (x_2, y_2)$  اي متجهين في  $R^2$  فأني من الدوال  $f: R^2 \times R^2 \rightarrow R$  يكون دالة ثنائية الخطية على  $R^2$ .

- .  $f(A, B) = x_1 x_2 + 5y_1 y_2 + 3$  (أ)
- .  $f(A, B) = 7x_1 y_2 - 2x_2 y_1$  (ب)
- .  $f(A, B) = 1 + x_1 x_2 - y_1 y_2$  (ج)
- .  $f(A, B) = 2x_1^2 + 3y_2^2$  (د)
- .  $f(A, B) = x_1 y_1 x_2 y_2$  (هـ)

2 — اذا كان  $A = (u_1, v_1, w_1)$  ،  $B = (u_2, v_2, w_2)$  اي متجهين في الفضاء  $C^3$  على الحقل  $C$  فأني من الدوال  $f: C^3 \times C^3 \rightarrow C$  يكون دالة ثنائية الخطية على  $C^3$ .

- .  $f(A, B) = u_1 u_2 - i v_1 w_2 + (1 + i) w_1 v_2$  (أ)
- .  $f(A, B) = (2-3i) + u_1 w_2 - v_1 u_2$  (ب)
- .  $f(A, B) = -i u_1 w_2$  (ج)
- .  $f(A, B) = u_1^2 + v_1^2 + w_1^2 - i u_2^2 + (1 + i) w_2^2$  (د)
- .  $f(A, B) = (2 + 4i) u_1 - v_2 + w_2$  (هـ)

3 — ليكن  $P_2(\mathbb{R})$  له القاعدة الطبيعية  $\{1, x, x^2\}$ . اوجد الدوال الخطية الخطية  
 الخطية  $f: P_2(\mathbb{R}) \times P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  التي تنتج من المصفوفات

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

4 — ليكن  $\mathbb{R}^4$  له القاعدة المكونة من المتجهات

$$A_1 = (0, 1, 0, 0), A_2 = (-2, 0, 0, 0), A_3 = (0, 0, 1/2, 0),$$

$$A_4 = (0, 0, 0, 3)$$

اوجد الدوال الثنائية الخطية  $f: \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$  التي تنتج من المصفوفات

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 7 & 5 & 6 & -3 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & \sqrt{2} & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

5 — اوجد مصفوفة الدالة ثنائية الخطية  $f: \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$  المعرفة بالصيغة  
 $f((z_1, z_2), (w_1, w_2)) = iz_1w_2 - (1+i)z_2w_1$   
 وذلك بالنسبة للقاعدة  
 $S = \{A_1 = (i, 0), A_2 = (0, -1)\}$

6 — اوجد مصفوفة كل دالة ثنائية الخطية على  $R^2$  ظهرت في تمرين (1) وذلك بالنسبة للقاعدة الطبيعية .

7 — اوجد مصفوفة كل دالة ثنائية الخطية على  $C^3$  ظهرت في تمرين (2) وذلك بالنسبة للقاعدة الطبيعية .

8 — اوجد مصفوفة الدالة ثنائية الخطية  $f: P_1(R) \times P_1(R) \rightarrow R$  المعرفة بالصيغة  $f(a_1 + b_1x, a_2 + b_2x) = 2a_1b_2 - a_2b_1$  وذلك بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1 = -1 + x, A_2 = 3x\}$ .

9 — اذا كان  $A = (x_1, y_1, z_1)$  ،  $B = (x_2, y_2, z_2)$  اي متجهين في  $R^3$  فأى من الدوال ثنائية الخطية  $f: R^3 \times R^3 \rightarrow R$  تكون متناظرة .

$$f(A, B) = x_1x_2 - 2y_1y_2 + 3z_1z_2 \quad (\text{أ})$$

$$f(A, B) = 2x_1y_2 + 3y_1z_2 - z_1x_2 \quad (\text{ب})$$

$$f(A, B) = 2x_1x_2 - 3x_1z_2 + y_1z_2 + 4y_1x_2 - z_1y_2 \quad (\text{ج})$$

$$f(A, B) = x_1x_2 + 2y_1x_2 + 2x_1y_2 - z_1y_2 - y_1z_2 \quad (\text{د})$$

10 — اوجد مصفوفة عمودية  $P$  تحقق  $PAP^T$  تكون مصفوفة قطرية .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$$

11 — كرر تمرين (10) بالنسبة للمصفوفات

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{7}{25} & 0 & \frac{-24}{25} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{-24}{25} & 0 & \frac{7}{25} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

12 — اوجد قاعدة الى  $R^2$  تجعل من مصفوفة الدالة الثنائية الخطية المتناظرة بالنسبة لها مصفوفة قطرية، حيث  $f: R^2 \times R^2 \rightarrow R$  تكون كما يلي:

$$f((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = 5x_1x_2 + 3\sqrt{3}x_1y_2 + 3\sqrt{3}y_1x_2 - y_1y_2 \quad (\text{أ})$$

$$f((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = 3x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3y_1y_2 \quad (\text{ب})$$

13 — كرر المطلوب في تمرين (11) بالنسبة الى  $R^3$  والدوال التالية:

$$f(A, B) = 2x_1x_2 - x_1y_2 - x_1z_2 - y_1x_2 + 2y_1y_2 - y_1z_2 - z_1x_2 - z_1y_2 + 2z_1z_2 \quad (\text{أ})$$

$$f(A, B) = -2x_1x_2 - 36x_1z_2 - 3y_1y_2 - 36z_1x_2 - 23z_1z_2 \quad (\text{ب})$$

حيث ان  $A = (x_1, y_1, z_1)$  ،  $B = (x_2, y_2, z_2)$

## (6.2) الدوال التربيعية والصيغ التربيعية .

### Quadratic Functions & Quadratic Forms

لأي حقل  $F$ ، التخصيص  $k \leftarrow k^2$  يعرف دالة تربيعية متجانسة

$q: F \rightarrow F$ . لهذه الدالة خاصيتين مميزتين: الأولى  $q(-k) = q(k)$ ، والثانية

$$q(k + t) - q(k) - q(t) = (k + t)^2 - k^2 - t^2 = 2kt$$

والصيغة  $2kt$  تعتبر دالة ثنائية الخطية على  $F$ . لأي فضاء متجهات منتهي البعد  $V$  على الحقل  $F$ ، الدالة

$$q: V \rightarrow F$$

المعرفة بالصيغة :

$$q(A) = \sum_{j=1}^n x_j^2$$

حيث ان  $X = (x_1, \dots, x_n)$  هو متجه احداثيات  $A$  بالنسبة لقاعدة ثابتة الى  $V$  ، تكون دالة تربيعية متجانسة تحقق الخاصيتين اعلاه . هاتان الخاصيتان سوف تستخدمان لتعريف الدوال التربيعية بصورة عامة . بعد التعريف سنقدم تطبيقاً مهماً في موضوع التفاضل والتكامل . سنركز دراستنا على الدوال التربيعية على فضاءات على حقل الاعداد الحقيقية .

تعريف :

اذا كان  $V$  فضاء متجهات على حقل الاعداد الحقيقية ، فبدالة تربيعية متجانسة على  $V$  نقصد دالة :

$$Q: V \rightarrow R$$

تحقق :

$$Q(A) = Q(-A) \quad \text{① لكل } A \in V$$

$$f: V \times V \rightarrow R \quad \text{② الدالة}$$

المعرفة بالصيغة :

$$f(A, B) = (1/2)(Q(A + B) - Q(A) - Q(B))$$

تكون دالة ثنائية الخطية على  $V$  .

مثال (1) :

$$Q(x, y) = x^2 + 2y^2$$

الدالة  $Q: R^2 \rightarrow R$  المعرفة بالصيغة

تكون دالة تربيعية متجانسة وذلك لأن :

$$Q(x, y) = Q(-x, -y) \quad (1)$$

$$h((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = (1/2) (Q((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) - Q(x_1, y_1) - Q(x_2, y_2))$$

. . . . . (2)

$$= (1/2) (Q(x_1 + x_2, y_1 + y_2) - Q(x_1, y_1) - Q(x_2, y_2))$$

$$= (1/2) ((x_1 + x_2)^2 + 2(y_1 + y_2)^2 - (x_1^2 + 2y_1^2) - (x_2^2 + 2y_2^2))$$

$$= (1/2) (2x_1x_2 + 4y_1y_2) = x_1x_2 + 2y_1y_2$$

هذه الدالة عبارة عن دالة ثنائية الخطية على  $R^2$ .

مثال (2):

الدالة  $Q: M_2(R) \rightarrow R$  المعرفة بالصيغة

$$Q \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = x_1^2$$

تكون دالة تربيعية متجانسة والتحقق مماثل للمثال (1) اعلاه.

مثال (3):

الدالة  $Q: R^3 \rightarrow R$  المعرفة بالصيغة

$$Q(x, y, z) = x^2 - xy + yz$$

تكون دالة تربيعية متجانسة على  $R^3$  وذلك لان:

$$Q(-x, -y, -z) = (-x)^2 - (-x)(-y) + (-y)(-z) \quad \dots \quad (1)$$

$$= x^2 - xy + yz$$

$$= Q(x, y, z)$$



(2)

$$(1/2)[Q((x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) - Q(x_1, y_1, z_1) - Q(x_2, y_2, z_2)]$$

...

$$= (1/2) (x_1 + x_2)^2 - (x_1 + x_2)(y_1 + y_2) + (y_1 + y_2)(z_1 + z_2)$$

$$- [(x_1^2 - x_1y_1 + y_1z_1) - (x_2^2 - x_2y_2 + y_2z_2)]$$

$$= x_1x_2 - (1/2)x_1y_2 - (1/2)x_2y_1 + (1/2)y_1z_2 + (1/2)y_2z_1$$

وهذه دالة ثنائية الخطية على  $R^3$ .

سوف نبرهن بعض الخصائص التي تتمتع بها الدوال التربيعية المتجانسة.

مبرهنة (6.2.1):

كل دالة تربيعية متجانسة  $Q: V \rightarrow R$  على فضاء متجهات منتهي البعد

$V$  على حقل الأعداد الحقيقية، تحقق:

$$Q(0) = 0 \quad (1)$$

$$A \in V \quad Q(2A) = 4Q(A) \quad (2)$$

البرهان:

لأي ثلاثة متجهات  $A, B, C$  في  $V$  نلاحظ مايلي

$$Q(A + B + C) - Q(A) - Q(B + C) = 2f(A, B + C)$$

حيث ان  $f: V \times V \rightarrow R$  تلك الدالة ثنائية الخطية التي تحقق:

$$Q(A + B) - Q(A) - Q(B) = 2f(A, B)$$

اذن:

$$Q(A + B + C) - Q(A) - Q(B + C) = 2(f(A, B) + f(A, C))$$

$$= 2f(A, B) + 2f(A, C)$$

$$= Q(A + B) - Q(A) - Q(B) + Q(A + C) - Q(A) - Q(C)$$

يمكن كتابة المعادلة اعلاه بالصيغة :

$$Q(A + B + C) - Q(A + B) - Q(A + C) - Q(B + C) + Q(A) + Q(B) + Q(C) = 0$$

اذا وضعنا  $A = B = C = 0$  في المعادلة اعلاه، نحصل على

$$Q(0) = 0$$

اما اذا عوضنا :  $B = A, C = -A$  فنحصل على

$$Q(A) - Q(2A) + Q(A) + Q(A) + Q(-A) = 0$$

بما ان  $Q(A) = Q(-A)$  اذن

$$Q(2A) = 4Q(A)$$

( و . ه . م )

لأي دالة تربيعية متجانسة  $Q: V \rightarrow R$ ، الدالة ثنائية الخطية

$$h: V \times V \rightarrow R$$

المعرفة بالصيغة :

$$h(A, B) = (1/2)[Q(A + B) - Q(A) - Q(B)]$$

تكون دالة ثنائية الخطية متناظرة وتسمى الدالة ثنائية الخطية الناتجة من

استقطاب (Polarizing) الدالة التربيعية المتجانسة  $Q$ .

سوف نبرهن على ان كل دالة ثنائية الخطية ومتناظرة يمكن الحصول عليها  
بأستقطاب دالة تربيعية متجانسة وحيدة .

• رهنة (6.2.2) :

ليكن  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى حقل الاعداد الحقيقية . كل  
دالة ثنائية الخطية متناظرة  $R: V \times V \rightarrow R$  تعرف دالة تربيعية متجانسة  
 $Q: V \rightarrow R$  بالصيغة :

$$Q(A) = f(A, A), A \in V$$

هذه الدالة التربيعية المتجانسة هي الوحيدة التي تحقق :

$$f(A, B) = 1/2 [Q(A + B) - Q(A) - Q(B)]$$

البرهان :

نبرهن اولاً على ان الدالة  $R: V \leftarrow R$  المعرفة بالصيغة اعلاه تكون دالة  
تربيعية متجانسة . لهذا الغرض نلاحظ اولاً :

$$Q(-A) = f(-A, -A) = (-1)^2 f(A, A) = Q(A)$$

بما ان  $f$  ثنائية الخطية ومتناظرة فنحصل على :

$$(1/2)[Q(A + B) - Q(A) - Q(B)] = (1/2)[f(A + B, A + B) - f(A, A) - f(B, B)]$$

$$= (1/2)[f(A, B) + f(B, A)]$$

$$= f(A, B)$$

بذلك تكون الدالة  $Q$  المعرفة اعلاه تربيعية متجانسة وذلك بضوء التعريف .  
على العكس ، لو فرضنا ان  $R: V \rightarrow R$  دالة تربيعية متجانسة تحقق :

$$f(A, B) = (1/2)(Q(A + B) - Q(A) - Q(B))$$

فإن :

$$\begin{aligned} 2f(A, A) &= Q(2A) - Q(A) - Q(A) \\ &= Q(2A) - 2Q(A) \\ &= 4Q(A) - 2Q(A) \\ &= 2Q(A) \end{aligned}$$

وإذن :

$$Q(A) = f(A, A) = Q(A)$$

وذلك لكل  $A \in V$  أي ان  $Q = Q$

( و . ه . م )

مثال (4) :

جد الدالة ثنائية الخطية المتناظرة  $f: R^3 \times R^3 \rightarrow R$  التي تنتج من استقطاب الدالة التربيعية المتجانسة  $Q: R^3 \rightarrow R$  والمعرفة بالصيغة :

$$Q(x, y, z) = xy + 2yz$$

الحل : ليكن  $A = (x_1, y_1, z_1)$  و  $B = (x_2, y_2, z_2)$  الدالة ثنائية الخطية المتناظرة  $f: R^3 \times R^3 \rightarrow R$  التي تنتج من استقطاب  $Q$  يجب ان تحقق :

$$f(A, B) = (1/2)(Q(A + B) - Q(A) - Q(B))$$

$$\begin{aligned} &= (1/2)(Q(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) - Q(x_1, y_1, z_1) - \\ & \quad Q(x_2, y_2, z_2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (1/2)((x_1 + x_2)(y_1 + y_2) + 2(y_1 + y_2)(z_1 + z_2) - \\ & \quad x_1y_1 - 2y_1z_1 - x_2y_2 - 2y_2z_2) \end{aligned}$$

$$=(1/2)(x_1y_2 + x_2y_1 + 2y_1z_2 + 2y_2z_1)$$

مثال (5) :

جد الدالة التربيعية المتجانسة  $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  المرتبطة بالدالة ثنائية الخطية المتناظرة  $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  والمعروفة بالصيغة :

$$f((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = x_1x_2 - y_1z_2$$

الحل :  $Q(A) = f(A, A)$

$$\begin{aligned} Q(x, y, z) &= f((x, y, z), (x, y, z)) \\ &= (x)(x) - (y)(z) \\ &= x^2 - yz \end{aligned}$$

لقد رأينا في البند السابق ان الدالة ثنائية الخطية المتناظرة تتعين بصورة كاملة بمصفوفة متناظرة وقاعدة للفضاء المعرفة عليه . كذلك رأينا في هذا البند ان الدالة التربيعية المتجانسة على فضاء تتعين بصورة كاملة بدالة ثنائية الخطية ومتناظرة على ذلك الفضاء وبالعكس ( مبرهنة 6.2.2 ) . وعليه فإن اي مصفوفة متناظرة وقاعدة للفضاء  $V$  تعينان دالة تربيعية متجانسة على  $V$  وبالعكس فإن اي دالة تربيعية متجانسة وقاعدة الى  $V$  تعين مصفوفة متناظرة وكما موضح في المثال التالي :

مثال (6) :

جد المصفوفة المتناظرة التي تمثل الدالة التربيعية المتجانسة  $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  المعرفة بالصيغة :  $Q(x, y) = x^2 - xy + 3y^2$  ، وذلك بالنسبة للقاعدة الطبيعية .

الحل : الدالة التربيعية اعلاه تعرف دالة ثنائية الخطية متناظرة  $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  بالصيغة :

$$f(A, B) = (1/2)(Q(A + B) - Q(A) - Q(B))$$

لتكن:  $A = (1, 0)$ ،  $B = (0, 1)$  عناصر القاعدة الطبيعية عليه يكون لدينا:

$$f(A, A) = Q(A) = (1)^2 - (1)(0) + 3(0)^2 = 1$$

$$f(A, B) = (1/2)(Q(1, 1) - Q(1, 0) - Q(0, 1))$$

$$= (1/2)(3 - 1 - 3) = -1/2$$

$$f(B, A) = f(A, B) = -1/2$$

$$f(B, B) = Q(B) = 3$$

اذن تكون مصفوفة  $f$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية كما يلي .

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/2 & 3 \end{pmatrix}$$

هذه هي مصفوفة الدالة التربيعية اعلاه ولغرض التحقق من ذلك لاحظ ان متجه احداثيات  $A = (x, y)$  بالنسبة للقاعدة الطبيعية هو  $(x, y)$  نفسه، عليه يكون .

$$Q(A) = f(A, A) = (x, y) M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$Q(x, y) = (x, y) \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

اي ان

$$= (x - (1/2)y, (-1/2)x + 3y) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$= x^2 - xy + 3y^2$$

ان طريقة حل المثال اعلاه، طريقة بدائية وطويلة، حيث وجدنا مصفوفة الدالة التربيعية المتجانسة من خلال الدالة ثنائية الخطية التي تنتج من استقطابها. لندرس الحالة بصورة اكثر تفصيلاً.

لنفرض اننا اعطينا دالة تربيعية متجانسة  $Q: V \rightarrow R$  ولنفرض ان  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$  قاعدة ثابتة الى  $V$ . لتكن  $M$  المصفوفة المتناظرة التي تنتج من الدالة ثنائية الخطية  $f: V \times V \rightarrow R$  التي نحصل عليها من استقطاب  $Q$ ، اي ان:

$$f(A, B) = (1/2)[Q(A + B) - Q(A) - Q(B)]$$

وبذلك يكون:  $Q(A) = f(A, A)$  لأي متجه  $A \in V$ . اذا كان  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  متجه احداثيات  $A \in V$  بالنسبة للقاعدة  $S = \{A_1, \dots, A_n\}$ ، فإن

$$Q(A) = f(A, A) = XM X^T$$

حيث كما ذكرنا، ان  $M = (a_{ij})$  مصفوفة  $f$  بالنسبة للقاعدة  $S$ .

الان:

$$Q(A) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$Q(A) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j$$

تعريف: يُسمى التعبير:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} x_j = a_{11}x_1^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j$$

صيغة تربيعية متجانسة بالمتغيرات  $x_1, \dots, x_n$ .

إذا وجد ما يشير إلى ثبوت قاعدة الفضاء  $V$ ، فإنه بالإمكان كتابة:

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

ونسمى هذا صيغة تربيعية بالمتغيرات  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .

مثال (7):

جد المصفوفات المتناظرة لكل من الصيغ التربيعية التالية:

$$Q(x, y) = x^2 - xy + 3y^2 \dots (i)$$

$$Q(x, y, z) = -x^2 + 4xy + 2y^2 + 6xz - 5yz \dots (ii)$$

الحل: كما لاحظنا أعلاه، فإنه في المصفوفة  $M = (a_{ij})$  التي تمثل  $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$  يكون العنصر القطري  $a_{ii}$  مساوياً لمعامل  $x_i^2$  كما يكون كل من العنصرين  $a_{ij}$ ،  $a_{ji}$  مساوياً لنصف معامل  $x_i x_j$  وهكذا فإن:



(i) مصفوفة  $Q(x,y) = x^2 - xy + 3y^2$  تكون

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/3 & 3 \end{bmatrix}$$

(ii) مصفوفة  $Q(x,y,z) = -x^2 + 4xy + 2y^2 + 6xz - 5yz$  تكون

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & -5/2 \\ 3 & -5/2 & 0 \end{bmatrix}$$

المسألة الأساسية في بندنا هذا تتمثل في امكانية كتابة الصيغة التربيعية بمتغيرات جدد بحيث تتحول الى صيغة بسيطة. المبرهنة (6.1.3) تنص على وجود قاعدة للفضاء  $V$  تجعل من مصفوفة اي دالة ثنائية الخطية متناظرة  $f: V \times V \rightarrow R$  بالنسبة لها قطرية.

تعريف:

الصيغة التربيعية:  $a_{11}x_1^2 + \dots + a_{nn}x_n^2$  تسمى صيغة قطرية.

التعريف اعلاه ورد لكون مصفوفة الصيغة اعلاه قطرية.

مبرهنة (6.2.3):

اذا كانت  $Q: V \rightarrow R$  دالة تربيعية متجانسة على فضاء المتجهات  $V$  المنتهي البعد وعلى حقل الاعداد الحقيقية، فإنه توجد قاعدة الى  $V$  تجعل من مصفوفة  $Q$  بالنسبة لها قطرية.

المبرهنة اعلاه نتيجة مباشرة للمبرهنة (6.1.3) ولعلاقة الدوال التربيعية المتجانسة بالدوال ثنائية الخطية المتناظرة .

ان النتيجة بالنسبة للصيغ التربيعية وتحويلها الى صيغ قطرية بمتغيرات جدد تكمن في المبرهنة التالية، التي هي صورة اخرى من صور المبرهنة (6.2.3) اعلاه .

**مبرهنة (6.2.4) :**

كل صيغة تربيعية  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$  بالمتغيرات  $x_1, x_2, \dots, x_n$  قابلة للتحويل الى صيغة قطرية  $\sum_{i=1}^n b_{ii} y_i^2$  بمتغيرات جدد  $y_1, \dots, y_n$  وذلك على حقل الاعداد الحقيقية .  
المبرهنة اعلاه، هي ايضاً نتيجة مباشرة لكل ما ذكرناه سابقاً .

**مثال (8) :**

جد قاعدة للفضاء  $R^2$  تجعل من مصفوفة الدالة التربيعية

$$Q: R^2 \rightarrow R$$

المعرفة بالصيغة :

$$Q(x, y) = x^2 + 4xy + y^2$$

مصفوفة قطرية .

**الحل :**

ان مصفوفة الدالة التربيعية اعلاه بالنسبة للقاعدة الطبيعية، تكون

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

راجع المثال (7)، لكيفية استخراج هذه المصفوفة. نحاول الآن إيجاد مصفوفة P تحقق:  $PMP^T$  تكون قطرية. والحل يكمن بإيجاد القيم والمتجهات الذاتية للمصفوفة M وهذا موجود في المثال (9) من البند السابق، حيث تكون:

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

والمصفوفة القطرية:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

والقاعدة المطلوبة، هي تلك القاعدة الناتجة من تأثير المصفوفة P على القاعدة  $S = \{A_1 = (1,0), A_2 = (0,1)\}$  الطبيعية. أي أن

$$B_1 = 1/\sqrt{2}A_1 + 1/\sqrt{2}A_2 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$$

$$B_2 = -1/\sqrt{2}A_1 + 1/\sqrt{2}A_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$$

مثال (9):

اكتب الصيغة التربيعية

$$Q(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2$$

بمتغيرات جدد  $y_1, y_2$  بحيث تكون قطرية.

الحل:

السؤال اعلاه مشابه الى حد ما السؤال في المثال السابق. لقد رأينا في

المثال السابق ان مصفوفة Q بالنسبة للقاعدة الطبيعية  $S = \{A_1, A_2\}$  تكون :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

المصفوفة :  $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$  ، تحقق

$$PMP^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ان مصفوفة Q اعلاه بالنسبة للقاعدة

$$\{ B_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}), B_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) \}$$

نمذا يعني انه لو وضعنا

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

تكون قطرية وتساوي

$$(y_1, y_2) = (x_1, x_2) P^{-1}$$

لاصبح  $(y_1, y_2)$  متجه احدائيات  $(x_1, x_2)$  بالنسبة للقاعدة الجديدة  $\{B_1, B_2\}$

بما ان P مصفوفة عمودية ، اذن  $P^{-1} = P^T$

$$(y_1, y_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$= ( (1/\sqrt{2})(x_1 + x_2), (1/\sqrt{2})(-x_1 + x_2) )$$

$$y_1 = (1/\sqrt{2})(x_1 + x_2)$$

$$y_2 = (1/\sqrt{2})(-x_1 + x_2)$$

هذا يعني ان

هي المتغيرات الجدد التي تحقق:

$$\begin{aligned}
 Q(x_1, x_2) &= x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2 \\
 &= (x_1, x_2) M (x_1, x_2)^T \\
 &= (y_1, y_2) P M (y_1, y_2) P^T \\
 &= (y_1, y_2) P M P^T (y_1, y_2)^T \\
 &= (y_1, y_2) \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} (y_1, y_2)^T \\
 &= 3y_1^2 - y_2^2
 \end{aligned}$$

المثال اعلاه يوضح مسألة تدوير المحاور فلو طلب منا على سبيل المثال رسم المنحني الذي معادلته:  $x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2 = 1$  لعرفنا انها معادلة من الدرجة الثانية ويجب ان تمثل احد القطوع المخروطية. في التفاضل والتكامل كانت هذه المسألة تأخذ جانباً مهماً وكان الطالب يفهم بأن التعويض:

$$x_1 = (1/\sqrt{2})(y_1 - y_2)$$


$$x_2 = (1/\sqrt{2})(y_1 + y_2)$$

يؤدي الى حذف الحد  $x_1x_2$  الذي هو سبب الاشكال والغموض في معرفة مايمثله المعادلة من قطع مخروطي.

التعويض اعلاه يؤدي الى تدوير المحاور والحصول على معادلة

$$3y_1^2 - y_2^2 = 1$$

والتي تمثل قطع زائد (Hyperbola) . . نظر الشكل ادناه .



ان رؤس هذا القطع الزائد تكون عبارة عن

$$(y_1, y_2) = (\pm 1/\sqrt{3}, 0)$$

اما الاحداثيات  $(x_1, x_2)$  لهذه الرؤوس فإنها ستكون :

$$(x_1, x_2) = \pm (1/\sqrt{3})(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$$

مثال (10) :

صف القطع المخروطي C الذي معادلته هي

$$5x^2 - 4xy + 8y^2 - 36 = 0$$

الحل : ان الصيغة المصفوفية للمعادلة اعلاه هي

$$XAX^T - 36 = 0$$

حيث :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}, \quad X = (x, y)$$

لغرض تبسيط المعادلة اعلاه، نحول الصيغة التربيعية  $XAX^T$  الى صيغة قطرية وذلك بإيجاد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للمصفوفة  $A$ .

المعادلة المميزة للمصفوفة  $A$  هي

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -2 \\ -2 & 8 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda - 4) = 0$$

واذن القيمتان الذاتيتان للمصفوفة  $A$  هما  $\lambda = 4$ ،  $\lambda = 9$ . المتجهات الذاتية التابعة للقيمة  $\lambda = 4$  هي الحلول غير الصفرية للنظام.

$$(x, y) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = 0, 0$$

الذي يؤدي الى المعادلة:  $x = 2y$

وبذلك يكون المتجه:  $(2, 1)$  قاعدة للفضاء الذاتي التابع للقيمة  $\lambda = 4$ . نأخذ المتجه:

$$A_1 = (2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$$

احادي الطول.

وبالمثل يكون  $A_2 = (-1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$  متجهاً ذاتياً

احادي الطول تابعاً للقيمة الذاتية  $\lambda = 9$ .

$$P = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

ضع:

$$PAP^T = D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

عندئذ يكون:

$$X = (x, y) = (\hat{x}, \hat{y}) P = \hat{X}P$$

والتعويض:

$$(\hat{X}P) A (\hat{X}P)^T - 36 = 0$$

يؤدي الى:

$$\hat{X} (PAP^T) \hat{X}^T - 36 = 0$$

$$(x, y) \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 36 = 0$$


$$4\hat{x}^2 + 9\hat{y}^2 - 36 = 0$$

هذه المعادلة يمكن كتابتها بالصيغة

$$\hat{x}^2/9 + \hat{y}^2/4 = 1$$



وهذه معادلة قطع ناقص رسمه في الشكل ادناه .



مثال (11) :

صف السطح الذي معادلته

$$4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 4xy + 4xz + 4yz - 3 = 0$$

الحل : ان الصيغة المصفوية للمعادلة اعلاه هي  $XAX^T - 3 = 0$  حيث ان :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} , \quad X = (x, y, z)$$

كما تبين في مثال (9) من البند (6.1)، القيم الذاتية للمصفوفة A هي  $\lambda = 8, \lambda = 2$  وتكون A قابلة للإقطار بواسطة المصفوفة العمودية

$$P = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

حيث ان متجهي الصفين الاولين في P هما متجهان ذاتيان تابعان للقيمة الذاتية  $\lambda = 2$  و متجه الصف الثالث هو متجه ذاتي تابع للقيمة الذاتية  $\lambda = 8$ .

ان تحويل الاحداثيات:

$$X = (x, y, z) = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})P = \bar{X}P$$

يحول المعادلة  $XAX^T - 3 = 0$ ، عند التعويض الى المعادلة:

$$(\bar{X}P)A(\bar{X}P)^T - 3 = 0$$

$$\bar{X}(PAP^T)\bar{X}^T - 3 = 0$$

لكن:

$$PAP^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

اذن المعادلة اعلاه تصبح

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - 3 = 0$$

$$2x^2 + 2y^2 + 8z^2 = 3 \quad \text{اي}$$

وهذه يمكن كتابتها على الصورة

$$x^2/(3/2) + y^2/(3/2) + z^2/(3/8) = 1$$

وهي معادلة سطح ناقص (Ellipsoide).

مثال (12):

إرسم المنحني الذي تمثله المعادلة

$$16x^2 - 24xy + 9y^2 - 30x - 40y = 0$$

الحل: ان المشكلة الاساسية في معرفة مايمثله المعادلة اعلاه من قطع مخروطي تكمن في الحد  $xy$ . لذلك بإمكاننا اولاً النظر الى الصيغة التربيعية المتجانسة والموجودة في المعادلة اعلاه. هذه الصيغة هي:

$$16x^2 - 24xy + 9y^2$$

مصفوفة الصيغة اعلاه هي المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 16 & -12 \\ -12 & 9 \end{bmatrix}$$

سوف نحول الصيغة اعلاه الى صيغة قطرية .  
 أولاً: نحسب القيم الذاتية

$$\begin{aligned} \det(A - tI) &= \begin{vmatrix} 16-t & -12 \\ -12 & 9-t \end{vmatrix} \\ &= (16-t)(9-t) - 144 \\ &= t^2 - 25t + 144 - 144 \\ &= t^2 - 25t = t(t-25) \end{aligned}$$

القيم الذاتية للمصفوفة **A** تكون :  $\lambda_1 = 0$  ،  $\lambda_2 = 25$  المتجهات الذاتية التابعة للقيمة الذاتية  $\lambda_1 = 0$  هي الحلول غير الصفريّة للنظام

$$(x, y) \begin{pmatrix} 16 & -12 \\ -12 & 9 \end{pmatrix} = (0, 0)$$

الذي يؤدي الى المعادلتين الخطيتين :

$$16x - 12y = 0$$

$$-12x + 9y = 0$$

هاتان المعادلتان عبارة عن معادلة واحدة  $4x - 3y = 0$  والحل سيكون  $y = (4/3)x$ .  
 نأخذ  $x = 3$  ونحصل على المتجه  $(3, 4)$  ومنه نحصل على المتجه  $A = (3/5, 4/5)$   
 كمتجه ذاتي احادي الطول تابع للقيمة الذاتية  $\lambda_1 = 0$ .

بالمثل نحصل على المتجه  $B = (-4/5, 3/5)$  كمتجه ذاتي احادي

الطول تابع للقيمة الذاتية  $\lambda_2 = 25$ .

الآن ضع  $P = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$  ولاحظ ان  $P$  مصفوفة عمودية تحقق

$$P A P^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix}$$

لو وضعنا أي  $(x, y) = (x', y')$  P

$$(x, y) = (x', y') \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

لحصلنا على :

$$x = \frac{1}{5} (3x' - 4y')$$

$$y = \frac{1}{5} (4x' + 3y')$$

فبعد التحويل عن  $x, y$  بالتغيرات الجدد  $x', y'$  بالصيغة التربيعية

$$16x^2 - 24xy + 9y^2$$

$$25 y'^2$$

نصل على الصيغة القطرية :

نرجع الان الى المعادلة الاصلية

$$16x^2 - 24xy + 9y^2 - 30x - 40y = 0$$

ونعوض بالتغيرين الجدد  $x', y'$  فنصل على المعادلة


$$25y'^2 - 30 \cdot \frac{1}{5} (3x' - 4y') - 40 \cdot \frac{1}{5} (4x' + 3y') = 0$$

$$25y'^2 - 18x' + 24y' - 32x' - 24y' = 0$$

$$25y'^2 - 50x' = 0$$

$$y'^2 = 2x'$$

الان يمكن تمييز المعادلة اعلاه كمعادلة قطع مكافئ (Parabola) ورسم المنحني في الشكل ادناه



ملاحظة : بضبط اشارات المتجهات الذاتية احسن على ان يكون

$|F| = +1$  لكي يكون التحويل الخطي العمودي الناشئ من تدوير للمطاور

تارين (6.2)

( ١ ) اى ان الدوال الاتية يكون دالة تربيعية متجانسة :

$$Q(x, y) = x^2 - 2xy + 6y^2, \quad Q: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \quad (أ)$$

$$Q(x, y, z) = x^2 + xz - 2yz + 3xy, \quad Q: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \quad (ب)$$

$$Q(a+bx+cx^2) = abc, \quad Q: P_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \quad (ج)$$

$$Q\left(\begin{matrix} x & y \\ z & w \end{matrix}\right) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2 + 2, \quad Q: M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \quad (د)$$

2 — اوجد الدوال ثنائية الخطية الناتجة من استقطاب كل من الدوال التربيعية المتجانسة التالية .

$$Q(x, y) = 3x^2 - xy, \quad Q: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \quad (أ)$$

$$Q(z_1, z_2) = z_1^2 - 2z_2^2, \quad Q: \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \quad (ب)$$

حيث ان  $\mathbb{C}^2$  فضاء متجهات على حقل الاعداد الحقيقية .

$$Q(x, y, z) = xy - xz + 3yz - \sqrt{2}y^2, \quad Q: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \quad (ج)$$

$$Q(x, y, z, w) = xz + 3yw + x^2 - w^2, \quad Q: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R} \quad (د)$$

3 — اذا كانت  $Q: V \longrightarrow \mathbb{R}$  دالة تربيعية متجانسة فبرهن على

ان  $Q(rA) = r^2Q(A)$  وذلك لكل متجه  $A \in V$  ولكل عدد حقيقي  $r$  .

4 — اذا كان  $V$  فضاء متجهات منتهي البعد وعلى حقل الاعداد الحقيقية واذا

كانت  $Q: V \longrightarrow \mathbb{R}$  دالة تربيعية متجانسة على  $V$  فبرهن على ان الدالة

ثنائية الخطية  $h: V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$  التي تنتج من استقطاب  $Q$  تعرف ضرباً

داخلياً على  $V$  .

5 — اي من الصيغ التالية يكون صيغة تربيعية بالمتغيرات  $x, y, z$ .

( أ )  $2x^2 - 2xy + xz + y$

( ب )  $x^2 - y^2 + z^2 + 3yz$

( ج )  $10 + x^2 - y^2 + 3xy - xz$

( د )  $xz - xy$

6 — اكتب كل من الصيغ التربيعية التالية بالصيغة المصفوفية.

( أ )  $2x^2 + 3xy - 4xz + yz - 2y^2 + 3z^2$

( ب )  $x^2 + xy - xz + 4yz - 3xw + y^2 + 9z^2 - w^2$

( ج )  $(1/2)x^2 + w^2 - z^2 + 3y^2 + 4xz - 3xw + yw + 6xy$

( ملاحظة : ترتيب المتغيرات  $x, y, z, w$  )

7 — اوجد الدوال التربيعية المتجانسة الناتجة من الدوال ثنائية الخطية في كل مما يلي :

( أ )  $h(A, B) = x_1x_2 - y_1y_2 + x_1y_2, h: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

( ب )  $h(C, D) = y_1z_2 - x_1y_2 + 3z_1x_2 - y_1x_2, h: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

حيث  $A = (x_1, y_1), B = (x_2, y_2), C = (x_1, y_1, z_1)$

$D = (x_2, y_2, z_2),$

8 — اكتب كل من الصيغ التربيعية التالية بمتغيرات جدد بحيث تكون قطرية .

( أ )  $3x^2 + 5xy + 7y^2$

( ب )  $21x^2 + 6xy + 13y^2$

( ج )  $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 4xy + 4xz + 4yz$

( د )  $7x^2 + 7y^2 + 10z^2 - 2xy - 4xz + 4yz$

9 — ارسم كل من القطوع المخروطية التالية .

( أ )  $8x^2 - 12xy + 17y^2 - 80 = 0$



$$. 3x^2 + 2xy + 3y^2 - 4 = 0 \text{ (ب)}$$

$$. 5x^2 - 8xy + 5y^2 - 9 = 0 \text{ (ج)}$$

$$. 11x^2 - 24xy + 4y^2 + 6x + 8y + 15 = 0 \text{ (د)}$$

$$. 16x^2 - 24xy + 9y^2 - 30x + 40y - 5 = 0 \text{ (هـ)}$$

المصادر باللغة الانكليزية

- (1) Birkhoff and MacLane: A Survey of Modern Algebra (MACMILLAN) 1965.
- (2) T. J. Fletcher: Linear Algebra through its applications (Van Nostrand Reinhold) 1972.
- (3) Greub Werner: Linear Algebra (Springer- Verlage) 1975.
- (4) B. HARTLEY and T. O. HAWKES: Rings, Modules and Linear Algebra (Chapman and Hall) 1970.
- (5) S. Lang: Linear Algebra (Addison - Wesley) 1973.
- (6) MacLane, Birkhoff: Algebra (MACMILLAN) 1971.
- (7) Mostow and Sampson: Linear Algebra (Mc Graw - Hill) 1969.
- (8) Paige L. J., J. D. Swift: Elements of Linear Algebra (Blaisdell Publishing Company) 1961.
- (9) Paige L. J., J. D. Swift, T. A. Slobko: Elements of Linear Algebra; Second Edition (XEROX College Publishing, Lexington) 1974.

- (10) Smith L. : Linear Algebra (Springer - Verlage) 1978.
- (11) STEWART F. M.: Introduction to Linear Algebra (Van-  
Nostrand, East West Press) 1963.

المصادر باللغة العربية

1 — هوارد انتون: الجبر الخطي المبسط ( الطبعة الثانية )

. WILEY ARABOOK (1982)

2 — سيمور لبيشتز: نظريات ومسائل في الجبر الخطي سلسلة ملخصات  
سشوم ( دار ماكجر وهيل للنشر ) (1976).

معجم المصطلحات

عربي - انكليزي

Union	اتحاد
Trace	أثر
Coordinates	احداثيات
Linear Dependence	ارتباط خطي
Polarizing	استقطاب
Linear Independence	إستقلال خطي
Dimension	بُعد
Trivial	تافه
Associative	تجميعي
Linear Transformation	تحويل خطي
Orthogonal Transformation	تحويل عمودي
Identity transformation	تحويل محايد
Composition of functions	تركيب الدوال
Isomorphism	تشاكل
Intersection	تقاطع
Algebraic Multiplicity	تكرار جبري
Geometric Multiplicity	تكرار هندسي
Bilinear	ثنائي الخطية
Direct Sum	جمع مباشر
Field	حقل
Real	حقيقي
Linear	خطي
Function	دالة

Identity function	دالة محايدة
Rank	رتبه
Group	زمرة
Abelian Group	زمرة تبادلية
Nullity	صفيرية
Image	صورة
Normal Form	صيغة اعتيادية
Quadratic Form	صيغة تربيعية
Inner Product	ضرب داخلي
Block multiplication	ضرب قالي
Scalar Product	ضرب قياسي
Dot product	ضرب نقطي
Complex	عقدي
Orthogonal	عمودي
Identity element	عنصر محايد
Non - Singular	غير معتل
Subspace	فضاء جزئي
Vector Space	فضاء متجهات
Diagonalizable	قابل للاقطار
Invertable	قابل للقلب
Basis	قاعدة
Natural Basis	قاعدة طبيعية
Orthogonal Basis	قاعدة متعامدة
Orthonormal Basis	قاعدة متعامدة احادية
Hyperbola	قطع زائد
Conic Section	قطع مخروطي
Parabola	قطع مكافئ

Ellipse	قطع ناقص
Eigen Value	قيمة ذاتية
Homogeneous	متجانس
Eigen Vector	متجه ذاتي
Polynomial	متعددة حدود
Orthogonal Complement	متمم عمودي
Symmetric	متناظر
Skew Symmetric	متناظر متخالف
Determinant	محدد
Component	مركبة
Transpose	مدورة
Continuous	مستمر
Plane	مستوي
Projection	مسطط
Similar	مشابه
Identity matrix	مصفوفة محايدة
Orthogonal matrix	مصفوفة عمودية
Diagonal matrix	مصفوفة قطرية
Singular	معتل
Inverse	مقلوب
Left inverse	نظير أيسر
Right inverse	نظير أيمن
Characteristic	مميزة
Kernel	نواة