

## — الفصل الأول —

### { مقدمة في النبات }

### { النباتات اللاوعائية }

#### { تنوع النباتات اللاوعائية ( خصائصها ) }

- كالتحالب تخزن الغذاء على صورة نشا و جدارها الخلوي يتكون من السليلوز .
- لا تحتوي على أنسجة وعائية و هي صغيرة الحجم .تنتقل المواد خلالها بسهولة بواسطة الخاصية الأسموزية و الانتشار و تعيش في الأماكن الرطبة الظليلة ( حيث يساعدها الماء في التكاثر و انتقال المواد خلالها ) .
- لا تمتلك جذور حقيقية لامتصاص الماء أو أوراق حقيقية للقيام بالبناء الضوئي فقط ( اشباه جذور و اشباه أوراق ) .
- دورة حياتها بها ظاهرة تعاقب ( تبادل ) الأجيال و الطور المشيجي سائد على الطور البوغي .
- تنقسم الى ثلاث اقسام هي ( الحزازيات - الحشائش البوقية - الحشائش الكبدية )

#### أولاً : قسم الحزازيات : مثل الحزازيات القائمة أنظر شكل 1-1 ( B ) صفحة 12

- لبعضها سيقان تنمو عمودية و للبعض الآخر سيقان متدلية .
- تشكل بعضها سجادا يغطي التربة و يمنع تعريتها خاصة في المنحدرات .
- يساعد على الاحتفاظ برطوبة التربة لذلك يزرع في الحدائق المنزلية .
- يساهم بعضها في تكوين فحم الخث ( فحم البيت ) الذي يستعمل كوقود و هو عبارة عن تراكمات من حزاز ( سفاجنوم ) و مواد نباتية ترسبت و تعفنت .

#### ثانياً : قسم الحشائش البوقية : أنظر شكل 1-3 صفحة 15

- اصغر النباتات اللاوعائية وسميت بذلك لأنها تشبه البوق ( القرن ) .
- تمتاز بان خلايا الطور البوغي و الطور المشيجي تحتوي على بلاستيده واحدة كبيرة .
- تحتوي انسجتها على فراغات مملوءة بالمخاط الذي تنمو فيه البكتريا الخضراء المزرقه مثل نوستك ( Nostoc ) مشكله علاقة تعايش .

#### ثالثاً : الحشائش الكبدية : أنظر شكل 1-4 صفحة 15

- سميت ثالوس الحشائش الكبدية لمظهرها الخارجي و لأنها كانت تستعمل قديما في علاج امراض الكبد .
- تنمو موازية لسطح التربة .
- لها اشباه جذور وحيده الخلية عكس الحزازيات القائمة متعددة الخلايا .
- يعد تركيبها من ابسط نباتات اليابسة فهي تفتقر الى تسلسل الـ DNA .
- تصنف الى نوعين : هما
- 1- ثالوسية جسمية .
- الثالوس : هو تركيب مجزأ و لين في الحشائش الكبدية .
- 2- ورقية : لها سيقان تحمل اشباه اوراق .

### { النباتات الوعائية اللابذرية }

#### { تنوع النباتات الوعائية اللابذرية ( خصائصها ) }

- تحتوي على أنسجة وعائية ( خشب و لحاء ) .
- الطور البوغي سائد على الطور المشيجي .

- يحمل الطور البوغي في بعضها حاملاً بوغياً (ينتج ابواغاً تنتشر مع الهواء و إذا استقرت في بيئة مناسبة نمت لتعطي النبات المشيجي ) .
- اغلبها عشبية ( أقل من 30cm ) نادراً ما تكون شجيرية او شجرية .
- تصنف الى قسمين [ قسم النباتات الصولجانية - قسم السرخسيات ( النباتات الجنحة ) ]

**أولاً : قسم النباتات الصولجانية :** أنظر شكل 1-5 صفحة 17 - شكل 1-6 صفحة 18

- صغيرة غالباً طولها اقل من 30cm .
- شكلت الجزء الاكبر من الغطاء النباتي الذي بموتة و ترسبه تحول الى فحم حجري .
- سميت بذلك لأن التراكيب التي تنتج الابواغ صولجانية الشكل ( تشبه السنبله ) .
- وتسمى ايضا بالصنوبريات الارضية لأنها تشبه أشجار الصنوبر .
- سيقانها إما تنمو عمودية أو موازية لسطح التربة .
- معظمها نباتات هوائية ( تعيش متعلقة بنباتات اخرى ) .
- تصنف الى جنسين هما :
- 1- سيلانجينيل (selaginella): الأبواغ الكبيرة و الصغيرة محمولة على نفس الحامل البوغي.
- 2- ليكوبوديوم (lycopodium): الابواغ الكبيرة على حامل بوغي و الصغيره على حامل آخر ( منفصلة ) .

**ثانياً : قسم السرخسيات ( النباتات المجنحة ) :** أنظر شكل 1-7 صفحة 18

- كانت تصنف الى قسمين هما الخنشاريات (السرخسيات) و النباتات المجنحة مثل (ذيل الحصان) ثم جمعت في قسم واحد معا .
- بعضها يشبه الأشجار و تعيش في بيئات متباينة رطبة و جافة .
- ينمو الطور البوغي على النبات المشيجي و يعتمد عليه لفترة وجيزة .
- يمكن انتاج الطور البوغي بعملية الاخصاب و احيانا بدون اخصاب ( جعله يتكيف للعيش في بيئة جافة ) .
- ينمو النبات البوغي مكوناً جذوراً و ساقاً سميكة تحت الارض لتخزين الغذاء يسمى الريزوم (rhizome) و اوراق تسمى (السعفة) للقيام بالبناء الضوئي . أنظر شكل 1-8 صفحة 19
- توجد الأكياس البوغية (البثور) على السطح السفلي للأوراق و تتكون من تجمعات من المحافظ البوغية التي تنتج الابواغ .
- في الطور البوغي لذيل الحصان هنالك نوعين من السيقان ( السيقان الخضرية - السيقان التكاثرية التي على شكل مخاريط تنتج الابواغ ) أنظر شكل 1-9 صفحة 20
- في خنشار عش الطائر توجد الأكياس البوغية على شكل خطوط على السطح السفلي للورقة . أنظر شكل 1-9 صفحة 20

### { النباتات الوعائية البذرية }

**{ تنوع النباتات الوعائية البذرية ( خصائصها ) }** أنظر شكل 1-10 صفحة 21

- تحتوي على أنسجة وعائية ( خشب و لحاء ) و تنتج بذور ( عبارة عن طور بوغي صغير محاط بنسيج لحمايته ) .
- الطور البوغي سائد على الطور المشيجي .
- ينقسم النبات المشيجي انقسام منصف لتكوين النبات المشيجي المذكر ( حبوب اللقاح ) و المذكر ( البويضات ) .
- تحتوي البذور على فلقة أو أكثر لتخزين الغذاء .
- تنقسم حسب بذورها الى :
- 1- مُعراة البذور ( البذرة لا تشكل جزءاً من الثمرة ) حيث تتكاثر بالمخاريط

2- مغطاة البذور (البذرة تشكل جزءاً من الثمرة) حيث تتكاثر بالأزهار وتسمى النباتات الزهرية - تصنف الى خمسة اقسام هي : ( جميعها معراة بذور ما عدا النباتات الزهرية )

#### أولاً : قسم نباتات السيكادات :

- تتكاثر بالمخاريط .
- يوجد نوعين من المخاريط ( مذكرة و مؤنثة ) يُحمل كل منها على نبات منفصل .
- المخاريط المذكرة تنتج حبوب اللقاح و المخاريط المؤنثة تنتج البويضات
- اوراقها مقسمة تشبه شجرة النخيل و قد يصل طولها الى 18m .

#### ثانياً : قسم نباتات النيتوفايث :

- تستطيع العيش ما بين 1500-2000 سنة .
- تنقسم الى ثلاثة أجناس :
- 1- جنس افيدرا Ephedra: الذي يستخرج منه دواء الرشح و الحساسية ( افيدرين )
- 2- جنس جنتيوم Gnetum : له 30 نوعاً أغلبها اشجار استوائية و نباتات متسلقة .
- 3- جنس ولويتشيا Welwitschia : له نوع واحد فقط يعيش في صحاري جنوب غرب افريقيا و له ورقتان طويلتان تصل الى 6m . أنظر شكل 1-12 صفحة 23

#### ثالثاً : قسم النباتات الجنكية :

- يوجد نوعين من المخاريط ( مذكرة و مؤنثة ) يُحمل كل منها على نبات منفصل .
- المخاريط المؤنثة عند اخصابها تعطي رائحة نتنة ، اما المذكرة ليس لها رائحة نتنة .
- هذا القسم له نوع واحد فقط هو نبات جنكو بيلوبا Ginkgo biloba
- اوراقها صغيرة تشبه المروحة .

#### رابعاً : قسم النباتات المخروطية :

- يوجد نوعين من المخاريط ( مذكرة و مؤنثة ) تُحمل على النبات نفسه .
- تتباين في احجامها من شجيرات الى اشجار قد يصل طولها الى 50m .
- لها اوراق ابرية أو حشفية مغطاة بطبقة شمعية (من الكيوتين) لتقليل فقدان الماء .
- لها اهمية اقتصادية في انتاج الأخشاب و الورق و المواد الراتنجية مثل زيت التربينين .
- مثل ( الصنوبر - العرعر - السرو - التنوب - الخشب الأحمر )
- تصنف الى ( نباتات دائمة الخضرة - نباتات متساقطة الأوراق ) .

#### خامساً : قسم النباتات الزهرية :

- تسمى مغطاة البذور و تشكل 75% من المملكة النباتية .
- تعد أوسع النباتات انتشاراً بسبب قدرتها على التكيف في البيئات المائية و الجافة .
- تصنف الى :

- 1- ذوات الفلقة الواحدة : ( بذورها تحتوي على فلقة واحدة ) .
- 2- ذوات الفلقتين : ( بذورها تحتوي على فلقتين ) .

- دوره الحياة : تتراوح من عدة اسابيع الى عدة سنوات و تصنف من خلالها الى ثلاثة أصناف :

- 1- النبات السنوي :  
في فصل نمو واحد يكمل حياته من بذره الى نبات مكتمل النمو ينتج بذوراً ثم يموت .

- 2 - النبات ثنائي الحول : أنظر شكل 1-16 صفحة 27  
مثل الجزر و اللفت

يكون جذور لحماية خازنة تحت التربة في فصل النمو الأول و اذا لم يجمع النبات تموت الاوراق و السيقان وتبقى الجذور التي تنمو في السنة الثانية في فصل النمو الثاني مكونة اوراق وسيقان و ازهار و بذور ثم تموت بنهاية العام الثاني .

### 3- النباتات المعمرة :

- تستطيع العيش سنوات عديدة و كل عام تنتج ازهارا و بذورا جديدة .
- تستجيب للظروف القاسية بإسقاط أوراقها ثم تستأنف النمو بعد تحسن الظروف .
- مثل اشجار الفواكه و الشجيرات و السوسن و الورد والنباتات العنبية .

## — الفصل الثاني —

### { تركيب النبات و وظائف أجزائه }

### { خلايا النبات و أنسجته }

**\* خلايا النبات :** أنظر شكل 1-2 صفحة 38

- تمتاز الخلية النباتية عن الحيوانية بالآتي :
- 1- وجود جدار خلوي 2- فجوة مركزية كبيرة 3- نواة طرفية 4- وجود بلاستيدات خضراء .
- تنقسم الخلايا النباتية الى ثلاثة انواع :
- 1- الخلايا البرنشيمية 2- الخلايا الكولنشيمية 3- الخلايا الإسكلرنشيمية .

**أولاً : الخلايا البرنشيمية (خصائصها):** أنظر جدول 1-2 صفحة 39

- 1- جدرانها رقيقة . علل ( ليسهل تبادل الغازات )
- 2- لها عدة وظائف ( التخزين - البناء الضوئي - تبادل الغازات - الحماية )
- \*ملاحظة:** تختلف وظيفة الخلايا البرنشيمية حسب مكانها
- مثلا :
- أ- الخلايا البرنشيمية في الأوراق تكثر بها البلاستيدات فتكون وظيفتها البناء الضوئي
- ب- الخلايا البرنشيمية في الثمار و الجذور لها فجوات مركزية كبيرة لتخزين المواد مثل ( النشا و الماء و الزيوت ) .
- 3- كروية الشكل
- 4- لها القدرة على الانقسام للنمو وتعويض الأنسجة التالفة .

**ثانياً : الخلايا الكولنشيمية ( خصائصها ) :** أنظر جدول 1-2 صفحة 39

- 1- خلايا طولية الشكل توجد على هيئة حزم علل ( للدعامة )
- 2- لها جدران سميكة غير متساوية علل: (حتى يمكن أن تتمدد وتسمح للنبات بالانثناء دون أن ينكسر)
- 3- لها القدرة على الانقسام وتعويض الأنسجة التالفة .
- أمثله :** مثل الموجودة في أوراق الكراث و الكرفس .

**ثالثاً : الخلايا الإسكلرنشيمية ( خصائصها ) :** أنظر جدول 1-2 صفحة 39

- 1- غير حية عند اكتمال نموها
- 2- لها جدران سميكة صلبة علل: (للدعامة)
- 3- يمكن أن تقوم بوظيفة النقل
- مثالها/ توجد بكثرة في خشب البناء و الورق .

## أنواع الخلايا الإسكلرنشيمية :

### أ - الخلايا حجرية:

1- موزعة بشكل عشوائي في النبات 2- قصيرة وغير منتظمة الشكل 3- يمكن أن تقوم بوظيفة النقل

مثالها/ توجد في أغلفة البذور الصلبة في الكمثرى وفي بذور الجوافة .

### ب - الألياف:

1- إبرية الشكل 2 - لها جدار سميك و تجويف صغير

مثالها/ توجد في الحبال و الخيام و الأشرعة و الأقمشة

## { الأنسجة النباتية }

- تنقسم الأنسجة النباتية إلى 4 أنواع :-

1 - المولدة ( المرستيمية ) . 2 - الخارجية ( البشرة ) . 3 - الوعائية 4 - الأساسية.

### أولاً : الانسجة المولدة ( المرستيمية ) :

- 1- تُكوّن خلايا سريعة الانقسام .
- 2- خلاياها كبيرة الأنوية صغيرة الفجوات إن وجدت.
- 3- تتحول أثناء نموها لخلايا أخرى.

س/ أين توجد الأنسجة المولدة ؟ أنظر شكل 2-3 صفحة 42

أ - الانسجة المولدة القمية : في قمم الجذور والسيقان وتسبب زيادة طول النبات (النمو الابتدائي) .

ب - الانسجة المولدة البينية : تنتشر في سيقان نوات الفلقة وتسبب زيادة طول السيقان حتى بعد قص القمية. ( كما في قص حشائش الحدائق ) .

ج - الأنسجة المولدة الجانبية ( الكامبيوم ) : ينتج عنها الزيادة في قطر الساق و الجذر . و لها نوعين هما :

- كامبيوم وعائي: على شكل أسطوانة تمتد من الجذور إلى الساق وينتج خلايا مختصة بالنقل .

- كامبيوم فليني: ينتج خلايا ذات جدر قاسية تشكل هذه الخلايا :

1- طبقة خارجية لحماية الجذور و السيقان .

2- القلف في النباتات الخشبية .

ملاحظة/ خلايا نسيج الفلين هي التي فحصها روبرت هوك بالمجهر البسيط عند بداية اكتشاف الخلية .

### ثانيا : الانسجة الخارجية ( البشرة ) : أنظر شكل 2-4 صفحة 43

1- طبقة خلوية تُكوّن الغطاء الخارجي للنبات .

2- تفرز مادة دهنية تسمى ( كيوتكل )

س/ ما أهمية الكيوتكل؟

1- تقليل فقدان الماء بالتبخر . 2- منع البكتيريا و مسببات الامراض من دخول النبات.

\* اجزاء البشرة : أنظر شكل 2-4 صفحة 43 - أنظر شكل 2-5 صفحة 43

أ - الثغور : عبارة فتحات صغيرة يتحكم في فتحها و غلقها خليتين حارستين .

توجد في الأوراق والسيقان ( لتبادل الغازات )

ب - الشعيرات : نتوءات تشبه الشعر على الأوراق والسيقان.

س/ ما أهمية الشعيرات؟

1- الحماية من الحشرات و المفترسات .

- 2- بعضها ينتج مواد سامة .  
3- تحفظ النبات بارداً بعكسها لأشعة الشمس .  
ج - **الشعيرات الجذرية** : امتدادات تخرج من الجذر لزيادة مساحة الامتصاص .

### ثالثاً : **الانسجة الوعائية** :

لها نوعين هما : ( الخشب - اللحاء )

- أ - **الخشب** : نسيج وعائي مكون من (الأوعية الخشبية و القصيبات ) . أنظر شكل 6-2صفحة 44  
وظيفة الخشب : نقل الماء والأملاح المعدنية من الجذور الى الأوراق .  
( يُستخدم الماء في البناء الضوئي و الأملاح تدخل في وظائف الخلية )  
- **الأوعية الخشبية** :  
خلايا متراسة طرفاً لطرف تفقد جدرانها الطرفية و تشكل انبواب مفتوح الطرفين لنقل الماء و  
الأملاح .  
- **القصيبات** :  
خلايا متراسة طرفاً لطرف لا تفقد جدرانها الطرفية و تشكل انبواب له اطراف مثقبة ( لذلك هي  
اقل كفاءة في النقل من الأوعية الخشبية )

\* **ملاحظة** : يتكون الخشب في :

- النباتات مُعراة البذور اللازهرية : من القصيبات فقط  
- النباتات الزهرية : من الأوعية الخشبية والقصيبات ( هذا يفسر سر نموها في بيئات مختلفة ) .

- ب - **اللحاء** : نسيج وعائي مكون من (الانابيب الغربالية و الخلايا المرافقة ) . أنظر شكل 7-2صفحة 45  
وظيفة اللحاء : نقل المواد الغذائية من الاوراق والسيقان لجميع أجزاء النبات .  
و يحتوي اللحاء على خلايا حجرية وألياف للدعامة فقط .  
- الانابيب الغربالية : تقوم بنقل الغذاء و تحتوي على صفائح غربالية مثقبة.  
- الخلايا المرافقة : المحيطة بالانابيب الغربالية تمدها بالطاقة اللازمة للعمل و تتحكم و تنظم  
عملية النقل

**رابعاً **الانسجة الاساسية**** : هي التي لا تندرج تحت الانسجة المولدة او الخارجية أو الوعائية  
و تمثل معظم نسيج النبات . وتتكون من خلايا برنشيمية و كولنشيمية واسكلارنشيمية .  
وهي متعددة الوظائف ( بناء ضوئي - تخزين - دعامة - نقل ) حسب موقعها

### { **هرمونات النباتات و استجابتها** }

- كما درست سابقا الهرمون مركب عضوي يصنع في جزء من المخلوق الحي و ينتقل الى جميع  
اجزائه و يؤثر فيه و يرتبط بأماكن محددة على الغشاء البلازمي تسمى (المستقبلات البروتينية) .

### { **الهرمونات النباتية** }

- أمثل عليها :

أ - **الأكسين ( إندول حمض الخليك )** :

- 1 - اول الهرمونات النباتية اكتشافا و يؤدي الى استطالة الخلايا .
- 2 - يُنتج في الخلايا و الانسجة سريعة النمو مثل ( القمة النامية و البراعم و الأوراق الصغيرة )
- 3 - ينتقل من خلية برنشيمية إلى اخرى بسرعة تقدر بـ 1cm/h
- 4 - **آلية عمله** : أنظر شكل 8-2صفحة 46

يؤدي الى زيادة تدفق ايونات الهيدروجين  $H^+$  من السيتوبلازم الى جدار الخلية مما يؤدي الى زياده الحموضة و بالتالي إضعاف الجدار الخلوي ( السليلوزي ) بتفكيك الترابط بين أليافه مسببا تدفق الماء الى داخل الخلية و بالتالي استطالتها .

5- يختلف تأثير الأوكسين حسب تركيزه و موقعه مثلاً ( التركيز الذي يزيد نمو الساق يثبط نمو الجذر )

6 - سيادة القمة النامية : أنظر شكل 9-2 صفحة 47

اكسين القمة النامية يمنع نمو الأفرع الجانبية . فعند قص القمة النامية يقل تركيزه و بالتالي تنمو الأفرع الجانبية )

7 - يؤثر الأوكسين في نمو الثمار و يؤخر سقوطها . و عندما يقل تتساقط الثمار .

ب - الجبرلينات : أنظر شكل 10-2 صفحة 47

- تسبب استطالة الخلايا وتحفيز الانقسام وتؤثر في نمو البذور .

- لا توجد الجبرلينات في النباتات القصيرة لكن تعريضها لها يسبب استطالتها .

ج - الإثيلين :

- هو الهرمون الوحيد الغازي و يوجد في الثمار الناضجة والأوراق والأزهار المتساقطة و ينتشر بين الخلايا و ينتقل عبر اللحاء .

- يؤثر على جدران خلايا الثمار و يضعفها فتصبح طرية .

- يحلل الكربوهيدرات الي سكريات بسيطة تكسب الثمار حلاوتها .

- يشحن المزارعين ثمارهم وهي غير ناضجة ( صلبة ) وعند وصولها تُعالج بالإثيلين فتصبح ناضجة ( و ذلك لكي تتحمل الكدمات و لا تفسد ) .

د - السايوكاينينات :

- هو هرمون مُحفز للنمو يُنتج في الخلايا سريعة الانقسام .

- يحفز على انتاج البروتينات الضرورية للانقسام المتساوي و انقسام السيتوبلازم .

- في المختبر يضاف للوسط الغذائي عند زراعة الأنسجة النباتية لتنمية نباتات من قطع نباتية

- تتأثر السايوكاينينات بالهرمونات الأخرى مثل الأوكسين

مثلاً الأوكسين يسبب استطالة الخلايا وعند إضافته السايوكاينينات يسبب نمو سريع جدا للخلايا النباتية .

### { استجابة النبات }

- تنقسم استجابة النبات الى قسمين هما : ( استجابة الحركة - استجابات النمو ) .

\* استجابة الحركة :

هي استجابة تسبب الحركة وهي مؤقتة و يمكن تكرارها عدة مرات .

أمثلة :

1 - انطباق أوراق نبات آكل الحشرات ( فينوس ) على الحشرة بسبب حركة الماء في الورقة و اختلاف نسبته .

2 - حركة تباع الشمس نحو الشمس .

\* استجابات النمو ( الانتحاء ) : أنظر جدول 2-2 صفحة 50

هو نمو النبات استجابة لمنبه خارجي .

- إما ان يكون انتحاءً موجبا : ( النمو باتجاه المنبه )

- أو انتحاءً سالبا : ( النمو بعيدا عن المنبه )

### - أقسام الانتحاء :

- 1- **الانتحاء الضوئي** : هو استجابة نمو النبات للضوء .  
- سببه ابتعاد الأكسين في القمة النامية عن الضوء الى الجانب البعيد عن الضوء مسببا استطالته و بالتالي انتحاء القمة النامية ( الساق ) نحو الضوء .
- 2- **الانتحاء الأرضي** : هو استجابة نمو النبات للجاذبية الأرضية .  
- الجذور تُظهر استجابة ايجابية إلى الأسفل نحو الجاذبية و بالتالي تقترب من الماء و الأملاح .  
- الساق يُظهر استجابة سلبية إلى الأعلى بعيدا عن الجاذبية .
- 3- **الانتحاء اللمسي** : هو استجابة نمو النبات للمؤثرات الآلية ( الميكانيكية ) .  
- حيث ينمو النبات بملامسة جسم ما أو حتى الريح .  
- مثل النباتات المتسلقة ( العنب مثلاً ) عندما يلتف على سياج او شجرة أو عمود .

## — الفصل الثالث —

### { التكاثر في النباتات الزهرية }

#### { الأزهار }

- تختلف الأزهار في الشكل و التركيب و اللون وراثيا من نوع لآخر .
- الدور الأساسي للزهر هو التكاثر الجنسي .
- قد تحتوي الزهرة على عنق تتصل به السبلات و البتلات .

#### { أعضاء الزهرة ( تركيبها ) }

- تتركب من 4 محيطات زهرية ( أعضاء ) تُحمل على انتفاخ في نهاية عنق الزهرة يسمى (التخت).

وهي مرتبة من الخارج إلى الداخل :

- 1- **الكأس** : يتكون من أوراق تسمى (السبلات) ، وهي خضراء اللون ، تقوم بحماية أعضاء الزهرة الداخلية وعملية البناء الضوئي .
- 2- **التويج** : يتكون من أوراق تسمى (البتلات) ، عادة تكون ملونة وذات رائحة جذابة لجذب الحشرات لتلقيح الزهرة .
- 3- **الطلع** : عضو التذكير في الزهرة ، يتكون من عدد من **الأسدية** ، تتكون السداة من (خيط و متك) ، يتركب المتك من أربع أكياس تتكون بداخلها حبوب اللقاح .
- 4- **المتاع** : عضو التأنيث في الزهرة ، يتكون من **كريلة** أو عدة كرايل ، تتكون الكريلة من (ميسم - قلم - مبيض ) ، المبيض جزء منتفخ تتكون بداخله البويضات التي تتصل بجداره بواسطة الحبل السري ، لإمدادها بالغذاء .

#### { تكيفات الزهرة }

##### \* الفروق التركيبية ( أنواع الأزهار ) :

- تختلف الأزهار بناء على تركيبها إلى :

- 1- **الزهرة الكاملة** : هي التي تحتوي على سبلات وبتلات و أسدية و كرايل
- 2- **الزهرة الناقصة** : هي التي تفتقد لأحد الأعضاء السابقة

- 1- **الزهرة ثنائية الجنس ( الخنثى )** : هي التي تحتوي على أسدية و كرايل في نفس الزهرة .
- 2- **الزهرة أحادية الجنس** : هي التي تحتوي على أسدية أو كرايل ( فتكون إما مذكرة او مؤنثة )

- 1- النباتات احادية الفلقة : عدد بتلاتها ثلاث أو مضاعفاتها .
- 2- النباتات ثنائية الفلقة : عدد بتلاتها أربعة أو خمسة ومضاعفاتها .

### \* آليات التلقيح :

- التلقيح : هو انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة إلى الميسم .
- التلقيح له نوعان :
- أ - التلقيح الذاتي : هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم الزهرة ذاتها (أو أي زهرة على نفس النبات) .
- ب - التلقيح الخلطي : هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى على نبات آخر من نفس النوع .

### - طرق التلقيح ( وسائل التلقيح ) : أنظر شكل 3-3 صفحة 65

#### أ - التلقيح بواسطة الحيوانات ( الحشرات ) :

- تمتاز الأزهار التي تلقح بالحيوانات بالتالي :

- 1 - لها رائحة قوية وطيبة
- 2 - لها ألوان زاهية وناصعة
- 3 - لها رحيق سائل حلو المذاق

فمثلاً

- الرائحة الطيبة لأزهار التفاح والورد تجذب الحشرات مثل ( النحل - الفراش - الخنافس - الدبابير )

- الأزهار البيضاء والصفراء الفاتحة واضحة في الليل و تجذب الحيوانات الليلية مثل العث والخفاش

- الطيور تنجذب للأزهار بواسطة حاسة البصر وليس بالرائحة .

#### ب - التلقيح بواسطة الرياح :

- تمتاز الأزهار التي تلقح بالرياح بالتالي :

- 1 - ليس لها ألون جذابة
- 2 - ليس لها رائحة طيبة وعطرة
- 3 - تنتج كمية كبيرة من حبوب اللقاح
- 4 - اسدية الأزهار تقع في مستوى البتلات لسهوله تعرضها للرياح
- 5 - مياسمها كبيرة الحجم و احياناً ريشية ( علل) لضمان سقوط حبوب اللقاح عليها .

### \* طول الفترة الضوئية :

- النباتات تزهر في أوقات معينة من السنة استجابة لعامل الفترة الضوئية .
- لاحظ العلماء ان العامل المؤثر في نمو الأزهار هو عدد ساعات الظلام المتواصلة التي يتعرض لها النبات وليس عدد ساعات الضوء .
- بداية نمو الأزهار لأي نوع من النباتات هو استجابة النباتات لعدد ساعات الظلام وتدعى هذي الفترة بـ (الفترة الحرجة )

- تصنف النباتات بناءً على الفترة الحرجة إلى 4 مجموعات هي : أنظر شكل 3-5 صفحة 67

#### 1 - نباتات النهار القصير (الظلام الطويل) :

- تزهر عند تعرضها يومياً لعدد ساعات من الظلام اكبر من الفترة الحرجة .
- تزهر في فصل الشتاء والربيع و الخريف ( علل ) لان ساعات الظلام أكثر من ساعات الضوء .
- مثل نبات البنفسج و التوليب و قم السمكة .

## 2 - نباتات النهار الطويل (الظلام القصير):

- تزهر عند تعرضها يوميا لعدد ساعات من الظلام أقل من الفترة الحرجة
- تزهر في الصيف ( علل ) لان ساعات الظلام أقل من ساعات الضوء .
- مثل الخس و السبانخ و البطاطس .

## 3 - نباتات النهار المتوسط :

- تزهر هذه النباتات ما دام عدد ساعات الظلام ليس كبير ولا صغير
- مثل نبات قصب السكر

## 4 - النباتات النهار المحايد :

- تزهر هذه النباتات بغض النظر عن عدد ساعات الظلام ما دامت تستقبل كمية كافية من الضوء
- اللازم للبناء الضوئي .
- مثل نباتات الذرة والقطن والورد والطماطم

## { النباتات الزهرية }

### { دورة الحياة }

كما درست سابقا

- النباتات الزهرية أكثر النباتات تبايناً و توزيعاً .
- النبات البوغي سائد على النبات المشيجي .

## \* نمو الطور المشيجي :

أولا : الطور المشيجي الأنثوي : أنظر شكل 6-3 صفحة 68

س / اين توجد البويضة و مما تتركب ؟

- توجد في مبيض الكريهة - و تتركب من بوغ كبير (كيس جنيني) به ثمان أنوية محاط بغلاف أو غلافين وله فتحة عند القمة تسمى (فتحة النقيير)
- س / كيف تُنتج الامشاج (الأبواغ) المؤنثة ؟

- 1 - تنقسم خلية متخصصة في البويضة انقسام منصف منتجة اربع ابوغ كبيرة
- 2- تتلاشي الثلاث الابواغ القريبة من النقيير و يبقى البوغ البعيد عن النقيير .
- 3- تنقسم نواة البوغ المتبقية ثلاث انقسامات متساوية دون ان ينقسم السيتوبلازم فينتج عنها ثمان أنوية أربع مها عند كل طرف ( قطب).
- 4 - تتحرك نواة من كل طرف إلى المنتصف لتكون (النواتان القطبيتان) .
- 5- الأنوية القريبة من النقيير تسمى (الخليتان المساعدتان وفي وسطها خلية البويضة) .
- و الأنوية البعيدة عن النقيير تسمى (الخلايا السمتية) .

## ثانيا : الطور المشيجي المذكر :

س / اين توجد حبة اللقاح و مما تتركب ؟

- توجد في المتك - و تتركب من جدار سميك عليه ثقب أو ثقبون إنبات وجدار رقيق ونواة خضرية ( أنبوية ) كبيرة و نواة تناسلية (مولدة) صغيرة ،

س / كيف تُنتج الامشاج (الأبواغ) المذكرة ؟

- 1 - تنقسم خلايا متخصصة في المتك انقسام منصف منتجة اربع ابواغ صغيرة .
- 2 - تنقسم النواه في كل بوغ صغير إنقساماً متساوياً وينتج عنها نواتان . احدهما كبيرة تسمى النواة الخضرية ( الانبوية ) و الأخرى صغيرة تسمى النواة التناسلية ( المولدة ) .

## \* التلقيح و الإخصاب : أنظر شكل 7-3 صفحة 69

الإخصاب في النبات : هو اتحاد النواة التناسلية الذكرية في حبة اللقاح مع النواة التناسلية الأنثوية في البويضة.

### \* خطوات عملية الإخصاب :

- 1 - عندما تسقط حبة لقاح متطابقة على الميسم ( من نفس النوع ) تمتص مواد كيميائية من محلوله السكري وتنتفخ ويخرج أنبوب اللقاح من أحد ثقبوب الإنبات .
  - 2 - تتجه النواة الخضرية (الانبوبية ) إلى طرف الأنبوب وتليها النواة التناسلية التي تنقسم إلى نواتين تناسليتين ذكريتين .
  - 3 - يخترق أنبوب اللقاح أنسجة الميسم والقلم والمبيض متجها الى البويضة (عن طريق استجابة جذب كيميائية ) ثم يدخل البويضة عن طريق فتحة النقيير ثم يدخل الكيس الجنيني ، عندها تزول النواة الخضرية ويتمزق طرف أنبوب اللقاح لتخرج النواتان التناسليتان الذكريتان .
  - 4 - ثم تتحد أحدهما مع خلية البويضة لتكون الزيجوت ( اللاقحة )  $2N$  الذي ينمو ويعطي جنين البذرة.
- والأخرى تتحد مع النواتان القطبيتان لتكون نواة الإندوسبيرم الثلاثية  $3N$  التي تنمو و تعطي نسيج الإندوسبيرم
- 5 - ثم تتلاشى الخلايا السمتية والخلايا المساعدة .

### \* ملاحظات :

- نلاحظ حدوث عمليتي إخصاب في البويضة وهذا خاص بالنباتات الزهرية فقط و يسمى ( الإخصاب المزدوج ) .
- بعد الإخصاب تنمو البويضة المخصبة لتكون بذرة وينمو المبيض ليكون ثمرة .

## { نتائج التكاثر }

### \* نمو البذرة و الثمرة :

- بعد الإخصاب يحدث الآتي :
- 1 - تنمو البويضة المخصبة ( اللاقحة )  $2N$  وتكون الجنين الذي يتكون من [ ريشة - جذير - فلقة ( كما في ذوات الفلقة الواحدة ) أو فلقتين ( كما في ذوات الفلقتين ) ] . أنظر شكل 9-3صفحة 71
- 2 - تنمو خلية الإندوسبيرم الثلاثية  $3N$  و تعطي نسيج الإندوسبيرم الذي يخزن فيه الغذاء اللازم لإنبات الجنين .
- 3 - في ذوات الفلقة يخزن الغذاء في الإندوسبيرم ( قد يكون الإندوسبيرم صلب كما في الذرة أو سائل كما جوز الهند )
- 4 - في ذوات الفلقتين تمتص الفلقتين الإندوسبيرم و تخزن الغذاء بداخلها .
- 5 - تتصلب أغلفة البويضة لتشكل غلاف البذرة (القصرة)
- 6 - ثم ينمو المبيض ليكون الثمرة .(و أحيانا المبيض مع أجزاء أخرى من الزهرة مثل التفاح ) .

### \*ملاحظات : أنظر شكل 1-3صفحة 72

- يمكن معرفة عدد البويضات الموجودة في المبيض من خلال عدد البذور الموجودة في الثمرة مثلا ( المنجا بويضة واحدة - الطماطم و الخيار مئات البويضات ) .
- قد تكون الثمار لحمية طرية مثل (البرتقال - التفاح) و قد تكون صلبة جافة مثل ( الجوز - البندق ) و أحيانا مجتمعة ملتحمة مثل ( الفراولة ) وأحيانا مركبة مضاعفة مثل ( الأناناس ) .

### \* انتشار البذور :

- س / ما هو السبب في كون عملية انتشار الثمار والبذور مهمة للنبات ؟
- لأنه إذا سقطت البذور بجانب النبات ونمت فإنها تزدهم وتتنافس على الضوء الماء والمعادن مما يؤدي إلى ضعف نموها ، ولكن إذا ابتعدت عن النبتة الأم ووجدت مكاناً مناسباً يكون نموها أفضل .

### \* ما هي طرق انتشار الثمار والبذور ؟

#### 1 - الرياح ( الهواء ) :

- تكون صغيرة سهلة الحمل أو لها زوائد تساعد على الطيران (مثل بذور القطن).

**2 - الماء :**

- يجب أن تحتوي على فراغات مملوءة بالهواء لتساعدها على أن تطفو و تنتقل من مكان إلى آخر مثل ( ثمرة جوز الهند)

**3 - الحيوانات :**

- أن تحتوي على أشواك تعلق بجسم الحيوانات فتنتقل معها من مكان لآخر .  
- أو أن تحتوي البذرة على قصرة صلبة لا تهضم عندما يتغذى عليها الحيوان فتخرج سليمة مع البراز مثل (الجوافة) .  
- وقد تخزن الحيوانات بعض البذور بدفنها .

**4 - الإنسان :**

- وذلك لأغراض اقتصادية مثل :  
1- نقل العرب للبرتقال إلى الأندلس .  
2- نقل الذرة والبطاطس من أمريكا إلى بقية أجزاء العالم .

**\* إنبات البذور :**

- تكون البذور في حالة كُمون (سكون) وعند الإنبات يعتمد الجنين في نموه على الغذاء المخزن في [الفلقتين أو الإندوسبيرم] و ذلك بتحليله بإنزيمات هاضمة . حتى تتكون الأوراق التي تمكنه من صنع غذائه بالبناء الضوئي.  
- يجب أن تتوفر مجموعة من العوامل لكي يتم الإنبات بشكل طبيعي : و هي الماء ، الاكسجين ، الحرارة المثلى ( التي تختلف من نوع لآخر )

**\* مراحل إنبات البذور : أنظر شكل 10-3صفحة 73**

- 1- تمتص البذرة الماء عن طريق النقيير فتنتفخ ويتمزق غلافها الصلب (القصرة) .
- 2 - ينمو الجنين و يخرج الجذير وينمو إلى الأسفل ليمتص الماء و الاملاح ثم تتكون عليه الجذور الجانبية مكوناً ( المجموع الجذري) .
- 3 - ثم تنمو الريشة إلى الأعلى لتكون السويقة تحت الفلقية ( وهي المنطقة الأقرب من الساق الى البذرة ) و التي تنمو مكونة الساق و الأوراق مكونتاً (المجموع الخضري) .
- 4 - في بعض ذوات الفلقتين تظهر الفلقتان فوق سطح التربة و في البعض الآخر تبقى الفلقتان تحت سطح التربة . أما في ذوات الفلقة الواحدة تبقى الفلقة تحت سطح التربة
- 5 - تضمير (الفلقتان أو الاندوسبيرم ) لاستهلاك الغذاء المخزن فيها ، وبعد تكوين الأوراق يعتمد النبات على نفسه بالنبات الضوئي .

**\* الكمون :**

هي الفترة التي لا يوجد فيها نمو إطلاقاً أو يوجد فيها نمو قليل جداً . يساعده الكمون البذرة على البقاء مدة طويلة و يزيد من تحملها للظروف القاسية .

## — الفصل الرابع —

### { تركيب الخلية و وظائفها } { التراكيب الخلوية و العضيات }

#### \* أنواع الخلية :

- الخلايا هي الوحدات الأساسية لجميع المخلوقات الحية .
- للخلايا أحجام و أشكال مختلفة على حسب الوظيفة التي تؤديها .
- تشترك جميع الخلايا في صفات مشتركة مثل (الغشاء البلازمي - المادة الوراثية- تحليل الجزيئات لإنتاج الطاقة ) .
- تنقسم الخلايا إلى قسمين هما : أنظر شكل 4-1 صفحة 86
- 1- **خلايا حقيقية النواة :** أكبر حجما وتحتوي على (نواة بداخلها مادة وراثية DNA) و عضيات محاطة بأغشية (لكل عضي وظيفة محددة ) .
- 2- **خلايا بدائية النواة :** ليس لها نواة أو عضيات محاطة بأغشية .
- معظم المخلوقات الحية خلايا حقيقية النواة وبعضها بدائية النواة مثل بعض المخلوقات الحية وحيدة الخلية مثل البكتريا البدائية .

#### { وظيفة الغشاء البلازمي }

- أنظر شكل 4-2 صفحة 88
- الغشاء البلازمي : هو حاجز رقيق مرن فاصل بين الخلية وبينتها . ذو نفاذية اختيارية لتنظيم مرور المواد من وإلى الخلية .
- النفاذية الاختيارية : صفة مهمة في تركيب الغشاء البلازمي ينظم كمية ونوعية ووقت المواد التي تدخل إلى الخلية وتخرج منها .

#### { تركيب الغشاء البلازمي }

- أنظر شكل 4-3 صفحة 88
- جزيء الدهن الواحد يتكون من ( سلسلة جلسرول وثلاث سلاسل من الأحماض الدهنية ) .
- **الدهون المفسفرة** تتكون من ( سلسلة جلسرول وسلسلتين من الأحماض الدهنية ومجموعة فوسفات ) .
- يتركب الغشاء البلازمي من طبقتين من الدهون المفسفرة المزدوجة التي تشكل ما يشبه الشطيرة ( بحيث تكون الرؤوس القطبية بفعل مجموعة الفوسفات إلى الخارج وإلى الداخل منجذبة إلى الماء وذيول الأحماض الدهنية غير القطبية في الجزء الأوسط نافرة من الماء ) .- تجتمع الجزيئات الدهنية بهذه الطريقة يشكل حاجزاً سطحه قطبي وأوسطه غير قطبي (لذلك لا تمر المواد الذائبة في الماء بسهولة لأن وسط الغشاء غير القطبي يعيقها) .

#### \* مكونات الغشاء البلازمي الأخرى :

- أنظر شكل 4-3 صفحة 88
- يوجد على الغشاء البلازمي بروتينات بعضها :
- 1- على السطح الخارجي وتسمى ( المستقبلات ) ترسل إشارات إلى داخل الخلية .
- 2- على السطح الداخلي تقوم بربطه مع تراكيب الدعم الداخلية لإعطاء الخلية شكلها المحدد .
- 3- يخترق الغشاء كله وتسمى ( البروتينات الناقلة ) بحيث تشكل قنوات تنتقل عبرها المواد مثل ( الكولسترول والبروتينات والكربوهيدرات ) وبالتالي تساهم في النفاذية الإختيارية .
- يوجد على الغشاء البلازمي كولسترول غير قطبي ينفر من الماء بين الدهون المفسفرة ويساعد على منع التصاق ذيول الأحماض الدهنية ببعضها وبالتالي يساهم في سيولة الغشاء البلازمي .
- يوجد على الغشاء البلازمي كربوهيدرات تساعد على معرفة الإشارات الكيميائية مثلا (تساعد الخلايا المقاومة للمرض على تمييز الخلايا الضارة وتهاجمها) .

ملاحظة :

النموذج الفسيفسائي المائع : أنظر شكل 4.4 صفحة 91

- بسبب تكون الغشاء البلازمي من طبقتين مزدوجة من الدهون المفسفرة فإن الغشاء البلازمي وما يحتويه من مكونات تتحرك بشكل ثابت وينزلق بعضها فوق بعض داخل طبقة الدهون المزدوجة .

### { السيتوبلازم والهيكل الخلوي } أنظر شكل 4-5 صفحة 91

العضيات داخل الخلية ليست سباحة في السيتوبلازم بل تدعمها شبكة من الخيوط البروتينية تسمى الهيكل الخلوي ( الذي يساعد على حركة الخلية وأنشطتها الأخرى ).

يتركب الهيكل الخلوي من :

- 1- الأنابيب الدقيقة : وهي اسطوانية طويلة مجوفة من البروتين تكون هيكلاً صلباً للخلية وتساعد في حركة المواد داخل الخلية .
- 2- الخيوط الدقيقة : وهي خيوط بروتينية رفيعة تساعد على إعطاء الخلية شكلها وتمكن الخلية أو جزء منها على الحركة .

### { تراكيب الخلية } أنظر شكل 4-6 صفحة 92

تحتوي الخلية حقيقية النواة على عضيات مختلفة لكلٍ منها دور ووظيفة محددة منها:

\***النواة** : أنظر شكل 4-7 صفحة 93

- وظيفتها تنظم عمليات الخلية .

- وتحتوي بداخلها على نوية ومادة وراثية على شكل DNA ( تخزن فيها المعلومات الوراثية ) وتحاط بغشاء نووي مزدوج عليه ثقب يسمح بمرور المواد عبره من وإلى النواة .

\***الرايبوسومات** : أنظر شكل 4-8 صفحة 94

- وظيفتها إنتاج البروتين . الذي يستخدم داخل الخلية أو ينتقل إلى خلايا أخرى .

- وهي عضيات غير محاطة بأغشية تصنع في النوية داخل النواة وتوجد إما سباحة في السيتوبلازم أو ملتصقة بالشبكة الاندوبلازمية الخشنة .

\***الشبكة الاندوبلازمية** : أنظر شكل 4-8 صفحة 94

عبارة عن قنوات وأكياس متصلة ومتداخلة محاطة بغشاء مزدوج وهي كثيرة الإنشاءات لتعطيها مساحة سطح أكبر لإنجاز عمل أكثر .

ولها نوعان هما :

1- الشبكة الأندوبلازمية الخشنة : وهي تنتج عندما ترتبط بها الرايبوسومات وهي تعد مواقع لإنتاج البروتينات والدهون .

2- الشبكة الأندوبلازمية الملساء : وهي الشبكة بدون أن ترتبط بها الرايبوسومات

وظيفتها إنتاج الكربوهيدرات والدهون المعقدة مثل ( الدهون المفسفرة ) كما تعمل في خلايا الكبد على إزالة السموم الضارة من الجسم .

\***جهاز جولجي** : أنظر شكل 4-9 صفحة 95

عبارة عن أغشية مترابطة

وظيفتها : بعد أن ينتقل إليها البروتين المصنع في الرايبوسومات تغلفه داخل أكياس تسمى الحويصلات التي تلتصق بالغشاء البلازمي لنقله خارج الخلية .

**\*الفجوات :** أنظر شكل 10 - 4 صفحة 96

عبارة عن حوصلات محاطة بغشاء .  
- في الخلية النباتية كبيرة لتخزين ( الماء - الغذاء - الفضلات - ومواد أخرى ) .  
في الخلية الحيوانية إن وجدت فهي صغيرة جداً .

**\* الأجسام المحللة ( الليسوسومات ) :** أنظر شكل 11 4 صفحة 96

في الخلية الحيوانية فقط وهي عبارة عن حوصلات محاطة بأغشية تحتوي على أنزيمات لهضم الغذاء والبكتيريا والفيروسات التي تدخل الخلية .  
وقد تلتحم بالفجوة العصارية وتطرح فيها أنزيمات لهضم الفضلات التي بداخلها ويمنع الغشاء المحيط بها الأنزيمات من تحليل الخلية .

**\* المريكزات ( السنتريول ) :** أنظر شكل 12 - 4 صفحة 97

في الخلايا الحيوانية وخلايا الأوليات وهي عبارة عن مجموعة من الأنابيب الدقيقة على شكل أزواج تلعب دوراً في إنقسام الخلية .

**\* الميتوكوندريا :** أنظر شكل 13 - 4 صفحة 97

عضي له غشاء خارجي أملس وغشاء داخلي كثير الطيات و الأنتثناءات ليعطيها مساحة سطح أكبر  
وظيفة الميتوكوندريون هو تكسير الروابط بين جزيئات السكر لإنتاج الطاقة .

**\* البلاستيدات :** أنظر شكل 14 4 صفحة 98

في الخلية النباتية فقط ولها عدة أنواع وهي :

- 1- البلاستيدات الخضراء : تحتوي على صبغة الكلوروفيل بداخل الثايلاكويدات التي تتكون من أقرص الجرانال التي تمتص الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية بعملية البناء الضوئي .
- 2- البلاستيدات الملونة : تحتوي على أصباغ حمراء أو صفراء أو برتقالية لإعطاء الأوراق والأزهار والفواكه ألوانها .
- 3- البلاستيدات عديمة اللون : لتخزين النشا والدهون والبروتين .

**\*الجدار الخلوي :** أنظر شكل 15 4 صفحة 99

في الخلايا النباتية والفطريات وبعض الخلايا بدائية النواة .  
عبارة عن شبكة من الألياف السمكية تحيط بالغشاء البلازمي من الخارج لحماية الخلية وتوفير الدعامة والقوة .  
في النباتات الجدار الخلوي يحتوي على مادة كربوهيدراتيه معقدة تسمى ( السليلوز ) يعطي النبات الدعامة للوصول إلى ارتفاعات مختلفة .

**\*الأهداب والأسواط :** أنظر شكل 16 4 صفحة 99 وجدول 1 - 4 صفحة 100

تتكون من انبسيات دقيقة تمتد خارج الغشاء والبلازمي مرتبة في نمط ( 2+9 ) في محيط دائري مع تسع مجموعات مزدوجة تحيط بأنبسيبتين منفردتين في المركز تستخدم للحركة والتغذية .  
- الأهداب : زوائد قصيرة كثيرة العدد .  
- الأسواط : أطول من الأهداب وأقل عدداً .  
- ملاحظة : قد توجد الأهداب في خلايا ثابتة غير متحركة مثل الخلايا المبطنة للجهاز التنفسي للإنسان .

خلاصة تراكيب الخلية			الجدول 1-1
نوع الخلية	الوظيفة	مثال	تركيب الخلية
الخلايا النباتية و خلايا الفطريات وبعض الخلايا البدائية التواة.	حاجز غير مرن يعطي الدعامة والحماية للخلية النباتية.		الجدار الخلوي
الخلايا الحيوانية ومعظم خلايا الأوليات.	عشبات تظهر على شكل أزواج وتؤدي دورًا في انقسام الخلية.		المريكزات
الخلايا النباتية فقط.	عشبات لها غشاء مزدوج وثايلاكويدات وتحوي المادة الخضراء، ويتم فيها عملية البناء الضوئي.		البلاستيدات الخضراء
بعض الخلايا الحيوانية و خلايا الأوليات و الخلايا البدائية التواة.	امتدادات من سطح الخلية تساهم في الحركة والتغذية، وسحب المواد نحو سطح الخلية.		الأهداب
جميع الخلايا الحقيقية التواة.	إطار هيكل للخلية داخل السيتوبلازم.		الهيكال الخلوي
جميع الخلايا الحقيقية التواة.	غشاء كثير الطيات وهو موقع تصنيع البروتين.		الشبكة الإندوبلازمية
بعض الخلايا الحيوانية و الخلايا البدائية التواة و بعض الخلايا النباتية.	امتدادات تساهم في الحركة والتغذية.		الأسواط
جميع الخلايا الحقيقية التواة.	أغشية أنبوبية متراسة ومسطحة تقوم بتصنيع البروتين وتغليفه لنقله خارج الخلية.		جهاز جولجي
الخلايا الحيوانية فقط.	حويصلة تحتوي على إنزيمات هاضمة تحلل المواد الخلوية الزائدة.		الأجسام المحللة
جميع الخلايا الحقيقية التواة.	عضية محاطة بغشاء يوفر الطاقة للخلية.		الميتوكوندريون
جميع الخلايا الحقيقية التواة.	مركز السيطرة في الخلية، وتحتوي على تعليمات مشفرة لإنتاج البروتينات وانقسام الخلية.		النواة
جميع الخلايا الحقيقية التواة.	حاجز مرن ينظم حركة المواد من الخلية وإليها.		الغشاء البلازمي
جميع الخلايا.	عشبات تُعد موقعًا لبناء البروتينات.		الرايبوسومات
الخلايا النباتية تحوي فجوة كبيرة أما الخلايا الحيوانية فتحوي القليل من الفجوات الصغيرة الحجم.	حويصلة محاطة بغشاء لتخزين مؤقت للمواد.		الفجوات

### { العضيات عندما تعمل }

فكرة الموضوع أن العضيات في الخلية كل عضي يؤدي دور محدد وأن هذه العضيات تعمل معاً وتتكامل أدوارها للقيام بالوظائف الخلوية .

### { كيمياء الخلية }

تتكون خلايا المخلوقات الحية من مركبات عضوية يدخل في تركيبها الكربون كعنصر أساسي .

### { الكيمياء العضوية }

- لأهمية عنصر الكربون حُصص لمركباته فرع في الكيمياء يسمى بـ ( الكيمياء العضوية ) .  
- لذرة الكربون في مدارها الخارجي 4 إلكترونات تكون من خلالها 4 روابط تمكنها من الارتباط معاً على صورة سلاسل مستقيمة أو متفرعة أو على صورة مركبات حلقية .

### { الجزيئات الكبيرة }

\* الجزيئات الكبيرة ( الملمرات ) :

هي جزيئات كبيرة مكونة من مجموعة من الوحدات الأساسية ( مونومرات ) والتي ترتبط معاً بسلسلة من الروابط المشتركة ( التساهمية ) .

\* تنقسم المركبات الحيوية الكبيرة إلى أربع مجموعات هي ( الكربوهيدرات - الدهون - البروتينات - الأحماض النووية )

### { الكربوهيدرات }

- تتتركب كيميائياً من ( C و H و O ) بنسبة ( 1 : 2 : 1 )  
- صيغتها العامة هي  $(CH_2O)_n$  حيث n : هي عدد وحدات  $CH_2O$  في السلسلة وبتراوح عدد n من 3 - 7 وحدات .  
- وهي مصدراً أساسياً للطاقة .

وتنقسم إلى 3 أقسام هي :

أ - سكريات احادية : تتكون من جزيء واحد فقط من السكر الأحادي .

مثل : 1- الجلوكوز

2- الفركتوز

3- الجالكتوز

ب - سكريات ثنائية : تتكون من ارتباط جزيئين من السكر الأحادي .

مثل : 1- السكروز ( سكر المائدة ) .

2 - اللاكتوز ( سكر الحليب ) .

3 - المالتوز ( سكر الشعير ) .

ج - سكريات عديدة : تتكون من ارتباط عدد كبير من الجزيئات من السكر الأحادي .

مثل : 1- الجلايكوجين : على الكبد والعضلات كمخزن للطاقة .

2 - السليلوز : في جدار الخلية النباتية على شكل ألياف ليعطيها الدعم .

- ملاحظة : الكايتين هو سكر عديد يحتوي على النيتروجين ويوجد في صدف الروبيان وسرطان

البحر وبعض الحشرات والجدار الخلوي للفطريات .

### { الدهون }

- تتكون من وحدات أساسية تسمى ( الأحماض الدهنية و الجلسرول )

- تتتركب هذه الوحدات كيميائياً من ( O ، H ، C ) .

- تعتبر كمخزن للطاقة .

- أمثلة : 1 - الشحوم .

- 2 - الزيوت .  
 3 - الشمع : ( الذي يوجد في خلايا النحل وعلى أوراق النباتات لمنع فقدان الماء )  
 - للدهون نوعان هما :  
 أ - **الدهون المشبعة** : غالباً صلبة في درجة الحرارة العادية مثل الدهون الحيوانية وفيها ترتبط سلسلة ذرات الكربون ببعضها بروابط أحادية .  
 ب - **الدهون غير المشبعة** : غالباً سائلة في درجة الحرارة العادية مثل الزيوت النباتية وهي نوعان :  
 1 - دهون غير مشبعة : تحتوي على رابطة ثنائية واحده بين ذرات الكربون .  
 2 - دهون غير مشبعة عديدة : تحتوي على أكثر من رابطة ثنائية بين ذرات الكربون .  
 \* **الدهون المفسفرة** : تدخل في تركيب الغشاء البلازمي للخلية وبما أنها لاتذوب في الماء ( كارهه للماء ) فهي تعمل كحاجز في الأغشية الخلوية .

\* **الستيرويدات** : مثل

- 1 - الهرمونات  
 2 - الكولسترول : الذي يدخل في إنتاج دهون ضرورية أخرى وفيتامين D و هرمونات الأستروجين و التستوستيرون.

### { البروتينات }

أنظر شكل 21 - 4 صفحة 107

- تتكون من وحدات أساسية تسمى ( الأحماض الأمينية )  
 - تتركب هذه الوحدات كيميائياً من ( N, O, H, C ) وأحياناً ( S ) .  
 - هنالك حوالي 20 حمض أميني مختلفة ( تختلف باختلاف المجموعة الوظيفية المتغيرة ) .  
 ترتبط الأحماض الامينية معاً بروابط ببتيدية ( بين مجموعة الأمين ومجموعة الكاربوكسيل ) لتكون البروتينات .  
 - **ملاحظة** : أنظر شكل 21 - 1 صفحة 33  
 يتكون الحمض الأميني من ذرة كربون مركزية تتصل بها ذرة هيدروجين ( -H ) ومجموعة كاربوكسيل ( -COOH ) ومجموعة أمين ( -NH<sub>2</sub> ) ومجموعة متغيرة ( -R )

- \* **وظيفة البروتين** : يشكل 15% من كتلة الجسم ويساهم في معظم وظائفه ويوجد قرابة 10000 نوع من البروتين في الجسم حيث :  
 1 - يدخل في تركيب الشعر والأظافر والجلد والعضلات .  
 2 - تساهم في الدعم .  
 3 - تساهم في النقل ( نقل المواد داخل الخلية أو بين الخلايا ) .  
 4 - توصيل الإشارات داخل الخلية وبين الخلايا .  
 5 - تعمل كعوامل مساعدة ( محفزة ) تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية ( مثل الأنزيمات ) .

### { الأنزيمات }

أنظر شكل 23 - 4 صفحة 109

- الأنزيمات : هي نوع من البروتينات تعمل كعوامل مساعدة ( محفزة ) .  
 \* **المحفز** : هو مادة تقلل طاقة التنشيط التي يتطلبها بدء التفاعل الكيميائي وتعمل على تسريع التفاعل ولا تستهلك فيه ولا تزيد من كمية نواتج التفاعل .  
 - الأنزيمات تختلف عن العوامل المساعدة في كونها متخصصة بنوع واحد أو عدد قليل من التفاعلات ولا ينتج عنها تفاعلات غير مرغوب فيها .  
 - تساهم الأنزيمات بربط المواد المتفاعلة ببعضها بعد ارتباط المواد المتفاعلة بالأنزيم في (الموقع النشط) وبعد أن يتم التفاعل فيما بينها تتحرر المواد الناتجة عن الأنزيم . (أنظر شكل 24 - 1 صفحة 34).

- يتأثر عمل الأنزيمات بعوامل أخرى مثل ( الرقم الهيدروجيني PH ودرجة الحرارة ) .
- فالحرارة المثلى لإنزيمات الإنسان عند 37م .

### { الأحماض النووية }

أنظر شكل 42 - 4 صفحة 110

- تعتبر كمخزن للمعلومات الوراثية .
- تتكون من وحدات أساسية تسمى ( النيوكليوتيدات ) وهي ستة أنواع .
- تتركب هذه الوحدات كيميائياً من ( P ,N, O, H, C )
- يتركب النيوكليوتيد الواحد من ( مجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية وسكر رايبوز ) .
- للأحماض النووية نوعان هما :
- 1 - الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين (DNA) .
- 2 - الحمض النووي الرايبوزي (RNA) .
- ويتكون الحمض النووي DNA او RNA نتيجة اتحاد سلسلة من النيوكليوتيدات بحيث يرتبط سكر الرايبوز في نيوكليوتيد بمجموعة الفوسفات في نيوكليوتيد أخرى وتبقى القاعدة النيتروجينية خارج السلسلة لتكوين روابط هيدروجينية مع قواعد نيتروجينية أخرى في نيوكليوتيدات في سلسلة أخرى .

\* ملاحظة :

ادنيوسين ثلاثي الفوسفات ( ATP ) : هو نيوكليوتيد يحتوي على ثلاث مجموعات من الفوسفات . وهو المخزن للطاقة التي تستخدمها الخلايا . حيث تتحرر الطاقة عندما تتكسر الروابط بين مجاميع الفوسفات الثانية والثالثة .

## — الفصل الخامس —

### { الطاقة الخلوية }

### { كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة }

تستخدم المخلوقات الحية الطاقة للقيام بوظائفها الحيوية ولكن كيف تحصل عليها ؟

### { تحولات الطاقة }

\* قوانين الديناميكا الحرارية :

1 ( القانون الأول ( قانون حفظ الطاقة ) :

أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث بل تتحول من شكل لآخر .

2 ( القانون الثاني : انه عند تحول الطاقة من شكل لآخر فإنه يفقد ( يتحول ) جزء منها إلى طاقة حرارية . ( وعلى ذلك فكمية الطاقة القابلة للاستخدام تتناقص تدريجياً في السلسلة الغذائية ) .

\* ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية : أنظر شكل 2 - 5 صفحة 123

أ) المخلوقات ذاتية التغذية : هي التي تصنع غذائها بنفسها وهي إما ب :

1 ( البناء الضوئي : مثل النباتات التي تحول الطاقة الضوئية من الشمس إلى طاقة كيميائية .

2) ( البناء الكيميائي : مثل بعض المخلوقات التي تستخدم مركبات غير عضوية مثل (كبريتيد الهيدروجين) مصدراً للطاقة .

ب) المخلوقات غير ذاتية التغذية : مثل معظم المخلوقات الحية التي تحتاج إلى ابتلاع الطعام وهضمه للحصول على الطاقة .

### { عملية الأيض }

انظر شكل 3-5 صفحة 124

\* **عملية الأيض** : هي التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلية الحية .  
\* **مسار الأيض** : هي سلسلة التفاعلات الكيميائية التي تعد المواد الناتجة فيها مواد متفاعلة في التفاعل التالي .

\* **أنواع مسارات الأيض** : نوعان هما :

أ - **مسارات بناء** ( مثل عملية البناء الضوئي ) : تحتاج إلى طاقة ويتم فيها تحويل الجزيئات الصغيرة إلى جزيئات كبيرة ( حيث تستخدم الطاقة الضوئية في تحويل  $H_2O$  و  $CO_2$  إلى سكر جلوكوز و  $O_2$  .

ب - **مسارات هدم** : ( مثل التنفس الخلوي ) : يتحرر ( ينتج ) عنها طاقة ويتم تحويل الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة . ( حيث يستخدم الـ  $O_2$  في تحليل المواد العضوية ( الجلوكوز مثلاً) إلى  $H_2O$  و  $CO_2$  وينتج عن ذلك طاقة ) .

### { ATP وحدة الطاقة الخلوية }

للطاقة أشكال مختلفة ( ضوئية - ميكانيكية - حرارية - كيميائية ... الخ ) ويتم تخزين الطاقة في المخلوقات الحية على شكل طاقة كيميائية في مركب الـ ( ATP ) التي تستخدم في التفاعلات المتنوعة .

\* **تركيب جزيء الطاقة ATP (أدينوسين ثلاثي الفوسفات)** : انظر شكل 4-5 صفحة 125  
هو عبارة عن ينوكليوتيد يتكون من ( قاعدة نيتروجينية [أدينين] وسكر رايبوز و 3 مجموعات فوسفات ) .

\* **وظيفة جزيء الطاقة ATP** : انظر شكل 4-2 صفحة 51

عندما تنكسر الرابطة في جزيء ATP بين مجموعة الفوسفات الثالثة والثانية يتحرر جزء كبيره من الطاقة وينتج جزيء يسمى (ADP) أدينوسين ثنائي الفوسفات ومجموعة فوسفات حرة وعندما تنكسر الرابطة في جزيء ADP بين مجموعة الفوسفات الثانية والأولى يتحرر جزء قليل من الطاقة وينتج جزيء يسمى (AMP) أو أدينوسين أحادي الفوسفات . ومجموعة فوسفات حرة أخرى ونظراً لأن الطاقة الناتجة من هذا التفاعل قليلة فإن معظم التفاعلات الخلوية تتضمن جزيئات ATP, ADP

### { عملية البناء الضوئي }

- تحدث في المخلوقات ذاتية التغذية وفيها يتم صنع مركبات عضوية مثل السكر وتتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في البلاستيدات الخضراء حسب المعادلة التالية :

ضوء



- تتم عملية البناء الضوئي في مرحلتين هما :

- 1- **التفاعلات الضوئية** : تعتمد على الضوء ويتم فيها امتصاص الطاقة الضوئية و تحويلها إلى طاقة كيميائية على شكل ( ATP و NADPH )
- 2- **التفاعلات اللاضوئية** : لا تعتمد على الضوء بل تستخدم مركبات ( ATP و NADPH ) التي نتجت من التفاعلات الضوئية في إتمام باقي التفاعلات وصنع سكر الجلوكوز ومنه يتكون النشا والبروتينات والدهون والأحماض النووية .

## { المرحلة الأولى : التفاعلات الضوئية }

\* البلاستيدات الخضراء : أنظر شكل 5-5 صفحة 127

عضيات كبيرة تشبه القرص وتحتوي على جزيئين هما :

1 - الجزء الأول : الثايلاكويدات وهي مجموعة من الأغشية على شكل أكياس مترابطة في رزم تسمى الجراننا ( فيها تحدث التفاعلات الضوئية ).

2 - الجزء الثاني : اللحمه وهي سائل يملأ الفراغات المحيطة بالجراننا ( فيها تحدث التفاعلات اللاضوئية )

\* الأصباغ : هي جزيئات ملونة تمتص الضوء وتوجد في أغشية الثايلاكويدات في البلاستيدات الخضراء .

- يوجد أنواع مختلفة من الأصباغ كل نوع يمتص أطوالاً موجية محددة .

1 - الكلوروفيل بنوعيه ( A و B ) : يزداد إمتصاصه للطيف الضوئي المحصور بين الأزرق والبنفسجي . ويعكس الطيف الأخضر لذلك نشاهد الجزء المحتوى من النباتات على الكلوروفيل باللون الأخضر .

2- مجموعة الكاروتينات مثل ( صبغة بيتا كاروتين ) : تمتص الطيف في المناطق الخضراء والزرقاء وتعكسه في المناطق الصفراء والبرتقالية والحمراء ( مثل الموجوده في الجزر والبطاطا الحلوة ) .

- ملاحظة : أنظر شكل 7-5 صفحة 129

يمكن أن يظهر اللون الأصفر والأحمر والبرتقالي في الأوراق في فصل الخريف عندما يتحلل الكلوروفيل فتصبح الأصباغ الأخرى أكثر وضوحاً .

## { نقل الإلكترون }

ويتم ذلك على غشاء الثايلاكويد الذي يمتاز بمساحة سطح كبيرة توفر مساحة لازمة للاحتفاظ بأعداد كبيرة من الجزيئات الناقلة للإلكترون .

\* خطوات نقل الإلكترون : أنظر شكل 8-5 صفحة 131

1 - يوجد نظامان ضوئيان هما ( I و II ) .

2 - الطاقة الضوئية في النظام الضوئي II تحفز الإلكترونات .

3 - الطاقة الضوئية في النظام الضوئي II تحلل الماء إلى (إلكترون + أيون هيدروجين  $H^+$  (بروتون) + أكسجين  $O_2$  كنتاج غير مستخدم ) .

4 - تنتقل الإلكترونات المحفزة من النظام الضوئي II إلى جزيء مستقبل للإلكترون على غشاء الثايلاكويد .

5 - ينتقل الجزيء المستقبل للإلكترونات عبر سلسلة من النواقل إلى النظام الضوئي I.

6 - بوجود الضوء يقوم النظام الضوئي I بنقل الإلكترونات إلى بروتين يسمى فيرودوكسين ( يتم تعويض الإلكترونات المفقودة في النظام الضوئي I بالإلكترونات من النظام الضوئي II ) .

7 - ينقل بروتين فيرودوكسين الإلكترونات إلى ناقل الإلكترون  $NADP^+$  مكوناً الجزيء المخزن للطاقة  $NADPH$  .

\* الأسموزية الكيميائية :

يتم إنتاج جزيء ATP بالتزامن مع نقل الإلكترون بعملية تسمى الأسموزية الكيميائية .  
خطواتها :

1 - عند تحلل الماء تتراكم أيونات الهيدروجين  $H^+$  في الجانب الداخلي للثايلاكويد .

2 - نظراً لارتفاع تركيز أيونات  $H^+$  داخل الثايلاكويد وانخفاض تركيزها في اللحمه .

3 - تنتقل أيونات  $H^+$  إلى اللحمه عبر قنوات أيونية في الغشاء تسمى ( أنزيمات بناء الطاقة ) .

4 - تقوم أنزيمات بناء الطاقة بمساعدة أيونات  $H^+$  بتكوين جزيء ATP من جزيء ADP

## { المرحلة الثانية : التفاعلات اللاضوئية ( حلقة كالفن ) }

\* **خطواتها :** أنظر شكل 9 - 5 صفحة 133

1 - **الخطوة الأولى :** (عملية تثبيت الكربون):  $6CO_2 + 6$  جزيئات من سكر الرايبولوز ثنائي الفوسفات (خماسي الكربون) ← 6 جزيئات من مركب سداسي الكربون غير مستقر يتحلل إلى ← 12 جزيء ( ثلاثي الكربون) يسمى 3- حمض جلسرين أحادي الفوسفات (PGA - 3)

### 2- الخطوة الثانية :

يتحول (PGA - 3) بانتقال الطاقة إليه من ATP و NADPH إلى جزيء عالي الطاقة يسمى جلسير الدهيد 3 - الفوسفات (G3P) .

### 3- الخطوة الثالثة :

يخرج جزيئان من (G3P) من الحلقة ويتحدان معاً لتكون الجلوكوز ومنه تتكون مركبات عضوية أخرى مثل النشا والبروتينات وغيرها .

### 4 - الخطوة الرابعة :

تتحول العشرة المتبقية من (G3P) بواسطة أنزيم يسمى روبيسكو إلى ست جزيئات من سكر الرايبولوز - 5 - أحادي الفوسفات ← الذي يتحول إلى ست جزيئات من سكر الرايبولوز - 1,5 - ثنائي الفوسفات والتي تدخل في دور جديدة من حلقة كالفن حيث تتحد مع ست جزيئات من  $CO_2$  مره أخرى .

## { مسارات بديلة }

في البيئة التي لا يوجد فيها كمية كافية من الماء أو  $CO_2$  تقل قدرة النبات الذي يقوم بعملية البناء الضوئي على تحويل الطاقة الضوئية إلى كيميائية فيلجأ النبات إلى مسارات بديلة في عملية البناء الضوئي منها :

### \* نباتات C4 :

لها مسار يسمى مسار C4 مثل ( نبات قصب السكر والذرة ) وفيه يتم تثبيت  $CO_2$  وربطه مع مركبات رباعية الكربون بدلاً من ثلاثية الكربون وتغلق ثغورها في الأيام الحارة حيث يسمح هذا المسار باستهلاك كمية كافية من  $CO_2$  وتقليل فقدان الماء .

### \* نباتات CAM :

لها مسار يسمى أيض حمض كروسييلي (CAM) ويحدث في النباتات التي تختزن الماء وتعيش في الصحراء أو المستنقعات المالحة ومنها (الصبار - السحلب - الأناناس) وفيه يتم السماح لـ  $CO_2$  بالدخول إلى الأوراق ليلاً فقط في الجو البارد الرطب ثم تثبته في مركبات عضوية وفي النهار يتحرر ويدخل حلقة كالفن حيث يسمح هذا المسار باستهلاك كمية كافية من  $CO_2$  وتقليل فقدان الماء

## { التنفس الخلوي }

ومنه تحصل المخلوقات الحية على الطاقة وفيه تتحلل المركبات الكربونية مثل الجلوكوز إلى  $CO_2$  و  $H_2O$  وطاقة ( على شكل ATP) حسب المعادلة التالية : ( عكس البناء الضوئي ) .



- يمر التنفس الخلوي بمرحلتين هما : أنظر 11 - 5 صفحة 135

- 1 - **التنفس اللاهوائي ( التحلل السكري ) :** يحدث في السيتوبلازم ولا يتطلب وجود  $O_2$
- 2- **التنفس الهوائي :** يحدث في حشوة الميتوكوندريا ويتطلب وجود  $O_2$  ويشمل ( حلقة كريبس ونقل الإلكترون ) .

## { التحلل السكري }

يتم في السيتوبلازم بمعزل عن  $O_2$  حيث يتحلل جزيء الجلوكوز إلى جزيئين من بيروفيت ويتكون جزيئان من ATP وجزيئان من NADH .

\* **خطوات التحلل السكري :** انظر شكل 12 - 5 صفحة 136

- 1 - تنفصل مجموعتان من الفوسفات من جزيئين من ATP وترتبط مع الجلوكوز ( السداسي الكربون ) الذي يتحلل إلى مركبين كل منهما ثلاثي الكربون .
  - 2 - بعد إضافة مجموعتا الفوسفات تتحد الإلكترونات وأيونات  $H^+$  مع جزيئين من  $NAD^+$  فيتحول إلى جزيئات من  $NADH$  .
  - 3 - تتحول المركبات ثلاثية الكربون إلى جزئين من بيروفيت وينتج عن ذلك أربع جزيئات ATP
- ملاحظات :**

- 1 - جزيء  $NAD^+$  يشبه  $NADP^+$  ( الذي يستخدم في البناء الضوئي ) فكلاهما ناقل للإلكترون .
- 2 - لازالت معظم الطاقة مخزنة في البيروفيت .

### { التنفس الهوائي }

#### { حلقة كريس ( دوره TCA ) حلقة حمض الستريك }

تحدث في حشوة الميتوكوندريا بوجود  $O_2$  حيث يتحول البيروفيت عبر سلسلة من التفاعلات إلى  $CO_2$  .

\* **خطوات حلقة كريس :** انظر شكل 13 - 5 صفحة 137

- 1 - قبل أن تبدأ حلقة كريس يتفاعل البيروفيت مع مرافق إنزيم - أ (  $CO-A$  ) وينتج مركب وسطي ثنائي الكربون يسمى اسيتيل مرافق الإنزيم - أ ويتحرر غاز  $CO_2$  ويتحول  $NAD^+$  إلى  $NADH$  ثم يدخل اسيتيل مرافق الإنزيم - أ إلى الميتوكوندريا .
- 2 - تبدأ حلقة كريس بارتباط اسيتيل مرافق الإنزيم - أ مع مركب رباعي الكربون وينتج عن ذلك مركب سداسي الكربون يسمى ( حمض الستريك )
- 3 - يتحلل حمض الستريك في سلسلة الخطوات اللاحقة من التفاعل إلى ( جزيئين من  $CO_2$  + جزيء واحد  $ATP$  + 3 جزيئات  $NADH$  + جزيء واحد  $FADH_2$  ) ثم يعاد تكوين حمض الستريك ليبدأ في حلقة جديدة .

**ملاحظات :**

- 1 - جزيء  $FAD$  يشبه جزيء  $NAD^+$  وجزيء  $NADP^+$  فجميعها ناقلة للإلكترون .
- 2 - الناتج النهائي من جزيء واحد سكر ( 2 بيروفيت ) هو: 6 جزيئات  $CO_2$  + جزيئات  $ATP$  + 8 جزيئات  $NADH$  + جزيئات  $FADH_2$  .

### { سلسلة نقل الإلكترون }

تعد الخطوة النهائية في التنفس الهوائي وفيها يتم إنتاج معظم جزيئات ATP

\* **خطواتها :** انظر شكل 14 - 5 صفحة 138

- 1- تتحرر الإلكترونات من نواقل الإلكترون  $NADH$  و  $FADH_2$  التي تتحول إلى  $NAD^+$  و  $FAD$  وتنتقل من بروتين لآخر على طول غشاء الميتوكوندريا .
- 2- وتحرر أيونات الهيدوجين ( $H^+$ ) ويتم ضخها من الحشوة إلى الحيز بين الغشاء عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندريا .
- 3- وبالأسموزية الكيميائية ( المشابهة للأسموزية في البناء الضوئي ) تعود أيونات  $H^+$  من الحيز بين الغشائي ( الأكثر تركيزاً من  $H^+$  ) إلى الحشوة ( الأقل تركيزاً من  $H^+$  ) مروراً بجزيئات أنزيم بناء  $ATP$  .
- 4 - يعد الأكسجين  $O_2$  المستقبل النهائي للإلكترون حيث تنتقل الإلكترونات والبروتونات إلى  $O_2$  لإنتاج الماء .

5 - أخيراً ينتج عن عملية نقل الإلكترون 24 جزيء من ATP ( كل جزيء NADH يعطي 3 جزيئات ATP وكل جزيء FADH<sub>2</sub> يعطي جزيئين ATP ) .  
وإجمالاً في المخلوقات حقيقية النواة كل جزيء جلوكوز يعطي 36 جزيء ATP .

### { التنفس اللاهوائي }

- او ما يسمى ( التحليل السكر ) أو ( التخمر ) يحدث في السيتوبلازم بمعزل عن الأكسجين وينتج عنه فقط جزيئات ATP ويستهلك في ذلك جزيئات NAD<sup>+</sup> ، لذلك بانتهاء جزيئات NAD<sup>+</sup> يتوقف التفاعل .  
- وللتخمير نوعان هما :

\* **تخمير حمض اللاكتيك ( حمض اللبن )** : انظر شكل 15 - 2 صفحة 65


- يحدث في العضلات وفي بعض المخلوقات الدقيقة ( في تخمير اللبن والجبن والقشطة ) .  
- في العضلات الهيكلية وعند القيام بمجهود إضافي يتم تحويل البيروفيت إلى حمض لاكتيك بمعزل عن الأكسجين فيتجمع حمض اللاكتيك في العضلة مسبباً إجهادها

\* **التخمير الكحولي** : انظر شكل 15 - 5 صفحة 139

يحدث في فطر الخميرة وبعض أنواع البكتيريا وهو نفس تخمير حمض اللاكتيك ولكن النتائج هنا هو كحولي ايثيلي بدلاً من حمض اللاكتيك .

### { عملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي }

هي أهم المسارات الأيضية وهي عمليتان متعاكستان فالمواد الناتجة من عملية البناء الضوئي هي مواد متفاعلة في عملية التنفس الخلوي والعكس بالعكس حسب المعادلة التالية: انظر شكل 16-5 صفحة 141



### — الفصل السادس —

#### { التكاثر الخلوي }

#### { النمو الخلوي }

تنمو الخلايا إلى أقصى حجم لها ثم تتوقف عن النمو ثم تنقسم .

#### { حدود حجم الخلية }

1 ملم

- يبلغ قطر معظم الخلايا أقل من 100µm ( 100نانومتر ) ( =  $\frac{1}{1000000}$  نانومتر )

فلماذا أحجمها صغير؟؟

\* **نسبة مساحة السطح إلى الحجم** : انظر شكل 1 - 6 صفحة 154

- الذي يحدد حجم الخلية هو نسبة مساحة سطحها ( الذي يغطيه الغشاء البلازمي ) إلى حجمها .  
- كلما كبر حجم الخلية قلت مساحة سطحها إلى حجمها وبالتالي وجدت صعوبة في الحصول على الغذاء والتخلص من الفضلات وكلما صغر حجم الخلية زادت مساحة سطحها إلى حجمها وبالتالي تستطيع البقاء بسهولة .

#### \* **الإتصال الخلوي** :

وهو حاجة بروتينات التواصل الخلوي للحركة بداخل الخلية فكلما كبر حجم الخلية قد تقل سرعة إيصال الإشارات وحركة المواد المرسله للعضيات المختلفة للقيام بوظائفها على أتم وجه .

## { دورة الخلية }

- عندما تصل الخلية إلى أقصى حجم لها فإنها تنقسم (تتكاثر) عبر دورة نمو وانقسام تسمى دورة الخلية .

- دورة الخلية تمر بثلاث مراحل هي : أنظر شكل 2-6 صفحة 156

1- الطور البيني : يتضمن نمو الخلية وتضاعف مادتها الوراثية (DNA) وينقسم إلى ثلاث مراحل فرعية .

2- الانقسام المتساوي : فيه تنقسم نواة الخلية ومادتها الوراثية وينقسم إلى أربع مراحل فرعية .  
3- انقسام السيتوبلازم : فيه ينقسم السيتوبلازم مكوناً خلية جديدة حيث يبدأ قبل نهاية الانقسام المتساوي .

- تختلف فترة دورة الخلية على حسب نوع الخلايا فبعضها يستغرق 8 دقائق وبعضها يوم واحد وبعضها عام كامل . (ولكن الغالبية ما بين 12 - 24 ساعة تقريباً) .

\*ملاحظة : الخلايا حقيقية النواة تمر بدورة الخلية للتكاثر إما بدائية النواة فتتكاثر بطريقة تسمى ( الانشطار الثنائي ) .

## { مراحل الطور البيني }

يتضمن ثلاث مراحل فرعية هي :

أ- مرحلة النمو الأول (G1) : هي الفترة ما بعد انقسام الخلية مباشرة وفيها تنمو الخلية وتنتهي (تستعد) لتضاعف DNA . (بعض الخلايا مثل الخلايا العصبية والعصبية تتوقف عند هذه المرحلة .

ب- مرحلة بناء وتضاعف DNA (S) : هي الفترة التي يتم فيها نسخ المادة الوراثية .  
- الكروموسوم : هو تراكيب تحتوي على المادة الوراثية DNA التي تنتقل من جيل لآخر من الخلايا .

- الكروماتين : هي المادة الوراثية DNA الممتدة على شكل خيوط رفيعة داخل النواة والتي تظهر عند صبغ الخلية . أنظر شكل 3-6 صفحة 157

ج- مرحلة النمو الثاني (G2) : وفيها تستعد الخلية للانقسام المتساوي لانقسام نواتها حيث يبدأ بناء البروتين لإنتاج الأنبيبات الدقيقة اللازمة لعملية الانقسام .

## { الانقسام المتساوي و انقسام السيتوبلازم }

### { الانقسام المتساوي }

- يحدث في الخلايا الجسمية ويتضمن 4 مراحل فرعية هي :

أ- المرحلة الأولى (الطور التمهيدي) : أنظر شكل 4-6 صفحة 159 و 5-6 صفحة 160 ويحدث فيها الآتي :

- 1- ترتبط الكروماتيدات مع بعضها وتتكثف إلى كروموسومات .
- الكروماتيد الشقيق : هو كل نصف من الكروموسوم والذي يحمل نسخة متطابقة من DNA .
- السنترومير : هو التركيب الذي في منتصف الكروموسوم والذي يجمع بين الكروماتيدان الشقيقان .
- 2- ثم تختفي النوية .
- 3- ثم تتكون الخيوط المغزلية (وهي أنبيبات دقيقة)
- 4- ثم تتكون المريكزات التي تنتقل إلى قطبي الخلية (عبارة عن أنبيبات توجد الخلية الحيوانية فقط) .
- 5- ثم يختفي الغلاف النووي .
- 6- ثم ترتبط الخيوط المغزلية في طرف مع الكروماتيدات الشقيقة عند السنتروميرات وفي الطرف الآخر بالمريكزات عند قطبي الخلية . (وبالتالي تضمن كل خلية الحصول على نسخة من المادة الوراثية DNA) .

ب - المرحلة الثانية ( الطور الاستوائي ) : أنظر شكل 7-6 صفحة 161 وفيه يتم سحب الكروماتيدات الشقيقة بواسطة الخيوط المغزلية ( للجهاز المغزلي ) إلى مركز الخلية ثم ترتيبها واصطفافها على خط استواء الخلية .

ج - المرحلة الثالثة ( الطور الإنفصالي ) :

تتباع الكروماتيدات وتسحب إلى أقطاب الخلية . وذلك بسبب أن الخيوط المغزلية تقصر فتسحب الكروماتيدات الشقيقة من منطقة السنتروميير مما يؤدي إلى انفصالها إلى كروموسومين متطابقين ثم تسحب الكروموسومات إلى أقطاب الخلية بواسطة الخيوط المغزلية والبروتينات الحركية .

د - المرحلة الرابعة والنهائية ( الطور النهائي ) : أنظر شكل 8-6 صفحة 163 يحدث فيها الآتي :

- 1- تصل الكروموسومات إلى أقطاب الخلية وتقل كثافتها .
- 2- ثم يبدأ تكون غشائين نوويين .
- 3- ثم تبدأ النويات في الظهور .
- 4- ثم يتحلل الجهاز المغزلي ( حيث يستخدم لبناء أجزاء متنوعة من الهيكل الخلوي ) .

### { انقسام السيتوبلازم }

وفيه ينقسم السيتوبلازم وينتج عن ذلك خليتان تحتويان على نواتين متطابقتين .  
- في الخلية الحيوانية : يحدث ذلك بالتخصر وهو بسبب ضغط الأنبيبات الدقيقة على السيتوبلازم

- في الخلية النباتية : لأن غشائها البلازمي مغطى بجدار صلب فيحدث ذلك بتكوين (الصفیحة الوسطی) ثم تتكون الجدر الخلوية على جانبي الصفیحة الوسطی .

### { تنظيم دورة الخلية }

تنظم البروتينات الحلقية ( السايكلينات ) دورة الخلية الطبيعية .

### { دورة الخلية الطبيعية }

يتحكم في دورة الخلية آلية تتضمن بروتينات وأنزيمات خاصة .

\* دور البروتينات الحلقية ( السايكلينات ) : أنظر شكل 10-6 صفحة 165

- توجد بروتينات تسمى البروتينات الحلقية وأنزيم يسمى الأنزيم المفسر المعتمد على البروتين الحلقي ( أنزيم CDK ).

- ارتباط البروتين الحلقي مع أنزيم CDK يرسل إشارات .

- هذه الإشارات تنظم بدء وانتهاء مراحل دورة الخلية المختلفة ( حيث يرتبطان معاً لإرسال إشارة لبدء طور النمو الأول G1 مثلاً ويرتبطان لإرسال إشارة لبدء تضاعف DNA وهكذا يشكلان نظام نقاط فحص لضبط النوعية في دورة الخلية ) .

### { دورة الخلية غير الطبيعية }

عندما يفشل نظام نقاط الفحص في دورة الخلية في تنظيم دورة الخلية عندها لا تستجيب الخلايا لآليات التنظيم وتنتج حالة تسمى ( السرطان ) .

- السرطان هو انقسام الخلية بشكل غير منظم . هذا يؤدي إلي تكاثرها ومزاحمتها و ضغطها على خلايا النسيج وبالتالي توقف النسيج عن العمل .

\* أسباب مرض السرطان :

- يسبب ذلك الطفرات أو التغيرات في جينات الـ DNA الذي يسيطر على إنتاج البروتينات ( عادة يتم إصلاح التغيرات الجينية أو التلف بأنظمة إصلاح ولكن إذا فشل نظام الإصلاح تكون النتيجة هي تكون الخلايا السرطانية ) .

- هنالك مواد وعوامل تسبب السرطان تسمى المواد المسرطنة (المسرطنات) .
  - يساعدنا على التقليل من خطر الإصابة بالسرطان هو تجنب التعرض للمسرطنات .
- أمثلة :**

- 1- المواد الكيميائية مثلاً الاسبست حيث يتم إزالتها من المباني وأماكن العمل .
- 2- التدخين بالامتناع عنه.
- 3- الإشعاعات فوق البنفسجية من الشمس باستخدام مستحضرات طبية .
- 4- الأشعة السينية ( X-Ray ) : بلبس معطف الرصاص لعامل الأشعة .

### \* وراثه السرطان :

- يتطلب تحول الخلايا غير الطبيعية إلى خلايا سرطانية حدوث تغير واحد في المادة الوراثية DNA
- بتقدم السن يزداد حدوث هذه التغيرات .
- والفرد الذي يرث تغيراً واحداً أو أكثر من أحد والديه يكون معرضاً للإصابة بالسرطان بنسبة أعلى من الشخص الذي لا يرث هذه التغيرات .

### { موت الخلية المبرمج }

هو موت الخلية وفق نظام محدد . وتتم في جميع الخلايا الحيوانية .

**أمثلة :**

- 1- في الإنسان أثناء نمو يد الإنسان أو قدمه تحتل الخلايا الفراغات بين الأصابع ويمر هذا النسيج بعملية الموت المبرمج طبيعياً في الوقت الملائم فلا يتكون النسيج .
- 2- في النبات مثل موت الخلايا الذي ينتج عنه تساقط الأوراق فيفصل الخريف
- 3- موت الخلايا التي تتلف مادتها الوراثية والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلايا سرطانية.

### { الخلايا الجذعية }

- في المخلوقات الحية عديدة الخلايا كل مجموعة من الخلايا متخصصة في وظائف محددة (الجلد - القلب ..... الخ)

- **الخلايا الجذعية :** أنظر شكل 12 - 6 صفحة 169

هي خلايا غير متخصصة تنمو لتصبح خلايا متخصصة إذا وضعت في ظروف مناسبة . ويتمكن أن تبقى لعدة سنوات وهي تنقسم . ولها نوعان هما :

#### أ- الخلايا الجذعية الجنينية :

هي كتلة الخلايا التي عددها ( 100 - 150 خلية ) والناجمة بعد تلقيح الحيوان المنوي للبويضة . وحين تفصل خلية من هذه الكتلة يمكن أن تنمو وتتخصص إلى أنسجة وأعضاء مختلفة .

- **ملاحظة :** أثارت أبحاث الخلايا الجذعية الجنينية الكثير من الجدل بسبب اعتبارات أخلاقية حول مصدر هذه الخلايا .

#### ب- الخلايا الجذعية المكتملة النمو :

هي خلايا جذعية مكتملة النمو توجد في الأنسجة المختلفة للحفاظ على النسيج أو إصلاحه . ( المولود الجديد لديه خلايا جذعية مكتملة النمو لذلك يعتبر مصطلح مضلل في بعض الأحيان )

**\* أمثلة على إستخداماتها :**

- 1- عام 1999م استخدم باحثون خلايا جذعية عصبية لعلاج نسيج عصبي تالف لفأر .
  - 2- عام 2000م قام فريق آخر باستخدام خلايا جذعية بنكرياسية لإستعادة وظيفة بنكرياس لفأر مصاب بالسكر .
- **ملاحظة :** تثير أبحاث هذا النوع من الخلايا جدلاً أقل من الخلايا الجذعية الجنينية بسبب إمكانية الحصول على موافقة المتبرعين بها .

## — الفصل السابع —

### { التكاثر الجنسي والوراثة }

#### { الانقسام المنصف (الاختزالي) }

- يحدث في الخلايا الجنسية وينتج عنه الأمشاج (الجاميتات) أحادية المجموعة الكروموسومية (1n).

#### { الكروموسومات والعدد الكروموسومي }

- كل إنسان يحمل صفات وراثية أنتقلت إليه من والديه (لون الشعر - الطول - لون العيون.... الخ)  
- الذي يحدد الصفات الوراثية هو المادة الوراثية DNA الذي يتكون من مئات من الجينات هذه الجينات تتحكم في الصفات الوراثية .

\* **الكروموسومات المتماثلة** : أنظر شكل 1-7 صفحة 182

هو زوج من الكروموسومات إحداهما من الأب والآخر من الأم يحمل جينات صفات محددة على الموقع نفسه .  
- تحتوي خلية جسم الإنسان على 46 كروموسوم على شكل أزواج ( 23 زوج ) في كل زوج كروموسومين أحدهما من الأب والآخر من الأم .  
- وكل كروموسوم جيناته تحمل الصفات نفسها وفي الموقع نفسه . ولها نفس الطول وموقع السنتروميير (مثلاً يقع جين التحكم في شحمة الأذن في الموقع نفسه على الكروموسوم المماثل).

#### \* **الخلايا الأحادية والثنائية المجموعة الكروموسومية :**

أ - الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية (1n) : هي الخلية التي تحتوي على نصف العدد من الكروموسومات ، مثل الأمشاج (الجاميتات) التي ينتجها الإنسان سواء (حيوان منوي او بويضة) حيث يحتوي كل جاميت على نصف العدد من الكروموسومات (23 كروموسوم)  
ب - الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n) : هي الخلية التي تحتوي العدد الكامل من الكروموسومات مثل اللاقحة التي تنتج عن اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة بعملية الإخصاب وتحتوي على (46 كروموسوم) أحدهما من الأب والآخر من الأم

\* **ملاحظات :** انظر شكل 2-7 صفحة 183

1- ينتج عن الانقسام المنصف الأمشاج أحادية المجموعة الكروموسومية (1n)  
2- ويحدث في الخلايا الجنسية (التراكيب الجنسية) وهو نوع من الانقسام الخلوي تُختزل فيه عدد الكروموسومات إلى النصف وذلك بانفصال الكروموسومات المتماثلة .

\* **مراحل الانقسام المنصف (الاختزالي) :** مرحلتين هما :

#### { المرحلة الأولى من الانقسام المنصف I }

- قبل الدخول في الانقسام المنصف تدخل الخلية في (الطور البييني) وفيه تنمو الخلية ويتضاعف الـ DNA .  
- ثم تمر المرحلة الأولى من الانقسام المنصف بأربع مراحل (أطوار) فرعية هي :

\* **الطور التمهيدي الأول I** : أنظر شكل 3-7 و 4-7 صفحة 184

تحدث نفس الخطوات التي في الطور التمهيدي للانقسام المتساوي ولكن يضاف إليها التالي :

- 1 - عندما تتكثف الكروموسومات تكُون أزواج بعملية ( التصلب ) أو التشابك حيث يرتبط كل كروموسومين على امتداد طوليهما .
- 2 - ثم تحدث عملية العبور الوراثي أو الجيني (هي عملية تبادل الاجزاء بين الكروموسومات المتماثلة).

**\* الطور الاستوائي الاول I :** أنظر شكل 5- 7 صفحة 186

- تحدث نفس الخطوات التي في الطور الاستوائي للانقسام المتساوي ولكن هنالك فرق هو :
- في الانقسام المتساوي تصطف الكروموسومات المفردة التي تحتوي على كروماتيدات شقيقة على طول خط استواء الخلية .
- في الانقسام المنصف تصطف الكروموسومات المتماثلة على صورته أزواج .

**\*الطور الانفصالي الاول I:** أنظر شكل 5- 7 صفحة 186

- تحدث نفس الخطوات التي في الطور الانفصالي للانقسام المتساوي ولكن هنالك فرق هو :
- في الانقسام المتساوي تنفصل الكروماتيدات الشقيقة إلى أقطاب الخلية .
- في الانقسام المنصف يُسحب كل زوج كروموسومي إلى أقطاب الخلية ويبقى كل واحد من الكروموسومات المتماثلة مكون من كروماتيدين شقيقين .

**\* الطور النهائي الأول I :** أنظر شكل 5- 7 صفحة 186

- تحدث نفس الخطوات التي في الطور النهائي للانقسام المتساوي ولكن هنالك فرق هو :
- انه يبقى كل كروموسوم مكون من كروماتيدين شقيقين ولكن قد تكون الكروماتيدات الشقيقة غير متطابقة بسبب عملية العبور الوراثي التي حدثت في الطور التمهيدي .

**\* ملاحظات :**

- 1- تستمر العملية وتحدث مرحلة انقسام السيتوبلازم كالتالي تحدث في الانقسام المتساوي ( بالتخصر في الخلية الحيوانية وبالصفحة الوسطى في الخلية النباتية ).
- 2- قبل الدخول في المرحلة الثانية من الانقسام المنصف II تدخل الخلية في الطور البيني ولكن لا يتضاعف فيها الـ DNA .

## { المرحلة الثانية من الانقسام المنصف II }

**\* مراحل هذا الانقسام :** أنظر شكل 5- 7 صفحة 186


- تحدث نفس المراحل التي في الانقسام المتساوي : وهي
- 1- تمهيدي ثاني II 2- استوائي ثاني II 3- انفصال ثاني II 4- نهائي ثاني II
- ولكن لأن الـ DNA لم يتضاعف يكون الناتج هو 4 خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية (1n)

**\*الانقسام المنصف والتنوع الوراثي :** أنظر شكل 6- 7 صفحة 189

- كلما كان ترتيب الكروموسومات على خط استواء الخلية مختلف نتجت أربع أمشاج ذات مجموعات مختلفة من الكروموسومات .
- ويحدث التنوع الوراثي أيضاً نتيجة العبور الوراثي ثم ينتج التنوع الوراثي عن عملية الإخصاب .

## \* للمقارنة بين الانقسام المنصف والانقسام المتساوي : أنظر جدول 1 - 7 صفحة 188

الانقسام المنصف والانقسام المتساوي	
الانقسام المتساوي	الانقسام المنصف
تحدث مرحلة واحدة في أثناء الانقسام المتساوي.	تحدث مرحلتان في أثناء الانقسام المنصف: المرحلة الأولى والثانية.
يحدث تضاعف DNA في أثناء الطور البيئي.	يتضاعف DNA مرة واحدة قبل المرحلة الأولى من الانقسام المنصف.
لا يحدث تشابك أو تصالب بين الكروموسومات المتماثلة.	تحدث عملية التصالب بين الكروموسومات المتماثلة في أثناء الطور التمهيدي I.
ينتج عن الانقسام خليتان متطابقتان في كل دورة خلية.	ينتج عن الانقسام أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية ( $1n$ ) في كل دورة خلية.
الخلايا الجديدة متطابقة وراثياً.	الخلايا الجديدة غير متطابقة وراثياً بسبب عملية العبور الجيني.
يحدث الانقسام المتساوي في الخلايا الجسمية فقط.	يحدث الانقسام المنصف في الخلايا الجنسية.
يدخل الانقسام المتساوي في النمو وتعويض الخلايا التالفة.	يدخل الانقسام المنصف في إنتاج الأمشاج وتوفير التنوع الوراثي في المخلوقات الحية.



### \*مقارنة بين التكاثر الجنسي واللاجنسي :

- تتكاثر بعض المخلوقات لاجنسياً والبعض الآخر جنسياً والبعض الآخر يحدث فيه كلا النوعين .  
 1- في التكاثر اللاجنسي : يرث الفرد نفس صفات الأم فنتج أفراد مطابقة للأم .  
 2- في التكاثر الجنسي : ترث الأفراد الناتجة صفات من الأب ومن الأم وهذا يؤدي إلى إنتاج سلالة جديدة وتنوع وراثي .


## { الوراثة المندلية }

### { كيف بدأ علم الوراثة }

- \* **علم الوراثة** : هو العلم الذي يدرس انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء .  
 - عام 1866م اختار مندل نبات البازلاء لدراسة الوراثة عليه للأسباب التالية :  
 1- سهولة زراعته ونموه وإنتاجه المستمر لأفراد تحمل شكلاً واحداً من الصفة .  
 2- يتكاثر بالتلقيح الذاتي ( الأمشاج المذكر تلقح الأمشاج المؤنثة في الزهر نفسها )  
 3- يمكن أن يتكاثر بالتلقيح الخلطي يدوياً .

## { وراثة الصفات }

\* **تجربة مندل** : أنظر شكل 7-7 صفحة 191



### \* الملاحظات والاستنتاجات من التجربة :

- 1- أن كل صفة لها شكلان يتحكم في كل شكل عامل يسمى ( الجين المتقابل).
- 2- **الصفة السائدة** : هي الصفة التي ظهرت في الجيل الأول F1 ( الجين المسئول عنها هو الجين السائد).
- 3- **الصفة المتنحية**: هي الصفة التي لم تظهر في الجيل الأول F1 ( الجين المسئول عنها هو الجين المتنحي )
- 4- جين الصفة السائدة يرمز له بأول حرف من الكلمة الانجليزية التي تدل عليه ( حرف كبير Y وجين الصفة المتنحية بالحرف نفسه ولكنه ( حرف صغير y).
- 5- كل صفة تمثل بجينين متقابلين أي بحرفين ويسمى ( الطراز الجيني ) وهو المسئول عن تكوين الطراز الشكلي ( المظهري ) وهي الصفة التي نراها بالعين .  
 [ لايشير الطراز الشكلي دائماً إلى نوع الجينات فالبذور الصفراء لها طرازان جينيان ( YY ) أو ( Yy ) .
- 6- **متماثل الجينات ( النقي )** : هو المخلوق الذي يحمل زوجاً من الجينات المتقابلة المتشابهة لصفة محددة ( أما سائدان YY أو متنحيان yy).
- 7- **غير متماثل الجينات ( الهجين أو الخليط )** : هو المخلوق الذي يحمل زوجاً من الجينات المتقابلة المختلفة لصفة محددة ( احدهما سائد والآخر متنحي Yy).

**\* قانون انعزال الصفات :** أنظر شكل 8 - 7 صفحة 193

[ أن كل صفة تمثل بزواج من الجينات المتقابلة ينفصلان ( ينعزلان ) عند الانقسام المنصف بحيث يحتوي كل مشيج ( جاميت ) على جين واحد فقط من هذا الزوج ] .  
- تتحد الجينات المتقابلة مرة أخرى عند الإخصاب .

**\* التلقيح أحادي الصفة :** أنظر شكل 9 - 7 صفحة 194

وهي عملية التلقيح التي يحدث فيها التزاوج بين جينات صفة واحدة لنباتين مختلفين .  
- في الجيل الأول F1 نتجت بذور صفراء هجين ( Yy ) .  
- في الجيل الثاني F2 عندما قام بالتلقيح الذاتي نتجت بذور صفراء وخضراء بنسبة ( 3 : 1 ) والطرز الجينية المحتملة هي YY , Yy , yy بنسبة ( 1 : 2 : 1 ) .

**\* التلقيح ثنائي الصفة :** أنظر شكل 10 - 7 صفحة 195

وهي عملية التلقيح التي يحدث فيها التزاوج بين جينات صفتين أو أكثر لنباتين مختلفين .  
- حيث قام مندل بتلقيح بازلاء بذورها صفراء مستديرة ( نقية ) طرازها الجيني YY RR مع بازلاء بذورها خضراء مجعدة ( نقية ) طرازها الجيني yy rr .  
فنتج الجيل الأول بازلاء بذورها صفراء مستديرة ( هجين ) طرازها الجيني YyRr .  
- صفة اللون الأصفر سائدة على الأخضر وصفة الاستدارة سائدة على المجعدة .

**\* قانون التوزيع الحر:** أنظر إلى شكل 12 - 7 صفحة 196

إذا تزاوج فردان يختلفان في أكثر من زوج من الصفات المتقابلة فإن كل زوج من الجينات الخاصة بهذه الصفات يتوزع توزيعاً حراً أو مستقلاً ( عشوائياً ) عند تكوين الجاميتات ( الأمشاج ) .  
- استنتج مندل هذا القانون بعد ما لاحظ التالي :  
1- لاحظ مندل أن صفة الاستدارة ليست ملازمة للون الأصفر حيث ظهرت بذور خضراء مستديرة .  
2- لاحظ مندل أن صفة التجعد ليست ملازمة للون الأخضر حيث ظهرت بذور صفراء مجعدة .  
3- إذاً كل صفة تتوزع حرة ( مستقلة ) عن الأخرى .

**{ مربع بانيت }**

الذي وضعه الدكتور ريجينالد بانيت عام 1900 هـ حيث سهل تتبع الطرز الجينية المحتملة .

**\*مربع بانيت - التلقيح أحادي الصفة :** أنظر شكل 11 - 7 صفحة 196

لتجربة استطاعة ثني اللسان .

**\*مربع بانيت - التلقيح ثنائي الصفة :** أنظر شكل 12 - 7 صفحة 196

**{ الاحتمالات في الوراثة }**

- على حسب مبدأ الاحتمالات . قد لا تتطابق البيانات الحقيقية مع النسب المتوقعه .  
- لذلك لم تكن نتائج مندل مساوية تماماً للنسبة ( 1 : 3 : 3 : 9 ) في شكل 12 - 7 صفحة 196 ومع ذلك فإن عدد كبيراً من الأبناء يطابقون النتائج المتوقعة .

**{ ارتباط الجينات وتعدد المجموعات }**

يعد عبور الجينات ( العبور الجيني ) مصدراً للتنوع الوراثي .

## { التراكيب الجينية }

### \*التراكيب الجينية الجديدة :

هو مزيج من الجينات التي تنتج عن العبور الجيني والتوزيع الحر لها .  
- يمكن حسابها بهذه المعادلة : (  $2^n$  ) حيث n : عدد أزواج الكروموسومات .  
أمثلة :

- 1- نبات البازلاء ( تحتوي على 7 أزواج من كروموسومات  $2^7 = 128$  للمشيح الذكري + 128 للأنثوي إذا النتائج (  $128 \times 128$  ) أو ( 16384 ) .
- 2- الإنسان (  $2^{23} \times 2^{23}$  ) أو ( أكثر من 70 ترليون ) .

### { ارتباط الجينات }

أنظر شكل 13 - 7 صفحة 199

\*الجينات المرتبطة : هي الجينات التي تقع بالقرب من بعضها على الكروموسوم نفسه .  
- عادة تنتقل هذه الجينات معاً ( كقطعة واحدة ) أثناء الانقسام المنصف لذلك ( لا ينطبق عليها قانون مندل الثاني [ التوزيع الحر ] )  
- أحياناً لا تنتقل معاً بل يمكن أن تنفصل أثناء العبور الوراثي في الانقسام المنصف

### \* خرائط الكروموسومات : أنظر شكل 14 - 7 صفحة 199

- خريطة الكروموسومات هي ترتيب الجينات على الكروموسوم .
- أول خريطة كانت عام 1913م لذبابة الفاكهة.
- يتم رسم الخريطة باستخدام بيانات العبور الجيني .
- كلما زاد تكرار حدوث عملية العبور الوراثي ازداد تباعد الجينات عن بعضها .
- وكلما ازدادت التباعد بين الجينات ازدادت نسبة عملية العبور .
- وحدة خريطة واحدة : هي المسافة بين جينين على الكروموسوم .

## { تعدد المجموعة الكروسومية }

### \*المخلوقات متعددة المجموعة الكروسومية :

هو المخلوق الذي تحتوي خلاياه على مجموعة كروموسومية أو أكثر إضافية على المجموعة الثنائية التي يحملها . 15 - 7 صفحة 200  
أمثلة :

- 1- ديدان الأرض والأسماك (  $3n$  ) ولكن في الإنسان يعد ذلك قاتلاً .
- 2- القمح (  $6n$  ) -3 الشوفان (  $6n$  ) -4 قصب السكر (  $8n$  )
- ولوحظ أن النباتات متعددة المجموعة الكروموسومية كبيرة في الحجم وأكثر صلابة وحيوية .

## — الفصل الثامن —

### { الوراثة المعقدة والوراثة البشرية }

### { الأنماط الأساسية لوراثة الإنسان }

يمكن توضيح وراثة صفة ما لعدة أجيال بواسطة مخطط السلالة .

### { اختلالات وراثية متنحية }

أنظر جدول 1-8 صفحة 214

\*الصفة المتنحية : تظهر إذا كان الفرد متمائل الجينات المتنحية لتلك الصفة .  
( كلا الجينين متنحيين ) ولا تظهر إذا كان يحمل على الأقل جين سائد لتلك الصفة .  
\* حاملاً للصفة : هو الفرد الذي يكون غير متمائل الجينات لاختلال وراثي متنح ( يحمل جين سائد وآخر متنحي للصفة ) لا تظهر عليه الأعراض ولكنه حامل للصفة .

\* أمثلة على اختلالات وراثية متنحية : أنظر جدول 2-8 صفحة 215  
 أ - التليف الكيسي  
 ج - الجلاكتوسيميا  
 ب - المهاق  
 د - مرض تاي - ساكس

### { اختلالات وراثية سائدة }

هي الإختلالات التي سببها جينات سائدة .  
 إذا الشخص السليم هو الذي تكون جيناته المتماثلة لهذه الصفة متنحية .

\* أمثلة على اختلالات وراثية سائدة : أنظر جدول 3-8 صفحة 216  
 أ - مرض هنتجتون  
 2- عدم نمو الغضروف ( القمأة )

### { مخطط السلالة }

\* مخطط السلالة : أنظر شكل 1-8 صفحة 217

هو مخطط يبين تاريخ العائلة يستخدم لدراسة الأنماط الوراثية لصفة محددة عبر أجيال عدة .  
 ويمكن استخدامه لتوقع الاختلالات في الأبناء القادمين .

\* طريقة اعداد المخطط : أنظر شكل 1-8 صفحة 217

- 1 - يمثل الذكور بمربعات والإناث بدوائر .
- 2- الذين تظهر عليهم الصفة ( المرض ) مربعات أو دوائر مظلمة باللون الغامق .
- 3- الذين لا تظهر عليهم الصفة ( المرض ) مربعات أو دوائر غير مظلمة باللون الغامق .
- 4 - الذين لا تظهر عليهم الصفة و لكنهم حاملين للمرض بمربعات أو دوائر نصفها مظلم بالغامق
- 5 - الخط الأفقي بين الرموز يشير إلى الآباء ، و الأبناء أسفل منهم
- 6 - تستخدم الأرقام الرومانية لترقيم الأجيال (I,II)
- 7 - تستخدم الأرقام الانجليزية لترتيب الأولاد حسب ولادتهم
- ماذا يعني ( II3 ) في شكل 1-8 صفحة 217؟؟

### { تحليل مخطط السلالة }

\* انظر إلى شكل 2-8 صفحة 218 لمرض وراثي متنحي ( مرض تاي - ساكس )

\* انظر إلى شكل 3-8 صفحة 218 لمرض وراثي سائد ( مرض تعدد الأصابع )

- حل هذا المخطط ثم حاول ان تستنتج الطرز الجينية للآباء و الأبناء .

\* استنتاج الطرز الجينية من ( مخطط السلالة ) :

1 - يمكن للمستشار الوراثي تحديد الطرز الجينية للعائلة بدراسة الطرز الشكلية ( المظهرية ) للعائلات .

2 - يمكن للمستشار الوراثي تحديد النمط ( الصفة ) الوراثي هل هو سائد أو متنحي .  
 فالصفة السائدة تظهر في الطراز الشكلي بينما الصفة المتنحية لا تظهر إلا اذا كان الفرد متماثل الجينات المتنحية ( أي يحمل جينان متنحيان أحدهما من الأب و الآخر من الأم ) .

\* توقع الاختلالات :

تتبع الاختلالات الوراثية في الإنسان أمر صعب لأن كل جيل يحتاج إلى عقود حتى يكتمل .  
 لذا ف الاحتفاظ بسجلات للعائلات يساعد العلماء على تحليل مخطط السلالة ومن ثم توقع الاختلالات .

### { الأنماط الوراثية المعقدة }

لا تنطبق الوراثة التي وصفها مندل على وراثة الصفات المعقدة .

### { السيادة غير التامة }

#### \* السيادة غير التامة ( الناقصة ) :

هو نمط وراثي معقد حيث ينتج طراز شكلي وسطي مختلف يجمع بين صفات الآباء .

\* مثال : أنظر شكل 4-8 صفحة 221

(( تزاوج نبات شب الليل ذو الأزهار الحمراء RR مع ذو الأزهار البيضاء rr ))  
حيث نتج الجيل الأول ( F1 ) غير متمائل الجينات ( غير نقى ) ( هجين ) طرازه الشكلي مختلف فالأزهار لونها وردي .

### { السيادة المشتركة }

#### \* السيادة المشتركة :

هو نمط وراثي معقد يحدث عندما لا يسود جين على آخر. ويظهر أثر كلا الجينين عندما يكون الطراز الجيني لصفة ما غير متمائل الجينات .

أمثلة :

أ - مرض أنيميا الخلايا المنجلية : أنظر شكل 5-8 صفحة 222

وهو مرض ينتج عن تغير في الهيموجلوبين ( البروتين المكون لخلايا الدم الحمراء ) فتصبح ذات شكل منجلي وهذا يقلل فاعليتها على نقل الأكسجين .  
- الأفراد غير متمائلين الجينات ( غير النقيين ) دمائهم تحمل خلايا دم حمراء طبيعية ومنجلية في الوقت نفسه .

ب - مرض أنيميا الخلايا المنجلية والملاريا : أنظر شكل 5-8 صفحة 222

لوحظ في أفريقيا أن الأفراد غير متمائلين الجينات لمرض أنيميا الخلايا المنجلية يكثر عددهم ؟ وهم أعلى مقاومة لمرض الملاريا .  
لذلك يعيشون ويورثون صفة الأنيميا المنجلية ولذلك يستمر المرض في التزايد .

### { الجينات المتعددة المتقابلة }

#### \* الجينات المتعددة المتقابلة :

هو وجود أكثر من جينين متقابلين لصفة معينة .

\* أمثلة :

أ - فصائل الدم : نظام ( ABO ) : أنظر شكل 6-8 صفحة 223

- 1 - فصائل الدم هي ( O , AB , B , A ) .
- 2- تحدد بثلاث أشكال من الجينات المتقابلة ( علامات ) (  $I^A$  و  $I^B$  سائدان ) و (  $i$  متنحي ) .
- 3- فصيلة الدم A طرازه الجيني (  $I^A I^A$  نقى ) (  $I^A i$  هجين ) .
- فصيلة الدم B طرازه الجيني (  $I^B I^B$  نقى ) (  $I^B i$  هجين ) .
- فصيلة الدم AB طرازه الجيني  $I^A I^B$  .
- فصيلة الدم O طرازه الجيني ii .
- 4- العامل الريزي ( RH ) : وهو بروتين على خلايا الدم .  
حيث أن  $RH^+$  سائد على  $RH^-$  .

ب - لون الفراء للأرانب : أنظر شكل 7-8 صفحة 224

يسيطر على لون فراء الأرانب أربع جينات هي :

- 1- الجين C أسود سائد على c أبيض متنحي .
- 2 - الجين  $c^{ch}$  الشانشيلا سائد على  $c^h$  الهيميليا متنحي .
- 3- إذا تسلسل السيادة هو : من اليسار لليمين .

$$C > c^{ch} > c^h > c$$

### { تفوق الجينات }

\* **تفوق الجينات** : هو عندما يوجد جين يخفي صفة جين آخر .

\* **مثال** : لون فراء الكلاب : انظر شكل 8-8 صفحة 225

يختلف لون الفراء من الأصفر إلى الأسود ويتدرج من الغامق إلى الفاتح ، ويتحكم في لون الفراء مجموعات من الجينات المتقابلة :

1- E ( صبغة غامقة ) سائد على e ( لا توجد صبغة ) .

2- B (درجة اللون الغامق) من الصبغة سائد على b .

- الجين e يخفي آثار الجين B

### { تحديد الجنس }

انظر شكل 9-8 صفحة 225

- تحتوي الخلايا الجسمية على 46 كروموسوم ( 23 زوج )

- 22 زوج تسمى الكروموسومات الجسمية .

- زوج واحد يسمى الكروموسومات الجنسية وهي التي تحدد الجنس ( ذكر أم أنثى ) ، و

كروموسومات هذا الزوج على نوعين هما: X و Y : ( الأنثى XX ) و ( الذكر XY )

ويحدد ذلك نوع الحيوان المنوي الذي يلتقي بالبويضة عند الإخصاب .

### { تعويض الجرعة - تبديل الكروموسوم }

انظر شكل 9-8 صفحة 225

- الأنثى تحتوي على 22 زوج من الكروموسومات الجسمية + زوج من الكروموسومات الجنسية هو ( XX ) .

- الذكر يحتوي على 22 زوج من الكروموسومات الجسمية + زوج من الكروموسومات الجنسية هو ( XY ) .

- بما أن كروموسوم X أكبر من Y فهو يحمل عدد جينات أكثر .

ولتعويض الجرعة ( الفرق ) ، في الأنثى يتوقف عمل أحد كروموسومات X في كل خلية جسمية أنثوية .

### \* توقف عمل الكروموسوم : انظر شكل 10-8 صفحة 226

- ألوان فرو قط الكاليكو سببها توقف العمل العشوائي لكروموسوم X .

- ألوان الفرو تعتمد على كروموسوم X النشط .

- البقع البنية سببها توقف كروموسوم X الذي يحمل الجين المسؤول عن لون الفرو الأسود .

- البقع السوداء سببها توقف كروموسوم X الذي يحمل الجين المسؤول عن لون الفرو البني

### \* أجسام بار : انظر شكل 11-8 صفحة 226

هو تركيب غامق اللون في النواة وهو عبارة عن كروموسوم X المتوقف عن العمل في الأنثى .

- سمي بجسم بار نسبة إلى العالم الكندي موري بار حيث شاهد كروموسومات X التي توقفت

عن العمل في إناث قط الكاليكو .

### { الصفات المرتبطة مع الجنس }

#### \* الصفات المرتبطة مع الجنس :

هي صفة تتحكم فيها جينات محمولة على الكروموسوم الجنسي X .

- وبما أن للذكور كروموسوم X واحد فإن الصفات المتتحة المرتبطة مع الجنس تظهر فيهم وأما

الإناث فالكروموسوم X الثاني قد يمنع أو يقلل ظهور الصفة المتتحة .

- مثل عمي اللونين الأحمر والأخضر - نرف الدم ( الهيموفيليا) .

- \* **عمى اللون الأحمر - الأخضر :** أنظر شكل 12 - 8 صفحة 227
- مرض مرتبط بالجنس يكثر في الذكور ويقفل في الإناث .
  - الشخص المصاب لا يستطيع التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر .
  - جين اظهار هذا المرض متنحي محمول على الكروموسوم X .
  - ادرس مربع بانيت لأم حامله للمرض (  $X^B X^b$  ) و أب سليم (  $X^B Y$  ) .

### \* **نزف الدم ( هيموفيليا ) :**

- مرض مرتبط بالجنس يكثر في الذكور ويقفل في الإناث .
- الشخص المصاب عند الجروح يتأخر تجلط الدم مما يسبب استمرارية النزيف .
- وعادة يموت في سن مبكرة ( حتى أكتشف البروتين الضروري لتجلط الدم وأعطى للمرضى ولكن الأمراض التي تنتقل مع نقل الدم مثل الكبد الوبائي من النوع C و الإيدز اخذت تنتقل لهم حتى عام 1990 حيث أكتشفت طرق أكثر أمناً لنقل الدم .
- جين اظهار المرض متنحي محمول على الكروموسوم X .

### \* **الصفات المتأثرة بالجنس :**

- هي صفة تتحكم فيها جينات محمولة على الكروموسومات الجسمية ولكنها تتأثر بالجنس .
- مثلاً مرض الصلع ( سائد في الذكور و متنحي في الإناث ) . فيكفي ليظهر في الرجل أن يكون غير متماثل ( غير نقي ) بينما في الأنثى لا يظهر إلا إذا كانت متماثلة الجينات المتتحية ( نقية ) .

## { **الصفات المتعددة الجينات** }

### \* **الصفة متعددة الجينات :**

- هي الصفة التي تنتج عن تفاعل جينات متعددة .
- أمثلة : ( لون الجلد - لون العيون - طول القامة - نمط بصمة الإصبع ) .
- **لون الجلد :** أنظر شكل 13 - 8 صفحة 228
- لاحظ أن هذا النوع من الصفات عند رسم منحنى تكرار الجينات يكون المنحني شبيه بالجرس ( حيث الطرز الشكلية في الوسط أكثر من الطرز الشكلية في الأطراف )

## { **التأثيرات البيئية** }

- يمكن للعوامل البيئية أن تؤثر في الطرز الشكلية للفرد .
- أمثلة :
- 1 - قابلية الإصابة بمرض القلب وراثية ولكن تتأثر بالعوامل البيئية من غذاء ورياضة .
- 2 - معظم النباتات الزهرية لا تنتج أزهاراً من دون أشعة الشمس وقد تفقد أوراقها لنقص الماء .
- 3 - **القطه السيامية** شكل 14 - 8 صفحة 229
- الجين المسؤول عن إنتاج لون الصبغة في الفرو يعمل في البرد فقط .
- ( لذا تكون المناطق الأبرد في جسم القط أغمق لوناً من المناطق الأدفأ حيث يكون إنتاج الصبغة متوقفاً ) .

## { **دراسة التوائم** }

- التوائم المتطابقة متماثلة وراثياً . هي تساعد العلماء على فصل التأثيرات الجينية عن التأثيرات البيئية .
- الصفة التي تظهر بكثرة في التوائم المتطابقة تتحكم فيها الوراثة .
- الصفة التي تظهر بشكل مختلف في التوائم المتطابقة تتأثر بالبيئة بشكل قوي .
- نسبة التوائم الذين تظهر فيهم صفة معينة تسمى معدل التوافق .
- الفروق الكبيرة بين التوائم الشقيقة والتوائم المتطابقة تبين حجم التأثير الوراثي .

## { الكروموسومات و وراثته الإنسان }

يمكن دراسة الكروموسومات باستخدام المخطط الكروموسومي .

### { المخطط الكروموسومي }

\* **المخطط الكروموسومي** : أنظر شكل 16 - 8 صفحة 231

- هو رسم دقيق تترتب فيه الكروموسومات المتماثلة تنازلياً حسب حجمها .
- حيث يمكن التقاط صورة واضحة بالمجهر للكروموسومات عندما تتكثف في الطور الإستوائي ويصبح كل كروموسوم مكون من كروماتيدين شقيقين .
- شكل 16 - 8 صفحة 231: لاحظ في المخطط الكروموسومي أن الـ 22 زوج من الكروموسومات الجسمية متطابقة في الذكر والأنثى وزوج الكروموسومات الجنسية لا يتطابق .

### { القطع الطرفية ( التيلوميرات ) }

\* **القطع الطرفية** : هي الأغشية الواقية التي تغطي أطراف الكروموسومات وتتكون من DNA مرتبط مع بروتين .

### { عدم انفصال الكروموسومات }

\* **عدم انفصال الكروموسومات** : أنظر شكل 17 - 8 صفحة 232

- هو أن لا تنفصل الكروماتيدات الشقيقة بالشكل الصحيح أثناء الانقسام الخلوي فتنتج أمشاج تحتوي على أعداد غير طبيعية من الكروموسومات .
- أما أن يحدث نقص أو زيادة لعدد الكروموسومات في الأمشاج المتكونه ، فعندما يخصب مشيج مشيجاً آخر تتكون اللاقحة التي تكون بالنسبة لذلك الزوج من الكروموسومات اما :  
( ثلاثية المجموعة الكروموسومية أو أحادية المجموعة الكروموسومية ) .
- عادة هذه الاختلالات تكون قاتلة .

### \* أمثلة :

أ - **متلازمة داون** : أنظر شكل 18 - 8 صفحة 234

- يحدث في الإناث والذكور .
- يزداد إصابة المواليد بزيادة عمر الأم ( حيث يزداد 6 % في الأمهات اللاتي تزيد أعمارهن عن 45 ) .

- سببه اضافة كروموسوم جسي إلى الزوج رقم 21 لذلك تسمى ( ثلاثية المجموعة الكروموسومية 21 ) .

- اعراضه ( تأخر عقلي - اضطراب قلبي - قوام قصير )

ب - **مرض تيرنر** : أنظر جدول 4 - 8 صفحة 234

- يحدث في الإناث فقط .

- سببه نقصان أحد الكروموسومات الجنسية فتصبح الانثى X بدلاً من XX.

ج - **مرض كلينفلتر** : أنظر جدول 4 - 8 صفحة 234

- يحدث في الذكور فقط

- سببه زيادة كروموسوم X الى الكروموسومات الجنسية فيصبح الذكر XXY بدلاً من XY.

### { الفحص الجيني }

- هي الفحوصات التي تجري أثناء الحمل للأجنة لتتأكد من عدم وجود اختلالات وراثية .
- أنظر جدول 5 - 8 صفحة 235 لمعرفة أنواع الفحوصات وفوائدها .

## — الفصل التاسع —

### { الوراثة الجزيئية }

### { المادة الوراثية }

تطلب اكتشاف DNA بوصفها شفرة وراثية إجراء العديد من التجارب .

### { اكتشاف المادة الوراثية }

- المعلومات الوراثية محمولة على الكروموسومات .
- الكروموسوم يتكون من DNA وبروتين .
- حاول العلماء على مدى سنوات تحديد مصدر المعلومات هل هو ( البروتين أم الـ DNA )

\* **العالم جريفيث عام 1928م** : أنظر شكل 1 - 9 صفحة 248

- أجرى جريفيث تجربة على سلالتين من بكتيريا المكورات السبحية الرئوية هما :
- أ - سلالة **ملساء (S)** : محاطة بغلاف من السكريات تسبب مرض التهاب الرئة .
- ب - سلالة **خشنة (R)** : غير محاطة ولا تسبب المرض .

- خطوات التجربة : أنظر شكل 2 - 9 صفحة 249

- 1- حقن الفأر بالسلالة (S) الحية فمات الفأر .
- 2- حقن الفأر بالسلالة (R) الحية فبقى الفأر حياً .
- 3- حقن الفأر بالسلالة (S) الميتة ( بواسطة الحرارة ) فبقى الفأر حياً .
- 4- حقن الفأر بخليط من السلالة (S) الميتة وسلالة (R) الحية فمات الفأر .

**الاستنتاج :**

استنتج جريفيث أن هنالك تحول من البكتيريا (R) الخشنة إلى البكتيريا (S) الملساء ( كانت هذه بداية البحوث في عوامل التحول ) .

\* **العالم أفري عام 1944م** :

أكتشف هو وزملاؤه الجزيء الذي حول البكتيريا من السلالة R إلى السلالة S .

**- خطوات التجربة :**

- 1- عزل أفري من خلايا البكتيريا S الميتة جزيئات مختلفة مثل ( DNA وبروتين و دهون ) .
- 2- عرض خلايا البكتيريا (R) إلى هذه الجزيئات كل على حدة .
- 3- لاحظ أن البكتيريا (R) التي تعرضت إلى DNA تحولت إلى بكتيريا S والأخرى لم تتحول .

**- الاستنتاج :**

أستنتج أفري أنه عندما قام جريفيث بقتل البكتيريا S تحررت منها جزيئات الـ DNA وانتقلت إلى البكتيريا R مما أدى إلى تحولها إلى البكتيريا S .

\* **العالمان هيرشي وتشيس عام 1952م** :

- وفرا دليلاً حاسماً على أن الـ DNA هو عامل التحول .
- اجريا تجربتهما على الفيروس الأكل للبكتيريا هذا الفيروس يتكون من ( بروتين + DNA فقط )
- وهو لا يستطيع أن يتكاثر بمفرده بل يجب أن يحقن مادته الوراثية داخل خلية حية .
- استعمالا العلامات المشعة لتتبع الـ DNA والبروتين ومنها :

1- **الفسفور المشع  $^{32}P$**  : لأن الـ DNA يحتوي على الفسفور فسيصبح مشعاً بينما لن يصبح البروتين مشعاً .

2- **الكبريت المشع  $^{35}S$**  : لأن البروتين يحتوي على كبريت فسيصبح مشعاً بينما لن يصبح الـ DNA مشعاً .

\* **خطوات التجربة** : أنظر شكل 3 - 9 صفحة 250

- 1- تم تقسيم الفيروسات إلى مجموعتين الأولى ذات فسفور مشع ( DNA مشع ) .

- والتانية ذات كبريت مشع ( بروتين مشع ) وجعلهما تهاجمان البكتريا .  
 2- فحصت البكتريا المصابة في المجموعة الأولى ووجد أن المادة المشعة ( DNA ) للفيروس  
 حقت داخل الخلية ثم تكاثرت الفيروسات وخرجت وهي تحتوي على فسفور مشع  $^{32}\text{P}$   
 ( إذا الـ DNA هو الذي يحمل المعلومات الوراثية ) .  
 3- فحصت البكتريا المصابة في المجموعة الثانية ووجدت المادة المشعة ( البروتين للفيروس )  
 بقيت خارج الخلية البكتيرية ثم تكاثرت الفيروسات وخرجت .

#### - الإستنتاج :

إذا الـ DNA وليس البروتين هو المسؤول عن حمل المعلومات الوراثية التي تنتقل من جيل  
 لآخر في الفيروسات .

### { تركيب DNA }

\* **النوكليوتيدات :** انظر شكل 4-9 صفحة 251

- الذي حدد التركيب الأساسي للنوكليوتيدات هو عالم الكيمياء الحيوية ليفين .
- كما درسنا في الفصل الأول الأحماض النووية نوعين هما :
- 1- DNA يتكون من نوكليوتيدات تحتوي على ( سكر خماسي رايبوز منقوص الأكسجين و  
 مجموعة فوسفات و إحدى أربع قواعد نيتروجينية هي : سايتوسين C, جوانين G, أدنين A  
 , ثايمين T ) .
- 2- RNA يتكون من نوكليوتيدات تحتوي على ( سكر خماسي رايبوز ومجموعة فوسفات  
 واحد اربع قواعد نيتروجينية هي : سايتوسين C , جوانين G , ادنين A , يوراسيل U )
- **ملاحظات :**
- 1- الجوانين G والادنين A : قواعد نيتروجينية ثنائية الحلقات وتسمى قواعد البيورين .
- 2- السايتوسين C والثايمين T واليوراسيل U : قواعد نيتروجينية أحادية الحلقات وتسمى قواعد  
 بيريميدين .

\* **العالم تشارجاف :** انظر شكل 5-9 صفحة 252

- حلل السايتوسين والجوانين والثايمين والادنين في الـ DNA لأنواع مختلفة وتوصل إلى أن  
 ( كمية السايتوسين تساوي كمية الجوانين وكمية الأدنين تساوي كمية الثايمين )  
 - فاستنتج قاعدة سماها ( قاعدة تشارجاف ) : وهي  $G=C$  و  $A=T$  .  
 أو ( كمية البيورينات تساوي كمية البيريميديونات ) .

\* **تشنت الأشعة السينية :** انظر شكل 6-9 صفحة 252

- استخدم ويلكنز وفرانكلين تقنية تسمى ( تشنت الأشعة السينية ) حيث يتم تصويب الأشعة السينية  
 ( X-Ray ) على جزيء الـ DNA .
- تم إلتقاط الصورة المشهورة بـ ( الصورة رقم 51 ) والتي وضحت أن الـ DNA عبارة عن  
 جزيء مزدوج من سلسلتين من النوكليوتيدات الملتفة حول بعضها حلزونياً .

\* **العالمان واطسن وكريك :** انظر شكل 7-9 صفحة 253

- شاهدنا صورة فرانكلين لتشنت الأشعة السينية واستخدام بيانات فرانكلين و تشارجاف ثم قاسا  
 عرض الجزيء الحلزوني والمسافة بين القواعد النيتروجينية .
- ثم قاما بعمل نموذج للـ DNA اشتمل على الخصائص التالية :
- 1- سلسلتين تتكونان من سكر الرايبوز منقوص الأكسجين وفوسفات بشكل متبادل .
- 2- يرتبط السايتوسين مع الجوانين بثلاث روابط هيدروجينية .
- 3- يرتبط الثايمين مع الأدنين برابطتين هيدروجينيتين .

### \* تركيب DNA:

- يشبه السلم الملتوي حيث أن :
- 1- السكر منقوص الأكسجين والفوسفات المتبادل يمثل ( حاجر السلم ).
- 2- أزواج القواعد النيتروجينية ( C , G , A , T ) تمثل ( درجات السلم ) .
- كمية قواعد البيريميدينات تساوي كمية قواعد البيورينات ( C+T=G+A )

### \* الترتيب ( ترتيب سلسلتا DNA ) أنظر شكل 8 - 9 صفحة 254

- يمكن ترقيم سلسلتي DNA بترقيم ذرات الكربون في جزيئات السكر مثلاً 5' (خمس شرطة)
- ترقيم السلسلة الأولى على عدد جزيئات السكر ثم ترقيم السلسلة الثانية الموازية في الإتجاه المعاكس ويسمى ذلك ( المتوازي المتعاكس ) فمثلاً الأولى من 5' إلى 3' بينما الأخرى من 3' إلى 5' .

### \* تركيب الكروموسوم: أنظر شكل 9 - 9 صفحة 255

- جزيء الـ DNA يوجد في المخلوقات الحية :
- 1- بدائية النواة : في السيتوبلازم على شكل حلقة .
- 2- حقيقية النواة : في النواة على شكل سلسلة .
- يتكون الكروموسوم الواحد في الإنسان من ( 51 إلى 245 مليون نيوكليوتيد ) ولو بسطت 140 مليون نيوكليوتيد بخط مستقيم لأصبح طولها 5 سم . فكيف تترتب داخل خلية مجهرية ؟
- تلتف سلسلة DNA على مجموعة من البروتينات تسمى الهيستونات مكونة جسيماً نووياً يسمى ( نيوكليوسوم ) حيث تجذب الشحنة السالبة لمجموعة الفوسفات في الـ DNA مع الشحنة الموجبة للهيستونات .
- ثم تجتمع النيوكليوسومات معاً لتكون أليافاً كروماتينية يلتف بعضها على بعض مكونة الكروموسوم .

## { تضاعف DNA }

يتضاعف DNA بتكوين سلسلة جديدة متممة للسلسلة الأصلية .

## { تضاعف DNA شبه المحافظ }

التي أقترحها العالمان واطسن وكريك .

### \* التضاعف شبه المحافظ : أنظر شكل 10 - 9 صفحة 256

هو أن يتضاعف جزيء DNA إلى جزيئين كل جزيء يتكون من سلسلة أصلية وسلسلة جديدة .

### \* خطوات ( مراحل ) التضاعف شبه المحافظ : أنظر شكل 11 - 9 صفحة 257

ثلاث مراحل هي ( فك الالتواء - ارتباط القواعد في أزواج - إعادة ربط السلاسل )

### أ- فك الالتواء :

- 1- يتم فصل سلاسل الحلزون المزدوج للـ DNA إلى سلسلتين منفردتين إحداهما تسمى الرئيسية والأخرى الثانوية ( بواسطة أنزيم فك الالتواء ( هيليكيز ) .
- 2- ولضمان بقاء السلسلتين منفصلتين ترتبط بالـ DNA بروتينات تسمى ( البروتينات المرتبطة مع السلاسل المنفردة ) ثم يتم إضافة قطعة صغيرة من RNA تسمى ( قطعة RNA الأولية أو الباديء ) بواسطة أنزيم RNA الباديء .

### ب- ارتباط القواعد في أزواج :

- 1- يحفز أنزيم بلمرة DNA إضافة النيوكليوتيدات المناسبة لسلسلتي الـ DNA بحيث يكون ارتباط القواعد النيتروجينية كالتالي ( A مع T و C مع G )

- 2- تصنع السلسلتان بطريقتين مختلفتين :
- السلسلة الرئيسية : يزداد طولها عندما يتم فك الالتواء في اتجاه شوكة التضاعف حيث يتم انتاج السلسلة باضافة النيوكليوتيدات بشكل متواصل إلى النهاية .
  - السلسلة الثانوية : يزداد طولها في عكس اتجاه شوكة التضاعف حيث يتم انتاج السلسلة بشكل غير متواصل ( متقطع ) وفي صورة قطع تسمى ( قطع أوكازاكي ) ثم يتم ربط قطع أوكازاكي ببعضها بواسطة أنزيم ربط DNA ( حيث يبلغ طول كل قطعة من أوكازاكي نحو 100 - 200 نيوكليوتيد ) .
- \* **ملاحظة :** بما أن احدى السلاسل تصنع بشكل متواصل والاخرى بشكل غير متواصل فإن تضاعف DNA يسمى شبه المتقطع أو ( شبه المحافظ )

### ج - إعادة ربط السلاسل :

- بواسطة أنزيم بلمرة DNA يتم اضافة النيوكليوتيدات واستبدال قطعة RNA البادي بنيوكليوتيد .
- ثم يقوم أنزيم ربط DNA بربط السلسلتين معاً .

## { DNA و RNA والبروتين }

تنسخ شفرات DNA في صورة RNA الذي يتحكم بدوره في بناء البروتين .

### { المبدأ الأساسي }

- \* **جزئ DNA :** عبارة عن شريط مزدوج من سلسلتين حلزونيتين داخل النواة .
- \* **جزئ RNA :** عبارة عن شريط من سلسلة واحدة ( منفردة ) ( غالباً ) .

1- RNA ثلاث أنواع هي : أنظر جدول 2 - 9 صفحة 259

- 1- RNA الرسول ( mRNA ) : وهو سلسلة طويلة من النيوكليوتيدات وهي المتممه لأحدى سلاسل DNA .
- 2- RNA الرايبوسومي ( rRNA ) : وهو الذي يرتبط مع البروتينات في السيتوبلازم لبناء الرايبوسومات .
- 3- RNA الناقل ( tRNA ) : وهو قطع صغيرة من النيوكليوتيدات تنقل الأحماض الأمينية إلى الرايبوسومات .

## { عملية صنع البروتين }

### \* ملخص مختصر جداً لعملية صنع البروتين : \*

- 1- تنفصل سلسلتا DNA عن بعضهما .
- 2- تعمل احدى السلسلتين ( كقالب ) لتكوين RNA المراسل ( mRNA ) الذي يحمل الشفرة الوراثية ( الكودون ) نفسها الموجودة على DNA .
- 3- ينفصل mRNA ليخرج إلى السيتوبلازم عبر ثقب الغشاء النووي ويستقر على أحد الرايبوسومات الموجودة على الشبكة الأندوبلازمية .  
( الرايبوسوم هو المصنع الذي يتم فيه صنع البروتين )
- 4- الحمض RNA الناقل ( tRNA ) يحمل حمضاً أمينياً في طرف وشفرة وراثية على الطرف الآخر .
- 5- يرتبط كل tRNA بمكان ما على mRNA على حسب شفرته .
- 6- تتحد الأحماض الأمينية المحمولة على tRNA بروابط ببتيدية مكونة سلسلة من الأحماض الأمينية أي مكونة ( بروتين ) .

## \* شرح مفصل لعملية صنع البروتين \*

\* أولاً : عملية النسخ : أنظر شكل 12 - 9 صفحة 260

- 1- ينفك التواء DNA جزئياً في النواة .
- 2- ثم يرتبط به أنزيم بلمرة RNA الذي يحفز بناء RNA المراسل ( mRNA ).
- 3- بحيث كلما انفكت سلسلة DNA قام أنزيم بلمرة RNA ببناء mRNA في الاتجاه 3' إلى 5'
- 3- تسمى السلسلة التي يقرأها أنزيم بلمرة RNA بـ ( السلسلة الأساسية ) ، وتسمى السلسلة mRNA التي صنعها بـ ( السلسلة المتممة لنوكليوتيدات DNA )
- 4- تُصنع نسخة mRNA في الاتجاه 5' إلى 3' ( حيث يحل اليوراسيل U بدلاً من الثايمين T عند بناء mRNA ) .
- 5- أخيراً يتحرك mRNA من النواة إلى السيتوبلازم عبر الثقوب النووية .

## \* ثانياً معالجة RNA :

أ - المعالجة الأولى : التخلص من الانترونات .

(( وجد العلماء أن شفرة mRNA أقصر من شفرة DNA ما السبب ؟ ))

- 1- وجد العلماء أن DNA يحتوي على قطع مشفرة فعالة تسمى ( الاكسونات ) وقطع أخرى غير مشفرة تسمى ( الانترونات ) .
- 2- عندما يتم تصنيع mRNA فإنه يحتوي على شفرات DNA كلها ويسمى ( mRNA الأولي ) وقبل خروجه إلى السيتوبلازم يتم إزالة الانترونات لذلك يبدو أقصر من DNA .

## ب - المعالجة الثانية :

- 1- إضافة غلاف واقٍ على النهاية 5' لـ mRNA يساعد على التعرف على الرايبوسومات .
- 2- إضافة ذيل مكون من نيوكليوتيدات الأدينين عند النهاية 3' ( غير معروف أهمية حتى الآن )

\* الشفرة ( الكود ) : أنظر شكل 13 - 9 صفحة 261

- وجد العلماء أن شفرة DNA مكونه من ثلاث قواعد نيروجينية .
- هذه الشفرة الثلاثية القواعد النيروجينية في DNA و mRNA تسمى الشفرة الوراثية أو ( الكودون )
- الشفرة الوراثية ( الكودون ) هو الطريقة الوحيدة التي يختلف فيها DNA بين المخلوقات الحية .
- لاحظ في شكل 13 - 9 صفحة 261 : ان هناك كودونات أخرى تسمى كودونات انتهاء ( وهي ثلاثة ) وكودون واحد بدء ( كودون AUG ) يحمل الميثيونين .

\* ثالثاً : الترجمة : أنظر شكل 14 - 9 صفحة 262

- 1 - بعد أن يخرج mRNA إلى السيتوبلازم ترتبط النهاية 5' بالرايبوسوم .
- 2 - يتشكل RNA الناقل ( tRNA ) و ينطوي على شكل ورقة البرسيم ثم يتم تنشيطه بانزيم يعمل على ربط حمض أميني على النهاية 3' و في منتصف الشريط يوجد كودون مكون من ثلاث قواعد نيروجينية يسمى الكودون ( شفرة ) المضاد .
- 3 - كل كودون ( شفرة ) مضاد يتم كودون على mRNA .
- 4 - بينما تقرأ كودونات DNA و RNA من 5' إلى 3' فإن الكودونات المضادة تقرأ من 3' إلى 5' .

\* دور الرايبوسوم : أنظر شكل 14 - 9 صفحة 262

- يتكون الرايبوسوم من وحدتين منفصلتين .
- يقوم mRNA بربط الوحدتين معاً و ينتج الرايبوسوم الفعال .

- عندما يرتبط mRNA مع الرايبوسوم يتحرك tRNA مع كودونه المضاد UAC و يرتبط مع كودون البدء (AUG) الذي يحمل الميثيونين على mRNA على النهاية 5' .  
 - يحتوي الرايبوسوم على أحاديد ( شقوق ) تمثل مواقع ( موقع A ، موقع P ، موقع E ) يدخل فيها tRNA تمهيداً لارتباط كودونه مع كودونات mRNA ( يدخل أول tRNA في الموقع P و باقي tRNA يكون دخولها من الموقع A و يكون الخروج من الموقع E )  
 - ثم يعمل جزء من RNA الرايبوسومي rRNA عمل انزيم محفز لتكوين رابطة حيث يتحرك و يربط الحمض الأميني لـ tRNA في الموقع P مع الحمض الأميني لـ tRNA في الموقع A .  
 - يستمر الرايبوسوم في الحركة والربط بين الأحماض الأمينية على شكل سلسلة حتى يدخل في الموقع A كودون انتهاء ( حيث يشير إلى انتهاء تصنيع البروتين ) . حيث لا يوجد لهذا الكودون كودون مضاد على tRNA .  
 - أخيراً يتحرر mRNA من آخر tRNA تم ترجمته ثم تتفكك وحدات بناء الرايبوسوم منهية بذلك بناء البروتين .

### { التنظيم الجيني والطفرة }

تنظم الخلية التعبير الجيني ويمكن أن تؤثر الطفرات في هذا التعبير .

### { التنظيم الجيني في الخلايا بدائية النوى }

\***التنظيم الجيني** : هو قدرة المخلوق الحي على التحكم في اختيار أي الجينات تنسخ استجابة للبيئة .

\***المنطقة الفعالة** : هي المنطقة التي تتحكم في نسخ الجينات استجابة للبيئة في المخلوقات بدائية النوى.

- تضم المنطقة الفعالة الآتي ( المشغل - والمحفز - وجين منظم - وجين لتشفير البروتين ) .  
 المشغل : (قطعة من DNA لبدء النسخ و إيقافه)  
 والمحفز: (قطعة من DNA تمثل مكان بداية ارتباط DNA بإنزيم بلمرة RNA )

### { التنظيم الجيني في الخلايا حقيقية النوى }

- تنظيم وتركيب خلايا حقيقية النوى اعقد من بدائية النوى وهذا يزيد من تعقيد نظام التحكم في النسخ .

#### \* التحكم في عملية النسخ :

- تتم من خلال بروتينات تسمى عوامل النسخ ولها مجموعتان هما :  
 أ - المجموعة الأولى ( عوامل النسخ ) : عبارة عن مركبات معقدة تنظم أنزيم بلمرة RNA وتوجه ارتباطه بالمنظم .  
 ب - المجموعة الثانية ( بروتينات منظمة ) : وهي تساعد على التحكم في سرعة النسخ .  
 - ملاحظة : تركيب DNA المعقد الملف حول الهستونات يعد منظماً لأن تعقيده يوفر بعض التنشيط لعملية النسخ .

#### \* **تداخل RNA** : أنظر شكل 15 - 9 صفحة 266

- احدى طرق التنظيم وتتم كالتالي :

- 1- بواسطة أنزيم يسمى المقطع يتم تقطيع قطع صغيرة من RNA ثنائي السلسلة هذه القطع الصغيرة الثنائية تسمى ( جزيئات RNA المتداخلة الصغيرة ) .
- 2- ترتبط جزيئات RNA المتداخلة مع بروتين معقد يكسر سلسلة واحدة من السلسلتين ويبقى واحده .

3- ترتبط السلسلة المتبقية ( الناتجة عن جزيء RNA المتداخل الصغير) و البروتين المعقد مع مقاطع محدد ومتسلسلة على mRNA في السيتوبلازم وتؤدي إلى تقطيع mRNA ومنع ترجمته

### { الطفرات }

\* **الطفرة** : هي تغير دائم في DNA الخلية .

#### \* أنواع الطفرات :

تتراوح الطفرات بين تغيير في القواعد النيروجينية وإزالة مقاطع كبيرة من الكروموسومات .

من أنواعها : أنظر جدول 3-9 صفحة 268

أ - **طفرات الاستبدال (النقطية)** حيث يتم استبدال زوج من القواعد النيروجينية بآخر .

ولها نوعان :

1- **الحساسية (المؤثرة)** : حيث تتغير الشفرة الوراثية ( الكودون) للحمض الأميني مسببة خلل ما .

2- **غير الحساسية (غير مؤثرة)** : حيث يتغير كودون الحمض الأميني بكودون توقف فتتوقف .

الترجمة مبكراً ( غالباً ينتج عنها بروتينات لا تعمل بشكل طبيعي ) .

#### ب - طفرات الإزاحة : لها نوعان هما :

1- **طفرات الإضافة** : حيث يتم كسب نيوكليوتيد ضمن تسلسل القواعد النيروجينية .

2- **طفرات الحذف** : حيث يتم خسارة نيوكليوتيد ضمن تسلسل القواعد النيروجينية .

#### \*ملاحظات :

1- في بعض الأحيان ترتبط الطفرات بمرض أو خلل وراثي . فمثلاً اظهرت الدراسات أن مرض الكابتونورييا ( تغير لون البول إلى الأسود ) مصابون بنسبة عالية من طفرات الإزاحة والطفرات الحساسة .

2- متلازمة الكروموسوم الهش X : انظر شكل 16-9 صفحة 269

حيث ينتج ذلك عن وحدات CGG مكررة اضافية قريبة من نهاية الكروموسوم X مما يجعل المنطقة المكررة هشة تتدلى من الكروموسوم .

#### \* أسباب الطفرات :

أ - **إضافة قاعدة خطأ بواسطة أنزيم بلمرة DNA** وعادة يتم تصحيح الخطأ ويفلت من التصحيح ما نسبته 1 : بليون . ( مثل الطفرات الاستبدال النقطية )

ب - **عوامل مسببة للطفرات** مثل ( بعض المواد الكيميائية والاشعة ) .

1 - حيث أن لبعض المواد الكيميائية تركيب يشبه النيوكليوتيدات والتي من الممكن أن تحل محل أحد النيوكليوتيدات وبالتالي توقف عملية نسخ وتضاعف DNA بصورة صحيحة ( حيث استخدمت لمعالجة فيروس HIV المسبب للإيدز ) .

2- تعد أشعة X من العوامل المسببة للطفرات حيث تكسب DNA طاقة .

3- تحتوي أشعة الشمس فوق بنفسجية ( UV ) على طاقة أقل من أشعة X ولكنها يمكن أن تجعل قواعد الثايمين المتجاورة ترتبط معاً متلفناً الـ DNA انظر شكل 17-9 صفحة 270

#### \* طفرات الخلايا الجسمية والجنسية :

أ - **طفرات الخلايا الجسمية** : إذا حدثت طفرة فإن هذا الخلل يصبح جزء من الترتيب الوراثي للخلية ومن ثم ينتقل إلى الخلايا الجديدة المستقبلية ( ولكنه لا ينتقل من جيل لآخر ) .

و درسنا سابقاً أن الطفرة التي تجعل دورة الخلية غير منضبطة تؤدي إلى السرطان .

ب - **الطفرات الجنسية** : إذا حدثت فإن هذا الخلل ينتقل إلى أبناء المخلوق الحي .

## { الهندسة الوراثية }

\***الهندسة الوراثية** : أنظر شكل 18 - 9 صفحة 271

- هي تقنية تتضمن التحكم في جزيء DNA لأحد المخلوقات الحية بواسطة إضافة DNA خارجي من مخلوق حي آخر .
- تتضمن دراسة DNA وتعديله عمليات ( قطع بإنزيمات القطع وعزل القطع ، و ربطها مع جزيئات DNA خارجية و تحديد التسلسل ) أنظر جدول 4 - 9 صفحة 272
- **من الأمثلة** : أدخل بروتين الإضاءة الخضراء ( الموجودة طبيعياً في نوع من قناديل البحر ) في يرقات البعوض وبالتالي تحقق الباحثون من أن DNA الخارجي ارتبط مع المادة الوراثية للبعوض .

## { التقنيات الحيوية }

- \***التقنيات الحيوية** : هي استعمال الهندسة الوراثية لإيجاد حلول لمشكلات محددة .
- \***المخلوقات المعدلة وراثياً** : هي مخلوقات تم تعديلها بواسطة الهندسة الوراثية من خلال إدخال جين ما من مخلوق حي آخر ( مثل يرقات البعوض في المثال السابق ) .

### \* الحيوانات المعدلة وراثياً :

- حيث استعملت الفئران وذبابة الفاكهة والدودة الاسطوانية .
- المواشي ومنها الماعز لإنتاج بروتين لمنع تخثر الدم أثناء العمليات الجراحية .
- إنتاج ديك رومي مقاوم للأمراض .
- إنتاج أسماك تنمو سريعاً .
- وقد تصبح مستقبلاً مصدراً يستخدم في مجال زراعة الأعضاء .

### \* النباتات المعدلة وراثياً : أنظر شكل 19 - 9 صفحة 273

- إنتاج نباتات مقاومة للحشرات والآفات الفيروسية .
- إنتاج نباتات مقاومة لمبيدات الأعشاب والحشرات مثل ( الذرة وفول الصويا والقطن )
- إنتاج نبات فستق وفول صويا لا يسبب تفاعلات حساسية لمستهلكيها .

### \* البكتريا المعدلة وراثياً :

- إنتاج بكتيريا منتجة للانسولين و هرمونات النمو ومذيبة لخثرات الدم .
- إنتاج بكتيريا تبطيء من تكون بلورات الثلج على المحاصيل الزراعية عند الصقيع .
- إنتاج بكتيريا تزيل بقع النفط وتحلل القمامة .

## { مشروع الجينوم البشري }

أنظر شكل 20 - 9 صفحة 274

- \***الجينوم البشري** : هو معرفة جميع المعلومات الوراثية ( المحتوى الجيني ) في خلية بشرية .
- ولذلك بتحديد تسلسل وترتيب 3 مليارات نيوكليوتيد تقريباً تشكل DNA البشري ، و تحديد الجينات البشرية البالغ عددها من 20,000 إلى 25,000 جين..
- أيضاً تم دراسة المحتوى الجيني لمخلوقات حية أخرى .
- أقل من 2% فقط من نيوكليوتيدات الجينوم البشري تشفر جميع البروتينات في الجسم .
- أي ان الجينوم يحتوي على سلاسل من القواعد النيوتروجينية (غير المشفرة ) ليس لها وظيفة مباشرة .