




الجَمْهُورِيَّةُ الْبَلْسَارِيَّةُ
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة ل المناهج

الرياضيات

كتاب التمارين

للصف الأول الثانوي



حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم
٢٠١٥ / هـ ١٤٣٦



إيماناًً بـأهمية المعرفة وـمواكبة لـعصر التكنولوجيا تـتـشرف
الـادـارـةـ الـعـامـةـ لـلـتـعـلـيمـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ بـخـدـمـةـ أـبـنـائـنـاـ الطـلـابـ وـالـطـالـبـاتـ
فـيـ دـيـوبـونـ الـوطـنـ الـدـيـبـ بـهـذـاـ عـمـلـ آـمـلـينـ أـنـ يـنـالـ رـضـاـ الجـمـيعـ

فـكـرةـ وـإـعـدـادـ

أـ.ـ عـادـلـ عـلـيـ عـبـدـ اللـهـ الـبـقـعـ

مسـاعـدـ

أـ.ـ زـيـنـبـ مـهـمـودـ السـماـنـ

مراـجـعـةـ وـتـدـقـيقـةـ

أـ.ـ مـيسـونـةـ الـعـبـيدـ

أـ.ـ فـاطـمـةـ الـعـجلـ

أـ.ـ أـفـرـاحـ الـحـزـمـيـ

متـابـعـةـ

أـمـيـنـ الـإـدـرـيـسـيـ

إـشـرافـ مدـيرـ عـامـ

الـادـارـةـ الـعـامـةـ لـلـتـعـلـيمـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ

أـ.ـ مـحـمـدـ عـبـدـ الـطـرـمـيـ



الجَمْهُورِيَّةُ الْلَّوْنِيَّةُ

وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج

الرياضيات

كتاب التمارين للصف الأول الثانوي

فريق التأليف

د. شكيب محمد باجرش (رئيساً).

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| أ. سالمين محمد باسلوم (منسقاً). | د. أمة الإله علي حُمد الحوري. |
| د. محمد علي مرشد. | د. عوض حسين البكري. |
| أ. يحيى بكار مصطفى. | د. محمد رشاد الكوري. |
| أ. عبدالباري طه حيدر. | د. محمد حسن عبده المسوري. |
| أ. نصر محمد بدر. | د. عبدالله سالم بن شحنة. |
| أ. جميلة إبراهيم الرازحي. | د. عبد الرحمن محمد مرشد. الجابري. |
| أ. عادل علي مقبل البناء. | د. علي شاهر القرشي. |
| أ. مريم عبد الجبار سلمان. | أ. يحيى محمد الكنز. |

فريق المراجعة:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| أ/ أحمد عبده الصغير الدبعي. | أ/ سميرة حسن فضائل. |
| أ/ زايد مقبل الأغبري. | أ/ محمد صالح الخضر. |
| أ/ خالد القلزي. | |

تنسيق: أ/ سعيد محمد ناجي الشرعي.

تدقيق: د. أمة الإله علي حُمد.

إشراف: د/ عبدالله سلطان الصلاхи.

الإخراج الفني

الصف والتصميم: عبد الرحمن حسين المهرس.

أشرف على التصميم: حامد عبدالعالم الشيباني.

٢٠١٥ هـ / ١٤٣٦



النشيد الوطني

رددوا أياً تكنوا لا لذلة ما نشيد بي
واذكرى ثقبي شعرتني حكم شعيب وادمعتنيه خالا من ضوء عيدي

(رددوا أياً تكنوا لا لذلة ما نشيد بي)

(رددوا أياً تكنوا لا لذلة ما نشيد بي)

وحلقى .. وحلقى .. يا نشيءاً والآن يهلا نعشى
رايتى .. رايتى .. يا نسيجاً حكته من كل شمس أخلدي خافقة في كل قمة
أمتى .. أمتى .. امنحيني الباس يا مصدر بآسي وآخریني لك يا أكرة أمة

عشت أيام افاني وحبني أمميأ

وسيرى فوق دربي عربها

وسيبقي نبض قلبي يمنيا

لن ترى الدنيا على أرضي وصيا

المصد: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٦م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

أعضاء اللجنة العليا للمناهج

أ. د. عبدالرازق يحيى الأشول.

- د/ عبدالله عبده الحامدي.
- د/ عبدالله سالم ملس.
- أ/ أحمد عبدالله أحمد.
- د/ فضل أحمد ناصر مطلي.
- د/ صالح ناصر الصوفي.
- د/ محمد عمر سالم باسليم.
- أ. د/ داود عبد المللк الحدادي.
- أ. د/ محمد حاتم المخلافي.
- أ. د/ محمد عبدالله الصوفي.
- د/ عبد الله زيارة.
- أ/ محمد عبد الله علي النزيلى.
- أ/ إبراهيم محمد الحوشى.
- أ/ عبدالله علي إسماعيل الرازحي.
- د. عبدالله سلطان الصلاحى.

تقديم

في إطار تفاصيل التوجهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته تلبية للاحتجاجات ووفقاً للمتطلبات الوطنية.

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي على إعطاء أولوية استثنائية لتطوير المناهج الدراسية، كونها جوهر العملية التعليمية وعملية ديناميكية تتسم بالتجديد والتغيير المستمر لاستيعاب التطورات المتسارعة التي تسود عالم اليوم في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذا الكتاب في طبعته المعدلة ضمن سلسلة الكتب الدراسية التي تم تعديليها وتنقيحها في عدد من صنوف المراحلتين الأساسية والثانوية لتحسين وتجويد الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، اعتماداً على العديد من المصادر أهمها: الملاحظات الميدانية، والمراجعات المكتبية لتلافي أوجه القصور، وتحديث المعلومات وبما يتناسب مع قدرات المتعلم ومستواه العمري، وتحقيق الترابط بين المواد الدراسية المقررة، فضلاً عن إعادة تصميم الكتاب فنياً وجعله عنصراً مشوقاً وجذاباً للمتعلم وخصوصاً تلاميذ الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

ويعد هذا الإنجاز خطوة أولى ضمن مشروعنا التطويري المستمر للمناهج الدراسية ستتبعها خطوات أكثر شمولية في الأعوام القادمة، وقد تم تفاصيل ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة التربية والتعليم والجامعات من الذين أنضجتهم التجربة وصقلهم الميدان برعاية كاملة من قيادة الوزارة والجهات المختصة فيها.

ونؤكد أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى عن السير بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تنوير الجيل وتسلیحه بالعلم وبناء شخصيته المتزنة والمتكاملة القادرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن اليمني الحديث والتعامل الإيجابي مع كافة التطورات العصرية المتسارعة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

أ. د. عبدالرزاق يحيى الأشول

وزير التربية والتعليم

رئيس اللجنة العليا للمناهج



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وبعد ، فإننا نضع هذا الكتاب وهو «كتاب التمارين» بين أيدي أبنائنا الطلبة في الصف الأول الثانوي آملين أن يجدوا فيه الفائدة المرجوة . إن هذا الكتاب وما يحتويه من تمارين على وحدات الكتاب المدرسي بجزئيه الأول والثاني يحتوي بعض التمارين المشابهة لما ورد في كتاب الطالب والبعض الآخر إثرائي ، حيث أن بعض التمارين المتضمنة فيه متعددة الأفكار والمستويات ، وتختلف بعض الشيء عما هو في كتاب الطالب . وعليه فإن كتاب التمارين يحتوي على تمارين ومسائل وتطبيقات إضافية كما في كتاب الطالب . ولهذا يرى فريق التأليف أن يُكلف المدرس طلبه بحل تمارين ومسائل الوحدات المقابلة لوحدات الكتاب المدرسي وخاصة عند الانتهاء من تدريس الوحدة وتحضيراً لاختبار الوحدة والاختبارات الشهرية . ولهذا فإننا ننظر بشوق بالغ أن يوافيينا كافة المدرسين وال媢جهين والمعنيين بالأمر بمحاضاتهم حول فكرة هذا الكتاب (كتاب التمارين) للاستفادة منها . وفقنا الله جميعاً فهو ولـي التوفيق والهادي إلى سـواء السـبيل ..

المؤلفون

المحتويات

الصفحة

الموضوع

٦	■ الوحدة الأولى : المنطق الرياضي
٩	■ الوحدة الثانية : التطبيقات
١٣	■ الوحدة الثالثة : القوى والجذور
٢٠	■ الوحدة الرابعة : الحدو迪ات
٢٣	■ الوحدة الخامسة : البنى الجبرية
٢٧	■ الوحدة السادسة : المعادلات والمتراجحات
٣٢	■ الوحدة السابعة : حساب المثلثات
٣٦	■ الوحدة الثامنة : الهندسة الاعدائية والتحوييلات
٤٢	■ الوحدة التاسعة : المتجهات
٤٦	■ الوحدة العاشرة : الإحصاء

ćمارين عامة وسائل

١) أي من العبارات الآتية صائبة وأي منها خاطئة مع تصويب الخطأ أينما وجد.

أ) لأي قضيتين A ، B يكون $\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B$.

ب) نفي القضية «بعض الطلاب غائبون» هو القضية «كل الطلاب غائبون» .

ج) إذا كانت A قضية صائبة و B قضية خاطئة فإن القضية $(A \rightarrow B)$ خاطئة.

د) لأي قضيتين A ، B يكون : $A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$.

هـ) لأي قضيتين M ، N : $(M \equiv N) \iff (M \rightarrow N)$.

٢) القضيتان التاليتان صائبتان :

الأولى: $S = 2$ جذر للمعادلة $(S - 2)(S - 3) = 0$

الثانية: $S = 3$ جذر للمعادلة $(S - 2)(S - 3) = 0$

بين أيِّ القضايا التالية صائبة وأيها خطأ :

أ) جذراً المعادلة $(S - 2)(S - 3) = 0$ هما ٢ وَ ٣

بـ) أحد جذري المعادلة $(S - 2)(S - 3) = 0$ هو ٢ أو ٣

جـ) أحد جذري المعادلة $(S - 2)(S - 3) = 0$ هو ١ أو ٣

دـ) جذراً المعادلة $(S - 2)(S - 3) = 0$ هما ١ وَ ٤

هـ) أحد جذري المعادلة $(S - 2)(S - 3) = 0$ هو ١ أو ٤

٣) هل القضيتان $A \rightarrow B$ ، $B \rightarrow A$ متكافعتان؟ علل إجابتك.

٤) أعط مثالاً توضح فيه أن صواب الاقتباس $A \rightarrow B$ لا يؤدي بالضرورة إلى صواب الاقتباس $B \rightarrow A$

٥) لأيِّ ثلات قضايا A ، B ، C بين أن كلاً من القضايا التالية صائبة منطقياً :

أ) $(A \wedge B) \rightarrow B$

بـ) $[(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)] \rightarrow (A \rightarrow C)$

٦) لأي قضيتين ١ ، ب أثبت أن:

$$1 \leftrightarrow B \equiv (\sim A \vee B) \wedge (\sim B \vee A) = (B \leftrightarrow A)$$

٧) لتكن $S = \{1, 2, 3, 4\}$ عين قيم صواب كل من القضايا الآتية:

- (أ) $\forall S \in S : S + 3 > 6$
(ب) $\exists S \in S : S + 3 > 6$
(ج) $\forall S \in S : S^2 - 10 \geq 8$
(د) $\exists S \in S : S^2 + S = 15$

٨) اكتب نفي كل من القضايا الواردة في التمرين (٧) ، وبين قيمة صوابها.

اختبار الوحدة

السؤال الأول

في كل من الأسئلة الفرعية التالية، حوط الرقم الذي يرمز للإجابة الصحيحة.

(بعض الأسئلة لها أكثر من إجابة صحيحة):

- ١) أي من القضايا التالية هي نفي للقضية «كل الناس أغنياء»:
أ) بعض الناس أغنياء.
ب) بعض الناس فقراء.
ج) بعض الناس ليسوا أغنياء.
د) لا أحد غني.

- ٢) في أي من الحالات الآتية تكون القضية ($\sim A \sim B$) صائبة:
أ) ١ صائبة وَ ب خاطئة.
ب) كل من ١ ، ب صائبة.
ج) ١ صائبة وَ ($\sim B$) صائبة.
د) كل من ١ ، ب خاطئة.

- ٣) في أي من الحالات الآتية تكون القضية ($\sim A \leftrightarrow B$) خاطئة:
أ) كل من ١ ، ب خاطئة.
ب) ١ صائبة وَ ب خاطئة.
ج) ١ خاطئة وَ ب صائبة.
د) كل من ١ ، ب صائبة.

- ٤) أي من القضايا التالية تكافئ منطقياً القضية ($\sim A \sim B$)
أ) $\sim A \vee B$.
ب) $B \rightarrow A$.
ج) $\sim A \wedge B$.
د) $\sim A \wedge \sim B$.

٥) إذا كانت $s = \{2, 3, 5, 7\}$ فأي من القضايا التالية هي قضية صائبة:

- (أ) $\forall s \in S : s$ عدد فردي
- (ب) $\forall s \in S : s$ عدد أولي
- (ج) $\exists s \in S : s$ عدد زوجي
- (د) $\exists s \in S : s$ ليس أولياً

السؤال الثاني أكمل القضايا الآتية بحيث تصبح القضايا (٣-١) صائبة

والقضايا (٦-٤) خاطئة:

- ١) العدد ١٢ عدد زوجي ويقبل القسمة على ...
- ٢) العدد - ٥ عدد طبيعي أو عدد ...
- ٣) $5 < 7 \leftarrow$ القمر يدور حول ...
- ٤) تدور الأرض حول ... أو حول ...
- ٥) $15 = 15 = 3 \times 5$ و $15 = \dots + \dots$
- ٦) ... $\exists s : s + 2 = 2$ (استخدم أحد الرمزيين (\forall أو \exists))

السؤال الثالث أكمل الجدول التالي، ثم استخدمه في الإجابة عن الأسئلة التالية له:

١	$\sim \forall b$	$\sim \exists b$								
					X	X	ص	ص	ص	ص


١) استنتج من الجدول قضية مركبة صائبة منطقياً.

٢) بين أن: $\sim \forall b \equiv \sim \exists b$


٣) هل القضية $\forall b \sim b$ صائبة منطقياً؟

ć تمارين عامة ومسائل


١ أي المخططات السهمية الآتية تمثل تطبيقاً وبين نوعه:



شكل (٢ - ١ ج)



شكل (٢ - ١ ب)



شكل (٢ - ١ د)

٢ صل كل تطبيق من العمود (أ) بنوعه من العمود (ب) فيما يأتي:


العمود (أ)

متباين وليس غامر

غامر وليس متباين

تقابـل

ليس متباين وليس غامر



(٣) المجدول التالي يمثل التطبيق $t: S \rightarrow C$ حيث $S = \{3, 5, 7, 9, 11\}$ ، $C = \{6, 8, 10, 12, 14\}$

١١	٩	٧	٥	٣	S
١٤	١٢	١٠	٨	٦	$t(S)$

- أ**) أكمل : $t(3) = \dots + 3$ ، $t(5) = \dots + 5$ ، $t(7) = \dots + 7$

ب) أوجد قاعدة هذا التطبيق. **ج**) بين نوعه.

د) أوجد $t^{-1}(8)$ ، $t^{-1}(12)$ ، $t^{-1}(14)$.

هـ) هل معكوس التطبيق t تطبيق؟ أوجد قاعدته إن وجد.

(٤) ليكن التطبيق $t: S \rightarrow C$ معرفاً بالقاعدة $t(s) = s + 7$ ، حيث : $S = \{3, 5, 7, 10, 12, 14, 15\}$.

أ) عبر عن التطبيق كأزواج مرتبة.

ب) أوجد مدى هذا التطبيق.

جـ) هل هذا التطبيق تقابل؟

دـ) أوجد $t^{-1}(12)$ ، $t^{-1}(15)$.

هـ) هل معكوس التطبيق t تطبيق؟

(٥) ليكن التطبيقات t ، w معرفتين كالتالي :

$t: T \rightarrow T$ ، $t(s) = s + 2$ ،

$w: T \rightarrow T$ ، $w(s) = 2s$ ،

أ) ما نوع كل منها؟

بـ) أوجد قاعدة t^{-1} ، w^{-1} .

جـ) أوجد $(t \circ w)(s)$ ، $(w \circ t)(s)$ ، $(t^{-1} \circ w^{-1})(s)$ ،

$(w^{-1} \circ t^{-1})(s)$.

(٦) إذا كانت $L = \{1, 2, 3, 5\}$ كون في كل مرة تطبيقاً مجاله L ومجاله المقابل M ، بحيث تكون :

أ) ثابتاً ، **بـ**) متبايناً ، **جـ**) غامراً ، **دـ**) تقابلًا ، **هـ**) غير متبايناً ، **وـ**) غير غامر.

(٧) ليكن التطبيق t : $s \leftarrow s \text{ معروفاً بالقاعدة } t(s) = s + 2$ ، حيث $\{s : s \geq 5 \Rightarrow s \geq 9\}$ ، $s = \{\text{ص} : \text{ص} \geq 7 \Rightarrow \text{ص} \geq 11\}$. أثبت أن: t^{-1} تطبيق وأوجد قاعدته.

(٨) إذا كان التطبيق t_1 : $h \leftarrow h \text{ معروفاً بالقاعدة } t_1(s) = s^2 + 1$ والتطبيق t_2 : $h \leftarrow h \text{ معروفاً بالقاعدة } t_2(s) = s + 2$.

(أ) أوجد قاعدة $(t_1 \circ t_2)(s)$ ، $(t_2 \circ t_1)(s)$ وقارن بينهما.

(ب) أوجد $(t_1^{-1} \circ t_2^{-1})(s)$ ، $(t_2^{-1} \circ t_1^{-1})(s)$.

(ج) أوجد $(t_1 \circ t_2)(3)$ ، $(t_1^{-1} \circ t_2^{-1})(5)$.

(٩) ما نوع التطبيق t : $t \leftarrow \text{ط المعرف بالقاعدة } t(s) = 7$.

(١٠) ما نوع التطبيق t : $s \leftarrow s \text{ معروفاً بالقاعدة } t(s) = s^2$.

(١١) ليكن التطبيق t : $t \leftarrow \text{ط معروفاً بالقاعدة } t(s) = s$ ،

أثبت أن التطبيق t تقابل.

(١٢) إذا كان التطبيق t : $s \leftarrow h$ [حيث s مجموع الأعداد الزوجية] معروفاً بالقاعدة $t(s) = s^2$.

(أ) أوجد $t(2)$ ، $t(18)$ ، $t(112)$.

(ب) أوجد $t^{-1}(25)$ ، $t^{-1}(34)$.

(ج) هل t^{-1} تطبيق؟ أوجد قاعدته إن وجد.

(١٣) ليكن التطبيق t : $h \leftarrow h \text{ معروفاً بالقاعدة } t(s) = 3s$

(أ) بيّن نوع هذا التطبيق.

(ب) أوجد التطبيق العكسي له.

(١٤) هل من الممكن أن يكون التطبيق الثابت غامراً.

(١٥) ليكن التطبيق t : $h \leftarrow h \text{ معروفاً بالقاعدة } t(s) = 3s - 3$

أثبت أن t تقابل وأوجد قاعدة التطبيق العكسي.

(١٦) ليكن h : $h \leftarrow h \text{ معروفاً بالقاعدة } h(s) = 3s + 5$

أثبت أن التطبيق h تقابل ثم أوجد قاعدة التطبيق العكسي.

اختبار الوحدة

١) بين نوع التطبيق t : $h \rightarrow h$ والمعرف بالقاعدة $t(s) = 2s + 5$.

ليكن التطبيق h : $s \rightarrow s$ معروفاً بالقاعدة $h(s) = 4s + 3$,

أ) أوجد $h^{-1}(5)$, $h^{-1}(3)$, $h^{-1}(-s)$.

ب) هل معكوس التطبيق h تطبيق؟ أوجد قاعدته إن وجد.

٢) إذا كان التطبيق w : $h \rightarrow h$ والمعروف بالقاعدة $w(s) = s + 1$ والتطبيق

t : $h \rightarrow h$ والمعروف بالقاعدة $t(s) = 3s + 4$.

أ) أثبت أن $(w \circ t)(s) = (t \circ w)(s)$


ب) أوجد $(t \circ w)(3)$

٣) ليكن t : $s \rightarrow s$ تطبيقاً موضحاً بالخط السهمي شكل (٢-٢).

أ) أوجد $t^{-1}(4)$, $t^{-1}(64)$.

ب) اكتب التطبيق t كأزواج مرتبة.

ج) هل معكوس التطبيق t تطبيق؟ لماذا؟



شكل (٢-٢)

ćمارين عامة وسائل

١: القوى

(١) بسط ما يأتي : علماً بأن المتغيرات أعداد حقيقة لا تساوي الصفر

أ) $(x^2 - 1)^2$ ب) $(x^3 + 1)^2$ ج) $(x^2 - 1)^{-2}$

د) $x^{-4}(x^3 - 1)^2$ هـ) $(x^3 - 1)^{-5}$

ـ) $\frac{x^2(x+1)^5}{(x+1)^5}$ ز) $\frac{x^3(x-1)^4}{(x-1)^5}$

ـ) $\frac{x^3}{(x+1)^4}$ ط) $\frac{x^4}{(x+1)^4}$

ـ) $\frac{x^3 - x^2}{x^2 - x}$ كـ) $(x^2 - 1)^3(x^2 + 1)^2$

(٢) ضع كلاً مما يأتي في أبسط صورة باعتبار المتغيرات أعداداً حقيقة لا تساوي صفرأ

أ) $\left(\frac{x^3 - x^2}{x^4}\right)^{-1}$ بـ) $\left(\frac{x^2 - x^3}{x^3}\right)^{-2}$

ـ) $(x^2 + 1)^3(x^2 - 1)^2$ جـ) $(x^2 - 1)^{-3}(x^2 + 1)^{-1}$

ـ) $\frac{x^4 - x^2}{x^2 - x^4}$ هـ) $\frac{1}{2}x^3(x^4 - 1)^{-3}$

ـ) $\left(\frac{x^2 - x^4}{x^4 - x^2}\right)^{-5}$ زـ) $(x^2 - 1)^{-2}(x^2 - 1)^{-3}$

ـ) $\frac{1 - x^{-1}}{1 - x^{-1}}$ طـ) $\frac{1 - (1+b)^{-1}}{1 - (1+b)^{-2}}$

ـ) $(x^2 - 1)^0$ كـ) $[x^2 + (x^2 - 1)]^2$

٢: الجذور والأسس النسبية

(١) اختصر ما يأتي: بفرض أن كل المتغيرات $\in \mathbb{R}$ + ولا تساوي صفرًا .

أ) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ **ب)** $b^{\frac{3}{4}} \cdot b^{\frac{3}{4}}$ **ج)** $(\frac{2}{3})^{\frac{1}{3}}$

د) $(\frac{3}{4})^4$ **هـ)** $(\frac{3}{4}^3)^{\frac{1}{4}}$ **وـ)** $(\frac{3}{4}^3)^{-\frac{1}{4}}$

طـ) $\frac{\frac{1}{3}b}{\frac{5}{6}b}$ **حـ)** $(b^{-\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}$ **زـ)** $(b^2)^{\frac{1}{10}}$

(٢) بسط ما يأتي: بفرض أن المتغيرات $\in \mathbb{R}$ + والمقام لا يساوي صفرًا .

أ) $\frac{s^{\frac{1}{2}}}{s^{\frac{1}{3}}}$ **ب)** $\frac{s^{\frac{1}{2}}}{s^{\frac{1}{3}}}$ **جـ)** $\frac{s^{\frac{1}{3}}}{s^{\frac{1}{2}}}$

دـ) $\frac{s^{\frac{5}{4}}}{s^{\frac{5}{3}}}$ **هـ)** $(b^{\frac{1}{2}})^{-2}$ **وـ)** $(\frac{s^{\frac{1}{3}}}{s^{\frac{1}{2}}}^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{2}}$

زـ) $\frac{s^{\frac{3}{2}}}{s^{\frac{2}{3}}}$ **حـ)** $(b^{\frac{1}{2}})^{-5}$

٣: تبسيط الجذور

(١) بسط ما يأتي: (جميع المتغيرات $\in \mathbb{R}$ +) .

أ) $\sqrt[3]{19b^3}$ **ب)** $\sqrt[9]{s^3}$ **جـ)** $\sqrt[3]{27b^3}$

دـ) $\sqrt[6]{27}$ **هـ)** $\sqrt[20]{20}$ **وـ)** $\sqrt[24]{24}$

زـ) $\sqrt[4]{50}$ **حـ)** $\sqrt[9]{25s^3}$ **طـ)** $\sqrt[3]{54}$

كـ) $\sqrt[3]{227b^2}$ **لـ)** $\sqrt{\frac{1}{5}}$ **يـ)** $\sqrt[9]{450b^6}$

(٢) ضع كلاً ما يأتي في أبسط صورة (جميع المتغيرات $\in \mathbb{H}$ + المقام لا يساوي صفرًا):

ج) $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{81}}$

ب) $\sqrt{\frac{16}{25}}$

أ) $\frac{s}{\sqrt[4]{s^3}}$

د) $\sqrt[3]{\frac{b^2}{3ab^4}}$

هـ) $\sqrt[3]{\frac{s^2}{s^3}}$

ـ) $\sqrt[3]{\frac{27}{4}}$

ط) $\sqrt[3]{\frac{8}{4}}$

ـ) $\sqrt[3]{\frac{5}{12}} \times \sqrt[3]{\frac{72}{b^4}}$

ـ) $\sqrt[3]{\frac{2s}{8}} \times \sqrt[3]{\frac{s^2}{s}}$

٤: جمع وطرح الجذور

(١) ضع كلاً ما يأتي في أبسط صورة: (المتغيرات $\in \mathbb{H}$ + المقام لا يساوي صفرًا).

ب) $\sqrt{50} + \sqrt{18}$

أ) $\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{3}$

د) $s^5 \sqrt[2]{s^2} - s^2 \sqrt[3]{s^3}$

ـ) $\sqrt[11]{9} + \sqrt[18]{1}$

ـ) $\frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{2}{\sqrt{1}}$

ـ) $\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{5}{\sqrt{6}}$

ـ) $\sqrt[7]{50} + \sqrt[7]{2} + \sqrt[7]{81}$

ـ) $\sqrt[24]{3} - \sqrt[81]{7}$

ـ) $\sqrt[18]{4} + \sqrt[16]{1} + \sqrt[4]{81}$

ـ) $\sqrt[3]{256} - \sqrt[3]{81}b^4$

(٢) بسط ما يأتي: (كل المتغيرات $\in \mathbb{H}$ + المقام لا يساوي صفرًا).

ب) $\frac{2}{\sqrt{1}} - \frac{5}{\sqrt{99}}$

أ) $\frac{3}{\sqrt{b}} + \frac{2}{\sqrt{1}}$

ـ) $\frac{4}{\sqrt{s}} - \frac{5}{\sqrt{s^2}}$

ـ) $\frac{4}{\sqrt{50}} - \frac{2}{\sqrt{2s^18}}$

٥: ضرب وقسمة الجذور

(١) أوجد ناتج ما يأتي: (علمًا بأن المتغيرات $\in \mathbb{H}$ + المقام لا يساوي صفرًا)

أ) $(\sqrt[1]{2} - \sqrt[6]{1})(\sqrt[1]{2} + \sqrt[6]{1})$

ـ) $(\sqrt[7]{7} + \sqrt[10]{1})(\sqrt[7]{7} - \sqrt[10]{1})$

ـ) $2(\sqrt[5]{5} - \sqrt[5]{-5})$

$$\text{هـ) } (\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2}) \quad \text{وـ) } (\sqrt[3]{s} + \sqrt[3]{s})$$

$$\text{جـ) } \frac{15}{\sqrt[6]{4}}$$

$$\text{زـ) } \frac{1}{2 + \sqrt[6]{1}}$$

$$\text{كـ) } \frac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{b} - \sqrt[3]{a}}$$

$$\text{يـ) } \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}}$$

٦: حل المعادلات الأسية والجذرية

(١) حل المعادلات الآتية:

$$\text{أـ) } s^2 - 23 = 2 \times 12 - s^4$$

$$\text{بـ) } s^5 - 243 = 25 + s^5 \times 6$$

$$\text{جـ) } s^5(s^3 + s) = 1$$

$$\text{دـ) } s^6 + 6 = 7 - s^7 - s^6(36)$$

$$\text{هـ) } s^7 + 7 \times 8 = s^2 - 7$$

$$\text{زـ) } s^2 - 2s^3 + s^3 = 1 + s^2 - 2s$$

(٢) أوجد مجموعة الحل للمعادلات الآتية:

$$\text{أـ) } 5 = \frac{1}{s-3}$$

$$\text{بـ) } \sqrt{s+20} = 1 + \sqrt{2+s}$$

$$\text{جـ) } s^3 = 1 + 5 + \sqrt{s+3}$$

$$\text{دـ) } 5 = \sqrt{4+s^3} - \sqrt{4-s^2}$$

$$\text{هـ) } s^2 + \sqrt{s+20} = s^5$$

$$\text{زـ) } s = \sqrt{5+s} + \sqrt{s+5}$$

$$\text{طـ) } s^5 = s^3 - 1$$

(٣) حل ما يأتي:

$$\text{أـ) } s = \frac{1}{s+1}$$

$$\text{بـ) } \sqrt[3]{s+2} = s^4$$

ćمارين متنوعة

(١) اكتب ما يلي في أبسط صورة:

$$\frac{10(1,05)}{14(1,05)} \quad (ب)$$

$$^{\circ}(1,04) \times ^{\circ}(1,04) \quad (أ)$$

$$\frac{(54-)(54-)(15-)(42-)}{36 \times 25 \times 2(3-)} \quad (د)$$

$$\frac{^2(3-)^3(5-)-^4(2-)}{^3(15-)^2(6-)} \quad (ح)$$

$$\frac{^{\frac{1}{3}}b}{^{\frac{5}{3}}b} \times b^{\frac{1}{3}} \times b^{\frac{5}{3}} \quad (ه)$$

$$\sqrt[3]{3888} \quad (ح)$$

$$\sqrt[3]{147} \quad (ز)$$

$$\sqrt[3]{64 \times 27} \quad (ك)$$

$$\sqrt[8]{16b} \quad (ط)$$

$$\sqrt{108} \times \sqrt{72} \times \sqrt{12} \times \sqrt{3} \quad (ل)$$

(٢) احسب ناتج ما يلي:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{27}} \times \frac{1}{\sqrt[3]{7}} \quad (ب)$$

$$\sqrt[3]{0,008} \quad (أ)$$

$$\frac{^{\frac{1}{4}}(81)}{\sqrt[5]{7} \times \sqrt[4]{7}} \quad (د)$$

$$\frac{\sqrt[24]{7} \times \sqrt[60]{7}}{\sqrt[5]{7} \times \sqrt[4]{7}} \quad (ح)$$

$$\frac{^{\frac{2}{5}}(8-)}{\sqrt[5]{(0,008)}} \quad (ه)$$

$$\frac{^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{(0,008)}} \quad (ح)$$

(٣) احسب القيمة العددية لكل من المقادير الآتية:

$$\sqrt{s+2} + \sqrt{sc} \quad (أ)$$

$$\sqrt{sc} - \sqrt{s^3} \quad (ح)$$

$$\sqrt{s+3} \quad (د)$$

أولاً: عندما $s = 5$ ، $c = 4$ ثانياً: عندما $s = 4$ ، $c = 5$

٤ اختصر ما يلي:

$$\frac{1}{9}\sqrt[3]{3 - 24\sqrt{3} + 81\sqrt{7}} \quad (ب)$$

$$\frac{50\sqrt{7} - 18\sqrt{7} + 8\sqrt{7}}{\sqrt{50\sqrt{7}}} \quad (أ)$$

$$\frac{\sqrt{12\sqrt{3}}}{\sqrt{2\sqrt{7}}} \quad (د)$$

$$\sqrt[3]{16 \times 4\sqrt{7}} \quad (ح)$$

$$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2 + 5\sqrt{7}}} \quad (و)$$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2\sqrt{7}}} \quad (هـ)$$

$$\frac{\sqrt{2\sqrt{3+1}}}{\sqrt{5\sqrt{7} + \sqrt{2\sqrt{7}-1}}} \quad (ز) \quad \text{، ص} \rightarrow \frac{\sqrt{ص}}{\sqrt{ص+\sqrt{ص}}} - \frac{\sqrt{س}}{\sqrt{س}}$$

٥ رتب الجذور الآتية تنازلياً:

$$\sqrt[100]{10}, \sqrt[7]{7}, \sqrt[7]{1}, \sqrt[5]{5} \quad (ب)$$

$$\sqrt[5]{5}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[2]{2} \quad (أ)$$

٦ رتب الجذور الآتية تصاعدياً:

$$\sqrt[3]{3}, \sqrt[2]{2}, \sqrt[5]{4} \quad (ب)$$

$$\sqrt[4]{12}, \sqrt[3]{9}, \sqrt[5]{5} \quad (أ)$$

٧ حل المعادلات الآتية:

$$2 = \sqrt{s-4} \quad (ب) \quad 2 = \sqrt{2s+7} \quad (أ)$$

$$5 = \sqrt{s-10} - \sqrt{s+3} \quad (د) \quad . = 2 - \sqrt{2s-s} \quad (ح)$$

$$1 = s^4 - (s^3)^s \quad (و) \quad 16 = 2^5 \times 2^{-6} \quad (هـ)$$

$$2 = \sqrt{2(s+2)} \quad (ن)$$

٨ أثبت أن:

$$\frac{11}{15} = \frac{1-5^{23} \times 4^{23} - 5^{23} \times 5}{5^{23} - 1^{23} - 5^{23} \times 2}$$

اختبار الوحدة

١) ضع ما يأتي في أبسط صورة: (علمًا بأن المتغيرات في المقام ≠ ٠)

$$\frac{1 + s^3}{s^{15} \times s^5} \times \frac{s^2 \times 27}{9}$$

(ب)

$$\frac{3b^{-4}}{(2b^2)^2}$$

(أ)

$$(s^2 - s^1)^3 (s^1 - s^2)^8$$

(ج)

٢) بسط ما يأتي:

$$\sqrt[6]{25} \sqrt{3} - \sqrt[7]{5} \sqrt{2} + \sqrt[12]{5}$$

(ب)

$$\sqrt[64]{7} + \sqrt[16]{3} - \sqrt[8]{7}$$

(أ)

٣) بسط ما يأتي:

$$2(\sqrt{5} + \sqrt{7})(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$$

(ب)

$$\frac{1 + \sqrt{3}\sqrt{2}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

(ج)

$$\frac{s^2 + s}{s^3 + \sqrt{sc}}$$

(د)

٤) حل المعادلات الآتية:

$$5 = \frac{1}{2}(2 + s^3)$$

(ب)

$$32 = 8^{s+1}$$

(أ)

$$16 - (\frac{1}{2}) = s^3 - 2 \times s^2$$

(د)

$$15 = s^{2-s} + s^{1+s}$$

(ج)

$$3 = \sqrt[2+s]{2}$$

(هـ)

ć تمارين عامة ومسائل

١) اكتب الحدوبيات التي معاملاتها:

أ) $1 = .1 = ,1 , 2 = ,2 = 3 , 0 = 0 = ,0 , 3 = ,3 , 1 = ,1 = 8 , 7 = ,7$

ب) $5 = ,5 , 0 = 0 = ,0 , 7 = ,7 , 2 = ,2$

ج) $4 = ,4 , 1 = ,1 = 1$

٢) حدد الدرجة لكل حدودية مما يأتي وبين المعامل الرئيس والحد المطلق لكل حدودية:

أ) $s^3 + 2s - 3$

ب) $s^3 + s^2 - s + 6$

٣) أوجد القيمة العددية لكل حدودية مما يأتي:

أ) $s^2 + 3s + 2$ عندما $s = 1$

ب) $s^3 + s^2 + 6s + 6$ عندما $s = -1$

ج) $\frac{1}{2}s^4 + s^3 + 2s^2 - 3$ عندما $s = \frac{1}{2}$

٤) إذا كانت x_1 هي $s^5 - 3s^7 + 4s^3 + 3$ ، x_2 هي $s^3 - 2s^5 + s^2 - 7$

أوجد:

أ) $x_1 + x_2$

ب) $x_2 + x_1$

ج) $x_1 + x_2$

د) $x_2 - x_1$

٥) إذا كانت x_2 عاملًا من عوامل x_1 في كل مما يأتي فأوجد العامل الآخر:

(أ) x_1 هي $s^2 - 4$ ، x_2 هي $s - 2$

(ب) x_1 هي $-4s^5 - 20s^3 + 10$ ، x_2 هي $s^2 + 2$

(ج) x_1 هي $s^3 - 6s^2 - 13s + 42$ ، x_2 هي $s^2 - 7$

(د) x_1 هي $s^3 - 2s^2 - 13s - 10$ ، x_2 هي $(s - 5)$

(هـ) x_1 هي $s^3 - 2s^2 - 5s + 6$ ، x_2 هي $(s + 2)$

٦) أوجد في كل مما يأتي خارج وباقى قسمة x_1 على x_2 :

(أ) x_1 هي $s^4 - 2s^3 + 2s - 6$ ، x_2 هي $s^3 - 2$

(ب) x_1 هي $2s^3 + s^2 - 4$ ، x_2 هي $s^2 + 3$

(ج) x_1 هي $(2s^2 - 3s^3 + s - 2)$ ، x_2 هي $(3s^2 - 2s + 1)$

(د) x_1 هي $6s^5 - 19s^4 + 21s^3 - 14s^2 + 5s - 1$ ، x_2 هي $(3s^3 - 2s + 1)$

٧) أوجد قيمة كل من أ، ب التي تجعل x_1 تقبل القسمة على x_2 في كل مما

يأتي:

(أ) x_1 هي $2s^2 + s^3 - 2s + 1$ ، x_2 هي $s^2 - 1$

(ب) x_1 هي $s^4 + 4s + b$ ، x_2 هي $s^2 - 2s$

٨) حدد فيما إذا كان أصفار الحدودية المعطاة في كل مما يأتي:

(أ) $2 = 1$ ، $2 = s^2 - 4s + 5$ ، $2 = s^2 - 4$

(ب) $1 = 1$ ، $1 = s^3 + 7s^2 + 6s + 5$

(ج) $s^2 - 2 = 1$ ، $\overline{2} = 1$

٩) أوجد أصفار كل من الحدوبيات التالية واكتبها على شكل عوامل:

أ) $s^6 - s^2 - 1$ ب) $s^5 + s^3 - 5$

ج) $s^3 + s^2 - 12$ د) $s^8 + s^6 + s^3 + s^2 + 11$

هـ) $s^3 - s^2 - 13$ سـ) $s^3 - s^2 - 10$

اختبار الوحدة

١) اكتب الحدوبية التي معاملاتها:

$1 = .s^3 , s^4 = s^0 , s^3 - s^1 = s^7 , s^0 = s^4$

ب) إذا كانت $\frac{1}{s}$ هي $s^3 - s^2 - s^1 - s^0$ ،

فأوجد $\frac{1}{s^2}$ هي $s^2 - s^3 - s^4$:

١) $s^2 - s^1 + s^0$ ٢) $s^0 - s^1 \div s^2$ ٣) $s^1 + s^2$

٤) بين فيما إذا كانت $\frac{1}{s}$ تقبل القسمة على s^2 أم لا في كل مما يأتي :

أ) s^2 هي $s^4 - s^3$ ب) s^2 هي $s^2 + s^3$

ج) s^1 هي $s^3 - s^2 + s^1 - s^0$ د) s^2 هي $s^2 + s^3$

٥) أوجد أصفار كل من الحدوبيات التالية واكتبها على شكل عوامل:

أ) $s^2 + s$ ب) $s^2 + s^5 + s^3 + s^2$

ج) $s^3 - s^2 + s$

٦) أوجد باقي قسمة s^1 على s^2 باستخدام نظرية الباقي.

أ) s^2 هي $s^4 - s^2 - s^1 - s^0$ ب) s^2 هي $s^2 + s^1$

ج) s^1 هي $s^5 - s^3 - s^0 + s^4 - s^2 - s^1$ د) s^2 هي $s^1 - 1$

تمارين عامة ومسائل

١) بين في أي من الجداول التالية يكون $(s, *)$ نظاماً رياضياً :

$$\{8, 4, 2, 1\} = s$$

8	4	2	1	*
8	1	4	2	1
2	3	4	8	2
8	4	1	5	4
4	1	2	8	8

8	4	2	1	*
1	8	2	4	1
4	2	1	8	2
2	8	4	1	4
8	4	1	2	8

2	4	2	1	1
1	6	4	2	2
1	8	2	4	4
4	2	6	8	8

٢) ادرس خواص كلّ من العمليات Δ ، ∇ ، $*$ ، \circ المعرفة بالجدائل التالية على المجموعة $s = \{3, 2, 1\}$:

3	2	1	\circ
3	2	1	1
1	1	2	2
1	2	3	3

3	2	1	*
1	3	2	1
1	1	3	2
2	1	1	3

3	2	1	∇
3	2	1	1
3	2	2	2
3	3	3	3

3	2	1	Δ
1	1	1	1
2	2	1	2
3	2	1	3

٣) لتكن $s = \{1, 2, 3, 5, 7\}$ ولنعرّف عليها العمليات Δ ، $*$ ، \circ بالجدائل التالية :

7	5	3	1	\circ
7	5	3	1	1
5	7	1	3	3
3	1	7	5	5
1	3	5	7	7

7	5	3	1	*
7	5	3	1	1
7	5	3	3	3
7	5	5	5	5
7	7	7	7	7

4	3	2	1	1
5	4	3	2	3
6	2	4	3	5
7	6	5	4	7

بِّينَ أَيًّاً مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ ثَنَائِيَّةٌ عَلَى سَمِّهِ ثُمَّ أُوْجِدَ لِكُلِّ عَمَلِيَّةٍ ثَنَائِيَّةٍ مَا يَأْتِي:

(١) **العنصر المحادي إن وجد.** **ب)** نظير كل عنصر إن أمكن.

(٤) **لنعرف العمليّة *** كما يلي: $b * a = b^a$ حيث $a \neq 0$.

(٥) **هل العمليّة *** ثنائية على ط؟ **ب)** هل $(\text{ص}^{\text{ه}}, *)$ نظاماً رياضياً؟

(٦) **أيٌّ من الأزواج التالية يمثل نظاماً رياضياً:**

$(\text{ط}, -)$, $(\text{ص}^{\text{ه}}, \times)$, $(\text{ط}, \div)$, $(\text{ح}^*, \times)$; $(\text{ص}^{\text{ه}}, +)$

(٦) **لنعرف العمليّة *** على صم بالقاعدة: $a * b = a^b + 1$ ادرس خواص هذه

العمليّة من حيث كونها (ثنائية – تبديلية – تجمعيّة – ذات عنصر محادي).

(٧) **لتكن $\text{ص}^{\text{ه}} = \{0, 1, 2, 3\}$ بِّينَ أَيًّاً مِنَ الْأَنْظَمَةِ الْآتِيَّةِ يَمْثُلُ زَمْرَةً:**

$(\text{ص}^{\text{ه}}, +)$, $(\text{ص}^{\text{ه}}, \odot)$, $(\text{ص}^{\text{ه}}, \ominus)$

(٨) **لنعرف العمليّة *** على صم بالقاعدة: $s * c = s + c$ أجب عمّا يلي:

(٩) **هل العمليّة *** إبدالية؟ **ب)** هل $*_{\text{تجمعيّة}}$ ؟

(١٠) **هل للعمليّة *** عنصر محادي؟ **د)** هل يوجد لكل عنصر نظير؟

(٩) **لتكن العمليّة *** معرفة على سم = $\{1, 3, 5, 7\}$ بالقاعدة: $a * b =$ باقي

قسمة a ب على 8 ، أثبت أن $(\text{س}^{\text{ه}}, *)$ زمرة تبديلية. ثم حل المعادلات التالية:

$$s * 3 = 7, \quad 7 * s = 5$$

(١٠) **لتكن سم = {س : س = 3n, n ∈ صم}** ولتكن * هي عملية الجمع العادي
هل $(\text{س}^{\text{ه}}, *)$ يمثل زمرة؟

(١١) **لتكن سم = {3, 5, 7, 2}** مجموعـة المجموعـات الجزئـية لـ سـمـ.

(١٢) **هل $(2^{\text{س}^{\text{ه}}}, \cup)$ يمثل زمرة؟** **ب)** هل $(2^{\text{س}^{\text{ه}}}, \cap)$ يمثل زمرة؟

(١٢) إذا كانت $*$ عملية معرفة على S بالقاعدة: $s * s = s + s - 3$

(أ) عين العنصر المحايد للعملية $*$ **ب)** أوجد قاعدة نظير العنصر.

(١٣) إذا كان النظام $(H, *)$ يمثل زمرة حيث $*$ معرفة بالقاعدة:

$s * s = s + s - s$ فعين العنصر المحايد، ثم أوجد قاعدة نظير العنصر.

(١٤) لتكن $*$ عملية معرفة على H بالقاعدة $a * b = \frac{a+b}{a+b}$ حيث $a + b \neq 0$.

برهن أنه لا يوجد للعملية $*$ عنصر محايد.

(١٥) لتكن $S = \{z, f\}$ حيث z عدد صحيح زوجي ، f عدد صحيح فردي
أثبت أن $(S, +)$ يمثل زمرة.

(١٦) لتكن $S = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ مجموعة المجموعات الجزئية لـ S ولتكن \oplus عملية
معرفة على S بالقاعدة: $a \oplus b = a \cup b - a \cap b$ ، $b \in S$ ،
برهن أن (S, \oplus) يمثل زمرة إبدالية.

(١٧) لتكن $S = \{x^0, x^1, x^2, x^3\}$: $s \in S$ ، $a \neq 0$ ، برهن أن (S, \times) زمرة.

(١٨) لتكن $S = \{x^0, x^1, x^2\}$: $n, m \in S$ ، برهن أن (S, \times) زمرة.

(١٩) برهن أنه إذا كان كل عنصر في الزمرة $(S, *)$ نظير نفسه فإن هذه الزمرة
تبديلية.

(٢٠) ليكن لدينا الزمرتان $(S_1, +)$ ، (S_2, \circ) ، فبرهن أن $S_1 \times S_2$ يكون زمرة بالنسبة للعملية Δ المعرفة كما يلي:

$$(1, b_1) \Delta (2, b_2) = (1 + 2, b_1 \circ b_2)$$

$$+ 1, b_1 \in S_1 ; b_1, b_2 \in S_2 \in S_1 \times S_2$$

اختبار الوحدة

(١) لتكن $S = \{1, 0, 2\}$ وعرّفنا عليها العمليتين \oplus ، \odot كما يلي:

$$\oplus: b = \text{باقي قسمة } a + b \text{ على } 3$$

$$\odot: b = a + b$$

بَيْنَ أَيَّاً مِنَ الْعَمَلَيْتَينِ ثَانِيَّةً عَلَى S .

(٢) بَيْنَ أَيَّاً مِنَ الْأَزْوَاجِ الْآتِيَّةِ يَمْثُلُ نَظَامًا رِياضيًّا :

$$(S, \div), (S, \times), (S, *), (S, +)$$

(ب) برهن أن النظير في الزمرة عنصر وحيد.

(٣) في الجدول التالي ادرس الخواص التالية للعملية $*$ على

$$S = \{1, 2, 3, 4\} :$$

الإبدال – العنصر المحايد – النظير.

4	3	2	1	*
2	2	1	3	1
4	3	2	1	2
1	1	2	2	3
1	2	4	3	4

(٤) إذا كانت $S = \{-1, 1\}$ والنظام (S, \times) يمثل زمرة :

(أ) عَيْنِ العَنْصَرَ الْمَحَايِدَ ، وَنَظِيرَ كُلِّ عَنْصَرٍ.

(ب) حل المعادلة $s \times -1 = 1$

(٥) لنعرف العملية $*$ على H بالقاعدة: $s * h = s + h - \frac{1}{3}$

أثبت أن $(H, *)$ زمرة تبديلية.

ćمارين عامة ومسائل

أولاً : المعادلات

(١) أوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات التالية باستخدام القانون العام:

(أ) $s^5 - 2s^2 - 1 = 0$

(ب) $2s^6 - 2s^7 + 5 = 0$

(٢) بين أن $s=5$ جذر للمعادلة $s^3 - 2s^2 - 19s + 20 = 0$ ثم أوجد الجذر الآخر.

(٣) لتكن المعادلة $5s^2 - 5s + 2 = 0$

ما قيمة s إذا كان أحد جذريها يساوي -1 ؟

(٤) أوجد مجموع الجذرين وحاصل ضربهما للمعادلات الآتية:

(أ) $s^5 - 3s^2 - 1 = 0$

(ب) $7s^2 + 2s - 4 = 0$

(٥) لتكن المعادلة $(s+5)(s-8) = s^2 - 5s + 1 = 0$ ، $s \neq 5$

(أ) أوجد مجموع الجذرين وحاصل ضربهما بدلالة s .

(ب) أوجد قيمة s لكي يكون للمعادلة جذران حقيقيان متساويان.

(٦) لتكن المعادلة $s^2 + 5m = 0$

أوجد قيم m التي تجعل للمعادلة جذرين حقيقيين مختلفين.

(٧) كون المعادلات التي تتتصف بالشروط التالية (حيث s_1, s_2 جذراً المعادلة):

(أ) $s_1 + s_2 = \frac{3}{4}$

(ب) $s_1 + s_2 = -4$

(ج) $s_1 + s_2 = -\frac{1}{4}$

(٨) كون المعادلات التي لها الجذران في الحالات الآتية:

(أ) $s_1 = 2$

(ب) $s_1 = -3$

(ج) $s_1 = 0$

(د) $s_1 = \frac{7}{2}$

(٩) لتكن المعادلة $M = 2(m+4)s + m - 1 = 0$ ، $m \neq 0$

(أ) حل المعادلة في الحالات الآتية: $m = 1$ ، $m = 2$

(ب) أوجد مجموع جذري المعادلة وحاصل ضربهما بدلالة m .

(ج) أوجد قيمة m لكي يكون للمعادلة جذران حقيقيان متساويان.

(١٠) أوجد جذري المعادلات الآتية:

(أ) $s^3 + 2s - 5 = 0$

(ب) $s^7 - 8s^2 + s + 1 = 0$

(ج) $s^9 + 2s^6 + 11s^3 + 2 = 0$

ثانياً : المراجحات

(١) أوجد مجموعة الحل لكل من المراجحات التالية:

(أ) $5s - 7 > 3s - 15$

(ب) $|5s - 12| \geq |3s - 9|$

(ج) $|s - 12| \leq 2s$

(٢) أوجد مجموعة الحل لكل من المتراجحات التالية:

- (أ) $s^5 - 7s < 0$
- (ب) $\frac{13}{7}s < s < \frac{11}{5}$
- (ج) $-5s + 7 > 2s - 3$
- (د) $2s - 3s > 0$
- (هـ) $5s - 4 < 3s + 4$
- (و) $2s + 4 \geq 3s - 6$
- (ز) $2s + 5 < s$

(٣) أوجد مجموعة حل كل مميايّاتي ومثله بيانياً:

- (أ) $s^3 - 6 \geq 1$
- (ب) $2 - s > 1 - s$
- (ج) $2 - 1 \leq s - 1 \geq 2$
- (د) $|s - 3| > 4$

(٤) برهن أن: $|s - \frac{b-a}{2}| > b \iff s > \frac{b+a}{2}$

(٥) إذا كانت $f_1 = [2, \infty)$, $f_2 = [3, \infty)$, $f_3 = [5, 2]$, $f_4 = [8, 5]$, $f_5 = [3, 3]$, $f_6 = [5, 3]$, $f_7 = [2, 2]$, $f_8 = [1, 1]$:

أوجد كلاً مما يأتي:

- (أ) $f_1 \cap f_2$
- (ب) $f_1 \cup f_2$
- (د) $f_3 \cap f_4$
- (هـ) $f_1 \cap f_3$
- (و) $f_4 \cap f_5$
- (ز) $f_1 \cup f_6$
- (ط) $f_2 \cap f_6$

٦) إذا كانت: $|a - b| \geq l$, $|b - c| \geq l$, $|c - a| \geq l$ أثبت أن $a - b \geq l + k$

أثبت أن:

$$b) |as| = |sa| \neq 0, \text{ ص} \neq 0$$

٧) ارتفاع مثلث يقل عن قاعده بمقدار ٨ سم. أوجد الارتفاع المناسب للمثلث

الذي يجعل مساحته أكبر من ١٠ سم.

٨) أوجد مجموعة الحل لكل مما يأتي:

$$a) s^2 - 2s - 2 > 0$$

$$b) |s^2 - 4| < 5$$

$$c) 5 \geq \frac{s^3 - 5}{2} > 4$$

٩) مستطيل يزيد طوله عن عرضه بمقدار ٣ سم، ما طوله الذي يجعل مساحته

أصغر من ٢٠ سم؟

١٠) أوجد مجموعة حل المتراجحات التالية:

$$a) s^3 - s^2 \leq 0$$

$$b) \frac{|s^2 - s - 6|}{|s^3 - s|} \leq 6$$

$$c) \frac{1}{s^3} \geq \frac{1}{s^2}$$

$$d) \frac{1}{s^2} \geq \frac{1}{s^5}$$

$$e) \pi \leq |s|$$

$$f) 0 < s + 2s - 1 \leq 0$$

$$g) 0 < s + 2s - 1 \geq 0$$

اختبار الوحدة

السؤال الأول

(١) أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري كل من المعادلتين التاليتين:

(ج) $s^2 - 2s - 5 = 0$ (د) $s^3 - 2s^2 - 8s = 0$

(٢) أوجد مجموعة الحل لكل من المتراجحات التالية:

(ب) $s^3 - s^2 > s + 1$ (ج) $|s^2 - 5s| \leq 0$

السؤال الثاني

(١) كون المعادلات في الحالتين التاليتين:

(أ) $s_1 + s_2 = 4$, $s_1 \times s_2 = 10$

(ب) $s_1 + s_2 = -2$, $s_1 \times s_2 = \frac{3}{4}$

حيث s_1, s_2 هما جذرا المعادلة.

(٢) إذا كانت $f_1 = [2, 5], f_2 = [-3, \infty)$ أوجد كلاً من:

(ج) $f_1 \cap f_2$ (د) $f_1 \cup f_2$

(٣) أوجد مجموعة حل المتراجحة: $s^2 - 3s - 10 \leq 8$

السؤال الثالث

(١) لتكن المعادلة: $s^3 - 2s^2 - (5 + 2)s - (5 - 4) = 0$

(أ) أوجد مجموع الجذرين وحاصل ضربهما بدلالة s ,

(ب) ما قيمة s التي تجعل أحد جذري المعادلة = 1 .

(٢) أوجد مجموعة حل المتراجحة: $|s^2 - 3s - 3| \geq 0$

(٣) حل جملة المتراجحتين التاليتين:

$s^3 - 2s \leq 4$, $s - 4s - 3 > 0$

حساب المثلثات

الوحدة السابعة

ćمارين عامة ومسائل

١) حول إلى التقدير الدائري:

$$520^\circ \quad (d) \quad 310^\circ \quad (h) \quad -70^\circ \quad (b) \quad 360^\circ \quad (c)$$

٢) حول إلى التقدير الستيني:

$$\begin{array}{ll} 1) \frac{\pi}{18} \text{ ر} & 2) \frac{\pi}{9} \text{ ر} \\ (d) & (b) \\ 3) \pi^3 \text{ ر} & 4) \frac{\pi}{3} \text{ ر} \\ (h) & (c) \\ 5) \pi^2 \text{ ر} & 6) \frac{\pi}{2} \text{ ر} \\ (c) & (h) \end{array}$$

٣) في دائرة طول نصف قطرها يساوي ٢٠ سم ، أوجد طول القوس الذي يقابل زاوية مركبة قياسها θ حيث:

$$\theta = 60^\circ \quad (b) \quad \theta = \frac{3}{4}\pi \text{ ر} \quad (h) \quad \theta = 120^\circ \quad (d) \quad \theta = \frac{4}{3}\pi \text{ ر} \quad (c)$$

٤) أوجد نصف قطر الدائرة التي فيها طول القوس الذي يقابل الزاوية $\frac{\pi}{6}$ ر يساوي ٢٠ سم.

$$\frac{5 \text{ جاس} - 3 \text{ جتاس}}{5 \text{ جاس} + 2 \text{ جتاس}} = 4 \quad \text{إذا كان } \theta \text{ ظاس} = 4 \quad \text{أوجد قيمة}$$

٥) إذا كان θ ظاس = $\frac{3}{5}$ جناس أوجد قيمة: θ جناس

٦) بدون استخدام جداول المثلثات أوجد قيمة كل من:

$$1) 4 \text{ جتا}^2 45^\circ - \text{قا}^2 60^\circ + \text{جا}^2 60^\circ + \text{جتا}^2 90^\circ$$

$$2) \frac{\text{جا}^2 60^\circ}{\text{جتا}^2 45^\circ} - \text{ظتا}^2 30^\circ + \text{جتا}^2 90^\circ$$

(٨) إذا كانت $\text{جا}_h + \text{جتا}_h = 90^\circ$ أو جد ظتا h .

(٩) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة كل مما يأتي:

$$(١) \quad \text{جا}^{\circ} 67 - \text{ظا}^{\circ} 23$$

$$(٢) \quad \begin{array}{r} \text{جا}^{\circ} 20 + \text{جتا}^{\circ} 70 \\ \hline \text{جا}^{\circ} 31 + \text{جتا}^{\circ} 59 \end{array}$$

$$(٤) \quad \left(\frac{\text{جا}^{\circ} 47}{\text{جا}^{\circ} 43} \right) + \left(\frac{\text{جا}^{\circ} 47}{\text{جتا}^{\circ} 43} \right) - 4 \text{جتا}^{\circ} 54$$

(١٠) إذا كان h قياس زاوية في الوضع القياسي وكان ضلعها النهائي يقطع دائرة

الوحدة في نقطة إحداثيها $(s, \frac{1}{2})$ فإن h يساوي:

$$(١) \quad ٣٣٠^\circ \quad (٢) \quad ١٥٠^\circ \quad (٣) \quad ٢١٠^\circ$$

(١١) إذا كان $\text{جا } h = \frac{3}{5}$, $90^\circ > h > 180^\circ$ أو جد قيمة $\text{ظا } h + \text{جتا } h$.

(١٢) إذا كان $5 \text{ ظا } h = 120^\circ$, $120^\circ > h > 90^\circ$, $3 \text{ جا } b = 180^\circ$, $180^\circ > b > 90^\circ$

فأوجد قيمة: $\frac{\text{جا}(180^\circ + h) + \text{جتا}(180^\circ - b)}{\text{ظا}(180^\circ + h) + \text{ظا}(180^\circ - b)}$.

(١٣) زاوية h في الوضع القياسي يقطع ضلعها النهائي في دائرة الوحدة في النقطة

$(-6, 0, -8)$, أو جد h (٥).

(١٤) أثبت أن:

$$(١) \quad (\text{قا } h - \text{ظا } h) = \frac{1 - \text{جا } h}{1 + \text{جا } h}$$

$$(٢) \quad \frac{2 \text{ ظا } h}{1 + \text{ظا } h} = 2 \text{ جا } h \text{ جتا } h$$

$$(٣) \quad \frac{1}{1 + \text{قتا } h} + \frac{1}{1 - \text{قتا } h} = 2 \text{ قتا } h \text{ ظا } h$$

$$(٤) \quad \frac{\text{ظا } s + \text{ظتا } s}{\text{قا } s \text{ قتا } s} = \text{جا } 90^\circ$$

(١٥) برهن أن: **أ)** $\text{جتا}^{\frac{\pi}{2}-\theta} = \text{صفر}$

ب) $\text{جتا}^{\frac{\pi}{2}-\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)} = \text{صفر}$

(١٦) إذا كان $2 \leq \theta < 30^\circ$ حيث $90^\circ > \theta > 0^\circ$ أوجد قيمة:

$$\text{جا}(\pi - \theta) \text{ ظتا}(\pi - \theta) - \text{جا}^{120^\circ} \text{ ظا}^{60^\circ}$$

(١٧) إذا كان $\theta = 65,7^\circ$ حيث $90^\circ > \theta > 0^\circ$ أوجد قيمة كل من: $\text{جتا}\theta$, $\text{جا}\theta$, $\text{ظا}\theta$

(١٨) باستخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة كل من:

أ) جتا^{90° **ب)** ظا^{35° **ج)** $\text{جا}^{65,7^\circ}$

(١٩) (باستخدام الآلة الحاسبة) أوجد قيمة ص إذا علم أن:

أ) $\text{جا ص} = 0,9926$ **ب)** $\text{ظا ص} = 2,0353$

ج) $\text{جتا ص} = 0,6561$ **د)** $\text{ظتا ص} = 0,7645$

(٢٠) A B C مثلث قائم الزاوية في B . أوجد طول \overline{AB} إذا كان:

أ) $|B| = 70^\circ$ سم ، $\text{و } (C) = 50^\circ$

ب) $|B| = 20^\circ$ سم ، $\text{و } (A) = 53^\circ$

(٢١) A B C مثلث قائم الزاوية في C . أوجد طول \overline{AC} إذا كان:

أ) $|B| = 43,5$ سم ، $\text{و } (A) = 70^\circ$

ب) $|B| = 110,5$ سم ، $|B| = 67$ سم

(٢٢) مئذنة ارتفاعها ٤٥ م أوجد قياس زاوية ارتفاع أعلى نقطة فيها من نقطة في المستوى الأفقي المار بقاعدتها وتبعد عنها ٣٨ م.

(٢٣) من نقطة تبعد 150 متراً عن قاعدة سارية علم وجد أن قياس زاوية ارتفاع قمة السارية 25° بينما ارتفاع السارية مقرباً الإجابة لأقرب متر؟

(٢٤) من قمة صخرة ارتفاعها 100 متر عن سطح البحر وجد أن قياس زاوية انخفاض سفينة 14° أوجد بعد السفينة عن قاعدة الصخرة.

اختبار الوحدة

(١) ارسم كُلًاً من الزاويتين الموجهتين الآتيتين في وضعهما القياسي مبيناً الربع الذي

تقع فيه، ثم أوجد القياس الأساسي لكل منهما:

ب) ${}^{\circ}2250$

أ) ${}^{\circ}850$

(٢) حول إلى التقدير الدائري:

ب) ${}^{\circ}75$

أ) ${}^{\circ}240$

(٣) حول إلى التقدير الستيني:

ب) $\pi - 5\pi$

أ) $\frac{\pi}{6} - \pi$

(٤) في دائرة نصف قطرها ٩ سم ، أوجد طول القوس الذي يقابل زاوية مقدارها 150° .

(٥) إذا كانت $\theta = 2$ ، $\pi < \theta < \frac{\pi}{2}$ أوجد قيمة جتا θ ، جا θ ، قا θ ، ظتا θ

(٦) أثبت أن:

$$2 \text{جتا } 30^{\circ} \text{ جا } 60^{\circ} + \text{ظتا } 45^{\circ} \text{ قتا } 30^{\circ} = \frac{\pi}{3}$$

(٧) أوجد قيمة كل مما يأتي:

ب) ظتا 150° أ) قتا 135°

(٨) إذا كان قياس زاوية ميل أشعة الشمس على الأفقي في لحظة ما هو 57° ووضعت عصا طولها ١٥٠ سم رأسياً على أرض أفقيه. أوجد طول العصا على الأرض في هذه اللحظة.

ć تمارين عامة ومسائل

١) أوجد إحداثي منتصف القطعة الواقلة بين النقطتين $(-2, 4), (3, 7)$.

٢) ليكن $A(1, -4), B(1, 3), C(-3, 2)$.

أ) حدد النقاط A, B, C في المستوى الإحداثي.

ب) أثبت أن A, B, C هي رؤوس مثلث قائم الزاوية.

٣) أوجد ميل المستقيم الواصل بين النقطتين $(-4, 1), (1, 3)$.

٤) النقطة $(s, 0)$ تقع على المستقيم الواصل بين النقطتين $(-5, 3), (12, 6)$.
أوجد قيمة s .

٥) ليكن $A(2, -3), B(-1, 1), C\left(\frac{1}{2}, 2\right)$. أثبت أن $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{BC}$.

٦) ليكن $A(5, -4), B(-1, 4), C(-5, 8)$. فأوجد:

أ) معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة C العمودي على \overleftrightarrow{AB} .

ب) معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة B والموازي للمستقيم $s + c = 2$.

٧) ليكن المستقيم L معادلته $3s + 4c + 12 = 0$. فأوجد:

أ) ميل L .

ب) الجزء الذي يقطعه L من محوري الأحداثيات.

ج) رسم L .

(٨) أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(1, 1)$ ، $(-1, 2)$.

(٩) ارسم المستقيمات التالية:

(أ) $s - 4c = 12$.
ب) $c - 2s = \frac{1}{2}(s + 3)$.

ج) $s^2 - 7c = 14$.

(إرشادات: أوجد نقطتي تقاطع كل مستقيم مع محوري الإحداثيات.)

(١٠) ليكن $A(-1, 2)$ ، $B(5, 3)$ ، $C(0, 2)$ هي رؤوس مثلث. أوجد معادلة:

أ) الضلع AB
ب) العمودي من A على \overline{BC}

ج) المتوسط النازل من C .

(١١) أوجد بعد كل نقطة من النقاط $(-3, 5)$ ، $(2, -2)$ ، $(1, -1)$ عن

المستقيم $2s + c = 2$.

(١٢) أحسب مساحة المثلث الذي رؤوسه النقاط $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(0, 2)$.

(١٣) أحسب مساحة الشكل الرباعي الذي رؤوسه النقاط $(-3, 1)$ ، $(4, 1)$ ، $(2, -1)$ ، $(-4, 1)$.

(١٤) ما صورة النقطة $(3, 1)$ بالانعكاس في المستقيم:

أ) $c + s - 1 = 0$
ب) $c - s = 2$.

ج) $2s = 3c + 1$
د) $\frac{s}{2} + \frac{c}{3} = 1$.

(١٥) ما صورة المستقيم $c - s + 1 = 0$ بالانعكاس في المستقيم:

أ) $c = 2s$
ب) $c - 2s = 1$.

ج) $2s = c$
د) $\frac{s}{5} + \frac{c}{2} = 1$.

(١٦) أوجد صورة الشكل الرباعي الذي رؤوسه $(1, 1), (1, 4), (2, 1), (2, 4)$ بالانعكاس في المستقيم $3x - y = 0$:

(١٧) أوجد صورة النقطة $(1, -5)$ بانسحاب :

أ) $(2, 3)$

ب) $(-4, 3)$

ج) $(1, 2)$

د) $(0, 5)$

(١٨) أوجد المستقيمات التي صورها بانسحاب $(-3, -1)$ هي:

أ) $x - 2y = 0$

ب) $x - 2y = 4$

ج) $x + 2y = 1$

د) $x = 2y + 1$

(١٩) أوجد الانسحاب إذا علمت أن النقطة $(3, 7)$ صورتها النقطة $(6, 3)$ ، ثم أوجد إحداثي النقطة ه التي صورتها $(6, 5)$ تحت تأثير هذا الانسحاب.

(٢٠) أوجد ميل المستقيم وما يقطعه من محوري الإحداثيات في الحالات التالية:

أ) $x + y = 0$

ب) موازٍ للمستقيم $2x - y = 2$ وير بالنقطة $(1, 2)$.

ج) يمر بالنقطتين $(1, 2), (3, 1)$.

د) عمودي على المستقيم $3x - y = 5$ وير بالنقطة $(-1, 3)$.

(٢١) أوجد معادلة المستقيم في الحالات التالية:

أ) يقطع ٥ وحدات طولية من الاتجاه الموجب لمحور السينات وميله $-\frac{2}{3}$

ب) يمر بالنقطة $(2, 0)$ ويوازمي المستقيم $y = 3x + 2$

ج) يمر بالنقطة $(1, 3)$ وعمودي على المستقيم $3x - y = 6$

د) يمر بالنقطتين $(2, 3), (4, 3)$

(٢٤) يقطع ٣ وحدات طولية من الاتجاه الموجب لمحور السينات وَ ٤ وحدات طولية من الاتجاه السالب لمحور الصادات.


(٢٥) يقطع ٣ وحدات طولية من الاتجاه السالب لمحور الصادات ويميل بزاوية 45° على الاتجاه الموجب لمحور السينات.

(٢٦) (١، ٢)، (٥، ٣)، (-١، ٣) هي رؤوس المثلث $\triangle ABC$ أوجد:

(أ) معادلة متوسط المثلث $\triangle ABC$.
 (ب) معادلة ارتفاع المثلث $\triangle ABC$.

(ج) طول ارتفاع المثلث.

(٢٧) أوجد المستقيمات المارة بالنقطة (١، -٦) وحاصل ضرب ما تقطعه من محوري الإحداثيات يساوي ١.



شكل (١ - ٧)

(٢٨) أوجد صورة النقطة (-١، ٣) بالانعكاس في محور السينات يليه بالانعكاس في المستقيم $x = 4$.

(٢٩) أوجد صورة النقطة (١، ٣) بالانعكاس في المستقيم $x = 4$ يليه بالانعكاس في محور السينات. قارن نتيجتك بنتيجة سؤال (٢٥).

(٢٧) أوجد معادلة محور الانعكاس لكل نقطة و صورتها في الحالات التالية:

أ) $x(1, -1), y(2, 1), z(3, 0).$

ب) $x(1, 0), y(2, 1).$

(٢٨) أوجد صورة النقطة $(1, 2)$ بالانعكاس في:

أ) المستقيم $s + c = 6$ يليه بالانعكاس في المستقيم $s = 4$

ب) المستقيم $s = 4$ يليه بالانعكاس في المستقيم $s + c = 6$

ج) هل الانعكاس تبديل في هذه الحالة؟

(٢٩) لنفرض $N : (s, c) \leftarrow (s + 2, c + 4)$, والنقطة $A(2, 4)$,

$B(s_1, c_1)$, $C(s_2, c_2)$:

أ) أوجد صورة النقطة A بالانسحاب N .

ب) إذا كان $N(B) = A$ أوجد قيمتي s , c .

ج) إذا كان $N(A) = (N \circ N)(A) = (N \circ N)(B) = C$ أوجد قيمتي s_2 , c_2 .

د) أوجد النقطة D بحيث أن $N^2(D) = A$.

(٣٠) إذا كان: $N_1 : (1, 5) \leftarrow (2, 3)$

$N_2 : (2, 5) \leftarrow (4, 5)$


أوجد النقطة $(6, 7)$ بالانسحابات التالية:

أ) N_1 ب) N_2 ج) $N_1 \circ N_2$

د) $N_2 \circ N_1$

(٣١) الشكل (٢ - ٧) يوضح المثلثات ع ، ط ، ل .

- أ) أوجد معادلة محور الانعكاس الذي يربط Δ ع ب Δ ط .
- ب) أوجد الانسحاب الذي يربط Δ ل ب Δ ط .



اختبار الوحدة

(١) ليكن المستقيم ل معادلته $s - 2x + 2 = 0$ فأوجد :

أ) ميل \overleftrightarrow{L}

ب) ما يقطعه \overleftrightarrow{L} من محوري الإحداثيات .

ج) معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة (-١ ، ٢) والعمودي على \overleftrightarrow{L} .

د) أوجد طول العمود النازل من النقطة (٢ ، ٢) على \overleftrightarrow{L} .

(٢) أوجد صورة المستقيم $s - 2x - 1 = 0$:

أ) بالانعكاس في المستقيم $x - 3s = 0$.

ب) بالانسحاب (١ ، ٣) .

تمارين عامة ومسائل

(١) أكمل ما يلي:

(أ) $\vec{f}_1 + \vec{f}_2$ إذا كان $\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2 = \dots$

(ب) إذا كان $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ فإن

(ج) إذا كان $\vec{a} = (x, y)$ فإن قيمة $x = \dots$, قيمة $y = \dots$

(د) إذا كانت a, b, c, d خمس نقاط في المستوى فإن:

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} + \vec{e} = \dots$$

(هـ) إذا كان $\vec{f}_1 = \vec{s} + \vec{t}, \vec{f}_2 = (\vec{s} + \vec{u}) - \vec{v}$ فإن $\vec{f}_1 + \vec{f}_2 = \dots$

(و) إذا كان $\vec{s} = (x, y), \vec{c} = (z, w)$ فإن المتجهان \vec{s}, \vec{c}

(ز) إذا كان $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ فإن المتجهان \vec{a}, \vec{b}

(ح) إذا كانت m منتصف \overline{cd} فإن:

$$m = \frac{\vec{c} + \vec{d}}{2} = \dots$$

(ط) إذا كان $\vec{m} = (x, y), \vec{c} = (a, b)$ وكان $\vec{m} \perp \vec{c}$ فإن قيمة $x = \dots$

(ي) إذا كان $\vec{f} = \vec{v} + \vec{w}$ فإن:

$$|\vec{f}| = \dots$$

(٢) قياس الزاوية التي يصنعها المتجه \vec{f} مع المحور س الموجب ...

(٣) متجه الوحدة في اتجاه المتجه \vec{f} هو $\vec{f}^* = \dots$

٢) إذا كان $\vec{a} = (5, 2)$, $\vec{b} = (6, 3)$, $\vec{c} = (1, 1)$,
 $\vec{f} = \vec{b} - \vec{a} + \vec{c}$ المطلوب:

أ) عبر عن \vec{f} بدلالة متوجهى الوحدة الأساسية.

ب) إذا كان $\vec{m} - \vec{f} = \vec{g}$ فأوجد $|\vec{m}|$.

ج) أوجد بجميع الصور المختلفة معادلة المستقيم \vec{ab} .

٣) أ) ب ج د شكل رباعي بحيث $\vec{b} = \vec{a}$ وكانت $a(1, 1)$, $b(2, 2)$,
 $\vec{c}(-2, 0)$ المطلوب:

أ) أوجد إحداثي النقطة d . ب) حدد نوع الشكل الرباعي أ ب ج د.

ج) أوجد قياس الزوايا الداخلية للشكل الرباعي.

د) أوجد بجميع الصور معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة d ويوear زي المتوجه \vec{ab} .

٤) إذا كانت $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (1, 3)$, $\vec{c} = (3, 8)$ فأوجد قيمة k
التي تتحقق المعادلة $\vec{a} + \vec{c} + \vec{b} = \vec{g}$ ثم أوجد $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$.

٥) إذا كان $\vec{a} = (12, 15)$, $\vec{b} = (7, 9)$ فأوجد $\vec{a} + \vec{b}$ إذا كان
 $\vec{a} + \vec{b} = (3, 5)$ وثبت أن $\vec{b} = (-1, 2)$ ثم أوجد إحداثي النقاط
أ, ب, ج.

٦) إذا كان \vec{f}_1 , \vec{f}_2 متجهين وكان $|\vec{f}_1| = 2$, $|\vec{f}_2| = 3$ وقياس الزاوية
بينهما 60° فأوجد:

أ) $\vec{f}_1 + \vec{f}_2$ ب) $(\vec{f}_1 + \vec{f}_2)^2$

ج) إذا كان $\vec{a} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2$ فأوجد $|\vec{a}|$.

٧) إذا كانت $(s, c) = (3, 2) + (5, 4)$ فثبت أن: $2s + 3c = 22$

٨) إذا كان $\vec{f} = (s, c)$ فثبت أن:

$(\vec{f} \cdot \vec{s}) + (\vec{f} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{s} = \vec{f}$

٩) أثبت أنه إذا كان $(\vec{f}_1 + \vec{f}_2)^2 = |\vec{f}_1|^2 + |\vec{f}_2|^2$ فإن \vec{f}_1, \vec{f}_2 متعامدان.

١٠) اب ج، شكل رباعي بحيث $\frac{1}{3} \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a}$ أثبت أن:

أ) الشكل اب ج، شبه منحرف.

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c}$$

١١) اب ج مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه ل أثبت أن: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} L^2$

١٢) اب ج مثلث، ب ج، ج ب، ب ج = $\frac{3}{3} \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{b}$ أثبت أن

إذا كان $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ أثبت أن:

أ، ب ، ج على استقامة واحدة.

١٤) إذا كانت $\vec{d} = \vec{a} - \vec{c}$ هي المعادلة المتجهة لل المستقيم L، (١، ٣، ٥). المطلوب:

أ) ارسم المستقيم L .

ب) أوجد المعادلتين الوسيطتين لل المستقيم L .

ج) أوجد المعادلة الجبرية (الديكارتية) لل المستقيم L .

اختبار الوحدة

١) اختر الإجابة الصحيحة:

(١) إذا كان $\overrightarrow{f_1} = \overrightarrow{s_1} + \overrightarrow{c_1}$ ، $\overrightarrow{f_2} = \overrightarrow{s_2} - \overrightarrow{c_2}$ فإن المتجهين:

(٢) متوازيان . (٣) متعامدان . (٤) متطابقان .

(ب) إذا كان $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{b} - \overrightarrow{c}$ ، $\overrightarrow{b} = \overrightarrow{d} + \overrightarrow{e}$ فإن \overrightarrow{a} يساوي :

(١) (٤، ٥). (٢) (٦، ١). (٣) (١، ٦).

(ج) إذا كان $\overrightarrow{f_1} = \overrightarrow{s_1} - \overrightarrow{c_1}$ ، $\overrightarrow{f_2} = \overrightarrow{s_2} + \overrightarrow{c_2}$ فإن $\overrightarrow{f_1} \cdot \overrightarrow{f_2}$ يساوي :

(١) ١١ (٢) ٥ (٣) ٥ - ٥

(أ) إذا كان (١، ٢)، ب(٦، ٣)، ج(٣ - ٣، ٢) المطلوب
إثبات أن:

$$(١) \overrightarrow{b} = \overrightarrow{a} + \overrightarrow{c} \quad (٢) \overrightarrow{b} = \overrightarrow{a} - \overrightarrow{c}$$

(ب) إذا كان $\overrightarrow{f_1} = \overrightarrow{s_1} - \overrightarrow{c_1}$ ، $\overrightarrow{f_2} = \overrightarrow{s_2} + \overrightarrow{c_2}$ المطلوب:

(١) عبر عن $\overrightarrow{f_1}$ بدلالة متجهي الوحدة الأساسية.

(٢) أوجد المعادلة المتجهة للمستقيم L الذي يمر بمبدأ تقاطع الإحداثيات
ويوازي المتجه $\overrightarrow{f_2}$.

(١) ب ج مثلث ، و $\exists \overrightarrow{g}$ بحيث يكون $\overrightarrow{g} = \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}$

أثبت أن: $\overrightarrow{g} = \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}$

ć تمارين عامة ومسائل

١) اكتب المقادير التالية باستخدام مجـ : (١)

$$1 + 2 + \dots + (n-1) \quad (٢)$$

$$25 + \dots + 10 + 9 + 8 \quad (٣)$$

$$1 \times n + n \times 2 + \dots + 5 \times 5 + 5 \times 3 + 1 \times (n+1) \quad (٤)$$

$$(8) + \dots + (3-4) + (5-6) \quad (٥)$$

٢) أوجد ناتج ما يلي :

$$\frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \dots \times \frac{1}{n} \quad (٦)$$

$$\frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{n} \quad (٧)$$

٣) إذا كانت $\frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{n} = 10$ ، $\frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{n-4} = ?$ أوجد قيمة :

$$\frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{n-4} = ? \quad (٨)$$

٤) جدول التوزيع التكراري التالي يمثل درجات ١٨ طالبًا في امتحان مادة الرياضيات (الدرجة العظمى ٦٠)

الفئة	التكرار
٥٨ - ٤٨	٤٧ - ٣٧
٤	٨
٣٦ - ٢٦	٢٥ - ١٥
٥	٣

أوجد - المتوسط الحسابي - الوسيط - المتوازن .

(٥) فيما يلي درجات ٢٥ طالباً في اختبار (الدرجة العظمى °٢٠):

٧، ١٩، ١٤، ١٣، ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٠، ٩، ١٢، ٢٠، ١٧، ١٥

١٢، ١٥، ٦، ٦، ١٩، ١، ١٤، ٣، ١٤، ١٥

كون جدولًا بحيث يكون طول الفئة يساوي ٣، ثم أوجد المتوسط الحسابي والمنوال والوسيط لهذه الدرجات.

(٦) أوجد الانحراف المتوسط والمدى والتباين للقيم التالية:

٢٣، ٣٥، ٣٢، ٣٦ أ) ١٦، ١٤، ١٢، ١٥، ١٢

٦، ٦، ٥، ٤، ٤، ٣ ب) ١٢، ١٥، ١٣، ١٠، ٨

(٧) فيما يلي جدول التوزيع التكراري لعمال أحد المصنع موزعين في فئات حسب ساعات العمل الأسبوعية التي اشتغلواها في أسبوع معين.

فئات ساعات العمل	عدد العمال
٧٤-٧٦	٥
٧٥-٧٧	٨
٦٦-٥٨	٣٣
٥٧-٤٩	٤٤
٤٨-٤٠	٦٧
٣٩-٣١	١٨

أوجد - المتوسط الحسابي والانحراف المتوسط والتباين لعدد ساعات العمل الأسبوعية لهؤلاء العمال.

(٨) ، ٢٦، ٣١، ٣٠، ٣٢، ٢٥، ٢١، ١٨، ١٥، ١٥، ١٢، ٢٠، ١٤، ١٠، ٢٥

، ٢٤، ٣٣، ٣٤، ٢٩، ٢٥، ٢٨، ٣٥، ٣٦، ٤٥، ٥٠، ٥٢

، ٣٠، ٣٦، ٣٧، ٥٣، ٤٠، ٣٤، ٤٣، ٣٢، ٢٢، ٤٠، ٥٤، ٢٧، ٢٠

، ٣١، ٢٨، ٣١، ٣٥، ٣٨، ٣٢، ٣٩، ٣٨

البيانات السابقة درجات خمسين طالباً في اختبار مادة اللغة العربية (الدرجة العظمى ٦٠ درجة) والمطلوب:

أ) كون جدولًا تكرارياً بحيث يكون طول الفئة يساوي ٨ .

ب) أوجد الانحراف المتوسط لدرجات هؤلاء الطلبة.

ج) أوجد التباين والانحراف المعياري.

اختبار الوحدة

١) اكتب المقادير التالية باستخدام الرمز مج:

(أ) $12 + \dots + 2 + 1 + 0 + 8 + 6$
 (ب) $10 + 8 + \dots + 2 + 1 + 0 + \dots + 2$

(ج) $(13 -) + (12 -) + (11 -) + \dots + (-)$

(د) $اس_1 + اس_2 + اس_3 + \dots + اس_n$

٢) ليكن لدينا البيانات الإحصائية التالية:

$س_1 = 15, س_2 = 20, س_3 = 22, س_4 = 18$

$ع_1 = 3, ع_2 = 4, ع_3 = 5, ع_4 = 8$

استخدم البيانات السابقة في إيجاد قيمة ما يلي :

(أ) محوٌ سر ب) محوٌ سر ع مر ج) محوٌ سر ع مر

٣) أوجد المنوال والمتوسط الحسابي والانحراف المتوسط للبيانات التالية:

لفعات	التكرار	سر	مركز الفعات	لكرXسر
٤٤ - ٤٠	٢	٤٢	٤٢	٨٤
٤٩ - ٤٥	٣	٤٧	٤٧	١٤١
٥٤ - ٥٠	٩	٥٢	٥٢	٤٦٨
٥٩ - ٥٥	٥	٥٧	٥٧	٢٨٥
٦٤ - ٦٠	٣	٦٢	٦٢	١٨٦

٤) أوجد الانحراف المتوسط والتباين لبيانات الجدول التالي :

الفعات	التكرار	٢٥ - ١٥	٣٦ - ٢٦	٤٧ - ٣٧	٥٨ - ٤٨
٣	٥	٥	١٠	١٠	١٠

تم بحمد الله



e-learning

الادارة العامة للتعليم الالكتروني

el-online.net

el-online.net

