

مدرسة الرياض الافتراضية
المرحلة المتوسطة والثانوية - بنين

المخالب والمحاليل



الفصل الثاني : المخلوطات والمحاليل

مزيج من مادتين أو أكثر تحتفظ فيه كل مادة بخواصها الأصلية (الكيميائية)

☞ **المخلوط :**

أنواع المخلوطات

مخلوط متجانسة
(تسمى المحاليل)

مخلوط غير متجانسة

المخلوط غير المتجانسة : مخلوط لا تمتزج مكوناته تماماً معاً ويمكن تمييز مكوناته.

2) مخلوط غروي

أ) مخلوط معلق

(1) المخلوط المعلق

المخلوط غير متجانس يحتوي على جسيمات يمكن أن تترسب بالترويق إذا ترك فترة دون تحريك

التعريف

- 1- تنفصل الجسيمات المعلقة في المخلوط المعلق عندما تمرر في ورقة ترشيح.
- 2- بعض المخاليط المعلقة إذا تركت دون تحريك تنفصل إلى طبقتين . وإذا تم تحريكها فإن المادة الصلبة تناسب داخل المادة السائلة ولذلك يقال أن المادة تتميّز بالهُز أو التحريك.
- 3- دجم جسيمات المخلوط المعلق كبيرة .

الخواص

على / هناك أنواع من الطين تستخدم لإقامة المباني فوقها في مناطق الزلازل ؟

لأن هذا النوع من الطين يناسب بالهُز أو الحركة وكأنه سائل فتشيد المباني فوقها .

أمثلة
الوحـل - الطباشير في الماء - الرمل في الماء

2) الترويق

1) الترشيح

طرق الفصل


2) المخلوط الغروي :

مخلوط غير متجانس يحتوي على جسيمات متوسطة الحجم يتراوح أقطارها بين 1nm و 1000 nm

وسط الانتشار : المادة الأكثر توافر في المخلوط

- **الخواص :**
 - 1- حجم الجسيمات صغير لا تترسب بمرور الوقت
 - 2- يوجد شحنات على سطح الجسيمات المنتشرة تتنافر مع وسط الانتشار تمنعها من الترسب
 - 3- جسيمات المخلوط الغروي لا تنفصل بالترشيح أو الترويق

أمثلة : حلبة، دم، ضباب، هباء جوي صلب (الغبار في الهواء - دخان المصانع)، الجيلاتين، الغيوم، الأدجار الكريمة الملوونة



ملاحظات :

1- لا يترسب المذاب في المخلوط الغروي ؟

ج) لوجود شحنات على سطح الجسيمات المنتشرة تتنافر مع وسط الانتشار
تمنعها من الترسب

2- كيف تتلف المخلوط الغروي وتحدث به ترسب؟

- أ- تحريك مادة الكتروليتية (متأينة) في المخلوط الغروي.
- ب- الحرارة : لأن الحرارة تعطى الجسيمات المتصادمة طاقة حركية تبعدها عن بعضها لتترسب

3- الحركة العشوائية لجسيمات المذاب في المخاليط الغروية السائلة


هو قدرة المخاليط الغروية المذففة أو المخاليط المعلقة على تشتت الضوء وهي لا تحدث في المحاليل

4- تأثير تندال :

- مثال : 1- مرور أشعة الشمس خلال الهواء المشبع بالدخان أو مرور الضوء خلال الضباب أو الغيوم
2- يفضل عدم استخدام الضوء العالي عند قيادة السيارة في الضباب

يستخدم تأثير تندال في تحديد كمية الجسيمات المنتشرة في المخاليط المعلقة





❖ مقارنة بين المحلول الغروي والمحلول المعلق :

المحلول المعلق	المحلول الغروي
جسيمات المذاب كبيرة	جسيمات المذاب صغيرة
يمكن فصل جسيماته بالترويق أو الترشيح	لا يمكن فصل جسيماته بالترويق أو الترشيح
ترسب جسيمات المخلوط المعلق	لا تترسب جسيمات المخلوط الغروي

❖ المخاليط المتتجانسة (المحاليل)

- 1- **المخاليط المتتجانسة :** مخلوط له تركيب ثابت وتمتزج مكوناته بانتظام ولا يمكن التمييز بينها **وتسماى محاليل**
- 2- **أمثلة :** **الهواء الجوي - الفولاذ (السبائك) ، السكر في الماء**

أنواع المحاليل حسب حالة المذيب وأمثلة عليها

المذيب	المذاب	مثال	المحلول
النيتروجين (غاز)	الأكسجين (غاز)	الهواء الجوي	غاز
الهواء الجوي (غاز)	الماء (سائل)	الرطوبة	غاز
الماء (سائل)	الأكسجين (غاز)	ماء البحر	سائل
الماء (سائل)	ملح الطعام (صلب)	ماء البحر	سائل
الماء (سائل)	ايثريلين جلايكول (سائل)	مانع التجمد	سائل
الماء (سائل)	CO ₂ (غاز)	المياه الغازية	سائل
الفضة (صلب)	الزئبق (سائل)	مملغم الأسنان	صلب
الحديد (صلب)	الكريون (صلب)	الفولاذ	صلب

** مقارنة بين خصائص المحاليل والغرويات والمعلقات **

المعلقات	الغرويات	(المحاليل المتتجانسة)	وجه المقارنة
الطباسير في الماء	الدم	محلول السكر	مثال
غير متجانس	غير متجانس	متجانس	الحالة
كبير	متوسط	صغير جدا	حجم الجسيمات المذاق
قابل للترسيب	غير قابل للترسيب	غير قابل للترسيب	القابلية للترسب بمرور الزمن
يظهر تأثير تندال	يظهر تأثير تندال	لا يظهر تأثير تندال	تأثير ظاهرة تندال (تشتت الضوء)
يفصل	لا يفصل	لا يفصل	الفصل بالترويق والترشيح

•أنواع المخاليط الغروية

جسيمات المذيب (وسط الانتشار)	جسيمات المذاب (الجسيمات المنتشرة)	مثال	التصنيف
صلب	صلب	الأحجار الكريمة الملونة	صلب في صلب
سائل	صلب	الدم ، الجيلاتين	صلب في سائل
غاز	صلب	الدخان ، الغبار في الهواء	الهباء الجوي الصلب
غاز	سائل	الغيموم ، الضباب ، رذاذ مزيل العرق	الهباء الجوي السائل
سائل	سائل	الحليب ، المايونيز	مستحلب
صلب	سائل	الزبد ، الحبن	مستحلب صلب
صلب	غاز	الصابون الذي يطفو	رغوة صلبة

المحلول

هي المواد التي **تذوب** في المذيب (السكر في الماء)

المواد الذائبة :

هي المواد التي **لا تذوب** في المذيب (الرمل والماء)

المواد غير الذائبة :

السائل التي **تمتزج معاً فترة قصيرة** ثم تنفصل بعدها (الزيت لا يذوب في الخل)

- السوائل غير الممتزجة

مادتين سائلتين تذوب أحدهما في الأخرى بـ**أي نسبة** (مانع التجمد)

- السوائل الممتزجة :

مقاييس يعبر عن كمية المذاب الذائب في كمية محددة من المذيب أو **المحلول**

- التركيز :

التعبير عن تركيز المحلول

نسب التركيز	وصف التركيز
<p>كتلة المحلول = كتلة المذاب + كتلة المذيب</p> <p>- النسبة بين كتلة المذاب إلى كتلة المحلول</p> $\text{النسبة المئوية بالكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب} \times 100}{\text{كتلة المحلول}}$	النسبة المئوية بالكتلة
<p>حجم المحلول = حجم المذاب + حجم المذيب</p> <p>- النسبة بين حجم المذاب إلى حجم المحلول</p> $\text{النسبة المئوية بالحجم} = \frac{\text{حجم المذاب} \times 100}{\text{حجم المحلول}}$	النسبة المئوية بالحجم
<p>- عدد مولات المذاب في لتر من المحلول</p> $\text{التركيز بالمولارية} = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم المحلول ياللتر}}$ $\text{التركيز بالمولارية} = \frac{\text{كتلة المذاب g}}{\text{الكتلة المولارية للمذاب} \times \text{حجم المحلول ياللتر}}$	المolareية (التركيز المولاري)

عدد مولات المذاب في كيلو جرام واحد من المذيب (1000 g)

$$\text{التركيز بالمولالية} = \frac{\text{عدد مولات المذاب} \times 1000}{\text{كتلة المذيب g}}$$

المولالية *m*

- عند **تخفيف محلول (إضافة ماء)** فإن عدد المولات لا يتغير ويكون :

عدد المولات بعد التخفيف (للمحلول المخفف) = عدد المولات قبل التخفيف (للمحلول المركز)

$$\text{بعد التخفيف } M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2 \quad \text{قبل التخفيف}$$

مسائل التخفيف
(أضافة ماء)

الكسر المولي للمذاب X_A : النسبة بين عدد مولات المذاب في المحلول إلى عدد مولات المذاب + مولات المذيب

الكسر المولي للمذيب X_B : النسبة بين عدد مولات المذيب في المحلول إلى عدد مولات المذاب + مولات المذيب

$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

الكسر المولي

- الماء : مذيب

- الكتلة الأقل : للمذاب

1- يحتوي حوض سمك على g 3.6 من NaCl كل 100 ماء فإن النسبة المئوية بالكتلة لكلوريد الصوديوم في محلول ؟

د- 1.036 %

ج- 27.7 %

بـ 3.47 %

أ- 3.6 %

$$\text{كتلة المذاب} + \text{كتلة المذيب} = \text{كتلة محلول}$$



$$= \text{كتلة المذاب} = 3.6 + 100 = 103.6 \text{ g}$$

$$\text{النسبة المئوية بالكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب} \times 100}{\text{كتلة محلول}}$$

$$\text{النسبة المئوية بالكتلة} = \frac{100 \times 3.6}{103.6}$$

2- إذا كانت النسبة المئوية بالكتلة لهيبو كلورات الصوديوم NaOCl في محلول مبيض الملابس هي 3.62% وكان لديك g 1500 من محلول فما كتلة NaOCl الموجودة في محلول ؟

$$\text{النسبة المئوية بالكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب} \times 100}{\text{كتلة محلول}}$$

$$3.62 = \frac{\text{كتلة المذاب} \times 100}{1500}$$

$$\text{كتلة المذاب} = \frac{3.62 \times 1500}{100} = 54.3 \text{ g}$$

4- ما النسبة المئوية بالحجم لـإيثانول في محلول يحتوي 35 ml إيثانول مذاب في 155 ml ماء ؟

$$\text{حجم المذيب} + \text{حجم المذاب} = \text{حجم محلول} \rightarrow \text{حجم المذاب} = 35 + 155 = 190 \text{ ml}$$

$$\text{النسبة المئوية بالحجم} = \frac{\text{حجم المذاب} \times 100}{\text{حجم محلول}}$$

$$\frac{100 \times 35}{190} = 18.4 \% \quad \text{النسبة المئوية بالحجم}$$

6- مolarية محلول مائي يحتوي على 40 g من الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$ في 1.5 L من المحلول ؟
 (H= 1 O= 16 C= 12)

د- M 0.148

ج- M 30

ب- M 26.6

أ- M 0.33

$$C_6H_{12}O_6 \text{ الكتلة المولية لـ } = 12 \times 6 + 1 \times 12 + 6 \times 16 = 180 \text{ g / mol}$$

$$\text{التركيز بالمولارية} = \frac{\text{كتلة المذاب g}}{\text{الكتلة المولية للمذاب} \times \text{حجم المحلول ياللتر}}$$

$$\text{التركيز بالمولارية} = \frac{40}{1.5 \times 180} = 0.148 \text{ M}$$

m : التركيز بالمولالية

M_m : الكتلة المولية

m : كتلة المادة بالجرام

M : تركيز بالمولالية

8- ما كتلة هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)_2 بودعة الجرام التي تلزم لتدوير محلول مائي منها
حجمه L وتركيزه M ؟ 0.25 mol/L

$$M = \frac{\text{كتلة المذاب g}}{\text{الكتلة المولية للمذاب} \times \text{حجم محلول باللتر}}$$

$$0.25 = \frac{\text{كتلة المذاب}}{1.5 \times 74}$$

$$0.25 \times 74 \times 1.5 = 27.75 \text{ g}$$

Ca(OH)_2 = الكتلة المولية

$$40 + 2(16 + 1) = 74 \text{ g/mol}$$

$$\frac{+}{1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}}$$

9- مولارية مطول دجمه 250 ml ومذاب فيه 1.5 mol من NaOH ؟

د - M = 0.006

ج - M = 6

ب - M = 0.6

أ - M = 0.06

$$\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم محلول باللتر}} = \text{التركيز بالمولارية}$$

$$\Rightarrow \text{التركيز بالمولارية} = \frac{1.5}{0.25}$$

M₂

M₁

V₁ = ?

10- ما حجم محلول القياسi لـ KI 3.00 M تذخير مطول مخفف منه تركيزه 1.25 M وحجمه V₂ = 0.3 L

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2 \Rightarrow 3 \times V_1 = 1.25 \times 0.3$$

$$V_1 = \frac{1.25 \times 0.3}{3} = 0.125 \text{ L}$$

12- مولالية محلول يحتوي على 0.07 mol من كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 مذابة في 0.5kg من الماء؟

د- $m = 0.035 \text{ m}$

ج- $m = 7.1 \text{ m}$

بـ $m = 0.14 \text{ m}$

أ- $m = 0.28 \text{ m}$

= التركيز بالمولالية

$$\frac{\text{عدد مولات المذاب} \times 1000}{\text{كتلة المذيب g}} \Rightarrow m = \frac{1000 \times 0.07}{500 \text{ g}}$$

$\xrightarrow{\times 1000}$

$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$

13- محلول يحتوي على 3.0 mol سكر مذابة في 7.0 mol ماء احسب الكسر المولالي للمذاب والمذيب ؟

$$X(\text{سكر}) = \frac{n(\text{سكر})}{n(\text{سكر}) + n(\text{ماء})} = \frac{3}{3 + 7} = 0.3$$

$$X(\text{ماء}) = \frac{n(\text{ماء})}{n(\text{سكر}) + n(\text{ماء})} = \frac{7}{3 + 7} = 0.7$$

16- احسب التركيز المولاري لمحلول دبجمه 2.0 يحتوي على 0.5 mol من المذاب؟

= التركيز بالمولارية


$\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم المحلول ياللتر}}$

$$\rightarrow M = \frac{0.5}{2} = 0.25 \text{ M}$$



العوامل المؤثرة في الذوبان

عملية احاطة جسيمات المذاب بجسيمات المذيب

☞ الذوبان:



بلورة كلوريد صوديوم



أكبر كمية من المذاب يمكن ان تذوب في كمية محددة من المذيب عند درجة حرارة معينة.

☞ الذائبة :

☞ حرارة الذوبان : التغير الكلي في الطاقة الذي يحدث خلال عملية تكوين محلول .

إذا كانت قوى التجاذب بين جسيمات المذاب والمذيب أكبر من قوى التجاذب بين جسيمات المذاب بمفرده والمذيب بمفرده.

☞ وفضل عملية الذوبان

☞ تعليقات :

1- يذوب ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) بسهولة في الماء ؟

ج) لأن قوى التجاذب بين جسيمات الملح والماء أكبر من قوى التجاذب بين جسيمات الملح نفسه والماء نفسه

2- يذوب السكر بسهولة في الماء؟

ج) لأن قوى التجاذب بين جسيمات السكر والماء أكبر من قوى التجاذب بين جسيمات السكر نفسه والماء نفسه

3- لا يذوب الجبس في الماء رغم أنه مركب أيوني؟

ج) لأن قوى التجاذب بين جسيمات الجبس أكبر من قوى التجاذب بين جسيمات الجبس والماء

العوامل المؤثرة في الذوبان :

1- يقل ذوبان غار في سائل بالتحريك.

1- التحريك

2- يزداد ذوبان مادة صلبة في سائل بالتحريك.

مثال : تذوب ملعقة من السكر المطحون أسرع من ذوبان الكميه نفسها التي تكون في صورة مكعبات .

2- مساحة السطح :

1- يقل ذوبان غاز في سائل بزيادة درجة الحرارة .

3- الحرارة :

2- يزداد ذوبان مادة صلبة في سائل بزيادة درجة الحرارة .

الغازات القطبية مثل NH_3 تذوب بسهولة في المذيبات القطبية

4- القطبية :

تصنيف المحاليل حسب درجة التشبع

محلول يحتوي أكبر مقدار من المذاب عند ضغط ودرجة حرارة معينين المحلول المشبع :

محلول يحتوي كمية من المذاب أقل مما يحتويه محلول المشبع عند نفس الضغط ودرجة حرارة المحلول غير المشبع :

محلول يحتوي كمية من المذاب أكبر مما يحتويه محلول المشبع عند نفس الضغط ودرجة حرارة المحلول فوق المشبع :

الضغط وقانون هنري

☞ العوامل المؤثرة على ذائبية الغازات في السوائل:

- 1- يقل ذوبان غاز في سائل بزيادة درجة الحرارة
- 2- يزداد ذوبان عاز في سائل بزيادة ضغط الغاز فوق السائل

3- قانون هنري:
تناسب ذائبية غاز في سائل تناصياً طردياً مع ضغط الغاز الموجود فوق السائل عند درجة الحرارة.

P_1 : كتلة الغاز الذائبة عند الضغط الأول :

S_2 : كتلة الغاز الذائبة عند الضغط الثاني :

$$\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2}$$

• تعليقات :

-1 **عند فتح زجاجة المشروبات الغازية نسمع صوتا يشبه الفرقة عة ؟**

ج) لأنه عند فتح الزجاجة **يقل الضغط فيخرج الغاز لنسمع الصوت**

-2 **تفقد زجاجة المشروبات الغازية طعمها بعد فترتها بفترة؟**

ج) لأنه عند فتح الزجاجة **يقل الضغط فيخرج الغاز ليصبح المشروب بلا طعم**

P_2

$S_2 = ?$

P_1

S_1

- أذيب 0.85 g من غاز ما عند ضغط 4 atm ما كتلة الغاز التي يمكن ان تذوب في الماء عند ضغط مقداره 1.0 atm ودرجة الحرارة نفسها ؟

$$\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2} \rightarrow \frac{0.85}{4} = \frac{S_2}{1}$$

أنواع المواد من حيث تأينها في محلول المائي

مواد غير متأينة في المحلول المائي

مثال : محلول السكر

لا ينفك
في الماء

یظل مول واحد لا یتفکك

مواد متأينة في محلول المائي (مواد الكتروليتية)

مثال : محلول كلوريد الموديوم

$$\text{NaCl} \xrightarrow[\text{في الماء}]{{\text{يتبَكَ}}} 1 \text{ mol Na}^+ + 1 \text{ mol Cl}^-$$

أعطى 2 mol في محلول مما يزيد التركيز الفعلي


1

محلول السكر = سكر + ماء

مذيب


مذاب

(مادة صلبة غير متطايرة)



1 mol مذاب (سكر) + مذيب (ماء)

جزيئات السكر المذاب تشد جزيئات الماء
وتنعها من التبخر **فینخفض الضغط البخاري**



مذيب (ماء) نقى

درجة غليان الماء النقى

100°C



متى يقال أن الماء يغلي؟

2

يغلي الماء **النقى**
عندما يتساوى ضغطه
البخاري مع الضغط
الجوى


1 mol سكر في الماء ينخفض الضغط البخاري ← وترتفع درجة غليان محلول 100.5°C
(مذاب غير الكتروليتي)

2 mol سكر في الماء ينخفض الضغط البخاري أكثر ← وترتفع درجة غليان محلول 101°C
(مذاب غير الكتروليتي)

1 mol NaCl في الماء ينخفض الضغط البخاري ← وترتفع درجة غليان محلول 101°C
(مذاب الكتروليتي)

$\text{NaCl} \xrightarrow[\text{في الماء}]{} 1\text{ mol Na}^{+} + 1\text{ mol Cl}^{-}$

أعطى 2 mol في محلول



مذاب (سكر) + مذيب (ماء)

جزيئات السكر تشد وتتجذب بعض جزيئات الماء المذيب وتمنعها من التبخر **فينخفض الضغط البخاري** لذا محلول لا يغلي لذلك يجب تسخين محلول إلى درجة حرارة أعلى لرفع الضغط البخاري له إلى ما يعادل الضغط الجوي



الارتفاع في درجة الغليان


هو الفرق بين درجة غليان محلول و درجة غليان المذيب النقي..

متى يتجمد الماء ؟

2




الانخفاض في درجة التجمد
- هو الفرق بين درجة تجمد محلول و درجة تجمد المذيب النقي..



تجمد محلول السكر
(مذاب + مذيب)

عند 0°C - 1.86 $^{\circ}\text{C}$) يتجمد محلول السكر حيث تباعد جزيئات السكر بين جزيئات الماء وتمنعها من التجمد فتنخفض درجة تجمد محلول .

عند 0°C تقترب جزيئات الماء من بعضها وتترتب في شكل بلوري منتظم لتكون الجليد



تجمد مذيب نقي

الخواص الجامعية للمحاليل

هو الضغط الناتج عن بخار السائل في وعاء مغلق عند درجة حرارة معينة.

• **الضغط البخاري :**

هي الدرجة التي يتساوى عندها ضغط بخار السائل مع الضغط الجوي

• **درجة الغليان :**

⊗ **عند إذابة مادة ملبة غير متطايرة في سائل نقي يلاحظ:** (الخواص الجامعية للمحاليل)

- 1- انخفاض الضغط البخاري
- 2- ارتفاع درجة الغليان
- 3- انخفاض درجة التجمد
- 4- تغير الضغط الاسموزى





وتسمى هذه التغيرات **بالخواص الجامعية للمحاليل** : وهي تعتمد على **تركيز المذاب** في محلول المولاية

• **تعليلات**

1- انخفاض الضغط البخاري لسائل نقي عند إذابة مادة ملبة غير متطايرة فيه؟

ج) لأن جزيئات المذاب تشد وتتجذب بعض جزيئات السائل وتمنعها من التبخر فینخفض الضغط البخاري

2- أي المواد المتأينة التالية التي لها نفس التركيز تعمل على انخفاض الضغط البخاري لمذيب نقي بمقدار أكبر (لاهم مواد متأينة):



3- ارتفاع درجة غليان سائل نقي عند إذابة مادة صلبة غير متطايرة فيه؟

لأن جزيئات المذاب تشد وتجذب بعض جزيئات السائل النقي وتمنعها من التبخر فينخفض الضغط البخاري وترتفع درجة الغليان

4- انخفاض درجة التجمد لمذيب عند إذابة مادة صلبة غير متطايرة فيه؟

لأن جزيئات المذاب تبعد بين جزيئات السائل النقي وتمنعها من الاقتراب من بعضها فتنخفض درجة التجمد

ويعتمد


الانخفاض في الضغط البخاري – الارتفاع في درجة الغليان – الانخفاض في درجة التجمد – الضغط
الاسموزي على:

عدد جسيمات المذاب في محلول (تركيز المذاب في محلول المولالية) – تناوب طردي

ويعتمد

على:

ثابت الارتفاع في درجة الغليان – ثابت الانخفاض في درجة التجمد
طبيعة (نوع) السائل المذيب



• الضغط الأسموزي:

الخاصية الأسموزية: انتشار المذيب خلال غشاء شبه منفذ من محلول الأقل تركيز إلى محلول الأكثر تركيز.

الضغط الأسموزي: كمية الضغط الإضافي الناتج عن انتقال جزيئات الماء إلى محلول المركز

قوانين:

K_b : ثابت الارتفاع في درجة الغليان

ΔT_b : ارتفاع في درجة الغليان

m : التركيز بالمولالية

K_f : ثابت الانخفاض في درجة التجمد

ΔT_f : الانخفاض في درجة التجمد

T_f : درجة تجمد محلول

T_b : درجة غليان محلول

تركيز المذاب بالمولالية \times ثابت الغليان = الارتفاع في درجة الغليان

$$\Delta T_b = K_b \times m$$

تركيز المذاب بالمولالية \times ثابت التجمد = الانخفاض في درجة التجمد

$$\Delta T_f = K_f \times m$$

إذا كان المذاب مادة متأينة (تتفكك) يجب أن نضرب القوانين السابقة في عدد المولات المتفككة والتي نعرفها من الصيغة مثال: NaCl يجب أن نضرب $\times 2$

درجة غليان المذيب النقي - درجة غليان محلول = الارتفاع في درجة الغليان

$$\Delta T_b = T_b_{\text{مذيب}} - T_b_{\text{ محلول}} \Rightarrow T_b_{\text{ محلول}} = T_b_{\text{مذيب}} + \Delta T_b$$

درجة تجمد محلول - درجة تجمد المذيب = الانخفاض في درجة التجمد

$$\Delta T_f = T_f_{\text{مذيب}} - T_f_{\text{ محلول}} \Rightarrow T_f_{\text{ محلول}} = T_f_{\text{مذيب}} - \Delta T_f$$

1- يستعمل كلوريد الصوديوم NaCl عادة لمنع تكون الجليد على الطرق وتجميد الأيس كريم احسب الانخفاض في درجة تجمد محلول كلوريد الصوديوم تركيزه $m = 0.029$ ؟ [ثابت الانخفاض في درجة التجمد المولالي للماء $K_f = 1.86^\circ\text{C} / m$]

$$\Delta T_f = K_f \times m \times 2 \Rightarrow \Delta T_f = 1.86 \times 0.029 \times 2 = 0.107^\circ\text{C}$$

2- احسب الارتفاع في درجة غليان محلول مائي من كلوريد البوتاسيوم KCl تركيزه $m = 0.625$ علمًا بأن الملح مادة متآينة وأن ثابت الارتفاع في درجة الغليان للماء $K_b = 0.512 \text{ } ^\circ\text{C} / m$

$$\Delta T_b = K_b \times m \times 2 \Rightarrow \Delta T_b = 0.512 \times 0.625 \times 2 = 0.64 \text{ } ^\circ\text{C}$$

3- أحسب درجة غليان محلول مائي من السكر الناتج عن إذابة $m = 0.28$ من السكر في الماء؟
(ثابت الارتفاع في درجة الغليان للماء $K_b = 0.512 \text{ } ^\circ\text{C} / m$)

$$\Delta T_b = K_b \times m \Rightarrow \Delta T_b = 0.512 \times 0.28 = 0.143 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_b = T_{\text{ذيب (ماء)}} - T_{\text{محلول}} \quad \xrightarrow{\text{ومنها}} \quad T_{\text{محلول}} = \Delta T_b + T_{\text{ذيب (ماء)}}$$

$$T_{\text{محلول}} = 0.143 + 100 = 100.143 \text{ } ^\circ\text{C}$$

تدريبات: على الفصل الثاني

1- أي مما يأتي لا يعد خاصية جامعة؟

د- حرارة محلول

ج- الضغط الأسموزي

ب- زيادة الضغط البخاري

أ- رفع درجة الغليان

2- يعتمد الانخفاض في درجة التجمد على :

د- طبيعة المذيب

ج- عدد مولات المذيب

ب- طبيعة المذاب

أ- التركيز الفعلي للمذاب

3- يعتمد ثابت الارتفاع في درجة الغليان لسائل ما على :

د- طبيعة المذاب

ج- عدد مولات المذاب

ب- طبيعة المذيب

أ- تركيز المذاب

5- يعبر عن عدد مولات المذاب في لتر من محلول ب :

د- المعايرة

ج- النسبة المئوية الوزنية للمذاب

ب- المولالية

أ- المولارية

6- عدد مولات المذاب في كيلو جرام من المذيب تعبر عن :

د- المعايرة

ج- النسبة المئوية الوزنية للمذاب

ب- المولالية

أ- المولارية

7- ينتج عن إذابة مادة صلبة غير متطايرة في سائل نقي:

- ب- ارتفاع درجة الغليان
- د- جميع ما سبق

- أ- انخفاض الضغط البخاري
- ج- انخفاض درجة التجمد

8- المحلول الذي يرفع درجة غليان الماء بمقدار أعلى (كلاهم الكتروليتي) هو:

د- 0.01 m AlCl_3

ج- 0.1 m BaCl_2

ب- 0.02 m CaCl_2

أ- 0.2 m NaCl

$$0.01 \times 4$$

$$0.1 \times 3$$

$$0.02 \times 3$$

$$0.2 \times 2$$

9- في أحد المحاليل التالية يكون الضغط البخاري للماء أكبر مما يمكن :

0.1 × 2

ب- 0.1 m NaCl محلول

0.1 × 1

أ- 0.1 m السكر محلول

0.1 × 3

د- 0.1 m MgCl_2 محلول

0.1 × 4

ج- 0.1 m AlCl_3 محلول

11- تؤدي إضافة كمية من الأملاح إلى الجليد على الطرق في فصل الشتاء إلى:

- أ- رفع درجة التجمد ب- خفض درجة التجمد
ج- خفض درجة الغليان د- ثبات درجة التجمد

12- يصل الماء إلى درجة الغليان في حالة :

- أ- زيادة الضغط الجوي مقارنة بضغط البخار
ب- نقصان الضغط الجوي مقارنة بضغط البخار
ج- تساوي الضغط الجوي مع ضغط البخار
د- ارتفاع درجة الحرارة فقط $100^{\circ}C$

محلول = مخلوط متجانس

- د- الدم ب- الهواء

13- أي من المواد التالية ليس محلول :

- أ- السبائك ب- الشاي

14- مخلوط يحتوي على جسيمات يمكن أن تترسب بالترويق إذا ترك فترة دون تحريك :

- أ- المحلول ب- المخلوط الغروي
ج- المخلوط المعلق د- المخلوط المتجانس

15- تأثير تندال يظهر بوضوح عندما يحدث تشتت للنحوء في المحلول :

- د- المركز
- ج- الغروي
- ب- المتجانس
- أ- المشبع

16- كتلة غاز الأكسجين الموجودة في دورق سعته L عند STP تساوي : (O=16)

- د- 4 g
- ج- 64 g
- ب- 32 g
- أ- 16 g

$$\frac{m}{M_m} = \frac{V}{22.4} \rightarrow \frac{m}{16 \times 2} = \frac{11.2}{22.4} \rightarrow m = \frac{11.2 \times 16 \times 2}{22.4}$$

17- الغاز الأكثر حيواناً عن سلوك الغاز المثالي (ك.ذ) (C = 12 , O=16 , He = 4 , N=14) :

- د- He
- ج- N₂
- ب- CO₂
- أ- O₂

18- أي العبارات التالية تكون صحيحة عند اذابة g 10 سكر في 100g ماء ؟

- أ- الخليط الناتج يظهر تأثير تندال
- ب- النسبة المئوية بالكتلة للسكر تساوي 10%
- ج- الخليط الناتج متجانس**

20- المفهوم الذي يعبر عن عدد مولات المذاب الذائبة في لتر واحد من محلول هو.....

- أ- المولالية
- ب- المolarية**
- ج- الكسر الموللي
- د- النسبة الكتليلية

21- محلول الذي يكون له اقل درجة تجمد هو..... (حيث m تعني التركيز المولالي).

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| AlCl ₃ 1.5 m | Na ₂ SO ₄ 1.0 m | Al ₂ (SO ₄) ₃ 1.0 m | KCl 2.0 m |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|

↓	↓	↓	↓
1.5 × 4	1 × 3	5 × 1	2 × 2

22- كم تبلغ درجة غليان محلول السكر الذي تركيزه 1.0 موال.
(ثابت الارتفاع بدرجة الغليان للماء $K_b = 0.512 \text{ }^{\circ}\text{C/molal}$).

100.512 $\text{ }^{\circ}\text{C}$ د

105.12 $\text{ }^{\circ}\text{C}$ ج

101 $\text{ }^{\circ}\text{C}$ ب

100 $\text{ }^{\circ}\text{C}$ أ

$$\text{درجة غليان محلول} = \text{درجة غليان الماء النقي} + \text{الارتفاع في درجة الغليان}$$

$$= \text{ثابت الغليان} \times \text{تركيز المذاب بالمولالية} + 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$M_2 = ?$

V_2

V_1

M_1

24- عند تخفيف مطهول (0.2 M KI) حجمه 400 ml الى 800 ml فإن مolarية محلول الجديد تساوي:

0.1 M د

0.4 M ج

1.0 M ب

4.0 M أ

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2 \rightarrow 0.2 \times 400 = M_2 \times 800 \rightarrow M_2 = \frac{0.2 \times 400}{800}$$

25- اذا كانت النسبة المئوية بدالة الكتلة لهيدروكسيد الصوديوم تساوي 20% ، فإن كتلة المذيب في 300 جرام من محلول تساوي:

د- 150g

ج- 240g

ب- 60g

أ- 280g

$$\text{النسبة المئوية بالكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب} \times 100}{\text{كتلة محلول}}$$

$$20 = \frac{\text{كتلة المذاب} \times 100}{300}$$

$$= \frac{300 \times 20}{100} = 60 \text{ g}$$

$$= \text{كتلة المذيب} = 300 - 60 = 240 \text{ g}$$

ملاحظة هامة : في مسائل الكسر الموللي يكون المجموع التركيز للمذاب والمذيب

مساوياً ١

26- الكسر الموللي لهيدروكسيد الكالسيوم في خليط يحتوي على (0.5 mol Ca(OH)2 و 4.5 mol ماء) :

د- 1

ج- 0.1

ب- 9

أ- 0.9

$$X_{\text{هيدروكسيد الكالسيوم}} = \frac{n_{\text{Ca(OH)}_2}}{n_{(\text{H}_2\text{O})} + n_{\text{Ca(OH)}_2}} = \frac{0.5}{4.5 + 0.5} =$$

27- عدد المولات المذابة في محلول دجمه ml 600 وتركيزه M 0.2 يساوي:

د- 0.67 mol

ج- 120 mol

ب- 0.12 mol

أ- 1.2 mol

$$\text{التركيز بالمولارية} = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم محلول باللتر}} \Rightarrow$$

$$0.2 = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{0.6}$$

$$V = \frac{600}{1000} = 0.6 \text{ L}$$

28- النص (تناسب ذاتية غاز في سائل تناوباً طردياً مع ضغط الغاز الموجود في السائل عند ثبوت درجة الحرارة) يعبر عن قانون
.....

د- هنري

ج- الغاز المثالي

ب- شارل

أ- جراهام

29- أي المخلوطات التالية متجانس :
.....

د- السكر مع الماء

ج- الضباب

ب- الحليب

أ- الطين

30- أي المخلوطات التالية يظهر تأثير تندال :
.....

د- الشاي

ج- الضباب

ب- الهواء

أ- محلول ملح وماء

31- من الأمثلة التي يكون فيها وسط انتشار غاز والجسيمات المنتشرة صلبة في الخليط الغروي :

د- السكر مع الماء

ج- الضباب

ب- الحليب

أ- الدخان

32- للتمييز بين المخلوط الغروي والمحلول نستخدم :

د- الحركة البروانية

ج- تأثير تندال

ب- التبخر

أ- الترشيح

33- المخلوط يمكن فصل مكوناته بالترشيح :

د- السكر مع الماء

ج- المتجانس

ب- المعلق

أ- الغروي

34- عند ذوبان g 10 من السكر في g 100 من الماء يكون السكر :

د- خليط غروي

ج- وسط الانتشار

ب- مذاب

أ- مذيب

35- أي الاتي تم فيه عملية تشتت الضوء بفعل جسيمات المذاب :

د- الذوبانية

ب- تأثير تندال ج- المخلوط المتجانس

أ- الحركة البروانية

36- الفرق بين درجة تجمد محلول ودرجة تجمد مذيب نقي :

- أ- الانخفاض في درجة الغليان
- ب- الانخفاض في درجة التجمد
- ج- درجة غليان المذيب النقي
- د- درجة غليان المذاب

37- انتشار المذيب من محلول الأقل تركيز إلى محلول الأعلى تركيز :

- أ- التركيز المولاري
- ب- التذفيف
- ج- الذائبية
- د- الخاصية الأسموزية

38- يستخدم كدليل لتحديد كمية المذاب :

- أ- تأثير تن达尔
- ب- الحركة البروائية
- ج- الكهروستاتيكية
- د- الخاصية الأسموزية

$$M_1 =$$

$$V_1 =$$

-39 - أضفنا 150 ml ماء مقطر إلى 250 ml من محلول NaCl في الماء تركيزه 0.1 M فإن تركيز المحلول الجديد :

د - M = 0.16 M

ج - M = 0.166 M

ب - M = 0.06 M

أ - M = 0.0625 M

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$0.1 \times 250 = M_2 \times 400$$

$$M_2 = \frac{0.1 \times 250}{400}$$

-40 - محلول مائي من مادة صلبة يتجمد عند (- 2.53 °C) لذلك فإن الانخفاض في درجة التجمد يكون

د - 102.53 °C

ج - 102.53 °C

ب - 2.53 °C

أ - - 2.53 °C

درجة تجمد محلول - درجة تجمد المذيب = الانخفاض في درجة التجمد

صفر = الانخفاض في درجة التجمد - (- 2.53)


الأدماض والقواعد



T.M.Hagiga Chemistry

أيون هيدروجين ${}^1\text{H}^+$


ذرة هيدروجين فقدت الكترون عندما ارتبطت بذرة أعلى منها كهروسالبية



بروتون H^+

ذرة الهيدروجين ${}^1\text{H}^1$

تحتوي 1 بروتون و 1 الكترون



الفعل الثالث: الأحماض والقواعد

مثال : HCl , H_2SO_4 , CH_3COOH

٠٠ خواص الأحماض :

- ١- مادة تتفكك (تتأين) في المحاليل المائية وتعطي أيون هيدروجين (بروتون) H^+
- ٢- محليل الأحماض تحول لون ورق تباع الشمس الأزرق **للأحمر** .
- ٣- طعمها حمضي لاذع ومحاليلها توصل الكهرباء بدرجات متفاوتة
- ٤- **تفاعل محليل الأحماض مع الفلزات النشطة مثل الخارصين** ويتماعد غاز الهيدروجين H_2

٥- **تفاعل محليل الأحماض مع كربونات الفلزات وكربونات الفلزات الهيدروجينية** مثل كربونات الصوديوم الهيدروجينية NaHCO_3 ويتماعد غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2

مثال : تفاعل حمض الخل (الإيثانويك) مع كربونات الصوديوم الهيدروجينية لينتاج غاز CO_2

٠٠ خواص القواعد :

مثال : $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ، KOH ، NaOH

- 1- مادة تتفكك في المحلول المائي وتعطي أيون هيدروكسيد OH^-
- 2- طعمها مر وملمسها صابوني لبق .
- 3- محليل القواعد تحول لون تباع الشمس الأحمر إلى الأزرق .

المحاليل : تحتوي المحاليل جميعها على أيونات الهيدروجين H^+ وأيونات الهيدروكسيد OH^-

المحلول الحمضي : يكون فيه $[\text{OH}^-] < [\text{H}^+]$

المحلول القاعدي : يكون فيه $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$

المحلول المتعادل : يكون فيه $[\text{OH}^-] = [\text{H}^+]$

الماء النقي : متعادل التأثير على تباع الشمس بنوعيه حيث يكون فيه $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ - وهو غير موصل للكهرباء

- أكمل ما يلي

1- تتفاعل معظم الفلزات كالخارصين و الماغنيسيوم مع محاليل الأحماض وينتج عن هذا التفاعل

غاز H_2

2- تفاعل كربونات الفلزات وكربونات الفلزات الهيدروجينية مع محاليل الأحماض منتجة غاز

..... CO_2

3- محاليل الأحماض
تحول لون ورق تباع الشمس الأزرق إلى أحمر

4- محاليل القواعد
تحول لون ورق تباع الشمس الأحمر إلى أزرق

تعريفات المموض والقواعد

1


النظرية الأيونية لأرهينيوس :

مادة تتفكك في المحلول المائي وتعطي أيونات H^+ الحمض :

مادة تتفكك في المحلول المائي وتعطي أيونات OH^- القاعدة :

QUESTIONS: 1- علل / وجود قصور في تعريف نظرية أرهينيوس للقاعدة ؟
هناك مواد مثل Na_2CO_3 ، NH_3 لا تحتوي على OH ورغم ذلك تتصرف كقاعدة .

2 - منف كالا مما يلي إلى أحمس وقواعد أرهينيوس :





نموذج بر ونستد - لوري:

• الحمض :

• القاعدة :

مادة تتفكك وتعطي أيون هيدروجين H^+


مادة تستقبل أيون هيدروجين H^+



الأزواج المترافقه : أي مادتين ترتبطان معا عن طريق منح واستقبال أيون هيدروجين واحد

الحمض المرافق : المركب الكيميائي الذي ينتج عندما تستقبل القاعدة أيون الهيدروجين

القاعدة المرافقه : المركب الكيميائي الذي ينتج عندما يمنح الحمض أيون الهيدروجين





NH_3 القاعدة

H_2O الحمض

OH^- القاعدة المرافقة

NH_4^+ الحمض المرافق



اختر الإجابة الصحيحة فيما يلى:

1- من الأحماض الثلاثية البروتونات :



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

2- من الأحماض الأحادية البروتون :



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

ملاحظة:

- للحصول على الحمض المرافق (المقترن) **نزيد H^+ ونزيد شحنة +1**

- للحصول على القاعدة المرافق (المقترنة) **نطرح H^+ ونزيد شحنة -1**

2- اذكر القاعدة المترافقه لكل من
الحموض التاليه : (المقترب)

نطرح H^+ ونزيد $+1$

القاعدة المترافقه	الحمض
$H_2PO_3^-$	H_3PO_3
S^{2-}	HS^-
HSO_4^-	H_2SO_4
NH_3	NH_4^+
CH_3NH^-	CH_3NH_2
NO_3^-	HNO_3
CH_3COO^-	CH_3COOH

1- اذكر الحمض المترافق للقواعد
التاليه : (المقترب)

نزيد H^+ ونزيد $+1$

الحمض المترافق	القاعدة
OH^-	O^{--}
$CH_3NH_3^+$	CH_3NH_2
HCl	Cl^-
NH_4^+	NH_3
$H_2PO_4^-$	HPO_4^{--}
H_2CO_3	HCO_3^-

• **الحمض**: مادة تستقبل زوجاً من الإلكترونات

• **القاعدة**: مادة تمنح زوجاً من الإلكترونات

ملاحظات من هريدي الصعيدي:

1- كل أيون موجب هو حمض لويس.

2- كل أيون سالب هو قاعدة لويس.


3- في الجزيء المتعادل : (نوزع الذرة الوحيدة)

أ- إذا كان دولها في المجال الأخير أقل من $4e^-$ تكون حمض لويس.

ب- إذا كان دولها في المجال الأخير أكثر من $4e^-$ تكون قاعدة لويس.

2 . 8 . 8 . 2


• تدريب: صنف المواد التالية إلى أحماض وقواعد بموجب نظرية لويس :



$$(N=7 \quad \text{Al}=13 \quad \text{Cl}=17 \quad \text{H}=1 \quad \text{O}=8 \quad \text{P}=15 \quad \text{C}=6 \quad \text{B}=5)$$




ق. لويس




ح. لويس




ح. لويس






ح. لويس



ق. لويس




ق. لويس



ملاحظة : عندما يرتبط H^+ مع الماء يتكون أيون الهيدرونيوم H_3O^+


قوة الأحماض والقواعد

مادة تأين كليا في الماء وتكون موصلات جيدة للكهرباء



☞ **الحمض القوي:**

مادة تأين جزئيا في الماء وتكون موصلات ضعيفة للكهرباء



☞ **الحمض الضعيف:**

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$

(ثابت تأين الحمض الضعيف)

كلما زادت قيمة K_a زادت قوة الحمض وزادت التوصيلية للكهرباء

b : base

a: acid

مادة تأين كلية في الماء وتكون موصلات جيدة لـ كهرباء

☞ القاعدة القوية:



مادة تأين جزئياً في الماء وتكون موصلات ضعيفة لـ الكهرباء

☞ القاعدة الضعيفة:



$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+] [\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$$

(ثابت تأين القاعدة الضعيفة)

كلما زادت قيمة K_b زادت قوة القاعدة وزادت التوصيلية لـ الكهرباء

- أي محليل الأحماض التالية أقوى:

ب- حمض الهيدروسيانيك $K_a = 6.1 \times 10^{-10}$

أ- حمض الهيدروفلوريك $K_a = 6.3 \times 10^{-4}$

د- حمض الكربونيك $K_a = 4.5 \times 10^{-7}$

ج- حمض الإيثانويك $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$

ملاحظات

1- تتناسب قوة الحمض **طريديا** مع تركيز أيون H^+ أو $[H_3O^+]$

2- تتناسب قوة القاعدة **طريديا** مع تركيز أيون OH^-

3- الماء النقي متوازن التأثير على تباع الشمس بنوعيه لأن: $[H^+] = [OH^-]$

حاصل ضرب تركيز أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد في محليل المائية

إيجاد معادلة ثابت تأين الماء : K_w



$$K_w = [H^+] [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$K_w = [H^+] [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

تعريفات للحموض والقواعد :

$$[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$$

المحلول المتعادل :

$$[H^+] > 1 \times 10^{-7}$$

المحلول الحمضي :

$$[H^+] < 1 \times 10^{-7}$$

المحلول القاعدي :

الأَس الهيدروجيني pH والأَس الهيدروكسيلي pOH

الأَس الهيدروجيني pH ← لогاريتم تركيز أيون الهيدروجين H^+ مسبوقاً بإشارة سالبة

$$pH = -\log [H^+]$$

الأَس الهيدروكسيلي pOH ← لогاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد OH^- مسبوقاً بإشارة سالبة

$$pOH = -\log [OH^-]$$

$$[H^+] = 1 \times 10^{-7}$$

محلول متعادل

$$\begin{array}{c} -\log [H^+] = -\log 1 \times 10^{-7} \\ \hline \downarrow \\ pH = 7 \end{array}$$

$$[H^+] = 1 \times 10^{-9}$$

محلول قاعدي

$$-\log [H^+] = -\log 1 \times 10^{-9}$$



$$pH = 9$$

$$[H^+] = 1 \times 10^{-5}$$

في القهوة

محلول حمضي

$$-\log [H^+] = -\log 1 \times 10^{-5}$$



$$pH = 5$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$


وتكون :


تعريفات آخرى للحـمـوض والـقـوـاعـد

المحلول المتـعادـل : يكون فيه 7

المحلول الحـمـضـي : يكون فيه < 7

المحلول القـاعـدي : يكون فيه > 7



إذا كان
عندك :

هات

هات

عندك pH وتريد $[H^+]$ عندك pOH وتريد $[OH^-]$

$$[H^+] = 10^{-pH}$$

$$[OH^-] = 10^{-pOH}$$

نحكم على نوع الوسط (حمضي - قاعدي - متعادل) من قيمة pH

محلول متعادل	محلول قاعدي	محلول حمضي	
$[\text{H}^+] = 1 \times 10^{-7}$	$[\text{H}^+] < 1 \times 10^{-7}$	$[\text{H}^+] > 1 \times 10^{-7}$	$[\text{H}^+]$
تساوي 7	أكبر من 7	أقل من 7	pH

1- أحسب $[\text{OH}^-]$ في محلول يحتوي $[\text{H}^+] = 1 \times 10^{-13} \text{ M}$ حمضي أم قاعدي أم متعادل .

$$[\text{OH}^-] = \frac{1 \times 10^{-14}}{[\text{H}^+]} \rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{1 \times 10^{-14}}{1 \times 10^{-13}} = 1 \times 10^{-1} \text{ M}$$

يكون محلول قاعدي

2- أحسب $[\text{H}^+]$ في محلول يحتوي $[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-3} \text{ M}$ حمضي أم قاعدي أم متعادل

$$[\text{H}^+] = \frac{1 \times 10^{-14}}{[\text{OH}^-]} \rightarrow [\text{H}^+] = \frac{1 \times 10^{-14}}{1 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^{-11} \text{ M}$$

يكون محلول قاعدي

3- احسب قيمة pOH لمحلول حمضي أم قاعدي أم متعادل .

$$[\text{H}^+] = 1 \times 10^{-2} \rightarrow \text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 1 \times 10^{-2} = 2$$

$$\text{pOH} = 14 - \text{pH} \rightarrow \text{pOH} = 14 - 2 = 12$$

$\text{pH} < 7$ يكون المحلول حمضي

4- احسب قيمة pH لمحلول حمضي

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] \rightarrow \text{pH} = -\log 0.05 \rightarrow \text{pH} = 1.3$$

5- احسب قيمة pH لمحلول فيه $[OH^-] = 1 \times 10^{-6} M$ يساوي أم قاعدي أم متعادل؟

$$[OH^-] = 1 \times 10^{-6} \rightarrow pOH = -\log[OH^-] \rightarrow pOH = -\log 1 \times 10^{-6} \rightarrow pOH = 6$$

$$pH = 14 - pOH \rightarrow pH = 14 - 6 = 8$$

pH أكبر من 7 فيكون محلول قاعدي

• حساب $[OH^-]$ للقواعد القوية

القاعدة القوية : مثل : KOH ، $NaOH$



$[OH^-] = [NaOH]$ تركيز القاعدة في السؤال بالمولارية = تركيز المولارية

$$[OH^-] = \frac{\text{عدد المولات}}{VL}$$

• حساب $[H^+]$ للأحماض القوية

الحمض القوي : مثل : HNO_3 ، HCl



تركيز الحمض في السؤال بالمولارية = $[H^+] = [HCl]$

أو

$$[H^+] = \frac{\text{عدد المولات}}{VL}$$

من هريدي الصعدي : أبحث عن المادة في السؤال وترجمها إلى قانون ثم أرجع للشبكة
وأنتبه عندك حمض تبدأ بـ $[H^+]$ وعندك قاعدة تبدأ بـ $[OH^-]$

1- احسب قيم pH ، pOH لمحلول مائي يحتوي 0.001 mol من HCl مذاب في 5L من المحلول ؟

حمض قوي HCl

$$[\text{H}^+] = \frac{\text{عدد المولات}}{\text{VL}} = \frac{0.001}{5} = 2 \times 10^{-4}$$

↓

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] \rightarrow \text{pH} = -\log 2 \times 10^{-4} = 3.6$$

↓

$$\text{pOH} = 14 - \text{pH} \rightarrow \text{pOH} = 14 - 3.6 = 10.4$$

-2 احسب قيمة pOH في محلول يحتوي 0.001 M من HCl ؟

حمض قوي HCl

$$[\text{H}^+] = \text{ تركيز الحمض في السؤال بالمولارية} = \rightarrow [\text{H}^+] = 0.001\text{ M}$$



$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] \rightarrow \text{pH} = -\log 0.001 = 3$$

$$\text{pOH} = 14 - 3 = 11$$

-3 احسب قيمة pH في محلول يحتوي 0.001 M من NaOH ؟

قاعدة قوية NaOH

$$[\text{OH}^-] = \text{ تركيز القاعدة في السؤال بالمولارية} = \rightarrow [\text{OH}^-] = 0.001\text{ M}$$



$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] \rightarrow \text{pOH} = -\log 0.001 = 3$$

$$\text{pH} = 14 - 3 = 11$$

4- احسب قيم pH ، pOH لمحلول مائي يحتوي 0.03 mol من NaOH مذاب في 500ml من محلول ؟

قاعدة قوية NaOH

$$[\text{OH}^-] = \frac{\text{عدد المولات}}{V\text{L}} = \frac{0.03}{0.5} = 0.06\text{M}$$

$$V = \frac{500}{1000} = 0.5 \text{ L}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] \rightarrow \text{pOH} = -\log 0.06 = 1.22$$



$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} \rightarrow \text{pH} = 14 - 1.22 = 12.78$$

التعادل والأدلة

مفاهيم كيميائية

التعادل : تفاعل حمض وقاعدة ليتتج ملحًا وما^ء

$$\text{NaOH} + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$$

المعايرة: تفاعل حمض وقاعدة لمعرفة تركيز أحداهما

المحلول القياسي : محلول المعروفة تركيزه محلول مجهول التركيز

نقطة التكافؤ : النقطة التي يكون عندها تركيز أيونات الهيدروجين مساوياً لتركيز أيونات الهيدروكسيد.

الكاشف : أصباغ كيميائية تتأثر ألوانها بالمحاليل الحمضية والقواعدية.

اللون في الوسط المتعادل
وردي

اللون في الوسط القاعدي
احمر


مثال: كاشف ph :
اللون في الوسط الحمضي
عديم اللون

نقطة نهاية المعايرة : النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف.

$$M_A V_A = M_B V_B$$

$$M_A \times 10 = 0.1 \times 9$$

- 1- نأخذ 10 ml من حمض الكلور مجهول التركيز
- 2- نضيف نقطتين من كاشف (دليل pH) فيكون محلول عديم اللون
- 3- نضيف NaOH من السحاحة على الحمض في الدورق التي أن يصبح لون محلول وردي
- 4- نقيس حجم محلول NaOH من السحاحة والتي حولت محلول في الدورق لللون الوردي



حساب المolarية من سانات المعاشرة:

القانون المستخدم :

$$M_A \times V_A = M_B \times V_B$$

V_B : حجم القاعدة

M_B : تركيز القاعدة

V_A : حجم الحمض

M_A : تركيز الحمض

V_A

M_B

V_B

$M_A=?$

- ما مolarية محلول حمض النيتريك إذا لزم 34.33 ml KOH لمعادلة 0.1 M من حمض النيتريك ؟

$$M_A \times V_A = M_B \times V_B$$

$$M_A \times 20 = 0.1 \times 34.33$$

$$M_A = \frac{0.1 \times 34.33}{20} = 0.17 \text{ M}$$

قاعدة ضعيفة

NH_4^+

قاعدة قوية

موديوم Na

بوتاسيوم K

كالسيوم Ca

حمض ضعيف

فلوريد F

سيانيد CN

إيثانوات CH_3COO^-

كربونات CO_3^{2-}

بروميد Br

حمض قوي


كلوريد Cl

كبريتات SO_4^{2-}

نترات NO_3^-

تمييـه الـأـمـلاـح

مثال:



الملح : مركب أيوني أيوناته الموجبة من القاعدة وأيوناته السالبة من الحمض

أنواع الأملاك

مشتق من تفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعيفة

-1 ملحوظی

pH < 7

مثال : كلوريد الأمونيوم NH_4Cl

مشتق من تفاعل حمض ضعيف مع قاعدة قوية

- ملح قاعدي

pH > 7

مثال إيثانوات صوديوم CH_3COONa

مشتق من تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية


3- ملح متعادل

pH = 7


مثال كلوريد الصوديوم NaCl

تدريب:


منف الأملاح التالية إلى حمضي أم قاعدي أم متعادل وأذكر قيمة pH في كل حالة:
 كلوريد أمونيوم - نترات أمونيوم - إيثانوات صوديوم - كلوريد صوديوم




ملح متعادل
 $pH = 7$



ملح قاعدي
 $pH > 7$




ملح حمضي
 $pH < 7$



ملح حمضي
 $pH < 7$

أضافة حمض أضافة قاعدة



pH في الدم 7.4

6.8

7.8

المحاليل المنظمة:

المحاليل المنظمة

محاليل تقاوم التغيرات في قيم pH عند إضافة كميات محددة من حمض أو قاعدة





ما يكون محلول المنظم

حمض ضعيف + قاعدته المرافقة
أو قاعدة ضعيفة + حميتها المرافقة

سعة محلول المنظم




كمية الحمض أو القاعدة التي يستطيع محلول المنظم استوعبها دون تغيير في قيمة pH

أنواع أخرى من المحاليل المنظمة:









1- أحد الأنواع التالية يعد من الأحماض أحادية البروتون:



2- يمكن تفسير السلوك الحمضي لجميع الأنواع التالية حسب نظرية بروونستد ما عدا واحد:



3- أحد الأنواع التالية يسلك كقاعدة فقط حسب نظرية بروونستد



مادة تتفكم وتعطى أيون هيدروجين H^+

• الحمض :

مادة تستقبل أيون هيدروجين H^+

• القاعدة :

(N=7)

B= 5

د- -I

1- كل أيون موجب هو حمض لويس.

2- كل أيون سالب هو قاعدة لويس .

3- في الجزيء المتعادل : (نوزع الذرة الوحيدة)

O=8 (O)

BF₃
ج

H₂O
ب-

NH₃
أ-

₅B:1s²2s² 2p¹

₈O:1s²2s²2p⁴

₇N:1s²2s²2p³

(O=8)

P=15

H=1 (H)

Zn⁺⁺
د

PH₃
ج

-I
ب-

H₂O
أ-

6- الايون الذي يسلك كحمض وقاعدة برونستد هو

CO₃⁻⁻
د- -

PO₄⁻³
ج-

HSO₃⁻
ب-

NH₄⁺
أ-


7- الحمض المرافق لـ HSO₄⁻ هو :

HSO₄
د-

H₂SO₄
ج-

SO₄⁻²
ب-

H₂SO₄
أ-



(H=1)

PH₃ حسب نظرية لويس (P=15)

د- متعادل

جـ- حمض وقاعدة

بـ- قاعدة

أـ- حمض

10- المادة التي لها القدرة على استقبال البروتون من مادة أخرى هي :

د- قاعدة لويس

جـ- حمض لويس

بـ- قاعدة برونستد

أـ- حمض برونستد

11- واحد أو أكثر من الجمل التالية يكون صحيح :

2- القاعدة المقتنة لـ N₂H₄ هي N₂H₃⁻

4- الحمض المقتنـ لـ H₂O هو OH⁻


د- 3 ، 2

جـ- 4 ، 1

1- الحمض المقتـ لـ NH₃ هو NH₄⁺

3- القاعدة المقتـ لـ H₂CO₃ هي HCO₃⁻

أـ- 1 ، 3



12- في التفاعل :

يعتبر كاتيون الهيدرونيوم : H₃O⁺

أـ- قاعدة مرافقـ للماء


بـ- قاعدة مرافقـ لـ كلوريد الهيدروجين

جـ- حمضـ مرافقـ للماء

$$[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-4} \rightarrow \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] \rightarrow \text{pOH} = -\log 1 \times 10^{-4} = 4 \rightarrow \text{pH} = 14 - 4 = 10$$

14- في المعادلة : $\text{NH}_3 + \text{H}^+ = \text{NH}_4^+$ يسلك غاز الأمونيا :

- أ- كحمض لوييس
- ب- كحمض برونسنستد
- ج- كقاعدة برونسنستد
- د- كقاعدة وقاعدية برونسنستد



15- في التفاعل : $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ يعتبر :

- أ- حمض مرافقاً لـ H_2O
- ب- قاعدة مرافقاً لـ CO_3^{2-}
- ج- قاعدة مرافقاً لـ CO_3^{2-}
- د- قاعدي مرافقاً لـ H_2O

18- المحلول الذي يمتاز بأن $[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-4} \text{ M}$ هو محلول :

- أ- حمضي
- ب- قاعدي
- ج- متوازن
- د- متعدد

حمض برونسنستد: يعطي H^+ وله قاعدة مرافقة
قاعدة برونسنستد: تستقبل H^+ ولها حمض مرافق

محلول متعادل	محلول قاعدي	محلول حمضي	
$[H^+] = 1 \times 10^{-7}$	$[H^+] < 1 \times 10^{-7}$	$[H^+] > 1 \times 10^{-7}$	$[H^+]$
تساوي 7	أكبر من 7	أقل من 7	pH

-19- المحلول الحمضي يمتاز بأن pOH :

ج- تساوي

ب- أقل من 7

أ- أكبر من 7

-20- إذا كان $M > [OH^-] > 1 \times 10^{-7}$ فإن المحلول :

ج- متعادل

ب- قاعدي

أ- حمضي

-21- المحلول الأكثر حموضية في المحاليل التالية يكون فيه :

pH = 6

pOH = 6

$[H^+] = 0.001 M$

\downarrow
pH = 8

\downarrow
pH = 3

-22- أدد محليل الأملاح التالية يكون له أقل قيمة pH وهو:

NH_4Cl

pH < 7

K_2CO_3

pH > 7


$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

pH = 7

NaCl

pH = 7

24- عند الأنواع التالية لا يعمل كمحالول منظم:



25- ما قيمة pH عند نقطة التكافؤ في الشكل أمامك؟

د- 1

ج- 5

ب- 9

أ- 10

26- بالاستعانة بالرسم البياني أمامك ؟ ما الكاشف الأكثر فاعلية لتدريي نقطة التكافؤ لهذه المعايرة؟

أ- الميثيل البرتقالي الذي مداره 4.4 - 3.2

ب- فينولفتالين الذي مداره 10 - 8.2

ج- البروموكريپسول الأخضر الذي مداره 5.4 - 3.8

د- الثايمول الأزرق الذي مداره 9.6 - 8.0

27- أي المواد التالية أكثر قاعدية:

أ- الأمونيا (pH = 11.3) ب- عصير الليمون (pH = 2.3) ج- مضاد الحموضة (pH = 9.4) د- الدم (pH = 7.4)

-29- تفاعل حمض مع قاعدة واستخدام أداهما في معرفة تركيز الآخر فإن ذلك يدعى :

أ- معايرة **ب- موالية** **ج- تعادل** **د- موالية**

30- أي مما يلي يعتبر من القواعد حسب نظرية أرهينيوس :

NH_4^+	NaOH	CO_3^{2-}	HCl
-----------------	---------------	--------------------	--------------

NaOH - ج

$$\text{CO}_3^{2-} \rightarrow$$

HCl - i

31- أي الأكاسيد التالية أنهيدريد قاعدي :

CaO -ג

NO_2^-

CO_2 - \downarrow

SO_2^-

-32 مادة متعددة :

د- كربونات الصوديوم

بـ- هيدروكسيد الصوديوم


بـ- الْأَمُونِيَا

١٥


قاعدة أرهينيوس : مادة تعطى OH^-

حمض أرهينيوس : مادة تعطى H^+


33- إحدى المواد التالية لا تعتبر من حموض أو قواعد أرهينيوس:




$$M_2 = ?$$



$$M_1 = 6$$



$$V_1 = 1$$




37- أضيف لتران من الماء الى لتر من HCl تركيزه 6 فإن مolarية محلول الجديد :

د- 5 M

ج- 3 M

ب- 2 M

أ- 1 M



$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$



$$6 \times 1 = M_2 \times 3$$

38- الملح الذي لا يغير قيمة pH عند اضافته الى محلول مائي هو :



ح. ضعيف

ق. قوية



ق. ضعيفة

ح. قوي







ح. ضعيف
ق. قوية



ح. قوي
ق. قوية




39- عند اضافة حمض هيدروكلوريك (HCl) الى فلز الخارصين يحدث تفاعل ويتضاعد غاز:



40- العبارة الصحيحة فيما يخص المركب CH_3COOH هي:



41- المادة التي تعتبر حمض في نظرية لويس هي :



42- كاشف تبع الشمس يعطي في الوسط القاعدبي لون.....

د- بنفسجي

ج- احمر

ب- اصفر

أ- ازرق

$$\text{pOH} = 10 \rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} \rightarrow \text{pH} = 14 - 10 = 4 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

43- اذا كانت قيمة pOH لمحلول ما تساوي 10 ، فإن تركيز ايون الهيدرونيوم في المحلول يساوي:


د- 4.0×10^{-14}

ج- 4.0×10^{-4}

ب- 1.0×10^{-4}

أ- 4^{-1}

44- أي المحاليل التالية يعتبر محلول منظم :



كان _____ أصبح

45- في التفاعل : $\text{NH}_{3(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \text{NH}_4^{+}_{(aq)} + \text{OH}^{-}_{(aq)}$ فإن الماء يعتبر :

د- قاعدة مرافق

ج- حمض مرافق

ب- قاعدة

أ- حمض

50- أي المحاليل التالية متجانس :

د- ذوبان السكر في الماء

ج- الضباب الدخاني

ب- الحليب

أ- الطين

56- أي المواد الكيميائية التالية يمكن أن تحول ورق تباع الشمس إلى اللون الأزرق:



pH = 14- 12

57- مشروب فيه pH تساوي 12 يكون:

د- متعدد

ج- متعادل

ب- قاعدي

أ- حمضي





58- تتغير قيمة الأس الهيدروجيني pH عند تخفيف المحاليل الآتية ما عدا :



59- الملح الذي لا يغير قيمة pH عند اضافته إلى محلول مائي هو:



60- عند إضافة حمض الخل إلى صودا الخبز يحدث تفاعل وينتج غاز



$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$\longrightarrow$$

$$2 \times V_1 = 1 \times 0.2$$

$$\longrightarrow$$

$$V_1 = \frac{1 \times 0.2}{2} = 0.1 \text{ L} = 100 \text{ ml}$$

61- حجم محلول القياسي M 2.0 من KI اللازم لترميم محلول مخفف منه تركيزه 0.2 M وحجمه 100 ml :

د- 400 ml

ج- 300 ml

ب- 200 ml

أ- 100 ml

62- القاعدة المراجحة للحمض : HCOOH :



63- محلول الذي يحول لون تابع الشمس الى الأزرق يكون فيه :

$$\text{pH} = -\log 1 \times 10^{-3} = 3$$

$$\longleftrightarrow [H^+] = 1 \times 10^{-3}$$

ب-

$$\text{pH} = 3$$

$$\text{pOH} = 11$$

$$\longleftrightarrow$$

$$[OH^-] = 1 \times 10^{-11}$$

أ-

$$\text{pH} = 9$$

$$\longleftrightarrow$$

$$\text{pOH} = 5$$

ب-

$$\text{pH} = 6$$

64- تعريف القاعدة حسب نظرية (أرهينيوس) هي المادة التي :

ب- تنتج OH^-

أ- تنتج H^+

د- تمنح زوجا من الألكترونات

ج- تستقبل زوجا من الألكترونات

65- عندما يكون قيمة $pH = 1 \times 10^{-13}$ لمحلول فإن ذلك يدل على أنه :

- بـ- حمظها ضعيفة
- دـ- قاعدة ضعيفة

- أـ- قاعدة قوية
- بـ- قاعدة قوية

$pH > 7$

$pH < 7$

$7 = pH$

$pH = صفر$

66- حسب مقاييس pH يكون المحلول قاعدياً إذا كانت :

بـ-

أـ-

68- من الالماح التي تنتج محليل قاعدية عندما تتميأ :

دـ- $NaNO_3$

جـ- NH_4Cl

بـ- KF

أـ- $NaCl$

قـ. قوية

جـ. قوي

جـ. قوي جـ. ضعيفة

جـ. ضعيف قـ. قوية

جـ. قوي قـ. قوية

دـ- قاعدة ضعيفة أخرى


جـ- ماء

بـ- قاعدة قوية

أـ- حمضها المرافق

70- المحلول المنظم عبارة عن خليط من قاعدة ضعيفة مع :

71- حمض ثئي البروتون :



72- أي مما يلي ليس من خواص القواعد:

د- موصلات للكهرباء

ج- تتفاعل مع بعض الفلزات

ب- ملمسها لزق

أ- طعمها مر

73- واحد مما يلي من خواص المحاليل الحمضية:

د- تحول تابع الشمس للون الأزرق

ج- ملمسها صابون

ب- $\text{pH} < 7$

أ- طعمها مر


74- محلول $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ تركيزه M يكون تركيز أيون SO_4^{2-} فيه :

د- $3M$


ج- $0.9M$

ب- $0.6M$




أ- $0.3M$



من المعادلة
من السؤال



75- تفاعل الصوديوم مع الماء ينتج غاز :



76- عندما تكون $pOH = 3$ فإن $[H^+]$ يساوي:

د- 3

ج- 11

ب- 1×10^{-8}

أ- 1×10^{-11}

$$pOH = 3 \Rightarrow pH = 14 - 3 = 11 \Rightarrow [H^+] = 10^{-pH} \Rightarrow [H^+] = 10^{-11}$$

77- إذا كانت قيمة H m ل محلول تساوي (2) فأي العبارات التالية صحيحة :

د- $pOH < 10$

ج- محلول قاعدي

ب- محلول حمضي

أ- محلول أقرب للتعادل

78- حاصل ضرب تراكيز أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد :
 د- قاعدة برونستاد لوري ج- الرقم الهيدروجيني أ- ثابت تأين الماء

الأكسدة والاختزال





T.M.Hagiga Chemistry

$-11e^- + 11p$

$-01e^- + 11p$


يُفقد e^-



الفصل الرابع : الأكسدة والاختزال




فقد e – زاد عدد التأكسد – عملية أكسدة – عامل مختزل



اكتسب e – يقل عدد التأكسد – عملية اختزال – عامل مؤكسد

العملية التي يتم فيها فقد الالكترونات - وزيادة في عدد التأكسد	الأكسدة
العملية التي يتم فيها اكتساب الالكترونات - ويقل عدد التأكسد	الاختزال
مادة يحدث لها عملية اختزال - من خلال اكتساب ذراتها للإلكترونات	عامل المؤكسد
مادة يحدث لها عملية أكسدة - من خلال فقدان ذراتها للإلكترونات	عامل المختزل
الشحنة الموجبة أو السالبة التي يحملها أيون أحادي الذرة	عدد التأكسد



تطبيق : في التفاعل:

زاد عدد التأكسد - عملية أكسدة - عامل مختزل

يقل عدد التأكسد - عملية اختزال - عامل مؤكسد

عامل المختزل	عامل المؤكسد	المادة التي اختزلت	المادة التي تأكسدت
Fe	Ag^{+}	Ag^{+}	Fe

الاكسدة والاختزال عمليتان متلازمتان :

الاختزال	الاكسدة
-1 اكتساب e	-1 فقد e
-2 يقل عدد التأكسد	-2 يزداد عدد التأكسد
-3 عامل مؤكسد	-3 عامل مختزل
-4 يتم تحديدها من المتفاعلات	-4 يتم تحديدها من المتفاعلات
-5 يختزل	-5 يتآكسد

قواعد حساب أعداد التأكسد:

1- عدد أكسدة العنصر الحر (غير المتعدد) بغيره = Zero
 $Zn, Mg, Na, O_2, H_2, S, \dots$

2- عدد أكسدة بعض الأيونات في مركباتها : (العنصر متعدد)

F	Al	Ca	Mg	Sr	Cd	Ba	Li	Na	K	Rb	أيون العنصر
						Zn					متعدد
-1	+3				+2				+1		عدد التأكسد

3- عدد أكسدة الأكسجين (O) في مركباته : (وهو متعدد)

$+2$
مع الفلور
 OF_2

-1

في الأكسيد الفوقيية



-2

في معظم مركباته



٤- عدد أكسدة الهيدروجين (H) في مركباته :

-1

في الهيدريدات NaH , KH , LiH

+1

في معظم مركباته

- أ- عدد أكسدة Br ، Cl ، F ، I = -1
- ب- عدد أكسدة Br ، Cl ، I مع الأكسجين يكون موجب ويجب حسابه

٥- في المركب المتعادل : (مثل H_2SO_4 , NaOH) المجموع الجبري لأعداد أكسدة عناصره = صفر

٦- في الأيون المركب : (مثل NH_4^+ , CO_3^{2-}) المجموع الجيري لأعداد أكسدة عناصره = الشحنة الموجودة على الأيون

عدد ذرات العنصر الأول \times عدد أكسدته + عدد ذرات العنصر الثاني \times عدد أكسدته + +


معنى
المجموع
الجيري

..... و هو Na_2SO_4 في عدد أكسدة الكبريت هو




$$(2 \times +1) + (1 \times \text{S}) + (4 \times -2) = \text{صفر} \Rightarrow 2 + \text{S} - 8 = \text{صفر} \Rightarrow \text{S} = -2 + 8 = +6$$

..... و هو KClO_3 في عدد أكسدة الكلور هو



$$(1 \times +1) + (1 \times \text{Cl}) + (3 \times -2) = \text{صفر} \Rightarrow 1 + \text{Cl} - 6 = \text{صفر} \Rightarrow \text{Cl} = -1 + 6 = +5$$

..... و هو N_2H_4 في عدد أكسدة النيتروجين هو



$$(2 \times \text{N}) + (4 \times +1) = \text{صفر} \Rightarrow 2\text{N} = -4 \Rightarrow \text{N} = -2$$

$$\text{PO}_4 = -3$$

$$(1 \times \text{P}) + (4 \times -2) = -3 \quad \Rightarrow \quad \text{P} - 8 = -3 \quad \Rightarrow \quad \text{P} = +8 - 3 \quad \Rightarrow \quad \text{P} = +5$$

$$\text{Cr}_2\text{O}_7 = -2$$

..... هو $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ عدد أكسدة الكروم في

$$(2 \times \text{Cr}) + (7 \times -2) = -2 \quad \Rightarrow \quad 2 \text{Cr} - 14 = -2 \quad \Rightarrow \quad 2 \text{Cr} = 14 - 2 \quad \Rightarrow \quad 2 \text{Cr} = +12 \quad \Rightarrow \quad \text{Cr} = +6$$

$$\text{Fe(OH)}_3 = \text{مفر}$$

..... هو Fe(OH)_3 عدد أكسدة الحديد في

$$(1 \times \text{Fe}) + (3 \times -2) + (3 \times +1) = \text{مفر}$$

$$\text{Fe} - 6 + 3 = \text{مفر} \quad \Rightarrow \quad \text{Fe} = +3$$

9- عدد أكسدة الكربون في

د - 6

ب - 3

ب - 6

+3 أ



$$(2 \times +1) + (2 \times \text{C}) + (4 \times -2) = \text{صفر} \Rightarrow 2 + 2\text{C} - 8 = \text{صفر} \Rightarrow 2\text{C} = +6$$

درس:

1- حدد أي العمليات التالية أكسدة وايهما اختزال:



زاد - أكسدة - عامل مختزل






قل - اختزال - عامل مؤكسد



قل - اختزال - عامل مؤكسد

2- عدد العناصر التي تأكسدت والعناصر التي اخترلت في العمليات التالية:




فإن العامل المؤكسد I₂ والعامل المختزل Mg

2- في التفاعل:

..... فإن العامل المؤكسد $H_2S + Cl_2 \longrightarrow S + 2HCl$ 3- في التفاعل :

والعامل المخترل $H_2S =$

H_2S زاد - اكسدة - عامل مخترل
 Cl_2 قل - اختزال - عامل مؤكسد




تدريس : 1- في التفاعل $2KBr + Cl_2 \longrightarrow 2KCl + Br_2$ المطلوب:

أ- العامل المؤكسد : ج: يتآكسد : ب- العامل المخترل : د: يختزل :

KBr زاد - اكسدة - عامل مخترل

Cl_2 قل - اختزال - عامل مؤكسد



عامل مختزل = أكسدة = فقد e

-1 أي مجموعات الجدول الدوري التالية أقوى عوامل اختزال :

د - 2

ج - 1

ب - 18

أ - 17

لا يعد عامل مختزل \leftarrow يريد عامل مؤكسد = اختزال = اكتساب e

-2 أي مما يلي لا يعد عاماً مختزاً في تفاعل الأكسدة والاختزال :
 أ-المادة التي تأسدت
 ب-مستقبل الإلكترون
 د-مانح الإلكترون
 ج-المادة الأقل كهروسالبية

-3 التفاعل بين النيكل وكلوريد النحاس موضح على النحو التالي:
 فيكون العامل المختزل :

Ni
د -


Cu
ب -

CuCl₂
ب -

NiCl₂
أ -

Ni زاد - أكسدة - عامل مختزل

CuCl₂ قل - اختزال - عامل مؤكسد



7- عدد أكسدة الكربون في Na_2CO_3

- 4

-2




+ 4

+2 - أ

Na_2CO_3 صفر


$$(2 \times +1) + (1 \times \text{C}) + (3 \times -2) = \text{صفر} \rightarrow 2 + \text{C} - 6 = \text{صفر} \rightarrow \text{C} = +4$$

9- أي التفاعلات التالية يمثل تفاعل أكسدة :



زad - اكسدة - عامل مختزل

قل - اختزال - عامل مؤكسد




12- عدد أكسدة الألومنيوم Al_{13} في مركباته يساوي :

د- +3

ب- -2

ب- +2

أ- -3



عدد الأكسدة = الشحنة = عدد الالكترونات المفقودة أو المكتسبة

14- العملية التي يزداد فيها عدد أكسدة ذرة عنصر وتحدث عندما تفقد الذرة الكترون أو أكثر هي عملية :

د- تأين

ج- تفكك


ب- اختزال

أ- أكسدة

15- أي العبارات التالية ليس صحيحاً فيما يخص المعادلة التالية:
 أ- Fe هو العامل المؤكسد ب- تخزل أيونات Ag^+
 د- التفاعل أكسدة واحتزال ج- شاؤكسد ذرات Fe

زاد - أكسدة - عامل مخترل Fe

قل - احتزال - عامل مؤكسد Ag^+



16- أقوى العوامل المؤكسدة في مجموعة الالوجينات :

د- يود

ج- بروم

ب- كلور

أ- فلور

17- المادة التي عدد أكسدتها يساوي صفر هي :

د- Cl^-

ب- SO_3^{-2}

ب- H_2

أ- Cu^{+2}

18- الشحنة النهاية للمركب : Na_2SO_4

د- صفر

ج- -2

ب- +3

+2

19- العنصر الذي يمكن أن يكون عدد أكسدته +2 ؟

د- شبه فلز

ج- لا فلز

ب- فلز

أ- غاز نبيل

20- العامل المؤكسد :

د- يختزل

ج- يزداد عدد أكسدته

ب- يفقد الالكترونات

أ- يتآكسد

عامل مؤكسد = اختزال = اكتساب e = يقل عدد التأكسد

الفلور أعلى العناصر في الجدول الدوري
كهرولسالبية = اكبر ميل لاكتساب e

-21- عدد أكسدة الحديد في : Fe(OH)_3

د - 3

+ 3 ب

ب - 1

+ 1 أ

$\text{Fe(OH)}_3 = \text{صفر}$

$$(1 \times \text{Fe}) + (3 \times -2) + (3 \times +1) = \text{صفر} \Rightarrow \text{Fe} - 6 + 3 = \text{صفر} \Rightarrow \text{Fe} = +3$$

-22

يعد العنصر عاماً مؤكسد قوياً إذا :

- أ- وصل للتركيب الثماني
- ب- كهروسالبية مرتفعة
- ج- طاقة تأين منخفضة

عامل مؤكسد = اختزال = اكتساب e = كهروسالبية عالية = يقل عدد التأكسد

كهروسالبية = الالفة الالكترونية: الميل لاكتساب الالكترونات

-24- اذا ددثت عملية أكسدة لعنصر فإن عدد التأكسد له :

د- يزداد

ج- يقل

ب- لا يتغير

أ- يساوي صفر

وزن المعادلة في الوسط الحمضي والقاعدبي بطريقة أعداد الأكسدة التفاعل :-

1- نسب في طرفي المعادلة أعداد الأكسدة لذرات العناصر غير H ، O .

2- تدريب عملية الأكسدة والاختزال :

- المادة التي يزداد عدد أكسدتها
- المادة التي يقل عدد أكسدتها

.. عملية أكسدة
.. عملية اختزال

3- حساب التغيير في عدد التأكسد = **الفرق** بين عدد أكسدتي الذرتين مع التبسيط

4- ضرب الكترونات التغيير في عدد التأكسد بالنسبة لمعادلة الأكسدة مثلا في معادلة الاختزال والعكس

5- وزن الأكسجين :- لكل ذرة (O) ناقصة نظيف جزيء ماء للطرف الذي يوجد به النقص.

فـ **في الوسط الحمضي** : لكل ذرة H ناقصة نظيف H^+ للطرف الذي يوجد به النقص

6- وزن الهيدروجين:-

فـ **في الوسط القاعدبي** : لكل ذرة H ناقصة نظيف جزيء ماء H_2O للطرف الذي يوجد به النقص وفي نفس الوقت نظيف للطرف الآخر نفس العدد OH^- عن كل جزيء ماء تمت أضافته

1- زن التفاعل التالي في وسط حمضي: $\text{H}_2\text{S} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{S} + \text{NO}$

$$\text{H}_2\text{S} = \text{صفر}$$

$$(2 \times +1) + (1 \times \text{S}) = \text{صفر}$$

$$2 + \text{S} = \text{صفر} \Rightarrow \text{S} = -2$$

$$\text{NO}_3^- = -1$$

$$(1 \times \text{N}) + (3 \times -2) = -1$$


$$\text{N} - 6 = -1 \Rightarrow \text{N} = +5$$


$$\text{NO} = \text{صفر}$$

$$(1 \times \text{N}) + (1 \times -2) = \text{صفر}$$

$$\text{N} - 2 = \text{صفر}$$

$$\text{N} = +2$$






$$\text{NO}_2 = \text{مفر}$$

$$(1 \times N) + (2 \times -2) = \text{مفر}$$

$$N - 4 = \text{مفر}$$

$$N = +4$$



-3- وازن التفاعل التالي في وسط قاعدي :-

$$\text{MnO}_4^- = -1$$


$$(1 \times \text{Mn}) + (4 \times -2) = -1$$

$$\text{Mn} - 8 = -1 \quad \Rightarrow \quad \text{Mn} = +7$$

$$\text{MnO}_2 = \text{صفر}$$

$$(1 \times \text{Mn}) + (2 \times -2) = \text{صفر}$$

$$\text{Mn} = +4$$



13- موازنة الأكسجين في تفاعل الاختزال التالي عن طريق إضافة: Mn^{+2}

- بـ $O_4^- + 4H_2O \rightarrow 4H_2O$ إلى النواتج
دـ $8H^+ + O_4^- \rightarrow 4H_2O$ إلى النواتج

- أـ $4H_2O \rightarrow O_4^- + 8H^+$ إلى المتفاعلات
بـ $4H^+ \rightarrow O_4^- + 8H_2O$ إلى المتفاعلات

شكراً لكم



النهاية

