

مبادئ في الإحصاء والاحتمالات

الطبعة الثانية

د. حميد عويّد مشرف العكله

أستاذ في قسم العلوم الأساسية- عمادة السنة الأولى المشتركة

د. إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الواصل

أستاذ في قسم الإحصاء وبحوث العمليات- كلية العلوم


د. منصور محمد علي شراحيلى


أستاذ مساعد في قسم الإحصاء وبحوث العمليات- كلية العلوم

د. إبراهيم علي حسن النفيسه

أستاذ مساعد في قسم الإحصاء وبحوث العمليات- كلية العلوم

جامعة الملك سعود





محتوى الكتاب

iii	جدول المحتويات
vi	مقدمة الكتاب
ix	شكر وتقدير



1

الفصل التمهيدي . . مفاهيم أساسية في الرياضيات


- 2 المجموعات وخصائصها
- 13 الدوال الحقيقية
- 20 تمارين الفصل التمهيدي



23

الفصل الأول . . جمع البيانات الإحصائية وتنظيمها


- 24 تعاريف ومفاهيم أساسية
- 32 تنظيم البيانات الخام وتمثيلها
- 42 التوزيعات التكرارية
- 50 التمثيلات البيانية لجدول التوزيعات التكرارية
- 54 أشكال التوزيعات التكرارية
- 57 تمارين الفصل الأول



63

الفصل الثاني . . مقاييس الموضع للبيانات


- 64 مقاييس النزعة المركزية
- 81 الرُّبُيعَات
- 87 المَتَّيِّنَات
- 91 الأعداد الخمسة والتمثيل الصندوقي للبيانات
- 94 تمارين الفصل الثاني



99

الفصل الثالث . . مقاييس الاختلاف للبيانات

- 100 مقاييس التشتت
- 111 مُعَامَلَات من أجل مقارنة التشتت لمجموعتي بيانات أو أكثر
- 114 الدرجة المعيارية Z
- 117 تمارين الفصل الثالث



الفصل الرابع . . الارتباط والانحدار الخطي

122 الارتباط الخطي البسيط

134 الانحدار الخطي البسيط

141 تمارين الفصل الرابع



الفصل الخامس . . التجارب العشوائية واحتمالات الحوادث

144 القاعدتان الأساسيتان في العدّ

146 الترتيب والتوافق

150 فضاء الحوادث الابتدائية


154 الحوادث

160 الدالة الاحتمالية ومبدأ لابلاس في الحساب الاحتمالي

170 الاحتمالات الشرطية

175 استقلال الحوادث

180 تمارين الفصل الخامس



الفصل السادس . . المتغيّرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية

186 المتغيّرات العشوائية

192 دالة التوزيع لمتغير عشوائي

195 المتغيّرات العشوائية المتقطّعة


210 المتغيّرات العشوائية المستمرة

219 تمارين الفصل السادس

223 المراجع

224 جدول قيم التوزيع الطبيعي المعياري

226 ثبت المصطلحات



مقدمة الكتاب

مقدمة الطبعة الأولى:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أوصانا الله تعالى بطلب العلم وحثنا على اكتشاف أسرار مخلوقاته وسبر مكنوناتها، ولكن بالعلم والمعرفة وتقديم الدليل والحجة الداحضة، حيث يقول ربنا عز وجل في سورة الرحمن (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) (الآية 33)، وذكرنا ربنا تعالى أن ما لدينا من علوم ما هو إلا بالشيء القليل حيث يقول سبحانه وتعالى في الآية 85 من سورة الإسراء (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا).

إن علم العشوائيات (الإحصاء الرياضي ونظرية الاحتمالات) يُعد من العلوم التطبيقية الأكثر انتشاراً في الوقت المعاصر، وذلك لأن هذا العلم قد أصبح على علاقة وثيقة بمعظم فروع العلوم العلمية والانسانية، حيث يلاحظ أن الكثير من الاختصاصات تحتاج إلى تحاليل وعروض واختبارات إحصائية من أجل تشييت صحة نتائج دراساتنا. أما عن تاريخ علم الاحصاء فليس هناك ما يشير إلى زمن ولادته بشكل دقيق، فالبعض يذكر أنه كان حوالي عام 1662، والبعض الآخر يذكر أنه يعود إلى حوالي عام 1749. لكن في الواقع يُعتقد أن علم الإحصاء قديم قدم تاريخ الحساب عندما بدأت المراحل الأولى للتجمعات البشرية حيث سادت فيها مظاهر السلطة وحب التملك، وظهور العد والتصنيف لحصر الممتلكات من الأنعام والجند والجنان، وذلك لأن عملية العد مع التصنيف ما هي إلا عمل إحصائي ابتدائي. لذلك يُنظر إلى الإحصاء على أنه توأم الحساب أو ربما كان أحدهما هو الشقيق الأكبر للآخر. أما استخدامه كمفردة لغوية، فإنه كان متداولاً بين الناس منذ زمن بعيد جداً والدليل على ذلك ورود كلمة «إحصاء» في القرآن الكريم مرّات عديدة، وهذا يعني أن كلمة «إحصاء» كانت ذات دلالة واضحة منذ أمد بعيد. إن أول كتاب نُشر في الإحصاء كان عام 1845 من قبل الرياضياتي (الاكتواري) الإنكليزي نيسون Francis Gustavus Paulus Neison وحمل عنوان «مساهمات في الإحصاء الحيوي Contributions to Vital Statistics». لقد نشط في هذا المجال عدد كبير جداً من المهتمين بهذا العلم وأكثرهم من علماء العلوم الطبيعية (الرياضيات، الإحصاء، الفيزياء وعلم الحياة)، وكان من أبرز هؤلاء: بييز Thomas Bayes (1702-1761)، بواسون Siméon Denis Poisson (1781-1840)، بيرسون Karl Pearson (1857-1936) وفيشر Ronald Fisher (1890-1962).

أما علم الاحتمالات فهو حديث العهد (نسبياً) إذا ما قورن بعلم الإحصاء، فقد نشأ الحساب الاحتمالي من خلال محاولة إيجاد الحلول لبعض ألعاب الحظ والمراهنات. هذا وقد حظيت الاحتمالات باهتمام كبير من قبل علماء العلوم الطبيعية عامة وعلماء الرياضيات خاصة، وذلك لما لهذا العلم من تطبيقات مهمة في معظم مجالات العلوم التطبيقية والنظرية على حد سواء، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن القول إن نظرية الاحتمالات أصبحت الحجر الأساس لمعظم الدراسات المهمة بالتجارب والظواهر العشوائية ونمذجتها. إن أول كتاب نُشر في الحساب الاحتمالي كان عام 1657 من قبل هويغنز Christiaan Huygens (1629-1695) وحمل عنوان «حسابات لألعاب الحظ». إن عام 1713 يعدُّ التاريخ الحقيقي لولادة علم الاحتمالات بعد أن تم نشر أول مقالة علمية متقنة للرياضياتي السويسري يعقوب برنولي Jakob Bernoulli (1655-1705) (قدّمت من قبل أخيه بعد ثمان سنوات من وفاته). أما الناشطون في هذا المجال فهم كثيرون جداً أيضاً، ومن أبرزهم: هويغنز، يعقوب برنولي والرياضياتي الروسي كموغوراف (1903-1987) Andrey Kolmogorov.

في إطار تطوير العمل الأكاديمي من أجل الوصول إلى مستوى علمي مرموق ينهل منه الطلبة في الجامعات فقد تم بفضل من الله تعالى وعونه إعداد هذا الكتاب ليكون لبنة من لبنات الصرح العلمي للجامعات والمكتبات العربية. لقد تم إعداد هذا الكتاب بحيث يكون متناسباً مع السوية العلمية للطلبة الجامعيين في العلوم الإنسانية ومنسجماً مع خطة تدريسية لفصل دراسي واحد بمعدل ثلاث ساعات معتمدة.

في الواقع لم يكن إنجاز هذا الكتاب سهلاً لأنه يتعلّق بتقديم محتوى علمي لطالب في مسار علوم إنسانية، فقد حاولنا جاهدين إغناء موضوعات هذا الكتاب بقدراً جيّداً من المعارف العامة في الإحصاء والاحتمالات التي تناسب طلبة المسار الإنساني في أية جامعة وبحيث تلبّي الكثير من احتياجاته الإحصائية خلال مسيرته التعليمية الجامعية. كما حاولنا عرض التّصوُّص والصيغ بشكل يمكن للقارئ تفهمها دون جهد أو عناء وموضّحين ذلك بالجداول والرّسوم والعروض البيانية عند الضرورة.

بالطبع لدى تقديم المعلومات في هذا الكتاب تمّ الأخذ بالحسبان المستوى العلمي والمعرفي للطالب الجامعي الدّارس في مسار علم إنسانيّ، ولذلك بدأنا بمعلوماتٍ بسيطةٍ متوفّرةٍ بعضها لدى الطالب من مرحلة التعليم قبل الجامعيّ، ومن ثمّ التدرّج في رفع مستوى المعلومة إلى أن بلغت ذروتها في دراسة الاحتمالات. كذلك حاولنا قدر المستطاع إظهار الترابط العلمي والموضوعي للفقرات المقدّمة بحيث تبدو الفقرات للطالب متسلسلة بشكلٍ منطقيّ، بمعنى أنّ المعلومات المتراكبة بُنيت (في معظم الحالات) على نحوٍ متصاعد.

لقد قدّمنا في هذا الكتاب سبعة فصولٍ تناولنا في طيّاتها موضوعات أساسية في الإحصاء والاحتمالات، وكانت محتوياتها على النحو الآتي:

- الفصل التمهيدي، وقد قدّم فيه بعض المفاهيم الرياضياتية اللازمة لدراسة الفصول اللاحقة.
- الفصل الأول، وقد خصّص لتنظيم البيانات الإحصائية وعرضها بيانياً.
- الفصل الثاني، وقد خصّص لتقديم بعض مقاييس الموضع للبيانات الإحصائية.
- الفصل الثالث، وقد خصّص لتقديم بعض مقاييس الاختلاف للبيانات الإحصائية.
- الفصل الرابع، وقد خصّص لتقديم مبادئ أولية في الارتباط والانحدار الخطي.
- الفصل الخامس، وقد خصّص لشرح مفهوم التجارب العشوائية وحساب احتمالات حوادث متعلّقة بها.
- الفصل السادس، وقد خصّص لتقديم مفهوم المتغيّر العشوائي وعرض بعض نماذجه البسيطة والمهمّة.

لقد قمنا بإغناء موضوعات و فقرات هذا الكتاب بعددٍ لا بأس به من الأمثلة المحلولة، ومن ثمّ إدراج عددٍ آخر في نهاية كل فصل من التمارين غير المحلولة المناسبة للفكر المقدّمة في الفقرات النظرية. كما قمنا بترقيم الفقرات المهمة والعلاقات والجداول والأشكال بطريقة تُسهّل على الطالب التّقلّب فيما بينها، وأخيراً ننوّه إلى أنّنا قمنا بتشكيل الكثير من الكلمات وتجاوزنا عن البعض الآخر بشكلٍ متعمّد من أجل أن يتعوّد الطالب على القراءة الصحيحة للكلمة وإذا ما شكّلت الكلمة لاحقاً فهو من باب التذكير فقط.

في الحقيقة إنّ ما قدّم في طيّات هذا الكتاب ليس إلاّ غيض من فيض، ولذلك سيجد القارئ الكثير من الاقتراحات على إضافة فقرة هنا وحذف أخرى هناك وتعديل على فقرة في موضعٍ آخر، وهذا أمر قلّمنا يسلم منه مؤلّف مهما بَدّل من جهد لأجله. لذلك نوّد أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا العميقين لكل من يبدي لنا ملاحظة مفيدة أو نقداً بناءً حول هذا الكتاب آمليين من الله تعالى أن نكون قد وفّقنا في تقديمه بالشكل المناسب والمفيد.

قبل أن نختم مقدّمتنا هذه ننوّه إلى أنّنا اعتمدنا في التّعبير على بعض المعاجم العربية ومنها معجم الرياضيات الصّادر عن مؤسسة الكويت للتّقدّم العلميّ، وكذلك معجم الرياضيات من منشورات دار النّشر أكاديميا في بيروت.

اللّهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً وعملاً متقبلاً إنك أنت السميع العليم

الرياض: يوم الخميس في 1438/08/08 الموافق لـ 2017 /05 /04

المؤلّفون

مقدمة الطبعة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أوصانا الله تعالى بتقواه، وذكرنا سبحانه وتعالى بذلك في محكم تنزيله حيث يقول: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة 281).

لا يخفى على طالب علم أن موضوع تأليف الكتاب يُعدّ من الموضوعات الشائكة، وخاصةً إذا كان يتناول سويةً مُحددةً من طالب العلم، فقد تكون البداية يسيرةً، ولكنَّ الانتهاء منها ليس كذلك. فما إن ينتهي المؤلف من التأليف حتى يخوض في بحرٍ من الملاحظات على مؤلفه قائلاً: لو أنني وضعت هنا كذا ونقلت هذا إلى موضع آخر، ويدور في حلقة مغلقة من التساؤلات والتأملات. هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر، فكلُّ إنسانٍ معرّضٌ للتقصير أو الخطأ، ومن ثمَّ يصعب على المؤلف تقديم عملٍ مكتملٍ من جميع جوانبه. من هنا كان لا بدّ لنا من مراجعة الطبعة الأولى وتصحيح ما قد طبع خطأً أو عبارة سقطت سهواً أو نقص غاب عن الذاكرة في حينها.

لقد قمنا بمراجعة شاملة للطبعة الأولى آخذين بالحسبان ما قدّم لنا من ملاحظات ببناء حول الطبعة الأولى، وقمنا بتصحيح ما وقع عليه نظرنا من أخطاء مطبعية، وتنفيذ بعض التعديلات الطفيفة وإضافة بعض الأمثلة البسيطة التي من شأنها جعل المحتوى أكثر قوةً واتقاناً، وآملين من الله تعالى أن نكون قد وفقنا إلى تقديم هذا الكتاب على النحو الذي يرضيه عنّا.

وفي الختام نودُّ أن نُعرب عن شكرنا للأستاذ فادي حسن على جهده المميّز في إخراج هذا الكتاب، والشكر موصول إلى كلّ مدرّبٍ تقدّم لنا بملاحظةٍ أو نقدٍ ببناءٍ حول الطبعة الأولى للكتاب راجين الله تعالى أن يثيبهم على ذلك خيراً.


اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً وعملاً متقبلاً إنك أنت السميع العليم

الرياض: يوم الخميس في 1439/07/19 الموافق لـ 2018/04/05

المؤلفون

شكر وتقدير

يود المؤلفون تقديم الشكر الجزيل إلى عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور نامي الجهني ووكيله للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالمجيد الجريوي، وإلى الدكتور ناصر التركي رئيس قسم العلوم الأساسيّة في عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود على رعايتهم دعم تأليف هذا الكتاب، كما يشكرون جامعة الملك سعود التي أسهمت في طباعة هذا الكتاب ونشره، وشكرهم موصول إلى منسّق ومصمّم ومنتج رسومات هذا الكتاب الأستاذ فادي حسن.



الفصل التمهيدي

مفاهيم أساسية في الرياضيات Basic Concepts of Mathematics



المقدمة:

نقدّم في هذا الفصل بعض المفاهيم الأساسية في الرياضيات علماً أنّ الطالب الجامعي قد تعرّف على الكثير منها خلال مراحل تعليمه السابقة، ولكن لا بدّ من هذا التقديم لتذكير القارئ ببعض المفاهيم الرياضياتية الأساسية التي سيحتاجها هذا الكتاب المخصّص لتدريس مقرّر مبادئ في الإحصاء والاحتمالات من مقرّرات السنة الأولى المشتركة. إنّ البراهين والإثباتات الخاصة بفقرات هذا الفصل سيتمّ تجاوز معظمها حيث يمكن لمن يودّ الاطلاع عليها الرجوع إلى المراجع ذات الصلة والتي ذكر بعضها في نهاية هذا الكتاب.

■ ت - ١ - المجموعات وخصائصها

■ ت - ٢ - الدوال الحقيقية

ت ١ المجموعات وخصائصها Sets and their Characteristics

إنَّ مفهوم المجموعة يُعدُّ من الأهمية بمكان في مجال الرياضيات عامةً ذلك أنَّه يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد مفهوم الأعداد، وقد أسَّس على يد الرياضي الألماني **كانتور** Georg Cantor (1845-1918)، ولكننا سنقدِّم قسماً يسيراً من نظرية المجموعات مع التركيز على المواضيع التي تهتمنا في إطار هذا الكتاب.

في الحقيقة إنَّ نظرية المجموعات هي أحد فروع علم المنطق الرياضي الذي يهتم بدراسة المجموعات والعمليات الجبرية عليها، فبالرغم من أنَّ أيَّ تجمُّع لأشياء ذات طبيعة ما يمكن تمثيلها في مجموعة، إلاَّ أننا سنقوم بتطبيق نظرية المجموعات في معظم الأحيان على الأشياء التي لها صلة بعلم الرياضيات (وكجزء منها الاحتمالات والإحصاء)، وذلك أنَّه يمكن للغة نظرية المجموعات أن تستخدم في صياغة التعاريف لمفاهيم رياضية. إنَّ مفهوم المجموعة الذي سيقدمه التعريف الآتي يعود إلى كانتور.

ت-١-١-١ تعريف (المجموعة Set)

إنَّ المجموعة هي أيَّ تجمُّع لأشياء (أو كائنات) محدَّدة وتمييزة جيداً (أو مختلفة بعضها عن البعض الآخر) بحسب حدسنا أو تفكيرنا، وصُيِّت في قالب موحد (أو في شكل كلي واحد).

بمعنى آخر. المجموعة هي تجمُّع لأشياء (أو كائنات) محدَّدة وتمييزة بشكل جيد وليست مرتبة بالضرورة، ولكنها تشترك فيما بينها بصفة واحدة على الأقل، ويُعبَّر عنها رياضياً بقوسين كبيرين متقابلين يحتويان بينهما الرموز الممثلة لتلك الأشياء (أو الكائنات) وذلك على الشكل $\{ \bullet, \bullet, \dots, \bullet \}$ ، فعلى سبيل المثال تمثِّل مجموعة الأعداد في النظام العشري كما يلي:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

ويُدعى هذا العرض بـ **التمثيل السردى** للمجموعة، ولكن توجد طرائق أخرى لعرض المجموعات، ومنها **طريقة القاعدة**، وفي هذه الطريقة يُرمز للصفة المميِّزة لعناصر المجموعة بحرفٍ مع التنويه إلى دلالة هذا الحرف ومن ثمَّ يحاط الجميع بقوسين كبيرين، فعلى سبيل المثال لو أخذنا طلاب السنة الأولى المشتركة (في عام معيَّن) فإنهم يكونون مجموعة (ولتكن E مثلاً) حيث يوجد من الجنسين الذكور والإناث، ولكنهم جميعاً تجمع بينهم صفة الدراسة في السنة الأولى المشتركة، وحينئذٍ يمكننا أن نكتب:

$$\{x \mid x \text{ is a student in CFY}\}$$

وهنا نشير إلى أنَّ الرمز (|) داخل قوسي المجموعة يقصد به "علماً أنَّ" أو "حيث أنَّ".

ت-١-٢- ملاحظات

١- لقد درجت العادة على أن يُرمز للمجموعة بأحرف لاتينية كبيرة من قبيل A, B, C ، و...، أو بأحرف إغريقية كبيرة من قبيل Ω, Ξ, Θ ، و... .

٢- إن الأشياء (أو الكائنات) المكوّنة للمجموعة تُدعى **عناصر** ويُرمز لها عادةً بأحرف لاتينية صغيرة من قبيل a و b و c و...، أو بأحرف إغريقية صغيرة من قبيل α و β و γ و... أو برموز أخرى حسب طبيعة العناصر المكوّنة للمجموعة. من جهة أخرى، فإذا كان a عنصراً من مجموعة A فعندئذ يُقال إنَّ العنصر a ينتمي إلى A ويُرمز لذلك بالشكل $a \in A$ ، وأمّا إن كان a ليس عنصراً من المجموعة A فعندئذ يُرمز لذلك بالشكل $a \notin A$.

٣- يُقال عن المجموعة التي لا تملك أيّ عنصرٍ إنَّها مجموعة خالية، ويرمز لها بـ \emptyset ، أيّ أن:

$$\emptyset = \{ \}$$

٤- يُقال عن مجموعتين A و B غير خاليتين إنَّهما **متساويتان** إذا كانتا تملكان العناصر نفسها، ويكتب حينئذٍ $A = B$ ، فعلى سبيل المثال:

أ- نجد أن المجموعتين $A = \{7, 2, 5, 1, 15, 3\}$ و $B = \{1, 2, 3, 5, 7, 15\}$ متساويتان لأنَّهما تملكان العناصر نفسها.

ب- إنَّ المجموعة $A = \{a, b, c, \dots, x, y, z\}$ تساوي المجموعة الآتية لأنَّ لهما العناصر نفسها.

$$B = \{x \mid x \text{ is an English Alphabet}\}$$

٥- يُقال عن مجموعة A إنَّها **مجموعة جزئية** من مجموعة B إذا كانت جميع عناصر المجموعة A تنتمي إلى المجموعة B ويُكتب حينئذٍ $B \supseteq A$ ، وفي حال وجود عنصر واحد على الأقل في B لا ينتمي إلى A فعندئذٍ يُقال إنَّ المجموعة A **محتواه تماماً** في المجموعة B ويُكتب $B \supset A$.

٦- إذا كنّا نتعامل مع مجموعات جزئية من مجموعة ما غير خالية Ω ، فعندئذٍ يُقال عن Ω إنَّها **مجموعة شاملة**.

٧- إنَّ كلَّ مجموعة محتواه في نفسها. أيّ أنَّه من أجل مجموعة A يمكننا أن نكتب $A \supseteq A$.

٨- إذا كانت A و B مجموعتين من مجموعة Ω ، وكان $B \supseteq A$ و $A \supseteq B$ ، فعندئذٍ تكون المجموعتان متساويتين، ويُكتب $A = B$.

٩- نشير هنا إلى أنَّه من أجل مجموعة غير خالية Ω تكون المجموعة الخالية \emptyset محتواه فيها وفي أية مجموعة جزئية منها، بمعنى أنَّه من أجل $\Omega \supseteq A \neq \emptyset$ يكون لدينا $A \supset \emptyset$ أيضاً.

ت-1-3- أمثلة



1- لنقم برمي حجر نرد (سداسي الوجوه) لمرة واحدة فقط، فعندئذ سنحصل على أحد الأعداد الطبيعية Natural Numbers 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، علماً أن مجموعة الأعداد الطبيعية هي 1، 2، 3، ...، ويرمز لها بـ \mathbb{N} . هكذا سيكون لمجموعة القيم الناتجة عن هذه العملية (وتكن A مثلاً) العرض الآتي:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

2- لنقم برمي حجر نرد لمرتين متتاليتين، ولنعيّن المجموعة الناتجة عن فرق القيمة التي ستظهر في المرة الثانية من القيمة التي ظهرت في المرة الأولى.



من هذه العملية نحصل على أحد الأعداد الصحيحة -5 أو -4 أو -3 أو -2 أو -1 أو 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، علماً أن مجموعة الأعداد الصحيحة Integer Numbers هي ... -3 و -2 و -1 و 0 و 1 و 2 و 3 و ...، ويرمز لها بـ \mathbb{Z} ، ومن ثمّ سيكون لمجموعة القيم الناتجة عن هذه العملية (وتكن B مثلاً) العرض الآتي:

$$B = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

3- لنقم برمي حجر نرد لمرتين متتاليتين، ولنعيّن المجموعة الناتجة عن قسمة القيمة التي ظهرت في المرة الأولى على القيمة التي ستظهر في المرة الثانية. عندئذ سنحصل من هذه العملية على مجموعة (وتكن C مثلاً) تحوي الأعداد النسبية Rational Numbers (أو الأعداد العادية أو الأعداد الكسرية) الآتية:

$$\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, \frac{2}{5}, \frac{2}{3}, 2, \frac{3}{5}, \frac{3}{4}, \frac{3}{2}, 3, \frac{4}{5}, \frac{4}{3}, 4, \frac{5}{6}, \frac{5}{4}, \frac{5}{3}, \frac{5}{2}, 5, \frac{6}{5}, 6$$

ومن ثمّ سيكون للمجموعة C العرض الآتي:

$$C = \left\{ \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, \frac{2}{5}, \frac{2}{3}, 2, \frac{3}{5}, \frac{3}{4}, \frac{3}{2}, 3, \frac{4}{5}, \frac{4}{3}, 4, \frac{5}{6}, \frac{5}{4}, \frac{5}{3}, \frac{5}{2}, 5, \frac{6}{5}, 6 \right\}$$

علماً أن مجموعة الأعداد النسبية هي مجموعة كل الأعداد التي تكتب على شكل نسبة لعددين صحيحين أوليين فيما بينهما (مع الأخذ بالحسبان أن المقام لا يساوي الصفر)، ويرمز لهذه المجموعة بـ \mathbb{Q} ، أي أن:

$$\mathbb{Q} := \left\{ x \mid x = \frac{a}{b} ; a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \text{ and } a, b \text{ are coprime} \right\}$$

4- إن مجموعة الأعداد غير النسبية Irrational Numbers (الأعداد التي لا يمكن كتابتها على شكل نسبة لعددين صحيحين - مع الأخذ بالحسبان أن المقام لا يساوي الصفر- ويرمز لهذه المجموعة بـ \mathbb{I}) يمكن عرضها على النحو الآتي:

$$\mathbb{I} = \{x \mid x \text{ is irrational number}\}$$

نشير هنا إلى أن مجموعة الأعداد النسبية وغير النسبية تشكلان مع بعضهما البعض ما يُعرف باسم "مجموعة الأعداد الحقيقية" Real Numbers ويرمز لها بـ \mathbb{R} .



٥- لنقم بقذف قطعة نقود معدنية لمرة واحدة فقط، فعندئذ يكون لمجموعة الرموز (ولتكن D مثلاً) التي تنتج عن هذه العملية هي:
 $D = \{H, T\}$

علماء أن الحرفين H و T يشيران إلى كلمة Head و Tail على الترتيب. إن سبب استخدام Head تعود إلى القطع النقدية المعدنية التي استُخدمت في دراسة هذا النوع من التجارب قديماً حيث كان ينقش على أحد وجهيها صورة رأس أو جذع مع الرأس لشخصية شهيرة (وفي بعض العملات المحلية يقابلها "الكتابة")، وأما على الوجه الآخر فكان ينقش عليه شعار البلد Tail ويمثلها "الشعار" في العملة المحلية أيضاً.

٦- لنقم بقذف قطعة نقود معدنية لمرة متتاليتين، فعندئذ تكون كل نتيجة من نتائج هذه التجربة هي ثنائية مرتبة فيها المركبة الأولى والثانية صورة أو شعار، ومن ثم يكون لمجموعة نتائج هذه التجربة (ولتكن D مثلاً) العرض $D = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$ ، ونكتبها عادة (على سبيل الاختصار، وما لم يؤدي ذلك إلى التباس في فهم المحتوى) بالشكل الآتي:

$$D = \{HH, HT, TH, TT\}$$

٧- لو قمنا بتحليل ضوء الشمس باستخدام منشور، فعندئذ يكون لمجموعة الألوان المرئية (ولتكن E مثلاً) التي تنتج عن هذه العملية العرض الآتي:

$$E = \{\text{Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple}\}$$

٨- إن المدرسين في المملكة العربية السعودية يكونون مجموعة (ولتكن F مثلاً)، حيث يقومون بتدريس أنواع مختلفة من المقررات (الرياضيات، الفيزياء، اللغة العربية، اللغة الأجنبية، ...) كل حسب اختصاصه، ولكنهم جميعاً يتصفون بصفة المدرس، ولذلك يمكننا تمثيلهم في مجموعة على النحو الآتي:

$$F = \{x \mid x \text{ is a teacher in KSA}\}$$

٩- بالعودة إلى المثال السابق (١) (رمي حجر نرد سداسي الوجوه مرة واحدة فقط) سنقوم بتعيين المجموعات التي تعبر عن حصولنا على:

- أ- عدد أكبر من 2.
- ب- عدد أكبر أو يساوي 3 وأصغر من 6.
- ج- العدد 3.
- د- عدد أصغر من 1.
- هـ- عدد أكبر أو يساوي 1.

من أجل ذلك لدينا من المثال السابق (1) مجموعة نتائج رمي حجر النرد هي $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، ومن ثم من أجل الطلب:

أ- سنرمز بـ B للمجموعة التي تُعبر عن حصولنا على عدد أكبر من 2، فتكون $B = \{3, 4, 5, 6\}$. فنلاحظ أن $A \supset B$ (لاحظ أن العكس غير صحيح، وذلك لأن علاقة الاحتواء \supseteq أو \supset ليست انعكاسية).

ب- سنرمز بـ C للمجموعة التي تُعبر عن حصولنا على عدد أكبر أو يساوي 3 وأصغر من 6، فيكون لدينا $C = \{3, 4, 5\}$ ، فنلاحظ أن $B \supset C$ ، ومن ثم $A \supset C$ (وذلك لأن علاقة الاحتواء \supseteq أو \supset متعدية).

ج- سنرمز بـ D للمجموعة التي تُعبر عن حصولنا على العدد 3، فيكون لدينا $D = \{3\}$ ، وهنا نلاحظ أن $C \supset D$.

د- سنرمز بـ E للمجموعة التي تُعبر عن حصولنا على عدد أصغر من 1، فيكون لدينا: $E = \{ \} = \emptyset$

هـ- لنرمز بـ F للمجموعة التي تُعبر عن حصولنا على عدد أكبر أو يساوي 1، فيكون لدينا: $F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = A$



ت-1-4- ملاحظات

1- لاحظ هنا أن المجموعة A أخذت دور المجموعة الشاملة Ω .

2- نلاحظ من الأمثلة السابقة أنه أمكننا عرض بعض المجموعات من خلال ذكر جميع عناصرها كما في الأمثلة السابقة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وبعضها الآخر عرض من خلال كتابة القاعدة التي تستتبط منها العناصر كما في الأمثلة السابقة 4، 7، 8.

ت-1-5- العمليات المنطقية على المجموعات


بادئ ذي بدئ نشير إلى بعض الرموز التي يمكن أن تستخدم لدى صياغة المجموعات أو في العلاقات الرياضية ومنها مُحددات الكمية المنطقية وهي:

\forall بمعنى "من أجل كل" أو "من أجل أي"، ويدعى مُحدد الكمية الكلي (أو الشامل)، فعلى سبيل المثال العرض $\forall x \in A$ يُقرأ على النحو الآتي: من أجل أي (أو كل) عنصر x من A .

\exists بمعنى "يوجد على الأقل"، ويدعى مُحدد الكمية الوجودي، فعلى سبيل المثال $\exists x \in A$ ؛ ... تُقرأ بالعبارة: يوجد على الأقل عنصر x من A بحيث يكون ...

من المعلوم أنه في علم المنطق يمكن تشكيل أي قضية من القضايا الأولية باستخدام العمليات المنطقية (و- أو- كلا)، وهذه العمليات الثلاث يقابلها في علم المجموعات العمليات الثلاث الآتية على الترتيب:

١- التقاطع Intersection:




الشكل [0-1]

يُعرف **تقاطع** مجموعتين A و B على أنه مجموعة العناصر التي تنتمي إلى كل من A و B بأن واحد، ويستخدم الرمز \cap بين المجموعات للدلالة على التقاطع بينها (أنظر الشكل [0-1])، ومن ثمَّ يُرمز للمجموعة الممثلة لتقاطع A و B بالرمز $A \cap B$ ، أي أنه لدينا:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ and } x \in B\} \quad [0-1]$$

٢- الاتحاد Union:




الشكل [0-2]

يُعرف **اتحاد** مجموعتين A و B على أنه مجموعة كل العناصر التي تنتمي إلى A أو إلى B أو إلى كليهما معاً، علماً أن "أو" هنا لا تقيد الحصر (أنظر الشكل [0-2])، ويستخدم الرمز \cup بين المجموعات للدلالة على الاتحاد بينها، ومن ثمَّ يُرمز للمجموعة الممثلة لاجتماع A و B بالرمز $A \cup B$ ، أي أنه لدينا:

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\} \quad [0-2]$$

٣- الفرق Difference:



الشكل [0-3]

يُعرف **الفرق** بين مجموعتين A و B على أنه مجموعة العناصر التي تنتمي إلى A ولكن دون B (أنظر الشكل [0-3])، ويستخدم الرمز \setminus بين المجموعات للدلالة على الفرق بينها، ومن ثمَّ يُرمز للمجموعة الممثلة لفرق A و B بالرمز $A \setminus B$ ، أي أنه لدينا:


$$A \setminus B := \{x \mid x \in A, x \notin B\} \quad [0-3]$$

نشير هنا إلى أن كتابة $A - B$ بدلاً من $A \setminus B$ تُعدّ من الكتابات الغامضة وغير المرغوب فيها، وذلك لأن $A - B$ تستخدم عادة للتعبير عن المجموعة الآتية:

$$A - B = \{a - b \mid \forall a \in A, b \in B\}$$

في الحقيقة إنَّ العمليات المنطقية على المجموعات (التقاطع - الاتحاد-الفرق)، وبعض الخصائص الأساسية لهذه العمليات (مثل الخاصة التبادلية، والتجميعية، والتوزيعية) وبعض العلاقات الشهيرة المتعلقة بهذه المواضيع تُعدّ الحجر الأساس لفهم علم المجموعات، ولذلك سنقدمها بعد قليل بشكل موجز ودون الخوض في تفاصيلها.

من المفاهيم المهمة الناتجة عن عملية الفرق ما يُعرف باسم "متممة مجموعة"، فلو كانت Ω مجموعة شاملة، وأخذنا $\Omega \supseteq A$ (من الممكن أن تكون $A = \emptyset$)، فنحن نطلق على مجموعة كل العناصر من Ω والتي لا تنتمي إلى المجموعة A اسم "متممة المجموعة A " (أو المتمم المطلق للمجموعة A أيضاً).



الشكل [0-4]

ويُرمز عادة لمتَمَّ المجموعة A بالشكل \bar{A} . أي أنه لدينا:

$$\bar{A} := \Omega \setminus A \quad [0-4]$$

ت-1-6- بعض خصائص العمليات الجبرية على المجموعات

لتكن Ω مجموعة شاملة، ولناخذ A, B, C مجموعات جزئية من Ω ، فعندئذ يمكن للقارئ التحقق من صحة العلاقات الآتية:

1- الخاصة التبادلية (أو التناظرية) Commutative Property:

إنَّ كلَّ من الاتحاد والتقاطع يتمتَّ بالخاصة التبادلية التي يعبر عنها بالعلاقين الآتيتين:

$$\text{a) } A \cup B = B \cup A \quad \text{b) } A \cap B = B \cap A$$

2- الخاصة التجميعية Associative Property:

إنَّ كلَّ من الاتحاد والتقاطع يتمتَّ بالخاصة التجميعية التي يعبر عنها بالعلاقين الآتيتين:

$$\text{a) } (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{b) } (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

3- الخاصة التوزيعية Distributive Property:

إنَّ كلَّ من الاتحاد والتقاطع يقبل التوزيع على الآخر ويعبر عن ذلك بالعلاقين الآتيتين:

$$\text{a) } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{b) } A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

4- قانونا ديمورغان De Morgan's laws:

لدينا العلاقين الآتيتين محققتين دائماً، وتدعيان قانوني ديمورغان (نسبة للرياضياتي الفرنسي أوغستس

ديمورغان (Augustus De Morgan (1806-1871):

$$\text{a) } \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \text{b) } \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

ت-1-7- ملاحظات

1- يمكن الرجوع إلى الأصل باستخدام متَمَّ المتَمَّ، حيث لدينا العلاقة الآتية مُحَقَّقةً دوماً:

$$\overline{\bar{A}} = A$$

2- لدينا العلاقين الآتيتين محققتين دوماً:

$$\text{a) } A \setminus B = A \cap \bar{B} \quad \text{b) } A \setminus \bar{B} = A \cap B$$

ت-1-8- أمثلة

1- لتكن لدينا المجموعة الشاملة الآتية:

$$\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

ولناخذ منها المجموعات الجزئية الآتية:

$$A = \{d, e, f, g\} \quad \& \quad B = \{c, d, e, f\}$$

$$C = \{a, b, e, f, g\} \quad \& \quad D = \{a\}$$

والمطلوب تعيين المجموعات الآتية:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } A \cap B & \& \text{b) } \overline{B \cap D} & \& \text{c) } C \setminus B \\ \text{d) } B \cup C & \& \text{e) } \overline{A \cup B} & \& \text{f) } \bar{B} \end{array}$$

الإجابة: لدينا من أجل الفقرة:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A \cap B = \{d, e, f\} & \text{b) } \overline{B \cap D} = \overline{\{\}} = \bar{\emptyset} = \Omega \\ \text{c) } C \setminus B = \{a, b, g\} & \text{d) } B \cup C = \{a, b, c, d, e, f, g\} = \Omega \\ \text{e) } \overline{A \cup B} = \overline{\{c, d, e, f, g\}} = \{a, b\} & \text{f) } \bar{B} = \Omega \setminus B = \{a, b, g\} \end{array}$$

٢- لنقم برمي حجر نرد سداسي الوجوه لمرة واحدة فقط، فتكون لدينا مجموعة النتائج الآتية:
 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

والمطلوب تعيين المجموعات التي تُعبّر عن حصولنا على:

- أ- عدد أصغر من 3. ب- عدد أكبر أو يساوي 1.
 ج- عدد فردي. د- عدد أصغر من 1.

الإجابة: من أجل الطلب:

أ- لرمز بـ A للمجموعة التي تُعبّر عن حصولنا على عدد أصغر من 3، فتكون $A = \{1, 2\}$.

ب- لرمز بـ B للمجموعة التي تُعبّر عن حصولنا على عدد أكبر أو يساوي 1، فيكون لدينا:
 $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$

ج- لرمز بـ C للمجموعة التي تُعبّر عن حصولنا على عدد فردي، فيكون لدينا:
 $C = \{1, 3, 5\}$

د- لرمز بـ D للمجموعة التي تُعبّر عن حصولنا على عدد أصغر من 1، فيكون لدينا $D = \emptyset$.
 لاحظ هنا أن المجموعة Ω أخذت دور المجموعة الشاملة.

٣- لنقم برمي حجر نرد سداسي الوجوه لمرتين متتاليتين فتكون لدينا مجموعة النتائج الآتية:

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), \\ (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \end{array} \right\}$$

والمطلوب تعيين المجموعات التي تُعبّر عن حصولنا على:

- أ- مجموع أصغر أو يساوي 4.
 ب- الفرق بين المركبة الأولى والثانية (المركبة الأولى ناقص المركبة الثانية) أكبر من 3.

ج- عدد فردي في المرة الأولى، وعدد أصغر أو يساوي 3 في المرة الثانية.

د- عدد في المرة الأولى أكبر من العدد الذي حصلنا عليه في المرة الثانية.

الإجابة: من أجل الطلب:

أ- لنرمز بـ A للمجموعة التي تُعبّر عن حصولنا على مجموع أصغر أو يساوي 4، فيكون لدينا:

$$A = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1)\}$$

ب- لنرمز بـ B للمجموعة التي تُعبّر عن حصولنا على فرق بين المركبة الأولى والثانية أكبر من 3 (أي

أكبر تماماً من 3)، فيكون لدينا:

$$B = \{(5,1), (6,1), (6,2)\}$$

ج- لنرمز بـ C للمجموعة التي تُعبّر عن حصولنا على عدد فردي في المرة الأولى، وعلى عدد أصغر أو

يساوي 3 في المرة الثانية، فيكون لدينا:

$$C = \{(1,1), (1,2), (1,3), (3,1), (3,2), (3,3), (5,1), (5,2), (5,3)\}$$

د- لنرمز بـ D للمجموعة التي تُعبّر عن حصولنا على عدد في المرة الأولى أكبر من العدد الذي حصلنا

عليه في المرة الثانية، فيكون لدينا:

$$D = \left\{ \begin{array}{l} (2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3), (5,1), (5,2), \\ (5,3), (5,4), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5) \end{array} \right\}$$

إذن، فالمجموعة Ω هنا لعبت دور المجموعة الشاملة.

ت-٩-١- تعريف (قدرة مجموعة (Cardinality of a set

لتكن A مجموعة ما. عندئذ تُعرّف **قدرة** هذه المجموعة بأنه العدد الذي يمثل عدد عناصرها، ويرمز له بـ $|A|$.

فعلى سبيل المثال يكون للمجموعة $A = \{3, -1, 7, 15, 4, -13, 2, 0, -5\}$ قدرة تساوي 9،


وللمجموعة $A = \{a, b, c, d\}$ قدرة تساوي 4.

من المعلوم أن مجموعة ما A قد تكون منتهية (أي تحوي عدداً منتهياً من العناصر) أو غير منتهية، فإذا

كان لدينا على سبيل المثال $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مع n عدد طبيعي مُعيّن، فإنه سيكون لدينا $|A| = n$

، وأما إذا كانت A غير منتهية فعندئذ سنميز بين الحالتين الآتيتين:

١- إذا كانت المجموعة A غير منتهية ولكن يمكن ترقيم عناصرها بواسطة الأعداد الطبيعية، فعندئذ يُقال إن هذه المجموعة **قابلة للعد**، ويكتب $|A| = +\infty$. لاحظ هنا أن مجموعة الأعداد الطبيعية \mathbb{N} هي المعيار لقابلية العد، فعلى سبيل المثال يمكننا ترقيم عناصر مجموعة الأعداد الصحيحة بواسطة الأعداد الطبيعية وفقاً لاتجاه الأسهم في العرض الآتي:




الشكل [0-5]

وهذا يعني أن مجموعة الأعداد الصحيحة قابلة للعد، وكذلك يمكن إثبات أن مجموعة الأعداد النسبية قابلة للعد أيضاً.

٢- إذا كانت المجموعة A غير منتهية ولا يمكن ترقيم عناصرها بواسطة الأعداد الطبيعية، فعندئذ يُقال إن هذه المجموعة **غير قابلة للعد**، ويكتب $|A| = +\infty$ أيضاً، ولكن يُقال في هذه الحالة إن للمجموعة A **قدرة المستمر**.

بالطبع توجد مجموعة تعد المعيار لعدم قابلية العد ألا وهي مجموعة الأعداد الحقيقية، ولكن التقنية لاستخدام هذا المعيار لا يمكن إدراجه في هذا الموضوع. بمعنى آخر إن مجموعة الأعداد الحقيقية هي مجموعة غير قابلة للعد، علماً أن مجموعة الأعداد الحقيقية هي اتحاد مجموعة الأعداد النسبية \mathbb{Q} مع مجموعة الأعداد غير النسبية I ويرمز لها بـ \mathbb{R} ، أي أن $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup I$. كما يمكن إثبات أن كل فترة I من \mathbb{R} ذات طول موجب تماماً هي مجموعة غير قابلة للعد أيضاً.

في الواقع يمكن البرهنة على أنه من أجل أي عددين حقيقيين a و b مع $b > a$ يوجد عدد حقيقي c بحيث يكون $b > c > a$ ، وهذا يعني أن مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} **مستمرة (أو متصلة)** ولذلك سميت قدرتها بـ **قدرة المستمر**، وهذه النتيجة هي المبرر الحقيقي من أجل التمثيل الهندسي لمجموعة الأعداد الحقيقية بالمحور OX حيث تمثل مجموعة الأعداد الحقيقية تصويرياً من خلال خط مستقيم موجه OX (أي على شكل سهم) يكون فيه الرأس دالاً على تزايد القيم المتوضعة عليه، ويؤخذ (غالباً) أفقياً على الشكل الآتي.



الشكل [0-6]

من جهةٍ أخرى يمكن إثبات أن كلَّ عدد حقيقي يمكن تخصيصه بنقطةٍ وحيدة على المحور الحقيقي \mathbb{R} (حيث حرف الـ O هنا يعني نقطة الأصل وموضعها ينطبق على الصفر)، وبالعكس فإذا كان a هو العدد الموافق لنقطة M فإنَّ a تُدعى إحداثي النقطة M ، ويُشار عادةً إلى ترابطهما بالرمز $M(a)$ ، فعلى سبيل المثال يُشار إلى النقطة M التي إحداثيها العدد 3 بالرمز $M(3)$ ، ولهذا فإنَّنا كثيراً ما نتكلم عن الأعداد بلفظ النقاط، فنتكلم عن النقطة 5 بمعنى النقطة التي إحداثيها العدد 5. في هذه الحالة يُدعى الخط المستقيم \mathbb{R} بـ خط الإحداثيات أو المحور الحقيقي أو المستقيم الحقيقي.

ت-١-١-١٠- ملاحظات

- ١- إذا حُذفت مجموعة منتهية من مجموعة قابلة للعدِّ فإنَّ الباقي هي مجموعة قابلة للعدِّ أيضاً.
- ٢- إذا حُذفت مجموعة منتهية من مجموعة غير قابلة للعدِّ فإنَّ الباقي هي مجموعة غير قابلة للعدِّ أيضاً.
- ٣- إذا حُذفت مجموعة قابلة للعدِّ من مجموعة قابلة للعدِّ أيضاً، فإنَّ الباقي قد يكون مجموعة منتهية أو مجموعة قابلة للعدِّ أيضاً.
- ٤- إذا حُذفت مجموعة قابلة للعدِّ من مجموعة غير قابلة للعدِّ فإنَّ الباقي هي مجموعة غير قابلة للعدِّ أيضاً.
- ٥- إنَّ عمليتي الجمع (+) والضرب (·) بعددٍ مُغاير للصفر معرفتين جيداً على مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} ، ويرمز لمجموع أعداد حقيقية x_1, x_2, \dots, x_n بالرمز $\sum_{i=1}^n x_i$ ، في حين يُرمز لضرب الأعداد

$$\cdot \prod_{i=1}^n x_i \text{ بالرمز } x_1, x_2, \dots, x_n$$

ت ٢ الدوال الحقيقية

Real Functions


من المفاهيم المهمة جداً في دراسة الرياضيات ما يُعرف باسم "الدالة"، حيث يأتي هذا المفهوم في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد مفهومي العدد والمجموعة. إنَّ التقديم الآتي يمهد لنا الطريق للتعرف على هذا المفهوم.

لنأخذ A و B مجموعتين غير خاليتين، ولتكن f علاقة تُقرن كلَّ عنصر a من A بعنصر b من B يُدعى قيمة (أو صورة) a وفقاً لـ f ، ويرمز لذلك بالشكل $a f b$ أو بأحد العرضين الآتيين أيضاً:

$$f : A \longrightarrow B ; a \mapsto b = f(a) \quad \text{أو} \quad A \xrightarrow{a \mapsto b = f(a)} B$$

الآن، إذا كان كل عنصر من A يرتبط بعنصر وحيد من B ، فعندئذٍ يُطلق على هذه العلاقة اسم "دالة" من المجموعة A في المجموعة B (انظر الشكل الآتي [0-7])، وفي هذه الحالة تُدعى المجموعة A مجال الدالة f ، في حين يُطلق على المجموعة B اسم "المجال المقابل" للدالة f ، وإذا وضعنا:

$$f(A) := \{ b \in B \mid b = f(a); \forall a \in A \} \subseteq B \quad [0-5]$$




فعندئذٍ يُطلق على المجموعة $f(A)$ اسم "مدى" (أو "صورة") الدالة f ويرمز لها بـ $R(f)$ (انظر الشكل [0-7])، أي أن:

$$R(f) := f(A)$$


ت-٢-١- ملاحظات

١- في الحالة الخاصة إذا كانت $f(A) = B$ فعندئذٍ يُقال إنَّ دالة f من المجموعة A على المجموعة B (انظر الشكل [0-8])، وفي هذه الحالة يكون المدى $R(f)$ يساوي المجال المقابل بأكمله.




٢- إنَّ مجموعة كلِّ النقاط $(a, f(a))$ وعندما a تسمح كلِّ القيم الممكنة لها في A تُدعى التمثيل البياني للدالة f ، فعلى سبيل المثال نجد أن الشكليين [0-9-a] و [0-9-b] يقدمان تمثيلان بيانيان لعلاقتين داليتين، وأمَّا الشكل [0-9-c] فإنه يقدم تمثيلاً بيانياً لعلاقة غير دالية.


الشكل [0-8] f تطبيق من A على B



الشكل [0-9-a]



الشكل [0-9-b]



الشكل [0-9-c]


٣- في معظم الحالات تُستخدم الأحرف اللاتينية كرموز للدوال فيكتب على سبيل المثال: f, g, h, \dots أو F, G, H, \dots ، وكذلك يُرمز لعناصر مجال الدالة لهذه الدوال بأحرف لاتينية صغيرة من قبيل x, y, z, \dots وتُدعى **متغيرات مستقلة**، وأمّا القيمة من B والموافقة لـ $f(x)$ فإنّها تُسمّى **قيمة الدالة** f عند القيمة (أو النقطة) x ، ومن المهم جداً هنا التمييز بين الدالة f التي تمثل علاقة وقيمتها $f(x)$ التي تمثل عدداً.

٤- إذا كانت f دالة معرفة على مجموعة $R \supseteq A$ وتأخذ قيمها في مجموعة $R \supseteq B$ ، فعندئذ يُقال عن الدالة f إنها:


متباينة Injctive (انظر الشكل [0-10-a]) إذا كانت هذه الدالة مُحَقَّقةً للقضية الآتية:
 $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b ; \forall a, b \in A$

غامرة Surjective (انظر الشكل [0-10-b]) إذا كانت هذه الدالة مُحَقَّقةً للقضية الآتية:
 $\forall b \in B \exists a \in A \mid b = f(a)$


تقابل Bijective (انظر الشكل [0-10-c]) إذا وفقط إذا كانت هذه الدالة متباينة وغامرة معاً.



الشكل [0-10-a]



الشكل [0-10-b]




الشكل [0-10-c]

٥- إذا كانت f دالة معرفة على مجموعة $R \supseteq A$ وتأخذ قيمها في مجموعة $R \supseteq B$ (أي أن f دالة حقيقية معرفة على A)، فعندئذ تُعرّف الصورة العكسية لمجموعة $B \supseteq C$ وفقاً للدالة f على أنّها مجموعة كل العناصر a من A التي من أجلها تكون $f(a) \in C$ ، ويرمز لها عادة بـ $f^{-1}(C)$ ، أيّ أنّه لدينا:

$$f^{-1}(C) := \{a \in A \mid f(a) \in C\} \quad [0-6]$$

وهي مجموعة جزئية من A ، فعلى سبيل المثال لو أخذنا الدالة f المقدمة في الشكل [0-11].



الشكل [0-11]

فعدنئذ نجد أن مدى هذه الدالة هو $R(f) = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ ، ولدينا:

$$\begin{aligned} f^{-1}(\{b_1\}) &= \{a_1\} & \& & f^{-1}(\{b_2\}) &= \{a_2\} \\ f^{-1}(\{b_3\}) &= \{a_3\} & \& & f^{-1}(\{b_4\}) &= \{a_4, a_5\} \\ f^{-1}(C) &= \{a_2, a_3, a_4, a_5\} \end{aligned}$$

لاحظ أن الصورة العكسية لمدى أية دالة هي مجال الدالة كاملاً حيث لدينا من أجل المثال الأخير ما يلي:

$$f^{-1}(f(A)) = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} = A$$

ت-٢-٢- تعريف (الدالة الخطية Linear Function)

لتكن $\mathbb{R} \supseteq A$ ، ولنأخذ دالة حقيقية معرفة على A بحيث تُقرن كل عنصر x من A بعدد حقيقي y مُعطى من خلال العلاقة الآتية:

$$y = f(x) := a + bx \quad [0-7]$$

علماً أن a و b ثابتان حقيقيان. عدنئذ يُقال عن هذه الدالة إنها دالة خطية على المجموعة A .

ت-٣-٢- ملاحظات


١- إن التمثيل البياني للدالة الخطية هو مستقيم، ويُقال حينئذٍ عن b إنه ميل المستقيم (ويساوي ظل الزاوية التي يصنعها المستقيم مع محور الإحداثيات Ox)، في حين تمثل النقطة a تقاطع هذا المستقيم مع محور القيم Oy .

أمّا لرسم هذا المستقيم فإنه يكفي تعيين نقطتين منه ويتم ذلك من خلال التعويض في المعادلة [0-7] عن x بـ 0 فنحصل على النقطة $(0, a)$ ، ومن أجل النقطة الأخرى نعوض في المعادلة [0-7]

عن y بـ 0 فنحصل على النقطة $(-\frac{a}{b}, 0)$ ، وبعد ذلك نرسم المستقيم المار بهاتين النقطتين

فنحصل على التمثيل البياني لمعادلة المستقيم المعطية بالعلاقة [0-7].

فعلى سبيل المثال من أجل $f(x) = 2 + x$ يكون لدينا الشكل الآتي للمستقيم الممثل للمعادلة المعطاة:




الشكل [0-12]

٢- في الحالة الخاصة عندما تكون قيمة الثابت $a = 0$ فإنه يصبح للعلاقة [0-7] العرض الآتي:
 $y = f(x) = bx$


وفي هذه الحالة يمرّ المستقيم الممثل لهذه المعادلة من نقطة الأصل (أو من مبدأ الإحداثيات) O .
 فعلى سبيل المثال لو أخذنا f دالة حقيقية معرفة على \mathbb{R} من خلال العلاقة الآتية:
 $y = f(x) = x$

فعدنئذ نجد أنّ ميل المستقيم الممثل لهذه المعادلة يساوي $b = 1$ ، وأما تقاطعه مع محور القيم OY فإنه يساوي $a = 0$ ، ومن ثمّ يكون للمستقيم الممثل لهذه المعادلة الشكل [0-13] الآتي:



الشكل [0-13]

٣- إذا كان $b = 0$ فإنه يصبح للعلاقة [0-7] الصيغة $y = f(x) = a$ ، وفي هذه الحالة يصبح المستقيم الممثل لهذه المعادلة موازياً للمحور الإحداثي OX وماراً بالنقطة a على محور القيم OY ، وحينئذٍ يطلق على هذه الدالة اسم "الدالة الثابتة"، فعلى سبيل المثال لو أخذنا f دالة حقيقية معرفة على \mathbb{R}



الشكل [0-14]


من خلال العلاقة $f(x) = 3$ ، فعندئذٍ نجد أنّ ميل المستقيم الممثل لهذه المعادلة يساوي $b = 0$ ، وأما تقاطعه مع محور القيم OY فإنه يساوي $a = 3$ ، ومن ثمّ يكون للمستقيم الممثل لهذه المعادلة الشكل [0-14] الآتي:

ت-٢-٤- أمثلة

١- لتكن f دالة حقيقية معرفة على \mathbb{R} من خلال العلاقة الآتية:

$$y = f(x) = 2 + x$$

فعندئذ نجد أن ميل المستقيم الممثل لهذه المعادلة يساوي $b = 1$ ، وأما تقاطعه مع محور القيم oY فإنه يساوي $a = 2$ ، ومن ثم يكون للمستقيم الممثل لهذه المعادلة الشكل [0-15] الآتي:




الشكل [0-15]

٢- لتكن f دالة حقيقية معرفة على \mathbb{R} من خلال العلاقة الآتية:

$$y = f(x) = 4 - 2x$$

فعندئذ نجد أن ميل المستقيم الممثل لهذه المعادلة سالب ويساوي $b = -2$ ، وأما تقاطعه مع محور القيم oY فإنه يساوي $a = 4$ ، ومن ثم يكون للمستقيم الممثل لهذه المعادلة الشكل [0-16] الآتي:



الشكل [0-16]


من المثالين السابقين يُلاحظ أنه عندما تكون قيمة الميل موجبة في المعادلة الخطية فإنه سيكون للمستقيم الممثل للمعادلة الخطية اتجاه صاعد لدى تزايد قيم x . وعلى العكس، فإذا كانت قيمة الميل سالبة في المعادلة الخطية فإنه سيكون للمستقيم الممثل للمعادلة الخطية اتجاه هابط لدى تزايد قيم x .

ت-٤-٥- تعريف (دالة القيمة المطلقة Absolute Value Function)

لتكن $\mathbb{R} \supseteq A$ ، ولنأخذ f دالة حقيقية تُقرن كل عدد حقيقي x من A بعدد حقيقي غير سالب يُرمز له بـ $|x|$ ، ومُعرّف على النحو الآتي:

$$f: A \longrightarrow \mathbb{R} ; x \mapsto f(x) = |x| := \begin{cases} +x & \text{for } x \geq 0 \\ -x & \text{for } x < 0 \end{cases} \quad [0-8]$$

إنَّ هذه الدالة تُدعى **دالة القيمة المطلقة**، والعرض البياني لهذه الدالة يقدمه الشكل الآتي:



الشكل [0-17]

ت-٢-٦- ملاحظات

١- ليكن x و y عددين حقيقيين، فعندئذ يمكن للقارئ التحقق من صحة العلاقات الآتية:

- a) $|x| \geq 0$ & $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ b) $|x| = |-x|$
 c) $|x + y| \leq |x| + |y|$ d) $|x - y| \geq |x| - |y|$
 e) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

٢- ليكن x عدداً حقيقياً ما، و c ثابت حقيقي موجب، فعندئذ يمكن للقارئ التحقق من صحة العلاقات الآتية:

- a) $|x| \leq c \Leftrightarrow -c \leq x \leq c$ b) $|x| < c \Leftrightarrow -c < x < c$
 c) $|x| \geq c \Leftrightarrow x \leq -c \text{ or } x \geq c$ d) $|x| > c \Leftrightarrow x < -c \text{ or } x > c$

ت-٢-٧- أمثلة

بناءً على ما سبق لدينا ما يلي محققاً:

- a) $|7| = 7$ & $|-5| = 5$
 b) $\left. \begin{array}{l} |3 + 5| = |8| = 8 \\ |3| + |5| = 3 + 5 = 8 \end{array} \right\} \Rightarrow |3 + 5| = |3| + |5|$
 c) $\left. \begin{array}{l} |3 + (-5)| = |3 - 5| = |-2| = 2 \\ |3| + |-5| = 3 + 5 = 8 \end{array} \right\} \Rightarrow |3 + (-5)| < |3| + |-5|$
 d) $\left. \begin{array}{l} |7 - 3| = |4| = 4 \\ |7| - |3| = 7 - 3 \end{array} \right\} \Rightarrow |7 - 3| = |7| - |3|$
 e) $\left. \begin{array}{l} |3 - 7| = |-4| = 4 \\ |3| - |7| = 3 - 7 = -4 \end{array} \right\} \Rightarrow |3 - 7| > |3| - |7|$

$$f) \left. \begin{array}{l} |3 \times 7| = |21| = 21 \\ |3| \cdot |7| = 3 \times 7 = 21 \end{array} \right\} \Rightarrow |3 \times 7| = |3| \cdot |7|$$


$$g) \left. \begin{array}{l} |3 \times (-7)| = |-21| = 21 \\ |3| \cdot |-7| = 3 \times 7 = 21 \end{array} \right\} \Rightarrow |3 \times (-7)| = |3| \cdot |-7|$$




تمارين

٥- لتكن لدينا العروض البيانية الآتية لدوال حقيقية:


a)




b)



c)




d)



والمطلوب ما يلي:

- عين المجال والمدى لكل منها.
- وضّح أي من الدوال المعطاة لا يمثل دالة خطية.
- بين أي من الدوال المعطاة تتمتع بخاصية التقابل، التباين أو الغمور.



الفصل الأول

جمع البيانات الإحصائية وتنظيمها Collecting Statistical Data and their Organizing



المقدمة:

ينظر إلى علم الإحصاء على أنه أحد أهم فروع العلوم الرياضياتية خلال الخمسين سنة الأخيرة، وذلك لأنه يلعب دوراً مهماً في شتى مجالات الحياة بحيث يكاد لا يخلو أي مجال من مجالات المعرفة من استخدامه. إن الخدمات الكبيرة لعلم العشوائيات دفع علماء الرياضيات قُدماً في تسخير كل قدراتهم لتطوير هذا العلم حتى يلبي متطلبات التطور التقني المعاصر، ولذا نجد أن الأستاذ الدكتور إيفو شنايدر Ivo Schneider (أستاذ في تاريخ العلوم الطبيعية) يذكر في هذا الصدد (في كتابه تاريخ الاحتمالات منذ البدايات وحتى عام 1933)، أنه ما من فرع من فروع الرياضيات تطوّر خلال العقود الأخيرة مثل التطور الذي حظي به فرع العشوائيات (الاحتمالات والإحصاء الرياضي). في الواقع إن علم العشوائيات أوسع بكثير من أن يُلمّ به في كتاب أو مجلد أو حتى عدّة مجلدات، وذلك لكثرة اختصاصاته الفرعية وموضوعاته المتنوّعة.

- ١ - ١ - تعاريف ومفاهيم أساسية
- ١ - ٢ - تنظيم البيانات الخام وتمثيلها
- ١ - ٣ - التوزيعات التكرارية
- ١ - ٤ - التمثيلات البيانية لجدول التوزيعات التكرارية
- ١ - ٥ - أشكال التوزيعات التكرارية

١ - ١

تعريف ومفاهيم أساسية

Basic Definitions and Concepts

من المعتاد في دراسة أي علم من العلوم التّطرق أولاً إلى تعريف هذا العلم، وذلك لأنّ أي علم من العلوم يبدأ بتعريفه الذي يعدّ بمثابة حجر الأساس لذلك العلم. لذلك لا بدّ لنا أولاً أن نتعرف على ما تعنيه عبارة "علم الإحصاء". في الحقيقة يمكن تعريف علم الإحصاء على النحو الآتي.

١-١-١-١ تعريف (علم الإحصاء Statistics)

إنّ علم الإحصاء هو ذلك الفرع من الرياضيات الذي يهتمّ بجمع البيانات، وتنظيمها (في جداول وعروض بيانية مناسبة)، ودراسة خصائصها، وتحليلها، واستقرائها، وأخيراً اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما هو واضح من تعريف علم الإحصاء فإنّه يمكن تجزئة هذا العلم إلى قسمين رئيسيين. الأول منهما يهتمّ بجمع البيانات وتنظيمها ودراسة خصائصها العددية (ويُدعى الإحصاء الوصفي)، وأمّا الآخر فإنّه يهتمّ بتحليل البيانات واستقرائها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها (ويُدعى الإحصاء الاستدلالي، وفي مراجع أخرى يذكر باسم الاستدلال الإحصائي أيضاً)، وبناءً على ذلك يمكننا أن نقدّم التعاريف الآتية.

١-١-٢-١ تعريف (الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics)

الإحصاء الوصفي هو ذلك الفرع من الإحصاء الذي يهتمّ بجمع البيانات وتنظيمها في جداول وعروض بيانية مناسبة، ودراسة خصائصها العددية.

في الواقع إنّ هذه الجزئية من العلم يشترك فيها الاختصاصي وغير الاختصاصي أيضاً، فعلى سبيل المثال في عملية جمع البيانات الإحصائية يهتمّ المختصون بالطرائق والأساليب (أي بالتقنيّة) التي ستجمع بها البيانات، في حين يمكن لأشخاص غير مختصين (ولكن مدرّبين) القيام بجمع هذه البيانات، فعلى سبيل المثال لو أخذنا عملية المسح السكاني الشامل في بلد ما، فإنّ دور المختصين هو تحديد الطرائق والأساليب التي ستجمع بها البيانات، وإعداد الاستبيانات المناسبة للأهداف المطلوبة من هذه العملية. في حين يدرب معلّمون من المدارس على تعبئة الاستبيانات وكيفية تحصيل البيانات من الأهالي (لكيلا يحصل التّضليل الإحصائي). بعد ذلك يقوم الاختصاصي مرّةً أخرى بتنظيم هذه البيانات في جداول وعروض بيانية مناسبة (لهدف الدراسة الإحصائية) من أجل أخذ انطباع أولي عن سلوك هذه البيانات.

فيما سبق وردت عبارة "بيانات" مرّات عديدة، ولكيلا يكون هنا التباس في استخدامها سنقدّم تعريفها على النحو الآتي.

٣-١-١- تعريف (البيانات Data)

البيانات هي قياسات أو ملحوظات (أو مشاهدات) تهدف إلى غرض معين في مجتمع إحصائي (سنأتي على تعريفه بعد قليل) مُحدد، ويتم تدوينها كنتيجة لعملية إنتاجية (مثل كميات القمح الناتجة عن الزراعة في عام أو أعوام متتالية في بلد ما) أو لتجربة معملية (مثل معرفة الألوان الناتجة عن تحليل ضوء الشمس) أو لمراقبات (ملاحظات) لكائنات موجودة في الطبيعة (مثل أعداد النجوم في مجرة في الفضاء الكوني) أو

٤-١-١- تعريف (الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics)

الإحصاء الاستدلالي هو ذلك الفرع من علم الإحصاء الذي يهتم بتحليل البيانات واستقرائها (تعميم نتائج العينات على المجتمع الإحصائي) ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إنَّ العمل في هذا القسم من الإحصاء يقع على عاتق الاختصاصيين حصراً، وذلك لأنها تتطلب مهارات علمية على مستوى أكاديمي، حيث يبدؤون بتحليل البيانات ودراسة توزيعاتها وتعيين معالمها ومن ثمَّ البحث عن مقدرات مناسبة لهذه المعالم وبعد ذلك دراسة سلوك تلك المقدرات و.... وأخيراً اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المجتمع قيد الدراسة. بالطبع سوف لن نتناول هذه الدراسة في كتابنا هذا لأنها خارج إطار خطته.

في هذا الفصل سوف نتناول أول وأبسط جزئية من علم الإحصاء ألا وهي "البيانات الإحصائية جمعها وتنظيمها" كما ورد في عنوان هذا الفصل، وهذه الدراسة تتطلب العديد من المفاهيم الإحصائية وأولها هو الآتي.

٥-١-١- المجتمعات الإحصائية Populations

في الواقع إنَّ الدِّراسة الإحصائية لأية مسألة تنطلق ممَّا يُعرف باسم "المجتمع الإحصائي" الذي يكوِّن الأساس للبيانات التي ستخضع للدراسة، ولذلك لا بدَّ من تقديم تعريف واضح لمعنى المجتمع الإحصائي كي لا يكون هناك أي لبس في ذهن القارئ لهذا المفهوم المهم.

١-٥-١-١- تعريف (المجتمع الإحصائي Population)

المجتمع الإحصائي هو أي تجمُّع لأشياء تجمَع بينها صفة مشتركة واحدة على الأقل لتكون محل دراسة لهدف محدد.

٢-٥-١-١- ملاحظات

١- سنستخدم كلمة "مجتمع" عوضاً عن "مجتمع إحصائي" على سبيل الاختصار والتبسيط، وإذا ما كتبت بين الحين والآخر فإنَّ ذلك من باب التذكير بها فقط.

٢- تُدعى مكونات المجتمع عناصر أو أفراداً.

٣- إنَّ عدد عناصر المجتمع يُدعى حجم المجتمع، ولذلك فمن الممكن أن يكون حجم المجتمع:

- **محدوداً**، وفي هذه الحالة يكون عدد عناصر المجتمع منتهياً ويُرمز له بعدد طبيعي، وقد درجت العادة على استخدام أحرف لاتينية كبيرة من قبيل M ، N ... للدلالة على حجم المجتمع، فعلى سبيل المثال من أجل دراسة إحصائية ما على طلاب جامعة الملك سعود يمكن النظر إلى طلاب هذه الجامعة على أنه مجتمع محدود.

- **غير محدود**: وفي هذه الحالة يكون عدد عناصر المجتمع غير منتهٍ، ولذلك لا يستخدم رمزاً للدلالة على حجم المجتمع في هذه الحالة، فعلى سبيل المثال من أجل دراسة إحصائية ما على سلوك الأعداد الأولية (مثل عشوائيتها وتوزيعها) فإنه يمكن النظر إلى مجموعة الأعداد الأولية على أنها مجتمع غير محدود.

٤- من الأمور المهمة هنا هي أن ندرك أن المجتمع ليس بالضرورة أن يكون مجتمعاً بشرياً أو حتى مجتمعاً لأحياء، إذ إنه من الممكن أن يكون جماداً أو أي شيء آخر أيضاً، والمثالان الآتيان يوضحان لنا ذلك.

- لدى تحديد نسبة خام النحاس في فلز معدني في منجم معين، حيث يمكن أن تتواجد أنواع عديدة من مركبات النحاس في هذا المنجم، ولكنها جميعاً تحوي على معدن النحاس، ولذلك فلز النحاس في هذا المنجم يكون مجتمعاً.

- في دراسة لتحديد الحالة الفنية للطائرات السفريّة في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد أنواع عديدة من الطائرات السفريّة، ولكنها جميعاً تتصف بأنها طائرات سفريّة، ولذلك الطائرات السفريّة الموجودة في المملكة العربية السعودية تكون مجتمعاً.

٦-١-١-١ العيّنات Samples

قد تكون عملية إخضاع جميع عناصر المجتمع للبحث والدراسة شاقة، وأكثر من ذلك قد تكون في كثير من الحالات غير ممكنة أيضاً، فعلى سبيل المثال:

- لو أرادت هيئة الرقابة على الأدوية التحقق من مكونات عقار دوائي معين معبأ في كبسولات، فعندئذٍ من غير المجدي أن تقوم هذه الهيئة بإخضاع كل إنتاج المصنع (ومن ثمّ إتلاف كافة الإنتاج) للتحليل المخبري من أجل التثبت من أن المنتج مُحققاً للمواصفات المقدّمة من قبل المصنع.

- في عملية تحليل الدم لمريض فمن غير المعقول ولا المقبول أخذ كل دم المريض (ومن ثمّ قتل المريض) لتحليله من أجل الكشف على أسباب مرضه.

بالطبع هناك عوامل أخرى قد تضطرنا إلى عدم التعامل مع عناصر المجتمع كله لأسباب أخرى منها الاقتصادية والزمنية أيضاً، ولذلك يلجأ المرء في مثل هذه الحالات إلى أخذ جزء من المجتمع لدراسته، وهذا العمل يندرج تحت مفهوم العينة والذي يقدمه لنا التعريف الآتي.


١-٦-١-١ تعريف (العينة Sample)

تُعرف العينة على أنها جزء من مجتمع إحصائي يتم اختياره (أو سحبه) بطريقة مناسبة بحيث يُنظر إلى هذا الجزء كتمثّل جيد للمجتمع.

١-٦-١-٢ ملاحظات

- ١- سنستخدم كلمة عينة عوضاً عن كلمة عينة إحصائية على سبيل الاختصار والتبسيط.
- ٢- نشير إلى أن عدد عناصر العينة يجب أن يكون منتهياً.
- ٣- يُطلق على عدد عناصر العينة اسم "حجم العينة"، وقد درجت العادة على استخدام أحرف لاتينية صغيرة من قبيل m, n ... للدلالة على حجم العينة.

الشكلان الأتيان [1-1-a] و [1-1-b] يوضحان مفهوم المجتمع والعينة.



الشكل [1-1-a]

الشكل [1-1-b]

١-٦-١-٣ تصنيف العينات Classification of Samples

مما تقدّم يتبيّن لنا أن استخدام مفهوم العينة في الدراسة (أو البحث) إنّما هو وسيلة لتعميم ما تمّ التوصل إليه من نتائج على المجتمع، وذلك لاعتقادنا أنّ هذه العينة هي ممثّل مقبول للمجتمع. هذا وتصنّف العينات في نوعين رئيسيين هما:

١- **عينات عشوائية**، ويتميّز هذا النوع من العينات بأنّ عناصرها تسحب من المجتمع بطرائق عشوائية، ومن أهمّ أنواعها وأكثرها انتشاراً **العينات العشوائية البسيطة**، وهذا النوع من العينات يتميّز بأنّ لجميع عناصرها النصيب نفسه في الاختيار (أو السحب أو الانتقاء) مع أي عينة عشوائية أخرى بذات الحجم وممكنة التشكيل من المجتمع نفسه، وهذا يوافق الحالة التي يكون فيها جميع عناصر المجتمع مستقلة بعضها عن البعض الآخر ولها النصيب نفسه في الظهور (أو الاختيار).

٢- **عينات عمدية (أو قصدية)**، ويتميّز هذا النوع من العينات بأنّ عناصرها تُنتقى من المجتمع وفقاً لرأي الباحث وخبرته، ولهذا السبب فإنّه من النادر استخدام هذا النوع من العينات لأنّه من الممكن أن يتحيّز الباحث في عملية الانتقاء.

٧-١-١-٧ المتغيرات Variables

لقد لاحظنا أنه لدى أية دراسة إحصائية نكون أمام هدفٍ مُحددٍ نأمل الوصول إليه، ومن أجل ذلك كنا نقوم بتطبيق أداة معينة على أفراد العينة أو المجتمع للحصول على البيانات التي نرغب بها من أجل الوصول إلى قرار بشأن دراستنا الإحصائية. في الواقع إنَّ هذه الأدوات التي ذكرناها تدرج تحت أحد المفاهيم المهمة في الرياضيات (ألا وهي التطبيقات)، وتُقدَّم في الإحصاء تحت مسمى المتغيرات التي يقدمها لنا التعريف الآتي.

١-٧-١-١-١ تعريف (المتغير Variable)

يُعرف المتغير على أنه تطبيق (وقد يكون دالة) مجموعة تعريفه العينة أو المجتمع نفسه (حسب طبيعة الدراسة الإحصائية)، وأما مجموعة قيمه فهي مجموعة ذات طبيعة ما، فيمكن لها أن تكون أعداداً أو رموزاً أو مسميات، ويستخدم لقياس خاصية معينة لعناصر العينة أو المجتمع.

١-٧-١-٢ ملاحظة:

من التعريف السابق يتضح لنا أن القياسات أو المشاهدات التي يمكن أن تنتج عن متغيرٍ قد تكون قيماً عدديةً أو أحرفاً أو رموزاً أو...، وبناءً على ذلك يمكننا تصنيف المتغيرات في نوعين رئيسيين هما:

١- المتغيرات الكمية Quantitative Variables، وهي متغيرات تكون قيمها أعداداً حقيقية تنتج عن التساؤل بـ "كم". إنَّ البيانات التي تنتج عن هذه المتغيرات تُدعى بيانات كمية Quantitative Data، فعلى سبيل المثال:

أ- المتغير الذي يرصد أعداد الطلاب في الجامعات السعودية تكون قيمه أعداداً طبيعية ينتج عن التساؤل بـ "كم"، فلو كان عدد طلاب جامعة الملك سعود يساوي 50000 طالب، فعندئذٍ تنتج هذه القيمة عن السؤال: كم عدد طلاب جامعة الملك سعود؟

ب- المتغير الذي يرصد أعداد الأطفال لدى الأسر في مدينة الرياض تكون قيمه أعداداً صحيحة غير سالبة ينتج عن التساؤل بـ "كم"، فلو كان لدى أسرة X من مدينة الرياض خمسة أطفال، فعندئذٍ هذه القيمة تنتج عن السؤال: كم عدد الأطفال لدى الأسرة X ؟

ج- المتغير الذي يرصد الطول (مقدراً بالسنتيمتر) لدى أفراد بلد ما، فإنَّ قيم هذا المتغير هي أعداد حقيقية، ومن الممكن أن يكون لمجموعة قيمه الفترة [246, 45]، وينتج عن التساؤل بـ "كم"، فلو أخذ شخص ما X من ذلك البلد وكان طوله 176 سنتيمتر، فعندئذٍ هذه القيمة تنتج عن السؤال: كم طول الشخص X ؟

٢- المتغيرات النوعية Qualitative Variable، وهي متغيرات تكون قيمها عبارة عن رموز أو أسماء أو أرقام دالة على نوع أو اسم أو صفة أو تمييز، وهذه القيم تنتج عن السؤال بـ "ما".

إنَّ البيانات التي تنتج عن هذا النوع من المتغيِّرات تُدعى **بيانات نوعية** Qualitative Data، فعلى سبيل المثال:

أ- المتغيِّر الذي يرصد ألوان الزهور في حديقة معينة هو متغيِّر نوعي، والقيم التي تنتج عنه (أحمر، أصفر، أبيض و...)، ونحصل عليها بالسؤال: **ما لون الزهرة؟**

ب- المتغيِّر الذي يرصد فصيلة الدم لدى البشر تكون مجموعة قيمه رموزاً O, A, B, AB ، ونحصل على هذه القيم بالسؤال: **ما فصيلة دم الشخص X ؟**

ج- المتغيِّر الذي يرصد الرقم الجامعي لطالب في جامعة الملك سعود هو متغيِّر نوعي، والقيم التي تنتج عنه هي أرقام من قبيل $436....., 437.....$ و... وهذه الأرقام تميِّز الطالب ولا تعني مقداراً كميًّا له، ونحصل على هذه القيم بالسؤال: **ما رقم الطالب X ؟**

١-٧-٣- نتيجة

من الأمثلة السابقة نستنتج أنه يمكننا تصنيف المتغيِّرات النوعية والكمية إلى نوعين أيضاً وذلك بحسب عدد البيانات الناتجة عن الدراسة، حيث لاحظنا أن مجموعات القيم للمتغيِّرات (النوعية أو الكمية) قد تكون منتهية أو غير منتهية قابلة للعد، أو أن تكون غير منتهية وغير قابلة للعد، وبناء على ذلك تصنّف المتغيِّرات (وبغض النظر عن نوعها) في النوعين الآتيين:

١- **متغيِّرات متقطّعة** Discrete Variables، وهي تلك المتغيِّرات (نوعية أو كمية) التي تكون مجموعة قيمها منتهية أو غير منتهية ولكن قابلة للعد، ومن الأمثلة على ذلك:

أ- لنفترض أن عدد السيارات المباعة يومياً من معرض ما وعلى مدى عشرة أيام كانت كالتالي:

1 5 2 4 2 0 0 5 2 3

فعندئذ بفرض أن X هو متغيِّر يرصد عدد السيارات المباعة يومياً من هذا المعرض وعلى مدى هذه الأيام العشرة، فإنه سيكون لهذا المتغيِّر ست قيم فقط هي: 0، 1، 2، 3، 4، 5، ومن ثمّ X هو متغيِّر متقطّع.

ب- لنفترض أننا نقوم بقذف قطعة نقود معدنية حتى الحصول على شعار لأول مرّة، وأن X هو متغيِّر يرصد عدد التجارب التي نفذت حتى الحصول على شعار لأول مرّة، فإنه سيكون لهذا المتغيِّر عدداً غير منتهٍ ولكن قابل للعد من القيم هي 1، 2، 3 و...، وهذه القيم تكون مجموعة الأعداد الطبيعية كاملة $\{1, 2, 3, \dots\}$ ، ومن ثمّ X هو متغيِّر متقطّع.

ج- لنفترض أن فريق طبي يجري بحثاً حول أنواع فصائل الدم الأكثر انتشاراً في فصل من فصول السنة الأولى المشتركة مكون من عشرين طالباً، وأن النتائج كانت كالآتي:

O	O	AB	A	O	AB	B	O	B	A
A	O	A	A	O	AB	A	A	O	B

فعدنذ بفرض أن X هو متغير يرصد نوع فصيلة الدم لطالب من هذا الفصل، فإنه سيكون لهذا المتغير أربع قيم فقط هي: O, A, B و AB ، ومن ثم X هو متغير متقطع.

د- لنفترض أننا نقوم بقذف قطعة نقود معدنية حتى الحصول على شعار لأول مرة، وأن X هو متغير يرصد النتائج التي سنحصل عليها حتى الحصول على شعار لأول مرة، فإنه سيكون لهذا المتغير عدداً غير منتهٍ قابلٍ للعد من القيم، وهي:

$T, HT, HHT, HHHT, HHHHT, \dots$


ومن ثم X هو متغير متقطع.

٢- متغيرات مستمرة (أو متصلة) Continuous Variables، وهي تلك المتغيرات (نوعية أو كمية) التي تكون مجموعة قيمها غير قابلة للعد (وبالتالي غير منتهية أيضاً)، ومن الأمثلة على ذلك:

أ- بفرض أن X هو متغير يرصد عمر الإنسان في القرن الأخير 1916-2016، فعدنذ نجد أن قيم هذا المتغير تقع في الفترة $[0, 179]$ ، وهي مجموعة غير قابلة للعد، ومن ثم X هو متغير مستمر.


ب- بفرض أن X هو متغير يرصد الوقت المستغرق من قبل طالب لإنهاء اختباره (بزمن 120 دقيقة) في مقرر معين، فعدنذ نجد أن قيم هذا المتغير تقع في الفترة $[0, 120]$ ، وهي مجموعة غير قابلة للعد، ومن ثم X هو متغير مستمر.

ج- بفرض أن X هو متغير يرصد اللون الذي له طول موجي يقع في الفترة $[400nm, 700nm]$ (nm تعني: نانو متر $1nm = 10^{-9}m$)، فعدنذ نجد أن هذا المتغير يرصد القسم الأكبر من ألوان الطيف الضوئي المرئي (انظر الشكل الآتي)، ومن ثم عدد الألوان التي يرصدها هذا المتغير غير قابلة للعد، وبالتالي فإن هذا المتغير النوعي هو متغير مستمر.



الشكل [1-2]

الشكلان الآتيان يوضحان لنا تصنيفات المتغيرات والبيانات.



الشكل [1-3-a]



الشكل [1-3-b]

تنظيم البيانات الخام وتمثيلها

Organizing and Representing Raw Data

الآن، وبعد إتمام عملية جمع البيانات تأتي المرحلة التالفة، وهي البحث في كيفية التعامل مع هذه البيانات. حيث يتم التحقق أولاً من اكتمال البيانات، فإذا كانت هناك بعض البيانات المفقودة فعندئذٍ يجب النظر في كيفية تحصيلها ثانية أو تقديرها إن أمكن ذلك، وإلا سوف تستثنى من الدراسة (علماً أن عملية التقدير للبيانات المفقودة تقع خارج إطار هذا الكتاب، ولذلك سوف لن نتطرق إلى عملية تقدير البيانات المفقودة).

إن البيانات التي نحصل عليها قد تكون على أشكال مختلفة، فمنها على شكل قيم عددية مفردة، وبعضها الآخر قد يعرض تغيراً ظاهرياً ما مع مرور الزمن أو مع مساميات كالبلدان، أو المدن، أو مع كليهما معاً، وبعضها الآخر قد يكون مجمماً في جداول. لذلك سنبحث في تنظيم البيانات وفق اتجاهين:

الأول: يهتم بتنظيم البيانات المفردة التي تنتج مباشرة عن الدراسة الإحصائية (كمية كانت أم نوعية) في جداول تدعى الجداول التكرارية، ومن ثم تمثيل هذه البيانات في عروض بيانية مناسبة.

الثاني: يهتم بتجميع البيانات المفردة الكمية فقط في جداول من نوع خاص تدعى جداول التوزيع التكرارية، حيث يقال عن البيانات المقدمة بهذه الجداول إنها بيانات مجمعة (أو مبوبة، أو مجدولة)، ومن ثم تمثيل بيانات هذه الجداول في عروض بيانية مناسبة.

١-٢-١- البيانات الخام Raw Data

لدى تنفيذ دراسة إحصائية معينة حول ظاهرة ما وجمع البيانات حول هذه الظاهرة تنتج لدينا بيانات مفردة تدعى بيانات خام.

إذا كان عدد البيانات صغيراً فإنه يمكن التعامل مع هذه البيانات بشكل مباشر (مع كل قيمة على انفراد) لدراستها، وأما إذا كان عدد البيانات كبيراً نسبياً، فإنه قد يكون من الصعب التعامل معها بشكل مباشر، ولذلك لا بد من تقديم طرائق تسهل التعامل مع هذه البيانات كي يتم الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن.

فيما يلي نقدم بعض الأمثلة على بيانات خام قبل الشروع في تقديم طرائق عرضها جدولياً.

١-٢-١-١- أمثلة

١- لدى الاطلاع على تقديرات 60 طالباً في مقرر الإحصاء وجدنا المعطيات الآتية:

C	A	D	B	D	A	F	D	C	A
D	D	D	C	C	B	C	F	F	C
A	B	C	D	D	A	D	A	A	B
D	C	F	D	C	B	C	C	B	C
B	D	A	B	B	C	B	A	D	C
C	C	F	C	B	D	C	D	B	F

فلاحظ أن هذه البيانات هي بيانات خام نوعية.

٢- لقد سُئل 30 طالباً من كلية X عن عدد الحوادث المرورية التي حصلت معه خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام فكانت الإجابات كما يلي:

0	0	1	3	1	0	1	2	2	3
2	0	1	2	1	1	1	1	2	1
1	0	0	0	3	2	2	1	0	0

فلاحظ أن هذه البيانات هي بيانات خام كمية.

٣- البيانات الآتية تمثل الطول لخمسین طالباً جامعياً (مقدرة بالستيمتر):

140	155	168	171	158	168	159	149	172	145
155	154	166	169	168	158	149	172	168	166
156	166	149	157	156	159	167	166	169	171
170	159	168	168	167	157	154	166	169	168
158	157	172	155	154	166	168	167	171	168

وهذه البيانات هي بيانات خام كمية، ولكنها تتبع مجموعة بيانات مستمرة (أو متصلة). حيث نلاحظ أن كمية البيانات الخام المقدمة أعلاه لا تعد كبيرة نسبياً إلا أنه يصعب أخذ انطباع سريع عن سلوك هذه القيم بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال: هل كل قيمة في هذه المجموعة تتكرر بالقدر نفسه؟



بالطبع قد يقوم المرء بإجراء تعداد لكل بيان من هذه البيانات ومن ثم إجراء مقارنة بين هذه التعدادات، ولكن ذلك سيستغرق وقتاً لا بأس به. لذلك اقترح تنظيم هذه البيانات بطريقة معينة حتى يسهل على المرء الاستفادة منها واستنباط سلوك هذه البيانات بأقل وقت وجهد ممكن. من هنا جاءت فكرة صبّ البيانات في جداول يذكر في أحد أعمدتها البيان المميز (الرمز أو العدد الممثل)، وفي العمود المقابل يذكر التعداد وفي العمود الذي يليه يدون عدد يعبر عن تعداد هذا البيان.

٢-٢-١- التمثيل الجدولي للبيانات الخام Table Representation of Raw Data

إن تمثيل البيانات الخام جدولياً يعني صبّ هذه البيانات في جدول بتصميم معين، وهذا الجدول يدعى **الجدول التكراري** للبيانات. فإذا أردنا صبّ مجموعة بيانات خام في جدول تكراري نقوم بإدراج جدول يحتوي على خمسة أعمدة، وهذه الأعمدة تُخصّص على النحو الآتي:

١- يدوّن في العمود الأول ممثّل لكل نوع من الأسماء أو الرموز أو الأعداد (ولتكن x_1 و x_2 و... و x_m على افتراض أن عدد الممثّلين m) حسب طبيعة البيانات التي قيد الدراسة، فعلى سبيل المثال لدينا:
 أ- الرمز A هو ممثّل لكل الرموز A في مجموعة بيانات المثال (١) من الفقرة (١-٢-١)،
 ب- العدد 0 هو ممثّل لكل الأعداد 0 في مجموعة بيانات المثال (٢) من الفقرة (١-٢-١).

٢- يدوّن في العمود الثاني التعداد Tally لكل ممثّل (من الأسماء أو الرموز أو الأعداد) في مجمل البيانات التي قيد الدراسة، ويتمّ ذلك برسم خط عمودي عن كل بيان موافق للاسم أو الرمز أو العدد، وإذا أصبح لدينا أربعة خطوط عمودية فإنّ الخط الخامس يحزمها على النحو |||| .

٣ يدوّن في العمود الثالث عدد يُعبّر عن تعداد كل ممثّل (من الأسماء أو الرموز أو الأعداد) في مجمل البيانات التي قيد الدراسة، وهذا العدد يُدعى التكرار Frequency (وسنرمز لها بـ f_1 و f_2 و... و f_m افتراض أن عدد الممثّلين m).

٤- يدوّن في العمود الرابع عدد يعبر عن نسبة تكرار كل ممثّل (من الأسماء أو الرموز أو الأعداد) إلى العدد الكلي للبيانات التي قيد الدراسة، وهذا العدد يُدعى التكرار النسبي Relative Frequency. أي أنّ التكرار النسبي يساوي تكرار النوع مقسوماً على المجموع الكلي للتكرارات.

٥- يدوّن في العمود الخامس عدد يعبر عن حاصل ضرب العدد 100 في التكرار النسبي لكل ممثّل (من الأسماء أو الرموز أو الأعداد) ويقراً كنسبة مئوية، وهذا العدد يُدعى التكرار المئوي Percent Frequency. أي أنّ التكرار المئوي يساوي التكرار النسبي مضروباً في 100.

وهكذا يمكننا عرض نتائج صب البيانات في جدول تكراري نموذجي وفقاً للعرض الآتي:

الجدول [1-1]

التمثّل	التعداد	التكرار	التكرار النسبي	التكرار المئوي
x_1	...	f_1	$f_1 / \sum f_i$	$(f_1 / \sum f_i) \times 100\%$
x_2	...	f_2	$f_2 / \sum f_i$	$(f_2 / \sum f_i) \times 100\%$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
x_m	...	f_m	$f_m / \sum f_i$	$(f_m / \sum f_i) \times 100\%$
sum	-----	$\sum f_i$	1	100 %

والأمثلة الآتية توضح لنا هذا النوع من الجداول.

١-٢-٢-١- أمثلة

١- لنقم بصبّ البيانات الموجودة في المثال (١) من الفقرة (١-٢-١) في جدول تكراري، فنجد أنّ لهذا الجدول العرض الآتي:

الجدول [1-2]

التقدير	التعداد	التكرار	التكرار النسبي	التكرار المئوي
A	###	9	$9/60 = 0.15$	$0.15 \times 100 = 15\%$
B	### ###	12	$12/60 = 0.20$	$0.20 \times 100 = 20\%$
C	### ### ###	18	$18/60 = 0.30$	$0.30 \times 100 = 30\%$
D	### ### ###	15	$15/60 = 0.25$	$0.25 \times 100 = 25\%$
F	###	6	$6/60 = 0.10$	$0.10 \times 100 = 10\%$
Total	-----	60	1	100

نلاحظ هنا سهولة الحصول على المعلومة الخاصة بالتكرارات، فعلى سبيل المثال إذا أردنا الحصول على عدد الطلاب الحاصلين على تقدير C نجده بكل سهولة يساوي 18، وأن نسبة الطلاب الذين حصلوا على تقدير A يشكلون 15% من إجمالي عدد الطلاب، وأن 25% من الطلاب حصلوا على التقدير D.

٢- لتكن لدينا البيانات الآتية والنتيجة عن فحص فصيلة الدم لستين شخصاً.

B	A	B	A	B	O	A	O	AB	A
A	O	A	AB	O	A	AB	O	A	AB
A	B	B	B	A	AB	O	A	AB	A
B	AB	A	A	AB	A	A	O	B	B
AB	A	B	O	A	B	A	AB	A	AB
A	B	A	A	AB	A	O	A	B	B

فلو قمنا بصبّ هذه البيانات في جدول تكراري على النحو السابق، فإننا سنجد له العرض الآتي:

الجدول [1-3]

رمز فصيلة الدم	التعداد	التكرار	التكرار النسبي	التكرار المئوي
A	### ### ### ###	24	$24/60 = 0.40$	$0.40 \times 100 = 40\%$
B	### ### ###	15	$15/60 = 0.25$	$0.25 \times 100 = 25\%$
AB	### ###	12	$12/60 = 0.20$	$0.20 \times 100 = 20\%$
O	###	9	$9/60 = 0.15$	$0.15 \times 100 = 15\%$
Total		60	1	100

٣- في إحدى المدارس أخذت عيّنة مكوّنة من 40 طالباً من أجل دراسة عدد المرات التي أصيب فيها الطالب بنزلة برد (انفلونزا) خلال موسم الشتاء في عام 1438 هـ، فكانت النتائج كما يلي:

1	0	1	3	2	1	3	2	1	0
2	2	0	1	0	1	2	0	2	1
1	2	1	3	1	2	1	2	1	1
1	0	1	1	2	0	0	1	1	2

فلو قمنا بصبّ هذه البيانات في جدول تكراري، فإننا سنجد له العرض الآتي.

الجدول [1-4]

عدد مرات الإصابة	التعداد	التكرار	التكرار النسبي	التكرار المئوي
0	###	8	$8/40 = 0.20$	$0.20 \times 100 = 20\%$
1	### ### ###	18	$18/40 = 0.45$	$0.45 \times 100 = 45\%$
2	### ###	12	$12/40 = 0.30$	$0.30 \times 100 = 30\%$
3		2	$2/40 = 0.05$	$0.05 \times 100 = 5\%$
Total		40	1	100%

١-٢-٢-٢-١ ملاحظات

١- إن مجموع التكرارات النسبية يجب أن يساوي الواحد تماماً، ولكن عند تنفيذ بعض الحسابات نضطر إلى إجراء عملية تدوير للأرقام، وفي هذه الحالة قد لا نحصل على مجموع يساوي الواحد تماماً، فيكون المجموع أكبر أو أصغر من الواحد بقليل.

٢- إن مجموع التكرارات المئوية يجب أن يساوي المئة تماماً، ولكن إذا ما حصلت عملية تدوير للأرقام فإن مجموع التكرارات المئوية قد لا يساوي المئة تماماً، فيكون لدينا مجموع أكبر أو أصغر من المئة بقليل.

٣- بعد الانتهاء من صبّ البيانات يمكن الاستغناء عن عمود التعداد لأن عمود التكرار يؤدي الغاية نفسها، وأما في حال تقديم البيانات مجمعة في جدول تكراري فإنه (وفي معظم الحالات) لا يدرج عمود التعداد معه بسبب عدم وجود مبرر لظهوره، وبذلك يتبقى لدينا جدول بأربعة أعمدة فقط. نوع آخر من التمثيلات الجدولية للبيانات تقدمها لنا الفقرة الآتية.

١-٢-٢-٣ جدول الساق والأوراق Stem and Leafs Table

توجد طريقة أخرى لصبّ البيانات الخام في جدول مشابه للجدول التكرارية وتدعى عرض الساق والأوراق، والغاية منه تصنيف البيانات في مجموعات جزئية، كأن نبيّن القيم ما بين 0 و 9 في مجموعة جزئية واحدة، والقيم ما بين 10 و 19 في مجموعة جزئية ثانية، والقيم ما بين 20 و 29 في مجموعة جزئية ثالثة، وهكذا دواليك.

إن صبّ البيانات الخام في جدول الساق والأوراق يتمّ من خلال بناء جدول بعمودين أحدهما يخصّص للساق والآخر للأوراق، وذلك على النحو الآتي:

بفرض أنه لدينا بيانات كمية مكوّنة من أعداد صحيحة من خانتين على الأكثر، فعندئذ نضع في عمود الساق القيمة 0، وفي العمود المقابل لها (عمود الأوراق) نضع جميع القيم المكوّنة من خانة واحدة فقط.

بعد ذلك ننتقل إلى الأرقام المكوّنة من خانتين فنبدأ بالقيم التي خانة العشرات لها هي الأصغر، فنضع العدد المكوّن لخانة العشرات في عمود الساق وأما الأجزاء الأخرى المكوّنة لخانة الآحاد من العدد نفسه فنضعها في عمود الأوراق، فإذا ما انتهينا من هذه ننتقل إلى الأرقام الأكبر والمكوّنة من خانتين فنقوم بتطبيق الإجراء السابق عليها أيضاً، وهكذا دواليك حتى الانتهاء من عملية الصب. هذا ويفضّل ترتيب القيم في عمود الأوراق تصاعدياً في العرض الأخير للبيانات، والمثال الآتي يوضّح لنا ذلك.

١-٢-٤-٤-٢-٢-١ مثال

لنكن لدينا البيانات الآتية التي تمثّل درجات اختبار المنتصف لـ 24 طالباً:

13	3	27	22	8	11	14	17	7	21	6	12
16	6	5	25	25	23	15	6	24	5	19	13

عندئذٍ باستخدام الطريقة التي تمّ شرحها أعلاه نجد أن للبيانات المعطاة جدول الساق والأوراق الآتي:

الجدول [1-5]

الساق Stem	الأوراق Leafs حسب موضعها في البيانات المقدمّة	الأوراق بعد ترتيبها تصاعدياً
0	3, 8, 7, 6, 6, 5, 6, 5	3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8
1	3, 1, 4, 7, 2, 6, 5, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
2	7, 2, 1, 5, 5, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5, 5, 7

في الواقع هذه ليست كلّ التمثيلات الجدولية للبيانات حيث يوجد نوع آخر من التمثيلات الجدولية للبيانات يسمّى جدول التوزيع التكراري وسنأتي على شرحه لاحقاً في هذا الفصل.

١-٢-٣-٣-١-٣-٢-١ التمثيل الشرائطي للبيانات الخام Bar Chart Representation of Raw Data

يعدّ تمثيل البيانات الخام باستخدام الشرائط العمودية (ويُعرف باسم التمثيل بالأعمدة أيضاً) أو الشرائط الأفقية من أحد التمثيلات الجيدة للبيانات الخام، وذلك لأنها تعطي انطباعاً سريعاً حول طبيعة البيانات الخام وسلوكها، وسبب ذلك أنه من طبيعة الإنسان سرعة الملاحظة عند النظر إلى المشاهد والرسومات.


من أجل التمثيل الشرائطي لمجموعة بيانات خام (ويغض النظر عن نوعها اسمية، رموزاً أو عددية) نقوم برسم محورين متعامدين XoY ، ومن ثمّ يدوّن أسفل المحور oX الممثل لكل صنف في البيانات الخام (فإن كانت أسماء كُتبت الأسماء، وإن كانت رموزاً وضعت الرموز وإن كانت أعداداً سُجّلت الأعداد)، وأما المحور oY فيدوّن عليه قيم تكرارات البيانات الخام.

بعد ذلك يُرسم عمود فوق كل مُمثل بيانات بارتفاع قدره يساوي قيمة تكرار هذا الممثل مع الأخذ بالحسبان أن تكون هذه الأعمدة منفصلة بعضها عن البعض الآخر بتباعد ثابت (وغالباً ما تؤخذ بمقدار وحدة قياس). في هذه الحالة نحصل على التمثيل بالشرائط العمودية أو التمثيل بالأعمدة.


أما إذا أردنا تمثيل البيانات بالشرائط الأفقية فإننا نعكس العمليات التي تمت على المحورين المتعامدين، فيصبح المحور oY من أجل تدوين الممثل لكل صنف في البيانات الخام في حين يستخدم المحور oX لتدوين قيم تكرارات البيانات الخام، وفي هذه الحالة لا يُقال عن التمثيل الناتج إنه تمثيل بالأعمدة للبيانات الخام. بعد ذلك يُرسم شريط أفقي إلى جانب كل مُمثل للبيانات بطول قدره يساوي قيمة تكرار هذا الممثل، ومع الأخذ بالحسبان أن تكون هذه الشرائط منفصلة بعضها عن البعض الآخر بتباعد ثابت أيضاً.

١-٣-٢-١-١ مثال

بالعودة إلى المثال (٢) من (١-٢-٢-١) فإننا نجد تمثيل البيانات الخام المعطاة باستخدام الشرائط العمودية (أو التمثيل بالأعمدة) له الشكل [1-4-a]، وأما التمثيل باستخدام الشرائط الأفقية فله الشكل [1-4-b].




الشكل [1-4-b]




الشكل [1-4-a]

١-٣-٢-١-٢ ملاحظة

يمكن استخدام التكرارات النسبية والتكرارات المئوية بدلاً من التكرارات في التمثيل الشرائطي أيضاً، حيث تستبدل قيم التكرارات بقيم التكرارات النسبية أو التكرارات المئوية، فعلى سبيل المثال نجد من أجل المثال السابق أن العرض الشرائطي النسبي والمئوي لهما الشكلين الآتيين:



الشكل [1-4-c] العرض الشرائطي النسبي



الشكل [1-4-d] العرض الشرائطي المئوي

٣-٣-٢-١- التمثيل بالشرائط البيانية المزدوجة Pair Bar Charts Representation

يُعدّ التمثيل البياني بالشرائط المزدوجة من التمثيلات البيانية المهمة عند مقارنة مجموعتين من البيانات أو أكثر (ظاهرتين أو أكثر) مع بعضها البعض الآخر، وهذه الطريقة في التمثيل لها الخطوات نفسها التي استخدمت من أجل التمثيل الشرائطي، ولكن لكل مجموعة بيانات على حدى مع وضع الأشرطة الممثلة للنوع الواحد ملاصقة أو قريبة بعضها من البعض الآخر، ويميّز أحدهما عن الآخر بالتلوين المختلف أو التظليل المختلف.


٣-٣-٢-١- مثال

الجدول [1-6]

العام الدراسي	عدد الطلاب الناجحون	عدد الطالبات الناجحات
2013	970	650
2014	890	610
2015	950	630
2016	935	590
Total	3745	2480

على سبيل المثال يمكننا أن نقارن أعداد الطلاب والطالبات الذين اجتازوا اختبار مقرر الإحصاء في السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود وذلك خلال الأعوام الدراسية 2013 وحتى 2016. حيث لدينا البيانات الخاصة بذلك كما في الجدول المجاور.


فعندئذ نجد أنّ التمثيل بالشرائط المزدوجة للبيانات المقدّمة أعلاه له الشكل الآتي.



الشكل [1-5]

١-٢-٣-٥- العرض النقطي للبيانات Dot Plots of Data

يعدّ تمثيل البيانات باستخدام النقاط إحدى الطرائق المستخدمة في تمثيل البيانات، ويتم ذلك من خلال وضع نقطة فوق القيمة الممثلة (أو الرمز الممثل) عن كل بيان يتوافق مع هذه القيمة (أو الرمز). إنّ هذه الطريقة تستخدم عادة من أجل البيانات الكمية، وذلك بجعل المحور الحقيقي أساساً للتمثيل فوقه. على سبيل المثال لو أردنا تمثيل بيانات المثال ١-٢-٤ باستخدام العرض النقطي فإننا سنجد له العرض الآتي:



الشكل [1-6]

١-٢-٤- التمثيل بالقطاعات الدائرية (أو القرص الدائري) Pie Chart

يُنظر إلى التمثيل بالقطاعات الدائرية (أو القرص الدائري) على أنه أحد الأشكال البيانية الواسعة الانتشار في دراسات الإحصاء الوصفي عندما يكون عدد ممثلي البيانات قليلاً، وأما إذا كان عدد ممثلي البيانات كبيراً فعندئذٍ تصبح الفائدة منه شبه معدومة.

يلجأ عادة إلى استخدام هذه الطريقة عندما نكون بحاجة لتقسيم الكل إلى k من الأجزاء، وأما لرسمها فإننا نقوم أولاً برسم دائرة بنصف قطر مُثَبَّت (غالباً يكون عمودياً) يُعدّ مبدأً لقياس الزاوية عنه، ثم تُحسب زوايا القطاعات الدائرية α_i مقدرة بالدرجات Degrees، وتأخذ إلى يمين العمود السابق باتجاه دوران عقارب الساعة، وبحيث يكون للممثل i قطاع دائري زاويته تُحسب باستخدام العلاقة الآتية:

$$\alpha_i := \frac{n_i}{n} \times 360 \quad [1-1]$$

علماً أنّ n هو عدد البيانات الخام المعطاة و n_i هو عدد العناصر (أو البيانات) التابعة للممثل (أو الجزء) i ، بمعنى آخر، فإننا نحصل على قيمة الزاوية للقطاع التابع للممثل (أو الجزء) i من خلال ضرب قيمة التكرار النسبي لهذا الممثل في 360، والمثالان الآتيان يوضّحان لنا ذلك.

١-٢-٤-١- مثال

١- بالرجوع إلى المثال (٢) من (١-٢-٤-١) وباستخدام العلاقة [1-1] نجد أن:


$$\alpha_A = \frac{24}{60} \times 360 = 144^\circ \text{ هي زاوية القطاع الممثل لبيانات A}$$

$$\alpha_B = \frac{15}{60} \times 360 = 90^\circ \text{ هي زاوية القطاع الممثل لبيانات B}$$

$$\alpha_{AB} = \frac{12}{60} \times 360 = 72^\circ \text{ هي زاوية القطاع الممثل لبيانات AB}$$

زاوية القطاع الممثل لبيانات O هي $\alpha_0 = \frac{9}{60} \times 360 = 54^\circ$

ومن ثمَّ يكون لدينا العرض الجانبي للقطاعات الدائرية.



الشكل [1-7]

٢- بالرجوع إلى المثال (٣) من (١-٢-٢-١) وباستخدام العلاقة [1-1] نجد أن:


زاوية القطاع الممثل لبيانات 0 هي $\alpha_0 = \frac{8}{40} \times 360 = 72^\circ$

زاوية القطاع الممثل لبيانات 1 هي $\alpha_1 = \frac{18}{40} \times 360 = 162^\circ$

زاوية القطاع الممثل لبيانات 2 هي $\alpha_2 = \frac{12}{40} \times 360 = 108^\circ$

زاوية القطاع الممثل لبيانات 3 هي $\alpha_3 = \frac{2}{40} \times 360 = 18^\circ$

ومن ثمَّ يكون لدينا العرض الجانبي للقطاعات الدائرية.



الشكل [1-8]



التوزيعات التكرارية

Frequency Distributions

لقد قدمنا فيما سبق شرحاً مفصلاً للجداول التكرارية حيث لاحظنا أن تلك الجداول تعطينا تصوراً سريعاً حول سلوك البيانات، وأكثر من ذلك فقد كانت تهتمّ بسلوك ممثل البيانات نفسه، فتظهر لنا تكراره وتكراره النسبي والمئوي إذا رغبتنا في ذلك. إلا أنه من أجل البيانات الكمية المستمرة (أو المتصلة) خصوصاً فقد لا نكون قادرين على استخدام هذه الطريقة في العرض بسبب أن قيمها تنتمي إلى مجموعات قد تكون غير قابلة للعد، وربما لا تكرر قيمة البيان لأكثر من مرة واحدة أيضاً. لذلك في مثل هذه الحالات لا يعود اهتمامنا مركزاً على قيمة البيان نفسه وإنما على الفترة التي ينتمي إليها هذا البيان، ومن ثمّ يصبح اهتمامنا منصباً على بيان ممثل لكل فترة من الفترات التي ستصبّ فيها البيانات. بمعنى آخر، يكون لدينا تجزئة لمجموعة البيانات في فترات جزئية واهتمامنا يكون منصباً على قيمة ممثلة وحيدة (تُدعى مركز الفئة - سيرد ذكرها لاحقاً-) لكل فترة من هذه الفترات الجزئية. عادة يُطلق اسم "فئة Class" على كل فترة جزئية من هذه الفترات.

إنّ تمديد الجداول التكرارية إلى جداول تكرارية ذات فئات يجعلها أكثر فاعلية في تنفيذ بعض العمليات الحسابية على البيانات وخاصةً عندما يصبح عدد البيانات كبيراً، فعلى سبيل المثال تصوّر لو أنّك تقوم بدراسة على مجموعة بيانات مكوّنة من مليون قيمة عددية أو أكثر فكّم من الوقت ستحتاج لاستنباط سلوك هذه البيانات أو الحصول على بعض المميزات العددية لها؟

قبل البدء في بناء جداول التوزيع التكرارية لا بدّ لنا من تقديم بعض المفاهيم التي لا بدّ منها لبناء مثل هذه الجداول، وسنبداها بالتعريف الآتي.

١-٣-١- تعريف (المدى Range)

لتكن لدينا x_1, x_2, \dots, x_n بيانات مُعطاة، ولنرمز لأصغر وأكبر قيمة في هذه البيانات بـ x_s و x_l على الترتيب. عندئذٍ يُعرّف **المدى** لهذه البيانات (وسنرمز له بـ R) على أنه الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في هذه البيانات. أي أنه لدينا:

$$R = x_l - x_s$$

[1-2]

١-٣-٢- تعريف (الفئة Class)

الفئة من أجل بيانات مُعطاة هي فترة من مجموعة الأعداد الحقيقية لها طول موجب تماماً وتحتوي على بعض من البيانات المُعطاة، ويقال عن طرفها الأيسر إنه الحد الأدنى للفئة في حين يُقال عن طرفها الأيمن إنه الحد الأعلى للفئة.

من التسميات الأخرى للفئة Interval أو Category أو Group.

٣-٣-١- بناء جدول التوزيع التكراري

بالرجوع إلى موضوع تمديد الجداول التكرارية فإن عملية تمديد هذه الجداول وفقاً للآلية التي ستقدمها بعد قليل تُعطينا ما يُعرف باسم "جداول التوزيع التكرارية"، ولهذه الجداول نماذج مختلفة ولكن معظم هذه الجداول تحتوي على الأعمدة المقدّمة في الجدول الآتي:

الجدول [1-7]

رقم الفئة	الحدود العملية للفئة	الحدود الفعلية للفئة	مركز الفئة	تعداد الفئة	تكرار الفئة	التكرار النسبي للفئة	التكرار المثوي للفئة	التكرار المتجمّع الصاعد للفئة
1
2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Total	-----	-----	-----	-----				المجموع

نشير هنا إلى أن الفئات لجدول التوزيع التكرارية يمكن أن تُعرض (أو تُقدّم) وفقاً لأحد نوعين من الفئات:

- جدول توزيع تكرارية تحتوي على فئات ذات أطوال مختلفة، وهذا النوع لن نقوم بدراسته في هذا الكتاب.
- جدول توزيع تكرارية تحتوي على فئات ذات أطوال متساوية، وهذا النوع من الجداول سيكون محور دراستنا في هذا الكتاب.

قبل البدء في كيفية بناء جدول التوزيع التكراري نودّ التنويه إلى أننا سنشرح بناء جدول التوزيع التكراري من أجل الحالات البسيطة التي تكون فيها قيمة المدى للبيانات كبيرة نسبياً، والأمثلة التي ستقدمها ستكون على قيم صحيحة للبيانات، وكذلك لن نتطرق إلى الحالات التي تستوجب معالجة خاصة في بناء جدول التوزيع التكراري.

الآن، ومن أجل بناء جدول توزيع تكراري نتبع الخطوات الآتية:

١- تعيين عدد فئات جدول التوزيع التكراري:

إذا قدّم لنا عدد الفئات (وليكن k فئة) الواجب استخدامها في جداول التوزيع التكراري من قبل الجهة الطالبة لدراسة المسألة الإحصائية، فإننا نلتزم بهذا العدد للفئات ولا نجري أيّ تعديل عليه إلاّ لضرورة تتطلبها شروط بناء جداول التوزيع التكرارية. لكن إذا لم يقدّم عدد الفئات الواجب دراستها فإننا نختار عدد الفئات k بحيث لا يقلّ عن خمس فئات ولا يزيد عن عشرين فئة، وذلك لأنّ جداول التوزيع التكرارية التي تحتوي على أقلّ من خمس فئات تعدّ قليلة الفائدة، وأمّا التي تحتوي على أكثر من عشرين فئة فإنّها تكون متعبة في الدراسة.

إنَّ هذه التَّوصية تتحقَّق عملياً باستخدام العلاقة [1-3] الآتية (مستخدمة في بعض البرامج الإحصائية) لحساب عدد الفئات k ما دام عدد المشاهدات (البيانات) n أكبر أو يساوي 32 مشاهدة (بطبيعة الحال من غير المرغوب تجميع البيانات في جداول توزيع تكرارية إذا كان عددها أقل من 32):

$$k = \left\lfloor 3.322 \log n \right\rfloor \quad [1-3]$$

علماً أنَّ $\lfloor x \rfloor$ هو أكبر عدد صحيح أصغر أو يساوي x ، فعلى سبيل المثال $\lfloor 5 \rfloor = 5$ وكذلك لدينا:

$$\left\lfloor 3.322 \log 31 \right\rfloor = \left\lfloor 4.9543 \right\rfloor = 4 \quad \& \quad \left\lfloor 3.322 \log 32 \right\rfloor = \left\lfloor 5.00011 \right\rfloor = 5$$

$$\left\lfloor 3.322 \log 63 \right\rfloor = \left\lfloor 5.97741 \right\rfloor = 5 \quad \& \quad \left\lfloor 3.322 \log 64 \right\rfloor = \left\lfloor 6.00013 \right\rfloor = 6$$

٢- تعيين سعة وحدود الفئات في جدول التوزيع التكراري:

بفرض أنَّه لدينا بيانات عددها n ولها مدى R وبعدد فئات k ، فعندئذٍ نحصل على سعة الفئة الفعلية (وسنرمز لها بـ C) باستخدام العلاقة الآتية:

$$C = \frac{R + \text{one measuring unit}}{k} \quad [1-4]$$

وننوه هنا إلى أنَّ سعة الفئة الناتجة عن الحساب السابق يمكن تقريبها بالزيادة قليلاً إلى قيمة أكبر بحيث تسمح لنا القيمة الجديدة للسعة بصبِّ أسهل للبيانات أو تنسيق أفضل للفئات، ولكن يجب عدم المبالغة في زيادة السعة للفئات، وذلك لأنَّ الزيادة المبالغ فيها قد تؤدي إلى توليد فئات تصبغ معها الفئات الأخيرة خارج نطاق البيانات.

٣- تعيين حدود الفئات الفعلية (أو الحقيقية) Class Boundaries:

الآن، وبعد تحديد السعة لكل الفئات الفعلية C ، فإنَّنا نقوم بتعيين حدود هذه الفئات كما يلي:

أ - نجعل الحد الأدنى لأول فئة فعلية مساوياً للقيمة الناتجة عن طرح 0.5 من أصغر قيمة في البيانات.

ب- نضيف قيمة C إلى الحد الأدنى لهذه الفئة فنحصل على الحد الأعلى للفئة الفعلية الأولى.

ج- نجعل الحد الأدنى للفئة الفعلية التالية (الثانية) مساوياً للحد الأعلى للفئة الفعلية السابقة (الأولى)، ومن ثمَّ نضيف قيمة C إلى الحد الأدنى لهذه الفئة فنحصل على الحد الأعلى للفئة الفعلية الثانية.

د- نقوم بتطبيق الفقرة السابقة (ج) من أجل جميع الفئات المتبقية فنحصل على الحدود الدنيا والعليا للفئات الفعلية لجدول التوزيع التكراري.

٤- تعيين حدود الفئات العملية (أو التجريبية) Class Limits:

يُعيَّن الحد الأدنى للفئة العملية ذات الرقم i من خلال إضافة نصف وحدة قياس إلى الحد الأدنى للفئة الفعلية ذات الرقم i من أجل كل $i = 1, 2, \dots, k$ (لاحظ هنا أنَّ الحد الأدنى لأول فئة عملية سيقابض أصغر قيمة في البيانات المُعطاة)، وأمَّا الحد الأعلى للفئة العملية ذات الرقم i فإنَّه يُعيَّن من خلال طرح نصف وحدة قياس من الحد الأعلى للفئة الفعلية ذات الرقم i .

تجدد الإشارة هنا إلى الملاحظات الآتية:

أ- إنَّ عملية صبِّ البيانات في جدول توزيع تكراري تتمُّ في الفئات الفعلية حصراً لأنَّه لدى عملية تحصيل البيانات سيكون لدينا خطأ مرتكب من وسائل القياس المعتمدة (مهما بلغت من دقة) قد لا تصل إلى القيمة الحقيقية لقياس المشاهدة، ولذلك تمَّ الاتفاق على أن نصف وحدة الدقة المعتمدة في القياس ستغطي هذا الخطأ زيادةً أو نقصاناً، بمعنى أنه بهذه العملية سيغطي أكبر خطأ محتمل لدى أخذ البيانات، ولهذا السبب سميت هذه الفئات بالفئات الفعلية.

ب- إذا وافقت قيمة x من قيم البيانات الحد الأدنى لفئة فعلية فإنَّها تفرغ في هذه الفئة، وأمَّا إذا وافقت هذه القيمة الحد الأعلى للفئة الفعلية فإنَّها تفرغ في الفئة الفعلية التالية، ولهذا السبب سنكتب (وعلى سبيل التوضيح) الفئة الفعلية التي حدّها الأدنى a وحدّها الأعلى b بالشكل $a \rightarrow b$ للدلالة على أن القيمة b لا تتبع هذه الفئة وإنما تتبع الفئة الفعلية التالية.

ج- وفقاً لاستخدام العلاقة [1-4] في تعيين سعة الفئة قد يحصل أن قيمة x أو أكثر من قيم البيانات تساوي الحد الأعلى للفئة الفعلية الأخيرة، فإذا وافقت القيم المتبقية الحد الأعلى للفئة الفعلية الأخيرة فإنَّنا نقوم بتحميلها في الفئة الفعلية الأخيرة.

د- من أجل فئة فعلية حدّها الأدنى a وحدّها الأعلى b ستكون للفئة العملية الموافقة حدّ أدنى α قيمته تزيد على a بمقدار نصف وحدة الدقة المعتمدة، وأمَّا حدّها الأعلى β فإنَّه سينقص عن b بمقدار نصف وحدة الدقة المعتمدة، ولذلك تكتب الفئة العملية بالشكل $\alpha - \beta$ (بدون سهم \rightarrow) للدلالة على أنه من أجل هذا النوع من الفئات يكون كل من الحد الأدنى والأعلى منتمياً لها.

هـ- عندما يقدم جدول توزيع تكراري لمجموعة بيانات (أي أن البيانات الخام التي صُبَّت فيه ليست ظاهرة - خفية-) فإنَّه يمكن الاستغناء عن العمود الخاص بالفئات العملية لعدم الحاجة له في أية دراسة لاحقة تتعلق بهذا الجدول.

و- إذا حصل لدينا فئات فعلية خالية من البيانات عند عملية صبِّ البيانات فإنَّنا نقوم بتغيير عدد الفئات (وغالباً بزيادة عددها) حتى تختفي جميع الفئات الخالية. بالطبع سيرافق هذا التغيير لعدد الفئات تغيير في سعتها أيضاً، ولذلك يجب الانتباه في حال التعديل على السعة الجديدة ألا يؤدي ذلك إلى فئات خالية من البيانات أيضاً.

٤- تعيين مراكز الفئات Class Centers:

إنَّ مركز الفئة يساوي نصف مجموع حدِّها الأعلى والأدنى (أية فئة كانت العملية أو الفعلية)، ويُنظر إلى هذه القيمة (أي إلى مركز الفئة) على أنها الممثل لكل البيانات التي ستنتهي إلى هذه الفئة، ولذلك سوف نلاحظ أن لهذه القيمة دوراً مهماً جداً لدى حساب القيم العددية المميزة للبيانات المجمعة في جداول توزيع تكرارية.

٥- تدوين التعدادات للفئات Class Tallies:

لقد قمنا سابقاً بشرح تدوين التعدادات من أجل الجداول التكرارية، وهنا يستخدم ذلك الشرح بآلية مماثلة، ولكن هنا يرسم خط من أجل كل قيمة بيان تنتمي إلى الفئة الفعلية (وليس إلى الفئة العملية)، وأخيراً نشير إلى أن هذا العمود يستخدم عندما يكون لدينا عملية صبّ لبيانات خام (بيانات كمية) في جدول توزيع تكراري، وفيما عدا ذلك لا ضرورة لهذا العمود ضمن جدول التوزيع التكراري حيث يمكن حذفه (أو الاستغناء عنه).

٦- تعيين قيم التكرارات للفئات Frequencies of Classes:

لقد قمنا سابقاً بشرح تعيين قيم التكرارات للفئات من أجل الجداول التكرارية، ويستخدم ذلك الشرح من أجل جداول التوزيع التكرارية وفقاً للآلية نفسها.

٧- تعيين قيم التكرارات النسبية للفئات Relative Frequencies of Classes:

لقد قمنا سابقاً بشرح طريقة تعيين قيم التكرارات النسبية للفئات من أجل الجداول التكرارية، وتستخدم تلك الطريقة نفسها من أجل جداول التوزيع التكرارية أيضاً.

٨- تعيين قيم التكرارات المئوية للفئات Percentile Frequencies of Classes:

لقد قمنا سابقاً بشرح طريقة تعيين قيم التكرارات المئوية للفئات من أجل الجداول التكرارية، وتستخدم تلك الطريقة نفسها من أجل جداول التوزيع التكرارية أيضاً.

٩- تعيين قيم التكرارات المتجمعة الصاعدة للفئات:

Ascending Cumulative Frequencies of Classes

العمود التالي والأخير من جدول التوزيع التكراري هو عمود التكرارات المتجمعة الصاعدة، وتدوّن القيم في هذا العمود على النحو الآتي:

مقابل الفئة الأولى يدوّن تكرار الفئة الأولى نفسه (ويُدعى التكرار المتجمّع الصاعد للفئة الأولى) لأنه يمثل كل التكرارات التي أقل من حدّها الأعلى. أمّا مقابل الفئة الثانية فيتمّ تدوين حاصل مجموع التكرارين للفئتين الأولى والثانية (ويُدعى التكرار المتجمّع الصاعد للفئة الثانية) وهو يمثل كل التكرارات التي أقل من حدّها الأعلى. يدوّن مقابل الفئة الثالثة حاصل مجموع التكرارات للفئات الأولى والثانية والثالثة (ويُدعى التكرار المتجمّع الصاعد للفئة الثالثة) وهو يمثل كل التكرارات التي أقل من حدّها الأعلى، وهكذا دواليك حتى الانتهاء من جميع الفئات. إن القيم المدوّنة في هذا العمود تدعى التكرارات المتجمعة الصاعدة.

١-٣-٤- مثال

البيانات الآتية تمثّل عدد الأميال المقطوعة لكل لتر من البنزين لثلاثين سيارة حديثة.

12	16	15	12	19	17	20	16	14	13
12	20	12	15	20	14	16	15	12	18
20	18	16	14	12	20	18	16	14	12
16	17	16	15	16	18	15	16	15	14

والمطلوب صبّ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري.

الإجابة: بسبب كبر نموذج جدول التوزيع التكراري (كجدول نموذجي للتدريب) سنقوم (وعلى سبيل التوضيح) بتجزئة الجدول إلى جدولين.

لدينا أكبر وأصغر قيمة في البيانات هما $x_l = 20$ و $x_s = 12$ على الترتيب، ومن ثم نجد باستخدام العلاقة [1-2] أن المدى للبيانات المُعطاة يساوي:

$$R = x_l - x_s = 20 - 12 = 8$$

والآن لتعيين عدد الفئات نلاحظ أنه لدينا 30 مشاهدة، ومن ثم باستخدام العلاقة [1-3] يكون عدد الفئات لجدول التوزيع التكراري المطلوب هو:

$$k = \left\lceil 3.322 \log 40 \right\rceil = \left\lceil 5.322 \right\rceil = 5$$

ومن ثم بحسب العلاقة [1-4] تكون سعة الفئة لجدول التوزيع التكراري المطلوب هي:

$$C = \frac{R+1}{k} = \frac{9}{5} = 1.8$$

من أجل اختيار السعة المناسبة للفئات الفعلية لنمعن النظر في الجدول الآتي:

الجدول [1-8]

من أجل C=1.8		من أجل C=2	
الحد الأدنى للفئة	الحد الأعلى للفئة	الحد الأدنى للفئة	الحد الأعلى للفئة
11.5	13.3	11.5	13.5
13.3	15.1	13.5	15.5
15.1	16.9	15.5	17.5
16.9	18.7	17.5	19.5
18.7	20.5	19.5	21.5

لاحظ أنه لو استخدمنا السعة $C = 1.8$ للفئات فإننا ستمكن من صبّ جميع البيانات المُعطاة، ولكن بزيادة سعة الفئة إلى القيمة 2 فإن حدود الفئات ستصبح أكثر تناسقاً.

والآن باتباع الخطوات التي قمنا بشرحها سابقاً فإننا سنميز البيانات التي سيتم صبّها باستخدام لون خاص لكل فئة (وذلك على سبيل التوضيح فقط) فيكون لدينا العرض الآتي للبيانات المُعدة للصبّ:

12	16	15	12	19	17	20	16	14	13
12	20	12	15	20	14	16	15	12	18
20	18	16	14	12	20	18	16	14	12
16	17	16	15	16	18	15	16	15	16

وبصبّ هذه البيانات سنحصل على جدول التوزيع التكراري الآتي الذي يحتوي على الفئات الفعلية، الفئات العملية، مراكز الفئات، التعدادات والتكرارات:

الجدول [1-9-a]

رقم الفئة	الحدود العملية للفئة	الحدود الفعلية للفئة	مركز الفئة	تعداد الفئة	تكرار الفئة
1	12 – 13	11.5 → 13.5	12.5	### III	8
2	14 – 15	13.5 → 15.5	14.5	### ###	10
3	16 – 17	15.5 → 17.5	16.5	### ### II	12
4	18 – 19	17.5 → 19.5	18.5	###	5
5	20 – 21	19.5 → 21.5	20.5	###	5
Total	-----	-----	----	-----	40

وأما من أجل جدول التوزيع التكراري الذي يحوي التكرار النسبي، المئوي والمتجمّع الصاعد فإننا سنكون بحاجة إلى عمود الفئات الفعلية والتكرارات، فيكون لدينا الجدول الآتي.

الجدول [1-9-b]

رقم الفئة	الحدود الفعلية للفئة	تكرار الفئة	التكرار النسبي للفئة	التكرار المئوي للفئة	التكرار المتجمّع الصاعد للفئة
1	11.5 → 13.5	8	$8/40 = 0.20$	$0.20 \times 100 = 20\%$	8
2	13.5 → 15.5	10	$10/40 = 0.25$	$0.25 \times 100 = 25\%$	8+10=18
3	15.5 → 17.5	12	$12/40 = 0.30$	$0.30 \times 100 = 30\%$	8+10+12=30
4	17.5 → 19.5	5	$5/40 = 0.125$	$0.125 \times 100 = 12.5\%$	8+10+12+5=35
5	19.5 → 21.5	5	$5/40 = 0.125$	$0.125 \times 100 = 12.5\%$	8+10+12+5+5=40
Total	-----	40	1	100 %	المجموع

١-٣-٥- ملاحظة

بما أن التعدادات تستخدم عند صبّ البيانات فقط، فإنه إذا كانت قيم التكرارات معلومة فعندئذٍ يمكن استنتاج قيم التكرارات النسبية والتكرارات المئوية عند اللزوم، ولذلك تحذف الأعمدة الخاصة بالتعدادات والتكرارات النسبية والتكرارات المئوية من جداول التوزيع التكرارية، وكذلك سنلاحظ لاحقاً أن العروض البيانية وحساب القيم العددية المميزة لبيانات جداول التوزيع التكرارية تعتمد على الفئات الفعلية فقط، ولذلك يحذف العمود الخاص بالفئات العملية من جداول التوزيع التكرارية مالم تكن هناك عملية صبّ لبيانات خام في الجدول. لذلك سنستخدم لاحقاً جداول توزيع تكرارية لها العرض المختزل الآتي:

الجدول [1-10]

رقم الفئة	الحدود الفعلية للفئة	مركز الفئة	تكرار الفئة	التكرار المتجمّع الصاعد للفئة
1	$a_0 \rightarrow a_1$	x_1	f_1	$F_1 = f_1$
2	$a_1 \rightarrow a_2$	x_2	f_2	$F_2 = f_1 + f_2$
⋮	⋮ ⋮ ⋮	⋮	⋮	⋮ ⋮ ⋮ ⋮
k	$a_{k-1} \rightarrow a_k$	x_k	f_k	$F_k = f_1 + f_2 + \dots + f_k$
Total	-----	-----	$\sum f_i$	المجموع

فعلی سبیل التوضیح يُعرض جدول التوزيع التكراري لبيانات المثال السابق بشكله المختزل على النحو الآتي:

رقم الفئة	الحدود الفعلية للفئة	مركز الفئة	تكرار الفئة	التكرار المتجمّع الصاعد للفئة
1	11.5 → 13.5	12.5	8	8
2	13.5 → 15.5	14.5	10	18
3	15.5 → 17.5	16.5	12	30
4	17.5 → 19.5	18.5	5	35
5	19.5 → 21.5	20.5	5	40
Total	-----	-----	40	المجموع

التمثيلات البيانية لجدول التوزيعات التكرارية

Graphical Representations of Frequency Distributions Tables

في كثير من الحالات يكون التعامل مع جداول التوزيع التكرارية أمراً شاقاً، وخاصة إذا كان عدد الفئات كبيراً، لذلك يحاول المرء عرض نتائجه من خلال أشكال بيانية مناسبة يسهل معها فهم طبيعة وسلوك بيانات هذه الجداول. من النماذج المستخدمة في هذه العروض البيانية النموذج الآتي.

١-٤-١-١-١ المدرج التكراري Histogram

ينظر إلى المدرجات التكرارية على أنها من الأشكال البيانية المفيدة في تمثيل بيانات الجداول التكرارية، ويتميز بسهولة وبساطته. يتكوّن المدرج التكراري من مستطيلات متلاصقة ترسم فوق الفئات الفعلية للبيانات وبحيث يكون ارتفاع كل مستطيل متناسباً مع قيمة التكرار للفئة التي رُسم عليها، حيث تُمثّل الفئات الفعلية على المحور الأفقي (المحور OX)، وأما على المحور العمودي عليه (أي المحور الرأسي OY) فيتمّ تدوين قيم التكرارات للفئات الفعلية.

في الواقع يُمكننا الرسم البياني للمدرج التكراري من معرفة شكل توزيع البيانات وانتشارها وأين تتمركز البيانات بشكل سريع وسهل، والمثال الآتي يوضح لنا ذلك.


١-٤-١-١-١ مثال

ليكن لدينا جدول التوزيع التكراري الآتي:

الجدول [1-11]

رقم الفئة	الحدود الفعلية للفئة	مركز الفئة	تكرار الفئة	التكرار المتجمّع الصاعد للفئة
1	10 → 20	15	4	4
2	20 → 30	25	12	16
3	30 → 40	35	14	30
4	40 → 50	45	10	40
5	50 → 60	55	6	46
6	60 → 70	65	4	50
Total	-----	-----	50	المجموع

والآن لرسم المدرج التكراري نقوم برسم أعمدة مستطيلة فوق الفئات الفعلية بحيث يكون ارتفاع كل مستطيل يساوي تكرار الفئة التي رُسم عليها، فنحصل على الشكل [1-7-a] للمدرج التكراري.




الشكل [1-9-a]

١-٤-٢- المصّلع التكراري Frequency Polygon

تعدّ المصّلعات التكرارية من الأشكال البيانية المهمة في تمثيل البيانات الكميّة أيضاً، وهو رسم بيانيّ مكوّن من محورين متعامدين حيث تمثّل الفئات الفعلية على المحور الأفقي (المحور OX) في حين تدوّن قيم التكرارات للفئات الفعلية على المحور الرأسي (المحور OY)، ويتمّ تشكيل هذا المصّلع من خلال الوصل بقطع مستقيمة بين تلك النقاط التي إحداثياتها على محور الفئات هي مراكز الفئات، وأمّا إحداثياتها على محور التكرارات فهي قيم التكرارات المقابلة لتلك الفئات، وبعد ذلك إغلاق هذا المصّلع الناتج إلى محور الفئات من خلال وصل بداية المصّلع الناتج إلى مركز فئة افتراضية (وهيئة) سابقة لأول فئة تكرارها معدوم، وبعد ذلك وصل نهاية هذا المصّلع إلى مركز فئة افتراضية (وهيئة) لاحقة بأخر فئة تكرارها معدوم أيضاً.

على سبيل المثال لو رجعنا إلى المثال السابق (١-٤-١) نجد أنّ المصّلع التكراري لبيانات جدول التوزيع التكراري المعطى له الشكل الآتي.



الشكل [1-9-b]

أخيراً نشير إلى أنّه توجد حالات يغلق فيها المصّلع الناتج إلى بداية الفئة الأولى ونهاية الفئة الأخيرة إلا أنّنا لن نتطرق إلى النقاش الخاص بهذه الحالة.

١-٤-٣- مضع التكرار المتجمع الصاعد

Ascending Cumulative Frequency Polygon (ACFP)


لرسم مضع التكرار المتجمع الصاعد نقوم برسم محورين متعامدين، ومن ثمَّ يُمثَّل على المحور الأفقي الفئات الفعلية في حين يُمثَّل على المحور الرأسي التكرارات المتجمعة الصاعدة، وبعد ذلك تُعيَّن مجموعة نقاط على النحو الآتي:

النقطة الأولى مسقطها على المحور الأفقي هو الحد الأعلى للفئة الفعلية الأولى، ومسقطها على محور التكرارات يساوي قيمة التكرار المتجمع الصاعد للفئة الفعلية الأولى.

النقطة الثانية مسقطها على المحور الأفقي هو الحد الأعلى للفئة الفعلية الثانية، ومسقطها على محور التكرارات يساوي قيمة التكرار المتجمع الصاعد للفئة الفعلية الثانية.

وهكذا دواليك حتى يتمَّ تعيين النقطة الأخيرة التي مسقطها على المحور الأفقي هو الحد الأعلى للفئة الفعلية الأخيرة، ومسقطها على محور التكرارات يساوي قيمة التكرار المتجمع الصاعد للفئة الفعلية الأخيرة. بعد ذلك نصل بقطع مستقيمة بين النقاط التي تمَّ تعيينها آنفاً، وأخيراً نقوم بإغلاق بداية المضع الناتج إلى بداية الفئة الأولى فقط دون إغلاقه من اليمين (أي أنه يغلق من طرف واحد فقط).

على سبيل المثال لو رجعنا إلى المثال (١-٤-١-١) فإننا نجد لمضع التكرار المتجمع الصاعد لتلك البيانات الشكل الآتي.



الشكل [1-9-c]

١-٤-٤- المنحنى التكراري Frequency Curve


إنَّ هذه الطريقة تماثل طريقة العرض باستخدام المضلعات التكرارية من حيث تعيين النقاط التي سيمرُّ منها الرسم البياني، ولكنَّ الإغلاق من اليسار يكون إلى بداية الفئة الفعلية الأولى، في حين يكون الإغلاق من اليمين إلى نهاية الفئة الفعلية الأخيرة، ونحصل على هذا المنحنى من خلال تمهيد الخط المنكسر ليصبح منحنياً وفقاً لإحدى الطرائق الآتية:

١- جعل الفترات التي تبني عليها هذا الخطوط المنكسرة قصيرة جداً مع زيادة عددها بشكل كبير جداً، ولذلك فإن هذه الطريقة نادرة الاستخدام في المجالات التطبيقية.

٢- التمهيد اليدوي للخطوط المستقيمة لتصبح منحنية وملائمة عند مرورها بالنقاط الممثلة للبيانات، وهذه الطريقة قليلة الاستخدام أيضاً لأنها تحتاج إلى مهارة في الرسم.

٣- استخدام التمهيد الشرائحي Spline من الدرجة الثانية أو الثالثة، ومن ثم النظر أيهما أنسب للعرض وأقل تناقضاً مع واقع البيانات، وهذه الطريقة تعطينا نتائج ممتازة لعملية التمهيد وهي متوفرة في بعض البرامج الإحصائية، ومنها برنامج Curve Expert.

على سبيل المثال لو رجعنا إلى المثال السابق (١-٤-١) نجد أن المنحني التكراري لبيانات جدول التوزيع التكراري المعطى له الشكل الآتي.



الشكل [1-9-d]

أشكال التوزيعات التكرارية


Shapes of Frequency Distributions

في الواقع توجد أشكال عديدة للتوزيعات التكرارية، وشكلها يتبع طبيعة انتشار البيانات ونزوعها نحو قيمة أو موضع ما، وهذه الأشكال تعطي دلالات هامة عن المؤثرات التي خضعت لها البيانات. في هذه الجزئية سوف لن نخوض بعيداً في هذه المسائل ولكن سنعرض بشكل موجز وبسيط أهم التوصيفات التي تذكر بها الأشكال البيانية للتوزيعات التكرارية، وسنبداً بالفقرة الآتية.


١-٥-١- التوزيعات ذات المناويل Distributions that have Modes

يمكن للمرء التمييز بين نوعين من التوزيعات هما:

١- توزيعات تملك قمة (أو ذروة) واحدة، وهذه التوزيعات تُدعى توزيعات أحادية المنوال، والعرضين الآتيين يوضحان ذلك.




الشكل [1-10-a]




الشكل [1-10-b]

٢- توزيعات تملك أكثر من قمة (أو ذروة)، وهذه التوزيعات تُدعى توزيعات متعددة المناويل.



الشكل [1-11-a]




الشكل [1-11-b]


٢-٥-١- الالتواء والتناظر لتوزيع تكراري

Skewness and Symmetry of Frequency Distributions

يُقال عن توزيع تكراري إنه متناظر إذا انطبق على نفسه تمام الانطباق لدى طيه على محور مارٍ من منتصف قاعدته، وفي حال عدم تحقق الانطباق التام فإنه يُقال عن التوزيع التكراري إنه ملتوٍ، والعروض الآتية توضح لنا ذلك.




الشكل [1-12-a]




الشكل [1-12-b]

توزيعان تكراريان متناظران (أو متماثلان) Symmetric Frequency Distributions



توزيع تكراري ملتو نحو اليمين

الشكل [1-13-a]



توزيع تكراري ملتو نحو اليسار

الشكل [1-13-b]


٢-٥-١- التدبب والتفطح لتوزيع تكراري

Sputtering and Flattening of Frequency Distributions

تصنّف التوزيعات التكرارية في ثلاثة أنواع (انظر الشكل الآتي [1-14]) هي:

أ- التوزيعات المدببة ب- التوزيعات المعتدلة ج- التوزيعات المنبسطة

علماً أنّ مفهوم الاعتدال للتوزيعات بُنيّ على مدى تقارب شكله من شكل دالة الكثافة للتوزيع الطبيعي المعياري (سنأتي على ذكر دالة الكثافة للتوزيع الطبيعي المعياري في الفصل الأخير)، وأما من أجل الحكم على تدبب أو تفطح توزيع تكراري ما فإننا نحتاج لمعيّار مُحدّد لن نتطرق إليه هنا.



الشكل [1-14]

٣-٥-١- تفسير شكل التوزيع

في الواقع يمكن تقديم بعض التفسيرات لأشكال التوزيعات، ومنها:

١- إذا كان للتوزيع التكراري شكل متناظر معتدل فإن ذلك يعني أنّ البيانات تتوزع طبيعياً على وجه التقريب، وأنّ الأخطاء المرتكبة لدى عملية القياس هي على الغالب أخطاء عشوائية (غير متعمّدة).

٢- إذا كان للتوزيع التكراري عدّة مناويل فإنّ ذلك يدلُّ على وجود عدّة أسباب فاعلة ومؤثّرة في التجربة (أو المسألة) المولدة للبيانات، وعادة يكون عدد هذه الأسباب الفاعلة والمؤثّرة مساوياً لعدد المناويل في التوزيع.

٣- إذا كان للتوزيع التكراري شكل ملتوٍ نحو اليمين فإنّ ذلك يعني على الغالب تنفيذ عمليات فرز بشأن البيانات بحيث يستثنى منها البيانات التي تقل عن مقدار محدّد تفرضه طبيعة الدراسة الإحصائية، وأمّا إذا كان شكل التوزيع ملتوٍ نحو اليسار فإنّ ذلك يعني على الغالب تنفيذ عمليات فرز بشأن البيانات بحيث يستثنى منها البيانات التي تزيد عن مقدار محدّد تفرضه طبيعة الدراسة الإحصائية.

٤- إذا كان شكل التوزيع التكراري منبسّطاً فإنّ ذلك يعني على الغالب تنفيذ عمليات فرز بشأن البيانات بحيث يُستثنى منها البيانات التي تقل وتزيد عن قيمة محدّدة تفرضها طبيعة الدراسة الإحصائية، وكذلك يدلُّ على أنّ البيانات تتبعثر بعيداً عن قيمة المتوسط لهذه البيانات وذلك تبعاً لمقدار تفرطح (أو تفلطح) هذا التوزيع.



- ١- وضح الفرق بين العينة الإحصائية والمجتمع.
- ٢- لماذا نحتاج إلى تبويب (أو صب) البيانات في جداول تكرارية، وضح ذلك بالتفصيل.
- ٣- صنف المتغيرات الآتية من حيث كونها متغيرات كمية أو متغيرات نوعية:
 - أ- عدد الطلاب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
 - ب- فصيلة الدم لعينة مكونة من 50 طالباً.
 - ج- أنواع التمور في مزرعة معينة.
 - د- جنسية مجموعة من الأشخاص يعيشون بالمملكة العربية السعودية.
 - هـ- تقديرات مجموعة من الطلاب في مقرر الفيزياء.
 - و- عدد الكيلومترات التي يقطعها الطلاب للذهاب إلى جامعة الملك سعود.
 - ز- أعمار الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز.
 - ح- عدد الوجبات الغذائية المقدمة في مطعم معين في يوم ما.
 - ك- مستوى الخدمة المقدم من فندق معين في مكة المكرمة.
- ٤- حدد فيما إذا كانت العبارات الآتية صحيحة أم خاطئة:
 - أ- العمر يعدّ مثلاً على متغير نوعي.
 - ب- عدد الكليات في جامعة الملك سعود يعدّ متغيراً متقطعاً.
 - ج- عدد الدقائق التي يقطعها الطالب للوصول إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعدّ متغيراً متصلاً.
 - د- لا يوجد علاقة بين المجتمع الإحصائي والعينة الإحصائية.
 - هـ- المتغير الذي يمكن تمثيل قيمه على شكل فترات يسمى متغير نوعي.
- ٥- عدد أنواع البيانات الإحصائية، ومن ثمّ اذكر مثلاً على كل نوع منها.
- ٦- ليكن لدينا جدول التوزيع التكراري الآتي:

رقم الفئة	الفئات الفعلية	مراكز الفئات	التكرار	التكرار المتجمع الصاعد
1	10 – 14	12	2	2
2	14 – 18	16	4	6
3	18 – 22	20	8	14
4	22 – 26	24	16	30
5	26 – 30	28	10	40
Total			40	

والمطلوب ما يلي:

أ- رسم المدرج التكراري لبيانات هذا الجدول.

- ب- رسم المضع التكراري لبيانات هذا الجدول.
 ج- رسم مضع التكرار المتجمع الصاعد لبيانات هذا الجدول.
 د- رسم المنحني التكراري لبيانات هذا الجدول مستخدماً التمهيد باليد.
 ٧- ليكن لدينا جدول التوزيع التكراري الآتي:

الفئات الفعلية	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	المجموع
التكرار	4		16			4	50
التكرار النسبي		0.12					
التكرار المئوي				24 %			
التكرار المتجمع الصاعد					46		

والمطلوب إكمال معطيات هذا الجدول.

- ٨- أخذت عينة مكونة من 100 شخص وتم تصنيفهم حسب عدد مرات الذهاب لنادي رياضي معين خلال شهر، فكانت النتائج كما في جدول التوزيع التكراري الآتي:

عدد مرات الذهاب إلى النادي	عدد الأشخاص
0 – 3	23
4 – 7	40
8 – 11	28
12 – 14	6
16 – 18	3
Total	100

والمطلوب ما يلي:

- أ- قم بتمديد هذا الجدول بحيث يحتوي على التكرارات النسبية والمئوية.
 ب- ما هي نسبة الأشخاص الذين يذهبون إلى النادي سبع مرات على الأكثر خلال الشهر؟
 ٩- أخذت عينة عشوائية من إحدى المدارس مكونة من 50 طالباً، وقُرأت قيمة الوزن لكل واحد منهم (مقدرةً بالكيلوجرام)، فكانت لدينا النتائج الآتية:

30	34	27	23	33	33	26	25	24	28
21	26	31	22	27	33	27	23	28	21
31	35	34	22	26	25	23	35	31	27
30	34	27	22	27	33	23	35	31	27
34	22	26	33	33	26	27	23	22	27

والمطلوب ما يلي:

- أ- صب هذه البيانات في جدول توزيع تكراري.

تمارين

- ب- رسم المدرج التكراري، المضلع التكراري ومضلع التكرار المتجمع الصاعد لبيانات هذا الجدول.
ج- باستخدام مضلع التكرار المتجمع الصاعد للبيانات قدر التكرار المتجمع الصاعد للقيمة 25.5.
د- حدد شكل التوزيع من حيث كونه متماثلاً أم لا.

١٠- البيانات الآتية تمثل عينة نتائج استبيانات مُصنّفة في ثلاثة أنواع A، B و C كما يلي:

B	C	A	B	C	A	C	C	A	B
C	C	B	C	B	C	B	C	C	C
C	B	C	C	B	A	C	C	C	B

والمطلوب ما يلي:

- أ- صب هذه البيانات في جدول تكراري تظهر فيه التكرارات، التكرارات النسبية والتكرارات المئوية.
ب- تقديم العرض الشرائطي (بالأعمدة) لهذه البيانات.

١١- أُخذت عينة مكونة من 80 شخصاً، وسُئل كل واحد منهم عن آخر مؤهل علمي حصل عليه فكانت النتائج موضحة كما في الجدول الآتي:

مستوى التعليم	ابتدائي	متوسط	ثانوي	جامعي	دراسات عليا	المجموع
عدد الأشخاص	10	16	18	30	6	80

والمطلوب تمثيل بيانات هذا الجدول باستخدام القطاعات الدائرية.

١٢- من أحد الحقول الزراعيّة تم أخذ عينة مكونة من 40 زهرة وتمّ تصنيف هذه الزهور بحسب اللون، فكانت لدينا النتائج الآتية:

أصفر	أحمر	أبيض	أصفر	أصفر	أحمر	أبيض	بنفسجي
أصفر	أبيض	أحمر	بنفسجي	أصفر	أصفر	أحمر	بنفسجي
أحمر	أصفر	أبيض	أصفر	بنفسجي	أحمر	أبيض	أصفر
أصفر	أحمر	بنفسجي	أحمر	أصفر	أحمر	أبيض	أبيض
أصفر	أبيض	أصفر	بنفسجي	أصفر	أحمر	أصفر	بنفسجي

والمطلوب ما يلي:

- أ- صب هذه البيانات في جدول تكراري يظهر فيه التكراري النسبي والمئوي لهذه البيانات.
ب- تمثيل هذه البيانات بالعرض الشرائطي (بالأشرطة الأفقية).
ج- تمثيل هذه البيانات بالقرص الدائري وموضحة قيم زوايا القطاعات الدائرية الناتجة.
د- ما هي نسبة الزهور الحمراء؟

١٣- الجدول الآتي يوضح وقت الانتظار (بالدقائق) في طوارئ أحد المستشفيات لعينة من المرضى.

عدد المرضى	وقت الانتظار
5	0 → 7
15	7 → 14
20	14 → 21
15	21 → 28
5	28 → 35
Total	

بناءً على معطيات الجدول السابق اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

- سعة (أو طول) الفئة لبيانات الجدول هي: 8 ، 7 ، 6 أو 5.
- مركز الفئة الثالثة هو: 15.5 ، 16.5 ، 17.5 أو 19.5.
- الحد الأدنى للفئة العملية الثانية هو: 6 ، 6.5 ، 7 أو 7.5.
- الحد الأعلى للفئة العملية الثالثة هو: 19.5 ، 20 ، 20.5 أو 21.5.
- التكرار النسبي للفئة الرابعة هو: 0.20 ، 0.22 ، 0.25 أو 0.27.
- حجم العينة هو: 48 ، 58 ، 60 أو 65.
- التكرار النسبي المتوي للفئة الأخيرة هو: 7.8 ، 8.3 ، 8.5 أو 9.2.
- التكرار المتجمّع الصاعد للفئة الأولى هو: 0 ، 5 ، 15 أو 20.
- توزيع هذه البيانات: ملتو نحو اليمين، ملتو نحو اليسار أم متناظر.
- توزيع هذه البيانات: أحادي المنوال، ثنائي المنوال أم لا منوال له.

١٤- الجدول الآتي يعطينا مبيعات شركتين A و B (مقدرة بالملايين) خلال خمسة أشهر.

الشهر	مبيعات الشركة A	مبيعات الشركة B
يناير	5.6	3.8
فبراير	4.7	3.3
مارس	3.9	2.8
إبريل	4.5	3.5
مايو	6.1	4.2

والمطلوب ما يلي:

- مثل بيانات مبيعات الشركة A باستخدام العرض النقطي.
- مثل بيانات مبيعات الشركة B باستخدام الشرائط العمودية.
- مثل البيانات السابقة باستخدام الأعمدة البيانية المزدوجة

١٥- الجدول الآتي يمثل مبيعات أحد المقاهي بالريال خلال فترتين من اليوم ولمدة أسبوع كامل.

اليوم	مبيعات الفترة الأولى	مبيعات الفترة الثانية	المبيعات الكلية
السبت	530	150	680
الأحد	670	270	940
الاثنين	550	160	710
الثلاثاء	630	250	880
الأربعاء	620	230	850
الخميس	740	490	1230
الجمعة	850	530	1380

والمطلوب ما يلي:

أ- مثل بيانات مبيعات الفترة الثانية باستخدام الشرائط العمودية.

ب- مثل البيانات السابقة باستخدام الأعمدة البيانية المزدوجة

١٦- البيانات الآتية تمثل عدد الكيلومترات التي يقطعها أربعون مهندساً للوصول إلى مقر عملهم.

5	3	10	20	25	11	13	7	12	31
19	10	12	17	18	11	32	17	16	2
7	9	7	8	3	5	12	15	18	3
12	14	2	9	6	15	15	7	6	12

والمطلوب ما يلي:


أ- مثل البيانات المعطاة باستخدام العرض النقطي.

ب- صب هذه البيانات في جدول توزيع تكراري تكون فيه الفئة الفعلية الأولى هي 5 - 0.

ج- كم عدد المهندسين الذين يقطعون 20 كيلو متر على الأكثر للوصول إلى مقر عملهم؟

د- كم عدد المهندسين الذين يقطعون 15 كيلو متر على الأقل للوصول إلى مقر عملهم؟

١٧- لتكن لدينا بيانات مقدّمة من خلال العرض البياني الآتي:




والمطلوب ما يلي:

أ- قم ببناء جدول التوزيع التكراري لهذه البيانات.

- ب- ارسم المضلع التكراري ومضلع التكرار المتجمّع الصاعد لهذه البيانات.
ج- هل يوحي هذا الشكل إلى أن توزيع البيانات متناظر تماماً، ولماذا؟


١٨- لتكن لدينا بيانات مقدّمة من خلال العرض البياني الآتي:



والمطلوب ما يلي:

- أ- قم ببناء جدول التوزيع التكراري لهذه البيانات.
ب- ارسم المدرج التكراري ومضلع التكرار المتجمّع الصاعد لهذه البيانات.
ج- إلى أية جهة يلتوي فيها شكل توزيع البيانات؟

١٩- لتكن لدينا بيانات مقدّمة من خلال العرض البياني الآتي:




والمطلوب ما يلي:

- أ- قم ببناء جدول التوزيع التكراري لهذه البيانات.
ب- ارسم المدرج التكراري والمضلع التكراري لهذه البيانات.
ج- هل يوحي لك هذا الشكل إلى وجود التواء في توزيع البيانات، ولماذا؟

الفصل الثاني

مقاييس الموضع للبيانات Location Measures of Data



المقدمة:

لقد لاحظنا أنّ طرائق العرض البيانية لها أهمية خاصة عند تقديم المعلومات الإحصائية فهي تُعطي وصفاً عاماً وسريعاً للبيانات الإحصائية، إلا أنّ فوائدها الاستقرائية تبقى قليلة، فإذا نظرنا إلى المضلع التكراري لمجموعة بيانات عينة فإنه يعطينا تصوراً عن شكل المضلع التكراري لهذه البيانات، واستقراؤها له يقف عند الفرض أنّه يوجد تشابه ما بين المضلع الممثل لهذه البيانات والمضلع الممثل لمجتمع البيانات التي أخذت منه هذه العينة، ولذلك كان لا بدّ من تقديم معايير عددية تحدّد لنا وبدقة سلوك البيانات. من المعايير التي تقوم بهذه المهمة ما يُعرّف باسم «مقاييس الموضع» وعلى وجه الخصوص مقاييس النزعة المركزية (والتي تعدّ جزءاً من مقاييس الموضع).

■ ٢ - ١ - مقاييس النزعة المركزية

■ ٢ - ٢ - الربيعيات

■ ٢ - ٣ - المئينات

■ ٢ - ٤ - الأعداد الخمسة والتمثيل الصندوقي للبيانات

مقاييس النزعة المركزية

Measures of Central Tendency

في الواقع لكل مجتمع إحصائي معالم Parameters تميزه، وعادة تكون هذه المعالم مجهولة كلياً أو جزئياً، ولكي نتمكن من دراسة المجتمع الإحصائي يجب علينا تقدير معالمه المجهولة. إن الوسائط التي تقوم بهذه المهمة تدعى الإحصاءات (ونستخدم كمفردة لها كلمة "إحصاءة" Statistic)، وهذه الإحصاءات تتعامل مع بيانات العينات مباشرة. لذلك لا بد لنا أن نتعرف أولاً على مفهومي المعلمة والإحصاءة.

١-١-٢- تعريف (المعلمة Parameter)

المعلمة هي قيمة عددية تميز المجتمع (ومنها على سبيل المثال: المتوسط والانحراف المعياري للمجتمع- سنأتي على ذكرهما لاحقاً-)، وهذه القيمة تكون على الغالب مجهولة ويجب تقديرها من بيانات عينة تسحب من هذا المجتمع.

٢-١-٢- تعريف (الإحصاءة Statistic)

الإحصاءة هي قيمة عددية تميز العينة (ومنها على سبيل المثال: المتوسط والانحراف المعياري للعينة)، وتحسب هذه القيمة من بيانات العينة، ومن ثم فهي قيمة يمكن الحصول عليها بالحساب، وبالتالي ينظر إليها على أنها قيمة معلومة وتستخدم كقيمة تقريبية للمعلمة.

الآن بالعودة إلى الحوار السابق فإن المشكلة التي سنقف عندها هي كيفية قياس درجة الاختلاف بين قيمة معلمة المجتمع وما يقابلها من قيمة الإحصاءة التي ستستخدم كتقدير لقيمة هذه المعلمة، ولهذا السبب كان لا بد من وجود مقاييس كمية تمكننا من تقدير جيد لمعالم المجتمع الإحصائي.

فيما يلي سنوجه اهتمامنا على استخراج قيمة أو أكثر من مجموعة البيانات للاستدلال من خلالها على حقائق الظاهرة التي تمثلها مجموعة البيانات ككل، وهذا يتطلب منا الآتي:

١- البحث عن قيمة عددية (أو قيم عددية) تمثل مركز جذب لهذه البيانات، بمعنى آخر، تبدو البيانات كلها أو بعضها ينزع نحو هذه القيمة (أو نحو هذه القيم)، وهذا المبحث سيكون محور هذا الفصل من الكتاب.

٢- البحث عن قيمة عددية توضح مدى تبعثر قيم البيانات عن تلك القيمة التي تنزع إليها البيانات، وهذا المبحث سيكون محور الفصل الثالث من هذا الكتاب.

٣- البحث عن قيم عددية تدل على شكل التوزيع من حيث الالتواء والتفلطح، بمعنى أن هذه القيم تحدد لنا وبدقة إن كان التوزيع ملتوياً أم لا، وكذلك إن كان التوزيع مفلطحاً، مدبباً أم معتدلاً، وهذا المبحث لن نتناوله في كتابنا هذا.

كما يوجد أنواع أخرى من المقاييس التي تساعدنا في عملية الاستقراء لنتائج البيانات، إلا أنها أقل أهمية من المقاييس السابقة.

لقد تحدثنا قبل قليل حول ضرورة البحث عن القيمة العددية (أو القيم العددية) التي تنزع نحوها البيانات التي قيد الدراسة. إن هذه القيمة (أو القيم) تندرج تحت مفهوم مقاييس النزعة المركزية والتي تقدمها لنا الفقرة الآتية.

٢-١-٣- تعريف (مقياس النزعة المركزية)

لتكن لدينا مجموعة بيانات مُعطاة. عندئذٍ كل قيمة عددية تنزع إليها البيانات كلياً أو جزئياً (تبدو كمركز جذب للبيانات) تُدعى مقياساً للنزعة المركزية.

من التعريف السابق نلاحظ أن القيمة العددية التي تمثل مقياساً للنزعة المركزية تُعبّر في الواقع عن موضع تمركز توزيع البيانات، ومن المقاييس التي تهتمّ بهذه الدراسة المتوسط (أو الوسط الحسابي)، المتوسط الهندسي، المتوسط التوافقي، الوسيط والمنوال، ولكن في كتابنا هذا سنقوم بالتركيز على استخدام المتوسط، الوسيط والمنوال فقط، والتي سنقوم بتقديمها تباعاً.

٢-١-٤- تعريف (المتوسط Mean)

إن المتوسط لمجموعة بيانات يمثل في الواقع مركز ثقل هذه البيانات، ولهذا فإنه يُعدّ من أهم مقاييس النزعة المركزية، ولتعريفه سنناقش الحالات الثلاث الآتية:

١- إذا كانت البيانات المُعطاة خام من قبيل x_1, x_2, \dots, x_n (قد لا تكون مختلفة بعضها عن البعض الآخر)، فعندئذٍ يُعرّف المتوسط لهذه البيانات على أنه قيمة عددية (يُرمز له بـ \bar{x}) تحسب باستخدام العلاقة الآتية:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad [2-1-a]$$

٢- إذا كانت البيانات المُعطاة مفردة (خام) من قبيل x_1, x_2, \dots, x_k ولها أوزان w_1, w_2, \dots, w_k ، فعندئذٍ يُعرّف المتوسط لهذه البيانات على أنه قيمة عددية (ويُرمز له بـ \bar{x} أيضاً) تحسب باستخدام العلاقة الآتية:

$$\bar{x} = \frac{w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots + w_k \cdot x_k}{w_1 + w_2 + \dots + w_k} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad [2-1-b]$$

إن القيمة العددية \bar{x} التي حُسبت بالعلاقة السابقة تُدعى المتوسط الموزون للبيانات x_1, x_2, \dots, x_k .

٣- إذا كانت البيانات مُعطاة من خلال جدول تكراري كما في الجدول [1-1] (في الفصل الأول)، فعندئذ يُعرّف المتوسط لتلك البيانات على أنه قيمة عددية (ويُرمز لها بـ \bar{x} أيضاً) تحسب باستخدام العلاقة الآتية:

$$\bar{x} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m f_i} \sum_{i=1}^m f_i \cdot x_i \quad [2-1-c]$$

علماً أنّ x_1, x_2, \dots, x_m هي القيم الممثلة للبيانات.

لاحظ هنا أنّ عمل المتوسط لبيانات جدول تكراري يماثل تماماً عمل المتوسط الموزون حيث تقوم التكرارات بعمل الأوزان فقط.

٤- إذا كانت البيانات المُعطاة **مجمّعة** في جدول توزيع تكراري بـ k فئة كما في الجدول [1-10] (انظر الفصل الأول)، فعندئذ يحسب المتوسط (ويُرمز له بـ \bar{x} أيضاً) لبيانات ذلك الجدول من خلال العلاقة الآتية:

$$\bar{x} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k f_i} \sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i \quad [2-1-d]$$

علماً أنّ x_1, x_2, \dots, x_k هي مراكز الفئات.

إنّ العلاقة الأخيرة [2-1-d] توضح لنا أنه يمكن تمثيل كل فئة من فئات الجدول التكراري بمركزها كما ذكرنا ذلك في الفصل السابق، وأنّ لهذا المركز وزناً يساوي تكرار الفئة.

١-٤-١-٢- أمثلة

١- قام تاجر بشراء أربعة من الإبل كلّ على انفراد بثمن قدره 5950، 6950، 7950 و6250 ريال. وأراد بيعها دفعةً واحدة بسعر الحبة الواحدة، فما هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن يطلبه من الشاري في الحبة الواحدة حتى لا يقع في أية خسارة؟

الإجابة: حتى لا يقع التاجر في أية خسارة يجب ألا يقل المبلغ الذي سيطلبه في الحبة الواحدة عن قيمة متوسط الثمن الذي دفعه في الإبل الأربعة، ومن ثمّ بتطبيق العلاقة [2-1-a] يكون لدينا:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{5950 + 6950 + 7950 + 6250}{4} = \frac{27100}{4} = 6775$$

إذن عليه أن يطلب 6775 ريالاً على الأقل ثمناً لكل رأس من الإبل حتى لا يقع في أية خسارة.

٢- قام طالب بحساب الزمن (مقدراً بالدقيقة) الذي يستغرقه الطريق من منزله إلى عمادة السنة الأولى المشتركة، وذلك على مدى 12 يوماً، فحصل على القيم الآتية:

37	33	42	27	39	25	39	37	28	36	28	32
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

فما هو متوسط الزمن اللازم لتنقل الطالب من منزله إلى العمادة؟

الإجابة: بتطبيق العلاقة [2-1-a] نجد أن متوسط الزمن اللازم لتنقل الطالب من منزله إلى العمادة يساوي:

$$\bar{x} = \frac{37 + 33 + 42 + 27 + 39 + 25 + 39 + 37 + 28 + 36 + 28 + 32}{12} = \frac{403}{12} = 33.58$$

إذن يحتاج الطالب بالمتوسط إلى 33.58 دقيقة للتنقل من منزله إلى عمادة السنة الأولى المشتركة.

٣- إذا كان لدى طالب خمسة مقررات دراسية، ولكل مقرّر وزن خاص به مقدّم في الجدول الآتي، وبفرض أن الطالب قد نجح في هذه المقررات الخمسة وكانت درجاته في كل مقرّر كما هو مدوّن في الجدول الآتي أيضاً، فما هو متوسط درجات هذا الطالب في المقررات الخمسة هذه؟

الجدول [2-1]

المقرّر	لغة إنكليزية	مهارات الاتصال	تقن	إحصاء	تطوير الذات
الوزن w	3	2	2	1	1
الدرجة النهائية للطالب	87	92	80	93	98

الإجابة: بناءً على المعطيات المقدّمة نجد أن متوسط درجات هذا الطالب في المقررات الخمسة هو المتوسط الموزون لهذه الدرجات، ومنه بتطبيق العلاقة [2-1-b] يكون لدينا:

$$\bar{x} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k w_i} \sum_{i=1}^k w_i \cdot x_i = \frac{(3 \times 87) + (2 \times 92) + (2 \times 80) + (1 \times 93) + (1 \times 98)}{9} = \frac{796}{9} = 88.4$$

٤- لدى زيارة مريض مستوصف صحي معيّن يترتب على معالته وطبائه مبلغاً محدداً (مقدراً بوحدة نقدية ما) حسب نوع المعالجة التي يطلبها. لقد تمّ رصد عدد زيارات المرضى لذلك المستوصف خلال يوم فكانت المعطيات كما في الجدول التكراري الآتي:

الجدول [2-2]

عدد الزائرين	تكلفة المعالجة والطبابة	المعالجة
16	55	العينية
35	45	الأذن والأنف والحنجرة
20	85	العظمية
14	65	الباطنية
15	75	العصبية
100	-----	Total

فما هو متوسط التكلفة للزائر الواحد في ذلك اليوم؟

الإجابة: من المعلوم أن قيمة المتوسط لبيانات جدول تكراري يُعطى بالعلاقة [2-1-c]، ومن ثمَّ يكون متوسط التكلفة للزائر الواحد يساوي:

$$\bar{x} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m f_i} \sum_{i=1}^m f_i \cdot x_i$$

$$= \frac{(16 \times 55) + (35 \times 45) + (20 \times 85) + (14 \times 65) + (15 \times 75)}{100} = \frac{6190}{100} = 61.90$$

إذن معدّل التكلفة للزائر الواحد هو 61.90 ريالاً.

هـ- لتكن لدينا بيانات إحصائية مُعطاة من خلال جدول التوزيع التكراري الآتي الذي يعرض عدد الزبائن الذين اشترؤا بضائع (مقدّرة بالريال) من سوق تجاري في يوم معيّن، فما هو متوسط مبلغ المبيعات لكل زبون؟

الجدول [2-3-a]

رقم الفئة	(نطاق المبلغ الذي اشترى به الزبون) الحدود الفعلية للفئة	(عدد الزبائن) تكرار الفئة
1	0 → 100	125
2	100 → 200	48
3	200 → 300	32
4	300 → 400	25
5	400 → 500	27
Total	-----	257

الإجابة: من المعلوم أن قيمة المتوسط لبيانات جدول ذو فئات يُعطى بالعلاقة [2-1-d]، ومن ثمَّ يتوجب علينا تعيين مراكز الفئات لإتمام عملية الحساب حيث لدينا:

الجدول [2-3-b]

رقم الفئة	1	2	3	4	5
الحدود الفعلية للفئة	0 → 100	100 → 200	200 → 300	300 → 400	400 → 500
مركز الفئة	50	150	250	350	450
تكرار الفئة	125	48	32	25	27

ومنه يكون متوسط مبلغ المبيعات لكل زبون يساوي:

$$\bar{x} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k f_i} \sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i$$

$$= \frac{(125 \times 50) + (48 \times 150) + (32 \times 250) + (25 \times 350) + (27 \times 450)}{257} = \frac{42350}{257} = 164.79$$

إذن متوسط مبلغ المبيعات لكل زبون هو 164.79 ريالاً.

٦- بالرجوع إلى المثال (٤-٣-١) (عدد الأميال المقطوعة لكل لتر من البنزين). ما هو متوسط الأميال المقطوعة لكل لتر من البنزين؟

الإجابة: بتطبيق العلاقة [2-1-d] نجد أن متوسط بيانات جدول التوزيع التكراري الخاص بذلك المثال يساوي:

$$\bar{x} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k f_i} \sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i = \frac{(6 \times 12.5) + (8 \times 14.5) + (10 \times 16.5) + (3 \times 18.5) + (3 \times 20.5)}{30} = \frac{473}{30} = 15.77$$

٧- لتكن لدينا مجموعة من البيانات الخام الآتية التي تمثل الطول (مقدراً بالسنتيمتر) لخمسين طالباً.

175	190	175	172	160	182	155	143	179	160
177	184	179	171	183	165	184	168	160	182
190	168	182	168	157	153	182	175	159	169
149	168	173	162	183	162	144	191	178	162
199	140	185	176	169	166	151	167	160	197

ولتقم بصب هذه البيانات في جدول توزيع تكراري كما في الجدول الآتي:

الجدول [2-4]

رقم الفئة	الحدود الفعلية للفئة	مركز الفئة	تكرار الفئة	التكرار المتجمع المساعد للفئة
1	140 → 150	145	4	4
2	150 → 160	155	5	9
3	160 → 170	165	16	25
4	170 → 180	175	11	36
5	180 → 190	185	10	46
6	190 → 200	195	4	50
Total	-----	-----	50	-----

ما هو متوسط الطول لهؤلاء الطلاب وفقاً للبيانات الخام والمجمعة، ثم ناقش النتيجة؟

الإجابة: بتطبيق العلاقة [2-1-a] نجد أن متوسط الطول لهؤلاء الطلاب وفقاً للبيانات الخام يساوي:

$$\bar{x} = \frac{175 + 190 + 175 + \dots + 167 + 160 + 197}{50} = \frac{8529}{50} = 170.58$$

وأما بعد صبها في جدول التوزيع التكراري فنجد بتطبيق العلاقة [2-1-d] أن متوسط الطول لهؤلاء الطلاب يساوي:

$$\bar{x} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k f_i} \sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i = \frac{(4 \times 145) + (5 \times 155) + \dots + (4 \times 195)}{50} = \frac{8550}{50} = 171$$

نلاحظ هنا وجود اختلاف في قيمة المتوسط بين البيانات الخام والمجمعة، والسبب في ذلك يعود إلى أن العلاقة [2-1-d] لا تأخذ جميع القيم في الحسبان وإنما تكتفي بالقيم الممثلة للفئات (التي هي مراكز الفئات) فقط. لهذا السبب، فإنه إذا ما وجد اختلاف في قيمتي المتوسط (للخام والمجمعة) فإن قيمة المتوسط الناتجة عن البيانات الخام تكون أكثر دقة من تلك القيمة الناتجة عن ذات البيانات بعد تجميعها في جدول توزيع تكراري.

2-1-4-2- ملاحظة

إذا كانت x_1, x_2, \dots, x_n بيانات خام معطاة، فعندئذ المجموع الجبري للفروق $x_1 - \bar{x}$ ، $x_2 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x}$ يساوي الصفر دوماً، وهذا يعني أن المجموع الجبري لانحرافات قيم البيانات عن متوسطها معدوم دوماً، وذلك لأن:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i - n \cdot \bar{x} = n \cdot \bar{x} - n \cdot \bar{x} = 0$$

فعلى سبيل المثال، لو أخذنا البيانات: 4, 5, 6, 1، و 4 فإننا نجد متوسطها هو 4، ومن ثم يكون لدينا:

$$(4 - 4) + (5 - 4) + (6 - 4) + (1 - 4) + (4 - 4) = 0 + 1 + 2 - 3 + 0 = 0$$

2-1-4-3- مزايا المتوسط

إن المتوسط أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداماً وذلك يعود لسهولة حسابه وتعريفه بعلاقة رياضية بسيطة، ومن أهم المزايا (أو المحاسن) التي يتمتع بها هي:

1- يأخذ بالحسبان جميع القياسات التي تخضع للدراسة والبحث، ولذلك يُفضل استخدامه عندما يكون الاهتمام منصباً على القيمة العددية التي تأخذ جميع القياسات بالحسبان وليس الحصول على قيمة نموذجية ممثلة لها فقط.

2- يخضع للعمليات الجبرية المعروفة، فلو كان a و b عددين حقيقيين مع $a \neq 0$ ، فعندئذ:

أ- المتوسط للقيم $a \cdot x_1, a \cdot x_2, \dots, a \cdot x_n$ يساوي $a \cdot \bar{x}$ ،

ب- المتوسط للقيم $x_1 + b, x_2 + b, \dots, x_n + b$ يساوي $\bar{x} + b$ ،

ومن ثم ينتج لدينا أن المتوسط للقيم $a \cdot x_1 + b, a \cdot x_2 + b, \dots, a \cdot x_n + b$ يساوي $a \cdot \bar{x} + b$.

3- إذا عُلِمَت قيمته فإنه يمكن حساب مجموع البيانات إذا كان عددها معلوماً، أو حساب عدد البيانات إذا كان المجموع لها معلوماً.

4- إذا اضطررنا إلى تمديد حجم البيانات، فإنه بإضافة قيم تساوي قيمة متوسط البيانات الأصل لا تتغير قيمة هذا المتوسط.

5- يفضل استخدام المتوسط عندما يكون التوزيع متماثلاً (أو متناظراً) على وجه التقريب، وكذلك عندما تكون جميع البيانات معلومة ولا يوجد فيها بيانات مفقودة.

٢-١-٤-٤- عيوب المتوسط


في الواقع للمتوسط عيوب (أو مساوئ) عديدة من أهمها ما يلي:

١- إذا فقدت إحدى أو بعض قيم البيانات فإن المتوسط يصبح عديم التطبيق (حتى إذا علم ترتيبها بين البيانات).

٢- تأثره بالقيم المتطرفة (أو القيم المنعزلة Outlier Values وسنأتي على تعيين هذه القيم لاحقاً في هذا الفصل)، فعلى سبيل المثال لو قامت مجموعة من التلاميذ بجمع تبرعات من أجل عمل خيري، وبفرض أن هذه التبرعات كانت على النحو الآتي (مقدرة بالريال):

4 3 7 4 7 25 6 7 6 10 9 8

وبتمثيل هذه القيم على محور الحقيقي يصبح لها العرض الآتي حيث نلاحظ أن القيمة 25 تقع بعيداً على الطرف الأيمن من المحور.



الشكل [2-1]

وهنا نلاحظ بوضوح تام أن كل تبرعات التلاميذ كانت أقل من 11 ريال باستثناء أحدهم قد تبرع بـ 25 ريالاً، فلو استثنينا هذه القيمة 25 لوجدنا أن متوسط باقي القيم هو 6.45 ريالاً فقط، ولكن عندما تبرع أحد الطلاب بـ 25 ريالاً أصبحت قيمة المتوسط 8 ريالات، وكأنما قامت القيمة المتطرفة (25) بسحب قيمة المتوسط نحوها مما أظهر لنا نتيجة لا تُعبر عن واقع التبرعات للتلاميذ.

إذن، فإذا وجدت قيم متطرفة فإننا على الأقل غير قادرين على إعطاء قيمة مقبولة ومقبولة لقيمة المتوسط، ولذلك فمن غير المرغوب فيه استخدام المتوسط كمقياس للنزعة المركزية في هذه الحالة.

لقد لاحظنا فيما سبق أنه إذا فقدت إحدى أو بعض البيانات فإننا سنقف عاجزين عن حساب قيمة المتوسط للبيانات المعطاة. لذلك كان من الضرورة البحث عن طرائق أخرى تقوم بهذه المهمة. إن المفهوم الآتي يقدم لنا حلاً جزئياً للمشكلة السابق ذكرها، ويعد من المفاهيم البديلة للمتوسط في حال عدم إمكانية استخدامه أو عدم القبول بنتيجته.

٢-١-٥- تعريف (الوسيط Median)

من أجل تعريف الوسيط لمجموعة بيانات مُعطاة سنناقش الحالتين الآتيتين:

١- إذا كانت البيانات المعطاة خام فعندئذ يُعرّف الوسيط لهذه البيانات على أنه القيمة التي تقع وسط البيانات بعد ترتيبها تصاعدياً (وسوف نرسم له بـ \tilde{x})، فلو كانت x_1, x_2, \dots, x_n بيانات خام مرتبة تصاعدياً، فإن قيمة الوسيط لهذه البيانات تحسب باستخدام إحدى العلاقتين الآتيتين:

أ- إذا كان عدد البيانات n فردياً فيكون لدينا:

$$\tilde{x} := x_{\frac{n+1}{2}} \quad [2-2-a]$$

ب- إذا كان عدد البيانات n زوجياً فيكون لدينا:

$$\tilde{x} := \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} \quad [2-2-b]$$

٢- إذا كانت البيانات مُعطاة من خلال جدول تكراري كما في الجدول [1-1] (في الفصل الأول)، وكانت هذه القيم الممثلة للبيانات قابلة للترتيب فيما بينها، فعندئذٍ نقوم بإعادة تنسيق الجدول بحيث تصبح فيه قيم ممثلي البيانات x_1, x_2, \dots, x_n مرتبة تصاعدياً، أي يكون لدينا في هذه الحالة $x_m > \dots > x_2 > x_1$ ، ومن ثم ندرج عموداً للتكرارات التراكمية كما في الجدول الآتي:

الجدول [2-5]

الممثل	التكرار	التكرار المتجمّع الصاعد
x_1	f_1	f_1
x_2	f_2	$f_1 + f_2$
\vdots	\vdots	$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$
x_m	f_m	$\sum f_i = f_1 + f_2 + \dots + f_m$
sum	$\sum f_i$	-----

عندئذٍ يُعرّف الوسيط لبيانات هذا الجدول (وسنرمز له بـ \tilde{x} أيضاً) على أنه أول قيمة x_i ممثلة لبيانات يكون تكرارها المتجمّع الصاعد أكبر أو يساوي نصف مجموع التكرارات.

٣- إذا كانت البيانات المُعطاة مجمعةً في جدول توزيع تكراري بـ k فئة كما في الجدول [1-10] (في الفصل الأول)، فعندئذٍ يُحسب الوسيط لبيانات ذلك الجدول (وسنرمز له بـ \tilde{x} أيضاً) من خلال العلاقة الآتية:

$$\tilde{x} := \tilde{L} + \frac{\sum f_i - (\tilde{F} - \tilde{f})}{\tilde{f}} \times C \quad [2-3]$$

علماء أن: \tilde{L} هو الحد الأدنى للفئة (الفعلية) الوسطية، وأما الفئة الوسطية فهي أول فئة تكرارها المتجمّع الصاعد أكبر أو يساوي نصف مجموع التكرارات.

\tilde{f} هو تكرار الفئة الوسطية.

\tilde{F} هو التكرار المتجمّع الصاعد للفئة الوسطية.

C هي سعة الفئة الوسطية (هنا لم نرفق دليل لـ C أو رمز خاص بها لأننا نتعامل مع فئات


متساوية السعة)

هو مجموع التكرارات. $\sum_{i=1}^k f_i$

٢-١-٥-١ ملاحظات

١- قد يلجأ البعض إلى أخذ مركز الفئة الوسيطة كقيمة تقريبية للوسيط \tilde{x} (على سبيل التبسيط)، ولكن هذا قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة لدى استخدامها من أجل إجراء مقارنة بينها وبين مقاييس النزعة المركزية الأخرى أو لدى الاستدلال بها عن شكل توزيع البيانات.

٢- كما هو واضح من تعريف الوسيط، فإن الوسيط يأخذ موضعه في وسط البيانات المرتبة، ومن ثم فإن 50% من البيانات ستقع على يساره ومثل ذلك على يمينه، ومن أجل مجموعة بيانات مجمعة في جدول توزيع تكراري يُعبّر عن الوسيط هندسياً على أنه القيمة على محور الفئات التي إذا رُسم عندها عموداً فإنه سيقسم التوزيع (أو المدرج التكراري) إلى قسمين متساويين (وليس بالضرورة منطبقين)، ويكون الانطباق في حالة التوزيعات المتناظرة فقط (للتوضيح انظر الأشكال الآتية).



الشكل [2-2]

٢-١-٥-٢ أمثلة

١- تقدم تسعة طلاب للاختبار النهائي في مقرر دراسي وكانت نتائجهم على النحو الآتي:

45 27 37 43 42 47 42 45 39

فما هي الدرجة التي تجاوزها 50% من الطلاب؟

الإجابة: نلاحظ أن الإجابة على هذا السؤال تتم بتعيين الوسيط لهذه الدرجات، ولذلك لنقم أولاً بترتيبها تصاعدياً فيكون لها الترتيب الآتي:

27	37	39	42	42	43	45	45	47	القيم بعد ترتيبها
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	رموز القيم بعد ترتيبها

وبما أن عدد البيانات فردي فإنه بتطبيق العلاقة [2-2-a] نجد أن قيمة الوسيط يساوي:

$$\tilde{x} = x_{\frac{n+1}{2}} = x_5 = 42$$

140	153	160	162	168	171	175	179	183	189
143	155	160	165	168	172	176	182	183	190
144	157	160	166	168	173	177	182	184	191
149	159	162	167	169	175	178	182	184	197
151	160	162	168	169	175	179	182	185	199

ما هي قيمة الوسيط لطول هؤلاء الطلاب وفقاً للبيانات الخام وللبيانات المجمعّة في الجدول [2-4]، ثمّ ناقش النتيجة؟

الإجابة: بما أنّ عدد البيانات زوجي فإنّه بتطبيق العلاقة [2-2-b] نجد قيمة الوسيط للبيانات الخام تساوي:

$$\tilde{x} = \frac{x_n + x_{n+1}}{2} = \frac{x_{25} + x_{26}}{2} = \frac{169 + 171}{2} = 170$$

وبعد صبّ هذه البيانات في الجدول [2-4] نجد أنّ الفئة الرابعة هي الفئة الوسيطة، ومن ثمّ بتطبيق العلاقة [2-3] تكون قيمة الوسيط لهذه البيانات بعد تجميعها في الجدول [2-4] تساوي:

$$\tilde{x} := \tilde{L} + \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n f_i - (\tilde{F} - \tilde{f})}{\tilde{f}} \times C = 160 + \frac{25 - (25 - 16)}{16} \times 10 = 170$$

نشير هنا إلى أنّه من الممكن أن تتوافق قيمة الوسيط للبيانات الخام مع قيمة الوسيط لبيانات جدول التوزيع التكراري المثلّ لها، ولكن في معظم الحالات تكون قيمة الوسيط للبيانات الخام مختلفةً عن قيمة الوسيط للبيانات ذاتها بعد تجميعها في جداول توزيع تكرارية.



تعقيباً على ملاحظة سابقة نلاحظ أنّه لو أخذنا مركز الفئة الوسيطة كقيمة تقريبية لقيمة وسيط بيانات الجدول فإنّنا سنجدّه يساوي 165، وهكذا نجد أنّنا قد ارتكبنا خطأً ليس بالقليل بسبب كبر الفارق بينها وبين القيمة التي حُسبت لوسيط بيانات جدول التوزيع.

٢-١-٥-٣- مزايا الوسيط

- ١- الوسيط سهل التعريف والحساب.
- ٢- لا يتأثر بالقيم المتطرفة لأنّه يعتمد على القيم الواقعة في الوسط فقط.
- ٣- لا يعتمد على جميع القيم في حسابه، ومن ثمّ تغيّر قيمة أو أكثر من القيم غير الواقعة في الوسط لا تؤثر في قيمة الوسيط.
- ٤- إذا فقدت بعض قيم البيانات المرتبة غير الواقعة في الوسط فإنّه يمكن استخدام الوسيط.

٢-١-٥-٤- عيوب الوسيط

- ١- الوسيط أقل دقة من المتوسط لأنه لا يأخذ كل القيم بالحسبان.
 - ٢- إذا فقدت إحدى القيم المرتبة الواقعة في الوسط فإنه من غير الممكن حساب الوسيط.
- أخيراً نشير إلى أنه يُفضل استخدام الوسيط إذا كان الاهتمام منصباً على إيجاد قيمة ممثلة للقيمة التي تنزع إليها البيانات بدلاً من الاهتمام بالمجموع الكلي، وكذلك عندما يكون التوزيع ملتويًا.
- الآن، إذا كانت البيانات المفقودة واقعة في الوسط بعد ترتيبها تصاعدياً (ولكن معلوم موضعها) فعندئذٍ من غير الممكن استخدام المتوسط والوسيط، ولذلك يمكن اللجوء إلى المقياس الآتي لاستخدامه كمقياس للنزعة المركزية.

٢-١-٦- تعريف (المنوال Mode)

- من أجل تعريف المنوال لمجموعة بيانات مُعطاة سنناقش الحالتين الآتيتين:
- ١- إذا كانت البيانات المُعطاة خام فعندئذٍ يُعرّف المنوال (وسنرمز له بـ \hat{x}) لهذه البيانات على أنه البيان (قد يكون كميًا أو نوعيًا) الأكثر تكرارًا.
 - ٢- إذا كانت البيانات مُعطاة من خلال جدول تكراري كما في الجدول [1-1] (في الفصل الأول)، فعندئذٍ يُعرّف المنوال لبيانات ذلك الجدول (وسنرمز له بـ \hat{x} أيضاً) على أنه القيمة (إذا كانت البيانات كمية) أو الممثل (إذا كانت البيانات نوعية) التي يقابلها أكبر قيمة تكرار.
 - ٣- إذا كانت البيانات المُعطاة مجمعة في جدول توزيع تكراري بـ k فئة كما في الجدول [1-10]، فعندئذٍ تُحسب قيمة المنوال لبيانات ذلك الجدول (وسنرمز له بـ \hat{x}_d أيضاً) من خلال العلاقة الآتية:

$$\hat{x}_d = \hat{L} + \frac{d_1}{d_1 + d_2} C \quad [2-4]$$

علماً أن: \hat{L} هو الحد الأدنى للفئة المنوالية،

d_1 هو الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة السابقة لها مباشرةً،

d_2 هو الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة اللاحقة بها مباشرةً،

C هو سعة الفئة المنوالية.

علماً أن الفئة المنوالية هي تلك الفئة التي تكرارها أكبر من تكرار الفئة السابقة لها واللاحقة بها مباشرةً، وعلى ألا تكون هذه الفئة طرفية. أي أن الفئة الأولى والأخيرة في التوزيع التكراري لا ينظر إليهما كفتات منوالية.

٢-١-٦-١-١ ملاحظات

١- قد يلجأ البعض إلى أخذ مركز الفئة المنوالية كقيمة تقريبية للمنوال \hat{x} ، ولكن هذا قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة لدى استخدامها من أجل إجراء مقارنة بينها وبين مقاييس النزعة المركزية الأخرى أو لدى الاستدلال بها عن شكل توزيع البيانات.


٢- من تعريف المنوال يُلاحظ أن المنوال قد لا يكون موجوداً في حال أن جميع البيانات مختلفة عن بعضها البعض الآخر أو أن لجميع القيم الممتلئة التكرار نفسه. كذلك يُلاحظ أنه حتى في حال وجوده قد لا يكون وحيداً في حال تساوي التكرار لقياسين على الأقل من هذه القياسات حيث يكون لدينا منوالين على الأقل في هذه الحالة.

٣- إذا كان المدرج التكراري مُعطى فإنه يمكن تعيين المنوال هندسياً على النحو الآتي:

أ- نصل بقطعة مستقيمة بين النهاية اليمنى لقمة الفئة الفعلية المنوالية مع النهاية اليمنى لقمة الفئة السابقة لها.

ب- نصل بقطعة مستقيمة بين النهاية اليسرى لقمة الفئة الفعلية المنوالية مع النهاية اليسرى لقمة الفئة اللاحقة بها.

ج- نسقط عمود من نقطة تقاطع المستقيمين الناشئين على محور الفئات فتكون النقطة الموافقة لهذا المسقط هي قيمة للمنوال.



الشكل [2-3] القيمة المقدرة للمنوال

إن هذه الطريقة لتعيين المنوال تحتاج إلى دقة في الرسم واستخدام مقاييس دقيقة، ولذلك لا تستخدم إلا عند الضرورة.

٢-١-٦-٢ أمثلة

١- لدى وزن عشرة صناديق متماثلة تحتوي على برتقال وجدنا أوزانها كما يلي:

8	8.5	8.25	7.85	8	7.75	7.95	8	8.45	8.25
---	-----	------	------	---	------	------	---	------	------

فما هو منوال هذه البيانات؟

الإجابة: نلاحظ أن القيمة الأكثر تكراراً بين البيانات المُعطاة هي 8، وهي قيمة وحيدة ومن ثم لدينا منوال وحيد في هذه البيانات هو $\hat{x} = 8$.

٢- في سباق للسيارات عالية السرعة في حلبة مُحدّدة، دوّنت الأزمنة الآتية لثمانية متسابقين (الزمن مقدّر بالدقيقة):

13.62	12.79	12.88	13.09	13.00	12.95	13.82	13.57
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

فما هو منوال هذه البيانات؟

الإجابة: نلاحظ هنا أنّ لجميع القيم التكرار نفسه، ومن ثمّ لا يوجد منوال لهذه البيانات.

٣- بالرجوع إلى المثال (٧) من (٢-١-٤-١-الطول مقدراً بالسنتيمتر لخمسين طالباً-). ما هي القيمة المنوال (أو القيم المنوالية) لطول هؤلاء الطلاب وفقاً للبيانات الخام وللبيانات المجمّعة في الجدول [2-4]، ثمّ ناقش النتيجة؟


الإجابة: بخصوص البيانات الخام نجد فيها ثلاث قيم لها أكبر قيمة تكرار (لكل منها أربعة تكرّرات)، ولذلك سيكون لتلك البيانات ثلاثة مناويل هي $\hat{x}_1 = 160$ و $\hat{x}_2 = 168$ و $\hat{x}_3 = 182$.

وبعد صبّ تلك البيانات في الجدول [2-4] نجد أنّ الفئة الثالثة هي الفئة المنوالية، ومن ثمّ تكون قيمة المنوال لتلك البيانات تساوي:

$$\hat{x} = \hat{L} + \frac{d_1}{d_1 + d_2} C = 160 + \frac{11}{11 + 5} \times 10 = 166.88$$

نلاحظ هنا أنّه من غير الممكن مناقشة قيم المناويل للبيانات الخام مع قيمة المنوال للبيانات ذاتها بعد تجميعها في الجدول [2-4] وذلك بسبب عدم وحدانية المنوال للبيانات الخام.

٤- لتكن لدينا بيانات مقدّمة من خلال المضلع التكراري الآتي:



الشكل [2-4]

فما هي قيمة المنوال لبيانات هذا المضلع؟

الإجابة: من أجل ذلك لنقم ببناء جدول التوزيع التكراري الموافق لهذا المضلع، فنجد له العرض الآتي:

الجدول [2-7]

رقم الفئة	الحدود الفعلية للفئة	مركز الفئة	تكرار الفئة	التكرار المتجمّع الصاعد للفئة
1	2 → 6	4	4	4
2	6 → 10	8	10	14
3	10 → 14	12	8	22
4	14 → 18	16	10	32
5	18 → 22	20	8	40
Total	-----	-----	40	-----

فلاحظ وجود فئتين منواليتين في هذا الجدول، ومن ثمّ تملك بيانات هذا الجدول منوالين هما:

$$\hat{x}_1 = \hat{L} + \frac{d_1}{d_1 + d_2} C = 6 + \frac{6}{6 + 2} \times 4 = 9$$

$$\hat{x}_2 = \hat{L} + \frac{d_1}{d_1 + d_2} C = 14 + \frac{2}{2 + 2} \times 4 = 16$$

٣-٦-١-٢- مزاي المنوال

- ١- إنّ المنوال هو أقل مقاييس النزعة المركزية دقّة واستخداماً.
- ٢- تأثيره بتغيير بعض قيم البيانات قد لا يكون كبيراً بالقدر الذي يحصل للمتوسط.
- ٣- يمكن استخدامه في حالة البيانات النوعية، فعلى سبيل المثال إذا كان لون العيون لمعظم الناس في بلد ما هو اللون البني، فعندئذٍ يمكننا القول إنّ اللون المنوالي لعيون هؤلاء الناس هو اللون البني.
- ٤- في حال فقدان بعض البيانات الواقعة في الوسط (بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً) فإنّ للمنوال دور جيد في تعيين القيمة الممتلئة لتمركز البيانات.
- ٥- كما أنّه يشير في كثير من الحالات إلى عدد العوامل المؤثرة في توليد البيانات من خلال عدد المناويل التي ستظهر للبيانات عند تعيينها.

٤-٦-١-٢- عيوب المنوال

- ١- من مساوئ المنوال أنّ قد لا يكون موجوداً، وحتى في حال وجوده فقد لا يكون وحيداً، وهذا يعني أنّه لا يمكن تعريفه بشكل وحيد كمقياس للنزعة المركزية.
- ٢- يعدّ المنوال غير ذي جدوى عملياً إذا كان عدد البيانات قليلاً (هذا إنّ وجد أصلاً)، وأمّا في حالة البيانات كبيرة العدد ومن أجل جداول التوزيع التكرارية فيمكن الاستفادة منه لكون تأثيره بتغيير بعض قيم البيانات قد لا يكون كبيراً بالقدر الذي يلغي استخدامه.


٢-١-٦-٥- ملاحظات

١- نشير هنا إلى ما يقوم به البعض بأخذ مركز الفئة المنوالية كقيمة تقريبية لقيمة منوال بيانات جداول التوزيع التكرارية، فلو أخذنا مركز الفئة المنوالية في الجدول [2-4] كقيمة تقريبية لقيمة منوال بيانات ذلك الجدول فإننا سنجد أنه يساوي 165، وهذه القيمة تقل بمقدار 1.88 عن القيمة المحسوبة في المثال (٣) من (٢-١-٦-٢)، وكذلك لا تتوافق مع أية قيمة من قيم المناويل للبيانات الخام نفسها في المثال المذكور آنفاً. إذن فمن غير المقبول استخدام مركز الفئة المنوالية كقيمة تقريبية لقيمة منوال بيانات جدول التوزيع التكراري.

٢- من أجل التوزيعات التكرارية المتماثلة يكون لدينا $\bar{x} = \hat{x} = \tilde{x}$ ، وأما إذا كان التوزيع قريب من التماثل فإنه يكون $\bar{x} \approx \hat{x} \approx \tilde{x}$ ، وفي هذه الحالة وجد تجريبياً أن:

$$\bar{x} - \hat{x} = 3(\bar{x} - \tilde{x})$$

وأما التوضيح النسبي لقيم المتوسط والوسيط والمنوال في حالة التوزيعات التكرارية (التوزيعات لمجموعات بيانات مستمرة) المختلفة تظهرها لنا الأشكال الآتية:



الشكل [2-5]

٢ - ٢ الربيعيات

Quartiles

لقد قدّمنا فيما سبق بعض مقاييس النزعة المركزية، حيث لاحظنا أنّ كل مقياس من هذه المقاييس يشغل موضعاً على محور القيم (أو الفئات)، ومن ثمّ هذه المقاييس التي قدّمت هي مقاييس موضع أيضاً. لكن يوجد في الواقع مقاييس موضع أخرى لا تنتمي لمجموعة مقاييس النزعة المركزية، ومنها على سبيل المثال الربيعيات والمئينات التي سنقدّمها تباعاً، ولكن من أجل البيانات الكميّة الخام فقط وبشيء من الإيجاز أيضاً.

١-٢-٢-٢ تعريف (الربيعيات)

لتكن x_1, x_2, \dots, x_n بيانات خام مرتبة تصاعدياً. عندئذٍ تُعرّف الربيعيات على أنّها تلك القيم التي تقسم البيانات المُعطاة إلى أربع شرائح (أو أجزاء) متساوية الأعداد من البيانات (أي في كل شريحة العدد نفسه من قيم البيانات).

١-٢-٢-٢ ملاحظات


من هذا التعريف يتضح لنا وجود ثلاثة ربيعيات وهي:

١- القيمة التي يقع قبلها 25% وبعدها 75% من البيانات المرتبة وتُدعى **الربيعي الأول** First Quartile (أو **الربيعي الأدنى** Lower Quartile)، ويُرّمز له بالرمز Q_1 .

٢- القيمة التي يقع قبلها 50% وبعدها 50% من البيانات المرتبة وتُدعى **الربيعي الثاني** Second Quartile، ويُرّمز له بـ Q_2 ، ويلاحظ هنا أنّ **الربيعي الثاني** هو الوسيط نفسه، أي أنّ $Q_2 = \tilde{x}$.

٣- القيمة التي يقع قبلها 75% وبعدها 25% من البيانات المرتبة وتُدعى **الربيعي الثالث** Third Quartile (أو **الربيعي الأعلى** Upper Quartile)، ويُرّمز له بـ Q_3 .

ومن أجل مجموعة البيانات $A = \{1, 2, \dots, 11\}$ يمكننا تقديم العرض الهيكلي الآتي للربيعيات الثلاث.



الشكل [2-6]

2-2-2-2- تعيين الربيعيات

في الواقع توجد طرائق عديدة لتعيين الربيعيات، وهذه الطرائق تتفاوت في دقة نتائجها وفقاً للقاعدة الرياضية المستخدمة في الحساب، وهذا بدوره يجعل نتائج حساب الربيعيات باستخدام البرامج الإحصائية تختلف من برنامج إلى آخر. في كتابنا هذا سنقدم إحدى هذه الطرائق التي تعد من أكثر الطرائق دقة، وهي مستخدمة في برامج إحصائية كثيرة أيضاً. إن هذه الطريقة تقوم على الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: لتكن x_1, x_2, \dots, x_n (مع $3 \leq n$) بيانات خام مرتبة تصاعدياً، فعندئذ نضع بالتعريف:

$$q_r := \frac{r(n+1)}{4} \quad ; r = 1, 2, 3 \quad [2-5]$$

والذي يُدعى رتبة الربيعي r (وهذه القيمة تحدد موضع الربيعي بين البيانات المرتبة).

الخطوة الثانية: تُعَيَّن قيمة الربيعي Q_r مع $r = 1, 2, 3$ على النحو الآتي:

بفرض أن k هو الجزء الصحيح من العدد q_r ، وأن الباقي من هذا العدد يساوي s ، فعندئذ يُحسب الربيعي Q_r من خلال العلاقة الآتية:

$$Q_r = x_k + s(x_{k+1} - x_k) \quad ; r = 1, 2, 3 \quad [2-6]$$

نلاحظ هنا أنه إذا كان الباقي $s = 0$ أو كان $x_{k+1} = x_k$ فعندئذ سيكون لدينا $Q_r = x_k$.

2-2-2-1- أمثلة

1- لدينا درجات اختبار نهائي (الدرجة القصوى 50) لخمسة وعشرين طالباً كما هو آتٍ.

48	37	25	45	44
44	49	29	42	48
45	50	39	36	47
41	48	38	15	47
43	47	39	25	48

فما هي قيم الربيعيات الثلاثة Q_1, Q_2, Q_3 الخاصة بهذه البيانات؟

الإجابة: من أجل تعيين قيم الربيعيات الثلاثة Q_1, Q_2, Q_3 نقوم أولاً بترتيب البيانات التي لدينا تصاعدياً، فنجد لها التسلسل الآتي:

15	37	42	45	48
25	38	43	47	48
25	39	44	47	48
29	39	44	47	49
36	41	45	48	50

وبما أن $n = 25$ فإن رتبة الربيعي Q_1, Q_2, Q_3 ستكون على الترتيب هي:

$$q_1 = \frac{n+1}{4} = \frac{25+1}{4} = 6.5$$

$$q_2 = \frac{2(n+1)}{4} = \frac{2(25+1)}{4} = 13$$

$$q_3 = \frac{3(n+1)}{4} = \frac{3(25+1)}{4} = 19.5$$

فنجد من أجل:

أ- الربيعي الأول Q_1 (أي أن $r = 1$) أن الجزء الصحيح من العدد q_1 هو $k = 6$ ، وأما الباقي من هذا العدد يساوي $s = 0.5$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$\begin{aligned} Q_1 &= x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_6 + 0.5(x_7 - x_6) \\ &= 37 + 0.5(38 - 37) = 37.5 \end{aligned}$$

أي أن 25% من الطلاب قد حصلوا على درجة دون 37.5، وأما الباقي (وهم 75%) فقد حصلوا على درجة أعلى من 37.5 في هذا الاختبار.

ب- الربيعي الثاني Q_2 نجد أن الجزء الصحيح من العدد q_2 هو $k = 13$ ، وأما الباقي من هذا العدد يساوي $s = 0$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$Q_2 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_{13} = 44$$

أي أن 50% من الطلاب قد حصلوا على درجة دون 44، وأما الباقي (وهم 50% أيضاً) فقد حصلوا على درجة أعلى من 44 في هذا الاختبار.

ج- الربيعي الثالث Q_3 نجد أن الجزء الصحيح من العدد q_3 هو $k = 19$ ، وأما الباقي من هذا العدد يساوي $s = 0.5$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$\begin{aligned} Q_3 &= x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_{19} + 0.5(x_{20} - x_{19}) \\ &= 47 + 0.5(48 - 47) = 47.5 \end{aligned}$$

أي أن 75% من الطلاب قد حصلوا على درجة دون 47.5، وأما الباقي (وهم 25%) فقد حصلوا على درجة أعلى من 47.5 في هذا الاختبار.

٢- لدى معاينة مجموعة مكونة من 20 رجلاً بالغاً من أجل معرفة أوزانهم وجدنا البيانات الآتية (مقدرةً بالكيلو غرام):

86	95	66	76
87	98	77	92
85	98	78	65
73	106	77	88
70	115	77	102

فما هي قيم الربيعيات الثلاثة Q_1 ، Q_2 و Q_3 الخاصة بهذه البيانات؟

الإجابة: من أجل تعيين قيم الربيعيات الثلاثة Q_1 ، Q_2 و Q_3 نقوم أولاً بترتيب البيانات التي لدينا تصاعدياً، فنجد لها التسلسل الآتي:

65	77	86	98
66	77	87	98
70	77	88	102
73	78	92	106
76	85	95	115

وبما أن $n = 20$ فإن رتبة الربيعي Q_1 ، Q_2 و Q_3 ستكون على الترتيب هي:

$$q_1 = \frac{n+1}{4} = \frac{20+1}{4} = 5.25$$

$$q_2 = \frac{2(n+1)}{4} = \frac{2(20+1)}{4} = 10.5$$

$$q_3 = \frac{3(n+1)}{4} = \frac{3(20+1)}{4} = 15.75$$

فنجد من أجل:

أ- الربيعي الأول Q_1 (أي أن $r = 1$) أن الجزء الصحيح من العدد q_1 هو $k = 5$ ، وأما الباقي من هذا العدد يساوي $S = 0.25$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$Q_1 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_5 + 0.25(x_6 - x_5)$$

$$= 76 + 0.25(77 - 76) = 76.25$$

أي أن 25% من هؤلاء الرجال لهم أوزان دون 76.25، وأما الباقي (وهم 75%) فإن أوزانهم أكثر من 76.25.

ب- الربيعي الثاني Q_2 نجد أن الجزء الصحيح من العدد q_2 هو $k = 10$ ، وأما الباقي من هذا العدد يساوي $S = 0.5$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$Q_2 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_{10} + 0.5(x_{11} - x_{10})$$

$$= 85 + 0.5(86 - 85) = 85.5$$

أي أن 50% من هؤلاء الرجال لهم أوزان دون 85.5، وأما النصف الباقي منهم فلهم أوزان أكثر من 85.5.

ج- الربيعي الثالث Q_3 نجد أن الجزء الصحيح من العدد q_3 هو $k = 15$ ، وأما الباقي من هذا العدد يساوي $S = 0.75$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$Q_3 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_{15} + 0.75(x_{16} - x_{15})$$

$$= 95 + 0.75(98 - 95) = 97.25$$

أي أن 75% من هؤلاء الرجال لهم أوزان دون 97.25، وأما الباقي (وهم 25%) فإن أوزانهم أكثر من 97.25.



٢-٢-٢-٢ ملاحظات

١- تجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة الربيعي قد لا تكون موجودة بين قيم البيانات المعطاة.

٢- إن القيمتين Q_1 و Q_3 ليستا من مقاييس النزعة المركزية.

٣- من الاستخدامات المهمة للربيعيات تحديد ما إذا كانت قيمة x من مجموعة بيانات معطاة هي قيمة متطرفة Extreme Value (أو قيمة منعزلة Outlier Value) أم لا. حيث يُقال عن قيمة x من مجموعة بيانات معطاة إنها متطرفة إذا حققت إحدى العلاقتين الآتيتين:

$$x < Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1) \quad [2-7-a]$$

$$x > Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1) \quad [2-7-b]$$

فإذا كانت العلاقة [2-7-a] مُحَقَّقة، فعندئذ يُقال إن القيمة x متطرفة بصغرها، وأما المقدار $Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1)$ فإنه يُدعى أدنى حاجز Lowest Fence (لأنه حاجز يفصل بين القيم المتطرفة بصغرها وباقي القيم غير المتطرفة)، وسنرمز له بـ LF، أي أنه لدينا:

$$LF = Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1)$$

وهو يمثل في الواقع الحد الأعلى للقيم المتطرفة بصغرها من أجل مجموعة بيانات معطاة.

أما إذا كانت العلاقة [2-7-b] مُحَقَّقة، فعندئذ يُقال إن القيمة x متطرفة بكبرها، وحينئذ يُقال عن المقدار $Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)$ إنه أعلى حاجز Highest Fence (لأنه حاجز يفصل بين القيم المتطرفة بكبرها وباقي القيم غير المتطرفة)، وسنرمز له بـ HF، أي أنه لدينا:

$$HF = Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)$$

وهو يمثل في الواقع الحد الأدنى للقيم المتطرفة بكبرها من مجموعة بيانات معطاة.

٢-٢-٢-٣ مثال

لتكن لدينا البيانات الآتية:

6	7	1	4	7	5	5	4	5	3
4	5	7	3	4	15	4	5	4	4
7	5	5	6	5	7	1	6	4	7

فهل يوجد في هذه البيانات قيم متطرفة؟

الإجابة: من أجل تعيين القيم المتطرفة علينا حساب Q_1 و Q_3 ، وهذا يتطلب منا ترتيب البيانات التي

لدينا أولاً، فنجد لها العرض الآتي:

1	1	3	3	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	7	7	7	7	7	7	15

ومنّه بحساب Q_1 و Q_3 نجد أنّ $Q_1 = 4$ و $Q_3 = 6.25$ ، وكذلك:

$$Q_3 - Q_1 = 6.25 - 4 = 2.25$$

ومن ثمّ يكون لدينا:

$$LF = Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1) = 4 - (1.5 \times 2.25) = 0.625 < 1$$

$$HF = Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1) = 6.25 + (1.5 \times 2.25) = 9.625 < 15$$

وبذلك تكون القيمة 15 هي قيمة **متطرفة** بـكبرها ولا وجود لقيم متطرفة بصغرها (والعرض البياني الآتي يوضّح لنا ذلك أيضاً).



الشكل [2-7]



٢ - ٣ المئينات

Percentiles

يعدّ المئين من مقاييس الموضع المهمة وذلك لأنه يوفر معلومات حول كيفية امتداد البيانات من أصغر قيمة إلى أكبر قيمة، فعلى سبيل المثال يُذكر في كثير من الأحيان في جدول نتائج تقديم الطلبات لمؤسسة ما أنّ 85% من المتقدمين استوفوا الشروط المطلوبة للتعين فقط. أو أن يُقال إنّ 72% فقط من الطلاب حقّقوا درجة النجاح في المقرّر X.

١-٣-٢ تعريف (المئينات)

لتكن x_1, x_2, \dots, x_n بيانات مرتبة تصاعدياً. عندئذٍ تُعرّف المئينات على أنّها تلك القيم التي تقسم البيانات إلى مئة شريحة (أو جزء) متساوية الأعداد من البيانات (أي في كل شريحة العدد نفسه من قيم البيانات).

٢-٣-٢ ملاحظات

١- من هذا التعريف يتضح لنا وجود تسعة وتسعين مئيناً، علماً أنّه من أجل $r = 1, 2, \dots, 99$ فإنّ القيمة التي يقع قبلها $r\%$ من البيانات (المرتبة تصاعدياً) وبعدها $(100 - r)\%$ تدعى المئين ذي الرقم r (r^{th} Percentile أو المئيني الرائي r -Percentile)، ويرمز لها بـ P_r .

٢- من تعريف المئين نلاحظ أنّ $P_{25} = Q_1$ ، $P_{50} = Q_2 = \tilde{x}$ ، و $P_{75} = Q_3$.

٣- بما أنّ عدد المئينات كبير (لدينا 99 مئيناً) فإنّ هذا النوع من المقاييس يكون أكثر وضوحاً كلما ازداد عدد البيانات، وتكون جميع المئينات قابلةً للحساب وأكثر دقّةً عندما يكون عدد البيانات أكبر أو يساوي 99، وما سنقدّمه من أمثلة على بيانات قليلة العدد سيكون من باب التوضيح والتبسيط.

٣-٣-٢ تعيين المئينات

إنّ طريقة تعيين المئينات تماثل طريقة تعيين الربيعيات تماماً، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
الخطوة الأولى: بفرض أنّ x_1, x_2, \dots, x_n بيانات مرتبة تصاعدياً، فإنّنا نضع بالتعريف:

$$p_r = \frac{r(n+1)}{100} \quad ; \quad r = 1, 2, \dots, 99 \quad [2-8-a]$$

وهذه القيمة p_r تدعى رتبة المئين r في البيانات المرتبة تصاعدياً، وعملها تحديد موضع هذا المئين بين البيانات المرتبة تصاعدياً. عندئذٍ لتعيين قيمة المئين P_r نقوم بما يلي:

الخطوة الثانية: بفرض أن k هو الجزء الصحيح من المقدار p_r وأن الباقي منه يساوي s ، فعندئذٍ تحسب قيمة المئين P_r من خلال العلاقة الآتية:

$$P_r = x_k + s(x_{k+1} - x_k) \quad ; r = 1, 2, \dots, 99 \quad [2-8-b]$$

نلاحظ هنا أنه إذا كان $s = 0$ أو $x_{k+1} = x_k$ فإنه سيكون لدينا $P_r = x_k$ فقط.

٢-٣-١- أمثلة

١- تقدم لنا البيانات الآتية الطول لخمسین طالباً في عمادة السنة الأولى المشتركة.

185	169	173	179	173	178	147	171	173	172
169	201	184	160	163	189	190	158	149	173
172	149	177	158	169	172	171	168	181	178
195	181	171	195	190	167	185	173	180	179
169	181	172	196	152	175	179	169	175	175

فما هي قيم المئينات P_{15} ، P_{43} و P_{87} الخاصة بهذه البيانات؟

الإجابة: من أجل تعيين قيم المئينات علينا أولاً ترتيب البيانات المعطاة تصاعدياً، فنجد لها التسلسل الآتي:

147	158	169	171	172	173	177	179	184	190
149	160	169	171	172	173	178	180	185	195
149	163	169	171	173	175	178	181	185	195
152	167	169	172	173	175	179	181	189	196
158	168	169	172	173	175	179	181	190	201

البيانات بعد ترتيبها تصاعدياً

وبما أن $n = 50$ فإن رتبة المئين P_{15} ، P_{43} و P_{87} ستكون على الترتيب هي:

$$p_{15} = \frac{15(n+1)}{100} = \frac{15(50+1)}{100} = 7.65$$

$$p_{43} = \frac{43(n+1)}{100} = \frac{43(50+1)}{100} = 21.93$$

$$p_{87} = \frac{87(n+1)}{100} = \frac{87(50+1)}{100} = 44.37$$

ومن ثم يكون لدينا:

$$\begin{aligned} P_{15} &= x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_7 + 0.65(x_8 - x_7) \\ &= 160 + 0.65(163 - 160) = 161.95 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{43} &= x_{(k)} + s(x_{(k+1)} - x_{(k)}) = x_{21} + 0.93(x_{22} - x_{21}) \\ &= 172 + 0.93(172 - 172) = 172 \end{aligned}$$

$$P_{87} = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_{44} + 0.37(x_{45} - x_{44}) \\ = 189 + 0.37(190 - 189) = 189.37$$

٢- عيّن قيم المئينات P_{25} ، P_{50} و P_{75} والخاصّة ببيانات المثال (٢) من (١-٢-٢-٢).

الإجابة: من أجل تعيين قيم المئينات علينا أولاً ترتيب البيانات المعطاة تصاعدياً، فنجد لها التسلسل الآتي:

65	77	86	98
66	77	87	98
70	77	88	102
73	78	92	106
76	85	95	115

الآن، وبما أنّ $n = 20$ فإنّ رتبة المئين P_{25} ، P_{50} و P_{75} ستكون على الترتيب هي:

$$p_{25} = \frac{25(n+1)}{100} = \frac{25(20+1)}{100} = 5.25$$

$$p_{50} = \frac{50(n+1)}{100} = \frac{50(20+1)}{100} = 10.5$$

$$p_{75} = \frac{75(n+1)}{100} = \frac{75(20+1)}{100} = 15.75$$

ومن ثمّ يكون لدينا:

$$P_{25} = x_5 + 0.25(x_6 - x_5) = 76 + 0.25(77 - 76) = 76.25$$

$$P_{50} = x_{10} + 0.5(x_{11} - x_{10}) = 85 + 0.5(86 - 85) = 85.5$$

$$P_{75} = x_{15} + 0.75(x_{16} - x_{15}) = 95 + 0.75(98 - 95) = 97.25$$

وبالرجوع إلى قيم الربيعيات الثلاثة التي قمنا بحسابها في ذلك المثال $Q_1 = 76.25$ ، $Q_2 = 85.5$ و

$Q_3 = 97.25$ نجد تطابق نتائجها مع قيم المئينات P_{25} ، P_{50} و P_{75} بشكل تام.

٣- لتكن لدينا البيانات الآتي والتي تمثّل درجات 23 طالباً في مقررٍ مبادئ في الإحصاء والاحتمالات (الدرجة التامة 100):

98	88	75	69	53	91	81	73	68	36	95	86
75	68	49	88	77	71	65	89	79	72	66	

والمطلوب ما يلي:

أ- ما هي الدرجة التي لن يتجاوزها 40% من الطلاب؟

ب- ما هي الدرجة التي سيتجاوزها 15% من الطلاب فقط؟

الإجابة: من أجل الإجابة على الأسئلة السابقة سنقوم بترتيب البيانات المعطاة تصاعدياً، فنجد لها التسلسل الآتي:

36	68	73	81	91
49	68	75	86	95
53	69	75	88	98
65	71	77	88	
66	72	79	89	

الآن من أجل الفقرة:

أ- إن الدرجة التي لن يتجاوزها 40% من الطلاب هي قيمة المئين P_{40} ، ورتبته تساوي:

$$p_{40} = \frac{40(23 + 1)}{100} = 9.6$$

ومن ثم يكون لدينا:

$$P_{40} = x_9 + 0.6 (x_{10} - x_9) = 71 + 0.6 (72 - 71) = 71.6$$

وبما أن القيم العشرية للدرجات تجبر بالزيادة إلى العدد الصحيح التالي فإن 60% من الطلاب سيكون لهم درجات أعلى 72.

ب- إن الدرجة التي سيتجاوزها 15% من الطلاب فقط هي قيمة المئين P_{85} ، ورتبته تساوي:

$$p_{85} = \frac{85(23 + 1)}{100} = 20.4$$

ومن ثم يكون لدينا:

$$P_{85} = x_{20} + 0.4 (x_{21} - x_{20}) = 89 + 0.4 (91 - 89) = 89.8$$

وبالتالي فإن 15% من الطلاب فقط سيكون لهم درجات أعلى 90.



الأعداد الخمسة والتمثيل الصندوقي للبيانات

Five Numbers and the Box Plot Representation of Data


يقصد بالأعداد الخمسة في الإحصاء الوصفي القيم الآتية:

١- أصغر قيمة في البيانات x_s ،

٢- أكبر قيمة في البيانات x_ℓ ،

٣- قيم الربيعيات الثلاثة Q_1 ، Q_2 و Q_3 .

إنَّ هذه الأعداد الخمسة تساعدنا في وصف تركز البيانات وانتشارها وشكل توزيعها، وأما العرض (أو التمثيل) الصندوقي Box Plot للبيانات فهو عرض رسومي للبيانات يقوم على أساس ملخص الأعداد الخمسة السابقة، ويتكوّن من صندوق وخطين طوليين يتوسطانه على طرفيه يُمَنَّةً ويسرى (أو من الأعلى والأدنى) يدعيان "الشُعيرتان Whiskers". ويُقدّم هذا العرض وفقاً لأحد الشكلين الآتيين:



الشكل [2-8]

أما نهاية الشعيرة اليمنى (وسنرمز لها بـ x_e) واليسرى (وسنرمز لها بـ x_a) فإنَّهما يعيَّنان كما يلي:

١- إذا كانت مجموعة البيانات لا تحتوي قيم متطرفة، فعندئذ يكون $x_e = x_\ell$ و $x_a = x_s$.


٢- إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على قيم متطرفة بصغرها فقط، فعندئذ يكون لدينا $x_a = LF$. أي أنَّ نهاية الشعيرة اليسرى x_a توافق الحد الأعلى للقيم المتطرفة بصغرها، ومن ثمَّ تبلغ الشعيرة اليسرى الطول الأعظمي لها. أما x_e فيكون مساوياً لـ x_ℓ في هذه الحالة.

٣- إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على قيم متطرفة بكبها فقط، فعندئذ يكون لدينا $x_e = HF$. أي أنَّ نهاية الشعيرة اليمنى x_e توافق الحد الأدنى للقيم المتطرفة بكبها، ومن ثمَّ تبلغ الشعيرة اليمنى الطول الأعظمي لها. أما x_a فيكون مساوياً لـ x_s في هذه الحالة.

٤- إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على قيم متطرفة بصغرها وأخرى متطرفة بكبها، فعندئذ يكون لدينا $x_e = HF$ و $x_a = LF$ ، وفي هذه الحالة تبلغ الشعيرتان اليمنى واليسرى الطول الأعظمي


٢-٤-١- ملاحظات

- ١- عند تقديم الرسم الصندوقي يُشار إلى كل قيمة متطرفة بنجمة (*) أو نقطة (•).
- ٢- إذا كان توزيع البيانات متناظراً، فعندئذٍ سيتمركز الصندوق وخط الوسيط بين نقطتي النهاية للشعيرتين (انظر الشكل التوضيحي الآتي).




الشكل [2-9-a]

- ٣- إذا كان توزيع البيانات ملتوياً نحو اليسار فعندئذٍ سينزاح الصندوق لليمين باتجاه نهاية الشعيرة اليمنى (انظر الشكل [2-9-b])، وأما إذا كان توزيع البيانات ملتوياً نحو اليمين فإن الصندوق سينزاح إلى اليسار باتجاه نهاية الشعيرة اليسرى (انظر الشكل [2-9-c]). أما خط الوسيط فيمكن له أخذ أية وضعية داخل الصندوق في هاتين الحالتين.



الشكل [2-9-c]



الشكل [2-9-b]

بهذا يمكننا استخدام العرض الصندوقي للبيانات لمعرفة إن كان توزيع البيانات ملتوياً أم لا.

٢-٤-٢- أمثلة

- ١- لتكن لدينا مجموعة البيانات الآتية:

$$8, 4, 7, 6, 9, 1, 5, 9, 3, 17, 5, -7$$

والمطلوب تعيين الأعداد الخمسة لهذه المجموعة من البيانات، ومن ثمّ رسم المخطط الصندوقي لها.

الإجابة: من أجل تعيين الأعداد الخمسة سنقوم أولاً بترتيب البيانات تصاعدياً فنجد لها العرض الآتي:

$$-7, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 17$$

ومن ثمّ تكون الأعداد الخمسة لهذه البيانات هي:

$$x_s = -7 \quad \& \quad x_\ell = 17 \quad \& \quad Q_1 = 3.25 \quad \& \quad \tilde{x} = Q_2 = 5.5 \quad \& \quad Q_3 = 8.75$$

وأما من أجل تحديد القيم المتطرفة بصغرها والتي تكون أصغر من نهاية الشعيرة اليسرى، فلدينا:


$$LF = 3.25 - 1.5(8.75 - 3.25) = -5$$

أي أن القيم المتطرفة بصغرها هي تلك القيم التي تكون أصغر من -5، ومن ثم لدينا قيمة متطرفة بصغرها في البيانات المقدمة هي $x_s = -7$.

كذلك من أجل تحديد القيم المتطرفة بكبها التي تكون أكبر من نهاية الشعيرة اليمنى لدينا:
 $HF = 8.75 + 1.5(8.75 - 3.25) = 17$

أي أن القيم المتطرفة بكبها هي تلك القيم التي تكون أكبر من 17، ومن ثم لا وجود لقيمة متطرفة بكبها في البيانات المقدمة.

هكذا نجد أن الشعيرتان اليمنى واليسرى تبلغان الطول الأعظم لهما حيث لدينا $x_a = LF = -5$ و $x_e = HF = 17$ ، ومن ثم يكون التمثيل الصندوقي للبيانات المعطاة العرض الآتي:



الشكل [2-10]

٢- لتكن لدينا مجموعة البيانات الآتية:

2, 5, 7, 4, 8, 9, 4, 8, 5, 6, 15, 4

والمطلوب تعيين الأعداد الخمسة لهذه المجموعة من البيانات، ومن ثم رسم المخطط الصندوقي لها.

الإجابة: من أجل تعيين الأعداد الخمسة سنقوم أولاً بترتيب البيانات تصاعدياً فنجد لها العرض الآتي:

2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 15

ومن ثم تكون الأعداد الخمسة لهذه البيانات هي:

$$x_s = 2 \quad \& \quad x_e = 15 \quad \& \quad Q_1 = 4 \quad \& \quad \tilde{x} = Q_2 = 5.5 \quad \& \quad Q_3 = 8$$

وأما من أجل تحديد القيم المتطرفة بصغرها فلدينا:


$$LF = 4 - 1.5(8 - 4) = -2$$

ومن ثم لا وجود لقيم متطرفة بصغرها في البيانات المعطاة، ولذلك سيتوقف الطرف الأيسر من الشعيرة اليسرى عند أصغر قيمة للبيانات.

كذلك من أجل تحديد القيم المتطرفة بكبها لدينا:

$$HF = 8 + 1.5(8 - 4) = 14$$

ومن ثم لدينا قيمة متطرفة بكبها في البيانات المقدمة وهي $x_e = 15$ ، وهكذا نجد أن الشعيرة اليمنى تبلغ الطول الأعظم لها، وبالتالي يصبح للتمثيل الصندوقي للبيانات المعطاة الشكل الآتي.



الشكل [2-11]

تمارين

- ١- قام شخص بشراء أربعة أنواعٍ مختلفةٍ من التفاح بأسعار متباينة للكيلو غرام الواحد هي: 5.95، 6.95، 7.95 و 6.25. فما هو متوسط سعر الكيلو غرام الواحد من التفاح الذي اشتراه هذا الشخص؟
- ٢- بفرض أن 1، 3، 5، 7، 2، 3، 6، 3، 2 و 8 تمثل أوزان عشرة صناديق من الفاكهة (مقدرة بالكيلوغرام)، فعندئذ احسب المتوسط والوسيط، ومن ثمّ عيّن المنوال (إن وجد) لهذه البيانات؟
- ٣- الجدول الآتي يقدم لنا درجات خمسين طالباً في أحد المقررات الدراسية:

نطاق الدرجات الفئات الفعلية	أعداد الطلاب الحاصلين على هذه الدرجة التكرار
49.5 → 59.5	3
59.5 → 69.5	12
69.5 → 79.5	10
79.5 → 89.5	17
89.5 → 99.5	8
المجموع	50

والمطلوب ما يلي:

- أ- تعيين الفئات المنوالية إن وجدت وتحديد قيمتها.
- ب- تعيين الفئة الوسيطة وتحديد قيمتها.
- ج- حساب المتوسط لبيانات هذا الجدول.
- ٤- إذا كان لدينا خمس مشاهدات بمتوسط $\bar{x} = 10$ ، فما هو مجموع هذه المشاهدات؟
- ٥- إذا كان لدينا عينة متوسطها $\bar{x} = 10$ ومجموع بياناتها 100، فما هو عدد البيانات في هذه العينة؟
- ٦- إذا كان لدينا مشاهدات x_1 ، x_2 ، x_3 و x_4 متوسطها $\bar{x} = 6$ ، فما هو متوسط المشاهدات:
- $$\frac{x_4}{4} + 0.5 \text{ و } \frac{x_3}{4} + 0.5 \text{ ، } \frac{x_2}{4} + 0.5 \text{ ، } \frac{x_1}{4} + 0.5$$
- ٧- ما هو مقياس النزعة المركزية المناسب لكل من البيانات الآتية، ولماذا؟
- a) 2, 4, 4, 7, 7, 7, ?, 8, 10, 13, 15, 19, 21
- b) 1, 4, 5, 7, ?, 8, 13, 13, 15, ?, 22, 25, ?
- c) 20, 24, 31, 27, 28, 30, 23, 25
- d) 20, 23, 21, 121, 28, 30, -20, 28
- e) 20, 21, 21, 37, 18, -25, 23, 35
- f) 4, 5, 7, 9, ?, ?, 11, 15, 18, 23

علماً أنّ ? تشير إلى القيم المفقودة في البيانات.

تمارين

٨- ما هو المنوال (في حال وجوده) لكل من مجموعات المشاهدات الآتية:

أ- مجموعة المشاهدات 3، 1، 3، 5، 7، 11، 6، 9 و 8

ب- مجموعة المشاهدات 7، 5، 1، 6، 11، 17، 12 و 21

ج- مجموعة المشاهدات 3، 3، 3، 3، 3 و 3

د- مجموعة المشاهدات 1، 3، 1، 5، 3، 1، 5 و 5

٩- أي مقياس من مقاييس النزعة المركزية يمكن استخدامه مع فواصل الدم O، A، B و AB لمجموعة من الأشخاص.

١٠- سجّل أحد الطلاب في خمسة مقرّرات لفصل دراسي، وكانت الدرجات التي حصل عليها في كل مقرّر والأوزان الموافقة لها مقدّمة في الجدول الآتي.

المقرّر	O	N	M	L	K
الدرجة	95	73	84	94	85
الوزن	1	2	3	3	2

والمطلوب حساب المعدّل التراكمي (المتوسط الموزون) للطلاب في ذلك الفصل؟

١١- لتكن لدينا البيانات الآتية لعينة عشوائية:

4, 7, 5, 4, 8, 5, 17, 8, 7, 13, 2, 4

والمطلوب ما يلي:

أ- تعيين المنوال (أو المتناوب في حال وجودها)، ومن ثمّ حساب المتوسط وبعد ذلك الوسيط أيضاً.

ب- احسب الربيعي الأول والثالث لهذه البيانات.

ج- احسب المئين الـ 65 لهذه البيانات.

د- بين فيما إذا كانت توجد قيم متطرفة في البيانات المعطاة أم لا.

هـ- تقديم الرسم الصندوقي لهذه البيانات موضحاً عليه جميع المسميات والرموز.

و- بناءً على شكل المخطط الصندوقي للبيانات. هل تلاحظ وجود التواء في توزيع البيانات وإلى أية جهة؟

١٢- لدى معاينة أوزان 20 طفلاً أعمارهم دون العام الواحد وجدنا البيانات الآتية (مقدّرة بالكيلو غرام):

7.0	11.5	7.7	10.2
7.3	10.6	7.7	8.8
8.5	9.8	7.8	6.5
8.7	9.8	7.7	9.2
8.6	9.5	6.6	7.6

والمطلوب ما يلي:

- تعيين الربيعيات الثلاثة Q_1 و Q_2 و Q_3 .
- تعيين القيم المتطرفة إن وجدت.
- تقديم الرسم الصندوقي لهذه البيانات موضحاً عليه جميع المسميات والرموز.
- بناءً على شكل المخطط الصندوقي للبيانات. هل تلاحظ وجود التواء في توزيع البيانات وإلى أية جهة؟


١٣- تقدم لنا البيانات الآتية الطول لثلاثين شخصاً بالغاً (مقدرةً بالسنتيمتر).

178	181	120	171	172	169	158	177	147	172
173	149	158	195	189	163	160	184	201	169
172	173	171	147	178	173	179	218	169	185

والمطلوب ما يلي:

- تعيين الربيعيات الثلاثة Q_1 و Q_2 و Q_3 .
- تعيين القيم المتطرفة إن وجدت.
- تقديم الرسم الصندوقي لهذه البيانات موضحاً عليه جميع المسميات والرموز.
- بناءً على شكل المخطط الصندوقي للبيانات. هل تلاحظ وجود التواء في توزيع البيانات وإلى أية جهة؟

١٤- لتكن لدينا مجموعات البيانات الموضحة في العروض الآتية:




والمطلوب ما يلي:

- ماذا تمثل النقطة الزرقاء على الرسم المقدم؟
- أي من هذه البيانات تملك منوالاً (أو مناوئيل)، ثم عيّنها في حال وجودها؟
- أيها أكثر تبعثراً حول المتوسط، ولماذا؟
- عين موضع الوسيط لكل منها على الرسم.

تمارين

١٥- لدينا مجموعات لبيانات مقدّمة من خلال المخططات الصندوقية الآتية:



والمطلوب ما يلي:

أ- عين الأعداد الخمسة الخاصة بكل مخطط من هذه المخططات.


ب- أي من هذه الأشكال يدلّ على توزيع متناظر؟

ج- أي من هذه الأشكال يدلّ على توزيع ملتوٍ نحو اليمين؟

د- أي من هذه الأشكال يدلّ على توزيع ملتوٍ نحو اليسار؟


هـ- أي من هذه الأشكال يشير إلى وجود قيم متطرفة بـكبرها؟

و- أي من هذه الأشكال يشير إلى وجود قيم متطرفة بصغرها؟



الفصل الثالث

مقاييس الاختلاف للبيانات Variability Measures of Data



المقدمة:

لقد ذكرنا في الفصل السابق أنه من المقاييس الضرورية للتعرف على سلوك البيانات الإحصائية هي تلك المقاييس التي تهتم بتبعثر البيانات حول مقياس نزعتها المركزية (وعلى وجه الخصوص حول متوسطها)، وذلك لأنه قد يكون لدينا مجموعتي بيانات أو أكثر من ذات الطبيعة (لها وحدة القياس نفسها) ولها قيمة مقياس النزعة المركزية نفسه، ولكن تبعثر البيانات حول مقياس نزعتها المركزية مختلف من مجموعة بيانات إلى أخرى، وبالتالي استخدام مقياس النزعة المركزية من أجل المقارنة بين سلوك هذه المجموعات من البيانات يصبح غير ذي جدوى. هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد يكون لقيم البيانات في تلك المجموعات وحدات قياس مختلفة، ومن ثم عملية المقارنة بين سلوك هذه المجموعات من البيانات يصبح غير ذي جدوى أيضاً حتى لو علمنا كيفية تبعثر البيانات حول مقياس نزعتها المركزية لتلك المجموعات من البيانات. لذلك كان لا بد من تقديم مقاييس تساعدنا في مقارنة سلوك البيانات حتى في حال اختلاف وحدات القياس لبيانات تلك المجموعات من البيانات. إن المقاييس التي تساعدنا في مقارنة سلوك البيانات حتى في حال اختلاف وحدات القياس تدرج تحت اسم « مقاييس الاختلاف للبيانات ».

■ ٣- ١ - مقاييس التشتت

■ ٣- ٢ - معاملات من أجل مقارنة التشتت لمجموعي بيانات أو أكثر

■ ٣- ٣ - الدرجة المعيارية Z

٣ - ١ مقاييس التشتت

Dispersion Measures

كما ذكرنا في مقدمة هذا الفصل أنه من الممكن أن يكون لدينا مجموعتي بيانات أو أكثر من ذات الطبيعة (لها وحدة القياس نفسها) ولها قيمة مقياس النزعة المركزية نفسه، ولكن تبعثر البيانات حول مقاييس نزعتها المركزية مختلف من مجموعة بيانات إلى أخرى، ولتوضيح ذلك سنأخذ المثال الآتي.


٣-١-١-٣ مثال

ليكن X و Y متغيرين راصدين لدرجات الحرارة في مدينتين A و B على الترتيب، علماً أن قياس درجة الحرارة (مقدرة بالدرجات المئوية Celsius) قد بدأ الساعة السادسة صباحاً، وأخذ قياساً كل ثلاث ساعات ليوم كامل.

الجدول [3-1]

الوقت	3	6	9	12	15	18	21	24	27
قيم المتغير X	16	22	28	34	36	39	25	12	6
قيم المتغير Y	18	26	28	30	31	32	25	22	12

ف نجد أن متوسط درجات الحرارة في كلا المدينتين خلال هذا اليوم يساوي 26.5 إلا أن تبعثر قيم درجات الحرارة حول متوسطها يختلف من مدينة إلى أخرى حيث نلاحظ أن بيانات المتغير Y قريبة من المتوسط على خلاف بيانات المتغير X التي تتناثر مبتعدة عن المتوسط (انظر الشكل الآتي).



الشكل [3-1]

مما سبق يتبين لنا ضرورة وجود مقاييس تُحدد لنا بدقة كيفية تبعثر البيانات حول مقياس نزعتها المركزية ليتكوّن لدينا انطباعاً أكثر وضوحاً حول سلوك البيانات.

إنّ المقاييس التي تهتمّ بتحديد مقدار كمّي لقياس مدى تبعثر البيانات حول مقياس نزعتها المركزية تدعى **مقاييس التشتت**، وسنقدم فيما يلي بعضاً منها.

٣-١-٢- الانحراف المعياري Standard Deviation

لقد لوحظ أنه يمكن النظر إلى قيم الفروقات بين البيانات ومتوسطها كمقياس للتشتت، ولكن المجموع الجبري لهذه الفروق يساوي الصفر دوماً، ولذلك طُرِحَت فكرة استخدام مربعات قيم تلك الفروقات كمقياس للتشتت، فكانت فكرة تقديم الانحراف المعياري الذي سنمهد له من خلال التعريف الآتي.

٣-١-٢-١- تعريف (التباين Variance)

لتكن لدينا بيانات عيّنة، فعندئذٍ لتعريف التباين لهذه البيانات (ويُرمز له بـ S^2) سَنَمَيِّز بين الحالتين الآتيتين:

١- إذا كانت البيانات خام من قبيل x_1, x_2, \dots, x_n بمتوسط \bar{x} ، فإن التباين يُعطى من خلال العلاقة الآتية:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad [3-1-a]$$

وبالتعويض في العلاقة السابقة عن قيمة المتوسط \bar{x} بما يساويها بدلالة المجموع وعدد البيانات، ومن ثم إجراء بعض التعديلات على العلاقة يصبح للعلاقة السابقة العرض الآتي:

$$S^2 = \frac{1}{n(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right] \quad [3-1-b]$$

وهذه العلاقة تستخدم قيم البيانات مباشرة دون اللجوء إلى حساب المتوسط أو معرفة قيمته.

٢- إذا كانت البيانات كمية ومجمعة في جدول تكراري لـ m ممثلاً كما في الجدول [1-1]، وكان متوسط بيانات الجدول يساوي \bar{x} ، فإن قيمة التباين لبيانات ذلك الجدول تُعطى من خلال العلاقة الآتية:

$$S^2 = \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^m f_i \right) - 1} \sum_{i=1}^m f_i (x_i - \bar{x})^2 \quad [3-2]$$

علماً أن x_i و f_i هما قيمة الممثل i وتكراره على الترتيب.

٣- إذا كانت البيانات مجمعة في جدول توزيع تكراري بـ k فئة وكان متوسطها \bar{x} ، فإن قيمة التباين تُعطى من خلال العلاقة الآتية:

$$S^2 = \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^k f_i \right) - 1} \sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2 \quad [3-3]$$

علماً أن x_i و f_i هما مركز وتكرار الفئة i على الترتيب.

٣-٢-١-٢- تعريف (الانحراف المعياري Standard Deviation)

يُعرف الانحراف المعياري على أنه الجذر التربيعي الموجب للتباين، ويرمز له بـ S ، أي أنه لدينا:

$$S := +\sqrt{S^2} \quad [3-4]$$

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانحراف المعياري يستخدم وحدة قياس البيانات نفسها.

٣-٢-١-٣- ملاحظات

١- إن استخدام رمز التربيع فوق الرمز S للدلالة على أن التباين هو مقدار غير سالب، وأن القيمة الناتجة عنه تقرأ بالوحدة المربعة لوحدة القياس المستخدمة في البيانات، فعلى سبيل المثال إذا كانت وحدة القياس للبيانات هي الكيلو غرام فإن قيمة التباين لهذه البيانات تقرأ بالكيلو غرام المربع، ولهذا السبب لا يستخدم التباين بحد ذاته كمقياس للتشتت.

٢- إن مجموع مربعات انحرافات قيم البيانات x_1, x_2, \dots, x_n عن أي عدد حقيقي a يكون أصغرياً عندما يكون $a = \bar{x}$ ، ولهذا السبب يُنظر إلى الانحراف المعياري (الناتج عن مفهوم التباين) على أنه أفضل مقياس للتشتت.

٣-٢-١-٤- أمثلة

١- ليكن X متغيراً راصداً لدرجات 10 طلاب في اختبار قصير (من 10 درجات):

7, 4, 9, 7, 8, 10, 9, 3, 7, 6

والمطلوب حساب الانحراف المعياري لدرجات الطلاب.

الإجابة: من أجل تبسيط عملية الحساب وكسب الوقت في الإجابة على مثل هذه المسائل يُفضل بناء جدول

حسابات على النحو الآتي إذا كنا سنستخدم المتوسط في حساب الانحراف المعياري:

الجدول [3-2]

i	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	7	0	0
2	4	-3	9
3	9	2	4
4	7	0	0
5	8	1	1
6	10	3	9
7	9	2	4
8	3	-4	16
9	7	0	0
10	6	-1	1
Total	70	0	44

ف نجد أن متوسط درجات الطلاب \bar{x} يساوي:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{7 + 4 + 9 + \dots + 7 + 6}{10} = \frac{70}{10} = 7$$

ومن أجل الانحراف المعياري لدرجات الطلاب علينا القيام أولاً بحساب التباين لبيانات درجات الطلاب فنجد باستخدام العلاقة [3-1-a] أن:

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{(7-7)^2 + (4-7)^2 + \dots + (7-7)^2 + (6-7)^2}{9} \\ &= \frac{44}{9} = 4.\bar{8} \end{aligned}$$

ومنه ينتج لدينا أن الانحراف المعياري لدرجات الطلاب يساوي:

$$S = +\sqrt{S^2} = +\sqrt{4.9} = 2.21$$

٢- عندما نتسوق في أحد المتاجر للمواد التموينية لاحظنا أنه كتبت على إحدى السلع عبارة "الوزن الصافي ...

كغ ± ... كغ"، وللتحقق من ذلك قمنا بوزن 15 قطعة من هذه السلعة فوجدنا القيم الآتية (مقدرة بـ كغ):

4.87, 5.2, 5.1, 4.95, 4.85, 4.85, 4.75, 4.97, 5.15, 5.05, 5.2, 5.05, 5.12, 4.98, 4.91

والمطلوب تعيين الوزن الصافي الذي يفترض كتابته على علب هذه السلعة مع تحديد قيمة ± ... التي كتبت إلى جانبها.

الإجابة: إن قيمة الوزن الصافي الذي يفترض كتابته على علب هذه السلعة يقصد به متوسط الأوزان لجميع

قطع هذه السلعة، وأما العبارة ± ... كغ فيقصد بها أن معظم هذه السلع يمكن لها أن تقل أو تزيد عن المتوسط بالمقدار المشار إليه وهو في الواقع قيمة الانحراف المعياري لأوزان هذه السلعة، ولكن لحساب الانحراف المعياري يجب علينا حساب التباين أولاً حيث سنستخدم العلاقة [3-1-b]، ولأجل ذلك سنستخدم الجدول الآتي الذي يسهل علينا إنجاز العمليات الحسابية.

الجدول [3-3]

i	x_i	x_i^2
1	4.87	23.7169
2	5.20	27.04
3	5.10	26.01
4	4.95	24.5025
5	4.85	23.5225
6	4.85	23.5225
7	4.75	22.5625
8	4.97	24.7009

i	x_i	x_i^2
9	5.15	26.5225
10	5.05	25.5025
11	5.20	27.04
12	5.05	25.5025
13	5.12	26.2144
14	4.98	24.8004
15	4.91	24.1081
Total	75	375.268

ومنه يكون لدينا:

$$S^2 = \frac{1}{n(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right]$$

$$= \frac{15(375.268) - (75)^2}{15 \times 14} = \frac{0.2682}{210} = 0.01914$$

ومن ثمَّ ينتج أن قيمة الانحراف المعياري لأوزان هذه السلعة يساوي:

$$S = +\sqrt{S^2} = +\sqrt{0.01914} = 0.138 \text{ Kg}$$

وبهذا يصبح للعبارة "الوزن الصافي ... كغ ± ... كغ" العرض الآتي:

الوزن الصافي 5 كغ ± 0.138 كغ

٣- بالعودة إلى بيانات المثال (٤) من (٢-١-٤) سنقوم بحساب الانحراف المعياري لتلك البيانات.

لقد كُنَّا قد حسبنا قيمة المتوسط لتلك البيانات، وكان لدينا $\bar{x} = 61.90$ ، ومن أجل إتمام عملية الحساب للتباين يُفَضَّلُ بناء جدول حسابات على النحو الآتي:

الجدول [3-4]

العيادة	تكلفة المعاينة x_i والطبابة	عدد الزائرين f_i	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i(x_i - \bar{x})^2$
العينية	55	16	47.61	761.76
الأذن والأنف والحنجرة	45	35	285.61	9996.35
العظمية	85	20	533.61	10672.2
الباطنية	65	14	9.61	134.54
العصبية	75	15	171.61	2574.15
Total	325	100	-----	24139

ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$S^2 = \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^m f_i \right) - 1} \sum_{i=1}^m f_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{24139}{100 - 1} = 243.828$$

ومنه نجد أن قيمة الانحراف المعياري للبيانات تساوي:

$$S = +\sqrt{S^2} = +\sqrt{243.828} = 15.615$$

٤- الجدول الآتي يقدم عدد الحوادث المرورية خلال شهر معين لكل فئة عمرية في مدينة ما X.

الجدول [3-5]

الفئة العمرية	عدد الحوادث
18 → 24	37
24 → 30	28
30 → 36	17
36 → 42	8
42 → 48	5
Total	95

والمطلوب حساب متوسط عدد الحوادث في هذه المدينة، ومن ثمّ حساب الانحراف المعياري المرافق له.

الإجابة: من أجل متوسط والانحراف المعياري سنقدم جدول الحسابات الآتي:

الجدول [3-6]

i	مراكز الفئات x_i	التكرارات f_i	$f_i \cdot x_i$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i(x_i - \bar{x})^2$
1	21	37	777	44.823	1658.452
2	27	28	756	0.483	13.5247
3	33	17	561	28.143	478.4314
4	39	8	312	127.803	1022.424
5	45	5	225	299.463	1497.315
Total	-----	95	2631	-----	4670.147

والآن لنحسب المتوسط، فنجد:

$$\bar{x} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k f_i} \sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i = \frac{(37 \times 21) + \dots + (5 \times 45)}{95} = \frac{2631}{95} = 27.695$$

وأما لحساب التباين فإننا سنستخدم العلاقة [3-2]، فيكون لدينا:

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^k f_i\right) - 1} \sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{37(21 - 27.695)^2 + \dots + 5(45 - 27.695)^2}{94} \\ &= \frac{37(44.823)^2 + \dots + 5(299.463)^2}{94} \\ &= \frac{4670.147}{94} = 49.68 \end{aligned}$$

وبالتالي فإن قيمة الانحراف المعياري تساوي:

$$S = +\sqrt{S^2} = +\sqrt{49.68} = 7.05$$

١-٢-٣-٥- مزاي الانحراف المعياري

- ١- سهل الحساب.
- ٢- إن الانحراف المعياري هو أفضل مقاييس التشتت بلا منازع كما ذكرنا ذلك سابقاً، ويأخذ بالحسبان جميع قيم البيانات.

١-٢-٣-٦- عيوب الانحراف المعياري

- ١- إن الانحراف المعياري يتأثر بالقيم المتطرفة، وذلك لأنه إذا وجدت قيم متطرفة فإن المتوسط سيتأثر بها، ومن ثم سينتقل هذا التأثير على قيمة الانحراف المعياري أيضاً.
- ٢- إذا فقدت إحدى أو بعض البيانات فعندئذ يصبح الانحراف المعياري عديم الفائدة.

هكذا نلاحظ أنه في حال فقدان بعض قيم البيانات يجب علينا البحث عن مقياس آخر للتشتت، وفي حال وجود قيم متطرفة يُفضل استخدام مقاييس أخرى للتشتت أيضاً. إن المقياس الآتي يقدم لنا بعض الحلول الجزئية للمشكلات التي ذكرناها سابقاً.

لقد قمنا في الفصل الأول بتقديم تعريف المدى لمجموعة من البيانات الخام (التعريف ١-٣-١) من خلال العلاقة [1-2]، وأما إذا كانت البيانات مجمعة في جدول توزيع تكراري فعندئذ يعرف المدى كما في التعريف الآتي.

١-٢-٣-٢- المدى Range

لتكن لدينا بيانات مجمعة في جدول توزيع تكراري بـ k فئة، فعندئذ تعطى قيمة المدى لبيانات هذا الجدول من خلال العلاقة الآتية:

$$R = x_k - x_1 \quad [3-5]$$

علماً أن x_k و x_1 هما مركز الفئة الأولى والأخيرة على الترتيب.

في الواقع يُعدّ المدى مقياساً للتشتت في حال فقدان بعض البيانات غير الواقعة على أطراف البيانات بعد ترتيبها، أي أنه عندما تكون أكبر وأصغر قيمة في البيانات ليست في عداد البيانات المفقودة. لكن لا يُنظر إلى هذا المقياس على أنه مقياس جيد للتشتت رغم أنه يُعطي صورة عن مدى تشتت مجموعة من البيانات، إذ إنه وفي كثير من الحالات (وخاصة لدى العينات كبيرة الحجم) لا يُظهر لنا بوضوح توضع البيانات حول متوسطها لأنه يعتمد على الفرق بين أكبر وأصغر قيمة فقط، والمثال الآتي يوضح لنا ذلك.

١-٢-٣-١- مثال

لنأخذ مجموعتي البيانات الآتيتين:

الجدول [3-7]

3	8	5	10	7	15	7	9	9	مجموعة البيانات X
7	8	5	8	17	6	8	5	5	مجموعة البيانات Y

٢- يكثر استخدامه لسهولة فهمة من عامة الناس، حيث يستخدم لدى الإعلان عن حالات المناخ: كدرجات الحرارة، الرطوبة والضغط الجوي.

٣- له استخدامات في بعض الدراسات الإحصائية المهمة مثل مراقبة الجودة.

٣-٢-١-٣- عيوب المدى كمقياس للتشتت

١- يعتمد على قيمتين فقط، ولا يأخذ جميع القيم في الحسبان، ومن ثم تكون قيمته أقل دقة من الانحراف المعياري.

٢- يتأثر بالقيم المتطرفة بشكل كبير جداً لأنه في الأصل يعتمد على القيم التي تقع على الأطراف.

إذن، فلا بد من البحث عن مقياس آخر يتجاوز السلبيات للمقياس السابق، وفي هذا الإطار نجد أن مقياس التشتت الآتي يقدم لنا حلاً جزئياً آخر لمشكلة وجود القيم المتطرفة في البيانات.

٣-١-٣- تعريف (المدى الربيعي Interquartile Range)

لتكن x_1, x_2, \dots, x_n بيانات خام لعينة معطاة، فعندئذ يُعرّف المدى الربيعي (ويُرمز له IQR) من خلال العلاقة الآتية:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

[3-6]

علماً أن Q_1 و Q_3 هما الربيعي الأول والثالث للبيانات على الترتيب.

لاحظ أن هذا المقياس يحسب المدى لنصف عدد البيانات الواقعة في الوسط بعد ترتيبها تصاعدياً، ومن ثم فإن القيم المتطرفة ستصبح خارج نطاق هذا المقياس. من جهة أخرى، فعلى الرغم من أن هذا المقياس أفضل من المدى إلا أنه يعتمد في قراره على قيمتين من البيانات فقط ولا يأخذ في الحسبان مواضع جميع البيانات، ولهذا السبب يُنظر إلى هذا المقياس على أنه مقياس ضعيف للتشتت أيضاً، ولكنه يُعدّ مقبولاً في حال فقدان بعض البيانات المعلوم ترتيبها وغير الموافقة لقيمتي الربيعيين الأول والثالث.

أخيراً نشير إلى أن نصف قيمة المدى الربيعي $Q = IQR / 2$ تدعى الانحراف الربيعي Quartile Deviation، وتستخدم كمقياس للتشتت أيضاً.

٣-١-٣-١- أمثلة

١- لتكن لدينا البيانات الإحصائية الآتية:

8, 5, 3, 11, 5, 4, 7, 5, 3, 9, 6

والمطلوب حساب المدى الربيعي لهذه البيانات.

الإجابة: من أجل ذلك يجب حساب الربيعي الأول والثالث، وهذا يتطلب ترتيب البيانات أولاً حيث لدينا:

3	3	4	5	5	5	6	7	8	9	11	البيانات بعد ترتيبها
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	رموز البيانات بعد ترتيبها

وبما أن $n = 11$ فإن رتبة الربيعي Q_1 و Q_3 ستكون على الترتيب هي:

$$q_1 = \frac{n+1}{4} = \frac{11+1}{4} = 3 \quad \& \quad q_3 = \frac{3(n+1)}{4} = \frac{3(11+1)}{4} = 9$$

ومن ثم يكون لدينا:

$$Q_1 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_3 + 0(x_4 - x_3) = 4$$

$$Q_3 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_9 + 0(x_{10} - x_9) = 8$$

وهكذا يكون المدى الربيعي لمجموعة البيانات هو:

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 8 - 4 = 4$$

٢- بالرجوع إلى بيانات الجدول [3-7] حيث لدينا $n = 8$ فإننا نجد ما يلي:

أ- من أجل البيانات X: نجد للبيانات بعد ترتيبها تصاعدياً العرض الآتي:

3	5	7	7	8	9	10	15	البيانات X بعد ترتيبها
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	رموز البيانات بعد ترتيبها

ومن ثم يكون لرتبة الربيعي Q_1 و Q_3 القيمتين الآتيتين على الترتيب:

$$q_1 = \frac{n+1}{4} = \frac{8+1}{4} = 2.25 \quad \& \quad q_3 = \frac{3(n+1)}{4} = \frac{3(8+1)}{4} = 6.75$$

ومنه يكون لدينا:

$$Q_1 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_2 + 0.25(x_3 - x_2) = 5 + 0.5 = 5.5$$

$$Q_3 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_6 + 0.75(x_7 - x_6) = 9 + 0.75 = 9.75$$

وهكذا يكون المدى الربيعي لمجموعة البيانات هو:

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 9.75 - 5.5 = 4.25$$

ب- من أجل البيانات Y: فنجد للبيانات الترتيب التصاعدي الآتي:

5	5	6	7	8	8	8	17	البيانات Y بعد ترتيبها
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	رموز البيانات بعد ترتيبها

ومن ثم يكون لرتبة الربيعي Q_1 و Q_3 القيمتين الآتيتين على الترتيب:

$$q_1 = \frac{n+1}{4} = \frac{8+1}{4} = 2.25 \quad \& \quad q_3 = \frac{3(n+1)}{4} = \frac{3(8+1)}{4} = 6.75$$

ومنه يكون لدينا:

$$Q_1 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_2 + 0.25(x_3 - x_2) = 5 + 0.25 = 5.25$$

$$Q_3 = x_k + s(x_{k+1} - x_k) = x_6 + 0.75(x_7 - x_6) = 8 + 0 = 8$$

وهكذا يكون المدى الربيعي لمجموعة البيانات هو:

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 8 - 5.25 = 2.75$$



بذلك نجد أن مجموعة البيانات X تتبعثر حول متوسطها بشكل أكبر من تبعثر مجموعة البيانات Y حول متوسطها، وهكذا نلاحظ أن ما عجز عنه المدى (في إظهار فروق التشتت لمجموعتي البيانات) أنجزه المدى الربيعي.

مُعاملات من أجل مقارنة التشتت لمجموعتي بيانات أو أكثر

Coefficients for Comparison of Dispersion of Two or More Data Sets

لقد لاحظنا أن مقاييس التشتت تعتمد على وحدة القياس المستخدمة من أجل البيانات، ولذلك يصعب علينا إجراء المقارنة بين تشتت مجموعتي بيانات أو أكثر عندما تكون وحدات القياس المستخدمة من أجل كل منها مختلفة عن الأخرى، ولذلك كان لابد من وضع معيارٍ يمكننا من الحكم على مثل هذه المقارنات حتى في حال كانت وحدات القياس مختلفة بعضها عن البعض الآخر. يقدم لنا المعيار الآتي حلاً لهذه الإشكالية.

١-٢-٣-١-٢-٣ تعريف مُعامل التغيُّر (أو الاختلاف) Coefficient of Variation

لتكن لدينا مجموعة بيانات عينة بمتوسط $\bar{x} \neq 0$ وانحراف معياري S ، فعندئذٍ يُعرَّف مُعامل التغيُّر (والذي يُرمز له بـ CV) لهذه البيانات من خلال العلاقة الآتية:

$$CV := \frac{S}{\bar{x}} \times 100 \% \quad [3-7]$$

ويقرأ الناتج كنسبة مئوية كما هو واضح.

لاحظ أن مُعامل التغيُّر يقدم لنا قيمة تجعلنا نشعر بمدى التغيُّر الحاصل لتغيُّر ما، وبفينا في مقارنة إحصائية لدرجة التباين من سلسلة بيانات إلى أخرى حتى ولو كانت وحدات القياس تختلف بشكل كبير بعضها عن البعض الآخر، وذلك لأن نسبة الانحراف المعياري إلى المتوسط الحسابي تلغي خاصية وحدة القياس المستخدمة (فمثلاً: متر على متر، كيلوغرام على كيلوغرام، فولط على فولط أو ... حيث يختفي أثر وحدة القياس) وإظهار مفعول التباين بأن واحد، ومن ثم تقديم هذه القيمة كنسبة مئوية خاصة بالبيانات. أخيراً نشير إلى أن $|CV|$ (القيمة المطلقة لمعامل الاختلاف) تُعرف باسم "الانحراف المعياري النسبي" Relative Standard Deviation (RSD)، ويُعبَّر عنها كنسبة مئوية أيضاً.

١-٢-٣-١-٢-٣ مثال

لتكن لدينا مجموعتي بيانات تمثل الطول والوزن لستة أطفال في سن العاشرة، ومقدمتين من خلال الجدول الآتي:

الجدول [3-9]

الشخص	A	B	C	D	E	F
الطول X بـ سم	123	114	128	137	119	129
الوزن Y بـ كغ	25	31	29	34	31	33

فهل تشير هذه البيانات إلى أن تبعثر قياسات الطول حول متوسطها أصغر من تبعثر قياسات الوزن حول متوسطها؟

الإجابة: نلاحظ أن وحدة القياس بين مجموعتي البيانات مختلفة، وبالتالي لا يمكننا استخدام الانحراف المعياري من أجل إجراء المقارنة المطلوبة، ولذلك سنستخدم معامل الاختلاف للحصول على القرار. الآن، بحساب قيم المتوسط والانحراف المعياري لكل من مجموعتي البيانات نجد أن:

$$\bar{x} = 125 \text{ cm} \quad \& \quad S_X = 8.12 \text{ cm}$$

$$\bar{y} = 30.5 \text{ Kg} \quad \& \quad S_Y = 3.21 \text{ Kg}$$

وبالتالي تكون قيمة معامل التغير لمجموعة البيانات X هي:

$$CV_X = \frac{S_X}{\bar{x}} \times 100 = \frac{8.12}{125} \times 100 = 6.496 \%$$

في حين نجد قيمة معامل التغير لمجموعة البيانات Y هي:

$$CV_Y = \frac{S_Y}{\bar{y}} \times 100 = \frac{3.21}{30.5} \times 100 = 10.525 \%$$

وهكذا نجد أن قيمة معامل تغير الوزن أكبر من قيمة معامل تغير الطول لهذه العينة من الأطفال، ومن ثم تبعثر قياسات الطول حول متوسطها أقل من تبعثر قياسات الوزن حول متوسطها.



الآن، وفي حال تعذر حساب المتوسط أو التباين لسبب ما (مثل فقدان بعض البيانات) فإنه يجب البحث عن معامل آخر ينجز لنا عملية المقارنة. إن المعيار الآتي الذي يُحسب بدلالة الربيعيين الأول والثالث يمكن استخدامه بدلاً من معامل التغير.

٣-٢-٢- معامل التشتت Coefficient of Dispersion

لتكن لدينا مجموعة بيانات عينة مُعطاة، فعندئذ يُعرّف **معامل التشتت** (والذي يُرمز له بـ CD) لبيانات هذه العينة من خلال العلاقة الآتية:

$$CD := \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100 \% \quad [3-8]$$

علماً أن Q_1 و Q_3 هما الربيعي الأول والثالث للبيانات على الترتيب.

٣-٢-٢-١- مثال

تقدّمت مجموعة من الطلاب لاختبارين (مقابلة وتحريري) في مقرر دراسي، فكانت لهم النتائج الآتية التي تظهر فقدان بعض الدرجات (المعلوم ترتيبها) في اختبار المقابلة:

الجدول [3-10]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	الطلاب
35	42	48	35	49	43	45	37	36	25	نتائج الاختبار التحريري X
05	8	10	?	13	15	?	17	18	19	نتائج اختبار المقابلة Y

فهل تشير هذه المعطيات إلى أن درجات الاختبار التحريري تتبعثر حول متوسطها أكثر مما هو لدى اختبار المقابلة؟

الإجابة: بالطبع من كون إحدى مجموعتي البيانات تحتوي على بيانات مفقودة فليس من المنطقي أن نستخدم معامل التغير من أجل البيانات الكاملة ومعامل التشتت من أجل البيانات المنقوصة لكي نعطي قرارنا في عملية المقارنة، وإنما علينا استخدام المعيار نفسه للوصول إلى القرار الصحيح. لذلك سنقوم بحساب معامل التشتت لكل من مجموعتي البيانات، ولأجل ذلك سنقوم أولاً بترتيب مجموعة بيانات الاختبار التحريري فقط لأن بيانات اختبار المقابلة قدّمت مرتبة، فيكون لدينا العرض الآتي:

25	35	35	36	37	42	43	45	48	49	نتائج الاختبار التحريري بعد ترتيبها
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	رموز القيم بعد ترتيبها

ف نجد من أجل هذه البيانات أن لرتبة الرُّبعيين Q_1 و Q_3 القيمتين الآتيتين على الترتيب:

$$q_1 = \frac{n+1}{4} = \frac{10+1}{4} = 2.75 \quad \& \quad q_3 = \frac{3(n+1)}{4} = \frac{3(10+1)}{4} = 8.25$$

ومن ثمّ يكون لدينا:

$$Q_1 = x_2 + 0.75(x_3 - x_2) = 35 + 0.75(35 - 35) = 35$$

$$Q_3 = x_8 + 0.25(x_9 - x_8) = 45 + 0.25(48 - 45) = 45.75$$

وبالتالي تكون قيمة معامل التشتت لبيانات الاختبار التحريري هي:

$$CD_X = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100 = \frac{45.75 - 35}{45.75 + 35} \times 100 = 13.31 \%$$

وأما من أجل رتبة الرُّبعيين Q_1 و Q_3 الخاصّة باختبار المقابلة فنجد لهما القيمتين الآتيتين على الترتيب:

$$q_1 = \frac{n+1}{4} = \frac{10+1}{4} = 2.75 \quad \& \quad q_3 = \frac{3(n+1)}{4} = \frac{3(10+1)}{4} = 8.25$$

ومن ثمّ يكون لدينا:

5	8	10	?	13	15	?	17	18	19	نتائج اختبار المقابلة (مرتبة)
y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}	رموز القيم المرتبة

$$Q_1 = y_2 + 0.75(y_3 - y_2) = 8 + 0.75(10 - 8) = 9.5$$

$$Q_3 = y_8 + 0.25(y_9 - y_8) = 17 + 0.25(18 - 17) = 17.25$$

ومنه نجد أن قيمة معامل التشتت لبيانات اختبار المقابلة تساوي:

$$CD_Y = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100 = \frac{17.25 - 9.5}{17.25 + 9.5} \times 100 = 28.97 \%$$

وهكذا ينتج لدينا أن بيانات اختبار المقابلة تتبعثر حول متوسطها بشكل أكثر بكثير ممّا هو عليه الحال من أجل بيانات الاختبار التحريري.



الدرجة المعيارية Z

Z - Score

الآن، وقبل ختام هذا الفصل سنقدّم مفهوماً متعلقاً بقيمة المتوسط والانحراف المعياري لمجموعة بيانات، ويُدعى **الدرجة المعيارية Z** (وستستخدم عبارة **الدرجة المعيارية على سبيل الاختصار**).

من فوائد الدرجة المعيارية أنها تُعطينا صورةً عن موضع البيان بالنسبة إلى متوسط البيانات، ولذلك يمكننا أن نقارن بين قيمتين لكل منهما موضع نسبيّ مختلف في مجموعتي بيانات مختلفتين (وقد يكون لهما قيم مختلفة للمتوسط)، فعلى سبيل المثال يمكننا مقارنة مستوى أداء طالب في جامعة ما مع مستوى أداء طالب آخر من جامعة أخرى، أو مقارنة مستوى أداء طالب في مدرسة حكومية مع مستوى أداء طالب آخر من مدرسة أهلية.

٣-٣-١- تعريف (الدرجة المعيارية)

لتكن x_1 و x_2 و \dots و x_n بيانات عينة بمتوسط \bar{x} وانحراف معياري S ، فنعدّد **الدرجة المعيارية Z** لقيمة x_i من هذه البيانات (والتي سنرمز لها بـ Z_{x_i}) تُعرّف من خلال العلاقة الآتية:

$$Z_{x_i} := \frac{x_i - \bar{x}}{S} ; i = 1, 2, \dots, n \quad [3-9]$$

٣-٣-٢- ملاحظات

١- إن العملية التي نُفذت على القيمة x_i بواسطة العلاقة [3-9] تُدعى عملية استيعار للقيمة x_i ولذلك سُميت Z_{x_i} بالدرجة المعيارية لـ x_i .

٢- نلاحظ أنّ قيمة هذا المعيار هي مؤشر على انحراف القيمة x_i عن المتوسط، ومن ثمّ فإنّها تُحدّد موقع x_i من المتوسط اتجاهاً وبعداً، فالاتجاه تُحدّده إشارة (+ أو -)، فإذا كانت قيمة Z_{x_i} موجبة فإنّ ذلك يعني أنّ x_i أكبر من المتوسط، والعكس إذا كانت قيمة Z_{x_i} سالبة. أمّا البعد فتعني كبر القيمة المطلقة لـ Z_{x_i} ، فكلما كبرت القيمة المطلقة لـ Z_{x_i} دلّ ذلك على ابتعاد القيمة x_i عن المتوسط.

٣-٣-٣- أمثلة

١- في إطار التقدّم لوظيفة مدرّس لدى وزارة التعليم تقدّم خريج جامعي A من كلية X في جامعة F حيث كان متوسط المعدّل التراكمي لدفعته في الكلية يساوي 4.6 بانحراف معياري يساوي 0.3، وكذلك تقدّم خريج جامعي آخر B من كلية Y في جامعة G حيث كان متوسط المعدّل التراكمي لدفعته في الكلية يساوي 4.4 بانحراف معياري يساوي 0.4.

فإذا علمت أنّ المعدّل التراكمي للشخص A يساوي 4.7 في حين كان المعدّل التراكمي للشخص B يساوي 4.4، فهل يمكننا الادّعاء أنّ أداء الشخص A أفضل من أداء الشخص B ؟

الإجابة: هنا نلاحظ أنّ الردّ على هذا التساؤل يتطلب معرفة مستوى كل متقدّم في كليّته لأنّهما لا يخضعان لتعليم موحدٍ سواءً من حيث البيئّة المحيطة بالمتقدّم أو من حيث طبيعة العلم الذي تلقاه، ولذلك الإجابة على السؤال المطروح ليست بهذه البساطة، ويجب أن يؤخذ في الحسبان المعدّل التراكمي لزملاء كل واحد منهم، ومن ثمّ يُبحث في الإجابة بناءً على هذه المعطيات. من هذا الحوار نلاحظ أنّ الإجابة على السؤال المطروح تكمن في حساب الدرجة المعياريّة لكل من هذين المتقدّمين حيث نجد الآتي:

$$z_A = \frac{4.7 - 4.6}{0.3} = 0.3 \quad \& \quad z_B = \frac{4.4 - 4.2}{0.4} = 0.5$$

وهكذا نجد أنّ الدرجة المعياريّة للشخص B أعلى من الدرجة المعياريّة للشخص A بفارقٍ كبيرٍ، وهذا يعني أنّ أداء الشخص B أفضل من أداء الشخص A رغم أنّ المعدّل التراكمي للشخص B أقل من المعدّل التراكمي للشخص A.

٢- لتكن لدينا مجموعتي البيانات الآتيتين:

$$A) 7, 9, 8, 6, 2, 7, 9, 7, 3, 6, 5, 3 \quad \& \quad B) 8, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 9, 5, 4$$

والمطلوب حساب الدرجة المعياريّة للقيمة $x = 8$ في كلّ من مجموعتي البيانات المعطاة.

الإجابة: من أجل مجموعة البيانات (A) و (B) نجد أنّ متوسطها وانحرافها المعياري على الترتيب هي:

$$\bar{x}_A = 6 \text{ and } S_A = 2.335 \quad \& \quad \bar{x}_B = 7 \text{ and } S_B = 1.7$$

ومن ثمّ تكون الدرجة المعياريّة للقيمة $x = 8$ في مجموعة البيانات (A) تساوي:

$$z_{8,A} = \frac{x - \bar{x}}{S} = \frac{8 - 6}{2.335} = 0.857$$

والدرجة المعياريّة للقيمة $x = 8$ في مجموعة هذه البيانات (B) تساوي:

$$z_{8,B} = \frac{x - \bar{x}}{S} = \frac{8 - 7}{1.7} = 0.588$$

وهكذا نجد أنّ الدرجة المعياريّة للقيمة $x = 8$ في مجموعة البيانات (A) أكبر من الدرجة المعياريّة للقيمة نفسها في مجموعة البيانات (B).

٣-٤-٤- ملاحظات

١- لو حُسبت الدرجة المعياريّة لجميع عناصر العيّنة فعندئذٍ سنلاحظ أنّ البيانات الناتجة عن هذه الدرجات المعياريّة لها متوسط يساوي الصفر وانحراف معياري يساوي الواحد.

٢- يُؤخذ على الدرجة المعيارية أنها عند قيمة الصفر يكون للبيان الذي استعيرت قيمته درجة قيمة المتوسط \bar{x} ، ولذلك قد لا يكون معناها واضحاً لدى الكثير، وعلاوةً على ذلك فقد تكون هذه الدرجة المعيارية سالبةً أيضاً، وهذا بدوره يجعل تفسيرها من أجل بعض الحالات غير واضح أو غير ذي معنى، ولذلك اقترح تقديم مقياس آخر يتجاوز هذه السلبيات يدعى الدرجة المعيارية t - (أو الدرجة المعيارية التائية)، ولكننا لن نتطرق إلى هذا المقياس في كتابنا هذا.



١- عندما نتسوق في أحد المتاجر للمواد التّموينية لاحظنا أنّه كتّب على بعض السلع عبارة "الوزن الصافي 2 كغ ± 100 غ"، فما هو تفسير هذه الكتابة؟

٢- إذا كانت x_1, x_2, \dots, x_n مع $1 \leq n$ مجموعة بيانات مُعطاة، فعندئذ:

أ- هل يمكن لقيمة عددية x أن تكون مقياساً للنزعة المركزيّة لهذه المجموعة من البيانات علماً أنّها توافق x_ℓ (أكبر قيمة في البيانات) أو x_s (أصغر قيمة في البيانات)؟

ب- بفرض أنّ \bar{x} هي قيمة المتوسط لهذه المجموعة من البيانات، فمن أجل أي قيمة لـ n تصبح $\bar{x} = x_\ell$ أو $\bar{x} = x_s$ ؟

ج- من أجل أيّة قيمة لـ n تصبح قيمة الانحراف المعياري لهذه المجموعة من البيانات تساوي الصفر؟

٣- لتكن لدينا مجموعة بيانات مرتّبة لعينة مُعطاة كما يلي:

3.50 3.55 3.75 6 ? 9 12 12 14 19 ?

علماً أنّ (?) ترمز إلى قيمة مفقودة ضمن الترتيب المقدّم، فعندئذ:

أ- استخدم المقياس الملائم لتعيين القيمة التي تنزع إليها هذه البيانات.

ب- استخدم المقياس الملائم لتعيين القيمة التي تعبر عن تبعثر هذه البيانات حول مقياس نزعتها المركزية.

ج- هل يمكن لقيمة عددية x أن تكون مقياساً للنزعة المركزيّة لهذه المجموعة من البيانات علماً أنّها توافق x_ℓ (أكبر قيمة في البيانات) أو x_s (أصغر قيمة في البيانات)؟

٤- لتكن لدينا مجموعة بيانات مرتّبة لعينة مُعطاة كما يلي:

21 21 ? 15 ? 12 ? 6 6 6 ? 3

علماً أنّ (?) ترمز إلى قيمة مفقودة ضمن الترتيب المقدّم، فعندئذ:

أ- استخدم المقياس الملائم لتعيين القيمة التي تنزع إليها هذه البيانات.

ب- استخدم المقياس الملائم لتعيين القيمة التي تعبر عن تبعثر هذه البيانات حول مقياس نزعتها المركزية.

٥- لتكن لدينا مجموعة البيانات الآتية التي تمثّل الوزن لعينة مكوّنة من عشرين شخصاً بالغاً (مقدّرةً بالكيلو غرام):

60 79 66 76 80 62 73 74 92 75
82 61 65 84 75 81 71 77 84 77

والمطلوب ما يلي:

أ- حساب المنوال- الوسيط- المتوسط- الانحراف المعياري- معامل التغيّر والدرجة المعياريّة للقيمة 75.

ب- تحت الفرض أنّ لجميع قيم البيانات المُعطاة النصيب نفسه في الاختيار ولا يؤثر بعضها على البعض الآخر لدى عملية السحب، فعندئذٍ قم بسحب عينات عشوائية من البيانات بحجم $n = 5$ ، $n = 10$ و $n = 15$ ، ومن ثمّ احسب المتوسط والانحراف المعياري، وبعد ذلك قارن بين النتائج المتقابلة. ماذا تستنتج؟

٦- لتكن لدينا البيانات 8, 9, 6, 9, 5, 4, 8, 6, 7, 8 لعينة حجمها 10، والمطلوب حساب المدى الربيعي لهذه البيانات.


٧- ليكن لدينا مجموعة بيانات عينة مقدّمة من خلال جدول توزيع تكراري له العرض الآتي:

رقم الفئة	حدود الفئة	مركز الفئة	تكرار الفئة	التكرار المتجمّع الصاعد للفئة
1	50 → 55		5	
2	55 → 60			13
3			12	
4				40
5			17	
6				70
7	80 → 85		7	
Total				المجموع

والمطلوب ما يلي:

- إكمال جدول التوزيع التكراري السابق.
- حساب كل من المتوسط، الوسيط والمنوال.
- حساب الانحراف المعياري.

٨- لتكن لدينا ثلاث مجموعات بيانات لعينات مقدّمة كما في العروض الآتية:



والمطلوب ما يلي:

أ- حساب المتوسط، الوسيط، المدى، الانحراف المعياري والمدى الربيعي لكل من مجموعات البيانات المعطاة.


ب- لو حُذِفَت القيمة $x = 18$ فهل تتغيّر قيم المتوسطات لهذه المجموعات من البيانات، ولماذا؟

تمارين

ج- حساب معامل التغير لكل من مجموعات البيانات المعطاة، ومن ثمَّ بينَّ أيها أقل تبعثراً من الأخرى.

د- حساب الدرجة المعيارية للقيمة $x = 14$ في كل من مجموعات البيانات المعطاة، ماذا تلاحظ؟

٩- ليكن لدينا المضلع التكراري الآتي لمجموعة بيانات عينة:



والمطلوب ما يلي:


أ- بناء جدول التوزيع التكراري لبيانات هذا المضلع التكراري.

ب- حساب المتوسط، الوسيط والمنوال لبيانات هذا المضلع التكراري.

ج- حساب المدى لبيانات هذا المضلع التكراري.

د- حساب الانحراف المعياري لبيانات هذا المضلع التكراري.

١٠- ليكن لدينا المدرج التكراري الآتي لمجموعة بيانات عينة:



والمطلوب ما يلي:

أ- بناء جدول التوزيع التكراري لبيانات هذا المدرج التكراري.

ب- حساب المتوسط، الوسيط والمنوال لبيانات هذا المدرج التكراري.

ج- حساب المدى لبيانات هذا المدرج التكراري.

د- حساب الانحراف المعياري لبيانات هذا المدرج التكراري.

١١- لتكن لدينا بيانات مقدمة من خلال العرض البياني الآتي:



والمطلوب ما يلي:

- بناء جدول التوزيع التكراري للبيانات الخاصة بمضلع التكرار المتجمع الصاعد المعطى.
- حساب المتوسط، الوسيط والمنوال للبيانات الخاصة بمضلع التكرار المتجمع الصاعد المعطى.
- حساب المدى للبيانات الخاصة بمضلع التكرار المتجمع الصاعد المعطى.
- حساب الانحراف المعياري للبيانات الخاصة بمضلع التكرار المتجمع الصاعد المعطى.

١٢- ينتج مصنع أربعة أنواع من العقاقير الدوائية A، B، C و D. إن هذه العقاقير تخضع لعدد من الاختبار العملية كل حسب نوعه حتى يمكن التثبت من صلاحيته للتسويق، فإذا علمت أن البيانات المتعلقة بهذه الاختبارات كانت كما في الجدول التكراري الآتي:


العقار الدوائي	تكلفة الاختبار الواحد (بالريال السعودي)	عدد الاختبارات التي أجريت على العقار
A	555	6
B	495	6
C	850	3
D	750	5
Total		

والمطلوب ما يلي:

- تقديم التمثيل الشرائطي والدائري لبيانات هذا الجدول على أساس الكلفة الإجمالية للاختبار.
- حساب الوسيط وتعيين المنوال (أو المناويل) لبيانات هذا الجدول.
- حساب متوسط كلفة الاختبارات والانحراف المعياري المرافق لهذه الكلفة.

الفصل الرابع

الارتباط والانحدار الخطي Linear Correlation and Regression



المقدمة:

لقد تحدثنا في الفصول الثلاثة السابقة عن طرائق إحصائية مُستخدمة في وصف ودراسة متغيرٍ واحد، ولاحظنا أنه يمكن لتلك الطرائق أن تُعطي تصوراً مقبولاً حول المتغير قيد الدراسة، ولكنها لا تقدّم لنا تصوراً واضحاً ودقيقاً حول التأثير المتبادل بين متغيرين أو أكثر. فعلى سبيل المثال قد يتساءل المرء عن العلاقة التي تربط بين الطول والوزن لأشخاص من فئةٍ عمريةٍ معيّنة (فيكون لدينا متغيرين)، أو بين تركيز النيكوتين في الدم وأمراض الرئة وتصلّب الشرايين لدى مجتمع من المدخنين (فيكون لدينا ثلاثة متغيرات)، أو مستوى الدخل واستهلاك بعض المواد الغذائية وزيادة الوزن واقتناء بعض أجهزة الرفاهية (فيكون لدينا أربعة متغيرات)، وهكذا دواليك ...، وأكثر من ذلك، فمن الممكن أن يتساءل المرء عن إمكانية تقدير أحد المتغيرات إذا عُلِمَت قيمة لمتغيرٍ آخر. إن العلم الذي يبحث في الإجابة على مثل هذه التساؤلات يُعرف باسم « الارتباط وتحليل والانحدار » والذي سنقدّم بعض مبادئه في هذا الفصل.

■ ٤ - ١ - الارتباط الخطي البسيط

■ ٤ - ٢ - الانحدار الخطي البسيط

الارتباط الخطي البسيط

Simple Linear Correlation

قبل البدء في دراستنا لهذا الفصل ننوّه إلى أنّ دراستنا في هذا الفصل ستكون من أجل العيّنات فقط، وكذلك سننّفق على استخدام كلمة متغيّر للدلالة على ظاهرة يُمثّلها هذا المتغيّر، والذي بدوره يقوم بتوليد البيانات الخاصة بهذه الظاهرة، فعلى سبيل المثال لو أخذنا الظاهرة A هي ظاهرة الطول لأشخاص عددهم n ، فعندئذ المتغيّر X سيلعب دور وسيلة القياس (المسطرة) التي تقيس الطول وتولّد البيانات x_1, x_2, \dots, x_n ، الممتلئة لقيم الطول لهؤلاء الأشخاص، ويُقال في هذه الحالة إنّ المتغيّر X راصد للظاهرة A وواصف للمجتمع الإحصائي الذي تنتمي إليه هذه البيانات.

الآن لنطرح السؤال الآتي:

هل التأثير المتبادل بين ظاهرتين ممثّلتين بمتغيّرين X و Y طردي أم عكسي، قوي أم ضعيف؟ من أجل الإجابة على هذه الأسئلة لا بدّ لنا من منهج علمي دقيق وواضح بعيداً عن التخمين الحدسي، ويقدم لنا مقداراً عددياً يعبر عن طبيعة التأثير المتبادل بين المتغيّرات. إنّ الجانب الرياضي الذي يهتم بالإجابة على مثل هذه الأسئلة يُعرف باسم "تحليل الارتباط"، ويبحث هذا العلم في الكشف عن العلاقة بين متغيّر واحد Y ومتغيّرات أخرى X_1 و X_2 و... و X_k ، وفي هذه الحالة يُدعى Y متغيّر الاستجابة Response Variable وأما بقية المتغيّرات X_1, X_2, \dots, X_k فإنّها تُدعى متغيّرات تفسيرية Explanatory Variables. في دراستنا هنا سنهتم بشكل أساسي بالعلاقة التي تربط بين متغيّر الاستجابة Y ومتغيّر تفسيري وحيد X ، ويُدعى هذا النوع من الارتباط بـ الارتباط البسيط.

الآن لنفترض أنّه لدينا دراسة متعلّقة برصد متغيّرين (أو ظاهرتين) X و Y فقط، فعندئذ ستكون البيانات على شكل ثنائيات مرتبة (x_i, y_i) من أجل كل القيم الممكنة لـ i ، ويُقال في هذه الحالة عن البيانات x_i و y_i إنّها بيانات متزاوجة من أجل كل القيم الممكنة لـ i ، وهنا يُبحث في اتجاهين رئيسيين أيضاً، وهما:

١- إذا كانت العلاقة التي تربط بين البيانات المتزاوجة x_i و y_i هي علاقة خطية (أي أنّ هذه العلاقة هي دالة خطية) من أجل كل القيم الممكنة لـ i .

٢- إذا كانت العلاقة التي تربط بين البيانات المتزاوجة x_i و y_i هي علاقة غير خطية من أجل كل القيم الممكنة لـ i (كأن تكون العلاقة بينهما على شكل دالة من الدرجة الثانية وما فوق، أو دالة مثلية أو...).

٤-١-١- بعض نماذج الارتباط

فيما يلي سنهتم بدراسة العلاقة بين متغيّرين (أو ظاهرتين) X و Y تربط بينها علاقة خطية فقط، وكتمهيد لذلك سنقدم بعض نماذج الارتباط بين المتغيّرات التي أساسها التأثير والتأثر، حيث يوجد في هذا المضمّن عدّة أنواع من الارتباط بحسب العلاقة التي تصفه، ومن هذه النماذج ما يلي:

١- الارتباط السببي Causal Correlation:

هذا النوع من الارتباط مبني على أن التغيير في قيم متغير يؤدي إلى تغيير في قيم متغير آخر مرتبط به، وهذا التأثير غير قابل للعكس. أي أن التغيير في المتغير الأخير لا يؤثر في تغيير المتغير الأول، ولذلك يدعى هذا النوع من الارتباط بـ **الارتباط السببي**، ومن الأمثلة على ذلك:

- أ- زيادة نسبة الأسمدة وفق معايير سليمة يؤدي إلى زيادة الإنتاج، إلا أن العكس ليس صحيحاً بالضرورة.
- ب- كلما ازداد ارتفاعنا عن مستوى سطح البحر فإن درجة الحرارة ستخفض عموماً، إلا أن العكس ليس صحيحاً بالضرورة.

٢- ارتباط السلسلة السببية Causal Chain Correlation:

إن هذا النموذج من الارتباط يشابه النموذج السابق من الارتباط، ولكنه يكون في سلسلة من نماذج الارتباط السببي، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن هطول الأمطار يؤدي إلى تسرب مياه الأمطار إلى التربة، وهذا يزيد المحتوى المائي للتربة، والتي بدورها تتسرب إلى مخازن المياه الجوفية، ونحصل نتيجة لذلك على زيادة في مخزون المياه الجوفية. إن هذا النوع من الارتباط يمكن إدراجه تحت اسم الارتباط السببي أيضاً.

٣- الارتباط التبادلي Reciprocal Correlation:

إن هذا النوع من الارتباط مبني على التأثير المتبادل بين المتغيرات أو على ردود الأفعال بين المتغيرات، فكل تغيير في متغير يؤدي إلى تغيير في المتغير الآخر، فعلى سبيل المثال لو أخذنا حادثة تصادم جسمين يسيران بسرعة ما (غير ساكنين) فإن كل جسم سيؤثر في الجسم الآخر بقوة تتناسب مع كتلته وسرعته عند لحظة التصادم. إن هذا النوع من الارتباط يُعرف بـ **الارتباط التبادلي**.


٤- الارتباط الوهمي Spurious Correlation:

في هذا النوع من الارتباط يبدو لنا ظاهرياً نوع من التأثير لمتغير على متغير آخر، ولكن هذا التأثير غير حقيقي، فعلى سبيل المثال لو أخذنا تغيير مستوى وعي الطفل ومقارنته مع تغيير طول ذراعه، فنجد أن هناك علاقة طردية بينهما ولكنها ليست حقيقية، فلا تأثير لطول ذراع الطفل على وعيه ولا لعونه على طول ذراعه، ولذلك يُعرف هذا النوع من الارتباط بـ **الارتباط الوهمي**.

الآن، وبعد هذا التقديم نتقل إلى النمذجة الرياضية للارتباط بين متغيرين X و Y ، والمتمثلة بتقديم بعض المعايير العددية التي تقيس لنا درجة الارتباط بين هذين المتغيرين. إن دراسة الارتباط بين متغيرين X و Y تبدأ عادة بما يُسمى **لوحة الانتشار**، حيث تعدّ لوحة الانتشار من الوسائط المهمة في دراسات الارتباط.

إنَّ الغاية من هذه اللوحة أخذ انطباع أولي عن طبيعة التأثير المتبادل بين المتغير التفسيري X ومتغير الاستجابة Y ، ومن ثمَّ التعرف على سلوك البيانات.

4-1-2- Scatter Plot لوحة الانتشار



الشكل [4-1]

لتكن لدينا (x_1, y_1) و (x_2, y_2) و..... و (x_n, y_n) بيانات مُعطاة، فعندئذٍ لوحة الانتشار لهذه البيانات هي تمثيل نقطي للبيانات (أي تمثيل البيانات بنقاط) على المستوي الإحداثي XoY ، ويؤخذ عادةً في الإحداثيات المتعامدة، أي أنَّ x_1, x_2, \dots, x_n و y_1, y_2, \dots, y_n هي مساقط النقاط الممثلة لهذه البيانات على المحور oX و oY على الترتيب (انظر الشكل [4-1])، ولإعطاء المزيد من التوضيح سنقدم الأمثلة الآتية.


4-1-2-1- أمثلة

١- قمنا بقياس الطول (مقدراً بالسنتيمتر) والوزن (مقدراً بالكيلوغرام) لعشرة أشخاص بالفين فحصلنا على البيانات المدونة في الجدول الآتي:

الجدول [4-1]


i	X الوزن	Y الطول	i	X الوزن	Y الطول
1	60	155	6	70	169
2	54	156	7	85	185
3	85	190	8	65	155
4	95	185	9	90	190
5	70	172	10	87	180

عندئذٍ نجد أنَّ لوحة الانتشار لهذه البيانات لها العرض الموضح بالشكل الآتي.



الشكل [4-2-a]

فلاحظ أن ثمة علاقة تربط بين هاتين المجموعتين من البيانات، حيث يبدو لنا جلياً أن النقاط الممثلة للبيانات (x_1, y_1) و (x_2, y_2) و... و (x_{10}, y_{10}) تظهر منحىً صاعد، بمعنى أنه كلما ازدادت قيمة مُركبة أدى ذلك إلى زيادة في قيمة المُركبة الأخرى، وهذا السلوك في الارتباط يُدعى الارتباط الإيجابي (أو الطردي) للبيانات. أما بخصوص قوّة التأثير المتبادل (أي قوّة الارتباط، وسوف نوضّحه لاحقاً) بين الطول والوزن، فإنّ الشكل يظهر لنا درجةً عاليةً من التأثير المتبادل بين الطول والوزن بسبب وقوع معظم البيانات بالقرب من مستقيم ممثّل لمنحى هذه البيانات (سنأتي على شرح كيفية تعيين هذا المستقيم لاحقاً في بحث الانحدار الخطي من هذا الفصل)، انظر الشكل المجاور [4-2-b].




الشكل [4-2-b]

٢- تقدّم ستة عشر طالباً للاختبار النهائي في مقرّرَي الرياضيات واللغة العربية، فكانت لهم النتائج الآتية مقدّرةً من 50 درجة.

الجدول [4-2]

i	درجة اختبار الرياضيات X	درجة اختبار اللغة العربية Y	i	درجة اختبار الرياضيات X	درجة اختبار اللغة العربية Y
1	45	32	9	28	13
2	48	17	10	35	35
3	30	25	11	39	22
4	50	50	12	42	50
5	43	44	13	32	50
6	37	15	14	38	42
7	34	44	15	31	41
8	44	36	16	29	50

فنجد لوحة الانتشار لهذه البيانات لها العرض الموضّح بالشكل الآتي.




الشكل [4-3]


وهنا نلاحظ أنَّ النقاط الممثلة للبيانات المعطاة تُظهر توزعاً على شكل غيمة يصعب تحديد اتجاهها (المنحى غير واضح تماماً)، بمعنى أنه من خلال النظر بالعين المجردة يصعب تحديد طبيعة التأثير المتبادل بين المتغيرين X و Y من حيث الإيجابية أو السلبية.



من النماذج الأخرى التي تصف العلاقة بين متغيرين يوجد الارتباط السلبي (أو العكسي) وكذلك الارتباط غير الخطي، والشكلين الآتيين يوضحان ذلك.



الشكل [4-4-a] ارتباط خطي سلبي (أو عكسي)



الشكل [4-4-b] ارتباط غير خطي

الآن، وبما أنَّ النظر إلى الأشكال البيانية يختلف من شخص إلى آخر فإنه لا بدَّ من البحث عن مقياس عددي يوضح لنا طبيعة الارتباط أهو إيجابي أم سلبي، وإن كان قوياً أم ضعيفاً. إنَّ المقياس العددي الذي يقوم بهذه المهمة يُدعى **مُعامل الارتباط**، وسنرمز له بـ r . لكن قبل القيام بتقديم بعض المفاهيم المتعلقة بالارتباط والانحدار، فإنَّنا سننوه إلى الآتي تجنباً للتقديم المطوَّل، فعندما نذكر مستقبلاً أنه لدينا (x_1, y_1) و (x_2, y_2) و... و (x_n, y_n) بيانات عينة خاضعة لمتغيرين X و Y ، فإنَّنا نقصد بذلك:

١- إما أن تكون عناصر عينة حجمها n مسحوبة من مجتمع إحصائي أخضعت لدراسة هذين المتغيرين X و Y وحصلنا نتيجةً لذلك على البيانات المتزاوجة المذكورة أعلاه.

٢- أو أن تكون البيانات x_1, x_2, \dots, x_n هي قيم ناتجة عن إخضاع عناصر عينة حجمها n مسحوبة من مجتمع إحصائي لدراسة المتغير X ، وكذلك البيانات y_1, y_2, \dots, y_n هي قيم ناتجة عن إخضاع عناصر عينة حجمها n مسحوبة من مجتمع إحصائي آخر لدراسة المتغير Y ، وبحيث تكون x_1, x_2, \dots, x_n وكذلك y_1, y_2, \dots, y_n البيانات المتزاوجة المذكورة أعلاه.

٤-١-٣- مُعامل بيرسون للارتباط Person's Coefficient of Correlation

لتكن (x_1, y_1) ، (x_2, y_2) ، ... و (x_n, y_n) بيانات عينة أخضعت لمتغيرين X و Y ، وأنَّ للبيانات x_1, x_2, \dots, x_n متوسط وانحراف معياري \bar{x} و S_X على الترتيب، وكذلك للبيانات y_1, y_2, \dots, y_n متوسط وانحراف معياري \bar{y} و S_Y على الترتيب، فعندئذ يُعطى مُعامل الارتباط الخطي لهذه البيانات بالعلاقة الآتية:

$$\mathbf{r} = \begin{cases} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})}{S_X} \cdot \frac{(y_i - \bar{y})}{S_Y} & \text{for } S_X > 0 \text{ and } S_Y > 0 \\ 0 & \text{for } S_X = 0 \text{ or } S_Y = 0 \end{cases} \quad [4-1-a]$$

إنَّ هذه العلاقة تُعرف باسم "مُعامل بيرسون للارتباط الخطي" نسبةً إلى الإحصائي الإنجليزي بيرسون (1875-1936) Karl Pearson والذي كان رائداً في الإحصاء، وكما هو ملاحظ يمكن استخدام هذه العلاقة إذا كانت قيم المتوسطات والانحرافات المعياريّة للبيانات مُعطاة. أمّا إذا كانت قيم الانحرافات المعياريّة للبيانات ليست مُعطاة ولدينا قيم المتوسطات للبيانات مُعطاة فقط، وكان لدينا:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2 \right) > 0 \quad \& \quad \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 - n \bar{y}^2 \right) > 0$$

فعدنئذ يمكننا استخدام العلاقة الآتية لحساب \mathbf{r} (والتي تنتج عن العلاقة السابقة باستخدام الصيغة التي تعطي قيمة الانحراف المعياريّ بدلالة قيم البيانات والمتوسط - انظر العلاقة [3-1-a] في الفصل السابق):

$$\mathbf{r} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2 - n \bar{y}^2}} \quad [4-1-b]$$

وأخيراً إذا كانت قيم المتوسطات ليست مُعطاة، وكان لدينا:

$$\left(n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) > 0 \quad \& \quad \left(n \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right) > 0$$

فإنّه يمكننا استخدام قيم البيانات مباشرة في حساب قيمة مُعامل الارتباط \mathbf{r} من خلال العلاقة الآتية (والتي تنتج عن العلاقة السابقة بعد التعويض عن المتوسطات بما يساويها بدلالة مجاميع البيانات).

$$\mathbf{r} = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}} \quad [4-1-c]$$

٤-١-٣-١-١ ملاحظات

- ١- يُستخدم هذا المقياس من أجل البيانات الخام الكميّة فقط، ويُعدّ من المقاييس الجيدة للارتباط الخطي، وجودته تكمن في أنّه يستخدم جميع قيم بيانات المتغيّرين X و Y في الحساب.
- ٢- إنَّ مُربّع قيمة مُعامل الارتباط تُدعى مُعامل التحديد Coefficient of Determination، ويرمز له بـ \mathbf{r}^2 (وفي بعض البرامج الإحصائية يُشار إليه بـ **R-square**)، وهذه القيمة تستعمل كتقدير لقوة علاقة الارتباط بين متغيّرين أيضاً.


4-1-4- خصائص معامل الارتباط الخطي

يتميز معامل الارتباط الخطي r بخصائص عديدة من أهمها ما يلي:

1- إن قيمة r تنتمي للفترة $[-1, +1]$ دوماً، أي أن $-1 \leq r \leq +1$.

2- إذا كان $r > 0$ فعندئذ يُقال إن الارتباط بين المتغيرين X و Y إيجابي (أو طردي)، وأما إذا كان $r < 0$ فإنه يُقال إن الارتباط بين المتغيرين X و Y سلبي (أو عكسي).

3- إذا كان $r = \pm 1$ فعندئذ يُقال عن الارتباط بين المتغيرين X و Y إنه خطي تام، وفي هذه الحالة تكون جميع النقاط الممثلة للملاحظات (x_i, y_i) من أجل كل القيم الممكنة لـ i تقع على خطٍ مستقيمٍ واحد. لكن يجب التنبيه هنا إلى أن العكس ليس صحيحاً بالضرورة، فلو نظرنا إلى مجموعة البيانات الموضحة من خلال الشكل الآتي لوجدنا أن جميع النقاط الممثلة لها تقع على مستقيمٍ واحد، ولكن بسبب انعدام الانحراف المعياري S_Y (أي $S_Y = 0$) فإنه ستكون قيمة معامل الارتباط الخطي $r = 0$.




الشكل [4-5]

4- إذا كان $r = 0$ ، فعندئذ لا يُقال إنه لا يوجد ارتباط، بل نكون أمام إحدى الحالات الثلاث الآتية:
 أ- إما أن يكون توزع البيانات على لوحة الانتشار على شكل غيمة عديمة الاتجاه، أو في تجمعات جزئية متناثرة تشكل بمجملها مشهداً يصعب تحديد اتجاهه، ومن ثمّ منحى البيانات سيكون غير واضح، ومن الأمثلة على ذلك تجدها في الشكل الآتي [4-6].

ب- أو أن يكون منحى البيانات موازياً لأحد محوري لوحة الانتشار، ومن الأمثلة على ذلك الشكل [4-5]، وتجد بعض العروض التوضيحية الأخرى في الشكل الآتي [4-6].

ج- وأخيراً من الممكن أن يكون توزع البيانات على لوحة الانتشار له شكل بيان علاقة غير خطية بين المتغيرين X و Y ، ونماذج توضيحية على ذلك تجدها في الشكل الآتي [4-6] أيضاً.



الشكل [4-6]

٤-١-٥- تقييم قوة وضعف الارتباط الخطي

لتقييم قوة وضعف الارتباط الخطي بين بيانات متغيرين X و Y ، فإننا سنعتمد على القاعدة الآتية التي تعد أكثر استخداماً. حيث يُقال عن الارتباط الخطي بين المتغيرين X و Y إنه:

١- خطي تام إذا كان $r = \pm 1$ (قوة الارتباط تكون في أوجها).

٢- قوي جداً إذا كان $0.86 < |r| < 1$ ،

٣- قوي إذا كان $0.70 < |r| \leq 0.86$ ،

٤- متوسط القوة إذا كان $0.50 < |r| \leq 0.70$ ،

٥- ضعيف إذا كان $0.30 < |r| \leq 0.50$ ،

٦- ضعيف جداً إذا كان $0 < |r| \leq 0.30$ ،

٧- معدوم إذا كان $r = 0$.

٤-١-٦- أمثلة

١- الجدول الآتي يعرض لنا عدد الساعات الدراسية التي يمضيها الطالب في دراسة مقرراته (استنكار الطالب لمقرراته) في السنة الأولى المشتركة وما يقابلها من درجة التحصيل الفصلي (من أصل 5 درجات)، علماً أن X متغيراً يرصد عدد الساعات الدراسية في حين Y متغيراً يرصد درجة التحصيل الفصلي للطالب.

الجدول [4-4-a]

رقم الطالب i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X عدد ساعات الدراسة	2	3	1	2	4	5	2	3	4
Y درجة التحصيل الفصلي	2	2.5	1	2.5	4	4.5	2	3	3.5

والمطلوب ما يلي:

أ- حساب معامل الاختلاف لبيانات كل من X و Y (لتبيان أيهما أكثر تبعثراً حول المتوسط).

ب- تمثيل بيانات المتغيرين X و Y على لوحة الانتشار، ومن ثمّ تعيين نوعية الارتباط الخطي من الشكل الناتج وبعد ذلك حساب قيمة معامل بيرسون للارتباط الخطي لتبيان قوة هذا الارتباط.

الإجابة: من أجل:

أ- لتبيان تبعثر البيانات لكل من X و Y علينا حساب المتوسط والانحراف المعياري لبيانات كل من X و Y ، فإننا سنقوم بتقديم الجدول الآتي الذي يسهل علينا عملية الحساب للمقادير التي سنحتاجها.

الجدول [4-4-b]

i	x_i	x_i^2	y_i	y_i^2	$x_i \cdot y_i$	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
1	2	4	2	4	4	1.11	0.72	1.2321	0.5184
2	3	9	2.5	6.25	7.5	0.11	0.22	0.0121	0.0484
3	1	1	1	1	1	-0.89	-0.78	0.7921	0.6084
4	2	4	2.5	6.25	5	2.11	1.72	4.4521	2.9584
5	4	16	4	16	16	1.11	1.22	1.2321	1.4884
6	5	25	4.5	20.25	22.5	-0.89	-0.28	0.7921	0.0784
7	2	4	2	4	4	-1.89	-1.78	3.5721	3.1684
8	3	9	3	9	9	0.11	-0.28	0.0121	0.0784
9	4	16	3.5	12.25	14	-0.89	-0.78	0.7921	0.6084
sum	26	88	25	79	83			12.889	9.5556

ف نجد ما يلي:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{26}{9} = 2.89 \quad \& \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \frac{25}{9} = 2.78$$

ومن ثم يكون لدينا:

$$S_X = \sqrt{1.61} = 1.2963 \quad \& \quad S_Y = \sqrt{1.194} = 1.093$$


وبما أن طبيعة البيانات المقدمة مختلفة (وحدات قياسها مختلفة) فإننا سنستخدم معامل الاختلاف لتوضيح أيهما أكثر تبعثراً. حيث لدينا:

$$CV_X = \frac{S_X}{\bar{x}} \times 100 = \frac{1.2963}{2.89} \times 100 = 44.85 \%$$

$$CV_Y = \frac{S_Y}{\bar{y}} \times 100 = \frac{1.093}{2.78} \times 100 = 39.32 \%$$

وهكذا نلاحظ أن بيانات المتغير X أكثر تبعثراً من بيانات المتغير Y .

ب- لتعيين نوعية الارتباط الخطي لبيانات المتغيرين X و Y يمكننا استخدام لوحة الانتشار لبيانات كل من X و Y ، فنجد العرض الآتي:



الشكل [4-8]

نشير هنا إلى أننا قمنا بتمييز النقطة المضاعفة (2,2) بنقطة زرقاء وفي داخلها نقطة حمراء

فلاحظ (وبوضوح تام) وجود ارتباط إيجابي بين عدد ساعات الدراسة ودرجة التحصيل الفصلي، وهذا يعني أنه كلما ذكّر الطالب لعدد ساعات أكثر كلما حصل على درجة أعلى في نتائج التحصيل الفصلي، وأما من أجل حساب قيمة معامل بيرسون للارتباط الخطي فإننا سنقوم بتقديم الجدول الآتي الذي يسهّل علينا عملية الحساب للمقادير التي سنحتاجها.

الجدول [4-4-b]

i	x_i	x_i^2	y_i	y_i^2	$x_i \cdot y_i$	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$\frac{x_i - \bar{x}}{S_X}$	$\frac{y_i - \bar{y}}{S_Y}$	$\frac{x_i - \bar{x}}{S_X} \cdot \frac{y_i - \bar{y}}{S_Y}$
1	2	4	2	4	4	1.11	0.72	0.8563	0.6587	0.5641
2	3	9	2.5	6.25	7.5	0.11	0.22	0.0849	0.2013	0.0171
3	1	1	1	1	1	-0.89	-0.78	-0.6866	-0.7136	0.49
4	2	4	2.5	6.25	5	2.11	1.72	1.6277	1.5737	2.5614
5	4	16	4	16	16	1.11	1.22	0.8563	1.1162	0.9558
6	5	25	4.5	20.25	22.5	-0.89	-0.28	-0.6866	-0.2562	0.1759
7	2	4	2	4	4	-1.89	-1.78	-1.458	-1.6286	2.3744
8	3	9	3	9	9	0.11	-0.28	0.0849	-0.2562	-0.022
9	4	16	3.5	12.25	14	-0.89	-0.78	-0.6866	-0.7136	0.49
sum	26	88	25	79	83	-----	-----	-----	-----	7.6068

فلو استخدمنا العلاقة [4-1-a] فنعدّد نجد أنّ قيمة معامل بيرسون للارتباط الخطي بين بيانات X و Y تساوي:

$$r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})}{S_X} \cdot \frac{(y_i - \bar{y})}{S_Y} = \frac{7.6068}{8} = 0.95085$$

وأما إذا استخدمنا العلاقة [4-1-b] فنعدّد نجد أنّ قيمة معامل بيرسون للارتباط الخطي بين بيانات X و Y تساوي:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2 - n \bar{y}^2}} = \frac{10.692}{3.58 \times 3.03} = 0.98567$$

في حين أنّنا لو استخدمنا العلاقة [4-1-c] فنعدّد نجد أنّ قيمة معامل بيرسون للارتباط الخطي بين بيانات X و Y تساوي:

$$r = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}}$$

$$= \frac{9(83) - (26 \times 25)}{\sqrt{9(88) - (26)^2} \sqrt{9(79) - (25)^2}} = \frac{97}{10.77 \times 9.274} = \frac{97}{99.881} = 0.97116$$

لاحظ أن القيم التي حصلنا عليها وفقاً للصيغ المختلفة لحساب معامل بيرسون للارتباط الخطي هي قيم تختلف عن بعضها البعض الآخر بأجزاء من المئة والسبب في ذلك يعود إلى عملية تدوير الأرقام أثناء حساب المقادير المختلفة في هذه الصيغ، وعلى كل الأحوال فإن هذه النتيجة تؤكد لنا ثانية وجود علاقة ارتباط خطية إيجابية قوية جداً بين عدد ساعات الدراسة الأسبوعية والمعدل الفصلي الذي حصل عليه الطالب.


٢- لتكن لدينا البيانات الآتية والتي تظهر كمية الانتاج من القمح (مقدرة بالكيلو غرام) من عشرة قطع أرض متماثلة ومتساوية في المساحة (1000 متر مربع لكل قطعة) مع ما يقابلها من كمية السماد الأزوتي (مقدرة بالكيلو غرام) التي وزعت على تلك القطع من الأرض أثناء الزراعة.

الجدول [4-3-a]

رقم القطعة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X كمية السماد المقدمة للأرض	17	19	20	21	24	26	28	30	32	35
Y كمية القمح الناتجة	650	780	825	975	820	675	600	500	400	250

فهل تشير هذه النتائج إلى وجود ارتباط خطي بين المتغيرين X و Y (أي بين كمية السماد المقدمة للأرض وكمية القمح الناتجة)، وما قيمته، وهل هو قوي أم ضعيف (وفقاً للكميات التي قدمت من السماد)؟

الإجابة: لنقم أولاً بعرض لوحة الانتشار للبيانات فنجد لها العرض الآتي.



الشكل [4-7]

الآن، بالنظر إلى لوحة الانتشار نلاحظ أن النقاط الممثلة للبيانات ترسم مساراً صاعداً قليلاً ومن ثم يهبط على مسار طويل، وهذا يعني على العموم وجود ارتباط عكسي (سلبى) بين كمية السماد المقدمة للأرض وكمية القمح الناتجة، وأما من أجل حساب معامل بيرسون للارتباط الخطي فإننا سنقوم بتقديم الجدول الآتي الذي يسهل علينا عملية الحساب لهذا المعامل.

الجدول [4-3-b]

i	x_i	x_i^2	y_i	y_i^2	$x_i \cdot y_i$
1	17	289	650	422500	11050
2	19	361	780	608400	14820
3	20	400	825	680625	16500
4	21	441	975	950625	20475
5	24	576	820	672400	19680
6	26	676	675	455625	17550
7	28	784	600	360000	16800
8	30	900	500	250000	15000
9	32	1024	400	160000	12800
10	25	625	250	62500	6250
المجموع	242	6076	6475	4622675	150925

فنجذ أن قيمة معامل بيرسون للارتباط الخطي بين بيانات X و Y تساوي:

$$r = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}}$$

$$= \frac{10(150925) - (242 \times 6475)}{\sqrt{10(6076) - (242)^2} \sqrt{10(4622675) - (6475)^2}} = \frac{-57700}{97186.78} = -0.594$$

وهذه النتيجة تؤكد لنا مرة أخرى على وجود ارتباط عكسي متوسط القوة بين كميات محصول القمح وكميات السماد التي قدمت لقطع الأرض.




الانحدار الخطي البسيط

Simple Linear Regression

إنَّ أصل مفهوم الانحدار جاء (في أواخر القرن التاسع عشر) من دراسات في علم الوراثة للإحصائي وعالم الوراثة والنفس والاجتماع الإنجليزي **غالتون** (1822-1911) Sir Francis Galton عند تقديم دراسته حول العلاقة التي تربط بين أعمار الآباء والأبناء لأجيال متعاقبة عديدة، وذلك بغية استقراء واقع تطور العمر لدى العنصر البشري، فوجد أنَّ أعمار الأبناء في حالة انحسار متواصل عبر الأجيال المتعاقبة، وكذلك لاحظ غالتون أن خصائص محددة مثل الطول في الآباء لا تنتقل تماماً إلى ذرياتهم (الطول في حالة انحسار أيضاً)، وعبر عن ذلك بالقول: إنَّ أعمار الأبناء في حالة انحدار لأنَّ التمثيل البياني لها كان منحدرًا، ومن هنا جاءت تسمية تحليل الانحدار (ومن ثمَّ منشأ التسمية تاريخي ولا علاقة له بسلوك البيانات منحدرًا كانت أم صاعدة).


إنَّ تقدير قيمة ما لمتغير X إذا ما علمت علاقة ارتباطه بمتغير آخر Y مبنية على ما يُسمى بتحليل الانحدار. في الواقع إنَّ الانحدار هو تمثيل للعلاقة المتوسطة بين المتغيرات، فإذا وجدت علاقة تربط بين متغيرين مطلوب دراستهما فإنه يمكن توفيق معادلة لمنحن (أو لخط) يُحدد طبيعة تلك العلاقة، ومن ثمَّ يمكننا استخدام ذلك المنحني لتقدير القيم النظرية لمتغير إذا علمت القيم للمتغير الآخر.

الآن، ولتوضيح ذلك رياضياً سنفترض أنه لدينا (x_1, y_1) و (x_2, y_2) و... و (x_n, y_n) مجموعة منتهية من المشاهدات الناتجة عن متغيرين X و Y ، ولنفترض على سبيل المثال أن تمثيلها على لوحة الانتشار له العرض المقدم في الشكل المجاور [4-9-a].




الشكل [4-9-a]

فعدنئذ من أولى مهام تحليل الانحدار تمكيننا من تقدير قيمة y_0 مقابلة لقيمة x_0 مجهولة تقع ضمن نطاق البيانات الأصلية للمتغير X . بالطبع إنَّ أفضل تقدير لهذه القيمة ينتج عن استخدام الدالة التي يرمز رسمها البياني من جميع النقاط الممثلة للبيانات، ولكن تعيين معادلة مثل هذه الدالة في الحالة العامة قد يكون صعب جداً إن لم يكن غير ممكن في بعض الحالات، ولذلك يبحث المرء في تعيين الدالة التي رسمها البياني يرمز من بعض النقاط أو بالقرب من بعضها الآخر إن أمكن ذلك (انظر الشكل [4-9-b]).



الشكل [4-9-b]

لكن تعيين الدوال غير الخطية قد يحتاج في كثير من الأحيان إلى برامج خاصة بتوفيق المنحنيات Curves Fitting الأمر الذي قد لا يكون متوفراً إلا لدى الاختصاصيين. لذلك سنبحث فيما يلي في تعيين معادلة أبسط أنواع المنحنيات (ألا وهي المستقيمات) التي تمرّ من بعض هذه النقاط وبالقرب من بعضها الآخر إن أمكن ذلك. إن هذه المعادلة تُدعى **معادلة الانحدار الخطي البسيط**. أي أننا سنسعى إلى تعيين المستقيم الذي يمرّ من جميع هذه النقاط أو يمرّ من بعض هذه النقاط وبالقرب من بعضها الآخر إن أمكن ذلك، وإن لم يكن ذلك ممكناً فليكن المستقيم الذي يمرّ بالقرب من هذه النقاط كما في الشكل الآتي [4-9-c]. إن هذا المستقيم يُدعى **مستقيم الانحدار**.



الشكل [4-9-c]

في الواقع توجد طرائق عديدة لتعيين العلاقة الخطية التي تربط بين متغيرين X و Y ، ولكننا سنقدم معادلة مستقيم الانحدار اعتماداً على ما يُسمّى بـ "طريقة المربعات الصغرى" (لن نتناول شرحها) فقط.

٤-٢-١- معادلة مستقيم انحدار Y على X (Equation of Straight Regression of Y on X)

لنكن لدينا (x_1, y_1) ، (x_2, y_2) ، ... و (x_n, y_n) بيانات عينة، فإذا كنّا نرغب في تعيين قيمة \hat{y}_i كتقدير لقيمة y_i باستخدام مستقيم الانحدار لدى إعطاء قيمة محدّدة لـ x_i ، فإنّه يمكننا ذلك باستخدام معادلة مستقيم الانحدار لهذه البيانات (وفقاً لطريقة المربعات الصغرى) التي لها العرض الآتي:

$$\hat{Y} = a + bX$$

[4-2]

علماً أنّ a و b ثوابت حقيقية يتمّ حسابهما كما يلي:

أ- باستخدام قيم البيانات مباشرة حيث نضع:

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad [4-3]$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad [4-4-a]$$

ب- إذا كنا نعلم قيم المتوسطين \bar{x} و \bar{y} فإننا نحسب b من العلاقة [4-3]، وأما قيمة a فإنها تُحسب من العلاقة الآتية:

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \quad [4-4-b]$$

وهكذا تكون معادلة المستقيم [4-2] معيّنة تماماً بعد حساب قيم الثابتين a و b .

إنَّ المستقيم الناتج عن المعادلة [4-2] يُدعى **مستقيم انحدار Y على X** للبيانات المعطاة، ويُنظر إلى هذا المستقيم على أنه أفضل مستقيم يمرُّ بالنقاط الممثلة لهذه البيانات، وهذه العلاقة تساعدنا في تقدير (أو التخمين عن) القيمة \hat{y}_0 الموافقة لقيمة x_0 تقع ضمن نطاق بيانات المتغير X ، وفي هذه الحالة تُدعى القيمة \hat{y}_0 بالقيمة المقدَّرة لـ Y والموافقة للقيمة المعلومة x_0 .

٤-١-٢-١- ملاحظة

إنَّ مستقيم الانحدار يمرُّ بالنقطة التي إحداثيها (\bar{x}, \bar{y}) ، ولذلك عندما نرغب برسم مستقيم الانحدار على لوحة الانتشار يكفي تعيين نقطة واحدة مختلفة عن النقطة (\bar{x}, \bar{y}) ومن ثمَّ الوصل بينهما بمستقيم.

٤-٢-١-٢- أمثلة


١- لتكن لدينا البيانات الآتية التي تمثل درجات التحصيل النهائية لعشرة طلاب في مقرري الرياضيات X والإحصاء Y :

الجدول [4-5-a]

رقم الطالب i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
درجة الطالب في مقرري الرياضيات X	75	82	65	90	77	60	55	87	77	45
درجة الطالب في مقرري الإحصاء Y	69	85	55	90	80	50	50	90	72	60

والمطلوب تعيين معادلة مستقيم انحدار Y على X لهذه البيانات.

الإجابة: من أجل ذلك نلتقي نظرة على توضع البيانات على لوحة الانتشار فنجد لها العرض الآتي.



الشكل [4-10-a]

فنلاحظ أن مَنحَى هذه البيانات مُطَرِّدًا، ولذلك سنَتَوَقَّع أن يكون لمستقيم الانحدار ميل موجب.

الآن لنستخدم الجدول الآتي من أجل تسهيل العمليات الحسابية في إنجاز صيغة العلاقة [4-2].

الجدول [4-5-b]

i	x_i	x_i^2	y_i	$x_i \cdot y_i$
1	75	5625	69	5175
2	82	6724	85	6970
3	65	4225	55	3575
4	90	8100	90	8100
5	77	5929	80	6160
6	60	3600	50	3000
7	55	3025	50	2750
8	87	7569	90	7830
9	77	5929	72	5544
10	45	2025	60	2700
المجموع	713	52751	701	51804

ومنه يكون لدينا:

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \frac{10(51804) - (713 \times 701)}{10(52751) - (713)^2} = 0.952$$


$$a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \frac{701(52751) - (713 \times 51804)}{10(52751) - (713)^2} = 2.205$$

ومن ثم يكون لمعادلة مستقيم انحدار Y على X العرض الآتي:

$$\hat{Y} = 2.205 + 0.952 X$$

حيث يُلاحظ بأن ميله موجب (ويساوي 0.952) ويتقاطع مع المحور Y في النقطة $(0, 2.205)$ ، فلو افترضنا أن طالباً قد حصل على الدرجة $x_0 = 67.5$ في المقرر X ، فعندئذ ستكون الدرجة المقدرة له في المقرر Y هي (انظر الشكل الآتي [4-10-b]):

$$\hat{y}_0 = 2.205 + 0.952(67.5) = 66.465 \approx 66.5$$



الشكل [4-10-b]

٢- البيانات الآتية تمثل عينة من المبالغ التي دفعت من أجل المشتريات اليومية (مقدرةً بوحدة نقدية ما) من السلع الغذائية X والحاجات المنزلية الأخرى Y لأسرة.

الجدول [4-6-a]

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	13	33	100	85	16	45	75	31	42	77	36	85
Y	12	45	20	66	33	45	22	60	33	66	55	45

والمطلوب حساب معامل الارتباط الخطي، ومن ثم تعيين معادلة مستقيم الانحدار الخطي لهذه البيانات. **الإجابة:** من أجل ذلك سنقدم الحسابات الآتية.

الجدول [4-6-b]

i	x_i	x_i^2	y_i	y_i^2	$x_i \cdot y_i$	i	x_i	x_i^2	y_i	y_i^2	$x_i \cdot y_i$
1	13	169	12	144	156	7	75	5625	22	484	1650
2	33	1089	45	2025	1485	8	31	961	60	3600	1860
3	100	10000	20	400	2000	9	42	1764	33	1089	1386
4	85	7225	66	4356	5610	10	77	5929	66	4356	5082
5	16	256	33	1089	528	11	36	1296	55	3025	1980
6	45	2025	45	2025	2025	12	85	7225	45	2025	3825
---	---	---	---	---	---	Sum	638	43564	502	24618	27587


فوجد أن:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i &= 638 & \& & \sum_{i=1}^n y_i &= 502 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 &= 43564 & \& & \sum_{i=1}^n y_i^2 &= 24618 \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i &= 27587 & \& & (\bar{x}, \bar{y}) &= (53.17, 41.83) \end{aligned}$$

ومنه تكون قيمة معامل الارتباط الخطي لهذه البيانات تساوي:

$$\begin{aligned} r &= \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}} \\ &= \frac{12(27587) - (638 \times 502)}{\sqrt{12(43564) - (638)^2} \sqrt{12(24618) - (502)^2}} \approx 0.1519 \end{aligned}$$

وهذا يعني وجود ارتباط خطي إيجابي ضعيف جداً بين بيانات المتغيرين X و Y ، وهذا ما تأكده لوحة الانتشار الآتية للبيانات المقدمة.



الشكل [4-11-a]

أما لتعيين مستقيم انحدار Y على X فإننا نجد:

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \frac{12(27587) - (638 \times 502)}{12(43564) - (638)^2} = 0.093$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \frac{502(43564) - (638 \times 27587)}{12(43564) - (638)^2} = 36.89$$

بالطبع كان من الممكن حساب الثابت a باستخدام العلاقة [4-4-b] لأن قيم المتوسطات لـ X و Y معلومة
 $(\bar{x}, \bar{y}) = (53.17, 41.83)$ فيكون لدينا:

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 41.83 - (0.093 \times 53.17) = 36.89$$


ومن ثم يكون لمعادلة مستقيم انحدار Y على X العرض الآتي:

$$\hat{Y} = 36.89 + 0.093 X$$

فلو أننا افترضنا أن الأسرة قد اشترت سلع غذائية بمبلغ $x_0 = 65$ وحدة نقدية، فعندئذ سيكون المبلغ المقدر لشراء السلع الأخرى يساوي:

$$\hat{y}_0 = 36.89 + (0.093 \times 65) = 42.935$$

لاحظ التباعد الكبير للنقاط عن مستقيم الانحدار بسبب ضعف الارتباط بين بيانات المتغيرين X و Y (انظر الشكل الآتي).



الشكل [4-11-b]

تمارين

- ١- اذكر أهم أنواع الارتباط من حيث التأثير والتأثر مع تقديم مثال على كل منها.
- ٢- ما الفائدة من استخدام لوحة الانتشار عند دراسة الارتباط؟
- ٣- لماذا ندرس الانحدار وما الفائدة منه؟
- ٤- لتكن لدينا مجموعة من البيانات الإحصائية الآتية:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	1.2	1.3	1	1.5	1.1	1.3	2.5	2.5	0.5	0.7
Y	-1.6	-1.5	1.5	-1.2	0.3	1.1	0.5	0.7	0.3	- 0.3

والمطلوب تمثيل هذه البيانات على لوحة الانتشار.

- ٥- لتكن لدينا المشاهدات الناتجة عن إخضاع مجموعة مكونة من 12 طالباً لاختبارين تحريري X (الدرجة القصوى 80) ومقابلة Y (الدرجة القصوى 20) في أحد المقررات الدراسية.
- (41,15) , (58,12) , (58,9) , (46,16) , (54,18) , (42,14) ,
(64,13) , (60,16) , (29,5) , (71,19) , (79,18) , (62,17)

والمطلوب ما يلي:

- أ- تمثيل هذه البيانات على لوحة الانتشار.
 - ب- حساب قيمة معامل الارتباط الخطي لهذه المشاهدات.
 - ج- تعيين معادلة مستقيم انحدار Y على X لهذه المشاهدات ومن ثم رسمه على لوحة الانتشار.
 - د- استخدام معادلة مستقيم الانحدار لتقدير الدرجة \hat{y}_o المقابلة $x_o = 68$.
- ٦- لتكن لدينا مجموعة من البيانات الإحصائية التي تمثل نتائج تسعة طلاب في اختبار المنتصف لمقرري الإحصاء X والرياضيات Y .

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	30	20	19	28	07	25	29	18	27
Y	24	23	22	21	24	21	24	23	22

والمطلوب ما يلي:

- أ- تمثيل هذه البيانات على لوحة الانتشار.
- ب- حساب قيمة معامل الارتباط لهذه المشاهدات.
- ج- تعيين معادلة مستقيم انحدار Y على X ورسمه على لوحة الانتشار.
- د- استخدام مستقيم الانحدار لتقدير القيمة الموافقة لـ $x_o = 19.5$.


٧- أخضعت مجموعة مكونة من 10 رجال بدينين من ذوي الوزن 140 كغ لدورة رياضية ونظام غذائي موحد من أجل تخفيض أوزانهم بحيث يمارس كل منهم فترة زمنية ما يومياً حسب استطاعته ولدّة 45 يوماً، وبعد ذلك قيس الوزن لكل منهم، ومن ثمّ دون إلى جانب عدد الساعات التي مارسها كما في الجدول الآتي:

الرجل	X عدد الساعات التي مارسها خلال 45 يوماً	Y الوزن عند نهاية الدورة
1	30	131
2	45	125
3	56	122
4	42	128
5	90	103
6	33	131
7	48	120
8	35	127
9	70	110
10	82	108

عندئذ وباستخدام الارتباط والانحدار الخطي أجب على السؤال الآتي:

هل تشير هذه النتائج إلى درجة عالية من التأثير المتبادل بين عدد ساعات الرياضة ونقصان الوزن؟

٨- لتكن لدينا المشاهدات المقدمة في الشكل الآتي:



والمطلوب ما يلي:

أ- بناء الجدول الخاص بهذه المشاهدات.

ب- حساب قيمة معامل الارتباط لهذه المشاهدات.

ج- تعيين معادلة مستقيم انحدار Y على X لهذه المشاهدات.

د- رسم مستقيم الانحدار على لوحة الانتشار المعطاة.

الفصل الخامس

التجارب العشوائية واحتمالات الحوادث Random Experiments and Probability of Events



المقدمة:

إنَّ مفهوم الحساب الاحتمالي لا يُعدُّ من المفاهيم القديمة إذا ما قُورِنَ بمفهوم الإحصاء أو بمفاهيم رياضية أخرى مثل الجبر والهندسة و... والحديث من هذا العلم لا يتجاوز عمره 85 سنةً حيث تبلور المفهوم الحديث للحساب الاحتمالي بعد وضع ما يُعرف باسم «مسلمات كموغوراف» للفضاء الاحتمالي عام 1933 والتي قدَّمها الرياضي الروسي كموغوراف (1903-Andrey Kolmogorov-1987).

في الحقيقة لن نقوم بدراسة الاحتمالات وفقاً للنظرية الحديثة لهذا العلم وإنما سنقدِّمه وفق منهج تقليدي بسيط يناسب طلاب المسار الإنساني في الجامعات آخذين بالحسبان ما قد درسه الطالب من مواد علمية في المراحل السابقة لتخصصه في الفرع الأدبي.

- ١ - ٥ - القاعدتين الأساسيتين في العدّ
- ٢ - ٥ - الترتيب والتوافيق
- ٣ - ٥ - فضاء الحوادث الابتدائية
- ٤ - ٥ - الحوادث
- ٥ - ٥ - الدالة الاحتمالية ومبدأ لابلاس في الحساب الاحتمالي
- ٦ - ٥ - الاحتمالات الشرطية
- ٧ - ٥ - استقلال الحوادث

القاعدتان الأساسيتان في العدّ

Basic Rules of Counting

إنّ من متطلبات الحساب الاحتمالي التعرّف على بعض قواعد العدّ والحساب التي يحتاجها الطالب في حساب بعض الاحتمالات لحوادث وسنبدأها بالمفهوم الآتي.

١-١-٥ قاعدة الضرب Multiplication Rule

لنفترض أنّ عملية ما A يمكن أن تُنجز بـ n طريقة، وعملية أخرى B يمكن أن تُنجز بـ m طريقة، فعندئذٍ يمكننا إنجاز كلاّ من العمليتين A و B بأنّ واحدٍ بعدد من الطرائق يساوي $n \times m$. إنّ هذا الإجراء الحسابي لهذا النوع من المسائل يُعرف باسم "قاعدة الضرب"، ويمكن تعميم هذه الطريقة في الحساب على أي عددٍ منتهٍ من العمليات التي لها عدد منتهٍ من الإمكانيات. فلو كان لدينا k عملية A_1, A_2, \dots و A_k بحيث يمكن أن تُنجز هذه العمليات بـ n_1, n_2, \dots, n_k طريقة على الترتيب، فعندئذٍ يمكن إنجاز هذه العمليات جميعاً وبأنّ واحد بعدد من الطرائق يساوي $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.


١-١-٥-١ أمثلة



١- لدينا قفل رقمي عشري لحقيبة مكوّن من خمس خانات (كما في الشكل الجانبي). بكم طريقة يمكننا أن نختار رقماً لقفل هذا القفل؟

الحل: بملاحظة أنّ أول رقم في الخانة اليسرى يمكننا اختياره بعددٍ من الطرائق يساوي 10، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخانات الأربعة المتبقية، فإنّه يمكننا أن نختار رقماً لقفل هذا القفل بعدد من الطرائق يساوي:

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$$



٢- إنّ لوحات السيارات في بعض البلدان تُصمّم بحيث تكون اللوحة المميزة للسيارة تحتوي على أربعة أرقام عشرية وثلاثة أحرف عربية، فما هو عدد السيارات التي يمكن أن تحمل لوحة من هذا النموذج؟

الحل: بملاحظة أنّ أول رقم في اللوحة يمكننا اختياره بعددٍ من الطرائق يساوي 10، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية الأرقام الموجودة على اللوحة، أمّا بالنسبة إلى الأحرف فيمكننا اختيار أول حرف بعددٍ من الطرائق يساوي 28 طريقة، وبالمثل نجد من أجل اختيار بقية الأحرف الموجودة على اللوحة، ومن ثمّ يكون عدد اللوحات التي يمكن إنتاجها وفقاً لهذا التقديم يساوي (وهو عدد السيارات التي يمكن أن تحمل لوحة من هذا النموذج):

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 28 \times 28 \times 28 = 219520000$$

٥-١-٢- قاعدة الجمع Addition Rule

لنفترض أن عملية ما A يمكن أن تُنجز بـ n طريقة، وعملية أخرى B يمكن أن تُنجز بـ m طريقة، فعندئذٍ يمكن إنجاز العملية A أو العملية B بعدد من الطرائق يساوي $n + m$. إن هذا الإجراء الحسابي لهذا النوع من المسائل يُعرف باسم "قاعدة الجمع"، ويمكن تعميم هذه التقنية في الحساب على أي عدد منته من العمليات التي لها عدد منته من الإمكانيات. فلو كان لدينا k عملية A_1, A_2, \dots, A_k ، بحيث يمكن أن تُنجز هذه العمليات بـ n_1, n_2, \dots, n_k طريقة على الترتيب، فإنه يمكن إنجاز العملية A_1 أو A_2 أو... أو A_k بعدد من الطرائق يساوي $n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

٥-١-١-١- أمثلة

١- يرغب أحد العاملين في أرشيف ترميز ملفاته باستخدام حرف عربي أو رقم عشري، فكم ملفاً يمكن ترميزه بهذه الطريقة؟

الإجابة: بملاحظة أن العامل لا يستطيع استخدام إلا حرف عربي أو رقم عشري فقط، فإنه يستطيع ترميز 28 ملفاً بوساطة الأحرف العربية و10 ملفات بوساطة الأرقام العشرية فقط، ومن ثم يكون عدد الملفات التي يمكن ترميزها وفقاً لهذا التقديم يساوي $28 + 10 = 38$.

٢- يريد باحث تنفيذ تجربة تربوية على تلاميذ إحدى المدارس، حيث يمكنه تطبيقها إما على التلاميذ الذكور ولديه ست مدارس فقط أو على التلميذات ولديه ثمان مدارس. كم إمكانية لديه لتنفيذ تجربته؟

الإجابة: نلاحظ أنه يمكن للباحث تنفيذ تجربته بعدد من الطرائق يساوي $6 + 8 = 14$.

٣- تقوم مكتبة بترميز كتبها بوساطة إحدى الطريقتين الآتيتين:

- إما باستخدام رقمين وثلاثة أحرف لاتينية،

- أو باستخدام ثلاثة أرقام وحرفين عربيين،

فما هو عدد الكتب التي يمكن ترميزها وفقاً لهذه الشروط؟

الإجابة: بملاحظة أنه يمكن للمكتبة أن ترمز باستخدام رقمين وثلاثة أحرف لاتينية عدداً من الكتب يساوي:

$$10 \times 10 \times 26 \times 26 \times 26 = 1757600$$

وكذلك باستخدام ثلاثة أرقام وحرفين عربيين تستطيع أن ترمز عدداً من الكتب يساوي:

$$10 \times 10 \times 10 \times 28 \times 28 = 784000$$

ومن ثم يكون عدد الكتب التي يمكن ترميزها وفقاً لقاعدة الجمع يساوي:

$$1757600 + 784000 = 2541600$$



الترتيب والتوافيق

Permutations and Combinations

من المفاهيم الهامة في الحساب الاحتمالي التقليدي أيضاً ما يُعرف باسم "الترتيب والتوافيق"، والذين ستقدمهما من خلال الفترتين الآتيتين:

٥-٢-١- الترتيب



لنفترض أنه لدينا 3 كتب، ونودّ ترتيبها واحداً تلو الآخر على رف فيه 5 مواضع للكتب. بكم طريقة يمكننا ترتيب هذه الكتب الثلاثة؟

نلاحظ أنه لدينا خمسة اختيارات من أجل وضع الكتاب الأول، وبعد ذلك يتبقى لدينا أربعة مواضع شاغرة على الرف من أجل وضع الكتاب الثاني، وبعد وضع الكتاب الثاني يمكننا وضع الكتاب الأخير بإحدى ثلاث طرائق. إذاً، وبحسب قاعدة الضرب يمكننا أن نضع الكتب الثلاثة على هذا الرف واحداً تلو الآخر بعدد من الطرائق يساوي:

$$5 \cdot (5 - 1) \cdot (5 - 2) = 5 \times 4 \times 3 = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} = \frac{5!}{(5 - 3)!} = 60$$

في الحقيقة يمكننا تعميم هذه القاعدة من أجل عدد منتهٍ من الأشياء على النحو الآتي.

لنفترض أنه لدينا n من الأشياء المتميزة ونريد أخذ k شيء منها واحداً تلو الآخر دون إعادة، فعندئذٍ يمكننا اختيار الشيء الأول بعدد من الطرائق يساوي n ، وأما من أجل اختيار الشيء الثاني فيكون قد تبقى لدينا $n - 1$ من إمكانيات الاختيار، ومن أجل اختيار الشيء الذي يليه يتبقى لدينا $n - 2$ من إمكانيات الاختيار، وهكذا على هذا النحو فيتبقى لدينا من أجل اختيار الشيء الأخير $[n - (k - 1)]$ من إمكانيات الاختيار، وبالتالي بحسب قاعدة الضرب يكون لدينا من أجل اختيار الـ k شيء عدداً من الطرائق يساوي:

$$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot [n - (k - 1)] = \frac{n!}{(n - k)!}$$

ويُرمز لهذا المقدار بـ nPk ، أي أنه لدينا:

$$nPk = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot [n - (k - 1)] = \frac{n!}{(n - k)!} \quad [5-1]$$

ويُقرأ "ترتيب لـ k شيء مأخوذة من n شيء متمايز على التوالي، علماً أن:

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \quad [5-2]$$

ويُدعى " n مضروب n -Factorial"، والجدول الآتي يزودنا ببعض القيم لـ $n!$ من أجل استخدامها في حل التمارين والمسائل (علماً أنّ معظم الآلات الحاسبة تنجز حساب $n!$ حتى 50! وأكثر).

الجدول [5-1]

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880	3628800

٥-٢-١-١ ملاحظة

في الحالة الخاصّة عندما يصبح لدينا $k = n$ فإنّه يُقال عن nPn تبديل لـ n من الأشياء المتمايزة، ويكون لدينا في هذه الحالة:

$$nPn = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

نقدّم فيما يلي مثلاً بسيطاً على سبيل التوضيح.

٥-٢-١-٢ مثال

- لدينا صندوق يحوي ثلاث كرات متماثلة تماماً ومرفّمة بالأعداد 1، 2 و3. عندئذ:
- 1- إذا قمنا بسحب عشوائي لكرتين من الصندوق على التوالي وبدون إعادة، فبكم طريقة يمكننا اختيار هاتين الكرتين؟
 - 2- إذا قمنا بسحب عشوائي لثلاث كرات من الصندوق على التوالي وبدون إعادة، فبكم طريقة يمكننا اختيار هذه الكرات الثلاث؟
 - 3- نسحب عشوائياً كرتين من الصندوق على التوالي ومع الإعادة، فبكم طريقة يمكننا اختيار هاتين الكرتين؟
- الإجابات:** من أجل الطلب:

1- بملاحظة أنّه يمكننا سحب الكرة الأولى بعدد من الطرائق يساوي 3، والتي تليها بطريقتين فقط، ومن ثمّ بحسب قاعدة الضرب يمكننا اختيار الكرتين بعدد من الطرائق يساوي:

$$3 \times 2 = 6 = \frac{3!}{(3-2)!}$$

وهذا موافق للسحوبات الممكنة الآتية حيث يُلاحظ أنّ للترتيب أهمية في هذا النوع من السحب:
(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2)

2- بملاحظة أنّه يمكن سحب الكرة الأولى بثلاث طرائق، والتي تليها بطريقتين، والكرة الأخيرة بطريقة واحدة فقط، ومن ثمّ بحسب قاعدة الضرب يمكننا اختيار الكرات الثلاث بعدد من الطرائق يساوي:

$$3 \times 2 \times 1 = \frac{3!}{(3-3)!} = \frac{3!}{0!} = 6 = 3P3$$

وهذا يعني أنّه لدينا في هذه الحالة تبديلات لثلاثة أشياء. لاحظ أنّ للترتيب أهمية في هذا النوع من السحب أيضاً حيث لدينا النتائج (1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1).

٣- بملاحظة أنه يمكننا سحب الكرة الأولى بعدد من الطرائق يساوي 3، وكذلك التي تليها يمكننا سحبها بعدد من الطرائق يساوي 3 أيضاً، ومن ثمّ بحسب قاعدة الضرب يمكننا اختيار الكرتين بعدد من الطرائق يساوي:

$$3 \times 3 = 3^2 = 9$$

وهذا موافق للسحوبات الممكنة الآتية حيث يُلاحظ أن للترتيب أهمية في هذا النوع من السحب:
(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)

ولكن لم تعد المسألة هي مسألة ترتيب رغم أهمية الترتيب لنتائج السحب، والسبب في ذلك يعود إلى عملية الإعادة للكرات المسحوبة.



٥-٢-٢- التوافيق

لنفترض أنه لدينا n من الأشياء المتمايزة ونريد أخذ k شيء منها دفعة واحدة، فعندئذ يكون لدينا

عدداً من الطرائق لاختيار الـ k شيء يساوي $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ ، ويُدعى هذا المقدار توافيق لـ n فوق k ،

ويُرمز له بـ nCk أو بـ $\binom{n}{k}$. أي أنه لدينا:

$$nCk = \binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad [5-3]$$

٥-٢-٢-١- ملاحظة

في الواقع يمكن طرح المسألة السابقة على وجه آخر، فهي تكافئ مسألة أخذ k شيء واحد تلو الأخرى من n شيء متمايز وبدون إعادة، ومع الأخذ بالحسبان أنه لا أهمية لترتيب الأشياء المسحوبة، فعلى سبيل المثال لو كانت هذه الأشياء مرقمة من 1 وحتى n ، فعندئذ إذا حصلنا في السحب الأول على الشيء الذي يحمل الرقم 5 وفي السحب الثاني على الشيء الذي يحمل الرقم 9 هو نفسه كما لو حصلنا على الشيء الذي يحمل الرقم 9 في السحب الأول وعلى الشيء الذي يحمل الرقم 5 في السحب الثاني، والمهم في هذه الحالة أننا حصلنا على 5 و9 في السحبين الأول والثاني، وعلى هذا النحو نتناقص بقية السحوبات الممكنة، ولذلك سيكون لدينا عدد الطرائق الممكنة لسحب k شيء من n شيء متمايز يساوي:

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot [n-(k-1)]}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = nCk$$

والأمثلة الآتية توضح لنا ذلك.

٥-٢-٢-٢- أمثلة

١- لدينا صندوق يحوي ثلاث كرات متماثلة تماماً ومرقمة بالأعداد 1 وحتى 3. نسحب عشوائياً كرتين من الصندوق دفعة واحدة. بكم طريقة يمكننا اختيار هاتين الكرتين؟

الإجابة: بملاحظة أن السحوبات الممكنة هي (1,2)، (1,3) و (2,3)، وذلك لأنّ النتيجتين (1,2) و (2,1) تعدّ نتيجة واحدة فقط بسبب عدم أهمية الترتيب، وذلك لأننا لا نعلم أي منهما الأولى وأيها الثانية بسبب سحبهما بأن واحد. كذلك الأمر بالنسبة إلى النتيجتين (1,3) و (3,1) والنتيجتين (2,3) و (3,2).
إذاً، فعدد الطرائق الممكنة لسحب هاتين الكرتين يساوي 3C_2 حيث لدينا:

$${}^3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{3!}{2! \cdot 1!} = \frac{6}{(2) \cdot (1)} = 3$$

٢- في مركز صحي يوجد تسع ممرضات وأربعة أطباء، وطلب منّا تشكيل لجنة من أجل إدارة هذا المركز بحيث تكون مكونة من طبيبين وثلاث ممرضات. بكم طريقة يمكننا تشكيل هذه اللجنة؟

الإجابة: بملاحظة أنه يمكننا أن نختار طبيبين من أربعة أطباء بعدد من الطرائق يساوي 4C_2 (لأنه لا أهمية للترتيب هنا، فالمهم الحصول على طبيبين فقط)، وكذلك يمكننا أن نختار ثلاث ممرضات من تسع ممرضات بعدد من الطرائق يساوي 9C_3 (لأنه لا أهمية للترتيب هنا أيضاً، والمهم الحصول على ثلاث ممرضات)، ومن ثمّ بحسب قاعدة الضرب يمكننا اختيار طبيبين وثلاث ممرضات بعدد من الطرائق يساوي $({}^4C_2) \cdot ({}^9C_3)$ ، حيث لدينا:

$$({}^4C_2) \cdot ({}^9C_3) = \frac{4!}{2!(4-2)!} \cdot \frac{9!}{3!(9-3)!} = 6 \times 84 = 504$$

٣- شهد وقوع حادثة في مركز للتسوق سبعة رجال وثمان نساء. بكم طريقة يمكن اختيار الشهود على هذه الواقعة (وفقاً للقاعدة الشرعية للشهادة)؟

الإجابة: من المعلوم أنّ الشهادة تتمّ برجلين أو رجل وامرأتين، وبما أنّ الترتيب بين كل الرجال والنساء من الشهود ليس له أهمية فإنّه يمكننا اختيار الشهود على هذه الواقعة بعدد من الطرائق يساوي (مستخدمين في ذلك قاعدتي الجمع والضرب):

$$\begin{aligned} {}^7C_2 + ({}^7C_1) \cdot ({}^8C_2) &= \frac{7!}{2!(7-2)!} + \frac{7!}{1!(7-1)!} \cdot \frac{8!}{2!(8-2)!} \\ &= 21 + (7 \times 28) = 217 \end{aligned}$$



فضاء الحوادث الابتدائية

Space of Elementary Events

إن مفهوم فضاء الحوادث الابتدائية ذو صلة وطيدة بمفهوم التجارب العشوائية، ولذلك لا بد لنا أولاً من توضيح مفهوم التجربة العشوائية.

في الواقع إن التجارب التي يقوم بها المرء تقسم إلى نوعين:



الأول: تجارب نتائجها معروفة مسبقاً وقابلة للتخمين بشكل دقيق، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تجربة وضع ملعقة من السكر في كوب شاي ومن ثم تحريك السائل حيث تنحل بلورات السكر في الماء ونحصل على كوب من الشاي المحلى، ويمكن للكيميائيين تحديد درجة حلاوة السائل في الكوب (وبدقة) مسبقاً إذا علموا كمية المقادير التي استخدمت مع خصائصها. إن هذا النوع من التجارب يُدعى **تجارب نظامية** Regular Experiments.



الثاني: تجارب لا يمكن الجزم بمعرفة نتائجها مسبقاً، وكل ما يمكن عمله تعيين مجموعة تنتمي إليها تلك النتائج، والأمثلة على ذلك كثيرة أيضاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تجربة قذف قطعة نقود معدنية Coin لمرة واحدة، فعندئذ سنحصل إما على صورة H أو على شعار T ، ولكن أي من هاتين النتيجةين ستظهر للأعلى؟

بالطبع لا يمكن الجزم بمعرفتها مسبقاً وكل ما يمكننا فعله في الواقع هو تعيين مجموعة تنتمي إليها نتائج هذه التجربة ألا وهي $\{H, T\}$. إن هذا الصنف من التجارب يُدعى **تجارب عشوائية** Random Experiments.

١-٣-٥- الحادث الابتدائي وفضاء الحوادث الابتدائية

في الواقع ينتج عن كل تجربة عشوائية مجموعة معينة (أو محددة) من النتائج الممكنة يُرمز لها عادةً بـ Ω . إن كل نتيجة من هذه النتائج تُدعى **حادثاً ابتدائياً** Elementary Event، ولهذا السبب يُطلق على مجموعة كل نتائج التجربة العشوائية Ω اسم "فضاء الحوادث الابتدائية" Space of Elementary Events. إن تعيين فضاء الحوادث الابتدائية Ω لتجربة عشوائية يحتاج إلى انتباه ودقة كبيرين في فهم التجربة العشوائية وذلك لأنه لا توجد قاعدة مُحددة من أجل استنباط مجموعة النتائج لتجربة عشوائية.

فيما يلي نقدّم مجموعة من الأمثلة البسيطة نوضح من خلالها كيفية تعيين مجموعة نتائج تجربة عشوائية (أو فضاء الحوادث الابتدائية)، ولكن من أجل تجارب عشوائية ذات عدد منتهٍ من النتائج فقط.

٥-٣-١-١ أمثلة

١- لنقذف قطعة نقود معدنية لمرتين متتاليتين، فعندئذ ستكون النتائج كما في العروض الآتية:




وهنا نلاحظ أن نتائج هذه التجربة هي ثنائيات مركباتها إما شعاراً أو صورة، ومن ثم يكون لمجموعة نتائج هذه التجربة العشوائية العرض الآتي:

$$\Omega = \{ (H, H), (H, T), (T, H), (T, T) \}$$

حيث نجد أن عدد النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية منته، ويساوي $2^2 = 4 = |\Omega|$.

ننوه هنا إلى أنه يمكن تمثيل نتائج هذه التجربة بشكل بياني يدعى تمثيل الشجرة ويوضحه الشكل الآتي [5-1].



الشكل [5-1]

وكذلك نشير إلى أننا سنكتب (على سبيل التبسيط، وما لم يؤدي ذلك إلى التباس) المجموعة السابقة Ω على النحو الآتي:

$$\Omega = \{ HH, HT, TH, TT \}$$

وبالمثل بالنسبة إلى المجموعات التي تماثلها من حيث العرض.

٢- لنقذف قطعتي نقود متميزتين (مختلفتين) مرة واحدة فقط، فعندئذ ستكون نتائج التجربة هي عبارة عن ثنائيات أيضاً، ومركباتها إما شعاراً أو صورة كما في العروض الآتية (في إحدى قطعتي النقود نقشت كتابة بدلاً من الصورة):



ومن ثم تكون مجموعة النتائج لهذه التجربة العشوائية هي:

$$\Omega = \{ HH, HT, TH, TT \}$$

وهنا نلاحظ أن النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية متطابقة مع النتائج الممكنة للتجربة في المثال السابق، والسبب في ذلك يعود لتمايز قطعتي النقود.

٣- لنقم بقذف قطعتي نقود غير متميزتين (متماثلتين تماماً) بآن واحد ولمرة واحدة فقط، فعندئذ ستكون نتائج هذه التجربة هي ثنائيات مركباتها شعار وصورة كما في العروض الآتية:



وذلك لأن عدم التمايز لقطعتي النقود يجعلنا ننظر إلى النتيجة:



على أنها نتيجة واحد فقط، وذلك لأنه لا يمكننا معرفة تبعية المركبة الأولى (وبالمثل المركبة الثانية) أي من القطعة الأولى أم الثانية، ومن ثم يكون لمجموعة نتائج هذه التجربة العرض الآتي:

$$\Omega = \{HH, HT, TT\}$$

حيث نجد أن عدد النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية يساوي $|\Omega| = 3$

٤- لنأخذ تجربة رمي حجر نرد لمرة واحدة فقط، فعندئذ ستكون مجموعة النتائج لهذه التجربة العشوائية هي:


$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

فلاحظ أن عدد النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية هو $|\Omega| = 6$.

٥- لنأخذ تجربة رمي حجر نرد لمرتين متتاليتين، فعندئذ سيكون لمجموعة نتائج هذه التجربة العشوائية العرض الآتي (وتمثيل الشجرة لنتائج هذه التجربة العشوائية موضح أدناه):

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), \\ (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \end{array} \right\}$$

ف نجد أن عدد النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية هو $|\Omega| = 36 = 6^2$ ، وأما عرض الشجرة لنتائج هذه التجربة العشوائية فيقدمه الشكل الآتي:



الشكل [5-2]




٦- لنأخذ تجربة رمي حجرين نرد متميزين بأن واحد ولمرة واحدة فقط، فعندئذ ستكون لمجموعة نتائج هذه التجربة العشوائية العرض الآتي (وتمثيل الشجرة لنتائج هذه التجربة العشوائية موضح في الشكل [5-3]):

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), \\ (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \end{array} \right\}$$

ف نجد أن عدد النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية هو $|\Omega| = 36 = 6^2$ أيضاً، والسبب في ذلك يعود لتمايز حجرين النرد.

أما عرض الشجرة لنتائج هذه التجربة العشوائية فهو مماثل للشكل [5-2] ويقدمه الشكل الآتي:



الشكل [5-3]

٥ - ٤ الحوادث

Events

من المعلوم أنه من أجل تجربة عشوائية ما يتوجب على المرء البت فيما إذا كانت النتيجة المطلوبة قد تحققت أم لا، وذلك من أجل مقولة مُحددة متعلقة بهذه التجربة، فعلى سبيل المثال لدى تجربة إلقاء حجر نرد لمرة واحدة فقط قد نكون مهتمين بحصولنا على عدد فردي، ومن ثم علينا البت فيما إذا كانت نتيجة هذه التجربة قد تحققت من أجل المقولة التي ذكرناها (الحصول على عدد فردي) أم لا. في الحقيقة إن هذا الطرح يكافئ القول الآتي:

إن المجرّب لا يهتم عادةً بأية نتيجة للتجربة سيأخذ، وإنما الذي يهّمه هو إن كانت هذه النتيجة ستنتهي إلى مجموعة جزئية أو أكثر من مجموعة كل نتائج التجربة العشوائية أم لا.

فيما يلي سنقدّم مفهوم الحادث من أجل تجربة عشوائية منتهية النتائج فقط، وذلك لأنه من أجل الحالات التي تكون فيها مجموعة نتائج التجربة العشوائية غير منتهية (قابلة للعدّ أو غير قابلة للعدّ) تحتاج لمفاهيم رياضية تقع خارج إطار هذا الكتاب.

٥-٤-١- تعريف (الحادث Event)

لتكن لدينا تجربة عشوائية مجموعة نتائجها Ω منتهية. عندئذٍ كل مجموعة جزئية A من Ω تدعى حادثاً Event.

٥-٤-١-١- أمثلة

- ١- بالرجوع إلى المثال (١) من (٥-١-٣-١) حيث لدينا $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ ، فعندئذٍ نجد:
 - أ- أن $A = \{HT, TH\}$ هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على صورة واحدة فقط (أو على شعار واحد فقط) خلال القذفتين لقطعة النقود.
 - ب- أن $B = \{HH, HT, TH\}$ هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على صورة واحدة على الأقل (أو على شعار واحد على الأكثر) خلال القذفتين لقطعة النقود.
 - ج- أن $C = \{TT\}$ هو الحادث الذي يعبر عن عدم حصولنا على أية صورة (أو على شعارين تماماً) خلال القذفتين لقطعة النقود.

- ٢- بالرجوع إلى المثال (٤) من (٥-١-٣-١) حيث لدينا $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، فعندئذٍ نجد:
 - أ- أن $A = \{1, 3, 5\}$ هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على عدد فردي (أو على عدم حصولنا على أي عدد زوجي) لدى رمي حجر النرد.
 - ب- أن $B = \{2, 4, 6\}$ هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على عدد زوجي (أو على عدم حصولنا على أي عدد فردي) لدى رمي حجر النرد.

- ج- أن $C = \{1,2,3,4\}$ هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على عدد أصغر أو يساوي 4 (أو حصولنا على أي عدد أصغر من 5) لدى رمي حجر النرد.
- د- أن $D = \{4,5,6\}$ هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على عدد أكبر أو يساوي 4 (أو حصولنا على أي عدد أكبر من 3) لدى رمي حجر النرد.
- هـ- أن $E = \{2,3,4,5\}$ هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على عدد ما بين 2 و5 (أو على عدم حصولنا على أصغر وأكبر عدد) لدى رمي حجر النرد.

٥-٤-٣- حوادث مستنتجة

- لتكن لدينا تجربة عشوائية مجموعة نتائجها $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ منتهية (أي أن n عدد طبيعي منتهٍ)، ولنفترض أن A و B حادثين متعلقين بهذه التجربة، فعندئذ:
- ١- إذا كان الحادث A يحوي حادث ابتدائي وحيد، أي أن $A = \{\omega_i\}$ مع i قيمة ما من $\{1,2,\dots,n\}$ ، فعندئذ يُقال عن A إنه حادث بسيط.
 - ٢- حادث تحقق A أو B (ويُرمز له بـ $A \cup B$) هو ذلك الحادث الذي يُعبر عن انتماء نتيجة التجربة إلى A أو B أو إلى كليهما.
 - ٣- حادث تحقق A و B معاً (ويُرمز له بـ $A \cap B$) هو ذلك الحادث الذي يُعبر عن انتماء نتيجة التجربة إلى كل من A و B بأن واحد.
 - ٤- حادث تحقق A ولكن دون B (ويُرمز له بـ $A \setminus B$)، هو ذلك الحادث الذي يُعبر عن انتماء نتيجة التجربة إلى الحادث A ولكن دون أن تنتمي إلى الحادث B .
 - ٥- الحادث الذي يتحقق في حال عدم تحقق الحادث A يُدعى **حادثاً متمماً** Complement Event للحادث A ، وسنرمز له بـ \bar{A} ، أي أن $\bar{A} = \Omega \setminus A$.
 - ٦- من أجل أي حادث $A \subseteq \Omega$ ستنتج نتيجة التجربة إلى الحادث $A \cup \bar{A}$ بكل تأكيد، ولذلك يُسمى الحادث $A \cup \bar{A}$ بـ **الحادث الأكيد** Certain Event، وبما أن $\Omega = A \cup \bar{A}$ فإنه يُرمز للحادث الأكيد بـ Ω أيضاً.
 - ٧- من أجل أي حادث $A \subseteq \Omega$ سيكون من المستحيل انتماء نتيجة التجربة إلى كل من الحادث A ومتممه \bar{A} بأن واحد، ولذلك يُسمى الحادث $A \cap \bar{A}$ بـ **الحادث المستحيل** Impossible Event، وبما أن $A \cap \bar{A} = \emptyset$ فإنه يُرمز للحادث المستحيل بـ \emptyset أيضاً.
 - ٨- إذا كان انتماء نتيجة التجربة إلى الحادثين A و B بأن واحد أمراً غير ممكن (مستحيلاً)، فحينئذ يُقال إن A و B **حادثين متنافيين** Exclusive Events، حيث يكون لدينا في هذه الحالة $A \cap B = \emptyset$.

٩- إذا كانت A_1, A_2, \dots, A_k حوادث من Ω ، وكان $A_i \cap A_j = \emptyset$ من أجل كل القيم الممكنة لـ i و j من $\{1, 2, \dots, k\}$ ، فحينئذ يُقال عن هذه الحوادث إنها متنافيةً متنى متنى Pairwise Mutually Exclusive.

٥-٤-٤- ملاحظات

١- نشير هنا إلى أنه عندما نذكر مستقبلاً أنه في تجربة عشوائية ما (مثل: قذف قطع نقود معدنية أو رمي حجارة نرد أو سحب كرات من صندوق أو...) أن الأدوات المستخدمة في توليد النتائج (مثل: قطع النقود المعدنية أو حجارة النرد أو الكرات التي في صندوق أو...) هي أدوات متماثلة إنما نقصد بذلك أنه لا يمكننا التمييز بين هذه الأدوات، وفي حال ذكرنا أن هذه الأدوات متميزة إنما نقصد بذلك أن النتائج المولدة بتلك الأدوات يمكن تمييز بعضها عن البعض الآخر.

٢- سنرمز بـ 2^Ω لأسرة كل المجموعات الجزئية في Ω ، فإذا كانت Ω منتهية مع $n = |\Omega|$ فعندئذ سيكون عدد العناصر في 2^Ω يساوي 2^n ، ولتوضيح ذلك سنقدم الأمثلة الآتية:

أ- بفرض أن $\Omega = \{H, T\}$ ، فعندئذ يكون لأسرة كل المجموعات الجزئية في المجموعة Ω العرض الآتي:

$$2^\Omega = \{ \emptyset, \{H\}, \{T\}, \{H, T\} = \Omega \}$$

ومن ثم تكون $|2^\Omega| = 2^2 = 4$ ، ومن أجل هذه التجربة العشوائية نلاحظ أنه باستثناء الحادث الأكيد Ω ليس لدينا حوادث مركبة، حيث لدينا $S_1 = \{H\}$ و $S_2 = \{T\}$ حوادث بسيطة.

ب- بفرض أن $\Omega = \{3, 4, 5\}$ هو فضاء الحوادث الابتدائية لتدوير مثلث قائم (أضلاعه 3، 4 و 5 وحدات قياس) حول مركز ثقله ورصد طول الضلع الذي سيظهر للأعلى، فعندئذ يكون لأسرة كل المجموعات الجزئية في المجموعة Ω العرض الآتي:

$$2^\Omega = \{ \emptyset, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4, 5\} = \Omega \}$$

ف نجد أن $|2^\Omega| = 2^3 = 8$ ، ومن أجل هذه التجربة العشوائية لدينا:

- الحوادث $S_1 = \{3\}$ ، $S_2 = \{4\}$ و $S_3 = \{5\}$ هي حوادث بسيطة،

- الحادثين $A_1 = \{3, 4\}$ و $A_2 = \{4, 5\}$ يعبران عن حصولنا على رقمين متجاورين، وكما هو ملاحظ فإنهما حادثان مركبان،

- $B = \{3, 5\}$ هو حادث مركب يعبر عن حصولنا على رقمين غير متجاورين (أو على عدد فردي).

ج- بفرض أن $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ ، فعندئذ يكون لأسرة كل المجموعات الجزئية في المجموعة Ω العرض الآتي:

$$2^\Omega = \left\{ \begin{array}{l} \emptyset, \{HH\}, \{HT\}, \{TH\}, \{TT\}, \{HH, HT\}, \{HH, TH\}, \\ \{HH, TT\}, \{HT, TH\}, \{HT, TT\}, \{TH, TT\}, \{HH, HT, TH\}, \\ \{HH, HT, TT\}, \{HH, TH, TT\}, \{HT, TH, TT\}, \\ \{HH, HT, TH, TT\} = \Omega \end{array} \right\}$$

ومنه يكون لدينا:

$$|2^\Omega| = 2^4 = 16$$

٥-٤-٥-٥ أمثلة

١- لنأخذ تجربة رمي حجر نرد لمرة واحدة فقط، ولنأخذ:

الحدث A ، والذي يعبر عن حصولنا على عدد أصغر من 3،

الحدث B ، والذي يعبر عن حصولنا على عدد أكبر من 4،

الحدث C ، والذي يعبر عن حصولنا على عدد أكبر أو يساوي 3 وأصغر أو يساوي 4،

الحدث D ، والذي يعبر عن حصولنا على عدد أصغر من 1،

الحدث E ، والذي يعبر عن حصولنا على عدد أكبر أو يساوي 1.

الحدث F ، والذي يعبر عن حصولنا على عدد فردي.

الحدث G ، والذي يعبر عن حصولنا على عدد زوجي.

والمطلوب تعيين الحوادث المذكورة آنفاً مع تبيان المتنافية وغير المتنافية منها.

الإجابة: من أجل ذلك نجد أن الحوادث A و B و C هي $A = \{1,2\}$ ، $B = \{5,6\}$ و $C = \{3,4\}$ ، وأما

D فهو الحادث المستحيل \emptyset لأن $D = \{\}$ ، في حين أن E هو الحادث الأكيد حيث لدينا

$E = \{1,2,3,4,5,6\} = \Omega$ ، وأخيراً نجد أن الحادثين F و G هما $F = \{1,3,5\}$ و $G = \{2,4,6\}$.

من جهة أخرى نجد أن الحوادث A و B و C متنافية متنى متنى وذلك لأن:

$$A \cap B = \{1,2\} \cap \{5,6\} = \emptyset$$

$$A \cap C = \{1,2\} \cap \{3,4\} = \emptyset$$

$$B \cap C = \{5,6\} \cap \{3,4\} = \emptyset$$

وكذلك F و G هما حادثان متنافيان لأن:


$$F \cap G = \{1,3,5\} \cap \{2,4,6\} = \emptyset$$

في حين أن:

- الحادثين F و A وكذلك F و B وأخيراً F و C ليست متنافية.

- الحادثين G و A وكذلك G و B وأخيراً G و C ليست متنافية أيضاً.

٢- لنفترض أنه لدينا صندوق يحوي 4 كرات متماثلة تماماً، ولكل كرتين منها لون مميز (أحمر وأزرق)، وقد رُقمَت كل كرة من الكرتين ذات اللون الواحد بالرقم 1 و 2 للتمييز. نقوم بسحب عشوائي (أي بعد خلط الكرات جيداً ودون النظر إلى الصندوق أثناء السحب) لكرتين على التوالي دون إرجاع إلى الصندوق، والمطلوب تعيين:



أ- حادث حصولنا على كرتين من لون واحد.

ب- حادث حصولنا على أرقام مختلفة.

ج- حادث حصولنا على مجموع للأرقام يساوي 4.

د- حادث حصولنا على مجموع للأرقام يساوي 3.

هـ- حادث حصولنا على مجموع للأرقام أصغر من 5.

و- حادث حصولنا على مجموع للأرقام أصغر من 2.

ز- حادث حصولنا على كرات تحمل أرقاماً فردية.

الإجابات: من أجل مسألتنا هذه سنرمز بـ r_1 و r_2 للكرتين الحمراء اللتين تحملان الرقمين 1 و 2 على الترتيب، وكذلك بـ b_1 و b_2 للكرتين الزرقاوين اللتين تحملان الرقمين 1 و 2 على الترتيب، فعندئذ يكون لفضاء الحوادث الابتدائية العرض الآتي:

$$\Omega = \left\{ (r_1, r_2), (r_2, r_1), (b_1, b_2), (b_2, b_1), (r_1, b_1), (r_1, b_2), (r_2, b_1), (r_2, b_2), (b_1, r_1), (b_1, r_2), (b_2, r_1), (b_2, r_2) \right\}$$

والآن من أجل الطلب:

أ- سنفترض أن A هو حادث حصولنا على كرتين من لون واحد، فعندئذ يكون لدينا:

$$A = \left\{ (r_1, r_2), (r_2, r_1), (b_1, b_2), (b_2, b_1) \right\}$$

ب- سنفترض أن B هو حادث حصولنا على أرقام مختلفة، فعندئذ يكون لدينا:

$$B = \left\{ (r_1, r_2), (r_2, r_1), (b_1, b_2), (b_2, b_1), (r_1, b_2), (r_2, b_1), (b_1, r_2), (b_2, r_1) \right\}$$

ج- سنفترض أن C هو حادث حصولنا على مجموع للأرقام يساوي 4، فعندئذ يكون لدينا:

$$C = \left\{ (r_2, b_2), (b_2, r_2) \right\}$$

د- سنفترض أن D هو حادث حصولنا على مجموع للأرقام يساوي 3، فعندئذ يكون لدينا:

$$D = \left\{ (r_1, r_2), (r_2, r_1), (b_1, b_2), (b_2, b_1), (r_1, b_2), (r_2, b_1), (b_1, r_2), (b_2, r_1) \right\}$$

هـ- سنفترض أن E هو حادث حصولنا على مجموع للأرقام أصغر من 5، فعندئذ يكون لدينا:

$$E = \left\{ (r_1, r_2), (r_2, r_1), (b_1, b_2), (b_2, b_1), (r_1, b_1), (r_1, b_2), (r_2, b_1), (r_2, b_2), (b_1, r_1), (b_1, r_2), (b_2, r_1), (b_2, r_2) \right\} = \Omega$$

و- سنفترض أن F هو حادث حصولنا على مجموع للأرقام أصغر من 2، فعندئذ نجد أن:
 $F = \{\} = \emptyset$

ز- سنفترض أن G هو حادث حصولنا على كرات تحمل أرقاماً فردية، فعندئذ يكون لدينا:
 $G = \{(r_1, b_1), (b_1, r_1)\}$



الدالة الاحتمالية ومبدأ لابلاس في الحساب الاحتمالي

Probability Function and Laplace Rule in Probability Computation

لقد لاحظنا سابقاً أنه لدى تجربة عشوائية ما ستنشأ لدينا حوادث، وفي هذا الإطار قد يسأل المرء عن احتمال تحقق حدث معين متعلق بهذه التجربة، فعلى سبيل المثال في تجربة إلقاء حجر النرد لمرة واحدة فقط قد يطرح السؤال الآتي:

ما هو احتمال حصولنا على عدد فردي في تجربة إلقاء حجر النرد لمرة واحدة فقط؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن الإجابة على هذا السؤال بسيطة جداً، ولكن في الواقع الأمر ليس كذلك لأسباب عديدة، منها على سبيل المثال:

- ١- كيف يمكننا تعيين احتمال الحادث الابتدائي في تجربة عشوائية ما؟
 - ٢- ما هي الأداة التي ستقوم بحساب هذا الاحتمال؟
 - ٣- ما هي الخصائص التي يجب على هذه الأداة تحقيقها حتى تصبح عديمة التناقض عند التعميم؟
- إذاً علينا الإجابة على الأسئلة الثلاث السابقة قبل البدء في الإجابة على السؤال المطروح أعلاه، ولكن قبل البدء بتقديم هذه الإجابات على الأسئلة الثلاث السابقة نود التنويه إلى الملاحظة الآتية.

١-٥-٥- ملاحظة

عندما نذكر مستقبلاً أن الأدوات المستخدمة في التجربة (مثل: قطع نقود أو حجارة نرد أو كرات أو بطاقات أو ...) متوازنة، فإننا نقصد بذلك أن هذه الأدوات مصنعة من مادة متجانسة الكثافة بحيث يصبح لكل نتيجة من نتائج التجربة العشوائية النصيب نفسه في الظهور.

الآن من أجل الإجابة على السؤال الأول يمكننا الجزم بأن احتمال الحادث الابتدائي في تجربة عشوائية ما ليس من صلب عمل الاحتمالات، وذلك لأن احتمال حادث ابتدائي متعلق بطبيعة المادة التي تجرى عليها التجربة، فعلى سبيل المثال:

- ١- لو أخذنا تجربة قذف قطعة نقود متوازنة لمرة واحدة فقط، فعندئذ سيكون لكل نتيجة من نتائج التجربة العشوائية النصيب نفسه في الظهور، ومن ثم احتمال كل حادث ابتدائي متعلق بهذه التجربة سوف يساوي $\frac{1}{2}$ لأنه لدينا نتيجتين فقط. لكن في حال ليس لدينا معلومات حول تجانس المادة التي صنعت منها قطعة النقود، فعندئذ لا يمكننا الادعاء أن احتمال كل حادث ابتدائي متعلق بهذه التجربة يساوي $\frac{1}{2}$ ، فقد يكون مركز ثقل القطعة منحازاً إلى أحد وجهي القطعة بسبب عدم تجانس المادة المكونة للقطعة، ومنه يصبح للوجه الآخر احتمال أكبر في الظهور للأعلى، وهكذا فإذا لم نعط الاحتمال لظهور كل وجه من الوجهين سوف لن يكون بإمكاننا حساب احتمالات لحوادث متعلقة بهذه التجربة العشوائية.

٢- لو أخذنا تجربة إلقاء حجر نرد متوازن لمرة واحدة فقط، فعندئذ سيكون احتمال كل حادث ابتدائي متعلق بهذه التجربة يساوي $\frac{1}{6}$ لأنه لدينا ست نتائج، ولكن في حال أنه ليس لدينا معلومات حول تجانس المادة التي صنع منها حجر النرد فإنه لا يمكننا الادعاء أن احتمال كل حادث ابتدائي متعلق بهذه التجربة يساوي $\frac{1}{6}$ ، فقد يكون مركز ثقل حجر النرد ليس في مركزه بسبب عدم تجانس المادة المكونة لحجر النرد، ومن ثم يصبح لكل وجه من الوجوه نصيب مختلف في الظهور عن الآخر، وما لم يُعطى احتمال الظهور لكل وجه من الوجوه الستة سوف لن يكون بإمكاننا حساب احتمالات لحوادث متعلقة بهذه التجربة العشوائية.

أمّا للإجابة على السؤالين الثاني والثالث فقد اقترح تقديم دالة تقوم بذلك على أن تحقق شروطاً معدّدة، وفي هذا الإطار بُدلت من أجلهما محاولات جادة من قبل بعض علماء الرياضيات (وعلماء الاحتمالات على وجه الخصوص)، وقد تراوحت نتائجهم ما بين عدم الدقة حيناً والتخصيص حيناً آخر، إلى أن جاء التعميم في النصف الأول من القرن العشرين (وذلك في عام 1933) على يد الرياضياتي الروسي كلموغوراف، ولكن في كتابنا هذا سوف لن نتطرق إلى هذه الدراسات وسنكتفي بتقديم نموذج بسيط يتوافق مع التخصيص الذي فرضناه على فضاء الحوادث الابتدائية Ω (أي عندما تكون مجموعة نتائج التجربة منتهية).

ليكن لدينا تجربة عشوائية بفضاء حوادث ابتدائية $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ منتهٍ مع n من \mathbb{N} مثبت، وعلاوةً على ذلك سنفترض أن لجميع نتائج التجربة العشوائية النصيب نفسه في الظهور، وهذه الصفة تنتج من مواقف عملية كثيرة إذ إنه يمكن الاستفادة من خاصية التجانس للمادة التي تُجرى عليها التجربة لتحقيق هذه الخاصية، وأخيراً سنأخذ دالة حقيقية P معرفة على 2^Ω ، أي أن:

$$P : 2^\Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$A \mapsto P(A)$$

ومُحققة لما يلي:

$$١- P(\emptyset) = 0 \text{ لدينا}$$

٢- من أجل أية متتالية حوادث A_1, A_2, \dots, A_n من 2^Ω متنافية متنى متنى لدينا:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$٣- P(\Omega) = 1 \text{ لدينا}$$

إن الدالة P المُحققة للشروط الثلاثة السابقة تُدعى دالة احتمالية.

٢-٥-٥- ملاحظات

١- من الشرطين (١) و (٣) السابقين نلاحظ أن مجموعة قيم الدالة P هي الفترة $[0, 1]$ فقط، ومن ثم يكون من أجل أي حادث A من 2^Ω لدينا العلاقة الآتية محققة:

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad [5-4]$$

٢- لو أخذنا الحوادث البسيطة $\{\omega_1\}$ و $\{\omega_2\}$ و... و $\{\omega_n\}$ ، فعندئذ سيكون لجميع هذه الحوادث الاحتمال نفسه (لأن لجميع نتائج التجربة العشوائية النصيب نفسه في الظهور)، أي أن:

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_n\})$$

وبالتالي بحسب الشرط الثاني والثالث ينتج لدينا الآتي:

$$\begin{aligned} 1 = P(\Omega) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n \{\omega_i\}\right) = \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) \\ &= \underbrace{P(\{\omega_1\}) + P(\{\omega_1\}) + \dots + P(\{\omega_1\})}_{n\text{-times}} = n P(\{\omega_1\}) \end{aligned}$$

والتي ينتج عنها أن $P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{n}$ ، وبالتالي يكون لدينا:

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_n\}) = \frac{1}{n} \quad [5-5]$$

ومن ثم احتمال أي حادث A متعلق بالتجربة العشوائية سيكون مساوياً إلى النسبة $\frac{|A|}{|\Omega|}$ ، وهذا يعني أنه يمكننا أن نكتب:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \quad ; \forall A \in 2^\Omega \quad [5-6]$$

وهذه العلاقة صاغها لابلاس على النحو الآتي أيضاً:

$$\text{احتمال الحادث الذي قيد الدراسة} = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة للحادث قيد الدراسة}}{\text{عدد الحالات الممكنة للتجربة}}$$

إن الدالة الاحتمالية P المعطاة بالعلاقة الأخيرة (والتي وضعها لابلاس) يُطلق عليها اسم مبدأ لابلاس من أجل الحالات المتساوية الإمكانية، وعُرفت فيما بعد باسم "التعريف التقليدي للاحتمال" Classical

.Definition of Probability

إنَّ التعامل مع هذا التعريف للاحتمال سيقود المرء في كثير من الحالات إلى استخدام التحليل التوافقي (استخدام الترتيب والتوافق) لحل المسائل، ومن ثمَّ سنلاحظ أنَّ التحليل التوافقي سيقوم بدورٍ مهمٍّ في الحساب الاحتمالي لمسائل تتوافق مع هذه الحالة. هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر يجب على المرء ألاَّ يتجاوز فرضيات هذا التعريف إذ إنه يصبح عديم الفائدة عندما يكون فضاء الحوادث الابتدائية غير منتهٍ أو عندما يكون للحوادث الابتدائية احتمالات مختلفة.

٥-٥-٣- أمثلة

١- بالعودة إلى المثال ١/ من (٥-٤-٥) حيث لدينا تجربة رمي حجر نرد لمرة واحدة فقط، وسنفترض علاوةً على ما سبق أنَّ حجر النرد متوازن، فعندئذٍ يكون استخدام مبدأ لابلاس من أجل حساب احتمالات لحوادث متعلِّقة بهذه التجربة قابلاً للتطبيق (لأنَّ عدد نتائج هذه التجربة منتهٍ ولجميع الأوجه النصيب نفسه في الظهور)، ولذلك سنقوم بحساب احتمالات الحوادث التي تمَّ تعيينها في ذلك المثال، حيث لدينا:

أ- الحادث $A = \{1, 2\}$ (والذي يعبر عن حصولنا على عدد أصغر من 3)، ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = 0.\bar{3}$$

ب- الحادث $B = \{5, 6\}$ (والذي يعبر عن حصولنا على عدد أكبر من 4)، ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = 0.\bar{3}$$

ج- الحادث $C = \{3, 4\}$ (والذي يعبر عن حصولنا على عدد أكبر أو يساوي 3 وأصغر أو يساوي 4)، ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = 0.\bar{3}$$

د- الحادث $D = \emptyset$ (والذي يعبر عن حصولنا على عدد أصغر من 1)، ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{0}{6} = 0$$

هـ- الحادث $E = \Omega$ (والذي يعبر عن حصولنا على عدد أكبر أو يساوي 1)، ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = \frac{6}{6} = 1$$

و- الحادث $F = \{1, 3, 5\}$ (والذي يعبر عن حصولنا على عدد فردي)، ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$P(F) = \frac{|F|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

ز- الحادث $G = \{2, 4, 6\}$ (والذي يعبر عن حصولنا على عدد زوجي)، ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$P(G) = \frac{|G|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

٢- بالعودة إلى المثال /٢/ من (٥-٤-٥) السابق حيث لدينا تجربة سحب كرتين على التوالي دون إرجاع إلى الصندوق، وفي هذه المسألة نلاحظ أن استخدام مبدأ لابلاس من أجل حساب احتمالات لحوادث متعلقة بالتجربة قابلاً للتطبيق دون إضافة أية شروط إضافية (لأن عدد نتائج هذه التجربة منتهٍ ولجميع الكرات النصيب نفسه في الظهور)، ولذلك سنقوم بحساب احتمالات الحوادث التي تمَّ تعيينها في ذلك المثال، حيث لدينا:

أ- الحادث $A = \{(r_1, r_2), (r_2, r_1), (b_1, b_2), (b_2, b_1)\}$ يعبر عن حصولنا على كرتين من لون واحد، واحتماله يساوي:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} = 0.\bar{3}$$

ب- الحادث:

$$B = \{(r_1, r_2), (r_2, r_1), (b_1, b_2), (b_2, b_1), (r_1, b_2), (r_2, b_1), (b_1, r_2), (b_2, r_1)\}$$

يعبر عن حصولنا على أرقام مختلفة، واحتماله يساوي:

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = 0.\bar{6}$$

ج- الحادث $C = \{(r_2, b_2), (b_2, r_2)\}$ يعبر عن حصولنا على مجموع للأرقام يساوي 4، واحتماله يساوي:

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} = 0.1\bar{6}$$

د- الحادث:

$$D = \{(r_1, r_2), (r_2, r_1), (b_1, b_2), (b_2, b_1), (r_1, b_2), (r_2, b_1), (b_1, r_2), (b_2, r_1)\}$$

يعبر عن حصولنا على مجموع للأرقام يساوي 3، واحتماله يساوي:

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = 0.\bar{6}$$

هـ- الحادث $E = \Omega$ يعبر عن حصولنا على مجموع للأرقام أصغر من 5 واحتماله يساوي:

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{12}{12} = 1$$

و- الحادث $F = \emptyset$ يعبر عن حصولنا على مجموع للأرقام أصغر من 2 واحتماله يساوي:

$$P(F) = \frac{|F|}{|\Omega|} = \frac{0}{12} = 0$$

ز- الحادث $G = \{(r_1, b_1), (b_1, r_1)\}$ يعبر عن حصولنا على كرات تحمل أرقاماً فردية واحتماله يساوي:

$$P(G) = \frac{|G|}{|\Omega|} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} = 0.1\bar{6}$$

٣- في مستوصف يوجد كادر طبي مكون من طبييين وثلاث ممرضات. قامت إدارة المستوصف بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص اختيروا عشوائياً من هذا الكادر، فإذا علمت أن لكل شخص في هذا الكادر النصيب نفسه في الاختيار، فما هو احتمال وجود الطبييين في هذه اللجنة؟

الإجابة: لنرمز بـ A لحدث وجود طبييين في هذه اللجنة. عندئذٍ بسبب أنه لم يذكر شيء عن كيفية سحب عناصر هذه اللجنة من الكادر الطبي، فهو شخص بعد الآخر أم دفعة واحدة، فإنه علينا مناقشة الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان السحب قد تم لشخص بعد الآخر، فعندئذٍ يكون عدد الحالات الممكنة للتجربة هو:

$$|\Omega| = 5P3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

وأما عدد الحالات الملائمة للحدث A يساوي:

$$|A| = (2P2) \cdot (3P1) = 2 \times 3 = 6$$

ومن ثم يكون الاحتمال المطلوب يساوي:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{60} = 0.1$$

ب- إذا كان السحب تم على دفعة واحدة، فعندئذٍ يكون عدد الحالات الممكنة للتجربة هو:

$$|\Omega| = 5C3 = 10$$

وأما عدد الحالات الملائمة للحدث A يساوي:

$$|A| = (2C2) \cdot (3C1) = 1 \times 3 = 3$$

ومن ثم يكون الاحتمال المطلوب يساوي:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{10} = 0.3$$

٤- يوجد في صندوقين A و B كرات متماثلة تماماً وبألوان مختلفة، وبحيث يحوي الصندوق A كرة بيضاء وأخرى سوداء فقط، وأما الصندوق B فإنه يحوي كرة بيضاء وكرة سوداء وأخرى حمراء. نقوم بخلط الكرات في الصندوق A جيداً ومن ثم نسحب عشوائياً كرة من هذا الصندوق ونضعها في الصندوق الثاني دون رؤيتها، وبعد ذلك نقوم بخلط كرات الصندوق B جيداً ومن ثم نسحب عشوائياً كرة منه، فما هو احتمال أن تكون الكرة المسحوبة أخيراً بيضاء؟

الإجابة: بما أن جميع الكرات متماثلة فإن ذلك يعني أن لجميع الحوادث الابتدائية الناتجة عن هذه التجربة النصيب نفسه في الظهور، ومن ثم سيكون لجميع الحوادث الابتدائية الاحتمال نفسه.

الآن لتعيين فضاء الحوادث الابتدائية سنرمز للكرة البيضاء والسوداء في الصندوق A بـ w_A و b_A على الترتيب، في حين سنرمز للكرة البيضاء والسوداء والحمراء في الصندوق B بـ w_B و b_B و r_B على الترتيب. عندئذٍ يكون لفضاء الحوادث الابتدائية العرض الآتي:

$$\Omega = \{(w_A, w_A), (w_A, w_B), (w_A, b_B), (w_A, r_B), (b_A, b_A), (b_A, w_B), (b_A, b_B), (b_A, r_B)\}$$


حيث ترمز المركبة الأولى من الشائبة إلى نتيجة السحب الأول بينما ترمز المركبة الثانية من الشائبة إلى نتيجة السحب الثاني. نلاحظ هنا أن فضاء الحوادث الابتدائية لهذه التجربة منته، ومن ثمّ يمكننا تطبيق مبدأ لابلاس في الاحتمالات لحساب الاحتمال المطلوب، فلو افترضنا أن C هو حادث سحب كرة بيضاء من الصندوق الثاني بعد إضافة كرة إليه من الصندوق الأول فإنه يمكننا أن نكتب:

$$C = \{(w_A, w_A), (w_A, w_B), (b_A, w_B)\}$$

ومن ثمّ يكون الاحتمال المطلوب يساوي:

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{3}{8} = 0.375$$

هـ- ليكن لدينا بطاقات لعب Playing Cards مكوّنة من 52 بطاقة لها العرض الآتي:



علماً أنه لدينا أربعة أنواع في هذا النوع من البطاقات هي: \heartsuit ، \spadesuit ، \clubsuit وتدعى دينار Diamond، قلب Heart، بستوني Spade و زهر Club على الترتيب.

والآن. إذا علمت أن لجميع البطاقات النصيب نفسه في الاختيار (أو السحب)، وقمنا بسحب عشوائي لأربع بطاقات دفعةً واحدة من هذه المجموعة، فما هو احتمال أن يكون:

أ- لدينا بطاقة سوداء واحدة فقط؟

ب- لدينا ثلاث صور؟

ج- جميع البطاقات المسحوبة آسات Aces (والمثّلة بنقطة واحدة)؟

د- لدينا من كل نوع بطاقة؟

الإجابات: بما أن فضاء الحوادث الابتدائية لهذه التجربة منته ولجميع البطاقات النصيب نفسه في الاختيار فإنه يمكننا تطبيق مبدأ لابلاس في حساب الاحتمالات المطلوبة، حيث نلاحظ في هذه المسألة أن عدد الحالات الممكنة للتجربة يساوي إلى عدد الطرائق التي يمكننا فيها اختيار 4 بطاقات من 52 بطاقة، وبما أن الترتيب هنا ليس له أهمية فإن عدد هذه الطرائق يساوي:

$${}_{52}C_4 = \frac{52!}{4! \cdot (52-4)!} = 270725$$

والآن من أجل الإجابة على الطلب:

أ- سنرمز بـ A لحدث حصولنا على بطاقة سوداء واحدة فقط، فعندئذ يكون لدينا عدد الحالات الملائمة لهذا الحدث يساوي عدد الطرائق التي يمكننا فيها اختيار بطاقة واحدة من 26 بطاقة سوداء واختيار 3 بطاقات من 26 بطاقة حمراء (حيث الترتيب هنا ليس له أهمية)، وعدد هذه الطرائق يساوي:

$$({}_{26}C_1) \cdot ({}_{26}C_3) = 26 \times 2600 = 67600$$

ومن ثمّ الاحتمال المطلوب يساوي:

$$P(A) = \frac{({}_{26}C_1) \cdot ({}_{26}C_3)}{{}_{52}C_4} = \frac{67600}{270725} \approx 0.25$$

ب- سنرمز بـ B لحدث حصولنا على ثلاث صور، فعندئذ يكون لدينا عدد الحالات الملائمة لهذا الحدث يساوي إلى عدد الطرائق التي يمكننا فيها اختيار ثلاث بطاقات من 12 صورة، واختيار البطاقة الرابعة من الـ 40 بطاقة المتبقية (حيث الترتيب هنا ليس له أهمية)، وعدد هذه الطرائق يساوي:

$$({}_{12}C_3) \cdot ({}_{40}C_1) = 220 \times 40 = 8800$$

ومن ثمّ الاحتمال المطلوب يساوي:

$$P(B) = \frac{({}_{12}C_3) \cdot ({}_{40}C_1)}{{}_{52}C_4} = \frac{8800}{270725} \approx 0.0325$$

ج- سنرمز بـ C لحدث حصولنا على أربعة آسات، فعندئذ يكون لدينا عدد الحالات الملائمة لهذا الحدث يساوي عدد الطرائق التي يمكننا فيها اختيار أربع بطاقات من 4 فقط (حيث الترتيب هنا ليس له أهمية)، وعدد هذه الطرائق يساوي ${}_{4}C_4 = 1$ ، ومن ثمّ الاحتمال المطلوب يساوي:

$$P(C) = \frac{{}_{4}C_4}{{}_{52}C_4} = \frac{1}{270725} = 0.0000037$$

د- سنرمز بـ D لحدث حصولنا على بطاقة من كل نوع، فعندئذ يكون لدينا عدد الحالات الملائمة لهذا الحدث يساوي عدد الطرائق التي يمكننا فيها اختيار بطاقة واحدة من 13 بطاقة وبالمثل بالنسبة لبقية البطاقات الأخرى (حيث الترتيب هنا ليس له أهمية)، وعدد هذه الطرائق يساوي:

$$({}_{13}C_1) \cdot ({}_{13}C_1) \cdot ({}_{13}C_1) \cdot ({}_{13}C_1) = 13 \times 13 \times 13 \times 13 = 28561$$

ومن ثمّ الاحتمال المطلوب يساوي:

$$P(D) = \frac{({}_{13}C_1) \cdot ({}_{13}C_1) \cdot ({}_{13}C_1) \cdot ({}_{13}C_1)}{{}_{52}C_4} = \frac{28561}{270725} \approx 0.1055$$



5-5-4- بعض خصائص الدالة الاحتمالية

إنّ المقولات الآتية (سنقدّمها دون برهان) تعرض لنا بعض الخصائص البسيطة للدالة الاحتمالية.

1- من أجل أي حدث A من 2^Ω لدينا:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad [5-7]$$

2- من أجل أي حدثين A و B من 2^Ω لدينا:

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B) \quad [5-8]$$

3- من أجل أي حدثين A و B من 2^Ω مع $B \supset A$ (أي أنّ تحقق B يقتضي تحقق A حتماً) سيكون لدينا:

$$P(B) \geq P(A)$$

وهذه الخاصية تُعرّف باسم **خاصية الاطراد** Monotone Property للدالة الاحتمالية، وعلاوةً على ذلك

يكون لدينا في هذه الحالة:

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A) \quad [5-9]$$

4- من أجل أية ثلاثة حوادث A و B و C من 2^Ω لدينا:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \end{aligned} \quad [5-10]$$

والذي يُدعى **قانون الجمع** Addition Law في الاحتمالات، وفي الحالة الخاصة إذا كانت الحوادث A

و B و C متنافية مثني مثني، فعندئذٍ يصبح لدينا:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

وفي حال كان لدينا حدثين فقط A و B من 2^Ω ، فعندئذٍ يكون لدينا:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad [5-11]$$

وعندما يكون الحادثان A و B متنافيين (أي أنّ $A \cap B = \emptyset$) فعندئذٍ يصبح لدينا:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

5-5-5- أمثلة

1- ليكن لدينا A و B و C حوادث من فضاء حوادث ابتدائية Ω ، ولنفترض أنّ:

$$P(A \setminus B) = 0.25 \quad \& \quad P(B \setminus A) = 0.30 \quad \& \quad P(C \setminus A) = 0.10$$

$$P(A \cap B) = 0.15 \quad \& \quad P(A \cap C) = 0.10 \quad \& \quad P(B \cap C) = 0.15$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0.05$$

والمطلوب حساب $P(A \cup B)$ و $P(A \cup B \cup C)$.

الإجابة: نعلم أن $P(A \cup B \cup C)$ يحسب بالعلاقة [5-10]، وكذلك $P(A \cup B)$ يحسب باستخدام العلاقة [5-11]، ولذلك يجب علينا أولاً حساب الاحتمالات $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$ حيث لدينا من العلاقة [5-8] ما يلي:

$$P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) = 0.25 + 0.15 = 0.40$$

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B) = 0.30 + 0.15 = 0.45$$

$$P(C) = P(C \setminus A) + P(A \cap C) = 0.10 + 0.10 = 0.20$$

ومن ثم يكون لدينا:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.40 + 0.45 - 0.15 = 0.70$$

وكذلك نجد أن:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ &= 0.40 + 0.45 + 0.20 - 0.15 - 0.10 - 0.15 + 0.05 = 0.70 \end{aligned}$$

٢- لنأخذ تجربة إلقاء قطعة نقود متوازنة لثلاث مرّات متتالية، فعندئذ يكون لمجموعة نتائج هذه التجربة العشوائية العرض الآتي:

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

والمطلوب حساب احتمال الحصول على صورة واحدة على الأقل في هذه التجربة.

الإجابة: من أجل حساب الاحتمال المطلوب سنفترض أن A هو حادث الحصول على صورة واحدة على الأقل في هذه التجربة، فعندئذ يكون لدينا:

$$A = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH\}$$

وبما أن قطعة النقاد متوازنة فإنه سيكون لجميع النتائج النصيب نفسه في الظهور، ومن ثم يصبح لدينا بحسب مبدأ لابلاس في الاحتمالات ما يلي:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{7}{8} = 0.875$$

لاحظ هنا كان بإمكاننا حسابه باستخدام حساب احتمال الحادث المتمم حيث لدينا:

$$\bar{A} = \{TTT\} \Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{|\bar{A}|}{|\Omega|} = \frac{1}{8} = 0.125$$

ومن ثم يكون لدينا بحسب العلاقة [5-7] ما يلي:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0.125 = 0.875$$



الاحتمالات الشرطية

Conditional Probability

لقد قمنا فيما سبق بالتعرف على مفهوم الحادث وكيفية حساب احتماله بوساطة الدالة الاحتمالية، ولكن قد يصادفنا في كثير من الحالات حساب احتمالات لحوادث ذات طبيعة شرطية، فعلى سبيل المثال:

١- لدى رمي حجر نرد متوازن، فما هو احتمال حصولنا على العدد 1 علماً أننا قد حصلنا على عدد فردي؟

٢- لدى قذف قطعة نقود متوازنة لثلاث مرات متتالية، فما هو احتمال حصولنا على صورة في المرة الثانية علماً أننا قد حصلنا على صورتين تماماً؟

نلاحظ هنا أن المطلوب حساب احتمال حادث إذا علم تحقق وقوع حادث آخر سابق له، وتوضيح ذلك أكثر لنأخذ تجربة إلقاء حجر نرد متوازن لمرة واحدة فقط، ولنطرح السؤال الآتي:

ما هو احتمال الحصول على الرقم 1 علماً أننا قد حصلنا على عدد فردي؟

من أجل الإجابة على هذا السؤال سنرمز بـ A لحادث الحصول على العدد 1، وأما حادث الحصول على عدد فردي فنرمز له بـ B . عندئذ يكون لدينا:

$$A = \{1\} \quad \& \quad B = \{1, 3, 5\}$$

ف نجد أن $A \cap B$ هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على العدد 1 وعدد فردي، ومن جهة أخرى نلاحظ أنه بعد أن علمنا أننا قد حصلنا على عدد فردي فإن فضاء الحوادث الابتدائية Ω قد اختزل إلى الحادث B لأن الحالات الممكنة للتجربة ستصبح 1 و3 و5 فقط، ومن ثم بحسب مبدأ لابلاس في الاحتمالات فإن الاحتمال المطلوب سيكون مساوياً النسبة الآتية:

$$\frac{\text{عدد الحالات الملائمة للحادث}}{\text{عدد الحالات الممكنة للتجربة}} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3}$$

فلو قمنا الآن بتقسيم البسط والمقام على $|\Omega|$ فإنه يصبح لدينا:

$$\frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{\mathbf{P(A \cap B)}}{\mathbf{P(B)}}$$

إذاً احتمال الحصول على العدد 1 علماً أننا قد حصلنا على عدد فردي يساوي قيمة النسبة $\frac{\mathbf{P(A \cap B)}}{\mathbf{P(B)}}$

ويساوي $\frac{1}{3}$.

بالطبع يُشترط هنا أن يكون $0 < P(B)$ لأنَّ النسبة $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ لا معنى لها عندما يكون $P(B) = 0$.

٥-٦-١ - تعريف (الاحتمال الشرطي لحادث) Conditional Probability of an Event

ليكن Ω فضاء حوادث ابتدائية منتهٍ، ولنأخذ A و B حادثين من 2^Ω مع $0 < P(B)$. عندئذٍ يُعرَّف الاحتمال الشرطي للحادث A علماً أنَّ الحادث B قد تحقَّق وقوعه (ويرمز له $P(A | B)$) على أنَّه

$$\text{قيمة النسبة } \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ أي أن:}$$

$$P(A | B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad [5-12]$$

٥-٦-١-١ - ملاحظات

١- في الحالة الخاصة عندما يكون لجميع نتائج التجربة العشوائية النصيب نفسه في الظهور، فإنَّه يمكننا حساب الاحتمال الشرطي السابق من خلال العلاقة الآتية:

$$P(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} \quad ; A \in 2^\Omega, |B| > 0 \quad [5-13]$$

٢- إذا كان $0 < P(A)$ فإنَّه يمكننا أن نكتب أيضاً:

$$P(B | A) = \frac{|A \cap B|}{|A|} \quad ; B \in 2^\Omega$$

٣- من أجل A حادث ما من 2^Ω مع $0 < P(A)$ ، فإنَّه ينتج لدينا من تعريف الاحتمال الشرطي لحادث تحقَّق ستكون العلاقات الآتية:

$$\text{أ- لدينا } P(\emptyset | A) = 0 \text{ وكذلك } P(\Omega | A) = 1.$$

ب- من أجل أي حادثين متنافيين B و C من 2^Ω لدينا:

$$P((B \cup C) | A) = P(B | A) + P(C | A)$$

ج- من أجل أي حادث B من 2^Ω لدينا:

$$P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A)$$

د- إذا كان B حادثاً ما من 2^Ω مع $0 < P(B)$ فعندئذٍ يمكننا أن نكتب الآتي:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B | A) \\ &= P(B) \cdot P(A | B) \end{aligned}$$

إنَّ العلاقة الأخيرة تُدعى قانون الضرب في الاحتمالات.

٥-٦-١-٢- مثال

لنأخذ تجربة إلقاء قطعة نقود متوازنة لثلاث مرّات متتالية، حيث ذكرنا سابقاً أنّ لمجموعة نتائج هذه التجربة العشوائية العرض:

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

والمطلوب حساب احتمال الحصول على صورة في الرمية الأخيرة علماً أنّنا حصلنا على صورة واحدة على الأقل خلال هذه الرميات الثلاث.

الإجابة: من أجل ذلك سنفترض أنّ A هو الحادث الذي يعبر عن حصولنا على صورة في الرمية الأخيرة، و B حادث يعبر عن حصولنا على صورة واحدة على الأقل خلال الرميات الثلاث، فعندئذ يكون لدينا:

$$A = \{HHH, HTH, THH, TTH\}$$

$$B = \{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT\}$$

وبسبب توازن قطعة النقود، فإنّ الاحتمال الشرطي لـ A علماً أنّ الحادث B مُحققاً يساوي:


$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{4/8}{7/8} = \frac{4}{7}$$



من التطبيقات المهمة للاحتمال الشرطي ما يُعرف باسم "صيغة الاحتمال التام" وكذلك "صيغة بييز" والتي سنقدمهما تباعاً بعد التمهيد الآتي.

٥-٦-٢- تعريف (التجزئة للحادث الأكيد)

ليكن $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ فضاء حوادث ابتدائية منتهٍ، ولنأخذ Z_1, Z_2, \dots, Z_k



الشكل [4-5]

حوادث من 2^Ω علماً أنّ $n \geq k$. عندئذ يُقال عن أسرة من الحوادث $Z = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_k\}$ إنّها تجزئة للحادث الأكيد Ω إذا كان ما يلي مُحققاً:

أ- جميع الحوادث $Z_i \neq \emptyset$ من أجل كل $i = 1, 2, \dots, k$.

ب- الحوادث Z_1, Z_2, \dots, Z_k متنافية متنى متنى.

ج- لدينا $\Omega = Z_1 \cup Z_2 \cup \dots \cup Z_k$.


والشكل الجانبي [4-5] يعرض لنا تجزئة للحادث الأكيد Ω من أجل $k = 5$.

٥-٦-٣- صيغة الاحتمال التام وصيغة بييز

Total Probability Formula and Bays's Formula

ليكن $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ فضاء حوادث ابتدائية منتهٍ، ولنأخذ $Z = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_k\}$ مع

$n \geq k$ تجزئة للحادث الأكيد Ω مع $0 < P(Z_1)$ و $0 < P(Z_2)$ و $0 < P(Z_k)$ ، فعندئذ:



١- من أجل أي حدث A من 2^Ω يكون لدينا:

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(Z_i) \cdot P(A | Z_i) \quad [5-14]$$

وهذه العلاقة تُعرف باسم "صيغة الاحتمال التام" Total Probability Formula.

٢- من أجل أي حدث A من 2^Ω مع $0 < P(A)$ ، ومن أجل أية قيمة صحيحة $1 \leq j \leq k$ يكون لدينا:

$$P(Z_j | A) = \frac{P(Z_j) \cdot P(A | Z_j)}{\sum_{i=1}^k P(Z_i) \cdot P(A | Z_i)} \quad [5-15]$$

وهذه العلاقة الأخيرة تُعرف باسم "صيغة بيز في الاحتمالات" Bays's Formula، وتنسب إلى الإحصائي والفيلسوف الإنجليزي بيز (1701-1761) Thomas Bayes.

٥-٦-٣-١- أمثلة

١- يوجد في عمادة السنة الأولى المشتركة ثلاثة مسارات لتدريس الطلبة هي: الإنساني، العلمي والصحي، فإذا علمنا أن نسبة أعداد الطلبة في هذه المسارات هي 30% و 50% و 20% على الترتيب، وأن نسبة أعداد الطلبة المتميزين في كل من المسارات الثلاثة هو 0.10 و 0.15 و 0.20 على الترتيب، فإذا قمنا بسحب عشوائي لطالب من عمادة السنة الأولى المشتركة، فعندئذ:

أ- ما هو احتمال أن يكون الطالب الذي تم اختياره متميزاً؟

ب- ما هو احتمال أن يكون الطالب الذي تم اختياره من المسار الإنساني إذا وجدنا أنه متميز؟

الإجابة: من أجل الإجابة على هذين السؤالين سنفترض أن Z_1 ، Z_2 و Z_3 هو الحادث الذي يعبر عن كون الطالب الذي تم اختياره من المسار الإنساني، العلمي والصحي على الترتيب، فنجد أن هذه الحوادث الثلاثة تشكل تجزئة للحادث الأكيد Ω (الذي يمثل كل الطلبة في عمادة السنة الأولى المشتركة)، ومن ثم يفرض A هو الحادث الذي يعبر عن كون الطالب الذي تم اختياره من المتميزين، فإنه سيكون لدينا من أجل الطلب:

أ - احتمال أن يكون الطالب الذي تم اختياره متميزاً يساوي (بحسب صيغة الاحتمال التام):

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(Z_i) \cdot P(A | Z_i) \\ = \frac{30}{100} \cdot \frac{10}{100} + \frac{50}{100} \cdot \frac{15}{100} + \frac{20}{100} \cdot \frac{20}{100} = \frac{1450}{10000} = 0.145$$

ب- احتمال أن يكون الطالب الذي تم اختياره من المسار الإنساني إذا وجد أنه متميز (بحسب صيغة بيز في الاحتمالات):

$$P(Z_1 | A) = \frac{P(Z_1) \cdot P(A | Z_1)}{\sum_{i=1}^3 P(Z_i) \cdot P(A | Z_i)} = \frac{30 \cdot 10}{100 \cdot 100} = \frac{1450}{10000} \approx 0.207$$

٢- في مطبعة للكتب توجد أربع آلات للإنتاج L_1, L_2, L_3, L_4 لها القدرة الانتاجية نفسها، ولكن نسبة النسخ المعيبة (غير محققة للمواصفات) في إنتاج هذه الآلات هو 0.01، 0.03، 0.02 و 0.05 على الترتيب. نقوم بسحب عشوائي لنسخة كتاب من الإنتاج الكلي للمطبعة، فعندئذ:

أ - ما هو احتمال أن تكون نسخة الكتاب المسحوبة سليمة؟

ب- إذا وجدنا أن نسخة الكتاب المسحوبة معيبة، فما هو احتمال أن تكون من إنتاج الآلة L_4 ؟

الإجابة: من أجل الإجابة على هذين السؤالين سنفترض أن Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 هو الحادث الذي يعبر عن كون نسخة الكتاب المسحوبة من إنتاج الآلة L_1, L_2, L_3, L_4 على الترتيب، فنجد أن هذه الحوادث تشكل تجزئة للحادث الأكيد (الذي يمثل كل إنتاج المطبعة من الكتب)، وبما أن لجميع الآلات القدرة الانتاجية نفسها فإنه سيكون لدينا:

$$P(Z_1) = P(Z_2) = P(Z_3) = P(Z_4) = \frac{25}{100}$$

ولذلك فمن أجل الطلب:

أ - سنفترض أن:

A - هو حادث سحب نسخة كتاب معيبة من الإنتاج الكلي للمطبعة.

B - هو حادث سحب نسخة كتاب سليمة من الإنتاج الكلي للمطبعة، فنجد أن $B = \bar{A}$.

فعندئذ يكون لدينا $P(B) = 1 - P(A)$ ، ولكن من صيغة الاحتمال التام لدينا:

$$P(A) = \sum_{i=1}^4 P(Z_i) \cdot P(A | Z_i) = \frac{25}{100} \cdot \frac{1}{100} + \frac{25}{100} \cdot \frac{3}{100} + \frac{25}{100} \cdot \frac{2}{100} + \frac{25}{100} \cdot \frac{5}{100} = \frac{275}{10000} = 0.0275$$

ومن ثم يكون:

$$P(B) = 1 - P(A) = 1 - 0.0275 = 0.9725$$

ب- نجد بواسطة صيغة بيز في الاحتمالات أن:

$$P(Z_4 | A) = \frac{P(Z_4) \cdot P(A | Z_4)}{\sum_{i=1}^4 P(Z_i) \cdot P(A | Z_i)} = \frac{25 \cdot 5}{100 \cdot 100} = \frac{275}{10000} = 0.45$$

استقلال الحوادث

Independence of Events

إن مفهوم استقلال الحوادث يُنظر إليه كأحد المفاهيم المهمة في الاحتمالات، ولذلك سنقدمه من خلال دراسة مبسطة فقط ولن نخوض في تفاصيل تقع خارج مستوى هذا الكتاب.

ليكن لدينا تجربة عشوائية بفضاء حوادث ابتدائية Ω منته، ولنأخذ A و B حادثين من 2^Ω ، فإذا كان تحقق وقوع الحادث B لا يؤثر في تحقق وقوع الحادث A ولا بأي شكل من الأشكال، فعندئذ يقال إن الحادث A مستقل عن الحادث B (أو الحادث B مستقل عن الحادث A)، وهذا يعني أنه بفرض $0 < P(B)$ فإن $P(A|B) = P(A)$ ، ومن ثم باستخدام قانون الضرب في الاحتمالات يكون لدينا الآتي محققاً:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B)$$

ومنه ينتج أنه إذا كان الحادث A مستقل عن الحادث B فإن العلاقة الآتية ستكون مُحَقَّقة:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

وبشكل مماثل يكون B مستقل عن A بحسب المفهوم السابق إذا تحققت العلاقة السابقة أيضاً، ونقول حينئذ إن الحادثين A و B مستقلان بعضهما عن البعض الآخر، وهكذا يمكننا أن نصيغ تعريف الاستقلال لحادثين على النحو الآتي.

٥-٧-١- تعريف (استقلال حادثين)

يُقال عن حادثين A و B من 2^Ω إنهما مستقلان بعضهما عن البعض الآخر إذا تحققت من أجلهما العلاقة الآتية:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

[5-16]

٥-٧-٢- ملاحظات

١- إن الحادث الأکید Ω مستقل عن أي حادث آخر A من 2^Ω ، وذلك لأنه من أجل A حادث ما من 2^Ω لدينا العلاقة الآتية مُحَقَّقة دوماً:

$$P(A \cap \Omega) = P(A)$$

$$P(A) \cdot P(\Omega) = P(A) \cdot (1) = P(A)$$

ومن ثم يكون لدينا:

$$P(A \cap \Omega) = P(A) \cdot P(\Omega)$$

٢- بشكل مماثل لما سبق يمكننا صياغة الاستقلال بين ثلاثة حوادث A و B و C من 2^Ω حيث يُقال عن هذه الحوادث إنَّها مستقلة (أو مستقلة عشوائياً Stochastic Independent) إذا تحققت من أجلها جميع العلاقات الآتية:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

٣- إذا كانت العلاقات الثلاث الأولى في الفقرة السابقة مُحَقَّقة، فعندئذ يُقال عن الحوادث A و B و C إنها **مستقلةً مثنى مثنى** Pairwise Independent، وبناءً على ذلك، فإذا كانت الحوادث التي قيد الدراسة ليست مستقلةً مثنى مثنى فإنها لن تكون مستقلةً.

٤- إذا كانت الحوادث التي قيد الدراسة مستقلةً فإنها ستكون مستقلةً مثنى مثنى، ولكن العكس ليس صحيحاً.

٥-٧-٣- أمثلة

١- لنأخذ تجربة إلقاء قطعة نقود متوازنة لثلاث مرات متتالية، وليكن A و B و C هو حادث الحصول على صورة في الرمية الأولى والثانية والثالثة على الترتيب، فعندئذ نجد أن هذه الحوادث مستقلة، وذلك لأنه لدينا:

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$$

$$A = \{HHH, HHT, HTH, HTT\}$$

$$B = \{HHH, HHT, THH, THT\}$$

$$C = \{HHH, HTH, THH, TTH\}$$

ومن ثمَّ يكون لدينا:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(C)$$

$$P(B \cap C) = \frac{1}{4} = P(B) \cdot P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{8} = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

٢- لنفترض أنه لدى طالب مقرَّر دراسي، ويتقدَّم باختبارين لهذا المقرَّر، تحريري أولاً ومن ثمَّ مقابلة، ويمكن له أن يحصل على أحد تقديرين A أو B بالاحتمال نفسه في أي اختبار من الاختبارات التي سيجريها. عندئذ سيُكون لفضاء الحوادث الابتدائية الخاص بهذه المسألة العرض الآتي:

$$\Omega = \{AA, AB, BA, BB\}$$

فإذا أخذنا الحوادث الآتية:

$$A_1 = \{AA, AB\} \quad \& \quad A_2 = \{AA, BA\} \quad \& \quad A_3 = \{AA, BB\}$$

فهل هذه الحوادث مستقلة بعضها عن البعض الآخر؟

الإجابة: للإجابة على هذا السؤال لدينا من معطيات المسألة ما يلي:

$$P(\{AA\}) = P(\{AB\}) = P(\{BA\}) = P(\{BB\}) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{2}$$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3) = \frac{1}{4}$$

وهذا يعني أن الحوادث A_1 ، A_2 و A_3 مستقلة مثنى مثنى، ولكن هذه الحوادث ليست مستقلة عشوائياً وذلك لأن:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(\{AA\}) = \frac{1}{4} \neq P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = \frac{1}{8}$$

٣- لتأخذ تجربة إلقاء حجر نرد متوازن مرتين متتاليتين فقط، ولتأخذ الحوادث الآتية:

$$A = \left\{ (1,1), (1,2), (1,5), (2,1), (2,2), (2,5), (3,1), (3,2), (3,5), (4,1), (4,2), (4,5), (5,1), (5,2), (5,5), (6,1), (6,2), (6,5) \right\}$$

$$B = \left\{ (1,4), (1,5), (1,6), (2,4), (2,5), (2,6), (3,4), (3,5), (3,6), (4,4), (4,5), (4,6), (5,4), (5,5), (5,6), (6,4), (6,5), (6,6) \right\}$$

$$C = \left\{ (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) \right\}$$

فنجد أن هذه الحوادث ليست مستقلة مثنى مثنى وذلك لأن:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

علماً أنه لدينا:

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{36} = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

فيما يلي سنقدّم بعض الخصائص للحوادث المستقلة دون الخوض في إثباتاتها.

٥-٧-٤- بعض خصائص الحوادث المستقلة

ليكن A و B حادثين مستقلين بعضهما عن البعض الآخر من فضاء حوادث ابتدائية Ω ، فعندئذ:

١- يكون الحادثان A و \bar{B} مستقلين بعضهما عن البعض الآخر أيضاً.

٢- يكون الحادثان \bar{A} و B مستقلين بعضهما عن البعض الآخر أيضاً.

٣- يكون الحادثان \bar{A} و \bar{B} مستقلين بعضهما عن البعض الآخر أيضاً.

٥-٧-٥- مثال

لدينا ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية E_1 ، E_2 و E_3 وتعمل كل منها بشكل مستقل عن المحطتين الأخرين، فإذا كان احتمال تعطل هذه المحطات خلال السنة القادمة هو 0.07، 0.05 و 0.03 على الترتيب، فعندئذ:

١- ما هو احتمال عمل المحطات الثلاث خلال السنة القادمة؟

٢- ما هو احتمال عمل المحطة E_2 وتعطل E_1 و E_3 خلال السنة القادمة؟

٣- ما هو احتمال تعطل محطة واحدة على الأكثر خلال السنة القادمة؟

الإجابات: للإجابة على هذه الأسئلة سنفترض أن A_1 ، A_2 و A_3 هو حادث تعطل المحطة E_1 ، E_2 و E_3 خلال السنة القادمة على الترتيب. عندئذ بحسب الفرض ستكون الحوادث A_1 و A_2 و A_3 مستقلة عشوائياً، ومنه يكون لدينا من أجل الطلب:

١- بفرض أن A هو الحادث الذي يُعبر عن عمل المحطات الثلاث خلال السنة القادمة، فإنه سيكون لدينا $A = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3$ ، ومن ثمّ بسبب استقلال الحوادث A_1 و A_2 و A_3 يمكننا أن نكتب الآتي:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) \\ &= 0.93 \times 0.95 \times 0.97 \approx 0.857 \end{aligned}$$

٢- بفرض أن B هو الحادث الذي يُعبر عن عمل المحطة E_2 وتعطل E_1 و E_3 خلال السنة القادمة، فإنه سيكون لدينا $B = A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3$ ، ومن ثمّ بسبب استقلال الحوادث A_1 و A_2 و A_3 يمكننا أن نكتب:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(A_3) \\ &= 0.07 \times 0.95 \times 0.03 = 0.002 \end{aligned}$$

٣- بفرض أن C هو الحادث الذي يُعبر عن تعطل محطة واحدة على الأكثر خلال السنة القادمة، فعندئذ يكون لدينا:

$$C = (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) \cup (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) \cup (A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3)$$

هو الحادث الذي يُعبر عن تعطل محطة واحدة على الأكثر خلال السنة القادمة، فعندئذ بملاحظة أن الحوادث:

$$\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \quad \& \quad \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 \quad \& \quad \bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \quad \& \quad A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3$$

متنافية متنى متنى، وبسبب استقلال الحوادث A_1 و A_2 و A_3 ، ومن ثم استخدام خصائص الحوادث المستقلة، فإنه يمكننا أن نكتب الآتي:

$$\begin{aligned} P(C) &= P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(A_3) \\ &\quad + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \cdot P(\bar{A}_3) + P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) \\ &= 0.93 \times 0.95 \times 0.97 + 0.93 \times 0.95 \times 0.03 \\ &\quad + 0.93 \times 0.05 \times 0.97 + 0.07 \times 0.95 \times 0.97 = 0.99311 \end{aligned}$$





تمارين



- ١- لدينا باب خزانة حديدية مقفل ويفتح بنظام رقمي عشري مكوّن من خمس خانات. عندئذ:
 - أ- إذا كان من الممكن تكرار الرقم، فما هو أكبر عدد من المحاولات اللازمة لفتح هذا الباب؟
 - ب- إذا كان من غير الممكن تكرار الرقم، فما هو أكبر عدد من المحاولات اللازمة لفتح هذا الباب؟
- ٢- بكم طريقة يمكن لستة طلاب الجلوس:
 - أ- على مقعد خشبي مفتوح يتسع لستة أشخاص على الأقل في فصل دراسي؟
 - ب- على طاولة مستديرة حولها ستة كراسي في فصل دراسي؟
- ٣- إذا كانت المدينة A ترتبط بالمدينة B بخمسة طرق مختلفة، وكانت المدينة B ترتبط بالمدينة C بثلاثة طرق مختلفة، بكم طريقة يمكن لشخص السفر من المدينة A إلى المدينة C مروراً بالمدينة B؟
- ٤- تريد مؤسسة تشكيل لجنة مكوّنة من خمسة خبراء لوضع خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة. بكم طريقة يمكن تشكيل هذه اللجنة إذا علمت أن:
 - أ- المؤسسة تحوي 15 خبيراً لهم جميعاً الكفاءة نفسها (أي يمكن لكل منهم أن يقوم بأية مهمة توكل إليه)؟
 - ب- المؤسسة تحوي 15 خبيراً وسوف توكل لكل واحدٍ منهم مهمة خاصة به؟
- ٥- يوجد في إدارة منظّمة اجتماعية تسعة رجال وثمان نساء، وطلب منهم تشكيل وفد لمناظرة تلفزيونية حول هذه المنظّمة وعلى أن يكون الوفد مكوّن من رجلين وثلاث نساءٍ أو ثلاثة رجالٍ وامرأتين. بكم طريقة يمكن اختيار هذا الوفد؟
- ٦- يوجد على قائمة الطعام في مطعم خمسة أصناف من المقبلات واثنتي عشرة صنفاً من الأطعمة وستة أصناف من المشروبات الغازية، بكم طريقة يمكن لزبون أن يختار صنفين من المقبلات وثلاثة أنواعٍ من الأطعمة ومشروبٍ غازيٍّ واحد؟
- ٧- يوجد في صندوقٍ كرتين بيضاويين، كرتين سوداويين وأربع كرات زرقاء. نقوم بسحب ثلاث كراتٍ على التوالي مع الإرجاع (أو الإعادة). عندئذ:
 - أ- إذا كان الحادث A هو الحصول على ثلاثة كرات زرقاء فما هو الحادث \bar{A} ؟
 - ب- إذا كان الحادث B هو حادث الحصول على كرة سوداء في السحب الأول وبيضاء في السحب الثاني، وبفرض أن C هو حادث الحصول على كرة زرقاء في السحب الثالث، فما هو الحادث $B \cup C$ ؟
 - ج- إذا كان الحادث D هو حادث الحصول على كرة سوداء في السحب الأول، وبفرض أن E هو حادث الحصول على كرة زرقاء في السحب الثالث، فما هو الحادث $D \cap E$ ؟
- ٨- لدى أسرة ثلاثة أطفال، فإذا كان لكلٍ منهم النصيب نفسه في الوجود (الولادة)، فما هو احتمال أن يكون:
 - أ- لدى الأسرة ولدين وبنات؟
 - ب- لدى الأسرة ولد واحد على الأقل؟

تمارين

- ٩- يوجد في قسم تسعة أعضاء هيئة تدريس منهم ثلاث إناث، وطلب من القسم تشكيل لجنة علمية من أعضائه مكونة من أربعة أشخاص. فما هو احتمال:
- أ- أن تكون جميع الإناث في هذه اللجنة؟
ب- أن يكون في هذه اللجنة أنثى واحدة على الأقل؟
ج- أن يكون في هذه اللجنة رجل واحد على الأقل؟
- ١٠- خصص مدرب 30 سؤالاً لاختبار الطلاب، وبحيث يقدم لكل طالب خمسة أسئلة تسحب عشوائياً من هذه الأسئلة، فإذا علمت أنه يمكن لطالب X أن يجيب على 16 سؤال من الـ 30 المخصصة للاختبار، فما هو احتمال أن يجيب الطالب على الأسئلة الخمسة في الامتحان؟
- ١١- لنأخذ تجربة قذف قطعة نقود متوازنة مع إلقاء حجر نرد متوازن مرة واحدة. عندئذ عين فضاء الحوادث الابتدائية لهذه التجربة العشوائية، ومن ثم اجب عما يلي:
- أ- احسب احتمال الحصول على صورة وعدد فردي.
ب- احسب احتمال الحصول على شعار وعدد أكبر من 5.
ج- هل حادث الحصول على صورة وعدد فردي مستقل عن حادث الحصول على شعار وعدد زوجي؟
- ١٢- لنأخذ تجربة إلقاء حجر نرد متوازن لمرتين متتاليتين، فعندئذ:
- أ- احسب احتمال أن يكون مجموع الرقمين الظاهرين للأعلى أصغر من 2.
ب- احسب احتمال أن يكون مجموع الرقمين الظاهرين للأعلى أصغر من 13.
ج- احسب احتمال أن يكون الرقمين الظاهرين للأعلى غير متساويين.
د- ما هو احتمال الحصول على رقمين متتاليين؟
هـ- هل حادث الحصول على الرقم 1 في الرمية الأولى مستقل عن حادث الحصول على الرقم نفسه في الرمية الثانية؟
و- لو أخذنا تجربة إلقاء حجري نرد متوازنين ومتمايزين مرة واحدة فقط، فهل تتغير نتائج الطلبات السابقة في هذه المسألة، ولماذا؟
- ١٣- لنأخذ تجربة إلقاء حجري نرد متوازنين ومتماثلين تماماً (غير متميزين) مرة واحدة، فعندئذ اجب عن الأسئلة الآتية:
- أ- احسب احتمال أن يكون مجموع الرقمين الظاهرين للأعلى أكبر من 6.
ب- احسب احتمال أن يكون الرقمين الظاهرين للأعلى متساويين.
ج- ما هو احتمال الحصول على رقمين غير متتاليين؟
د- هل حادث الحصول على الرقم 3 في الرمية الأولى مستقل عن حادث الحصول على الرقم 2 في الرمية الثانية؟

١٤- في صندوق يوجد 6 كرات متماثلة تماماً، منها ثلاث كرات حمراء وكرتان زرقاوين والكرة السادسة خضراء. قمنا بسحب عشوائي لثلاث كرات بأن واحد من هذا الصندوق، والمطلوب:

أ- ما هو احتمال أن تكون الكرات الثلاث من ألوان مختلفة؟

ب- ما هو احتمال أن تكون الكرات الثلاث من لون واحد؟

ج- ما هو احتمال أن يكون لكرتين اللون نفسه والثالثة من لون آخر؟

١٥- يوجد في فصل دراسي لطلاب السنة الأولى المشتركة 21 طالباً منهم خمسة طلاب متميزين، وأردنا تشكيل فريق عمل مكون من ثلاثة طلاب لإدارة شؤون الفصل، فإذا أخذنا عشوائياً ثلاثة طلاب دفعة واحدة من هذا الفصل، فعندئذ:

أ- ما هو احتمال أن يكون في هذا الفريق طالب متميز واحد فقط؟

ب- ما هو احتمال أن يكون جميع عناصر الفريق من الطلاب المتميزين؟

١٦- لنفرض أنه لدينا صندوقان I و II يحويان كرات متماثلة بألوان مختلفة، وبحيث يحوي الصندوق الأول I على كرتين بيضاويين وكرة سوداء بينما يحوي الصندوق الثاني II كرة بيضاء وكرة سوداء وكرة زرقاء. الآن نقوم بخلط الكرات في الصندوق الأول جيداً ومن ثمَّ نسحب (سحب عشوائي) كرة من هذا الصندوق ونضعها في الصندوق الثاني دون رؤيتها، وبعد ذلك نقوم بخلط الكرات في الصندوق الثاني جيداً ومن ثمَّ نسحب كرة من هذا الصندوق. عندئذٍ لنحسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة أخيراً ذات لون أسود.

١٧- لدينا ثلاثة صناديق بحيث يحوي الصندوق الأول أربع كرات حمراء وثلاث كرات سوداء بينما يحوي الثاني على ثلاث كرات حمراء وخمس كرات بيضاء، وأخيراً يحوي الصندوق الثالث على ثلاث كرات سوداء وثلاث كرات بيضاء. الآن بفرض أن لكل صندوق النصيب نفسه في السحب وأن جميع الكرات متماثلة تماماً (ومن ثمَّ لها النصيب نفسه في الاختيار)، وأننا قمنا بسحب عشوائي لصندوق من هذه الصناديق، ومن ثمَّ سحب كرة من هذا الصندوق، فعندئذ:

أ - ما هو احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء؟

ب- إذا علمنا أن الكرة المسحوبة كانت بيضاء، فما هو احتمال أن تكون هذه الكرة قد سُحبت من الصندوق الثاني؟

١٨- في مصنع لإنتاج المصابيح الكهربائية يوجد ثلاثة خطوط للإنتاج L_1 ، L_2 و L_3 بحيث تنتج هذه الخطوط 50 %، 30 % و 20 % على الترتيب من نسبة الإنتاج الكلي للمصنع، ونسبة المعطل في إنتاج هذه الخطوط على الترتيب هو 0.03، 0.02 و 0.01. الآن نقوم بسحب عشوائي لمصباح من الإنتاج الكلي للمصنع، فما هو احتمال أن يكون:

أ - المصباح المسحوب سليماً؟

ب- المصباح المسحوب من إنتاج الخط الأول إذا علمنا أنه وجد معطلاً؟

تمارين

١٩- إذا كان A و B حادثين من فضاء حوادث ابتدائية Ω ، علماً أن:

$$P(A) = 0.4 \quad , \quad P(B) = 0.5 \quad \text{and} \quad P(A \cap B) = 0.4$$

عندئذٍ أي من القيم الآتية هي $P(A \cup B)$ ؟

- A) 0.3 B) 0.2 C) 0.5 D) 0.1

٢٠- إذا كان $\Omega = \{E_1, E_2, E_3\}$ فضاء حوادث ابتدائية، وكان لدينا $P(E_1) = P(E_3) = 0.30$ ، فعندئذٍ

أي من القيم الآتية تساوي $P(E_2)$ ؟

- A) 0.04 B) 0.40 C) 0.41 D) 0.30

٢١- إذا كان A و B حادثين من فضاء حوادث ابتدائية Ω بحيث أن $P(A) = 0.6$ و $P(B \cap A) = 0.3$.

عندئذٍ أي من القيم الآتية تساوي $P(A \setminus B)$ ؟

- A) 0.30 B) 0.03 C) 0.50 D) 0.05

٢٢- إذا كان A و B حادثين مستقلين من فضاء حوادث ابتدائية Ω بحيث أن $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.1$.

عندئذٍ أي من القيم الآتية تساوي $P(A \cap B)$ ؟

- A) 0.04 B) 0.40 C) 0.10 D) 0.004

٢٣- إذا كان A و B حادثين من فضاء حوادث ابتدائية Ω بحيث أن $P(A) = P(B) = 0.495$ و

$P(A \cap B) = 0.09$. عندئذٍ أي من القيم الآتية تساوي $P(A \cup B)$ ؟

- A) 0.50 B) 0.51 C) 0.90 D) 0.001

٢٤- صندوق يحتوي على 15 كرة متماثلة تماماً منها 5 حمراء، 4 زرقاء، و 6 خضراء. إذا سحب كرة بشكل

عشوائي من الصندوق، فما هو احتمال أن يكون لونها أزرق أو أحمر؟


- A) 4/15 B) 6/15 C) 9/15 D) 5/15

٢٥- إذا استخدمت جميع حروف OKLAH في تكوين كلمة، فكم كلمة يمكن تكوينها من هذه الأحرف؟

- A) 100 B) 120 C) 80 D) 166

الفصل السادس

المتغيرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية Random Variable and their Probability Distributions



المقدمة:

لقد قدمنا في الفصل السابق مفهوم الدالة الاحتمالية وبعض خصائصها، ومن ثم تناولنا كيفية حساب احتمالات بعض الحوادث المتعلقة بتجربة عشوائية ذات عدد منتهٍ من النتائج، وبعد ذلك تطرقنا (وبشكل مبسط) إلى الاحتمال الشرطي وبعض خصائصه، وأخيراً خُتِمَ الفصل بعرض مفهوم الاستقلال لعددٍ منتهٍ من الحوادث (حتى ثلاثة حوادث). لكن يصادفنا في كثير من مسائل الاحتمالات طروحات تجعل من اهتمامنا بالحوادث الابتدائي منفرداً ليس مرغوباً ويكون تركيزنا منصباً على الخصائص التي يحملها الحادث الابتدائي، بمعنى أننا لا نهتم أي حادثٍ ابتدائي سنأخذ وإنما المهم إن كان الحادث الابتدائي يتمتع بصفات معينة أم لا. إن هذه المسائل تترافق عادةً مع مفهوم المتغير العشوائي والذي سيكون محور دراستنا لهذا الفصل.

- ٦ - ١ - المتغيرات العشوائية
- ٦ - ٢ - دالة التوزيع لمتغير عشوائي
- ٦ - ٣ - المتغيرات العشوائية المتقطعة
- ٦ - ٤ - المتغيرات العشوائية المستمرة

المتغيرات العشوائية

Random Variables

من أجل توضيح مفهوم المتغير العشوائي سنقدم المثال الآتي.

٦-١-١-١ مثال

لنأخذ تجربة قذف قطعة نقود لمرتين متتاليتين، فعندئذ سيكون لفضاء الحوادث الابتدائية لهذه التجربة العشوائية العرض الآتي:


$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$$

فلو افترضنا أن A هو حادث حصولنا على صورة واحدة على الأقل خلال الرميّتين، فعندئذ يكون:

$$A = \{HH, HT, TH\}$$

حيث نلاحظ أنه لا أهمية لموضع الصورة خلال الرميّتين، وهذا يعني أننا لم نعد نهتم في أية رميّة من هاتين الرميّتين سنحصل على الصورة وإنما الذي يهمنا حقاً هو إن كنا سنحصل في نهاية الرميّتين على صورة واحدة على الأقل، ولذلك دراسة كل حادث ابتدائي ω من Ω لم تعد مهمة بالنسبة لنا في هذه التجربة.

الآن لو أمعنا النظر في مكونات الحادث A ، فإنّه قد يتبادر إلى ذهننا فكرة استخدام الأعداد للتعبير عن الحادث A وذلك من خلال عملية إرفاق كل حادث ابتدائي ω من Ω بعدد يعبر عن عدد الصور في هذا الحادث الابتدائي (انظر الشكل [6-1]).



الشكل [6-1]

إنّ عملية الإرفاق هذه ما هي إلا علاقة (وتدعى تطبيقاً أيضاً) X معرفة على Ω وتأخذ قيمها في مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} كما يوضّحه الشكل [6-1]، وأكثر من ذلك فإنّ هذه العلاقة وحيد القيمة ومعينة بشكل وحيد وفقاً للطريقة التي قدّمت بها، وهذا يعني أنّ العلاقة X هي دالة حقيقية معرفة على فضاء الحوادث الابتدائية Ω .

الآن لو رمزنا لمجموعة قيم الدالة X بـ Ω^* ، فعندئذ سيكون لدينا $\Omega^* = \{0, 1, 2\}$ ، ونلاحظ هنا أنّ كل عنصر من المجموعة Ω^* هو من جديد حادث ابتدائي لأن ظهور القيم 0 و 1 و 2 في Ω^* سيكون عشوائياً، وعشوائيتها تنتج من عشوائية الحوادث الابتدائية في Ω .

في الحقيقة يوجد شرط هام جداً يجب تحقيقه من قبل الدالة X ، وبدونه لا يمكن القبول بعشوائية قيم هذه الدالة أبداً. إنّ هذا الشرط ينصّ على أن تكون الصورة العكسية لأيّ حادث مكون من عناصر Ω^* هو حادث في Ω أيضاً، وهذا يعني أنه من أجل أي حادث B من 2^{Ω^*} فإن $X^{-1}(B)$ يجب أن يكون حادثاً من 2^{Ω} .

إذاً، فلو أردنا التَّحَقُّقَ من عشوائية قيم الدالة X في مثالنا المقدم أعلاه علينا إثبات أنه من أجل أي حدث B من 2^{Ω^*} فإن $X^{-1}(B)$ هو حدث من 2^{Ω} ، وللبحث في ذلك لدينا من الفصل السابق:

$$2^{\Omega} = \left\{ \begin{array}{l} \emptyset, \{HH\}, \{HT\}, \{TH\}, \{TT\}, \{HH, HT\}, \{HH, TH\}, \\ \{HH, TT\}, \{HT, TH\}, \{HT, TT\}, \{TH, TT\}, \{HH, HT, TH\}, \\ \{HH, HT, TT\}, \{HH, TH, TT\}, \{HT, TH, TT\}, \\ \{HH, HT, TH, TT\} = \Omega \end{array} \right\}$$

ومن أجل Ω^* نجد أن:

$$2^{\Omega^*} = \left\{ \emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\} = \Omega^* \right\}$$

ومن ثم يكون:

$$\begin{array}{ll} X^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in 2^{\Omega} & \text{من أجل } B = \emptyset \text{ لدينا:} \\ X^{-1}(\{0\}) = \{TT\} \in 2^{\Omega} & \text{من أجل } B = \{0\} \text{ لدينا:} \\ X^{-1}(\{1\}) = \{HT, TH\} \in 2^{\Omega} & \text{من أجل } B = \{1\} \text{ لدينا:} \\ X^{-1}(\{2\}) = \{HH\} \in 2^{\Omega} & \text{من أجل } B = \{2\} \text{ لدينا:} \\ X^{-1}(\{0,1\}) = \{TT, HT, TH\} \in 2^{\Omega} & \text{من أجل } B = \{0,1\} \text{ لدينا:} \\ X^{-1}(\{0,2\}) = \{TT, HH\} \in 2^{\Omega} & \text{من أجل } B = \{0,2\} \text{ لدينا:} \\ X^{-1}(\{1,2\}) = \{HT, TH, HH\} \in 2^{\Omega} & \text{من أجل } B = \{1,2\} \text{ لدينا:} \\ X^{-1}(\Omega^*) = \{HH, HT, TH, TT\} = \Omega \in 2^{\Omega} & \text{من أجل } B = \{0,1,2\} = \Omega^* \text{ لدينا:} \end{array}$$

وهذا يعني أن الشرط المذكور أعلاه مُحَقَّقٌ من أجل الدالة X ، ومن ثم X هي متغير عشوائي حقاً.



تجدر الإشارة هنا إلى أن احتمال أن يأخذ التطبيق X قيمة من قيمه ليست بالضرورة أن تكون متساوية من أجل القيم المختلفة لـ X حتى لو كان لجميع الحوادث الابتدائية الاحتمال نفسه، فعلى سبيل المثال لو كانت قطعة النقود متوازنة فعندئذٍ يلاحظ أن احتمال أن تأخذ X إحدى قيمها مرتبطة بعدد الحوادث الابتدائية الناتجة عنها في Ω ، ومن ثم يكون لدينا ما يلي (حيث لجميع عناصر Ω النصيب نفسه في الظهور):

$$P(\{\omega \in \Omega ; X(\omega) = 0\}) = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$P(\{\omega \in \Omega ; X(\omega) = 1\}) = \frac{2}{4} = 0.5$$

$$P(\{\omega \in \Omega ; X(\omega) = 2\}) = \frac{1}{4} = 0.25$$

إنَّ العلاقات (أو الدوال) التي تُحقَّق مثل هذه الخاصية تُدعى متغيرات عشوائية، وأصل التسمية تعود إلى كون القيم التي تأخذها X هي قيم عشوائية، وأمَّا التعريف الرياضي لهذا المفهوم فتقدمه لنا الفقرة الآتية.

٦-١-٢- تعريف المتغير العشوائي

لتكن Ω مجموعة نتائج تجربة عشوائية (منتهية النتائج)، ولتكن X علاقة حقيقية معرفة على Ω بمجموعة قيم Ω^* ، فإذا كان من أجل أي حدث B من 2^{Ω^*} لدينا $X^{-1}(B)$ هو حادث من 2^{Ω} ، فعندئذ يُقال عن العلاقة X إنها متغير عشوائي على Ω .

٦-١-٣- ملاحظات

١- فيما يلي سنستخدم في دراستنا علاقات دالية حقيقية فقط، ولذلك ستكون جميع المتغيرات العشوائية التي سنتعامل معها هي دوال حقيقية.

٢- في الجوانب التطبيقية يُعدُّ تحقيق الشرط المذكور في متن التعريف السابق ليس سهلاً في كثير من الحالات، ولذلك قُدمت اختبارات لتحديد ما إذا كانت الدالة X على Ω هي متغير عشوائي أم لا، ومن أجل الحالة التي تكون فيها Ω منتهية يمكن اعتماد الاختبار الآتي:

تكون الدالة X متغيراً عشوائياً على Ω إذا كانت المجموعة $\{\omega \in \Omega ; X(\omega) \leq x\}$ هي حادث من 2^{Ω} وذلك عندما تسمح x كل القيم الممكنة لها في \mathbb{R} ، فعلى سبيل المثال لو عدنا إلى المثال السابق فإننا نجد ما يلي:

$$\{\omega \in \Omega ; X(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset & \text{for } x < 0 \\ \{TT\} & \text{for } 0 \leq x < 1 \\ \{TT\} \cup \{TH, HT\} = \{TT, TH, HT\} & \text{for } 1 \leq x < 2 \\ \{TT\} \cup \{TH, HT\} \cup \{HH\} = \{TT, TH, HT, HH\} = \Omega & \text{for } x \geq 2 \end{cases}$$

حيث نعلم أنَّ \emptyset و Ω هي عناصر من 2^{Ω} دوماً، ولدينا $\{TT\}$ و $\{TT, TH, HT\}$ عناصر من 2^{Ω} أيضاً، وهذا يعني أنَّ الدالة X المعطاة في المثال السابق هي متغير عشوائي على Ω .

٣- في إطار دراستنا في هذا الكتاب لن نتطرق إلى تحقيق الدالة X للشرط المذكور في متن التعريف السابق وذلك لأننا سنتعامل مع دوال تكون مُحققة لهذا الشرط دائماً.

٦-١-٤- مثال

١- لنأخذ تجربة إلقاء حجر نرد متوازن مرتين متتاليتين، وليكن X متغيراً عشوائياً يرفق كل حادث ابتدائي (i, j) بعدد يساوي مجموع المركبتين i و j ، والمطلوب الإجابة على الأسئلة الآتية:

- أ- ما هو احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي X القيمة 1 ؟
 ب- ما هو احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي X قيمة أصغر من 4 ؟
 ج- ما هو احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي X قيمة أكبر أو يساوي 10 ؟
الإجابات: نلاحظ هنا أن مجموعة تعريف المتغير العشوائي X هي:

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), \\ (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \end{array} \right\}$$

وأما مجموعة قيمه فهي $\Omega^* = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ ، ومن ثم يكون لدينا من أجل الطلب:

$$P(\{(i, j) \in \Omega \mid X((i, j)) = 1\}) = P(\{\}) = P(\emptyset) = 0$$

ب- الاحتمال المطلوب هو:

$$P(\{(i, j) \in \Omega \mid X((i, j)) < 4\}) = P(\{(1,1), (1,2), (2,1)\}) = \frac{3}{36} = 0.08\bar{3}$$

ج- الاحتمال المطلوب هو:

$$P(\{(i, j) \in \Omega \mid X((i, j)) \geq 10\}) = \\ = P(\{(4,6), (5,5), (6,4), (6,5), (5,6), (6,6)\}) = \frac{6}{36} = 0.1\bar{6}$$

٦-١-٥- ملاحظات

١- على سبيل الاختصار والتبسيط يكتب في مجال الدراسات الاحتمالية (وفي معظم الحالات) ما يلي:

$$P(X = x) \text{ عوضاً عن } P(\{\omega \in \Omega ; X(\omega) = x\})$$

$$P(X < x) \text{ عوضاً عن } P(\{\omega \in \Omega ; X(\omega) < x\})$$

وبالمثل عند استخدام بقية المتباينات الممكنة \leq ، $>$ و \geq ، وعندما نكتب الصيغة المفصلة فإنه سيكون من باب التذكير بها أو لضرورة تملئها طبيعة عرض العلاقة التي قيد الدراسة.

٢- لكي نتجنب سوء الفهم الذي يمكن أن ينشأ عن مصطلح المتغير العشوائي كدالة نود أن نشير هنا إلى أن المتغير العشوائي X كدالة إنما يعني أنه لدى متغيرات مستقلة ω من Ω مُعطاة تكون القيم $X(\omega)$ وحيدة التعيين، وأن قبول هذه الدالة كمتغير عشوائي يتوقف على اختيار المتغيرات المستقلة ω من Ω .

6-1-6- أمثلة

١- ليكن Ω فضاء الحوادث الابتدائية لرمي مكعب (كحجر النرد) دون على كل وجه من وجوه الستة أحد الأرقام 123، 132، 213، 231، 312، 321، أي أن:

$$\Omega := \{\underbrace{123}_{\omega_1}, \underbrace{132}_{\omega_2}, \underbrace{213}_{\omega_3}, \underbrace{231}_{\omega_4}, \underbrace{312}_{\omega_5}, \underbrace{321}_{\omega_6}\}$$

والآن لنأخذ X دالة حقيقية معرفة على Ω بحيث تقرب كل حادث ابتدائي ω_i بعدد يساوي مجموع الأعداد المكونة لهذا الحادث الابتدائي، أي أن:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} ; \omega_i \mapsto X(\omega_i) = 6 ; i = 1, 2, \dots, 6$$

عندئذ نجد أن هذه الدالة هي متغير عشوائي وذلك لأن:

$$\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset & \text{for } x < 6 \\ \{123, 132, 213, 231, 312, 321\} = \Omega & \text{for } x \geq 6 \end{cases}$$

حيث نعلم أن كلاً من \emptyset و Ω هي عناصر من 2^Ω دوماً.

إن هذا المتغير العشوائي هو أبسط أنواع المتغيرات العشوائية على الإطلاق، ويقال عنه إنه خاضع للتوزيع وحيد النقطة ب معلمة $c = 6$. أي أن لتوزيع هذا المتغير العشوائي معلمة وحيدة هي القيمة c التي يأخذها هذا المتغير العشوائي، ونلاحظ هنا أن:

$$P(X = c) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = c\}) = P(\Omega) = 1$$

٢- ليكن $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ فضاء الحوادث الابتدائية لتجربة رمي قطعة نقود لمرتين متتاليتين، و لنأخذ X دالة حقيقية معرفة على Ω من خلال العلاقة الآتية:

$$X(\omega) = \begin{cases} -1 & \text{for } \omega = HH, HT, TH \\ 2 & \text{for } \omega = TT \end{cases}$$

فنجذ أن:

$$\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset & \text{for } x < -1 \\ \{HH, HT, TH\} & \text{for } -1 \leq x < 2 \\ \{HH, HT, TH, TT\} = \Omega & \text{for } x \geq 2 \end{cases}$$

ولكن نعلم أن $\{HH, HT, TH\}$ ، \emptyset و Ω هي عناصر من 2^Ω دوماً، وهذا يعني أن الدالة X هي متغير عشوائي على Ω ، ويقال عن هذا المتغير العشوائي (الذي يمكن له أن يأخذ إحدى قيمتين فقط) إنه خاضع للتوزيع ثنائي النقطة في $x_1 = 2$ و $x_2 = -1$ بمعلمة p . إن قيمة المعلمة p هي قيمة الاحتمال $P(X = x_1)$ والذي يدعى احتمال النجاح، وفي الحالة الخاصة عندما يصبح لدينا $x_1 = 1$ و $x_2 = 0$ فإنه يقال عن هذا المتغير العشوائي إنه برنولي، وذلك نسبة إلى الرياضياتي السويسري يعقوب برنولي (1655-1705) Jacob Bernoulli الذي كان أول من قدم دراسة رياضية متقنة لهذه المسألة.

٦-١-٧- ملاحظة

- قياساً على المثال الأخير في الفقرة السابقة يُقال عن كل تجربة عشوائية تتمخض عنها إحدى نتيجتين فقط إنها تجربة برنولية، فعلى سبيل جميع التجارب الآتية تُصنّف تجارب برنولية:
- رمي قطعة نقود لمرة واحدة (فتكون النتيجة: صورة أو شعار).
 - إطلاق رمية على هدف من قبل شخص ما (فتكون النتيجة: إصابة أو عدم الإصابة).
 - تقديم طالب إلى اختبار (فتكون النتيجة: نجاح أو رسوب).
 - تطبيق عقار دوائي على مريض (فتكون النتيجة: الدواء فعال أو غير فعال).
 - تحليل عقار دوائي (فتكون النتيجة: مطابق للمواصفات أو غير مطابق للمواصفات).
- وهكذا دواليك.

٢-٦ دالة التوزيع لمتغير عشوائي

Distribution Function of a Random Variable

في كثير من الحالات، وخاصة لدى الجوانب التطبيقية والعملية، لا يظهر فيها المتغير العشوائي بشكله الصريح، ولذا يستعاض عنه بتقديم ما يُعرف باسم **دالة توزيع** Distribution Function للمتغير العشوائي، ويطلق عليها البعض اسم "**دالة التوزيع التراكمية**" أيضاً، وهذه الدالة تساعدنا في حساب احتمالات متعلقة بمتغير عشوائي. إنَّ التعريف لهذا المفهوم تقدمه لنا الفقرة الآتية.

٦-٢-١-١ تعريف (دالة توزيع متغير عشوائي)

ليكن X متغيراً عشوائياً على فضاء حوادث ابتدائية Ω ، ولنعرّف من أجل هذا المتغير العشوائي دالة حقيقية F_X على \mathbb{R} من خلال العلاقة الآتية:


$$F_X : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto F_X(x) := P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}) \quad [6-3]$$

عندئذٍ تُدعى F_X **دالة التوزيع الاحتمالية** للمتغير العشوائي X ، وعلى سبيل التبسيط والاختصار يُقال **دالة التوزيع** للمتغير العشوائي X .

٦-٢-٢-٢ ملاحظات

- ١- كما هو واضح من هذا التعريف فإنَّ مجموعة قيم دالة التوزيع F_X هي الفترة $[0, 1]$.
- ٢- إذا حصل لبيان دالة التوزيع F_X انقطاع في موضع x من \mathbb{R} فإنَّها تقوم بقفزة نحو الأعلى عند هذه النقطة (انظر الشكل [6-2])، ونشير هنا إلى أنَّ الدائرة المغلقة على الرسم البياني للدالة F_X عند النقطة x تدلُّ على قيمة الدالة F_X عند هذه النقطة، بينما يدلُّ رأس السهم في الرسم البياني للدالة F_X على قيمة الدالة F_X عند أول قيمة $x > x_0$.



الشكل [6-2]

- ٣- إذا كانت F_X دالة توزيع متغير عشوائي X معرف على فضاء حوادث ابتدائية Ω ، فعندئذٍ من أجل $-\infty < a < b < +\infty$ تكون العلاقة الآتية مُحَقَّقة:

$$\mathbf{P}(a < X \leq b) = \mathbf{P}(X \leq b) - \mathbf{P}(X \leq a) = \mathbf{F}_X(b) - \mathbf{F}_X(a) \quad [6-4]$$


وهذه العلاقة تساعدنا في حساب احتمالات متعلقة بالمتغير العشوائي X إذا كانت دالة توزيعه معلومة.

٦-٢-٣- أمثلة

١- بالعودة إلى المثال (١) من (٦-١-٦) حيث لدينا X متغير عشوائي معرف على Ω من خلال العلاقة $X(\omega) = c$ مع c ثابت عددي، فنعدّد نجد أنّ دالة توزيع هذا المتغير العشوائي هي:

$$\mathbf{F}_X(x) = \mathbf{P}(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < c \\ 1 & \text{for } x \geq c \end{cases}$$

وذلك لأنّه لدينا $\mathbf{P}(\emptyset) = 0$ و $\mathbf{P}(\Omega) = 1$ ، وأما رسمها البياني فله العرض الآتي:



الشكل [6-3] (الرسم البياني لدالة توزيع المتغير العشوائي X)

حيث نلاحظ أنّ لها قفزة واحدة نحو الأعلى عند النقطة c ، وكذلك يُلاحظ أنّ لهذه الدالة شكل درجة السلالم، ولذلك يُقال عن هذا النوع من الدوال إنّها دالة درجيّة، وبما أنّ لها قفزة واحدة فقط عند c فهي أبسط دالة درجية على الاطلاق (درجة واحدة فقط).

فلو أخذنا $c = 1.5$ في هذا المثال، وأردنا حساب $\mathbf{P}(-2 < X \leq 0.5)$ و $\mathbf{P}(0.7 < X \leq 3)$ (على سبيل

المثال)، فإنّنا نجدهما باستخدام العلاقة [6-4] يساويان:

$$\mathbf{P}(0 < X \leq 0.5) = \mathbf{P}(X \leq 0.5) - \mathbf{P}(X \leq 0) = \mathbf{F}_X(0.5) - \mathbf{F}_X(0) = 0 - 0 = 0$$

$$\mathbf{P}(0.75 < X \leq 3) = \mathbf{P}(X \leq 3) - \mathbf{P}(X \leq 0.75) = \mathbf{F}_X(3) - \mathbf{F}_X(0.75) = 1 - 0 = 1$$

٢- بالرجوع إلى المثال (٢) من (٦-١-٦)، فإذا افترضنا أنّ قطعة النقود متوازنة، وأنّ الحصول على شعارين هو النجاح (أي أنّ يأخذ X القيمة 2)، فإنّه سيكون لدينا بسبب توازن قطعة النقود ما يلي:


$$p = \mathbf{P}(X = 2) = \mathbf{P}(\{TT\}) = \frac{1}{4}$$

ومن ثمّ نجد لدالة توزيع هذا المتغير العشوائي العرض الآتي:

$$\mathbf{F}_X(x) = \mathbf{P}(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < -1 \\ 3/4 & \text{for } -1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{for } x \geq 2 \end{cases}$$

وذلك لأنه لدينا $P(\emptyset) = 0$ و $P(\{HH, HT, TH\}) = \frac{3}{4}$ و $P(\Omega) = 1$ وبالتالي يكون لدالة توزيع

هذا المتغير العشوائي العرض البياني الآتي:




الشكل [4-6] (الرسم البياني لدالة توزيع المتغير العشوائي X)

حيث نلاحظ أن لهذه الدالة شكل دالة دَرَجِيَّة بقفزتين (درجتين) أيضاً، فلو أردنا (على سبيل المثال) حساب $P(-2 \leq X < 1)$ ، فإننا نجد باستخدام العلاقة [4-6] ما يلي:

$$P(-2 < X \leq 1) = F_X(1) - F_X(-2) = 0.75 - 0 = 0.75$$

٦-٢-٤- ملاحظة

توجد متغيرات عشوائية لها دوال توزيع مستمرة (أو متصلة، أي الخط البياني لدالة التوزيع مستمر ولا انقطاع فيه) على \mathbb{R} بأكملها كما في الشكل الآتي:



الشكل [5-6]

وبناءً على ذلك يوجد نوعين على الأقل من المتغيرات العشوائية. أحدها له دوال توزيع دَرَجِيَّة، والآخر له دوال توزيع مستمرة، ومن ثمَّ يمكننا أن نذكر تصنيفين على الأقل للمتغيرات العشوائية وهما:

- المتغيرات العشوائية المتقطعة (الرسم البياني لدوال توزيعها على شكل درجات السلالم).
- المتغيرات العشوائية المستمرة (الرسم البياني لدوال توزيعها خطوط متصلة وليس فيها قفزات).

سنقوم في الفقرة التالية بتقديم دراسة مبسطة عن كل نوع من هذين النوعين، وسنبداها بالمتغيرات العشوائية المتقطعة.

المتغيرات العشوائية المتقطعة

Discrete Random Variables

سنبدأ دراسة المتغير العشوائي المتقطع بتقديم تعريفه ودالة توزيعه على النحو الآتي.

١-٣-٦- تعريف (المتغير العشوائي المتقطع)

ليكن X متغيراً عشوائياً على فضاء حوادث ابتدائية Ω ، فإذا كانت مجموعة قيم X منتهية أو غير منتهية ولكن قابلة للعد، فعندئذ يُقال عن المتغير العشوائي X إنه متقطع.

٦-٣-٢- أمثلة

١- ترد طلبات إلى موظف بشكل مستقل كل منها عن الأخرى، فإذا كانت الطلبة مستكملة للشبوتيات المطلوبة فإنه يستقبل الطلبة التي تليها، وهكذا على هذا النحو إلى أن تصله طلبية ليست مستكملة الشبوتيات فيتوقف عن استلام أية طلبية أخرى في ذلك اليوم. فإذا علمت أنه يمكن أن يرد في اليوم الواحد 100 طلبية على الأكثر، وأن احتمال أن تكون أية طلبية مستكملة للشبوتيات يساوي 0.95، فما هو احتمال أن يمتنع الموظف عن استلام الطلبة الثامنة ؟

الإجابة: لنفترض أن X متغير عشوائي يرصد عدد الطلبات المستلمة حتى الحصول على أول طلبية غير مستكملة الشبوتيات، فعندئذ نجد أن هذا المتغير العشوائي متقطع لأن عدد القيم التي يمكن له أن يأخذها منته (القيم هي 1، 2 و... و100)، ومن ثم يمكن التعبير عن الاحتمال المطلوب من خلال الاحتمال $P(X = 7)$.

من جهة أخرى نلاحظ أن كل عملية تدقيق للطلبية هي تجربة برنولية (مستكملة الشبوتيات أو غير مستكملة الشبوتيات) فيها احتمال النجاح $p = 0.05$. في هذه المسألة لدينا النجاح هو الحصول على طلبية غير مستكملة الشبوتيات لأنها هي التي ستقرر التوقف عن الاستلام (ولكن هذا ليس شرطاً ملزماً، فمن الممكن أن نأخذ الحصول على طلبية مستكملة الشبوتيات هو النجاح أيضاً). كذلك نلاحظ أن هذه التجارب تتم بشكل مستقل كل منها عن الأخرى (لأنه لا يعلم شيئ عن طبيعة الطلبية المقدمة)، ومن ثم يكون احتمال التوقف عن استلام الطلبة الثامنة هو احتمال وصول ست طلبيات مستكملة الشبوتيات والسابعة غير مستكملة للشبوتيات، ومن ثم بحسب قاعدة الضرب (في العد) يكون الاحتمال المطلوب هو:

$$(1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot p$$

وهي حالة في الحساب لا ثانية لها (أي لا تتم إلا بهذا التسلسل)، وبالتالي يمكننا أن نكتب:

$$\begin{aligned} P(X = 7) &= (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot p = (1 - p)^6 \cdot p \\ &= (0.05)^6 \cdot (0.95) = 0.000000015 \end{aligned}$$

إن المتغير العشوائي المتقطع الذي يتميز بالعلاقة:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p \quad ; k = 1, 2, 3, \dots$$

يُسمى متغيراً عشوائياً هندسياً Geometric Random Variable بمعلّمة p ، علماً أنّ $0 < p < 1$ ، وأنّ القيم التي يأخذها هذا المتغير العشوائي هي قيم صحيحة موجبة تماماً وعددها قد يكون غير منتهٍ ولكن قابل للعدّ على الأكثر، وبناءً على هذا فإنّ المتغير العشوائي X في مثالنا هذا هو من المتغيرات العشوائية الشهيرة، وله توزيع هندسي بمعلّمة $p = 0.05$.

٢- يوجد 20 قضية في إحدى المحاكم منها 7 قضايا اقتصادية (قضايا تتعلق بالاقتصاد). قام أحد القضاة بسحب عشوائي لخمس قضايا منها دفعة واحدة من أجل دراستها، فإذا علمت أنّ لجميع القضايا النصيب نفسه في السحب (أو الاختيار)، فما هو احتمال أن يكون لدى هذا القاضي ثلاث قضايا اقتصادية؟

الإجابة: لنفترض أنّ X متغير عشوائي راصد لعدد قضايا الاقتصاد في القضايا التي سُحبت، فعندئذ نجد أنّ هذا المتغير العشوائي متقطع لأنّ القيم التي يمكن له أن يأخذها ست فقط (وهي 0، 1، 2، 3، 4 و5)، ومن ثمّ يمكننا أن نعبر عن الاحتمال المطلوب من خلال الاحتمال $P(X = 3)$.

من جهة أخرى نلاحظ هنا أنّ عمليات السحب ليست تجارب برنولية (لأنّ السحب يتمّ على دفعة واحدة)، ولكن نلاحظ إمكانية تطبيق مبدأ لابلاس في الاحتمالات من أجل حساب الاحتمال المطلوب، حيث لدينا عدد الحالات الملائمة لحادث وجود ثلاث قضايا اقتصادية من القضايا الخمس التي سُحبت يساوي $(13C2) \cdot (7C3)$ ، وأمّا عدد الحالات الممكنة للتجربة فإنّه يساوي $(20C5)$ ، ومن ثمّ يكون (بحسب مبدأ لابلاس في الاحتمالات) الاحتمال المطلوب هو:

$$P(X = 3) = \frac{(7C3) \cdot (13C2)}{(20C5)} = \frac{\binom{7}{3} \cdot \binom{13}{2}}{\binom{20}{5}} = \frac{\binom{7}{3} \cdot \binom{20-7}{5-3}}{\binom{20}{5}} = \frac{(35) \cdot (78)}{15504} = 0.176$$

إنّ المتغير العشوائي الذي يتميّز بالعلاقة الآتية:

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \quad ; k = 0, 1, 2, \dots, \min\{n, M\}$$

يُسمى متغيراً عشوائياً فوق هندسي Hypergeometric Random Variable بمعالم N و M و n ، علماً أنّ N و M و n أعداد طبيعية محدودة مع $1 \leq M < N$ و $1 \leq n \leq N$ ، والقيم x_i التي يأخذها X هي قيم صحيحة غير سالبة، وهذا يعني أنّ المتغير العشوائي X في مثالنا هذا هو من المتغيرات العشوائية الشهيرة أيضاً، وله توزيع فوق هندسي بمعالم $N = 20$ ، $M = 7$ و $n = 5$.

٣- يقوم شخص بالرمي على هدف دون أي يعلم نتيجة إصابته للهدف، فإذا علمت أن احتمال إصابته للهدف في أية رمية تساوي 0.85، وأنه أطلق على الهدف 3 رميات، فما هو احتمال أن يكون قد أصاب برميتين منها؟

الإجابة: لنفترض أن X هو متغير عشوائي يرصد عدد الإصابات خلال الرميات الثلاث، فعندئذ نجد أن هذا المتغير العشوائي متقطع لأن القيم التي يمكن له أن يأخذها أربع فقط (وهي 0، 1، 2 و3)، ومن ثم يمكن التعبير عن الاحتمال المطلوب من خلال الاحتمال $P(X = 2)$.

من جهة أخرى نلاحظ أن كل عملية إطلاق على الهدف هي تجربة برنوليّة (يصيب أو لا يصيب) فيها احتمال النجاح $p = 0.85$ ، وأن هذه التجارب تتم بشكل مستقل كل منها عن الأخرى (لأنه لا يعلم شيء عن نتيجة الإصابة للهدف)، ومن ثم بحسب قاعدة الضرب (في العدّ) يكون لاحتمال الإصابة برميتين من أصل ثلاث أطلقت على الهدف لها أحد العروض الآتي:

$$p \cdot p \cdot (1 - p) \text{ أو } p \cdot (1 - p) \cdot p \text{ أو } (1 - p) \cdot p \cdot p$$

وبما أن حوادث إصابة الهدف وفقاً لهذه التسلسل من النتائج هي حوادث متنافية متنى متنى (كما هو واضح) فإن الاحتمال سيكون مساوياً للمقدار الآتي:

$$p \cdot p \cdot (1 - p) + p \cdot (1 - p) \cdot p + (1 - p) \cdot p \cdot p$$

ومن ثم يمكننا أن نكتب:

$$P(X = 2) = p \cdot p \cdot (1 - p) + p \cdot (1 - p) \cdot p + (1 - p) \cdot p \cdot p = 3 [p^2 \cdot (1 - p)]$$

لكن بملاحظة أن العدد 3 هو في الواقع التوافق لثلاثة أشياء أُختير منها شيئين بأن واحد، وأن أسّ المقدار $(1 - p)$ يمكن كتابته من خلال (3-2) (عدد المحاولات مطروحاً منه عدد النجاحات) فإنه يمكننا أن نكتب المقدار السابق على النحو الآتي:

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} p^2 \cdot (1 - p) = \binom{3}{2} (0.85)^2 \cdot (0.15) = 0.3825$$

وبالتالي نجد أن الاحتمال المطلوب هو $P(X = 2) = 0.3825$.

سنلاحظ فيما بعد أن المتغير العشوائي X في مثالنا هذا هو من المتغيرات العشوائية الشهيرة وأنه سيكون خاضعاً للتوزيع الحداني بمعلمتين $n = 3$ و $p = 0.85$.



٦-٣-٣- ملاحظات

١- يمكن تمييز المتغير العشوائي المتقطع من خلال الاحتمالات $P(X = x_i)$ من أجل كل القيم الممكنة i ، وتُدعى هذه القيم للاحتتمالات بـ **الكتل الاحتمالية** Probability Masses للمتغير العشوائي X ، ويرمز لها عادةً بـ p_i ، أي أنه يُكتب:

$$p_i = P(X = x_i) \quad ; \quad \forall i$$

٢- إذا كان فضاء الحوادث الابتدائية Ω منتهياً، فعندئذ ستكون مجموعة قيم المتغير العشوائي المتقطع X منتهية أيضاً، وفي هذه الحالة يُقال عن المتغير العشوائي X إنه بسيط.

٣- على سبيل التبسيط والتوضيح سوف نخصص دراستنا على متغيرات عشوائية لها عدد منته من القيم، أي أننا سنأخذ مجموعة قيم المتغير العشوائي المتقطع X من الشكل:

$$X = \{x_i \mid i = 1, 2, \dots, k\}$$

٦-٣-٤- التمثيل الجدولي والبياني للمتغيرات العشوائية المتقطعة

انطلاقاً من معرفة القيم x_i و p_i من أجل كل القيم الممكنة لـ i يمكننا تقديم المتغير العشوائي البسيط X (ولو نظرياً على الأقل) وفق طرائق أخرى منها على سبيل المثال:

أ- التمثيل الجدولي: بفرض أن X متغير عشوائي بسيط على فضاء حوادث ابتدائية Ω وبمجموعة قيم:

$$X = \{x_i \mid i = 1, 2, \dots, k\}$$

فعندئذ يمكن تقديم المتغير العشوائي X جدولياً من خلال جدول بصفتين يدون في صفه العلوي القيم x_i ، وأما في صفه السفلي فيتم تدوين الكتل الاحتمالية p_i المقابلة لتلك للقيم x_i على النحو الموضح في الجدول الآتي:

الجدول [6-1]

قيم x_i	x_1	x_2	...	x_k
$p_i = \mathbf{P}(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_k


إن هذا الجدول يُدعى جدول توزيع المتغير العشوائي X أيضاً، وهذه التسمية خاصة بالمتغيرات العشوائية المتقطعة البسيطة فقط. كذلك يجب الأخذ بالحسبان أن تكون العلاقة $\sum_{i=1}^k p_i = 1$ مُحَقَّقة.

ب- التمثيل البياني: بفرض أن X متغير عشوائي بسيط على فضاء حوادث ابتدائية Ω وبمجموعة قيم:

$$X = \{x_i \mid i = 1, 2, \dots, k\}$$

فعندئذ يمكن أن يُمثل هذا المتغير العشوائي بيانياً من خلال رسم محاورين إحداثيين متعامدين، ومن ثم رسم عمود (يُمثل قفزة المتغير العشوائي) بارتفاع يساوي p_i فوق القيمة x_i (التي تُدعى موضع القفزة للمتغير العشوائي) وذلك من أجل كل القيم الممكنة لـ i .

نشير هنا إلى أن بعض المراجع تضع في نهاية كل عمود دائرة صغيرة مصممة كتعبير عن موضع الكتلة الاحتمالية للمتغير العشوائي X عند موضع القفزة، وأما ارتفاع العمود (وهو الأهم في الرسم) فإنه يعبر عن قيمة الكتلة الاحتمالية للمتغير العشوائي X عند موضع القفزة. وهكذا يمكن للمتغير العشوائي X أن يُمثل بيانياً من خلال الشكل الآتي:



الشكل [6-6]

٦-٣-٥- ملاحظات

١- في الأشكال القادمة الممثلة للمتغيرات العشوائية المتقطعة سوف نتجاوز عن رسم الدوائر الصغيرة المصممة في نهايات الأعمدة وذلك لأن المهم في هذه العروض هو ارتفاعات الأعمدة عند مواضع القفزات.

٢- يلاحظ عدم جدوى تقديم المتغيرات العشوائية البسيطة بالطريقة الجدولية أو البيانية عندما تكون مجموعة قيمها كبيرة، وأما إذا كانت القيم التي تأخذها هذه المتغيرات العشوائية قليلة نسبياً فإن هاتين الطريقتين تعطيان عروضاً مقبولة.

٣- تجدر الإشارة هنا إلى أن التوزيعات الناتجة عن متغيرات عشوائية متقطعة تدعى توزيعات متقطعة.

٦-٣-٦- أمثلة

١- لنفترض أن متغيراً عشوائياً X قُدّم من خلال الجدول الآتي:

الجدول [6-2]

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
قيم x_i لـ X	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_i	0.0038	0.0313	0.1094	0.2188	0.2734	0.2188	0.1094	0.0313	0.0038

فلاحظ أن $\sum_{i=1}^9 p_i = 1$ ، ومن ثمّ هذا المتغير العشوائي متقطع بسيط. والعلاقات التي تميز هذا المتغير


العشوائي هي:

$$P(X = 0) = 0.0038 \quad \& \quad P(X = 1) = 0.0313 \quad \& \quad P(X = 2) = 0.1094$$

$$P(X = 3) = 0.2188 \quad \& \quad P(X = 4) = 0.2734 \quad \& \quad P(X = 5) = 0.2188$$


$$P(X = 6) = 0.1094 \quad \& \quad P(X = 7) = 0.0313 \quad \& \quad P(X = 8) = 0.0038$$

وتمثيله البياني يقدمه لنا الشكل الآتي.



الشكل [6-7]

٢- ليكن لدينا X متغيراً عشوائياً مُعطى بيانياً من خلال الشكل الآتي:



الشكل [6-8]

ف نجد لتمثيله الجدولي العرض الآتي:

الجدول [6-3]

i	1	2	3	4	5	المجموع
قيم x_i لـ X	0	1	2	3	4	
p_i	0.141	0.355	0.331	0.126	0.047	1

ومن ثمّ العلاقات التي تميّز هذا المتغير العشوائي المتقطع البسيط هي:

$$P(X = 0) = 0.141 \quad \& \quad P(X = 1) = 0.355 \quad \& \quad P(X = 2) = 0.331$$

$$P(X = 3) = 0.126 \quad \& \quad P(X = 4) = 0.047$$


٣- بالعودة إلى المثال (٣) من (٢-٣-٦) يمكننا عرض ذلك المتغير جدولياً كما يلي:

الجدول [6-4]

i	1	2	3	4	المجموع
قيم x_i لـ X	0	1	2	3	
p_i	0.003375	0.057375	0.325125	0.614125	1

حيث لدينا $n = 3$ هو عدد التجارب البرنولية المستقلة التي تمّ تنفيذها، x_i عدد النجاحات التي تحققت

خلال الـ n تجربة، $p = 0.85$ هو احتمال النجاح في أية تجربة، وأما تمثيله البياني فله الشكل الآتي.



الشكل [6-9]

٦-٣-٦- ملاحظات

- ١- يلاحظ مما سبق أنه من أجل متغير عشوائي متقطع بسيط وبقيم قليلة العدد يمكننا استخدام أي من التمثيلات التي ذكرناها سابقاً لاستنتاج بقية التمثيلات الأخرى للمتغير العشوائي.
- ٢- لقد لاحظنا في المثال (٣) من (٦-٣-٢) أنه إذا كان لدينا تجربة برنولية باحتمال نجاح p ، وقمنا بتكرار هذه التجربة لـ n مرة وبشكل مستقل كل منها عن الأخرى، وبفرض أن X متغير عشوائي راصد لعدد النجاحات (ويكن k) خلال التجارب التي نفذت، فإن العلاقة المميزة لهذا المتغير العشوائي سيكون لها العرض الآتي:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k} \quad ; k = 0, 1, 2, \dots, n$$

حيث نلاحظ أن القيم التي يأخذها X هي قيم صحيحة غير سالبة (عددها $n+1$ قيمة). إن المتغير العشوائي الذي يتميز بهذه العلاقة يُدعى **متغيراً عشوائياً حِدَانِيًّا** Binomial Random Variable ، أو يُقال إن له توزيع حِدَانِي Binomial Distribution بمعلمتين n و p علماً أن n عدد طبيعي منتهٍ و $0 < p < 1$.

٦-٣-٧- تعريف (المتغير العشوائي الحِدَانِي)

ليكن X متغيراً عشوائياً على فضاء حوادث ابتدائية Ω وبمجموعة قيم $X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ مع n عدد طبيعي منتهٍ. عندئذ يكون لهذا المتغير العشوائي توزيع حِدَانِي (أو ذي الحدين) بمعلمتين n و p مع $0 < p < 1$ ، إذا كان للعلاقة التي تميزه العرض الآتي:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k} \quad ; k = 0, 1, 2, \dots, n \quad [6-5]$$

إذن، نستنتج مما سبق أن المتغير العشوائي الحِدَانِي يرصد عدد النجاحات عند تنفيذ عدد منتهٍ من التكرارات لتجارب برنولية مستقلة باحتمال نجاح معلوم.

٦-٣-٨- أمثلة

١- بالعودة إلى المثال (٣) من (٦-٣-٢) نلاحظ أنه عدد التجارب البرنولية المستقلة التي تم تنفيذها يساوي 3، واحتمال النجاح في أية تجربة يساوي $p = 0.85$ ، ومن ثم يكون للمتغير العشوائي X (الراصد لعدد الإصابات خلال الرميات الثلاث) توزيع جداني بمعلمتين $n = 3$ و $p = 0.85$.

٢- يوجد 1000 مصباح من نوع معين في مستودع، منها 40 مصباحاً معيباً (غير مطابق للمواصفات). نقوم بسحب 10 مصابيح عشوائياً من المستودع ومن ثم فحصها بشكل مستقل كل منها عن الآخر (واحداً تلو الآخر)، فما هو احتمال:

أ- حصولنا على 8 مصابيح سليمة؟

ب- حصولنا على 8 مصابيح سليمة على الأقل؟

ج- عدم حصولنا على أي مصباح سليم؟

الإجابات: بملاحظة أن كل عملية فحص لمصباح هي تجربة برنولية (سليم أو معيب) فيها احتمال النجاح:

$$p = \frac{1000 - 40}{1000} = \frac{960}{1000} = 0.96$$

وأن هذه التجارب تتم بشكل مستقل كل منها عن الأخرى (لأننا لا نعلم شيء عن نتيجة الفحص مسبقاً)، فعندئذ يفرض أن X هو متغير عشوائي راصد لعدد المصابيح السليمة خلال الفحوصات العشر، فإنه سيكون لهذا المتغير العشوائي توزيع جداني بمعلمتين $n = 10$ و $p = 0.96$ ، ومن ثم يكون لدينا من أجل الطلب:

أ- الاحتمال المطلوب هو $P(X = 8)$ (حيث لدينا $k = 8$)، وبحسب العلاقة [6-5] نجد:

$$P(X = 8) = \binom{10}{8} p^8 \cdot (1 - p)^{10-8} = (45) \cdot (0.96)^8 \cdot (0.04)^2 = 0.052$$

ب- الاحتمال المطلوب هو $P(X \geq 8)$ والذي يكتب على النحو الآتي:

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10)$$

وباستخدام العلاقة [6-5] في حساب كل حدٍ من حدود الطرف الأيمن من العلاقة السابقة نجد أن الاحتمال المطلوب هو:

$$P(X \geq 8) = (0.05194) + (0.27701) + (0.66483) = 0.99378$$

ج- لدينا الاحتمال المطلوب هو $P(X = 0)$ ، وباستخدام العلاقة [6-5] نجد أن الاحتمال المطلوب هو:

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} (0.96)^0 \cdot (0.04)^{10-0} = 1 \times 1 \times 0.0000000000000001 \approx 0$$

٣- يقوم شخص ما بكتابة نص على الحاسب الآلي، وبحيث أن كتابة كل حرف مستقلة عن الأخرى، وبفرض أن احتمال أن يخطئ في كتابة أي حرف يساوي 0.015، فعندئذ:

أ- إذا كان النص مكوناً من 1500 حرفاً، فما هو احتمال أن لا يخطئ في كتابة هذا النص أبداً؟

ب- إذا كان النص مكوناً من 150 حرفاً فقط، فما هو احتمال أن يخطئ في كتابة حرفين على الأقل؟

ج- إذا كان النص مكوناً من 150 حرفاً فقط، فما هو احتمال أن يخطئ في كتابة حرفين على الأكثر؟

د- إذا كان النص مكوناً من 150 حرفاً فقط، واحتمال أن يخطئ في كتابة أي حرف يساوي 0.01، فما هو احتمال أن يكون عدد الحروف التي سيخطئ في كتابتها ما بين 5 و7 حروف؟

الإجابات: نلاحظ أن كل كتابة كل حرف هي تجربة برنوليّة مستقلة بعضها عن البعض الآخر، ومن ثمّ بفرض أن X متغير عشوائي الكتابة للنص هي تجارب برنوليّة مستقلة بعضها عن البعض الآخر، ومن ثمّ بفرض أن X متغير عشوائي راصد لعدد الأخطاء المرتكبة في كتابة النص، فعندئذٍ من أجل الطلب:

أ- سيكون للمتغير العشوائي X توزيع جداني بمعلمتين $n = 1500$ و $p = 0.015$ ، وبالتالي احتمال أن لا يخطئ أبداً في كتابة هذا النص يساوي:

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{1500}{0} (0.015)^0 \cdot (1 - 0.015)^{1500-0} \\ &= 0.985^{1500} = 0.00000000014 \approx 0 \end{aligned}$$

وهذه النتيجة الضئيلة جداً جداً لقيمة الاحتمال يُعبّر عنها بالقول: إنَّ حادث أن لا يخطئ الكاتب في كتابة هذا النص أبداً هو حادث شبه مستحيل. ذلك أن الحادث شبه المستحيل هو حادث A مع $A \neq \emptyset$ ومن أجله يكون $P(A) = 0$.

ب- سيكون للمتغير العشوائي X توزيع جداني بمعلمتين $n = 150$ و $p = 0.015$ ، ومن ثمّ احتمال أن يخطئ الكاتب في كتابة حرفين على الأقل يساوي:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

حيث لدينا:

$$P(X = 0) = \binom{150}{0} (0.015)^0 \cdot (1 - 0.015)^{150-0} = (0.985)^{150} = 0.1036$$

$$P(X = 1) = \binom{150}{1} (0.015)^1 \cdot (1 - 0.015)^{150-1} = 15 \times 0.015 \times 0.1036 = 0.2367$$

ومن ثمّ يكون لدينا:

$$P(X \geq 2) = 1 - (0.1036 + 0.2367) = 0.6597$$

ج- سيكون للمتغير العشوائي X توزيع جداني بمعلمتين $n = 150$ و $p = 0.001$ ، ومن ثمّ احتمال أن يخطئ الكاتب في كتابة حرفين على الأكثر يساوي:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

حيث لدينا $P(X = 0) = 0.1036$ ، $P(X = 1) = 0.2367$ ، وبالمثل نجد $P(X = 2) = 0.2685$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$P(X \leq 2) = 0.1036 + 0.2367 + 0.2685 = 0.6088$$

د- سيكون للمتغير العشوائي X توزيع جدائي بمعلمتين $n = 150$ و $p = 0.01$ ، ومن ثم احتمال أن يكون عدد الحروف التي سيخطئ في كتابتها ما بين 5 و 7 حروف يساوي:

$$P(5 \leq X \leq 7) = P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7)$$

حيث لدينا:

$$P(X = 5) = \binom{155}{5} (0.01)^5 \cdot (1 - 0.01)^{150-5} = 0.0138$$

وبالمثل نجد $P(X = 6) = 0.0037$ وكذلك $P(X = 7) = 0.0007$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$P(5 \leq X \leq 7) = 0.0138 + 0.0037 + 0.0007 = 0.0182$$



٩-٣-٦- التوقع الرياضي للمتغير عشوائي متقطع

Mathematical Expectation of Discrete Random Variable

بالرجوع إلى الفصل الثاني من هذا الكتاب، والنظر في صيغة المتوسط الموزون لمجموعة من القيم x_i بأوزان w_i عندما تسمح i كل القيم الممكنة حيث لدينا:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i \cdot w_i}{\sum_i w_i}$$

وكذلك لو أمعنا النظر في جداول التوزيعات الاحتمالية للمتغيرات العشوائية المتقطعة التي مرت معنا سابقاً، فإننا سنلاحظ (وبوضوح تام) أن قيم الاحتمالات $P(X = x_i)$ تمثل في الواقع أوزاناً لـ x_i قيم المتغير العشوائي المتقطع X ، ومن ثم ستكون النسبة:

$$\frac{\sum_i x_i \cdot P(X = x_i)}{\sum_i P(X = x_i)}$$

هي المتوسط الموزون للقيم x_i عندما تسمح i كل القيم الممكنة لها، وبما أن $\sum_i P(X = x_i) = 1$ دوماً،

فإنه سيصبح $\sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$ هو المتوسط الموزون للقيم x_i عندما تسمح i كل القيم الممكنة لها،

والذي هو في الواقع متوسط قيم المتغير العشوائي المتقطع X . أما رياضياتياً فإن المجموع السابق يُدعى التوقع الرياضي للمتغير العشوائي X ويرمز له بـ $E(X)$ ، وبهذا التمهيد يمكننا أن نقدم التعريف الآتي

للتوقع الرياضي للمتغير عشوائي X .

٦-٣-١٠- تعريف (التوقع الرياضي لمتغير عشوائي متقطع)

ليكن X متغيراً عشوائياً متقطعاً على فضاء حوادث ابتدائية Ω وبمجموعة قيم:

$$X = \{x_i \mid i = 1, 2, \dots, k\}$$

فعدنئذ يُعرف التوقع الرياضي لـ X من خلال العلاقة الآتية:

$$E(X) := \sum_{i=1}^k x_i P(X = x_i) \quad [6-6]$$

٦-٣-١١- بعض خصائص التوقع الرياضي لمتغير عشوائي متقطع

١- إذا كانت قيم المتغير العشوائي المتقطع X تقع بين قيمتين t و u ، فعدنئذ سيكون لدينا:

$$t \leq E(X) \leq u$$

وإذا أصبحت $t = u$ فعدنئذ ينتج لدينا:

$$E(X) = E(t) = t \quad [6-7]$$

أي أن التوقع الرياضي للقيمة الثابتة يساوي القيمة نفسها، وكذلك ينتج من هذه الخاصية أنه إذا كانت

$t = 0$ (أي أن X متغير عشوائي غير سالب)، فعدنئذ سيكون $0 \leq E(X)$ أيضاً.

٢- إذا كان a و b عددين حقيقيين مع $a \neq 0$ ، فإن العلاقات الآتية ستكون محققة:

$$E(aX + b) = a \cdot E(X) + b \quad [6-8]$$

$$E(X - E(X)) = 0 \quad [6-9]$$

علماً أن المتغير العشوائي $X - E(X)$ يُدعى متغيراً عشوائياً مركزياً، ومن ثم يكون التوقع الرياضي

لأي متغير عشوائي مركزي يساوي الصفر دوماً.

٦-٣-١٢- أمثلة

١- الجدول الآتي يقدم لنا متغيراً عشوائياً من جدول توزيعه، والمطلوب حساب التوقع الرياضي لهذا المتغير العشوائي.

الجدول [6-5]

قيم x_i لـ X	1	2	3	4	المجموع
p_i	0.10	0.25	0.35	0.30	1

الإجابة: من أجل حساب التوقع الرياضي لهذا المتغير العشوائي لدينا:

$$E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i \cdot P(X = x_i) \\ = 1(0.10) + 2(0.25) + 3(0.35) + 4(0.30) = 2.85$$

٢- قامت إحدى مؤسسات بيع الأدوات المنزلية بتقديم عروض على سلعتها بحيث يكون تخفيض السعر فيه على خمس أصناف 1، 2، 3، 4 و 5، ثم رصد شراء الناس لهذه الأصناف حتى نفاذها، فكانت النتائج كما في الجدول الآتي:

الجدول [6-6]

1	2	3	4	5	مستوى التخفيض
15	30	35	12	8	الكمية المباعة
1500	4050	2450	1140	400	الأرباح بالريال

والمطلوب حساب متوسط كمية المبيعات وكذلك الربح المتوقع للسلع المباعة على افتراض أن لجميع السلع النصيب نفسه في الاختيار.

الإجابة: من أجل حساب متوسط كمية المبيعات سنفترض أن X هو متغير عشوائي راصد لكمية المبيعات، فعندئذ سيكون لهذا المتغير العشوائي القيم $x_1 = 15$ و $x_2 = 30$ و $x_3 = 35$ و $x_4 = 12$ و $x_5 = 8$ ، ومن ثم يكون لدينا:

$$P(X = 15) = \frac{15}{100} = 0.15 \quad \& \quad P(X = 30) = \frac{30}{100} = 0.30$$

$$P(X = 35) = \frac{35}{100} = 0.35 \quad \& \quad P(X = 12) = \frac{12}{100} = 0.12$$

$$P(X = 8) = \frac{8}{100} = 0.08$$

وبالتالي نجد أن متوسط كمية المبيعات للسلع المباعة يساوي:

$$E(X) = \sum_{i=1}^5 x_i \cdot P(X = x_i) = (15 \times 0.15) + (30 \times 0.30) + (35 \times 0.35) \\ + (12 \times 0.12) + (8 \times 0.08) = 25.58$$

وهذا يعني أن متوسط كمية المبيعات للسلع المباعة من كل صنف يساوي 26 قطعة تقريباً.

وأما من أجل حساب الربح المتوقع للسلع المباعة من كل صنف سنفترض أن X متغير عشوائي راصد لأرباح الكميات المباعة، فعندئذ سيكون لهذا المتغير العشوائي القيم $x_1 = 1500$ و $x_2 = 4050$ و $x_3 = 2450$ و $x_4 = 1140$ و $x_5 = 400$ ، وبالتالي يكون لدينا:

$$P(X = 1500) = \frac{1500}{7590} = 0.1976 \quad \& \quad P(X = 4050) = \frac{4050}{7590} = 0.5336$$

$$P(X = 2450) = \frac{2450}{7590} = 0.3228 \quad \& \quad P(X = 1140) = \frac{1140}{7590} = 0.1502$$

$$P(X = 400) = \frac{400}{7590} = 0.0527$$

ومن ثم نجد أن الربح المتوقع للسلع المباعة يساوي:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^5 x_i \cdot P(X = x_i) = (1500 \times 0.1976) + (4050 \times 0.5336) \\ &\quad + (2450 \times 0.3228) + (1140 \times 0.1502) + (400 \times 0.0527) = 3440.65 \end{aligned}$$

٣- بالعودة إلى المثال السابق (٢) من (٦-٣-٨)، فإذا علمنا أن التوقع الرياضي لمتغير عشوائي حداني X بمعلمتين n و p يساوي $E(X) = n \cdot p$ ، فما هو متوسط عدد الأحرف التي سيخطئ في كتابتها ذلك الشخص في كلا الحالتين (أ) و (ب)؟

الإجابات: من أجل الحالة:

أ- لدينا متوسط عدد الأحرف التي سيخطئ في كتابتها ذلك الشخص يساوي:

$$E(X) = n \cdot p = 1500 \times 0.015 = 22.5 \approx 23 \text{ حرفاً}$$

أي أننا سنتوقع منه كتابة 23 حرفاً خاطئاً في هذه الحالة.

ب- لدينا متوسط عدد الأحرف التي سيخطئ في كتابتها ذلك الشخص يساوي:

$$E(X) = n \cdot p = 15 \times 0.015 = 0.225 \approx 0$$

أي أننا سنتوقع منه كتابة نصٍ خالٍ من الأخطاء في هذه الحالة.

٦-٣-١٣ التباين لمتغير عشوائي متقطع

ليكن X متغيراً عشوائياً متقطعاً على فضاء حوادث ابتدائية Ω وبمجموعة قيم:

$$X = \{x_i \mid i = 1, 2, \dots, k\}$$

فعدنذ يُعرّف التباين لـ X (ويُرمز له $\text{var}(X)$) من خلال العلاقة الآتية:

$$\text{var}(X) = E \left(X - E(X) \right)^2 = \sum_{i=1}^k \left(x_i - E(X) \right)^2 \cdot P(X = x_i) \quad [6-10]$$

٦-٣-١٤ ملاحظات

١- يمكن عرض العلاقة السابقة [6-10] على النحو الآتي:

$$\text{var}(X) = \sum_{i=1}^k x_i^2 \cdot P(X = x_i) - \left(\sum_{i=1}^k x_i \cdot P(X = x_i) \right)^2 \quad [6-11]$$

٢- يُطلق على الجذر التربيعي الموجب لتباين متغير عشوائي X اسم "الانحراف المعياري" لـ X ، ويرمز له عادة بـ σ . أي أنه لدينا:

$$\sigma = +\sqrt{\text{var}(X)} \quad [6-12]$$

ومن ثم نلاحظ أنه يمكننا أن نكتب $\text{var}(X) = \sigma^2$.

٦-٣-١٥- أمثلة

١- بالعودة إلى المثال (٢) من (٦-٣-٦) حيث لدينا متغير عشوائي متقطع بجدول توزيع مُقدّم كما يلي:

X قيم x_i	0	1	2	3	4	Total
p_i	0.141	0.355	0.331	0.126	0.047	1

والمطلوب حساب التوقع الرياضي، التباين والانحراف المعياري لهذا المتغير العشوائي.

الإجابة: من أجل حسابات التوقع الرياضي، التباين والانحراف المعياري لمتغير عشوائي متقطع له عدد قليل من القيم (نسبياً) يُفضل استخدام الجدول الآتي:

الجدول [6-7]

i	x_i	$P(X = x_i)$	$x_i \cdot P(X = x_i)$	$x_i^2 \cdot P(X = x_i)$
1	0	0.141	0	0
2	1	0.355	0.355	0.355
3	2	0.331	0.662	1.324
4	3	0.123	0.369	1.107
5	4	0.047	0.235	1.175
Total	---	1	1.621	3.961

ومن ثم يكون لدينا:

$$E(X) = \sum_{i=1}^5 x_i \cdot P(X = x_i) = 1.621$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 \cdot P(X = x_i) = 3.961$$

وباستخدام العلاقة [6-11] نجد أن تباين المتغير العشوائي X يساوي:

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \sum_{i=1}^5 x_i^2 \cdot P(X = x_i) - \left(\sum_{i=1}^5 x_i \cdot P(X = x_i) \right)^2 \\ &= 3.961 - (1.621)^2 = 1.333359 \end{aligned}$$

وأخيراً باستخدام العلاقة [6-12] نجد أن الانحراف المعياري لهذا المتغير العشوائي يساوي:

$$\sigma = +\sqrt{1.333359} = 1.1547$$

٢- بالعودة إلى المثال السابق (٢) من (٦-٣-٨)، فإذا عَلِمْنَا أَنَّ التباين لمتغير عشوائي حداني X بمعلمتين n و p يُعطى بالعلاقة الآتية:

$$\text{var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

فما هي قيمة الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X في كلا الحالتين (أ) و (ب) ؟

الإجابات: لدينا من أجل الطلب:

أ- تباين المتغير العشوائي X يساوي:

$$\text{var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 1500 \times 0.015 \times 0.985 = 22.1625$$

ومن ثم تكون قيمة الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X هي:

$$\sigma = +\sqrt{\text{var}(X)} = +\sqrt{22.1625} = 4.7077$$

أي أن عدد الأحرف التي قد يخطئ في كتابتها قد تصل إلى 28 حرفاً، وإن قلّت فقد تكون 18 حرفاً.

ب- تباين المتغير العشوائي X يساوي:

$$\text{var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 15 \times 0.015 \times 0.985 = 0.221625$$

ومن ثم تكون قيمة الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X هي:

$$\sigma = +\sqrt{\text{var}(X)} = +\sqrt{0.221625} = 0.47077$$

أي أن عدد الأحرف التي قد يخطئ في كتابتها تكاد تكون معدومة في هذه الحالة.



المتغيرات العشوائية المستمرة

Continuous Random Variable

لقد ذكرنا سابقاً أنَّ المتغيرات العشوائية المستمرة تتميز بأنَّ دوال توزيعاتها الاحتمالية مستمرة على \mathbb{R} ، ولكنَّ التعريف الدقيق لهذا النوع من المتغيرات العشوائية لا يمكن تقديمه على مستوى هذا الكتاب، ولذلك سنكتفي بتقديم أحد أنواعه الشهيرة ودون الخوض في التفاصيل التي تقع خارج إطار هذا الكتاب.

٦-٤-١- التوزيع الطبيعي Normal Distribution

يُعدُّ التوزيع الطبيعي من أكثر التوزيعات الاحتمالية أهميةً وفائدةً، وهذا التوزيع يصف العديد من الظواهر التي تحدث في الصناعة، والبحوث العلمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- القياسات الفيزيائية في مجالات عديدة كقياسات الأجزاء الصناعية يكون لتوزيعها الاحتمالي (وفي كثير من الأحيان) تقريب جيد مع التوزيع الطبيعي.


- الأخطاء في القياسات العملية يمكن تقريبها بشكل جيد من التوزيع الطبيعي.
- كذلك وجد أنَّ الكثير من الظواهر الطبيعية تتوزع احتمالياً وفقاً لهذا التوزيع أيضاً.
ولهذا السبب أطلق على هذا التوزيع اسم **التوزيع الطبيعي**، ويُعرف هذا التوزيع باسم "التوزيع الغاوسي" Gaussian Distribution أيضاً، وذلك نسبةً إلى الرياضياتي الألماني **غاوص** Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855).

٦-٤-٢- تعريف (المتغير العشوائي الطبيعي) Normal Random Variable

يُقال عن متغير عشوائي X فوق فضاء حوادث ابتدائية Ω إنَّه خاضع للتوزيع الطبيعي بمعلمتين $\mu \in \mathbb{R}$ و $0 < \sigma$ إذا كانت الدالة التي تميِّزه (ويُرمز لها بـ f_X) مُعطاة من خلال العلاقة الآتية:


$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] \quad ; \quad x \in \mathbb{R} \quad [6-13]$$

إنَّ الدالة f_X تُدعى دالة الكثافة الاحتمالية لـ X ، ومن أجل $\mu = 2$ و $\sigma = 2$ يكون لرسمها البياني الشكل الآتي (لاحظ أنَّ ذروة الدالة f_X توافق قيمة μ دائماً):




الشكل [6-10]: الرسم البياني لـ f_X

وأما الرسم البياني لدالة التوزيع الطبيعي ذو المعلمتين $\mu = 2$ و $\sigma = 2$ فله الشكل الآتي:



الشكل [6-11]


إن الشكل الآتي يقدم عرضاً بيانياً لدالة الكثافة الاحتمالية لـ X من أجل $\sigma = 1$ وقيم مختلفة لـ μ .



الشكل [6-12]

فلاحظ أن تغيير قيمة μ يؤدي إلى انسحاب منحنى دالة الكثافة الاحتمالية f_X يمئةً أو يسرى وذلك بحسب القيمة التي تأخذها هذه المعلمة.

وأما الشكل الآتي فإنه يقدم عرضاً بيانياً لدالة الكثافة الاحتمالية لـ X من أجل $\mu = 0$ وقيم مختلفة لـ σ .



الشكل [6-13]

حيث نلاحظ هنا أن تغيير قيمة σ يؤدي إلى تدبب أو انبساط منحنى دالة الكثافة الاحتمالية f_X وذلك بحسب القيمة التي تأخذها هذه المعلمة.

٦-٤-٣ ملاحظات

- ١- إن قيمة المساحة التي تحت منحنى دالة الكثافة الاحتمالية وفوق المحور OX تساوي الواحد تماماً وذلك بغض النظر عن القيم التي تأخذها μ و σ .

٢- يُرمز بـ (σ, μ, N) للتوزيع الطبيعي ذو المعلمتين μ و σ .


٣- إن قيمة التوقع الرياضي والتباين لمتغير عشوائي طبيعي X بمعلمتين μ و σ هما على الترتيب $E(X) = \mu$ و $\text{var } X = \sigma^2$ ، ومن ثم تكون قيمة المعلمة σ هي قيمة الانحراف المعياري لهذا المتغير العشوائي.

٦-٤-٤- تعريف (المتغير العشوائي الطبيعي المعياري) Standard Normal Random Variable

ليكن X متغيراً عشوائياً طبيعياً بمعلمتين $\mu = 0$ و $\sigma = 1$ ، فعندئذ يُقال عن X إنه خاضع للتوزيع الطبيعي المعياري، حيث يصبح لدالة كثافته الاحتمالية العرض الآتي:


$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad ; \quad x \in \mathbb{R} \quad [6-14]$$

وفي هذه الحالة الخاصة يُرمز لدالة كثافته الاحتمالية بـ $\varphi(x)$ بدلاً من f_X ، وتكون ذروة منحنى دالة الكثافة الاحتمالية $\varphi(x)$ واقعة على المحور OY عند القيمة 0.339 تقريباً كما يوضحه الشكل الآتي:



الشكل [6-14]

وأما دالة التوزيع الطبيعي المعياري فيرمز لها عادة بـ $\Phi(x)$ بدلاً من F_X ، ويكون لرسمها البياني الشكل الآتي:



الشكل [6-15]


نشير هنا إلى أنه يوجد في آخر هذا الكتاب جدول لقيم هذه الدالة، إحداهما من أجل القيم الموجبة لـ x حيث يبدأ من الصفر وبتزايد يساوي 0.01، والأخرى لقيم السالبة لـ x تبدأ من الصفر وبتناقص يساوي 0.01، وهذه القيم تمكّننا من حساب احتمالات متعلقة بمتغير عشوائي طبيعي معياري، فعلى سبيل المثال لو أخذنا Z متغيراً عشوائياً معيارياً، فعندئذ سيكون لدينا:

$$\Phi(0.57) = P(Z < 0.57) = 0.7157$$

ونجدها من جدول القيم الموجبة لهذا التوزيع كما يوضحها العرض الآتي:

z	0.00	0.01	...	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040		0.5279	0.5391	0.5359
⋮						
0.5	0.6915	0.6950		0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291		0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611		0.7794	0.7823	0.7852

والتي تمثلها المساحة المظللة في الشكل الآتي:



الشكل [6-16]

كما يمكن للقيم التي في الجدول أن تساعدنا في تعيين قيمة z لمتغير عشوائي طبيعي معياري Z إذا كانت قيمة الاحتمال $P(Z < z)$ معلومة، فعلى سبيل المثال لو أخذنا Z متغيراً عشوائياً معيارياً، وكان لدينا $P(Z < z) = 0.0021$ ، فعندئذ نجد من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (القسم الخاص بالقيم السالبة لأن القيمة 0.0021 تقع في جدول القيم السالبة) أن قيمة z تساوي -2.86، وذلك من خلال جمع قيمتي z العمودية والأفقية المقابلتين للقيمة 0.0021 وهما -2.8+0.06، والشكل الآتي يوضح لنا ذلك:

z	0.00	0.01	...	0.06	...	0.09
-3.2	0.0007	0.0007		0.0006		0.0005
⋮						
-2.9	0.0019	0.0018		0.0015		0.0014
-2.8	0.0026	0.0025		0.0021		0.0019
2.7	0.0035	0.0034		0.0029		0.0026

ونشير هنا إلى أنه توجد جداول عديدة ومتنوعة في طريقة عرضها والدقة المستخدمة فيها، وقد استخدمنا هذا الجدول لبساطته وسهولة التعامل معه.

٦-٤-٥- ملاحظات

- 1- من أجل جدول التوزيع الطبيعي المعياري المقدم في آخر هذا الكتاب سوف نضع $P(Z < z) = 0.9999$ إذا كانت قيمة $z < 3.49$ ، وأما إذا كانت $z > -3.49$ فإننا سنضع $P(Z < z) = 0.0001$.

٢- من أجل أي متغير عشوائي مستمر X يكون $P(X = x) = 0$ مهما تكن قيمة $x \in \mathbb{R}$ ، وكذلك لدينا العلاقات الآتيتين صحيحتين:

$$P(X < x) = P(X \leq x) \quad \& \quad P(X > x) = P(X \geq x)$$


ولذلك فمن أجل متغير عشوائي طبيعي معياري Z ستكون لدينا العلاقات الآتية مُحَقَّقةً أيضاً:

$$P(Z = z) = 0 \quad \& \quad P(Z < z) = P(Z \leq z) \quad \& \quad P(Z > z) = P(Z \geq z)$$


٣- يمكننا تنفيذ نماذج عديدة من الحساب الاحتمالي باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري، ومنها على سبيل المثال الاحتمالات الآتية:

$$P(Z \geq 0.80) = 1 - P(Z < 0.80) = 1 - 0.7881 = 0.2119$$

$$P(0 \leq Z < 0.80) = P(Z < 0.80) - P(Z < 0) = 0.7881 - 0.5000 = 0.2881$$



المساحة الممثلة لـ $P(Z \geq 0.80)$



المساحة الممثلة لـ $P(0 \leq Z < 0.80)$

٦-٤-٦- أمثلة

١- بفرض أن Z متغير عشوائي طبيعي معياري، والمطلوب حساب الاحتمالات الآتية مستخدماً جدول التوزيع الطبيعي المعياري:

a) $P(Z < 1.99)$

b) $P(Z \geq -1.05)$

c) $P(0.02 < Z < 0.30)$

الإجابات: لدينا من أجل الفقرة:

a) $P(Z < 1.99) = 0.9767$

b) $P(Z \geq -1.05) = 1 - P(Z < -1.05) = 1 - 0.1469 = 0.8531$

c) $P(0.02 < Z < 0.30) = P(Z < 0.30) - P(Z < 0.02)$

$$= 0.6179 - 0.5080 = 0.1099$$

٢- بفرض أن Z متغير عشوائي طبيعي معياري، والمطلوب تعيين قيم z التي تحقق العلاقات الآتية مستخدماً جدول التوزيع الطبيعي المعياري:

a) $P(Z < z) = 0.9750$

b) $P(Z \geq z) = 0.8888$

c) $P(z < Z < 1) = 0.5557$

الإجابات: لدينا من أجل:

a) $P(Z < z) = 0.9750 \Rightarrow z = 1.96$

b) $P(Z \geq z) = 0.8888 \Rightarrow [1 - P(Z < z)] = 0.8888$
 $\Rightarrow P(Z < z) = 0.1112 \Rightarrow z = -1.22$

c) $P(z < Z < 1) = 0.5570$
 $\Rightarrow P(Z < 1) - P(Z < z) = 0.8413 - P(Z < z) = 0.5570$
 $\Rightarrow P(Z < z) = 0.8413 - 0.5570 = 0.2843 \Rightarrow z \approx -0.57$



٦-٧-٤-٧-٧-٧ Standardization of R.V المتغيرات العشوائية

إذا كان متغير عشوائي X يخضع للتوزيع الطبيعي غير المعياري، فإنه من غير الممكن استخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري لإنجاز حساب الاحتمالات المتعلقة بهذا المتغير العشوائي بشكل مباشر، ولذلك نقوم بتحويله إلى متغير عشوائي طبيعي معياري من خلال عملية تُدعى استيعار المتغير العشوائي (أي تحويل المتغير العشوائي إلى متغير عشوائي معياري)، وهذه العملية تتم على النحو الآتي:

بفرض أن X متغير عشوائي له توزيع طبيعي بمعلمتين μ من \mathbb{R} و $0 < \sigma$ ، وطلب حساب الاحتمال $P(X < x)$ مع x قيمة مثبتة من \mathbb{R} فنعدنذ نضع:

$$Z := \frac{X - \mu}{\sigma} \quad \& \quad z := \frac{x - \mu}{\sigma}$$

فيصبح للاحتمال المطلوب العرض الآتي:

$$P(X < x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P(Z < z)$$

حيث تُستخرج القيمة $P(Z < z)$ من جدول التوزيع الطبيعي المعياري كما فعلنا ذلك سابقاً.

٦-٨-٤-٦ أمثلة

١- ليكن X متغيراً عشوائياً له توزيع طبيعي بمعلمتين $\mu = 15$ و $\sigma = 4$ ، والمطلوب حساب قيمة الاحتمال $P(12.5 \leq X < 21)$ ، ومن ثم تقديم التفسير الهندسي لما يحدث نتيجة لعملية الاستيعار.

الإجابة: من أجل ذلك لنقم أولاً باستيعار المتغير العشوائي المعطى X فنجد الآتي:

$$P(12.5 \leq X < 21) = P\left(\frac{12.5 - 15}{4} \leq \frac{X - 15}{4} < \frac{21 - 15}{4}\right)$$

$$= P\left(-0.625 \leq Z < 1.50\right) = P(Z < 1.50) - P(Z < -0.625)$$


ومن جدول التوزيع الطبيعي المعياري نجد أن $P(Z < 1.50) = 0.9332$ ، وأما لتعيين قيمة الاحتمال $P(Z < -0.625)$ فإننا نأخذ المتوسط للقيمتين $P(Z < -0.62)$ و $P(Z < -0.63)$ لأن القيمة -0.625 غير موجودة في الجدول، ولكنها تقع في المنتصف بين القيمتين -0.62 و -0.63 ، وبالتالي يكون لدينا:

$$P(-0.625) = \frac{P(Z < -0.62) + P(Z < -0.63)}{2} = \frac{0.2676 + 0.2643}{2} = 0.26595$$

ومن ثم يصبح لدينا:

$$P(12.5 \leq X < 21) = 0.9332 - 0.26595 = 0.66725$$

الآن لو أمعنا النظر في الشكل الآتي لمعرفة ما الذي حدث للمساحة المشغولة من قبل قيمة الاحتمال للمتغير العشوائي المعطى X بعد عملية الاستيعار، فإننا نلاحظ تغير شكل المساحة التي تمثل الاحتمال $P(12.5 \leq X < 21)$ دون تغير قيمتها.



الشكل [6-17]

- ٢- إذا كانت درجات الاختبار النهائي لطلاب مقرر الإحصاء تتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط $\mu = 40$ وانحراف معياري $\sigma = 3$ ، واختير طالب من الذين تقدموا للاختبار بشكل عشوائي، فما هو احتمال:
- أن تكون درجته أصغر من 38 درجة؟
 - أن تكون درجته أكبر من 45 درجة؟
 - أن تكون درجته ما بين 38 و45 درجة؟

الإجابات: من أجل ذلك سنأخذ X متغيراً عشوائياً راصداً لدرجة الطالب، فعندئذٍ سيكون لهذا المتغير العشوائي توزيع طبيعي $N(40, 3)$ ، وبالتالي من أجل الطلب:

أ- يكون الاحتمال المطلوب هو $P(X < 38)$ ، حيث لدينا:

$$P(X < 38) = P\left(\frac{X - 40}{3} < \frac{38 - 40}{3}\right) = P(Z < -0.67) = 0.2514$$

$$. Z = \frac{X - 40}{3} \text{ علماً أننا وضعنا}$$

ب- يكون الاحتمال المطلوب هو $P(X > 45)$ ، حيث لدينا:

$$\begin{aligned} P(X > 45) &= 1 - P(X \leq 45) = 1 - P\left(\frac{X - 40}{3} \leq \frac{45 - 40}{3}\right) \\ &= 1 - P(Z \leq 1.67) = 1 - P(Z < 1.67) = 1 - 0.9525 = 0.0475 \end{aligned}$$

ج- يكون الاحتمال المطلوب هو $P(38 \leq X \leq 45)$ ، حيث لدينا:

$$\begin{aligned} P(38 \leq X \leq 45) &= P(X < 45) - P(X \leq 38) \\ &= P\left(\frac{X - 40}{3} < \frac{45 - 40}{3}\right) - P\left(\frac{X - 40}{3} \leq \frac{38 - 40}{3}\right) \\ &= P(Z < 1.67) - P(Z \leq -0.67) = 0.9525 - 0.2514 = 0.7011 \end{aligned}$$

٣- إذا كانت درجات الحرارة (مقدرة بالدرجات المئوية) لعدة أصناف من المياه المعدنية لها توزيع طبيعي بمتوسط $\mu = 0$ وانحراف معياري $\sigma = 2$ درجة مئوية، واختير أحد هذه الأصناف عشوائياً، فما هو احتمال:

أ- أن تكون درجة تجمده أعلى من الصفر؟

ب- أن تكون درجة تجمده أدنى من -2 درجة مئوية؟

ج- أن تكون درجة تجمده ما بين 1 و-1 درجة مئوية؟

الإجابات: من أجل ذلك سنأخذ X متغيراً عشوائياً راصداً لدرجة تجمد الماء الذي تم اختياره، فعندئذ سيكون لهذا المتغير العشوائي توزيع طبيعي $N(0, 2)$ ، وبالتالي من أجل الطلب:

أ- يكون الاحتمال المطلوب هو $P(X > 0)$ ، حيث لدينا:

$$P(X > 0) = 1 - P\left(\frac{X - 0}{2} < \frac{0 - 0}{2}\right) = 1 - P(Z < 0) = 1 - 0.5 = 0.5$$

$$. Z = \frac{X - 0}{2} \text{ علماً أننا قد وضعنا}$$

ب- يكون الاحتمال المطلوب هو $P(X < -2)$ ، حيث لدينا:

$$P(X < -2) = P\left(\frac{X}{2} < \frac{-2}{2}\right) = P(Z < -1) = 0.1587$$

ج- يكون الاحتمال المطلوب هو $P(-1 \leq X \leq 1)$ ، حيث لدينا:

$$\begin{aligned} P(-1 \leq X \leq 1) &= P(X < 1) - P(X \leq -1) = P\left(\frac{X}{2} < \frac{1}{2}\right) - P\left(\frac{X}{2} \leq \frac{-1}{2}\right) \\ &= P(Z < 0.5) - P(Z \leq -0.5) = 0.6915 - 0.3085 = 0.3830 \end{aligned}$$

٤- ليكن X متغيراً عشوائياً طبيعياً بمتوسط $\mu = -1$ وانحراف معياري $\sigma = 0.5$ ، فإذا كان من أجل قيمة x من \mathbb{R} لدينا $P(X < x) = 0.9901$ ، فما هي قيمة x ؟

الحل: من أجل ذلك لنقم باستيعار المتغير العشوائي المعطى ومن ثم استخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري لتعيين قيمة x المطلوبة، حيث لدينا:

$$\mathbf{P}(X < x) = \mathbf{P}\left(\underbrace{\frac{X - (-1)}{0.5}}_Z < \underbrace{\frac{x - (-1)}{0.5}}_z\right) = \mathbf{P}(Z < z) = 0.9901$$

ومن جدول التوزيع الطبيعي المعياري نجد أن قيمة الاحتمال 0.9901 تقع على تقاطع المسارين للقيمتين 2.3 مع 0.03 ، ومن ثم تكون قيمة $z = 2.33$ ، ومنه نحسب قيمة x المطلوبة على النحو الآتي:

$$z = \frac{x + 1}{0.5} = 2.33 \Rightarrow x = 0.5(2.33) - 1 = 1.165 - 1 = 0.165$$





- ١- لنأخذ تجربة إلقاء حجر نرد متوازن لمرة واحدة فقط، ولنرْفَق كل عدد فردي من الأعداد التي سنحصل عليها بعدد يساوي مجموع الأعداد الفردية الناتجة عن هذه التجربة، وأما الأعداد الزوجية الناتجة عن هذه التجربة فسنرْفَق كل واحد منها بضعفه. عندئذ المطلوب هو:
- أ- هل عملية الإرفاق هذه تعطي متغيراً عشوائياً، وما هو نوعه ؟
- ب- مثل هذا المتغير العشوائي جدولياً.
- ج- مثل هذا المتغير العشوائي بيانياً.
- د- ما هو احتمال حصولنا على القيمة 9 أو 12 ؟

- ٢- ليكن Ω فضاء حوادث ابتدائية لتجربة عشوائية، و X متغير عشوائي على Ω مُعطى بالعلاقة الآتية:

$$P(X = x) = c(x^2 + 2) \quad ; \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

والمطلوب:

- أ- عين قيمة الثابت c .
- ب- اكتب العلاقات التي تُعطي الاحتمالات الكتلية لهذا المتغير العشوائي.
- ج- مثل هذا المتغير العشوائي جدولياً.
- د- مثل هذا المتغير العشوائي بيانياً.
- ٣- ليكن Ω فضاء الحوادث الابتدائية لتجربة إلقاء حجري نرد متمايزين ومتوازنين لمرة واحدة، وليكن X تطبيقاً حقيقياً معرفاً على Ω كما يلي:

$$X((i, j)) := \begin{cases} -1 & \text{for } i + j > 10 \\ 1 & \text{for } i + j \leq 10 \end{cases} \quad ; \quad i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

والمطلوب ما يلي:

- أ- هل التطبيق X هو متغير عشوائي على Ω .
- ب- مثل هذا المتغير العشوائي جدولياً.
- ج- مثل هذا المتغير العشوائي بيانياً.
- د- عين دالة توزيع X وارسمها.
- هـ- استخدم دالة توزيع X في حساب الاحتمال $P(-3 \leq X < 0)$.

- ٤- لدى عملية تصنيع منتج من نوع مُحدد تقوم لجنة تفتيش عن الجودة بسحب عشوائي لمجموعات كل منها مكونة من ثلاثة عناصر منتجة وذلك بغية تفتيشها والتحقق من أنها تلبّي المواصفات المطلوبة، فإذا كُنّا ننظر إلى حصولنا على مكون معيب أنه نجاح Success، وأن لجميع العناصر النصيب نفسه في الاختيار، فعندئذ إذا تم سحب ثمان مجموعات وكانت نتائجها كما في الجدول الآتي (علماً أن الحرف S و F في الجدول الآتي يعني النجاح والفشل على الترتيب):

1	2	3	4	5	6	7	8	المجموعة ذات الرقم
SSS	SFS	SSF	FSS	SFF	FSF	FFS	FFF	نتائج السحب

وبفرض X هو متغير عشوائي راصداً لعدد مرّات النجاح في السحوبات جميعاً، فعندئذ:

أ- مثل هذا المتغير العشوائي جدولياً.

ب- مثل هذا المتغير العشوائي بيانياً.

٥- لنفترض أنّ متغيراً عشوائياً X قدّم من خلال الجدول الآتي:


X قيم x_i	0	1	2	3	4	5	Total
$p_i = \mathbf{P}(X = x_i)$	0.15	0.20	?	0.25	0.07	0.03	1

والمطلوب:

أ- عين القيمة المجهولة في جدول توزيع X .

ج- مثل هذا المتغير العشوائي بيانياً.

٦- لنفترض أنّ متغيراً عشوائياً X قدّم بيانياً من خلال الشكل الآتي:



والمطلوب:

أ- عين العلاقات التي تميز هذا المتغير العشوائي X .

ب- مثل هذا المتغير العشوائي جدولياً.

٧- يوجد على رف 15 كتاباً منها 4 كتب في الأدب العربي والباقي في موضوعاتٍ أخرى. قمنا بسحب عشوائي لـ 3 كتب من تلك التي على الرف، فإذا علمت أنّ لجميع الكتب النصيب نفسه في السحب (أو الاختيار)، فعندئذ:

أ- إذا كان السحب يتم على التوالي، فما هو احتمال أن يكون لدينا كتابين في الأدب العربي من تلك التي قمنا بسحبها.

ب- إذا كان السحب يتم على دفعة واحدة، فما هو احتمال أن يكون لدينا كتابين على الأقل في الأدب العربي من تلك التي قمنا بسحبها.

٨- قذفت قطعة نقود متوازنة لثلاث مرّات متتالية، وليكن X متغير عشوائي راصد لعدد الشعارات التي سنحصل عليها، والمطلوب:

تمارين

- أ- ما هو احتمال حصولنا على شعارين؟
 ب- ما هو احتمال حصولنا على شعارين على الأكثر؟
 ج- ما هو احتمال عدم حصولنا على شعار واحد على الأكثر؟
- ٩- يوجد في مؤسسة تجارية 100 عامل منهم 30 أجنبياً. أرادت هذه المؤسسة تشكيل ورشة عمل لتطوير عملها فقامت باختيار عشوائي لـ 15 عاملاً، عندئذ ما هو:
 أ- احتمال وجود 10 عمال أجانب في المجموعة المختارة؟
 ب- احتمال وجود 3 عمال أجانب على الأقل في المجموعة المختارة؟
 ج- احتمال عدم وجود أي عامل أجنبي في المجموعة المختارة؟
- ١٠- ليكن لدينا X هو متغير عشوائي معطى جدولياً كما يلي:

x_i	1	2	3	4	5	Total
$p_i = \mathbf{P}(X = x_i)$	0.15	0.35	0.25	0.13	0.12	0.15

- والمطلوب حساب التوقع الرياضي، التباين والانحراف المعياري لهذا المتغير العشوائي.
- ١١- بفرض أن باحثاً يقوم بتنفيذ تجربة ما وقد يضطر إلى تكرارها لمرات عديدة، فإذا علمت أن هذه التكرارات تتم بشكل مستقل كل منها عن الأخرى، وأن احتمال النجاح في أية تجربة يساوي 0.65، فعندئذ:
 أ- إذا كان سيكرر التجربة حتى الحصول على نجاح لأول مرة، فما هو احتمال أن يكون قد نفذ خمس تجارب؟
 ب- إذا قام بتكرار التجربة لسبع مرات متتالية، فما هو احتمال أن يكون قد نجح في خمس منها على الأكثر؟
- ١٢- لنقم بإلقاء قطعة نقود متوازنة لتسع مرات متتالية، فما هو احتمال الحصول على شعارين على الأقل خلال الرميات التسع؟
- ١٣- لدينا صندوق يحوي n كرة متماثلة تماماً وسُجِّل على إحداها عبارة رابح، فلو قام شخص ما بعمليات سحب مع الإعادة لكرة من هذا الصندوق وبحيث تُخلط الكرات جيداً بعد كل إعادة، فإذا علمت أن هذا الشخص سيتوقف عن السحب لدى حصوله على الكرة الراححة، فعندئذ:
 أ- ما هو احتمال أن يتوقف عن السحب بعد أن يكون عدد الكرات المسحوبة يساوي نصف عدد الكرات التي في الصندوق؟
 ب- أعد الطلب السابق إذا كان $n = 50$ ثم من أجل $n = 100$ ، وماذا تلاحظ.
- ١٤- في معمل للحاسوب يوجد 25 جهازاً منها ثلاثة أجهزة معطلة، قام ثلاثة طلاب (وبشكل عشوائي) بالجلوس أمام ثلاثة أجهزة كل على انفراد ودون معرفتهم بالأجهزة المعطلة، وذلك من أجل تأدية اختبار لمقرر، فما هو احتمال أن يتمكنوا الثلاثة من تأدية اختباراتهم؟

١٥- إذا علمت أن الأخطاء المرتكبة في قياس الطول لقضبان معدنية من نوع معين تتوزع طبيعياً معيارياً، قمنا بسحب عشوائي لقضيب من المنتج الكلي، فما هو احتمال أن يكون في طوله زيادة بمقدار 0.75 من وحدة القياس المستخدمة؟

١٦- ليكن X متغيراً عشوائياً له توزيع طبيعي بمعلمتين $\mu = 1$ و $\sigma = 0.75$ ، فإذا كان $-0.25 \leq X < 0.75$ ، فما هما القيمتان اللتان تقع بينهما قيمة المتغير العشوائي Z الناتج عن عملية الاستعيار X ؟

١٧- ليكن X متغيراً عشوائياً له توزيع طبيعي بمعلمتين $\mu = 1$ و $\sigma = 2$ ، والمطلوب:

أ- حساب الاحتمال $P(X < 1.53)$.

ب- حساب الاحتمال $P(X > -2.74)$.

ج- حساب الاحتمال $P(-2.74 \leq X < 1.53)$.

١٨- ليكن X متغيراً عشوائياً له توزيع طبيعي بمعلمتين $\mu = -2$ و $\sigma = 1.5$ ، والمطلوب:

أ- تعيين قيمة x إذا كان $P(X < x) = 0.9750$.

ب- تعيين قيمة x إذا كان $P(X > x) = 0.8549$.

١٩- إذا كانت درجة غليان ماء الشرب في المنازل (مقدرة بالدرجات المئوية) تتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط $\mu = 107$ درجة مئوية وبانحراف معياري $\sigma = 3$ درجات مئوية، وأختيرت عينة من خطوط المياه في أحد المنازل، فما هو احتمال:

أ- أن تكون درجة غليان الماء لهذه العينة أدنى من 105 درجات مئوية؟

ب- أن تكون درجة غليان الماء لهذه العينة أعلى من 110 درجات مئوية؟

ج- أن تكون درجة غليان الماء لهذه العينة ما بين 100 و107 درجات مئوية؟

المراجع


- ① Dimitri P. Bertsekas & John N. Tsitsiklis; **Introduction to Probability**; Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis; 2002.
- ② Douglas C. Montgomery & George C. Runger; **Applied Statistics and Probability for Engineers** -Third Edition; John Wiley & Sons, Inc; 2003.
- ③ Fisz, M.; **Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik**; VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin; 1980.
- ④ Gnedenko, B. W.; **Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung**; Akademie – Verlag. Berlin; 1987.
- ⑤ Krause, B. & Metzler, P.; **Angewandte Statistik**; VEB Deutscher-Verlag der Wessenschaften Berlin; 1988.
- ⑥ Kristian, H.; **Angewandte Wahrscheinlichkeitsthorie**; Friedr, Vieweg and Sohn, verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig , Wiesbaden; 2003.
- ⑦ Loeve, M.; **Probability Theory (I + II)**; Springer, New York; 1978.
- ⑧ Richard J. Larsen & Morris L. Marx; **Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications** - 5/E; Pearson • Cloth, 768 pp; 2012.
- ⑨ Ronald E. Walpole & Raymond H. Myers & Sharon L. Myers & Keying Ye; **Probability & Statistics for Engineers & Scientists** – Ninth Edition; Pearson Education, Inc; 2012.
- ⑩ Sirijaev, A.N.; **Wahrscheinlichkeit**; VEB Deutscher-Verlag der Wessenschaften Berlin; 1988.
- ⑪ Trevor Hastie & Robert Tibshirani & Jerome Friedmann; **The Elements of Statistical Learning - Second Edition**; Springer Science+Business Media, LLC; 2009.

مراجع ومعاجم عربية

- ① حميد عويّد العكله و عبيد جفين القحطاني - الاحصاء والاحتمالات (نظرية وتطبيقات) - دار جامعة الملك سعود للنشر - الرياض 2107 (قيد الطباعة).
- ② على مصطفى بن الأشتر- **معجم الرياضيات**- دار النشر أكاديميا - بيروت 1995.
- ③ عدنان، ف.م. - باقر، س.ط. - العايدي، ص.ن. - فران، ه.ر. و العقيل، ع.س.ه. - **معجم الرياضيات** - منشورات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1990.

جدول التوزيع الطبيعي المعياري


Standard Normal Distribution Table



من أجل القيم الموجبة لـ Z

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998
3.50 and up	.9999									

جدول التوزيع الطبيعي المعياري Standard Normal Distribution Table



من أجل القيم السالبة لـ Z

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.50 and lower	.0001									
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

ثبت المصطلحات

A	Absolute Frequency	قانون الجمع (في الاحتمالات)
	Addition Law	قاعدة الجمع (في الحساب)
	Additive Rule	حادث شبه أكيد
	Almost Certainly Event	حادث شبه مستحيل
	Almost Impossible Event	التكرار المتجمّع الصاعد
	Ascending Cumulative Frequency	مضلع التكرار المتجمّع الصاعد
	Ascending Cumulative Frequency (Ogive)	الخاصة التجميعية
	Associative Property	
B	Bar Graph	العرض الشرائطي
	Bar Notation	طريقة القاعدة (لتعيين مجموعة)
	Bays's Formula	صيغة بيز (في الاحتمالات)
	Bernoulli Distribution	توزيع برنولي
	Bernoulli Experiment	تجربة برنولية
	Bernoulli Random Variable	متغير عشوائي برنولي
	Bijective	خاصية التقابل (للدوال والتطبيقات)
	Bijective Function	دالة تقابل
	Binomial Distribution	التوزيع الحداني
	Binomial Random Variable	متغير عشوائي برنولي
	Box plot	العرض (أو التمثيل) الصندوقي
	C	Cardinality of a Set
Causal Chain Relation		علاقة السلسلة السببية
Causal Correlation		الارتباط السببي
Celsius		وحدة (الدرجة المئوية) لقياس الحرارة
Central Tendency Measure		مقياس نزعة مركزيّة
Certain Event		الحادث الأكيد
Class (Group, Category or Interval)		الفئة (في جدول تكراري)
Class Boundaries		الحدود العمليّة للفئة
Class Limit		الحدود الفعلية للفئة
Classes Table		جدول تكراري
Classical Definition of Probability		التعريف التقليدي للاحتمال
Coefficient of Determination		مُعامل التحديد
Coefficient of Dispersion		مُعامل التشتت

Coefficient of Skewness	مُعامل الالتواء
Coefficient of Skewness	مُعامل الالتواء
Coefficient of Variation	مُعامل التغيُّر
Coin	قطعة نقود معدنية
Combinations	التوافيق
Complement of an Event	متمّم حادث
Comprehensive Survey	المسح الشامل
Commutative Property	الخاصة التبدليّة (أو التناظرية)
Conditional Probability	الاحتمال الشرطي
Constant	ثابت
Constant Function	الدالة الثابتة
Continuous	مستمرّ (أو متصل)
Continuous Probability Distribution	توزيع احتمالي مستمرّ
Continuous Random Variable	متغيّر عشوائي مستمر
Continuous Set	مجموعة مستمرة (أو متصلة)
Continuous Variable	متغيّر مستمرّ
Correlation	الارتباط
Correlation Coefficients	مُعاملات الارتباط
Countable Set	مجموعة قابلة للعدّ
Cumulative Distribution Function	دالة التوزيع التراكمية
Curve	خط منحن
Curves Fitting	توفيق المنحنيات
D Degenerate Distribution	التوزيع المضمحل
Degree	درجة
De Morgan's laws	قانونا ديمورغان
Dependent Variable	المتغيّر التابع
Descending Cumulative Frequency	التكرار المتجمّع الهابط
Descending Cumulative Frequency Polygon	مضلع التكرار المتجمّع الهابط
Descriptive Measures	مقاييس وصفية
Descriptive Statistics	الإحصاء الوصفي
Difference	الفرق (ورمزه Δ)
Discrete	متقطّع (أو منفصل)
Discrete Probability Distribution	توزيع احتمالي متقطّع

	Discrete Random Variable	متغير عشوائي متقطع
	Discrete Variable	متغير متقطع
	Dispersion Measure	مقياس تشتت
	Distributive Property	الخاصة التوزيعية
	Domain	المنطلق (أو مجموعة التعريف)
	Domain of a Function	المنطلق (أو مجموعة التعريف) لدالة
	Domain of a Map	المنطلق (أو مجموعة التعريف) لتطبيق
	Dots Representation	التمثيل النقطي
	Draw with Replacement	السحب مع الإعادة (أو الإرجاع)
	Draw without Replacement	السحب بدون إعادة (أو بدون الإرجاع)
E	Element	عنصر
	Elementary Event	حادث ابتدائي
	Empirical Variance	التباين العملي (أو تباين العينة)
	Enumerative Representation	التمثيل السردى (لتعيين مجموعة)
	Error	الخطأ
	Existential Quantifier	مُحدِّد الكميَّة الوجودي (ورمزه \exists)
	Extreme Value	قيمة متطرفة
F	Fahrenheit	وحدة (فهرنهايت) لقياس الحرارة
	Failure Probability	احتمال الفشل
	First Quartile (or Lower Quartile Q_1)	الربيعي الأول (أو الربيعي الأدنى)
	Five Number and the Box plot	الأعداد الخمسة والتمثيل الصندوقي للبيانات
	Forecasting	تنبؤ
	Form Measures	مقياس الشكل
	Frequency	تكرار (عدد مرَّات تحقُّق شيء)
	Frequency Curve	منحني تكراري
	Frequency Distribution Table	جدول توزيع تكراري
	Frequency Histogram	مدرج تكراري
	Frequency of Class	تكرار الفئة
	Frequency Polygon	مضلع تكراري
	Frequency Table	جدول تكراري
G	Geometric Distribution	التوزيع الهندسي

	Graphing of Data	عرض البيانات
	Grouped Data	بيانات مُجمَّعة (بيانات مُجدولة)
	Growth Function	دالة النمو
H	Head	صورة (يقابلها الكتابة على قطع النقود المعدنية)
	High-Size Sample	عيّنة كبيرة الحجم
	Hypergeometric Distribution	التوزيع فوق الهندسي (أو الفوهندسي)
I	Image	صورة
	Image of a Function	صورة دالة
	Image of a Map	صورة تطبيق
	Impossible Event	الحادث المستحيل
	Independence of Events	استقلال حوادث
	Independent	مستقل
	Independent Events	حوادث مستقلة
	Independent Random Variables	متغيّرات عشوائية مستقلة
	Independent Variables	متغيّرات مستقلة
	Inferential Statistics	الإحصاء الاستدلالي
	Initial Element	عنصر البدء
	Injective (or One-to-one)	خاصية التباين (للدوال والتطبيقات)
	Injective Function (or One-to-one Function)	دالة متباينة
	Integer Numbers	الأعداد الصحيحة
	Intentional Samples	عيّنات عمدية (أو قصدية)
	Interquartile Range (IQR)	المدى الربيعي
	Intersection	التقاطع (ورمزه \cap)
	Interval Scale	مقياس الفترة
	Inverse image of a set	الصورة العكسية لمجموعة
	Irrational Numbers	الأعداد غير النسبية (أو الأعداد الصماء)
K	Kelvin	وحدة (الكلفين) لقياس الحرارة المنخفضة جداً
	Kurtosis	التفطح (أو التفرطح)
	Kurtosis Measure	مقياس التفطح
L	Least Square Method	طريقة المربعات الصغرى
	Length of Class	سعة الفئة (في جدول تكراري)

	Leptokurtic Distribution	توزيع مدبب	
	Linear	خطي	
	Linear Correlation Coefficient	مُعامل الارتباط الخطي	
	Linear Function	دالة خطية	
	Lowest Fence	الحاجز الأدنى (أو أدنى حاجز)	
M	Map	تطبيق	
	Mathematical Expectation	التوقع الرياضي	
	Mathematical Statistics	الإحصاء الرياضي	
	Mean (or Arithmetic Mean)	المتوسط (أو المتوسط الحسابي)	
	Mean of Sample	متوسط العينة	
	Measure	قياس	
	Median	الوسيط	
	Mesokurtic Distribution	توزيع معتدل	
	Midpoint	مركز الفئة (في جدول تكراري)	
	Mode	المنوال	
	Monetary Units	وحدة نقدية	
	Monotone	مطرّد	
	Monotony	الاطراد	
	Multimodal Symmetric Distribution	توزيع متناظر متعدّد المنوال	
	Multiplication Law	قانون الضرب (في الاحتمالات)	
	Multiplication Rule	قاعدة الضرب (في الحساب)	
Mutually Exclusive Events	حوادث متنافية		
	Natural Numbers	الأعداد الطبيعية	
N	Negative Skewed Distribution	توزيع سالب الالتواء	
	Nominal Scale	مقياس اسمي	
	Non Linear Correlation	الارتباط غير الخطي	
	Non Symmetric Distributions	توزيع تكراري غير متناظر	
	Normal (or Gaussian) Distribution	التوزيع الطبيعي (أو التوزيع الغاوسي)	
	Number of Classes	عدد الفئات	
	O	Observation	ملحوظة (أو مشاهدة)
		Observation Values	قيم ملحوظة (أو مشاهدة)

One Point Distribution	التوزيع وحيد النقطة
One-to-one Function	دالة واحد لواحد (أو دالة متباينة)
Ordinal Scale	مقياس ترتيبي
Origin Point	نقطة الأصل (أو مبدأ الإحداثيات)
Outcome	نتيجة (نتيجة تجربة)
Outlier Value	قيمة منعزلة (أو متطرفة)
P Pairwise Independent	مستقلة مثنى مثنى
Pairwise Mutually Exclusive Events	حوادث متنافية مثنى مثنى
Parameter	معلمة
Partition of a Set	التجزئة لمجموعة
Percent Frequency	التكرار المئوي
Percentile (Percentiles)	مئين (المئينات)
Percentile Frequency Histogram	مدرج تكراري مئوي
Permutation	التباديل
Person's Coefficient of Correlation	مُعامل بيرسون للارتباط
Pie Chart	التمثيل بالقطاعات الدائرية (أو بالقرص الدائري)
Platykurtic Distribution	توزيع منبسط
Playing Cards	بطاقات لعب
Polygon	مضلع (تمثيل بقطع مستقيمة متتالية)
Population	مجتمع إحصائي
Population Parameter	وسيط مجتمع إحصائي
Position Measure	مقياس موضع
Positive Skewed Distribution	توزيع موجب الالتواء
Predicted Value	قيمة مُقدّرة (أو قيمة متنبأ بها)
Probability Function	الدالة الاحتمالية
Probability Mass	الكتلة الاحتمالية
Probability Mass Function	دالة الكتلة الاحتمالية
Probability Theory	نظرية الاحتمالات
Pull with Return (or with Replacement)	السحب مع الإرجاع (أو الاستبدال)
Pull without Return (without Replacement)	السحب بدون إرجاع (أو بدون استبدال)
Q Qualitative Data	بيانات نوعية
Qualitative Variables	متغيرات نوعية

Quantitative Data	بيانات كمية
Quantitative Variable	متغير كمي
Quartile (Quartiles)	ربيعي (ربيعيات)
R Random Experiment	تجربة عشوائية
Random Sample	عيّنة عشوائية
Random Variable	متغير عشوائي
Range	المدى (تستخدم من أجل البيانات والدوال والتطبيقات)
Range of a Function	مدى دالة
Range of a Map	مدى تطبيق
Rank	رتبة
Ration Scale	مقياس النسبة
Rational Numbers	الأعداد النسبية
Raw Data	بيانات خام
Real Function	دالة حقيقية
Real Numbers	الأعداد الحقيقية
Reciprocal Correlation	الارتباط التبادلي
Reciprocal Relation	علاقة تبادلية
Regression	علم الانحدار
Regression Equation	معادلة انحدار
Regression Line	خط انحدار
Regular Experiment	تجربة نظامية
Relative Frequency	التكرار النسبي
Relative Frequency Histogram	مدرج تكراري نسبي
Relative Value	قيمة نسبية
Residual	الباقي
r-Percentile (or rth Percentile)	المئيني الرائي
S Sample	عيّنة
Sample Function	دالة عيّنة
Sampling Distribution	توزيع المعاينة
Sampling Theory	نظرية المعاينة
Scatter Measure	مقياس التبعثر (تسمية أخرى لمقياس التشتت)
Scatter Plot	لوحة الانتشار

Second Quartile	الرابعي الثاني
Set	مجموعة
Set of Outcomes	مجموعة نتائج
Simple Correlation	الارتباط البسيط
Simple Event	حادث بسيط
Simple Function	دالة بسيطة
Simple Linear Correlation	الارتباط الخطي البسيط
Simple Random Sample	العينة العشوائية البسيطة
Size of Population	حجم المجتمع
Size of Sample	حجم العينة
Skewed Frequency Distribution	توزيع تكراري ملتوي
Skewed to the Left Distribution	توزيع ملتوي نحو اليسار
Skewed to the Right Distribution	توزيع ملتوي نحو اليمين
Skewness Measure	مقياس التواء
Space of Elementary Events	فضاء الحوادث الابتدائية
Spline	التمهيد الشرائحي
Spread Measures	مقياس الانتشار (تسمية أخرى لمقياس التشتت)
Spurious Correlation	الارتباط الوهمي
Standard Deviation	الانحراف المعياري
Standard Deviation	الانحراف المعياري
Standard Score	درجة معيارية
Standardization	استعياره (أي جعله معيارياً)
Statistic	إحصاء
Statistical Independent	مستقلة إحصائياً
Statistical Inference	الاستدلال الإحصائي
Statistics	علم الإحصاء
Steiner Formula	صيغة شتاينر
Stem and Leafs Table	جدول الساق والأوراق
Step Function	دالة درجية
Stochastic	علم العشوائيات
Stochastic Independent	مستقلة عشوائياً
Straight Regression	مستقيم الانحدار
Stratified Sample	عينة طبقية
Subset	مجموعة جزئية

	Success Probability	احتمال النجاح
	Surjective	خاصية الغمور (للدوال والتطبيقات)
	Surjective Function	دالة غامرة
	Symmetric Difference	الفرق التناظري (ورمزه Δ)
	Symmetric Frequency Distribution	توزيع تكراري متناظر
T	Tail	شعار (في تجربة قذف قطعة نقود معدنية)
	Tally	التعداد (تعداد عناصر فئة في جدول تكراري)
	Third Quartile (or Upper Quartile Q_3)	الربيعي الثالث (أو الربيعي الأعلى)
	Total Probability Formula	صيغة الاحتمال التام (أو الكلي)
	Tow Point Distribution	التوزيع ثنائي النقطة
U	Uncountable Set	غير قابلة للعد
	Unidirectional Relation	علاقة وحيد الاتجاه
	Unimodal Symmetric Distribution	توزيع متناظر أحادي المنوال
	Union	الاتحاد (أو الاجتماع ورمزه \cup)
	Universal Quantifier	محدد الكمية الكلي (أو الشامل، ورمزه \forall)
V	Variability Measures	مقاييس الاختلاف (مقاييس للتبعثر أو للتشتت)
	Variable	متغير
	Variance	التباين
	Variance of Sample	تباين العينة
W	Weighted Mean	المتوسط الموزون
	Whiskers	الشعيرتان (شعيرتي التمثيل الصندوقي للبيانات)
Z	Z-Score	الدرجة المعيارية Z

