




موقع منهجي
www.mnhaji.com



ملخص الرياضيات

الصف الثاني المتوسط

الفصل الدراسي الاول

ملخص
مادة الرياضيات
الصف الثاني متوسط
الفصل الدراسي الاول

الفصل الأول

الجبر: الأعداد النسبية

(١-١) الأعداد النسبية

(٢-١) مقارنة الأعداد النسبية

(٣-١) ضرب الأعداد النسبية

(٤-١) قسمة الأعداد النسبية

(٥-١) جمع الأعداد النسبية ذات

المقامات المتشابهة وطرحها

(٦-١) جمع الأعداد النسبية ذات

المقامات المختلفة وطرحها

(٧-١) استراتيجية حل المسألة

(البحث عن نمط)

(٨-١) القوى والأسس

(٩-١) الصيغة العلمية



(١-١) الأعداد النسبية

الأعداد النسبية

أعداد
كسريّة

$$\frac{4}{10}$$

كسور
عشرية

$$0.4$$

كسور
العُشاريّة

$$\frac{4}{100}$$

تحويل عدد كسري إلى كسر عُشاري

$$\frac{34}{11} = \frac{1}{11} + \frac{1}{11} + \frac{1}{11} + \frac{1}{11} + \frac{1}{11} \Leftrightarrow \frac{3}{11} + \frac{1}{11} \times 3$$

تحويل كسر العُشاري إلى كسر عشرى

$$0.\overline{2} = \frac{2}{9} \quad \text{بالقصمة المطولة}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$


تحويل الكسر العشرى إلى كسر عُشاري

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{l} \text{في} \\ \text{أبسط} \\ \text{صورة} \end{array} \right] \frac{7}{0.9} = \frac{7 \times 100}{9 \times 100} = \frac{700}{900} = \frac{70}{90} = \frac{7}{9} \\ & \frac{7}{9} = 0.\overline{777} \end{aligned}$$



(٤-١) مقارنة الأعداد النسبية وتنبيهها

لقارنة الأعداد النسبية



* مع مراعاة الاشارات عند لقارنة

$$3 > 2$$

$$\frac{3}{0} > \frac{2}{0}$$

مختلف نوحد مقام

$$\frac{3}{1} < \frac{2}{1} \quad c \times c = c$$

$$2 \frac{1}{2} > 1 \frac{1}{2}$$



(١-٣) نوب الأعداد النسبية

$$\frac{\frac{5}{6} \times \frac{1}{5}}{\frac{5}{6} \times \frac{1}{5}} = \frac{5}{6} \times \frac{1}{5}$$

نوب كسر اعتيادي في

عدد صحيح	عدد كسري	كسر عشري
العدد صحيح دالما هما	نحو العدد الكسرى إلى	نحو العدد العشري إلى
العدد	كسر اعتيادي	كسر اعتيادي
$\frac{5}{6} \times \frac{1}{5}$	$\frac{1}{6} \times \frac{3}{5}$	$\frac{9}{10} \times \frac{7}{8}$
$\frac{5}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{0 \times 5}{3 \times 1} =$	$\frac{1}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{1 \times 7}{2 \times 5} =$	$\frac{9}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{9 \times 7}{10 \times 8} =$

* الناتج دائمًا في أبسط صورة

$- = -x +$	قاعدية	$+ = -x -$
$- = +x -$	الإشارات	$+ = +x +$



(٤) قسمة الأعداد النسبية

النَّكِيرُ الْضَّرِيبيُّ مُسَمٌ بـ $\frac{b}{a}$ هُوَ

الإسْارَةُ لَا تَتَغَيِّرُ


قسمة الأعداد النسبية

١ انزال الأسرا الأول

٢ تغيير $a \div b$ إلى $b \div a$

٣ الذظير الضريبي للكسن الثاني

$$\frac{a}{b} \times \frac{0}{c} = \frac{a}{b} : \frac{c}{0}$$



قاعدة الإشارات :

$$+ = - \times -$$

$$- = + \times -$$



(١-٥) جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة

$$\frac{\frac{4}{5} + \frac{1}{5}}{5} = \frac{4+1}{5} = \frac{5}{5}$$

**جمع الأعداد النسبية وطرحها
إذا المقامات متشابهـة**

الأعداد الكسرية

$$\frac{3}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3-5}{8} = \frac{-2}{8}$$

الكسور الاعتيادية

$$\frac{3}{2} = \frac{3 \div 3}{2 \div 3} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\frac{7}{9} - \frac{2}{9} = \frac{7-2}{9} = \frac{5}{9}$$

في أبسط صورة

قاعدة
الإشارات

$$\begin{aligned} + &= + \\ - &= - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{أكبر} &= \text{إشارة} \\ \text{أصغر} &= \text{عدم} \end{aligned}$$



(٦) جمع الأعداد النسبية ذات القوام المختلف

جمع الأعداد النسبية ذات القوام المختلف

طريق بـ ٢ قوامان
في بعضها

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{4}{12} + \frac{3}{12}$$

$$\frac{7}{12}$$

طريق
المترافق

$$\frac{3}{7} - \frac{1}{14}$$

$$= \frac{6}{14} - \frac{1}{14}$$

$$\frac{5}{14}$$

جعل أحد
القامين كالأخر

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{7}$$

$$= \frac{7}{14} + \frac{10}{14}$$

$$= \frac{17}{14}$$

* الناتج يجب في أبسط صورة

قائمة
الإشارات

{ وتحمّل

- = - 9 -

+ = + 9 +

{ وتحمّل
أشاره أكبر

- = + 9 -

+ = - 9 +




+ = (-) -



(٧-١) استراتيجية حل المسائل

البحث عن نمط

أوجد محيط السهيلين التاليين من النقط إذا علمنا
أن المثلث هنطاقية الأضلاع وطول كل
ثلاثي هو ٤ م ..



تعلم أن المثلث منتظمي الأضلاع وتعلم حول
الأضلاع ، أيضاً أشكال توضح عدد أضلاع كل شكل ..
احسب محيط الأشكال المعطاة وبنفس عن نمط
تسير به في الأشكال التالية ..

افهم

نسخة جدول كالتالي ..

خط

حل

الرقم	الرابع	الثالث	الثاني	الحادي	الأول	الشكل
٢٨	٢٤	٢٠	١٦	١٢	محيط	

$\curvearrowleft + \curvearrowleft + \curvearrowleft + \curvearrowleft$

محيط السهيلين التاليين هو ٣٢٨ + ٣٢٤

تحقق من النمط للتأكد من الإجابات لصحتها

تحقق



(٨١) القوى والأسس

$$c^4 = c \times c \times c \times c$$

c = c c c c
الأساس

الأس = عدد تكرار الأساس

$$7^3 = \boxed{7} \times \boxed{\frac{7}{7}} \times \boxed{\frac{7}{7}} \times \boxed{7} \times \boxed{\frac{7}{7}}$$

قيمة "العبارة الأسية"

$$\frac{1}{3375} = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \left(\frac{1}{10}\right)^3$$

↑ $\frac{1 \times 1 \times 1}{10 \times 10 \times 10}$

ثم نجري عملية الضرب

قواعد مهمة


$$\frac{1}{c} = c^{-1} \quad 1 = 1^0$$

$$c^0 = 1^1$$

$$\frac{1}{c^m} = \text{النطير لـ } c^m \quad \left(\frac{1}{c}\right)^m$$



(١-٩) الميغة العلمية



الفصل الثاني

الأعداد الحقيقية ونظرية فيثاغورس

(١-٢) الجذور التربيعية

(٢-٢) تقدير الجذور التربيعية

(٣-٢) استراتيجية حل المسألة

• (استعمال أشكال فن)

(٤-٢) الأعداد الحقيقة

(٥-٢) نظرية فيثاغورس

(٦-٢) تطبيقات على نظرية فيثاغورس

(٧-٢) هندسة:

• الابعاد في المستوى الاحداثي



(١-٢) الجذر التربيعي

$$\sqrt{a} = \sqrt{b} \Leftrightarrow a = b^2$$

$$c = \sqrt{3} \quad 0 = \sqrt{0} \quad d = \sqrt{36}$$

قواعد هامة

$$\frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{cd}} = \sqrt{\frac{ab}{cd}} \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$c - = \sqrt{3} - \Leftrightarrow \text{الإجابة} - = \sqrt{1} -$$

$$\sqrt{v} = \sqrt{u} \Leftrightarrow u = v$$

حل المعادلات باستعمال الجذر

$$t^2 = 169$$

١ أخذ الجذر التربيعي للطرفين

٢ الناتج \pm

$$\sqrt{169} = \pm \sqrt{13} \Leftrightarrow t = \pm 13$$



(٤-٩) تقدیم الجذور التربيعیة


بعض الجذور قيمتها كسور عشرية

$$4,12310568\dots = \sqrt{171}$$

وللحصول على قيمة مقربة نقدره

$$\begin{array}{ccc} \text{جذر} & & \text{جذر} \\ \text{تربيعى} & > \sqrt{171} & \text{تربيعى} \\ \text{عدد صحيح} & \downarrow & \text{عدد صحيح} \\ \frac{1}{\cancel{0}} & = 4 & \frac{1}{\cancel{1}} \\ 0 = & \xrightarrow{\text{أقرب إى}} & 4 = \end{array}$$

لذلك فإن $\sqrt{171} \approx 4$





(٣-٢) استرا تيجية حل المسئلہ

استعمال اشكال قن

عالج طيب بسيطوي . ٢٠ خروفًا و ١٦ بقرة و ١١ جملًا في أسبوع واحد، بعض الأشخاص لديهم أكثر من نوع واحد من الحيوانات ، كما هو مبين في الجدول ..

	المجموع	البقر	الخروف	الجمل	الحيوانات
المالكين	٢	٣	٥	٧	٣٠

* ما عدد المالكين
للخراف فقط ؟

نعلم أن الطيب عالج ٣٠ خروف و ١٦ بقر و ١١ جملًا وهنالك عدد للمالكين لكل صنف حسب الجدول .


ذنبنخ الأعداد للحيوانات باستعمال اشكال قن ..

افهم

خطط

حل

ما عدد المالكين للخراف فقط ؟



$$\text{الخراف} = 5 - 2 - 3 = 0$$

$$\text{الجمال} = 3 - 2 - 5 = 1$$

$$\text{البقر} = 20 - 16 - 11 = 3$$

ماديي الخراف فقط = ٠ أشخاص ..

تحقق من النقطة سؤاله من الاجابة ..

تحقق



(٤-٢) الأعداد الحقيقة

الأعداد الحقيقة

أعداد غير نسبية

- ① يمثلون أداً تليّن على صورة
كسر اعتيادي
② كسors عشرية

غير متناهية و غير دورية
 $\pi, \sqrt{2}, \sqrt[3]{5}$...
أعداد مختلفة

أعداد نسبية

- صورتها كسر
كسور عشرية

متناهية
غير متناهية
 $1,234\ldots$
 $1,\overline{2}$

لمقارنة الأعداد الصحيحة

نقرب المواتج إلى أقرب جزء من عشرة أو مائة

$$4,3210\ldots < 4,322 < 4,32 \quad >$$

خصائص الأعداد الحقيقة

$$3 = 1 \times 3 / c = 0 + c \quad ④ \text{ العنصر един}$$

$$0 = (c -) + c \quad ⑤ \text{ النضر الجمعي} \quad (3+4)+0 = 3+(4+0)$$

$$1 = \frac{3}{1} \times \frac{1}{3} \quad ⑥ \text{ النضر الضوبي}$$

$$0 + c = c + 0 \quad ① \text{ البدال}$$

$$7 \times c + 3 \times c = (7+3) c \quad ⑦ \text{ التوزيع}$$



(٤-٥) دُّرْبِيَّةٌ فِي ثَانِيَةِ عَوْدُس


$$ج = أ + ب$$



حالات إيجاد الظلوع المجهولة


الظلوع $ب$ = ?

$$ب = ج - أ$$




الظلوع $أ$ = ?

$$أ = ج - ب$$



الوتر $ج$ = ?

$$ج = أ + ب$$



كُوِّنِي دُّرْبِيَّةٌ فِي ثَانِيَةِ عَوْدُس

إذا أعطينا 3 أصول لـ ظلوع مثلث لا نعلم

أهوا قائم أم لا فإننا نتاج الآتي ..

٣ ٥ ١٤ ٣٦

١ أخذ أكبر عدد

٢ ٥ = ٥ ١٦ = ٤ ٩ = ٣

٣ نجمع مربعي العددين الآخرين

٤ $5^2 + 3^2 = 25 + 9 = 34$

٥ فإذا ساوى الناتج مربع العدد الأكبر

٦ فإن المثلث قائم الزاوية



(٦-٤) تطبيقات على نظرية فيثاغورس

في الحياة نحتاج لمعرفة أطول ومسافات لا شئ
معينه عنده مساحتها للوهلة الاولى بيه وكلئن
قائم الزاويه لذلك نستخدم نظرية فيثاغورس

$$ج^2 = أ^2 + ب^2$$



* مثلث ...

ما ارتفاع الخيمة؟


المجهول هو (أحد الأضلاع)

$$ج^2 = ج^2 - (\text{الضلوع الآخر})$$

$$ج^2 = ١٦ - ٩٠ =$$

$$ج = \sqrt{١٦ - ٩٠} =$$

ولأنه طول (ارتفاع) هو $ج = ٤$ أقدام



كم يبعد الثالث عن الولد؟

المجهول هو (وهو لوتر)

$$ج^2 = أ^2 + ب^2$$


$$ج^2 = ٥٣٠٠ + ٤٩٠٠ =$$

$$ج = \sqrt{٥٣٠٠ + ٤٩٠٠} =$$

$$ج = \sqrt{٧٢,٨٠} \approx ٨٠ \text{ قدمًا}$$



(٧-٨) الأبعاد في المستوى الأحادي



• نقطة الأصل - (٠٠٠)


تقاطع المحورين س و ص ..

(س ، ص)

الأحادي ليسني جا لـ الأحادي الصادي

* الارباع حسب الشكل ←

لابد احديان نقطة



① نرسم خط افقي يصل لمحور ص


② نرسم خط رأسى يصل لمحور س

③ العدد على محور س هو الأحادي ليسني

④ العدد على محور ص هو الأحادي الصادي

أ \leftrightarrow $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ب \leftrightarrow $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

المعرفة المسافة بين نقطتين



① نرسم خط يصل بين النقطتين

② نرسم خط افقي وآخر رأسى من كل نقطة ننسدل مثلث قائم الزاوية

③ نحسب عدد لمربعات للخط الافقى والرأسى

④ نوجد المسافة حاسباً حاصل قانون فيثاغورس .

$$ج^2 = أ^2 + ب^2 \quad \leftarrow \quad ج = \sqrt{أ^2 + ب^2}$$

الفصل الثالث

التناسب والتشابه

(١-٣) العلاقات المتناسبة وغير المتناسبة

(٢-٣) معدل التغير

(٣-٣) المعدل الثابت للتغير

(٤-٣) حل التناسب

(٥-٣) استراتيجية حل المسألة (الرسم)

(٦-٣) تشابه المضلعات

(٧-٣) التكبير والتصغير

(٨-٣) القياس الغير مباشر



(١-٣) العدقات المتزايدة وغير المتزايدة

العدقات

العلاقان
غير المتزايدة

النسبة بين الأكميتيين
غير ثابتة مختلفة

العلاقان
المتزايدة

النسبة بين الأكميتيين
ثابتة لا تتغير

* أمثلة

$\frac{\text{عدد فناجين السكر}}{\text{عدد أكواب الماء}} = \text{النسبة}$

٢	$1\frac{1}{2}$	١	$\frac{1}{2}$	فنجان سكر
٨	٦	٤	٢	كوب ماء

النسبة ثابتة

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{1} = 2 \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \times 3 = \frac{1}{2}$$

هـ الأكميـان متـزاـيدـة ..

$\frac{\text{المبلغ الإجمالي}}{\text{عدد الأسمايين}} = \text{النسبة}$

٤	٣	٢	١	الزمن (ساعة)
٠٠	٤٨٠	٤٦٠	٤٤٠	المبلغ الإجمالي

النسبة غير ثابتة

$$430 = \frac{460}{2}, \quad 440 = \frac{440}{1}$$

هـ الأكميـان غير متـزاـيدـة ..



(٢-٣) معدل التغير

المعدل يصف تغير كمية ما في علاقة بكمية أخرى

التغير هو \leftarrow

القيمة الثانية - القيمة التي تسبّب بها

الطول (سم)	١٤٥	١٣٠
العمر (سن)	١١	٨

$$\text{المعدل} = \frac{\text{التغير في طول}}{\text{التغير في عمر}} = \frac{١٣٠ - ١٤٥}{٨ - ١١} = ٥ \text{ سم في سنة}$$

معدل التغير

معدل التغير
الصافي


$$= \frac{\text{آخر}}{\text{أول}}$$

معدل تغير
السائل

$$= \frac{-\text{عدد}}{\text{عدد}}$$

معدل التغير
المويج


$$= \frac{+\text{عدد}}{\text{عدد}}$$



مثال لاعدل تغير سالب ..

$$\frac{\text{التغير في الدخل}}{\text{التغير في المستوى}} = \frac{٤٨٥ - ٤٥٩}{١٤٢٦ - ١٤٢٨} = ٠.٣$$

$$= \frac{٣}{٢} = ١٣ = ١٣ \text{ ألف في سنة}$$






(٣-٣) المعدل ثابت للتغير

إذا كان معدل التغير ثابتاً بين أي نقطتين خالعلاقه خطية

$$\text{معدل تغير} = \frac{\text{التغير في القيمة الأولى}}{\text{التغير في القيمة الثانية}}$$

معدل التغير (زيادة = + ، نقصان = -)

رسم بياني



معدل التغير (ثابت)

$$\text{المتغير في الزمن} = \frac{\text{المتغير في عدد العاملين}}{=}$$

$$\frac{5}{3} = \frac{10}{8} = \frac{70 - 60}{8 - 16} =$$

$$\frac{5}{4} = \frac{10}{16} = \frac{60 - 50}{16 - 24} =$$

$$\frac{5}{4} = \frac{10}{24} = \frac{50 - 40}{24 - 32} =$$

غير متساوٍ

$$\frac{5}{2}, \frac{5}{2}$$

جدول

الزمن (دقائق)	درجة الحرارة (س°)
٣٥	٥
٣٢	١٠
٣٠	١٥
٢٨	٢٠

معدل التغير (غير ثابت)

$$\text{المتغير في الزمن} = \frac{\text{المتغير في س}}{\text{المتغير في س}} =$$

$$\frac{5}{3} = \frac{5-10}{30-32} =$$

$$\frac{5}{2} = \frac{10-15}{32-30} =$$



(٤-٣) حل التفاسير

$$\frac{B}{D} = \frac{A}{C} \quad \text{حيث } B \neq 0, A \neq 0$$

$\div A$ $\div C$

أي أن النسبتين متكافئتان عند ضرب أو قسمة الكسر الأول ينتج لنا الكسر الثاني ..



كتابه تفاسير :

* دفع حازم ١٠,٩٥ ريالاً ثمناً لدرزن أقلام *
وحلمه لا يكاد ثمن ع أقلام (الدرزن = ١٢)

ضرب تبادلي

$$\frac{s}{4} \times 12 = 10,95$$

$\cancel{\times}$

الاقلام ←

$$s \times 12 = 4 \times 10,95$$

$s = 3,65$ ريالاً .. لأن المجهول الريال

كتابه معادلة ٥ :

* يحتاج التقاط ٣ صور إلى دقيقتين أكيد معاريله تمك
الفرق بين عدد الصور وهو الدقائق د، وكم يستغرق التقاط
١ صورة وفق المعدل نفسه -

$$\frac{3}{D} = \frac{75}{D} \Leftrightarrow \frac{3}{2} = \frac{1,5}{1} \Leftrightarrow \frac{3}{2} = 1,5$$

$\cancel{\times}$

الصور ←

الدقائق ←

أي أن $s = \frac{75}{D}$

$$s = 1,5 \Leftrightarrow D = \frac{1,5}{1,5} = 1 \text{ دقائق}$$



(٥-٣) استراتيجية حل المسئل

استراتيجية الرسم

حوض سعة ٥٠٠ لتر يصب فيه الماء بعمر ٨٠ لتر
خل ٦ دقائق . ما عدد الدقائق اللازمة لملء الحوض؟


نعلم ان سعة الحوض ٥٠٠ لتر . و اماه يصب بعمر

٨ لتر كل ٦ دقائق ..

نستعمل استراتيجية الرسم للتوضيح سريان بلاع
دا خل الحوض إلى أدنى يمتليء .. برسم مثل توضيحي ..

هناك كميات الدقائق واللترات للماء

فنكون محوران رأسي وأخر أفقي للتوضيح عدد الدقائق



تحقق من الاجابة التي توصلنا إليها من الشكل ..

تحقق

واللترات ..

$$d = \frac{500}{8} = 62.5 \text{ دقيقة}$$

من الشكل نجد أن

الحوض مليء ٥٠٠ لتر

بعد ٦٢.٥ دقيقة



(٦-٣) تشابه المثلثات

الاضلاع: هو شكل عند سُي اضلاعه قطع متسقمه معلقة

المثلثات المتشابهة متشابهات لها النسب المتناظرة
ويمكن للتشابه (~)

تشابه المثلثين

عبارة لتشابه



المثلث ~ المثلث
الأول الثاني

الاضلاع المتناظرة

يوجد تناوب بين الاضلاع
المتناظرة

الزوايا المتطابقة

كل زوايا المتناظر
متطابقة



*عبارة لتشابه

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ دو ابجد

*الاضلاع المتناسبة

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$$

$$\frac{8}{5} = \frac{10}{4} = \frac{9}{6}$$

$$8 \div 5 = 10 \div 4 = 9 \div 6$$

$$\frac{8}{5} = \frac{10}{4} = \frac{9}{6}$$

*الزوايا المتطابقة

$\angle A \cong \angle D$
 $\angle B \cong \angle E$
 $\angle C \cong \angle F$


* او به قياس فش (المثلثان متشابهان)

~~$$\frac{13}{15} = \frac{10}{15}$$~~

$$\frac{13}{15} = \frac{10}{15}$$

$$13 \times 15 = 10 \times 15$$

$$195 = 150$$





(٧-٣) التكبير والتقسيم

النفاذ

السلوك نفسه

عامل المقياس = ١

تصغير

عامل المقياس < ١

تكبير

عامل المقياس > ١

رسم النمذجة

١. ذحدد مركز النمذجة

٢. نرسم المستدل الأصل ثم ذحسب المسافة بين المركز ونقطة الأصل

٣. نرسم خط مستقيم بين المركز وصوده ولدي بيؤخذ بالعلاقة

$A' = k(A)$ الصوده = k (الأصل)
حيث k معامل المقياس ..

الممئل البياني


* ناتج نمذجة عامل المقياس ٣
ومركزه نقطة الأصل :

$$A(2, 6) \rightarrow A'(1, 2) = (1 \times 2, 3 \times 2)$$

$$B(6, 2) \rightarrow B'(3, 1) = (3 \times 2, 1 \times 2)$$


$$C(8, 4) \rightarrow C'(4, 3) = (2 \times 2, 3 \times 2)$$

الناتج تكبير لأن $k > 1$





(٨-٣) القياس غير المباشد




* حساب قيم مجهولة

باستعمال النسب بين

الضلاع ..

$$\frac{AD}{BD} = \frac{AE}{BE} = \frac{AD}{AB}$$



* مثال .. ماذا تفاصي لعلم لا يُعرف؟

مترب تبادلي

$$\frac{U}{V} = \frac{L}{C}$$

$$\frac{U}{C} = \frac{U}{L} \quad U \times C = V \times L$$

$$\dots \quad U = C$$

اسئل النسب

