



إدارة المناهج والكتب المدرسية

مشروع التعلم المبني على المفاهيم والنتائج الأساسية

الرياضيات

الصف التاسع

الناشر

وزارة التربية والتعليم

إدارة المناهج والكتب المدرسية

الحقوق جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم
الأردن - عمان / ص.ب (1930)

أشرف على تأليف هذه المادة التعليمية كل من:

د. نواف عقيل العجارمة/الأمين العام للشؤون التعليمية

د. نجوى ضيف الله القبيلات/ الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية

د. محمد سلمان كنانة/ مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية

د. أسامة كامل جرادات/ مدير المناهج

د. زايد حسن العكور / مدير الكتب المدرسية

د. عاصم مصطفى النمرات / عضو مناهج الرياضيات

لحة تأليف المادة التعليمية.

مهند ابراهيم العسود

رائے فرہان الزبیدی

مها يوسف الحلوان

رنا أحمد الجنيدى

المتابعة والتربية: د. زيندة حسن، أبو شوبيحة / رق، المباحث المهنية

التحرير اللغوي: ميسرة عبد الحليم صويفص	التحرير العلمي: د. عاصم مصطفى النمرات
التصميم: محمد راتب عباس	التحرير الفني: نداء فؤاد أبو شنب
الإنتاج: سليمان أحمد الخليلية	الرسـم: إبراهيم محمد شاكر

دفق الطباعة و راجعها: د. عاصم مصطفى، النمرات

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع	المحور	المجال
	المقدمة		
٥	العدد غير النسبي	الأعداد الحقيقية	الأعداد
٨	الأسس	الأسس والجذور والأعداد	و العمليات عليها
١٠	قوانين الأسس الصحيحة		
١٢	المقدار الجبري	المقادير والمعادلات والمتباينات	الأنماط والجبر والقياس
١٤	الاقرآن		
١٨	الاقرآن الخطى		
٢١	المتوسط الحسابي	مقياس النزعة المركزية	تحليل البيانات والاحتمالات
٢٤	المعادلة الخطية بمتغيرين.	المقادير والمعادلات والمتباينات	الأنماط والجبر والاقرارات
٢٨	حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بمتغيرين.		
٣٣	خصائص المثلث	المستقيمات والزوايا والمضلعات	الهندسة والقياس
٣٤	المثلث المتطابق الأضلاع		
٣٥	المثلث المتطابق الضلعين		

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فانطلاقاً من رؤية وزارة التربية والتعليم في تحقيق التعليم النوعي المتميز على نحو يلائم حاجات الطلبة، وإعداد جيل من المتعلمين على قدر من الكفاية في المهارات الأساسية اللازمة للتكييف مع متطلبات الحياة وتحدياتها، مزودين بمعارف ومهارات وقيم تساعد على بناء شخصياتهم بصورة متوازنة؛ بني هذا المحتوى التعليمي وفق المفاهيم والنتائج الأساسية لمبحث الرياضيات لصف التاسع الذي يُشكّل أساس الكفاية العلمية لدى الطلبة، ويركز على المفاهيم التي لا بد منها لتمكن الطلبة من الانتقال إلى المرحلة اللاحقة انتقالاً سلساً من غير وجود فجوة في التعلم؛ لذا حرصنا على بناء المفهوم بصورة مختزلة ومكثفة ورشيقه بعيداً عن التوسيع الأفقي والسرد وحشد المعرف؛ إذ عُني بالتركيز على المهارات ، وإبراز دور الطالب في عملية التعلم، بتفعيل استراتيجية التعلم الذاتي، وإشراك الأهل في عملية تعلم ابنائهم.

وقد اشتمل المحتوى التعليمي على موضوعين، يتضمن كلّ منها المفاهيم الأساسية لتعلم مهارات الرياضيات، بأسلوب شائق ومركمز.

لذا، بُني هذا المحتوى على تحقيق النتائج العامة الآتية:

- يميز العدد النسبي والعدد غير النسبي، ويعرف مجموعة الأعداد الحقيقة.
- يكتب الأعداد الحقيقة و يحسب قيم مقادير عدديّة باستخدام الأسس و أولويات العمليات.
- يميز المقدار الجبري ويحدد عدد حدوده ويجد قيمة عند قيم معطاة.
- يميز الاقتران الخطي والثابت من بين مجموعة من الاقترانات ويجد قاعدته.
- يحسب المتوسط الحسابي والمنوال لبيانات منظمة في جداول تكرارية ذي فئات.
- يميّز المعادلة الخطية بمتغيريْن عن غيرها من المعادلات.
- يتعرّفُ بعضَ خصائصِ المثلث.

والله ولي التوفيق

العدد الحقيقي

المجال الأعداد والعمليات عليها

المحور الأعداد الحقيقية

العدد غير النسبي

اختلف صديقان بينهما في تصنيف العدد π ، ادعى محمد أن الله عدد نسبي؛ لأن الله يمكن كتابته على صورة كسرٍ حيث: $\pi = \frac{22}{7}$ بينما ادعى محمود أنه ليس عدداً نسبياً؛ لأن الله يمكن إيجاده من الآلة الحاسبة، وهو كسرٌ عشرى غير منتهٍ وغير دوري.

حيث: $\pi = 3,1415926535897932384626433832795\dots$

أحاوْل تفسير كلامهما وتحديد قيمة π ؟ هل هي عدد نسبي أم لا؟

معلومة

الثابت π أو ثابت الدائرة هو ثابت رياضي، عُرف في الأصل على أنه نسبة محيط الدائرة إلى قطرها. والآن، لدى π تعریفات مختلفة، تظهر في العديد من الصيغ في مجالات الرياضيات والفيزياء جميعها. ونُساوي **٣,١٤١٥٩** تقريباً.

مثل بالحرف اليوناني π منذ منتصف القرن الثامن عشر، على الرغم من أنه يكتب أحياناً (Pi)، ويُسمى أيضاً ثابت أرخميدس.

العدد غير النسبي

ماذا سأتعلّم؟

أمّيّز العدّ غير النسبي من بين مجموعات الأعداد، وأصنّف مجموعات من الأعداد ضمن الأعداد الحقيقية.

- أمّيّز العدّ النسبي والعدّ غير النسبي.
- أتعرّف بمجموعة الأعداد الحقيقة.

توجّد مجموعة من الأعداد لا يُمكنني تحويلها إلى صورة $\frac{p}{q}$.

مثال

(١) ... ٢٠١٥١١٥١١٥٠٠

كسرٌ عشريٌ غيرٌ منتهٍ وغيرٌ دوريٌ أيضًا؛ لذا، لا يُمكنني تحويله إلى كسرٌ عاديٌ. ومن ثم، لا يُمكنني تصنيفه ضمن الأعداد النسبية.

(٢) لإيجاد قيمةٍ تقريريةٍ للعدّ $\sqrt[5]{7}$ استعمل الآلة الحاسبة:

$\sqrt[5]{7} = 1.9129299419753905140958797902802 \dots$

الاحظ أنَّه كسرٌ عشريٌ غيرٌ منتهٍ وغيرٌ دوريٌ؛ لذا، لا يُمكنني كتابته على صورة عددٍ نسبيٍ.

(٣) لإيجاد قيمةٍ تقريريةٍ للعدّ $\sqrt[7]{7}$ استعمل الآلة الحاسبة:

$\sqrt[7]{7} = 1.9129299419753905140958797902802 \dots$

الاحظ أنَّه كسرٌ عشريٌ غيرٌ منتهٍ وغيرٌ دوريٌ؛ لذا، لا يُمكنني كتابته على صورة عددٍ نسبيٍ.

العدد غير النسبي: كلُّ عدد لا يُمكن كتابته على صورة $\frac{p}{q}$ ، ومنها:


- الكسور العشرية غير المنتهية وغير الدورية.
- الجذور التربيعيَّة للأعداد التي ليست مربعاتٍ كاملةً.
- الجذور التكعيبية للأعداد غير المكعباتِ الكاملة.

استنتج أنَّ الأعداد إما أنْ تكون نسبيةً، وإما أنْ تكون غير نسبيةً.

غير نسبية

نسبية

مجموعة الأعداد الحقيقة: مجموعة الأعداد النسبية و**غير النسبية** جميعها، ويُرمز لها بالرمز \mathbb{R} .



أحوال

- ١) أصل بين العدد في العمود الأول وما يناسبه في العمود الثاني:
 (إرشاد: قد نصل العدد مع أكثر من مجموعة).

العمود الثاني
طبيعيٌ (ط)
صحيحٌ (ص)
ناريٌ (ن)
غير ناريٌ (غ ن)

العمود الأول
$0,121121112\dots$
$\overline{97}$
$1 \frac{1}{3}$
$0,31$
$\overline{67}$

- ٢) أكمل الجدول الآتي:

السبب	غير ناريٌ	ناريٌ	العدد
			$23,2541000$
			$0,13131300$
			$\overline{1217}$
			$\overline{187}$
			$1000\overline{7}$



التقويم الختامي

- ١) أميّز العدد π إنْ كان ناريًا أم غير ناريًّا مع ذكر السبب.
 ٢) أميّز ناتج العملية $(\overline{27})^2$ ناريًا أم غير ناريًّا.

المجال الأعداد والعمليات

المحور الأساس والجذور والأعداد

قوانين الأساس الصحيحة

- أحسب قيمة مقادير عدديّة باستخدام الأساس وأولويّات العمليّات.

أجد قيمة $(3^3 \times 7)^1$

(الأُسُّ و الأساس)

- أكتب الأعداد الحقيقية باستخدام الأساس

أحلل الأعداد الآتية إلى عواملها الأوليّة، ثم أكتبها باستخدام الأساس.
 484 64 400 $(3^2 \times 2^2 \times 5^2)$

الأسس

ماذا سأتعلّم؟

معرضٌ فنيٌ يجري حضوره عن طريق بطاقاتِ دعوةٍ، بحيث يحضرُ في اليوم الأوّل ٣ مدعوينَ ويعطى كلُّ شخصٍ ٣ بطاقاتِ دعوةٍ لليوم التالي، وهذا لمدةٍ ٥ أيامٍ. ما عدد المدعوينَ في اليوم الرابع؟ في أيِّ يوم يكونُ عدد المدعوينَ ٢٤٣ شخصاً؟

- أكتب الأعداد الحقيقية باستخدام الأساس.

- أحسب قيمة مقادير عدديّة باستخدام الأساس وأولويّات العمليّات .

اليوم	عدد المدعوينَ
الأول	٣
الثاني	3×3
الثالث	$3 \times 3 \times 3$

يمكنني التعبير عن الضرب المتكرر للعدد في نفسه باستخدام الأساس، وعندئذ يسمى عدد مرات تكرار الضرب الأساس (القوة)، أما العدد نفسه فيسمى الأساس.

$$62 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \rightarrow \text{الأساس}$$

↓
الأساس

أذكّر

يقرأ العدد ٦٢ كما يأتي:
اثنان أس ستة،
أو اثنان قوة ستة، أو القوة
السادسة للعدد اثنين.

مثال

أحلل الأعداد الآتية، ثم أكتبها باستعمال الأساس: ١٠٠ ، ٣٢

٢	١٠٠
٢	٥٠
٥	٢٥
٥	٥
قف	١

٢	٣٢
٢	١٦
٢	٨
٢	٤
٢	٢
قف	١

$$^{\circ}2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

$$^{\circ}5 \times ^{\circ}2 = 5 \times 5 \times 2 \times 2 = 100$$

أحاوْل

أحلل الأعداد الآتية إلى عواملها الأولية، ثم أكتبها باستعمال الأساس.

١٢١ (٣)

٣٦ (٢)

١٠٠ (١)

استخدم قواعد الضرب والقسمة الآتية؛ لأبسط العبارات الأساسية :

السبب	الرезульт	التعبير اللفظي
$A^3 = (A \times A) \times A$ $A^3 = A + A + A$	$A^n = A \times A \times \dots \times A$	ضرب القوى: لضرب قوتين لهما الأساس نفسه؛ أجمع الأسس.
$A^m = \frac{A \times A \times \dots \times A}{A \times A \times \dots \times A} = \frac{A}{A}$	$A^{m-n} = \frac{A}{A}$	قسمة القوى: لقسمة قوتين لهما الأساس نفسه؛ أطرح الأسس.
$(A^m)^n = A^{m \times n}$	$(A^m)^n = A^n \times A^n$	قوة القوة: لإيجاد قوة القوة؛ أضرب الأسس.
$(A^m)^n = (A \times A \times \dots \times A) \times (A \times A \times \dots \times A)$	$(A^m)^n = A^n \times B^n$	قوة حاصل الضرب: لإيجاد قوة حاصل الضرب؛ أجذب قوة كل عدٍ ثم أضرب.
$\frac{A^m}{B^n} = \frac{A \times A \times \dots \times A}{B \times B \times \dots \times B} = \frac{A}{B}$, $B \neq 0$	$\frac{A^m}{B^n} = \frac{A}{B}$	قوة ناتج القسمة: لإيجاد قوة ناتج القسمة؛ أجذب كلًا من قوة البسط والمقام، ثم أقسم.
$1 = A^{-7} = \frac{1}{A^7}$	$1 = A^0$	الأَسْ الصُّفْرِيُّ: أي عدٍ غير الصفر مرفوعًا للأَسْ صفر يساوي 1.
$\frac{1}{A^{-3}} = \frac{1}{A^{-1} \times A^{-1} \times A^{-1}} = A^3$	$\frac{1}{A^{-n}} = A^n$	الأَسْ السَّالِبَةُ: القوة السالبة لأي عدد غير الصفر، هي مقلوب للقوة الموجبة. والقوة الموجبة هي مقلوب للقوة السالبة.

مثال استخدم قوانين الأسس؛ لإيجاد قيمة كل مما يأتي:

$$(1) 3^2 \times 2^3 = 2^2 = ?$$

قاعدة ضرب القوى: أجمع الأسس.

$$49 = 27 = 6^{-87} = \frac{87}{67} \quad (2)$$

قاعدة قسمة القوى: أطرح الأسس.

أحوال

استخدم قوانين الأسس؛ لإيجاد قيمة كل مما يأتي:

$$\frac{10}{96} \quad (2)$$

$$1 \times (-10)^3 \quad (1)$$

مثال أستخدم قوانين الأسس؛ لإيجاد قيمة كلٌ منْ:

$$64 = 2^{4 \times 3} = 2^3 \cdot 2 = 2^4 (2^3)$$

قاعدةُ قوَّةِ القوَّةِ: أضربُ الأسس.

$$10000 = 625 \times 16 = 5^4 \cdot 2^4 = (5 \times 2)^4$$

قاعدةُ قوَّةِ حاصلِ الضربِ: أجُدُّ قوَّةً كُلَّ عدٍ ثُمَّ أضربُ.

$$\frac{4}{9} = \frac{2^2}{2^3} = 2 \left(\frac{2}{3} \right)^3$$

قاعدةُ قوَّةِ ناتجِ القسمةِ

$$\frac{1}{49} = \frac{1}{2^2 \cdot 7} = 2^{-2} \cdot 7^{-1}$$

قاعدةُ الأسسِ السالبةِ.

أحاوُل

أستعمل قوانين الأسس؛ لإيجاد قيمة كلٌ مما يأتي:

$$1. \left(\frac{1}{4} \right)^5 \cdot 4^4 \cdot 2^3 = 2^{(3 \times 4)} = 2^{12}$$

المجال

الألماظ والجبر والاقترانات

المحور

المقادير والمعادلات والمتباينات

المقدار الجبري

- أميّز المقدار الجبري.
- أحذّ عدد حدود المقدار الجبري.
- أجّد قيمة المقدار الجبري عند قيم معطاة.

ممّ يتكون المقدار الجيري؟

المقدار الجيري

ماذا سأتعلّم؟

ذهب عبد الله إلى السوق واشترى ٥ دفاتر و ٤ أقلام، ثم دفع ديناراً واحداً أجرة السيارة التي أعادته إلى المنزل. أكتب المقدار الجيري الذي يدل على مجموع ما دفعه.

- أميّز المقدار الجيري.
- أجّد القيمة العددية لمقدار جيري عند قيمة معطاة.

إذن:

اللاحظ من السؤال أنّ ثمن كلّ من الدفتر والقلم غير معلوم؛ لذا، يجب أن نُعبّر عنها بمتغيرات ولتكن س، ص على الترتيب. إذن:

ثمن ٥ دفاتر = ٥ س (هذا يمثل حداً جريئاً).

و ثمن ٤ أقلام = ٤ ص (هذا يمثل حداً جريئاً).

كما أنّ عبد الله دفع ديناراً واحداً أجرة السيارة التي أوصلته إلى المنزل؛ أي إنّ أجرة السيارة = ١ (هذا حدّ جريئ)،

فيكون مجموع ما دفعه هو: $5S + 4C + 1$

وهذا مجموع ٣ حدود جreibية، وتشتّت المقدار الجيري.

الذكّر



الحدّ الجيري مكوّن من عدد متغير، أو حدّ ثابت.

معلومة

المقدار الجبري يتكون من حد جبري واحد أو أكثر، ترتبط بعضها بعمليات جمع أو طرح.

عند عودة عبد الله إلى المنزل سأله أخوه: كم ثمن كل من الدفتر والقلم؟ فأجابه: ثمن الدفتر الواحد ٦٥ من الدينار، وثمن القلم الواحد ٢٥، من الدينار.
الآن، أستطيع أن أعرف مقدار ما دفعه تماماً كما يأتي:

$$\begin{aligned} \text{ثمن الدفتر الواحد س} &= ٦٥, \text{ إذن: } ٥ \text{ س} = ٦٥ \\ \text{ثمن القلم الواحد ص} &= ٢٥, \text{ إذن: } ٤ \text{ ص} = ٢٥ \\ \text{مجموع ما دفعه عبد الله} &= ٥ \text{ س} + ٤ \text{ ص} = ١ + ١ + ٣,٢٥ = ٥,٢٥ \end{aligned}$$

وبذلك أكون قد وجدت القيمة العددية للمقدار الجبري $(5\text{س} + 4\text{ص} + 1)$
بعد أن عرفت أن $(\text{س} = ٦٥) (\text{ص} = ٢٥)$.

أحوال

١) أُعبر عن الجمل الآتية بمقادير جبرية:

- أ) مجموع ٣ أمثال عدد؛ مضافاً إليه ٦ أمثال عدد آخر.
ب) طرح عدد من مربع عدد آخر.

٢) أُعبر عن المقادير الجبرية الآتية بالكلمات:

- أ) $3\text{س} + 4\text{ص}$
ب) $\text{س} - 2\text{ص}$

٣) إذا كانت $\text{س} = ٢$ ، $\text{ص} = ٥$ ، $\text{ع} = -٣$ ؛ فأجد القيمة العددية للمقدار الجبري

$$3\text{س} + 2\text{ص} - \text{ع} + 6 ?$$

المجال

الأسماء والاقترانات

المحور

الاقترانات

الاقتران

أصنفُ الحيواناتِ في العمودِ الأولِ بإيجادِ
علاقةٍ تربطُها بالصنفِ من العمودِ الثاني؛
وذلك بتوسيطِ خطٍّ بينَ كلِّ حيوانٍ وتصنيفِه.

التصنيف	الحيوان
الثدييات	الغزال
الطيور	النسُرُ
الزواحف	التمساح
الحشرات	النمرُ
	الدجاجة
	الثعبان
	الحصان
	النحل

ماذا سأتعلّم؟

يرافق خالد عمال بناء وهم يبنون سوراً لإحدى المزارع، وكان العمال يبنون ١٥ متراً مربعاً كل ساعه.
أجد قاعدة الاقتران بين ساعات العمل والأمتار المربعة التي يبنيها العمال.

- أميّز الاقتران من بين مجموعات العلاقات.
- أستعمل قاعدة الخط الرأسى لتمييز الاقتران.
- أجد قاعدة الاقتران.

الاقتران: علاقة تربط كل عنصر من المجال بعنصر واحد فقط في المدى.

وعليه، يمكنني تمييز الاقتران بالطرق الآتية:

(١) إذا كانت العلاقة مجموعة أزواج مرتبة.

أميّز الاقتران إذا لم يكن أي عنصر من عناصر المجال مكرراً.

مثال

أي العلاقات الآتية تمثل اقتراناً؟ ذكر السبب:

(١) $\{1, 4\} = \{(1, 4), (2, 3), (3, 4), (1, 7)\}$.

(٢) $\{2, 4\} = \{(2, 4), (3, 2), (3, 3)\}$.

(٣) $\{1, 2\} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 2)\}$.


الحل

الرقم	الإجابة	السبب
(١)	العلاقة ليست اقتراناً	العنصر ١ من المجال، له صورتان ٤ ، ٧.
(٢)	اقتران	كل عنصر من المجال، له صورة واحدة فقط في المدى.
(٣)	اقتران	كل عنصر من المجال، له صورة واحدة فقط في المدى.

(٢) إذا كانت العلاقة ممثلاً بأشكال فنّ.
أميّز الاقتران إذا كان لكل عنصر في المجال، سهم واحد باتجاه المدى.

مثال

أي العلاقات الآتية تمثل اقتراناً؟ ذكر السبب.



الشكل (٢)

لا يمثل اقتراناً السبب:

يوجد عنصر من المجال له صورتان في المدى
(انطلق من العنصر ٥ سهمنا باتجاه عناصر المدى ٣ - ٤ - ٥).

الشكل (١)

يُمثل اقتراناً السبب:

كل عنصر من المجال، له صورة واحدة في المدى
(انطلق من المجال سهم واحد لكل عنصر باتجاه المدى).


(٣) إذا كانت العلاقة تمثيلاً بيانياً.

استخدم اختبار الخط الرأسى لمعرفة بيان العلاقة إذا كانت تمثل اقتراناً أم لا.

اختبار الخط الرأسى

ينص على: تكون العلاقة اقتراناً إذا قطع أي مستقيم رأسى بيان العلاقة في نقطة واحدة فقط.

مثال



قاعدة الاقتران

يمكن إيجاد قاعدة تربط عناصر المجال مع عناصر المدى تسمى قاعدة الاقتران.

مثال

أجد المجال والمدى وقاعدة الاقتران في كلٌ مما يأتي:

$$Q = \{(1, 1), (4, 2), (9, 3), (16, 4), (25, 5)\}$$

الحل

$$\text{المجال } S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\text{المدى } C = \{1, 4, 9, 16, 25\}$$


قاعدة الاقتران $C = \text{كل عنصر من المجال ضرب في نفسه.}$

قاعدة الاقتران هي: $C = S^2$

$$C = S \times S$$

مثال

إذا كان $U(S) = C = 2S + 3$ فأجد ما يأتي: $U(2), U(0), U(-3)$

الحل


$$\begin{aligned} U(2) &= 2(2) + 3 & U(0) &= 2(0) + 3 & U(-3) &= 2(-3) + 3 \\ U(0) &= 0 & U(-3) &= -3 & U(-3) &= -3 \\ U(-3) &= -3 & U(-3) &= -3 & U(-3) &= -3 \end{aligned}$$

أحوال


1) أميّز الاقتران من بين العلاقات الآتية، وأذكر السبب.

أ) $L = \{(3, 0), (3, 4), (1, 3), (3, 2), (1, 1)\}$


ب) $M = \{(5, 1), (3, 2), (2, 1), (1, 1)\}$




(d)



(e)




(f)



(g)

(و)



(h)

2) إذا كان $Q(S) = 5 - 3S$ فأجد كلاً مما يأتي:

أ) $Q(-1)$ ب) $Q(0)$ ج) $Q(1)$

3) إذا كان $Q = \{(1, 1), (2, 8), (3, 27), (4, 64)\}$ فأجد كلاً مما يأتي:

أ) المجال. ب) المدى. ج) قاعدة الاقتران.

الاقتران الخطّي

ماذا سأتعلّم؟

اختلفَ مازنٌ وعمّارُ حولِ الاقترانِ

$$L(s) = \frac{3}{s^2 - 5}$$

 مازنٌ يقولُ إنَّ الاقترانَ خطّيٌّ، بينما
 يقولُ عمّارٌ: إنَّه غيرُ خطّيٌّ.
 أساعدُ مازنًا وعمّارًا علىِ الحكمِ
 علىِ الاقترانِ السالِقِ.

- أميّزُ الاقترانَ الخطّيَّ منْ بينِ مجموعةِ منِ الاقتراناتِ.
- أميّزُ الاقترانَ الثابتَ منْ بينِ مجموعةِ منِ الاقتراناتِ.
- أستعملُ قاعدةَ الاقترانِ الخطّيٍّ؛ لإيجادِ صورِ العناصرِ منِ المجالِ.

الاقترانُ الخطّيُّ هو:

اقترانٌ صورته العامةُ $Q(s) = As + B$ ، حيثُ $A, B \in \mathbb{C}$
 يُسمى **A** معامل س ويُسمى **B** الحد الثابت أو الحد المطلق. ويكون أكبر **A** للمتغير = 1

مثال أميّزُ الاقترانَ الخطّيَّ منْ بينِ الاقتراناتِ الآتيةِ، وأبيّنُ السببَ.

السبب	خطّيٌّ - غيرُ خطّيٌّ	الاقتران
أكبرُ A للمتغير = 1	خطّيٌّ	$Q(s) = 2s - 3$
أكبرُ A للمتغير = 1 بما أنَّه يوجدُ أقواسٌ؛ توزّعُ ثمَّ نحكمُ.	خطّيٌّ	$L(s) = 5s^3 + 3s$
$H(s) = s^2 - 3s$ أكبرُ A للمتغير = 2	غيرُ خطّيٌّ	$H(s) = s(s-3)$
بما أنَّ المتغيرَ في المقام؛ نحوُلُ الاقترانَ للصورةِ العامةِ. $Q(s) = 3s^3 - 5$ أكبرُ A للمتغير ≠ 1	غيرُ خطّيٌّ	$Q(s) = \frac{3}{s} - 5$
بما أنَّ المتغيرَ تحتَ الجذرِ؛ نحوُلُ الاقترانَ للصورةِ العامةِ. $Q(s) = s^{\frac{1}{2}} + 7$ أكبرُ A للمتغير ≠ 1	غيرُ خطّيٌّ	$Q(s) = \sqrt{s} + 7$

مثال أحده كلاً من معاملات الاقترانات الخطية الآتية:

الحد الثابت	معامل س	الاقتران	الرقم
-4	2	$ق(س) = 2s - 4$	(١)
6	-5	$ه(س) = 6 - 5s$	(٢)
صفر	-1	$ل(س) = -s$	(٣)
-5	$\frac{1}{3}$	$ق(س) = \frac{s}{3} - 5$	(٤)

مثال اذا كان $ل(س) = 5s - 3$ ، وكان $ل(س) = 12$ ، فأجد قيمة س.

الحل

$$س = 5 \leftarrow 15 س = 3 \leftarrow 3 + 12 = 5 \leftarrow 12 = 3 - 5$$

مثال

إذا كان $ق(س) = 3s - 4$ ، فأجد كلاً مما يأتي: ق(٢)، ق(-٢)، ق(٠).

الحل

$$\begin{array}{ccccccc}
ق(٢) & = & 2 = (٢) & \leftarrow & 4 - 6 = (٢) & \leftarrow & 4 - 2 \times 3 = (٢) \\
ق(-٢) & = & 10 - = (٢-) & \leftarrow & 4 - 6 - = (٢-) & \leftarrow & 4 - (٢-) \times 3 = (٢-) \\
ق(٠) & = & 4 - = (٠) & \leftarrow & 4 - 0 = (٠) & \leftarrow & 4 - 0 \times 3 = (٠)
\end{array}$$

أحوال

١) أي الاقترانات الآتية خطٌ؟ ذكر السبب.

$$(١) ق(س) = 2s^2 + 3$$

$$(٢) ل(س) = (1 - s)s$$

$$(٣) ه(س) = \frac{3s}{5} - 7$$

٢) أجد كلاً من أ، ب لكل اقتران خطٌ مما يأتي:

$$(١) ق(س) = 6s - 8 \quad (٢) ق(س) = 9 - 7s$$

$$(٣) ق(س) = 13 - 13s \quad (٤) ق(س) = s$$

٣) إذا كان $ق(س) = 4 - 3s$ ؛ فأجد: ق(-١)، ق(٠)، ق(٣).

حالة خاصة:

الاقتران الثابت

إذا كان معامل s يساوي صفرًا؛ فإن الاقتران الخطىٰ تصبح صورته العامة: $q(s) = b$ حيث $b \in \mathbb{R}$ ويسمى الاقتران الثابت.

مثال

إذا كان $q(s) = -3$ ، فأجد كلاً مما يأتي: $q(1)$ ، $q(-3)$ ، $q(0)$

الحل

$$q(1) = -3, q(-3) = -3, q(0) = -3$$

بما أنَّ الصور جميعها هي نفسها لأيِّ عددٍ؛ لذا، يُسمى الاقتران الثابت.

أحوال

١) إذا كان $q(s) = -6$ فأجد كلاً مما يأتي:

$$q(-1), q(0), q(-6)$$

٢) إذا كان $q(s) = m$ ، وكان $q(1) = 2$ ، $q(3) = 2$ ، $q(5) = 2$ ، فأجد قيمة m .

المجال

مقاييس النزعة المركزية والتشتت

المنوال

المتوسط الحسابي

- أجد المنوال.

- أحسب المتوسط الحسابي لبيانات منظمة في جداول تكرارية ذات فئات.

بعد ما نظمت البيانات: ١٥، ١٢، ١٣، ٢٦،
٢٣، ١٦، ٢٠، ٢٢، ١٨، ٢٣، ١٦، ٢٠،
جدول تكراري، أجد المنوال.

أنظم البيانات الآتية في جدول تكراري فئة الأولى (١٥-١٠)، ثم أجد المتوسط الحسابي:
٢٢، ٢٦، ٢٣، ١٨، ١٦، ١٣، ١٥، ١٢
٢٠، ٢٣، ١٦، ٢٠

المتوسط الحسابي

أراد عمر عمل دراسة على عدد الساعات التي يقضيها طلبة الصف التاسع في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الواحد، وبعد تفريغ نتائج الاستبانة كانت كما يأتي: ٦، ٣، ١٤، ١٦، ١٢، ١٥، ٣، ١٤، ٥، ١٢، ١٠، ١٣، ٢٢، ١١، ١٢، ١٤، ١٣، ٢٢، ١١، ١٤، ٦، ١٣، ١٨، ٧، ١٢، ١٠، ١١، ١٥، ٩

١٧

ثم سأله والدته التي تعمل في دائرة الإحصاءات العامة: كيف أنظم هذه البيانات في جدول؛ لتسهل علي دراستها؟

ماذا سأتعلّم؟

- أتعرف مقاييس النزعة المركزية.
- أجد المتوسط الحسابي.
- أجد المنوال.

الأُمَّ: يُمْكِنُكَ يا عمرُ أَنْ تُنْظِمَ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ فِي جُدُولٍ تَكْرَارِيٌّ.

عمرُ: وَمِمَّ يَتَكَوَّنُ الْجُدُولُ التَّكْرَارِيُّ؟

الأُمَّ: مِنْ فَئَاتٍ وَتَكْرَارٍ هَذِهِ الْفَئَاتِ، وَلَتَكُنْ الْفَئَةُ الْأُولَى لِجُدُولِكَ مِنْ (١-٥)، فَمَا عَدُ الطَّلَبَةِ الَّذِينَ

يَقْضُونَ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ٥ سَاعَاتٍ فِي مَتَابِعَةِ مَوْاقِعِ التَّوَاصِلِ الْاجْتِمَاعِيِّ؟

أَجَابَ عَمْرٌ: ٣ طَلَبَةٍ.

الأُمَّ: إِذْنُكَ تَكْرَارَاتُ هَذِهِ الْفَئَةِ ٣، ثُمَّ نَحْسُبُ طَوْلَ الْفَئَةِ طَوْلُ الْفَئَةِ = الْحَدُّ الْأَعْلَى - الْحَدُّ الْأَدْنَى + ١

عمرُ: الْحَدُّ الْأَعْلَى فِي الْفَئَةِ الْأُولَى ٥ وَالْحَدُّ الْأَدْنَى ١، صَحِيقٌ يَا أُمِّي؟

الأُمَّ: أَحْسَنْتَ يَا عَمْرُ، أَكْمَلْ يَا بْنِي.

عمرُ: طَوْلُ الْفَئَةِ = ١ - ٥ = ١ + ١ = ٢

الأُمَّ: نَعَمُ، وَمِنَ الْمُهِمِّ عِنْدَ بَنَاءِ الْجُدُولِ التَّكْرَارِيِّ أَنْ يَكُونَ طَوْلُ الْفَئَةِ مُتَسَاوِيًّا لِفَئَاتِ الْجُدُولِ التَّكْرَارِيِّ

جَمِيعِهَا، وَبِمَعْرِفَتِنَا لِطَوْلِ الْفَئَةِ يُمْكِنُ أَنْ نُحدِّدَ بَقِيَّةِ الْفَئَاتِ وَنَصْعُبُهَا فِي جُدُولٍ تَكْرَارِيٍّ كَالْآتِي:

الفَئَةُ	الْتَّكْرَارُ	١	٣	٦	١٢	٣	١	١٥ - ١١	١٠ - ٦	٢٠ - ١٦	٢٥ - ٢١

عمرُ: وَبَعْدَ أَنْ نَظَمَنَا هَذِهِ الْبَيَانَاتِ فِي جُدُولٍ كَيْفَ نَدْرِسُهَا؟

الأُمَّ: يُمْكِنُ أَنْ نَدْرِسَهَا عَنْ طَرِيقِ مَقَابِيسِ النَّزْعَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ، وَأَشْهَرُ هَذِهِ الْمَقَابِيسِ وَأَكْثُرُهَا اسْتِعْمَالًا

الْمَتَوَسِّطُ الْحَاسِبِيُّ.

عمرُ: أَذْكُرْ أَنَّنَا درَسْنَا الْمَتَوَسِّطَ الْحَاسِبِيَّ فِي الصَّفَّ الثَّامِنِ، وَهُوَ مَجْمُوعُ الْقِيمِ مَقْسُومًا عَلَى عَدِّهَا

وَيُرْمَزُ لَهُ بِالرَّمْزِ سَ.

وَدَرَسْنَا أَيْضًا مِنْ مَقَابِيسِ النَّزْعَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ الْوَسِيْطَ وَالْمَنْوَالِ.

الأُمَّ: مَا شَاءَ اللَّهُ ذَاكِرُكَ جِيدٌ يَا عَمْرُ، وَلَكِنَّنَا هُنَا سَنَحْسُبُ هَذِهِ الْمَقَابِيسَ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الَّتِي

تَعْلَمْنَا فِي الصَّفَّ الثَّامِنِ، وَلَنْبَدِأْ بِالْمَتَوَسِّطِ الْحَاسِبِيِّ.

أَوَّلًا: عَلَيْنَا تَحْدِيدُ مَرَاكِزِ الْفَئَاتِ، وَنَرْمُزُ لِمَرْكَزِ الْفَئَةِ بِالرَّمْزِ سَ.

مَرْكُزُ الْفَئَةِ = $\frac{\text{الْحَدُّ الْأَعْلَى} + \text{الْحَدُّ الْأَدْنَى}}{٢}$

مَقَابِيسِ النَّزْعَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ
تَصْفُ مَرْكَزَ الْبَيَانَاتِ

عمرُ: مَرْكُزُ الْفَئَةِ الثَّانِيَةِ = $\frac{(١٠+٦)}{٢} = \frac{١٦}{٢} = ٨.$

الأُمَّ: وَهَكُذا نَحْتَاجُ فِي الْجُدُولِ التَّكْرَارِيِّ إِلَى عَمُودَيْنِ جَدِيدَيْنِ: الْأَوَّلُ مَرْكُزُ الْفَئَةِ وَالثَّانِي (مَرْكُزُ الْفَئَةِ

× التَّكْرَارِ) وَبِالرَّمْزِ (سَ × تَ) فَنَحْنُ نَرْمُزُ لِلتَّكْرَارِ بِالرَّمْزِ (تَ)؛ فَيُصْبِحُ الْجُدُولُ كَالْآتِي:

الفنان	التكرار (ت)	مركز الفناء (س)	الناتج (س × ت)
٥-١	٣	٣	٩
١٠-٦	٦	٨	٤٨
١٥-١١	١٢	١٣	١٥٦
٢٠-١٦	٣	١٨	٥٤
٢٥-٢٠	١	٢٣	٢٣
المجموع	٢٥		٢٩٠

$$\bar{s} = \frac{290}{25} = 11.6$$

إذن: المتوسط الحسابي = ١١,٦

وقانونه:

المتوسط الحسابي للبيانات المبوبة في جدول تكراري = $\frac{\text{مجموع حواصل ضرب مراكز الفنان في تكرارها}}{\text{مجموع التكرارات}}$

$$\text{وبالرموز: } \bar{s} = \frac{\text{مجموع }(s \times t)}{\text{مجموع }(t)}$$

ويمكننا أيضاً يا عمر، إيجاد **المنوال** بتحديد الفنان المنوالة؛ وهي الفنان التي تُقابل أكبر تكرار ويكون مركزها هو المنوال، ويسمى (المنوال التقريري).

عمر: الفنان المنوالة في هذا الجدول التكراري هي: ١٣ ومركزها ١٣، إذن: المنوال = ١٣.

أحوال

في المثال السابق، أنظم عدد الساعات التي يقضيها طلبة الصف التاسع في متابعة موضع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الواحد في جدول تكراري؛ إذا كانت الفنان الأولى (٨-١)، ثم أجد المتوسط الحسابي والمنوال.

الـمـعـادـلـاتُ الـخـطـيـيـةُ بـلـتـحـيـيـرـيـنِ

المجال الأنماط والجبر والاقترانات

المهور المقادير والمعادلات

حلُّ نظامٍ مكوَّنٍ منْ معادلتينِ خطويَّتينِ بمتغيرَينِ

- أحَلُّ نظاماً مكوَّناً منْ معادلتينِ بمتغيرَينِ بطرائقٍ متَوْعِدةٍ، هيَ (الحذفُ، والتعويضُ).

المعادلةُ الخطيةُ بمتغيرَينِ

- أمِيزُ المعادلةَ الخطيةَ بمتغيرَينِ، عنْ غيرِها منَ المعادلاتِ.

أحلُّ نظامَ المعادلاتِ الآتي:

$$ص + 4س = 3$$

$$س - 12 = ص$$

أيُّ المعادلاتِ الآتيةُ معادلةٌ خطيةٌ بمتغيرَينِ؟

$$3ص^2 + 8س^2 + 10 = 0$$

$$7س + 8ص - 19 = 0$$

$$6ص = 7س - 9$$

أولاً: المعادلة الخطية بمتغيرين

ماذا سأتعلم؟



اتفقت هديل مع أختها هدى على شراء هدية لوالديهما بمبلغ ١٠ دنانير، فإذا دفعت هديل س دينار، وهدى ص دينار؛ فما المعادلة التي تُعبر عن المبلغ؟

- أميّز المعادلة الخطية بمتغيرين، عن غيرها من المعادلات.

الصورة العامة للمعادلة الخطية بمتغيرين س، ص هي:
 $A_s + B_ch + C = 0$ حيث A, B, C أعداد حقيقة، $A \neq 0$.
يسمى A معامل s ، B معامل ch ، بينما C يسمى حد ثابت.

مثال

أي المعادلات الآتية خطية بمتغيرين:

$$(1) 15s = 2 - 4ch \quad (2) ch^2 = 3s^2 - 7 \quad (3) ch - 2s = 8 + sc$$

$$(4) 7sc - 6 = 5 \quad (5) 0,5s = 6ch \quad (6) ch^2 = 2s - 1$$

المعادلات ١ ، ٣ ، ٥ معادلات خطية بمتغيرين؛ لأنَّه يُمكنني كتابتها بالصورة العامة للمعادلة الخطية بمتغيرين $As + Bch + C = 0$ ، بينما ٢ ، ٤ ، ٦ معادلات غير خطية.
أكتب المعادلة الخطية بالصورة العامة، بحيث أنقل الحدود جميعها إلى الطرف الأيمن ليصبح الطرف الأيسر صفرًا حيث تتغير إشارة الحد عند نقله من طرف إلى آخر، ثمّ نجمع الحدود المتشابهة مع بعضها.

$$(1) 15s = 2 - 4ch \quad \text{خطية بمتغيرين.} \quad \leftarrow$$

$$(3) 7ch - 2s = 8 + ch \quad \leftarrow \quad (2) ch - 2s = 8 + ch - sc = 0$$

$$(5) 0,5s = 6ch \quad \leftarrow \quad (4) 0,5s - 6ch = 0 \quad \text{خطية بمتغيرين.}$$

الاحظ أنَّ المعادلات ٢ ، ٤ ، ٦ معادلات غير خطية. $ch^2 = 3s^2 - 7$ ؛ لأنَّ ch مرفوعة للقوة ٢ و s مرفوعة للقوة ٢؛ فهي غير خطية. $7ch - 2s = 5$ ؛ لأنَّه يوجد حاصل ضرب s في ch . $7ch^2 = 2s - 1$ ؛ لأنَّ ch مرفوعة للقوة ٢.

أحاوٰل

أضْعُ دائِرَةً حَوْلَ المعادلاتِ الخطِّيَّةِ بِمتغِيرَيْنِ:

$$(1) \text{ص}^2 + 5\text{س}^2 - 8\text{س}\text{ص} + 10 = 0$$

$$(2) 7\text{س} + 2\text{ص} - 18 = 0$$

$$(3) 6\text{ص} = 2\text{س} - 9$$

$$(4) \text{ص}^3 = 7\text{س}^3$$

أحاوٰل

أكْتُبِ المعادلاتِ الخطِّيَّةِ الْآتِيَّةِ بِالصُّورَةِ الْعَامَّةِ:

$$\text{أ}\text{س} + \text{ب}\text{ص} + \text{ج} = 0$$

$$(1) 2\text{ص} + 5\text{س} - 4\text{ص} = 7$$

$$(2) 3\text{س} + 2\text{ص} = 16$$

$$(3) 7\text{ص} = 12\text{س} - 5$$

$$(4) 14\text{ص} = 7\text{س}$$

بالرجوعِ إِلَى الْمَسَأَلَةِ فِي مُقْدِمَةِ الدِّرْسِ، أَجِيبُ عَنِ الْأَسْلَةِ الْآتِيَّةِ:

(١) هلْ يُمْثِلُ المَقْدَارُ الْجِبْرِيُّ الَّذِي يُمْثِلُ الْمَسَأَلَةَ مَعَادِلَةً خَطِّيَّةً بِمَتغِيرَيْنِ؟

نعم. $\text{س} + \text{ص} = 10$.

(٢) أَفْرُّ زوجًا مِرْتَبًا يُمْثِلُ الْمَبْلَغَ الْمَدْفُوعَ مِنْ هَدِيلٍ وَهُدْيٍ.

(٣) $(1, 9), (2, 75), (4, 5), (5, 5), (7, 25), (4, 5)$.

(٣) ما عَدُ الأَزْوَاجِ الْمِرْتَبَةِ الَّتِي تُمْثِلُ حَلًّا لِلْمَعَادِلَةِ؟

عَدْدٌ لا نَهَايَّ مِنَ الْحُلُولِ.

يُسَمِّي الزَّوْجُ الْمِرْتَبُ مِنَ الْأَعْدَادِ الْحَقِيقِيَّةِ، الَّذِي يُحَقِّقُ الْمَعَادِلَةَ الخَطِّيَّةَ بِمَتغِيرَيْنِ حَلًّا لِلْمَعَادِلَةِ، وَمَجْمُوعَةُ حَلَّ الْمَعَادِلَةِ الخَطِّيَّةِ بِمَتغِيرَيْنِ، هِيَ مَجْمُوعَةٌ غَيْرُ مُنْتَهِيَّةٌ مِنَ الْأَزْوَاجِ الْمِرْتَبَةِ.

مثال

أي الزوجين الآتيين $(-1, 6), (1, 6)$ يمثل حلًّا للمعادلة الخطية
 $s + 4c = 2$
 أعرض كل زوج في المعادلة، ثم اختبر تساوي الطرفين.

$$\begin{aligned} s + 4c - 2 &= 0 \\ 6 + 4(-1) - 2 &= 0 \\ 6 - 4 - 2 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

إذن: $(-1, 6)$ حلًّا للمعادلة.

$$\begin{aligned} s + 4c - 2 &= 0 \\ -5 + 4 - 2 &= 0 \\ -1 &= 0 \\ 0 &\neq 0 \end{aligned}$$

إذن: $(1, 6)$ ليس حلًّا للمعادلة.

أحوال

أضع دائرة حول الأزواج المرتبة التي تمثل حلًّا للمعادلة: $c = 7s - 9$.
 $(-1, 6), (1, 6), (2, 5), (3, 2), (23, 2), (-1, 16).$

تمثل المعادلة الخطية بمتغيرين s و c ، فانوًا جبرياً نعتمد فيه قيم أحد المتغيرين على الآخر، وعند وضع (s, c) في المعادلة بدلالة (s) نسمى (s) موضوعاً للقانون، وتسمى عملية كتابة أحد المتغيرين بدلالة الآخر تغيير موضوع القانون.

مثال

أكتب المعادلة $6s + 3c = 9$ ، بحيث أجعل c موضوعاً للقانون.

$$\begin{aligned} 6s + 3c - 9 &= 0 \\ 6s - 6s &= 9 - 3c \\ 0 &= 9 - 3c \\ 3c &= 9 - 6s \\ c &= 3 - 2s \end{aligned}$$

أحوال

أكتب المعادلات الخطية الآتية بحيث أجعل c موضوعاً للقانون.

$$(1) 2s + 8c = 6 \quad (2) 32s - 4c = 16 \quad (3) 5s - c = 7$$

لِلْيَوْمِ حَلُّ نَظَارٍ مَكْوَنٌ مِنْ عِدَالَيْنِ بِهِ لَخَيْرَيْنِ

ماذا سأتعلّم؟

حديقة مستطيلة الشكل محيطها ٢٠٠ م، والفرق بين بعديها ٢٠ م، ما بعدها الحديقة؟

- أحل نظام معادلين بمتغيرين بطرق متعددة: (الحذف، التعويض).

لإيجاد بعدي الحديقة، أعبّر عن المسألة الكلامية بتعابير جبرية.
 محيط المستطيل = $2 \times \text{الطول} + 2 \times \text{العرض}$ ، أفترض أن الطول (س) والعرض (ص).
 إذن: $2s + 2c = 200 \dots \dots \dots (1)$ هذه المعادلة الأولى.
 الفرق بين بعديها ٢٠ (كلمة الفرق يقصد بها طرح أحد بعديها من الآخر).
 $\text{الطول} - \text{العرض} = 20$
 إذن: $s - c = 20 \dots \dots \dots (2)$

أصبح لدينا معادلتان خطيتان بمتغيرين (تسمى هاتان المعادلتان نظام المعادلين الخطبيتين).
 $2s + 2c = 200 \dots \dots \dots (1)$
 $s - c = 20 \dots \dots \dots (2)$

استطيع إيجاد حلّ نظام المعادلين الخطبيتين بطرريقتين (التعويض، الحذف).
 أوّلاً: طريقة التعويض. أجعل إحدى المعادلتين موضوعاً للقانون، ثم أعرضها في المعادلة الأخرى.
 لأجعل ص موضوعاً للقانون في المعادلة (1)

$$2s + 2c = 200 \quad \text{نطرح من طرفي المعادلة } 2s.$$

$$2s + 2c = 200$$

$$- 2s \quad - 2s = 200 - 2s \quad \leftarrow$$

$$\text{أقسم طرفي المعادلة على } 2 \quad \leftarrow \quad s = 100 - c$$

أصبحت (ص) موضوعاً للقانون في المعادلة الأولى.

أعرض قيمة ص والتي هي $(100 - s)$ في المعادلة الثانية.

$$s - c = 20 \quad \leftarrow \quad s - (100 - s) = 20 \quad \text{أوزّع الطرح على ما في داخل القوس، ثم أجمع الحدود المتشابهة } s - 100 + s = 20 \quad \leftarrow \quad 2s = 100 - 20 \quad \leftarrow \quad 2s = 80 \quad \leftarrow \quad s = 40$$

أجمع للطرفين ١٠٠

تصبح المعادلة $2s = 120$. أقسم الطرفين على 2 لتصبح $s = 60$.

أُعرض في المعادلة $s = 100 - \cancel{s}$ لإيجاد قيمة s ،

فتكون قيمة $s = 100 - 60 = 40$.

إذن: مجموعة حل المعادلة هي $\{40, 60\}$.

ثانياً: طريقة الحذف. أكتب المعادلين أسفل بعضهما، ثم أضرب إحدى المعادلين بعده لتسهل

عملية حذف المتغير عند جمع المعادلين. $2s + 2c = 200 \dots (1)$

$$s - c = 20 \dots (2)$$

أضرب المعادلة بالعدد 2 ← أضرب المعادلة بالعدد 2

$$(1) \dots 2s + 2c = 200 \quad \text{أجمع المعادلة 1 مع المعادلة 2:}$$

$$(2) \dots \frac{2s - 2c = 40}{4s = 240} +$$

الاحظ أن (s) قد حذفت لأننا جعلنا المعامل في المعادلة 2، معكوساً للمعامل في المعادلة 1

أقسم طرفي المعادلة على العدد 4 ← أقسم طرفي المعادلة على العدد 4

أُعرض قيمة $s = 60$ في إحدى المعادلين لأجد قيمة c ← أُعرض قيمة $s = 60$ في إحدى المعادلين لأجد قيمة c

$$200 + 60 \times 2$$

$$200 + 120$$

أطرح من طرفي المعادلة العدد 120 ← أطرح من طرفي المعادلة العدد 120

أقسم الطرفين على 2 ، فتصبح المعادلة $2c = 80$ ← أقسم الطرفين على 2 ، فتصبح المعادلة $2c = 80$

$$c = 40$$

إذن: مجموعة حل المعادلة هي $\{40, 60\}$.

مثال

أجد مجموعة حل نظام المعادلات الآتي باستعمال التعويض:

$$5s + 15c = 60 \quad (1)$$

$$3c = 3s - 12 \quad (2)$$

أجعل (ص) موضوعاً لقانون في المعادلة ٢، بحيث أقسم طرفي المعادلة على ٣
 $c = s - 4$ ، ثم أعرض قيمة (ص) = $s - 4$ في المعادلة ١.

$$5s + 15(s - 4) = 60 \quad \text{ينتج معادلة بمتغير واحد:}$$

$$5s + 15s - 60 = 60 \quad \text{أو زع العدد 15 على ما في داخل القوس:}$$

$$60 = 60s - 20 \quad \text{ثم أجمع الحدود المتشابهة:}$$

$$60 + 20 = 60s \quad \text{أضيف 60 للطرفين:}$$

$$80 = 60s \quad \text{لتصبح } 20s = 120 \text{ أقسم على 20:}$$

أعرض في إحدى المعادلتين بقيمة (س) لأجد قيمة (ص):

$$5s + 15c = 60 \quad (1)$$

$$15c = 60 - 60s \quad (2)$$

$$15c = 60 - 60s \quad (2)$$

إذن: مجموعة حل المعادلة {٦، ٢}.

أحوال

استعمل طريقة التعويض في حل نظام المعادلات الآتي:

$$(1) s + 4c = 3 \quad (2) s - 12 = c$$

مثال

أكون نظام معادلات من المسألة الآتية، ثم استعمل طريقة الحذف في حلها:

عدان مجموعهما ١١ ويزيد ٣ أمثال أحدهما على مثلي الآخر بمقدار ٣، فما هما العدان؟

افتراض أن العددين هما (س) و (ص) إذن: $s + c = 11$

$$3s - 2c = 3$$

أضرب المعادلة الأولى بـ ٢، ثم أحذف ٢ص مع $-2c$

$$2s + 2c = 22 \quad (1)$$

$$3s - 2c = 3 \quad (2)$$

أحد قيمة (س) بقسمة الطرفين على ٥ $s = 5$


أعرض في إحدى المعادلتين لأحد قيمة (ص): $2s + 2c = 22 \Rightarrow 2c = 22 - 2s$

$$2c = 2s - 10 \quad (2)$$


إذن: مجموعة حل النظام هي: {٥، ٦}.

أكُونُ نظامَ معادلاتٍ مرتبطاً بهذهِ المسألةِ، ثمَّ أستعملُ طريقةَ الحذفِ في إيجادها: عددانِ مجموعُهُما ١٠، والفرقُ بينهما ٢، ما العددانِ؟


الاحظُّ مما سبقَ، أنَّ حلولَ أنظمةِ المعادلاتِ الخطيةِ الواردةِ في الأمثلةِ، كانتْ حللاً وحيداً (نقطةً تقاطعٍ مشتركةً). فهلْ توجُّدُ حالاتٌ أخرى؟ ماذا لو كانَ المستقيمانِ متوازيَّينَ؟ أوْ متطابقَيْنَ؟ أتأمَّلُ الصورَ الآتيةَ:



الشكل ٣



الشكل ٢



الشكل ١

الاحظُّ من الشكلِ ١، أَنَّهُ لا يوجُدُ حلٌّ لنظامِ المعادلتَيْنِ، لأنَّهُ لا يوجدُ نقطَةٌ تقاطعٌ بينَ المعادلتَيْنِ. تكونُ عندهَا مجموعَةُ الحلِّ فاي \emptyset ، أمَّا في الشكلِ ٢، فُنلاحظُ تطابقَ المستقيميَّنِ؛ لذا، تكونُ مجموعَةُ الحلِّ غيرَ منتهيَّةٍ (عدداً لا نهائِيًّا منَ الحلُّولِ). بينما في الشكلِ ٣، توجُّدُ نقطَةٌ تقاطعٌ واحدةً، فتكونُ هيَ حلُّ النظَامِ. عندَ حلٍّ نظامِ المعادلتَيْنِ ص = ١ - س. الاحظُّ أنَّ مجموعَةَ الحلِّ \emptyset لا يوجُدُ حلولٌ في الشكلِ ١ يُمثِّلُها.

$$\text{ص} = 4 - \text{س}$$

أمَّا عندَ حلٍّ نظامِ المعادلتَيْنِ ص = ٢ - س ، ص + ٣ س = ٦ فُنلاحظُ أَنَّهُ يوجدُ عددٌ لا نهائِيٌّ منَ الحلُّولِ، والشكلُ ٢ يُمثِّلُها.

أمَّا النظَامُ ص = ٣ - س فلهُ حلٌّ وحيدٌ وهوَ النقطَةُ (٢ ، ١) والشكلُ ٣ يُمثِّلُها.

خلاصةٌ

- في نظامِ المعادلاتِ الخطيةِ بمتغيرَيْنِ على صورةِ ص = أ س + ب ، ص = م س + ج
- (١) يكونُ للنظامِ حلٌّ وحيدٌ إذا كانتْ $A \neq M$
 - (٢) لا يوجدُ حلٌّ للنظامِ إذا كانتْ $A = M$
 - (٣) يوجدُ عددٌ لا نهائِيٌّ منَ الحلُّولِ إذا كانتْ $A = M$ ، $B = G$



١) باستعمال طريقة الحذف، أحـلـ نظامـ المـعـادـلـاتـ الآـتـيـ: $5ص + 4س = 15$ $3ص + س = 2$

٢) ما الأزواج المرتبة التي تمثل حلـلـ لنـظـامـ المـعـادـلـاتـ الآـتـيـ: $3ص + س = 0$ $ص + 2س = 2$

- جـ (٣ ، ١) بـ (١ ، ٣-) أـ (٠ ، ٥ ، ١٥-)

خصائص المثلث

الهندسة والقياس

المجال

المستقيمات والزوايا والمضلعات


المحور

خصائص المثلث

- أتعرّفُ بعضَ خصائصِ المثلثِ.
- أتعرّفُ خصائصَ المثلثِ المتطابقِ الضلعينِ.
- أتعرّفُ خصائصَ المثلثِ المتطابقِ الأضلاعِ.

ما نتائجُ إزالةِ عمودٍ منْ رأسِ مثلثٍ متطابقِ
الضلعينِ على قاعدتهِ؟

التعلم القبلي



١) أستعملُ المنقلةَ لقياسِ زوايا المثلثِ في الشكلِ المجاورِ:

٢) ما مجموعُ زوايا المثلثِ؟

٣) قطعٌ مستقيمةٌ أطوالُها ٣ سم، ٦ سم، ٥ سم. هل يُمكّني تشكيلُ مثلثٍ منْ هذهِ القطعِ المستقيمةِ؟

٤) المثلثُ أ ب جـ فيه أ ب = ٤ سم، أ جـ = ٦ سم، ب جـ = ٣ سم، وكانتْ قياساتُ زواياهُ (منْ دونِ ترتيبِ)

٣٠، ٨٠، ٧٠. ما قياسُ كـلـ منْ الزوايا أ ، ب ، جـ؟

أذكر

المثلث متطابق الأضلاع أو متطابق الضلعين أو مختلف الأضلاع.

المثلث منفرج الزاوية أو قائم الزاوية أو حاد الزوايا.


مجموع زوايا المثلث 180°

الضلوع الأطول في المثلث يقابل الزاوية الكبرى.

مساحة المثلث = نصف طول القاعدة \times الارتفاع

حيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه

خصائص المثلث



أولاً: المثلث المتطابق الأضلاع

ماذا سأتعلّم؟

كيف يمكنني أن أعرف قياسات بعض زوايا المثلث وأطوال أضلاعه؛ عن طريق بعض المعطيات عن المثلث، ومن دون استعمال أدوات القياس؟


- أتعرّفُ خصائص المثلث.
- أتعرّفُ خصائص المثلث المتطابق الأضلاع.

ما قياس زاوية المثلث المتطابق الأضلاع؟


أعرف أن أطول ضلع في المثلث يقابل الزاوية الأكبر فيه. وبما أن أطوال أضلاع المثلث المتطابق الأضلاع متساوية، فإن قياسات زواياه متساوية. وبما أن مجموع قياسات أي مثلث هو 180 درجة، فإن قياس الزاوية الواحدة في المثلث المتساوي الأضلاع هو $180 \div 3 = 60$ درجة.

إذن: قياس أي زاوية في المثلث المتطابق الأضلاع هو 60° .

إذا أنزلت عموداً من رأس المثلث A بـ ج المتطابق الأضلاع على قاعته، وقسمت طول بـ د وطول دـ ج فسأجد أنهما متساويان، ومن ذلك أستنتج ما يأتي:



العمود النازل من رأس المثلث المتطابق الأضلاع على قاعته؛ يُنصف القاعدة وينصف زاوية الرأس.




مثال: المثلث S ص مع متطابق الأضلاع وطول ضلعه 6 سم ، أنزل عمود من رأس المثلث على قاعته في النقطة (L) كما في الشكل المجاور. أجد قياس الزاوية CSL وطول SL .

الحل: بما أن المثلث متطابق الأضلاع؛ فإن قياس زاوية الرأس $C = 60^\circ$ ، وبما أن العمود النازل من زاوية الرأس يُنصف القاعدة وينصف زاوية الرأس؛ فإن قياس الزاوية $CSL = 60^\circ \div 2 = 30^\circ$ وطول $SL = 6 \div 2 = 3\text{ سم}$.

ثالثاً: المثلث المتطابق الضلعين

المثلث المتطابق الضلعين يتشابه كثيراً مع المثلث المتطابق الأضلاع؛ ففي الشكل المجاور، المثلث A بـ ج مثلك متطابق الضلعين فيه $AB = AJ$.




وبما أنهما متساويان؛ فإن الزوايا المقابلة لهما أيضاً متساوية القياس. أي إن قياس زاويتي القاعدة (الزاوية B والزاوية J) متساو.

وكذلك عند إنزال عمود من رأس المثلث على قاعته؛ فإنه يُنصف القاعدة وينصف زاوية الرأس.

ثالثاً: قطعة مستقيمة تصل بين مترافقين ضلعي مثلث

أرسم المثلث (ABJ) ثم أنصف الضلعين (AB) ، (AJ) في النقطتين (D)، (E) في النقطتين (D)، (E) في النقطتين (D)، وأصل بينهما كما في الشكل المجاور.




بهذه الطريقة، أكون كأنني قمت بتصغير المثلث (ABJ) إلى المثلث (ADE) بمقدار النصف؛ لأن $(AB) \cong (AD)$ ، و $(AJ) \cong (AE)$ فيكون بالضرورة $(BJ) \cong (DE)$.

إذا قسمت الأضلاع بالمسطرة؛ ستأكد من صحة هذه الاستنتاجات،

وحتى إن استعملت مثلثات مختلفة فستكون النتيجة نفسها في كل مرة. ومن ذلك أستنتج القاعدة الآتية:


طول القطعة المستقيمة الواقلة بين منتصفين ضلعي أي مثلث، يساوي نصف طول الضلع الثالث.



مثال: في الشكل المجاور، إذا كان طول $AB = 10\text{ سم}$ ، فما قياس وهـ؟

الحل: بما أن النقطة (W) هي منتصف (BJ)، والنقطة (H) هي منتصف (AJ)؛

إذن: طول $(AB) \cong (WH)$. أي إن $(WH) = 10 \div 2 = 5\text{ سم}$.




١) في الشكل المجاور،

إذا كانت أطوال القطع المستقيمة كما يأتي:

$$AB = 8\text{ سم، } BC = 6\text{ سم، } AC = 5\text{ سم،}$$

فأجد محيط المثلث وده.



٢) المثلث في الشكل المجاور،

هل هو متطابق الأضلاع أم متطابق الضلعين؟ لماذا؟

اللهم يحمدك