

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= 1 - 2\sin^2 \theta \\ &= 2\cos^2 \theta - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha x &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha x) \\ \cos^2 \alpha x &= \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha x) \\ \sin^3 \alpha x &= (1 - \cos^2 \alpha x) \sin \alpha x \\ \cos^3 \alpha x &= (1 - \sin^2 \alpha x) \cos \alpha x \\ 1 + \tan^2 \alpha x &= \sec^2 \alpha x \end{aligned}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{4 \tan \theta}{1 - 4 \tan^2 \theta} \\ u(x) &= 4x - 3 \\ u'(x) &= 4 \\ v &= \sqrt{2x^2 - 3x + 1} \\ v' &= \frac{4x - 3}{\sqrt{2x^2 - 3x + 1}} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan kx &= k \sec^2 kx \\ \int \sec^2 \alpha x \, dx &= \frac{1}{\alpha} \tan \alpha x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z^2 + 3z + 4 &= 0 \\ z^2 + 2z^2 + 2 - 6 &= 0 \\ z^2 - 2 &= 0 \\ z &= \pm \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(x) &= 4x - 3 \\ v &= 2(2x^2 - 3x + 1)^{\frac{1}{2}} \\ \frac{d^2 u}{dx^2} &= \frac{4}{2(2x^2 - 3x + 1)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{4}{\sqrt{2x^2 - 3x + 1}} \end{aligned}$$

# الباب الأول: الرياضيات

$$\begin{aligned} 3z + 4 &= 0 \\ +3z + \frac{9}{4} &= -4 + \frac{9}{4} \\ 2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 &= -\frac{7}{4} \\ 2 + \frac{9}{4} &= -\frac{7}{4} \\ 2 &= -\frac{7}{4} - \frac{9}{4} \\ &= -\frac{16}{4} \\ &= -4 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \cos^{-1} x &= \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx} \tan^{-1} x &= \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \left[ \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_0^1 - \left[ \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_0^0 \\ &= \left( \frac{1}{3} - \frac{3}{2} \right) - (0 - 0) \\ &= \frac{2}{6} - \frac{9}{6} \\ &= -\frac{7}{6} \text{ sq. units} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx &= \sin^{-1} \frac{x}{a} + c \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} \, dx &= \cos^{-1} \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} + c \\ \int \frac{1}{a^2 + x^2} \, dx &= \tan^{-1} \frac{x}{a} + c \end{aligned}$$



# الفصل الأول :

## الرياضيات الأساسية

- التخمين الرياضي : إصدار ادعاء عام ( بهدف تعليمي ) يركز على معطيات ومعلومات معروفة.
- التبرير الاستقرائي : العملية التي يتم من خلالها اختبار عدة مواقف محددة للوصول إلى التخمين.
- المثال المضاد : هو نفي الادعاء أو التخمين لإثبات خطأ العبارة.
- العبارة : كل جملة خبرية يمكن الحكم عليها بأنها صحيحة فقط أو خاطئة فقط وهي نوعان :
- عبارة وصل : وهي العبارة التي تحتوي على أداة وصل " و " وتكتب  $p \wedge q$  وتقرأ  $p$  و  $q$ .
  - عبارة فصل : وهي التي تحتوي على أداة فصل " أو " وتكتب  $p \vee q$  وتقرأ  $p$  أو  $q$ .
- جدول الصواب : طريقة مناسبة لتنظيم قيم الصواب للعبارات المنطقية.

## ملاحظات هامة :

- يرمز في جدول الصواب ، للعبارة الصائبة ( الصحيحة ) بالرمز (T) وللعبارة الخاطئة بالرمز (F)
- يرمز في جدول الصواب للنفي بالرمز  $\sim p$  أو  $\sim q$  أو أي عبارة تشمل رمز نفي (  $\sim$  )
- عبارة الوصل تكون صحيحة إذا كانت مركبتها صحيحتان أما عبارة الفصل فتكون خاطئة فقط عندما تكون مركبتها خاطئتين.

س1/ كون جدول الصواب للعبارة  $p \wedge q$  ؟

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

- 1) نفصل كل عبارة على حدة
- 2) نضع في الجدول الأول ( على اليسار ) احتمالين (T T) (F F)
- 3) في الجدول الآخر T F T F
- 4) إذا كانت الأول صحيحة والثانية صحيح فالكل صحيح ، أما إذا كانت الأولى والثانية خاطئة فالكل خاطئ وكذلك إذا كانت الأولى صحيحة والثانية خاطئة فالكل خاطئ .

س2/ كون جدول الصواب للعبارة المركبة  $\sim p \wedge \sim q$

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$
T	T	F	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T



## - تحديد الفرض والنتيجة ( العبارة الشرطية " إذا كان ... فإن ..." ) :

- الفرض : الجملة التي تتبع كلمة " إذا " - النتيجة : الجملة التي تتبع كلمة " فإن "

مثل : الزاوية التي قياسها أقل من 90 درجة هي زاوية حادة ..

الفرض : زاوية قياسها أقل من 90 النتيجة : زاوية حادة .

العبارة	مكونة من	بالرموز	مثال توضيحي
الشرطية	فرض مُعطى ونتيجة	$p \rightarrow q$	إذا كانت الزاوية حادة فإن قياسها أقل من 90 درجة.
العكس	تبديل الفرض والنتيجة	$q \rightarrow p$	إذا كان قياس الزاوية أقل من 90 درجة فإنها تكون حادة
المعكوس	نفي كلا من الفرض والنتيجة في العبارة الشرطية	$\sim p \rightarrow \sim q$	إذا كانت الزاوية ليست حادة فإن قياسها ليس أقل من 90 درجة
المعكوس الإيجابي	نفي كل من الفرض والنتيجة في عكس العبارة الشرطية	$\sim q \rightarrow \sim p$	إذا كان قياس الزاوية ليس أقل من 90 فإنها ليست زاوية حادة .

## العبارة الشرطية الثنائية :

- العبارة الشرطية الثنائية : هي ربط عبارة شرطية وعكسها بأداة الربط " و " نعب عنها رياضياً كما يلي :


$$p \leftrightarrow q \text{ أو } p \rightarrow q \wedge p \rightarrow q \text{ ( إذا فقط إذا } q \text{ )}$$

## المسلّمات والبراهين الحرة :

- المسلمة : عبارة صحيحة لا تقبل النقاش ولا البرهان ( أي يسلم بصحتها دوماً ) .

- النظرية : عبارة قابلة للنقاش ، وهي مستنتجة من المسلمات والتعاريف الرياضية .

## مسلمات هامة :



(1) كل نقطتين مختلفتين يمر بهما مستقيم واحد.

(2) كل 3 نقاط مختلفة ولا تقع على مستقيم واحد يمر بها مستوى واحد.

(3) كل مستقيم يحوي نقطتين على الأقل.


(4) كل مستوى يحوي 3 نقاط مختلفة على الأقل وليست على استقامة واحدة.

(5) إذا وقعت نقطتان في مستوى فإن المستقيم الوحيد المار بهاتين النقطتين يقع كلياً في ذلك المستوى.

$$( E \in G, F \in G, \therefore \overline{EF} \subset G )$$

(6) إذا تقاطع مستقيمان فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة. (  $\overline{AB} \cap \overline{CD} = \{m\}$  )

(7) إذا تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان في مستقيم.



س3/ عدد القطع المستقيمة التي يمكن رسمها لنصل بين كل زوج من النقاط التالية هو :

- أ) 4      ب) 6      ج) 21      د) 24



$$\frac{n(n-1)}{2}$$

**الحل :** ( 6 ) باستعمال القانون :  $\frac{n(n-1)}{2}$  حيث  $n$  ; يمثل عدد النقاط.

س4/ عدد القطع المستقيمة التي يمكن رسمها لنصل بين كل زوج من النقاط التالية هو :

- أ) 9      ب) 15      ج) 21      د) 28



$$\frac{n(n-1)}{2}$$

**الحل :** ( 21 ) باستعمال القانون  $\frac{n(n-1)}{2}$  حيث  $n$  ; يمثل عدد النقاط.

س4/ المفهوم الذي يختلف عن باقي المفاهيم الأخرى :

- أ) النتيجة      ب) التخمين      ج) النظرية      د) المسلمة

**الحل :** التخمين ، لأن كلا النتيجة والنظرية والمسلمة.

س5/ ما هو أكبر عدد من المستويات التي يتم تحديدها من خمس نقاط لا تقع على استقامة واحدة ؟

- أ) 12      ب) 15      ج) 6      د) 10

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

**الحل :** ( ب ) 15 بالتعويض بالقانون  $\frac{n(n-1)}{2}$  حيث  $n$  ; يمثل عدد النقاط.

## الزوايا :-

- الزاوية الحادة : هي زاوية قياسها أقل من 90 درجة.


- الزاوية القائمة : زاوية قياسها 90 درجة.

- الزاوية المنفرجة : زاوية قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة.

- الزاوية المستقيمة : زاوية قياسها 180 درجة.

- الزوايا المتتامه : تكون الزاويتان متتامتين إذا كان مجموعهما = 90 درجة.

- الزوايا المتكاملة : تكون الزاويتان متكاملتين إذا كان مجموعهما = 180 درجة.



س6/ إذا كانت  $\angle 1, \angle 2$  متتامتان، وكان  $m\angle 1 = 43$ ، فإن  $m\angle 2$  بالدرجات =

- أ) 137      ب) 133      ج) 86      د) 47

**الحل :** ( د ) 47 ، لأن الزاوية المتتامه = 90 ، ف ( 43 - 90 ) = 47

س7/ إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متتامتين 2:3 فإن الزاوية الصغرى بالدرجات =


- أ) 90      ب) 54      ج) 36      د) 18

**الحل :** بجمع النسبتين ( 3 + 2 ) = 5 ، وبما أن الزاويتان متتامتان إذاً = 90 ، ولذلك  $18 = 90/5$  وبالضرب بأصغر


نسبة =  $18 \times 2 = 36$  ، في حين أن الزاوية الكبرى =  $18 \times 3 = 54$

## المستقيمت والمستويات :-

- المستقيمان المتوازيان : يقال للمستقيمين أنهما متوازيان إذا كانا في مستوى واحد دون تقاطع .
- المستقيمان المتخالفان : يقال للمستقيمين أنهما متخالفان إذا كانا لا يقعان في مستوى واحد بلا توازي .  
فمثلاً : نقول أن  $\overline{CG}$  و  $\overline{AB}$  متخالفان وكذلك  $\overline{HD}$  و  $\overline{AB}$  أنهما متخالفان وذلك لأنهما لا يتقاطعان ولا يجمعهما مستوى واحد .
- المستقيم المستعرض : مستقيم يقطع مستقيمين أو أكثر في مستوى في نقاط مختلفة.
- المستويان المتوازيان : يقال للمستويين أنهما متوازيان إذا كانا لا يتقاطعان .
- المستويان المقاطعان : يتقاطع المستويان في خط مستقيم .



مستويات متوازية



مستويان متقاطعان

	$\angle 1, \angle 2, \angle 7, \angle 8$	الزوايا الخارجية
	$\angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$	الزوايا الداخلية
	$\angle 6, \angle 3$ $\angle 4, \angle 5$	الزاويتان الداخليتان المتخالفتان
	$\angle 1, \angle 7$ $\angle 2, \angle 8$	الزاويتان الخارجيتان المتبادلتان
	$\angle 4, \angle 6$ $\angle 3, \angle 5$	الزاويتان الداخليتان المتبادلتان
	$\angle 1, \angle 5$ $\angle 3, \angle 7$ $\angle 2, \angle 6$ $\angle 4, \angle 8$	الزاويتان المتناظرتان

س8/ في الشكل التالي حدد قيم الزوايا المجهولة :

الزاوية B = ( 180 - 30 ) = 150 درجة.

الزاوية D = ( مقابلة للزاوية 30 ) إذاً = 30 درجة.


الزاوية C = ( مقابلة للزاوية B ) = 150 درجة.

الزاوية E = ( كل زاويتين داخليتين متبادلتين متطابقتان ) ( C = F , D = E ) = 30 درجة.

الزاوية F = زاوية C = 150

الزاوية G = ( كل زاويتين خارجيتين متبادلتين متطابقتان ) ( B = G , A = H ) = 150 درجة.

الزاوية H = زاوية A = 30 درجة.



## المثلث :-

- يصنف المثلث طبقاً لـ 3 أشياء وهي : (1) زواياه. (2) أضلاعه. (3) رؤوسه.

### \* تصنيف المثلث حسب الأضلاع :




- مثلث قائم الزاوية : به زاوية واحدة قائمة وقياسها = 90 درجة .
- مثلث حاد الزاوية : مثلث جميع زواياه حادة وقياس كل زاوية أقل من 90 درجة .
- مثلث منفرج الزاوية : به زاوية واحدة منفرجة ، وبه زاوية قياسها أكبر من 90 درجة .

### \* تصنيف المثلث حسب الأضلاع :

- مثلث متطابق الأضلاع : جميع أضلاع متطابقة وبالتالي زواياه متطابقة ، وكل زاوية = 60 درجة فيه .
- مثلث متطابق الضلعين : يوجد به ضلعان متطابقان على الأقل . وقياس زاويتي المتطابقان = 45 درجة ، والأخرى = 90 .
- مثلث مختلف الأضلاع : أضلاع غير متطابقة وبالتالي زواياه غير متطابقة .

### \* تصنيف المثلث حسب الرؤوس :

- يتطابق المثلثان حسب الرؤوس أيضاً ، فكيفية تحديد الرؤوس هي عن طريق تحديد الوتر والضلعان الآخرين كما في الشكل الأيسر .



ملاحظات على المثلث :

- مجموع زوايا المثلث الداخلية = 180 درجة .
- مجموع زوايا المثلث الخارجية = 360 درجة .
- الزاوية الخارجية في مثلث : مجموع الزوايا الداخليتين عدا الزاوية المجاورة .
- يوجد لأي مثلث 6 زوايا خارجية .
- الزاويتان الحادتان في المثلث القائم الزاوية متتامتان ( مجموعهما 90 درجة ) .
- أكبر زوايا المثلث في القياس تقابل أكبر أضلاع المثلث طولاً .

مسلمة SSS ، SAS ، AAS ، ASA :-

يقصد بمسلمة SSS : هي وجود 3 أضلاع متطابقة . حيث ( S : يرمز لضلع . ) ( side ) .

يقصد بمسلمة SAS : هي وجود ضلعان مع زاوية محصورة بينهما . حيث ( A : Angle ) .

يقصد بمسلمة AAS : هي وجود زاويتان وضلع .

يقصد بمسلمة ASA : هي وجود زاويتان مع ضلع محصور بينهما .

س/9 أي من الخيارات التالية يمكن أن تمثل أطوال أضلاع مثلث :



(د) 1,2,4

(ج) 7,9,14

(ب) 4,6,11

(أ) 5,7,12

الحل : ( ج ) 7,9,14 لأن  $7+9=16$  ، وهي  $< 14$  .



الزوايا الخارجية

## الأشكال الرباعية:

\* المضلع : خط مغلق بسيط يتكون من اتحاد عدة قطع مستقيمة ، والمضلع نوعان :

- المضلع المحدب : المضلع الذي لا يحتوي على زاوية منعكسة .

- المضلع المقعر : المضلع الذي يحتوي على زاوية منعكسة .

\* المضلع المنتظم : مضلع محدب جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متطابقة .

مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع :-

تُعطى بالعلاقة :  $S = 180(n - 2)$  ولحساب عدد الأضلاع يُعطى بالعلاقة  $Sn = 180(n - 2)$

- لحساب زاوية من زواياه المنتظمة نطبق القانون :  $\frac{180(n-2)}{2}$

- عدد المثلثات التي ينقسم إليها المضلع يُعطى بالعلاقة :  $(n - 2)$

- عدد الأقطار المرسومة من أحد الرؤوس يُعطى بالعلاقة :  $(n - 3)$

- عدد الأقطار الكلي للمضلع يُعطى بالعلاقة :  $\frac{n(n-3)}{2}$

- قياس الزاوية الخارجية في مضلع :  $\frac{360}{n}$

س10/ المضلع الذي ليس له أقطار هو :

أ) المربع ب) المثلث

الحل : المثلث هو الوحيد الذي ليس له أقطار .

س11/ عدد أقطار الشكل الرباعي =

أ) 2 ب) 3

الحل : الإجابة ( 2 )  $n-2 = 4-2 = 2$

س12/ قياس زاوية الخماسي المنتظم بالدرجات :


أ) 72 ب) 108

الحل : بما أن المطلوب قياس زاوية واحدة فبالتعويض بالقانون  $= 108$  .


س13/ مضلع منتظم قياس زاويته الداخلية 144 درجة فإن عدد أضلاعه =

أ) 6 ب) 7

الحل : 10 بالتعويض بقانون إيجاد عدد الأضلاع .



خط مغلق خط مفتوح



مضلع محدب مضلع مقعر

د) المضلع السداسي

ج) المضلع الخماسي

د) 5

ج) 4

د) 270

ج) 180

د) 10

ج) 8



## - متوازي الأضلاع :

\* خصائصه :

- 1) الأضلاع المتقابلة لمتوازي الأضلاع متطابقة.
  - 2) الزوايا المتقابلة لمتوازي الأضلاع متطابقة.
  - 3) الزوايا المتحالفة في متوازي الأضلاع متكاملة.
  - 4) قطرا متوازي الأضلاع يُنصف كل منهما الآخر.
  - 5) كلا قطري متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقين.
- تحسب مساحة متوازي الأضلاع بالقانون : **مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة (b) × الارتفاع (a) .**

## - المستطيل :

\* خصائصه :

- 1) الأضلاع المتقابلة متطابقة ومتوازية .
  - 2) الزوايا المتقابلة متطابقة.
  - 3) الزوايا المتحالفة متكاملة .
  - 4) القطران متطابقان وينصف كل منهما الآخر.
  - 5) جميع الزوايا الأربع قوائم.
- ملاحظة / كل مستطيل يعتبر متوازي أضلاع ، ولكن بعض متوازيات الأضلاع تكون مستطيل .
- تحسب مساحة المستطيل بالقانون : **مساحة المستطيل = الطول × العرض .**


## - المربع :

\* خصائصه :

- 1) جميع أضلاعه متطابقة.
  - 2) القطران متعامدان ومتطابقان
  - 3) جميع زواياه قوائم .
- ملاحظة / كل مربع معين وليس كل معين مربع .
- تُعطى مساحة المربع بالقانون : **( طول الضلع ) × ( طول الضلع )**


## - شبه المنحرف :

\* خصائصه :



- 1) زاويتا كل قاعدة لشبه المنحرف متطابق الساقين متطابقتان .
  - 2) قطرا شبه المنحرف متطابق الساقين متطابقان .
- تُعطى مساحة شبه المنحرف بالقانون :  $1/2$  ( مجموع طولي قاعدتيه ) × الارتفاع .
- لحساب القطعة المتوسطة لشبه المنحرف تُعطى بالقانون التالي :  $1/2$  ( مجموع طولي القاعدة ) .

س14/ في الشكل التالي قيمة  $x =$



د) 10

ج) 5

ب) 4

أ) 3.5


**الحل :** بالتعويض بالقانون : القطعة المتوسطة =  $1/2$  × ( مجموع طولي القاعدة )

$$إذاً 13 = 1/2 ( 3x+8 ) + ( 4x-10 ) = 26 = 2 - 7 = 28/7 = 4$$

## النسبة والتناسب :

- النسبة: هي مقارنة بين كميتين باستخدام القسمة فنسبة  $a$  إلى  $b$  بحيث  $b \neq 0$  يمكن أن تكتب على الصورة  $\frac{a}{b}$  أو  $a:b$ .
- التناسب : هي تساوي نسبتين .

س15/ قيمة " x " إذا علمت أن الأعداد هي : 2 ، 3 ، x ، 6 :



- أ) 3      ب) 4      ج) 6      د) 14

**الحل :**  $3x = 12$  ، إذاً  $x = 4$

س16/ إذا كان عمر فهد 12 سنة والنسبة بين عمره وعمر والده  $\frac{1}{3}$  فما عمر والده ؟

- أ) 48      ب) 36      ج) 28      د) 25

**الحل :** عمر فهد / عمر والده =  $\frac{1}{3}$  إذاً  $\frac{12}{x} = \frac{1}{3}$  ، يعني ذلك أن :  $36 = x = 12 \times 3$

س17/ قطعة من الجبن تحتوي على 9gm، منها 6gm دهون مشبعة فإن نسبة الدهون المشبعة إلى كامل الدهون هي

- أ)  $\frac{2}{5}$       ب)  $\frac{2}{3}$       ج)  $\frac{2}{4}$       د)  $\frac{2}{6}$

**الحل :** بجمع الأجزاء ( كامل الدهن ) =  $9+6 = 15$  ، والدهون المشبعة = 6 يعني ذلك  $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$  .

س18/ مثلث محيطه 52cm والنسبة بين أطوال أضلاعه هي 6 : 4 : 3 فإن طول أقصر أضلاع المثلث =

- أ) 24      ب) 16      ج) 12      د) 5

**الحل :** بجمع الأجزاء  $(3+4+5) \times x = 52$  ، إذاً  $\frac{52}{13} = 4$  ، وطول أقصر ضلع  $3 \times 4 = 12$  ( ج ) .

س19/ أوجد قياسات زاوية المثلث الكبرى ، النسبة بين قياسات زواياه 5:3:2 ؟

- أ) 90      ب) 54      ج) 36      د) 18

**الحل :** بجمع الأجزاء  $(2 + 3 + 5) \times x = 180$  ، إذاً  $\frac{180}{10} = 18$  ، وأكبر زاوية  $5 \times 18 = 90$

س20/ اشترك ثلاثة أشخاص في تجارة وكانت النسبة بين ما دفعه الأول والثاني هي 1 : 2 والنسبة بين ما دفعه الثاني والثالث

4 : 3 ، وفي نهاية الشهر كان الربح مساوياً 3400 ريال فكم يكون نصيب الشخص الثاني من الأرباح بالريال ؟

- أ) 337.778      ب) 800      ج) 1200      د) 3500

**الحل :**

الثالث : الثاني : الأول



3 : 6 : 8


النسب ستكون  $17x = 8 + 6 + 3$

ولذلك  $200 = \frac{3400}{17}$  ونصيب الثاني =  $200 \times 6 = 1200$  ريال

## الدائرة :-

- الدائرة : هي المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى ، والتي تبعد البعد نفسه من نقطة معطاة ( ثابتة ) .
- مساحة الدائرة تُعطى بالعلاقة :  $\pi r^2$  حيث :  $r$  نصف القطر .
- محيط الدائرة تُعطى بالعلاقة :  $C = 2\pi r$  أو  $C = 2\pi r$  حيث  $C$  : محيط الدائرة ،  $r$  : يمثل نصف القطر .
- $\pi$  هي النسبة التقريبية وتساوي : 3.14 أو  $\frac{22}{7}$  .
- محور تناظر الدائرة يكون أي قطر مار فيها .

السداسي المحصور داخل دائرة	المربع المحصور بداخل دائرة	المثلث المتطابق الأضلاع المحصور بداخل دائرة
$r =$ طول الضلع	$\sqrt{2} \times r =$ طول الضلع	$\sqrt{3} \times r =$ طول الضلع



الزاوية المركزية والزاوية المحيطية :-

- الزاوية المركزية : هي زاوية يقع رأسها على مركز الدائرة .

- الزاوية المحيطية : هي زاوية ضلعاها وتران في الدائرة ورأسها يقع على المحيط ABC .

\* الزاوية المركزية =  $2 \times$  الزاوية المحيطية .

\* والزاوية المحيطية =  $\frac{1}{2}$  الزاوية المركزية .

أقواس الدائرة :

نصف الدائرة	القوس الأكبر	القوس الأصغر
القوس الذي قياسه = 180 درجة	القوس الذي قياسه < 180 درجة .	القوس الذي قياسه > من 180 درجة .
يسمى بحرفي في نهايته ونقطة أخرى على القوس $\widehat{LJK}$ , $\widehat{LMK}$	يسمى بحرفي في نهايته ونقطة أخرى على القوس $\widehat{PFR}$	يسمى بحرفي نهايته $\widehat{AC}$

يُعطى قانون حساب طول القوس بالعلاقة :

$$\frac{A}{360} = \frac{\ell}{2\pi r}$$

حيث  $A$  : قياس القوس بالدرجات ،  $C$  : محيط الدائرة ،  $\ell$  طول القوس .

$$\ell = \frac{A}{360} \times C$$

ويمكن كتابتها بالصيغة التالية :

س21/ في الشكل التالي مقياس زاوية  $AB$  في الشكل التالي :

- أ) 60 (ب) 120 (ج) 270 (د) 300

**الحل :** 60 ( لأنه نفس الاستواء).

س22/ في الشكل المقابل مقياس زاوية قوس  $ACB, AC$  هو :

- أ) 120,180 (ب) 180,120 (ج) 300,120 (د) 300,180

**الحل :** مقياس الزاوية للقوس  $AC = 120 = (180 - 60 = 120)$  والزاوية  $ACB = 180 =$

س23/ في الشكل التالي مقياس زاوية قوس  $DC =$





- أ) 230 (ب) 270 (ج) 40 (د) 30

**الحل :** ( ج ) 40 ، لأن  $AD = 50$  و  $DC$  مجهول ، و  $BC = 90$  ولذلك  $90 - 50 = 40$  .

س24/ أوجد طول القوس  $AB$  في الشكل التالي :

- أ) 9.42 (ب) 55.82 (ج) 31.4 (د) 3.94

**الحل :** ( أ ) 9.42 بتطبيق قانون طول القوس.



## كثيرات الحدود :

– وحدة الحد : هي عدداً ، أو متغيراً ( حرفياً ) ، أو حاصل ضرب عدد في متغير واحد أو أكثر بأسس صحيحة غير سالبة.

– تسمى كثيرة الحدود التي لا يمكن تحليلها بكثيرة حدود أولية.

س25/ درجة وحدة الحدود للمعادلة :  $5x^2 + 2y - 3y$  هي :

(د) 0

(ج) 2

(ب) 3

(أ) 5

**الحل :** الإجابة (ج) حسب قيمة أكبر أس لـ  $x$  ، وهي تعتبر من الدرجة الثانية.

تدريب 1/  $3x^2$  المعامل الحرفي والعددي لها = ؟

**الحل :** المعامل الحرفي  $x^2$  والمعامل العددي 3 .

تدريب 2/ هل تمثل العبارة التالية كثيرة حدود  $x^5y + 9x^4y^3 - 2xy$  ؟

**الحل :** تمثل كثيرة حدود لأنها من الدرجة السابعة ( أكبر أس في  $x$  + أكبر أس في  $y$  ) .

تدريب 3/ هل تمثل العبارة التالية كثيرة حدود  $\frac{x}{y} + 3x^2$  ؟

**الحل :** لا تمثل كثيرة حدود لأن  $\frac{x}{y}$  لا يمثل وحدة حد.

تدريب 4/ هل تمثل العبارة التالية كثيرة حدود  $\sqrt{x} + x + 4$  ؟

**الحل :** لا تمثل كثيرة حدود.

## العمليات على كثيرات الحدود :

الخاصية :	التعريف :	مثال :
ضرب القوى	$x^a \cdot b^a = x^{a+b}$	$3^2 \cdot 3^3 = 3^{3+2} = 3^5$
قسمة القوى	$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}, x \neq 0$	$\frac{9^5}{9^2} = 9^{5-2} = 9^3$
الأس السالب	$x^{-a} = \frac{1}{x^a}, \frac{1}{x^{-1}} = x^a, x \neq 0$	$3^{-5} = \frac{1}{3^5}, \frac{1}{b^{-7}} = b^7$
قوة القوى	$(x^a)^b = x^{ab}$	$(3^3)^2 = 3^{3 \cdot 2} = 3^6$
قوة ناتج الضرب	$(xy)^a = x^a y^a$	$(2k)^4 = 2^4 k^4 = 16k^4$
قوة ناتج القسمة	$\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}, y \neq 0$ $\left(\frac{x}{y}\right)^{-a} = \left(\frac{y}{x}\right)^a = \frac{y^a}{x^a}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-5} = \left(\frac{3}{2}\right)^5 = \frac{3^5}{2^5}$
القوة الصفرية	$x^0 = 1, x \neq 0$	$100000^0 = 1$

تدريب 5/ بسط العبارة  $\frac{15c^5d^3}{-3c^2d^7}$  :

**الحل :**  $-5 \frac{c^3}{d^4}$

تدريب 6/ بسط العبارة  $(-2x^3y^2)^5$  ؟

**الحل :**  $-32x^{15}y^{10}$



س26/ أي مما يلي يُكافئ العبارة :  $(2x^2 + 3x - 1) - (4x^2 - 5x + 6)$  :

(أ)  $2x^2 + 8x + 7$

(ب)  $2x^2 - 8x - 7$

(ج)  $2x^2 - 8x + 7$

(د)  $2x^2 + 8x - 7$

**الحل :** الإجابة (ج) بترتيب الحدود المتشابهة رأسياً ونوجد ناتج الطرح.

س27/ أي مما يلي يُكافئ العبارة :  $(6x^2 - 7x + 8) + (-4x^2 + 9x - 5)$  :

(أ)  $2x^2 + 2x + 3$

(ب)  $2x^2 - 2x - 3$

(ج)  $2x^2 - 2x + 3$

(د)  $2x^2 + 2x - 3$

**الحل :** الإجابة (أ) بترتيب الحدود المتشابهة رأسياً ونوجد ناتج الجمع.

## دوال كثيرات الحدود :

تدريب 7/ المعامل الرئيس لكثيرة الحدود التالية  $8x^5 - 4x^3 + 2x^2 - x - 3$  ؟

**الحل :** المعامل الرئيس هو المعامل التابع للمتغير الحرفي ، والذي له قيمة أكبر أس، وهو 8.

## القانون العام والمميز :

- يُعطى القانون العام بالعلاقة :  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  .

- القانون العام يُستعمل لحل المعادلة التربيعية التي على الصورة  $ax^2 + bx + c = 0$  ,  $a \neq 0$  .

- المميز : العبارة  $b^2 - 4ac$  تسمى بالمميز ، وهو ما يمكن تمييز جذوره وأنواعه من خلاله .

مثال على التمثيل البياني لها	عدد الجذور وأنواعها	قيمة المميز
	جذران حقيقيان نسبيا	$b^2 - 4ac > 0$ و العبارة $b^2 - 4ac$ مربع كامل
	جذران حقيقيان غير نسبيا	$b^2 - 4ac > 0$ و العبارة $b^2 - 4ac$ لا تمثل مربع كامل
	جذران مركبان	$b^2 - 4ac < 0$
	جذر حقيقي واحد	$b^2 - 4ac = 0$

- إرشاد 1 : معنى مربع كامل ، أي مثلاً  $\sqrt{4} = 2$  يكون مربع كامل ، بينما  $\sqrt{2} = 1.4$  ولا يعتبر مربع كامل.

- إرشاد 2 : إذا وجد للمعادلة التربيعية جذران مركبان فهما مترافقان.

تدريب 8/ أوجد قيمة المميز وعدد الجذور وأنواعها للمعادلة  $-5x^2 + 8x = 1$  ..  
الحل :

- الخطوة الأولى / ترتيب المعادلة على الصورة الصفرية :  $-5x^2 + 8x - 1 = 0$

- الخطوة الثانية / استعمال قانون المميز والتعويض به ب قيم  $a, b, c$  فيكون :

$a = -5$  ,  $b = 8$  ,  $c = -1$  وبحله بقانون المميز  $b^2 - 4ac$  يكون الحل :

$(8)^2 - 4(-5)(-1) = 44$  ويتضح أن  $44 > 0$  وأن جذر 44 عدد غير نسبي  $\sqrt{44} = \text{II}$  أي لا يُعطينا مربع كامل ولذلك الحل يكون أن للمعادلة : جذران حقيقيان غير نسيبان.

**إيجاد قيمة  $c$  إذا علم الحد الأوسط وأحد الحدين الآخرين :**

- لإيجاد قيمة  $c$  فإننا نطبق القانون التالي : **الحد الثالث** =  $\left( \frac{\text{الحد الأوسط}}{\sqrt{\text{الجذر الأول ضعف}}} \right)^2$

تدريب 9/ قيمة  $c$  التي تجعل كل ثلاثية حدود في المعادلة التالية مربعاً كاملاً هي :  $x^2 + 13x + c$

الحل : بتطبيق قانون : إيجاد قيمة  $c$

$$\left( \frac{13x}{2\sqrt{x^2}} \right)^2 = \left( \frac{13x}{2x} \right)^2 = \left( \frac{13}{2} \right)^2 = \frac{169}{4} , \left( \frac{\text{الحد الأوسط}}{\sqrt{\text{الجذر الأول ضعف}}} \right)^2 = \text{الحد الثالث}$$

**تكوين معادلة إذا علم جذريها :**

- لتكوين معادلة بمعلومية جذريها يتم تطبيق القانون  $x^2 - (r_1 + r_2)x + (r_1 \times r_2)$

تدريب 10/ كون المعادلة التي جذريها 3 ، 4 ؟

الحل: بتطبيق القانون :  $x^2 - (r_1 + r_2)x + (r_1 \times r_2)$  يكون الحل :  $x^2 - (3 + 4)x + (3 \times 4)$

ويكون الحل أخيراً  $x^2 - 7x + 12 = 0$

**الأعداد المركبة :**

- العدد التخيلي : هو العدد السالب الذي يوجد بداخل الجذر.

- الوحدة التخيلية : هي الجذر التربيعي للعدد -1 أي بصيغة أخرى :  $i = \sqrt{-1}$

- العدد التخيلي البحت : هي الجذر التربيعي لأعداد حقيقة سالبة مثل :  $6i, -2i, i\sqrt{3}$

- الأعداد المركبة : هي الأعداد التي يمكن كتابتها على الصورة  $a+ib$  حيث  $a, b$  عدداً حقيقيين ،  $i$  الوحدة التخيلية.

تدريب 11/ أي من الخيارات التالية تُكافئ العبارة  $\sqrt{-27}$  :

أ)  $3\sqrt{-3}$       ب)  $3i\sqrt{3}$       ج)  $3i + \sqrt{3}$       د)  $3 + \sqrt{3i}$

الحل : الإجابة (ب) وذلك بالتحليل لعوامل :

3 27  
3 9  
3 3  
1

يتضح من التحليل أن  $(3)^2 \times 3 \times 1 = 27$  ويلاحظ أن العدد بداخل الجذر سالب

$$. 3i\sqrt{3} = i \times 3 \times \sqrt{3} = \sqrt{-1 \times 3^2 \times 3}$$

تدريب 12/ الجذر التربيعي للعدد السالب ، للمعادلة  $6i\sqrt{6}$  هو :

$$\sqrt{-216} \text{ (أ) } \quad \sqrt{-125} \text{ (ب) } \quad \sqrt{-81} \text{ (ج) } \quad \sqrt{-41} \text{ (د)}$$

**الحل:** هنا لا نُحلل لأن الجذر ناطق فيكون الحل  $6\sqrt{6i} = \sqrt{6i \cdot 6^2} = \sqrt{6i \cdot 36} = \sqrt{-216}$

**- قوى الوحدة التخيلية :**

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 \cdot i^1 = -i$$

$$i^4 = (i^2)^2 = 1$$

$$i^5 = i^4 \cdot i^1 = i$$

$$i^6 = i^4 \cdot i^2 = -1$$

$$i^7 = i^4 \cdot i^3 = -i$$

$$i^8 = (i^2)^4 = 1$$

تدريب 13/ ناتج  $3i \times 4i$  :

$$12i \text{ (أ) } \quad -12 \text{ (ب) } \quad 24 \text{ (ج) } \quad -24 \text{ (د)}$$

**الحل:** الإجابة (ب)  $4 \times 3 \times i^2 = 4 \times 3 \times -1 = -12$

تدريب 14/  $4x^2 + 100 = 0$  :

$$-5 \text{ (أ) } \quad -5i \text{ (ب) } \quad \pm 5i \text{ (ج) } \quad \pm 5 \text{ (د)}$$

**الحل:** الإجابة (ج)  $\pm 5i$

تدريب 14/ ناتج  $i^{42}$  :

$$i \text{ (أ) } \quad -i \text{ (ب) } \quad -1 \text{ (ج) } \quad 1 \text{ (د)}$$

**الحل:** بسط العبارة بأقل ما يمكن  $(i^2)^{21} = i^2 = -1$

تدريب 15/ ناتج  $i^{55}$  :

$$i \text{ (أ) } \quad -i \text{ (ب) } \quad -1 \text{ (ج) } \quad 1 \text{ (د)}$$

**الحل:** بسط العبارة بأقل ما يمكن :  $i \times -1 = -i = i^{11} \times i^5$

تدريب 16/  $i^{20}$  :

$$i \text{ (أ) } \quad -i \text{ (ب) } \quad -1 \text{ (ج) } \quad 1 \text{ (د)}$$

**الحل:** بسط العبارة بأقل ما يمكن :  $i^{10} \times i^{10} = -1 \times -1 = 1$

تدريب 17/  $i^{200}$  :

$$i \text{ (أ) } \quad -i \text{ (ب) } \quad -1 \text{ (ج) } \quad 1 \text{ (د)}$$

**الحل:** الإجابة (د) 1 بالتبسيط ( $i^{100} \times i^{100}$ ) وهي من مضاعفات الـ 10

تدريب 18/ أوجد قيمتي  $x, y$  اللتين تجعلان المعادلة التالية صحيحة

$$.5x + 1 + (3 + 2y)i = 2x - 2x + (y - 6)i$$

**الحل:** بمساواة الجزء الحقيقية مع الجزء الحقيقي والجزء التخيلي مع الجزء التخيلي.

$$y = -9 \text{ ويصبح الحل } x = -1 \text{ وكذلك } 3 + 2y = y - 6 \text{ ويصبح الحل } 5x + 1 = 2x - 2$$

- ملاحظة هامة / في حالة قسمة الأعداد المركبة ( عدد تخيلي + عدد حقيقي ) فإننا نضرب بمرافق المقام.

# الفصل الثاني:

## الهندسة الإحداثية

## الميل :

- الميل : هو النسبة بين ارتفاع المستقيم العمودي والمسافة الأفقية ، ويُعطى قانون الميل بالعلاقة :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

أي فرق الصادات / فرق السينات .

- إذا كان المستقيم أفقياً ( موازياً لمحور السينات ) فإن ميله  $m = 0$  .

- إذا كان المستقيم عمودياً ( موازياً لمحور الصادات ) فإن ميله غير معرف .

- يكون للمستقيمين غير الرأسيين الميل نفسه إذا فقط إذا كانا متوازيين .

- يكون المستقيمان غير الرأسيين متعامدين إذا فقط إذا كان حاصل ضرب ميليهما  $(-1)$  .

- إذا كان  $x_1 = x_2$  و  $y_1 \neq y_2$  فإن المستقيم يكون رأسياً وميله غير معرف .

- إذا كان  $x_1 \neq x_2$  و  $y_1 = y_2$  فإن المستقيم يكون أفقياً وميله  $0$  .

س28/ ميل المستقيم التالي :  $A = (3, -5)$  ،  $B = (6, -2)$

(د) -9/7

(ج) -9/7

(ب) 1

(أ) -1

$$A = \begin{pmatrix} x & y \\ 3 & -5 \end{pmatrix} ، B = \begin{pmatrix} x & y \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$$

(د) غير ذلك

(ج) متعامدان ومتوازيان

(ب) متوازيان

(أ) متعامدان

الحل : متعامدان ، لأن مثل قلب للكسر ، وإبدال لإشارة .

## مُعَادلة المستقيم :

- يمكن كتابة معادلة المستقيم إذا عُلم :

(3) نقطتان على المستقيم

(2) الميل ونقطة على المستقيم

(1) الميل والمقطع الصادي

- معادلة المستقيم بدلالة الميل والمقطع الصادي تُعطى بالعلاقة :

$$y = mx + b$$

حيث :  $b$  : محور الصادات ،  $m$  : الميل .



- معادلة المستقيم بصيغة النقطة والميل :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$


- معادلة المستقيم بمعلومية نقطتين عليه :

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$y - y_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_2)$$



ميل المستقيم الرأسي = غير معرف





## - حالات خاصة لمعادلة المستقيم :

\* إذا كان يوازي محور السينات : معادلته هي :  $y = y_1$  أو  $y = b$

\* إذا كان يوازي محور الصادات : معادلته هي :  $x = x_1$

\* إذا كان يوازي نقطة الأصل ( 0,0 ) : معادلته هي :  $y = mx$

س30/ اكتب معادلة المستقيم الذي ميله -3 والمقطع الصادي 2 بصيغة الميل والمقطع ؟

**الحل :**  $b = 2 , m = -3$

والقانون :  $y = mx + b$  وبالتعويض  $y = -3x + 2$

س31/ اكتب معادلة المستقيم الذي ميله  $-\frac{1}{3}$  ويمر بالنقطة ( 4,-2 ) ؟

**الحل :**  $y - y_1 = m (x - x_1)$

وبالتعويض بالقانون :  $y + 2 = \frac{-1}{3}x + \frac{4}{3}$

$$\begin{matrix} x_1 & y_1 \\ (4, -2) \end{matrix}$$

## نقطة المنتصف ( معادلة العمود المنصف ) :-

يُعطى قانون نقطة المنتصف بالعلاقة :  $M = \left( \frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2} \right)$

المسافة بين نقطتين ( طول قطعة مستقيمة ) :

يُعطى قانون المسافة بين نقطتين بالعلاقة :  $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

- يكونان المستقيمان متوازيان إذا كان البعد بينهما ثابتاً دائماً.

إذا كان [ AB ] // محور السينات فإن | AB | = | فرق السينات |

إذا كان [ AB ] // محور الصادات فإن | AB | = | فرق الصادات |

- دائماً طول القطعة المستقيمة يكون موجباً ( + ) .

## - التحويلات الهندسية :

للتحويلات الهندسية أنواع وهي :

- 1) الانعكاس . 2) الإزاحة ( الانسحاب ) . 3) الدوران . 4) التمدد . 5) التبليط .

## أولاً / الانعكاس :

- الانعكاس : تحويل يمثل قلب الشكل في نقطة أو في خط مستقيم أو في مستوى .

الانعكاس	من الأصل للصورة	كيفية إيجاد إحداثيات الصورة
حول محور (x)	$(a, b) \rightarrow (a, -b)$	بضرب الإحداثي الصادي (y) في ( - 1 )
حول محور (y)	$(a, b) \rightarrow (-a, b)$	بضرب الإحداثي السيني (x) في ( - 1 )
حول نقطة الأصل (0,0)	$(a, b) \rightarrow (-a, -b)$	بضرب كلا الإحداثيين ( x , y ) في (-1)
حول المستقيم $y = x$	$(a, b) \rightarrow (b, a)$	بتبديل الإحداثي x مكان الإحداثي y

## ثانياً / الإزاحة :

\* الإزاحة نوعان رأسية وأفقية :-

- الإزاحة الرأسية ( التغير في الإحداثي الصادي ) :  $\oplus$  أعلى  $\ominus$  للأسفل

- الإزاحة الأفقية ( التغير في الإحداثي السيني ) :  $\oplus$  يمين  $\ominus$  يسار

صورة النقطة P(x,y) بإزاحة ( a,b )  $\leftarrow P'(x+a, y+b)$

## ثالثاً / الدوران :

\* الدوران : تحويل تدور به كل نقطة من نقاط الشكل بزوايا معينة واتجاه معين حول نقطة ثابتة تسمى ( مركز الدوران ) .

- الدوران نوعان :

1) دوران موجب ( + ) : وهو الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة . مثل : الطواف حول الكعبة وحركة إطار السيارة .

2) دوران سالب ( - ) : وهو الدوران مع اتجاه عقارب الساعة .

\* صورة النقطة ( x,y ) بالدوران حول نقطة الأصل بزوايا 90 درجة :

- إن كان في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ( -y, x ) أما إن كان مع اتجاه حركة عقارب الساعة ( y, -x ) .

\* صورة النقطة ( x,y ) بالدوران حول نقطة الأصل بزوايا 180 : ( -x, -y ) .

- الدوران بزوايا 360 يسمى الدوران المحايد لأنه يعيد الشكل لوضعه الأصلي .

- مقدار رتبة التماثل الدوراني للمضلع المنتظم  $\frac{360^0}{n}$  حيث n : عدد الأضلاع .

س33/ تدور شفرات المروحة والتي لها 5 أضلاع في الهواء لتوفير التكييف ، التماثل الدوراني لها هي :

- أ) 60      ب) 62      ج) 70      د) 72

الحل : ( 72 ) لأن رتبة التماثل الدوراني  $= 360/5 = 72$  ، بينما رتبة التماثل الدوراني لها هي : 5 ( نفس الأضلاع ) .

## رابعاً / التمدد :

- التمدد : نوع من التحويلات الهندسية حيث يحدث تغيير في قياسات الشكل .

- للتمدد عنصرين أساسيين وهما : مركز التمدد ومعامل التمدد .

- معامل التمدد يُعطى بالعلاقة :  $\frac{\text{طول الصورة}}{\text{طول الأصل}}$  ويرمز له بالرمز  $r$  .

ومن خلاله نستنتج أن طول الصورة = طول الأصل  $\times$  معامل التمدد ..

\* هناك 3 حالات لمعامل التمدد وهي :

(1) إذا كان  $|r| < 1$  فالتمدد يكون تكبير .

(2) إذا كان  $|r| > 1$  فالتمدد يكون تصغير .

(3) إذا كان  $|r| = 1$  فالتمدد يكون تحويل تطابق .

- إذا كان  $r > 0$  فالأصل والصورة في نفس الجهة من مركز التمدد أما  $r < 0$  فالأصل والصورة مختلفتين من مركز التمدد.

س34/ إذا علمت أن معامل التمدد  $= \frac{2}{3}$  فإن التمدد يكون :

(أ) تمدد تكبير (ب) تمدد تصغير (ج) تحويل تطابق (د) ليس تمداً

الحل : تمدد تصغير لأن  $|r| < 1$  .

س35/ إذا كانت صورة  $\overline{A'B'}$  بمعامل التمدد  $r = 2$  ، وكان  $AB = 12$  فإن  $A'B'$  :

(أ) 6 (ب) 12 (ج) 24 (د) 36

الحل : ( 24 ) حسب قانون معامل التمدد .

س36/ في الشكل التالي ، معامل التمدد  $(r) =$

(أ)  $\frac{1}{3}$  (ب)  $\frac{2}{7}$  (ج)  $\frac{5}{6}$  (د)  $\frac{1}{2}$

الحل :  $\frac{1}{3}$  لأن طول الصورة = 6 ، وطول الأصل = 2 ( حسب المربعات بالنسبة للطول )

لذا  $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$  .

## التبليط :

- التبليط 3 أنواع حسب الانتظام : (1) منتظم . (2) شبه منتظم . (3) غير منتظم .


\* التبليط المنتظم يتألف من ضلع واحد فقط منتظم أما شبه منتظم يتألف من مضلعين منتظمين أو أكثر .

- والتبليط حسب الشكل يكون : متسق أو غير متسق .




المتسق يحتوي على الترتيبات نفسها للأشكال والزوايا عند كل رأس أما الغير متسق فيحتوي على ترتيبات مختلفة

للأشكال والزوايا عند رؤوس مختلفة .

التبليط للمضلع المنتظم يُعطى بالعلاقة :  $\frac{180(n-2)}{n}$



## العلاقات والدوال :



- الدالة : علاقة يرتبط فيها كل عنصر في المجال بعنصر واحد في المدى .
- الدالة المتباينة : دالة لا يرتبط أكثر من عنصر في المجال بالعنصر نفسه في المدى .
- \* الدوال من حيث الاتصال ، تنقسم لقسمين :
- دالة متصلة : وهي الدالة التي تكون عناصرها على نفس الاستواء ( الخط ) .
- دالة منفصلة : الدالة التي تكون عناصرها متفرقة وليست على نفس الخط .
- للتعرف على أن الشكل يمثل دالة أو لا نستخدم طريقة - اختبار الخط الرأسي - .
- وهي أن نضع خط رأسي على الرسم الديكارتي ( البياني ) فإن قطع الخط الرأسي نقطة واحدة فالعلاقة دالة ، أما إن قطع بأكثر من نقطة فالعلاقة ليس دالة .
- الدالة تشتمل على مجال ومدى ( مجال مقابل ) ، دائماً المجال يشمل قيم ( X ) والمدى يشمل قيم ( Y )
- ولذلك يسمى المجال بالمتغير المستقل ، أما المدى بالمتغير التابع ( الذي يتبع المتغير المستقل ) .

س37/ في الشكل التالي هل العلاقة دالة ؟ وهل الدالة متصلة أو منفصلة ؟

- العلاقة ليست دالة لأن ارتباط عنصرين من المجال بالمدى . والدالة منفصلة.

س38/ حدد كلا من المجال والمدى في العلاقة التالية ، مع بيان هل هي دالة ؟ وإذا كانت دالة فهل ستكون متباينة؟

الحل :

المجال ( 3 , 1 , - 8 ) لأنه خارج منه السهم للمدى . والمدى ( 5 , 6 , - 2 ) .

ولذا تعتبر دالة لأن كل عنصر من المجال ارتبط بعنصر آخر في المدى ولذلك فهي دالة متباينة.

س39/ هل يمثل الشكل التالي دالة ؟

نعم يمثل دالة لأن هذا النوع من الدوال يسمى دالة شاملة ( شمولية ) .

( المجال = المدى المقابل ) .



س40/ لتكن  $h(x) = 0.5x^2 - 5x + 3.5$  فإن قيمة  $h(2) =$

أ) 11.5

ب) -4.5


ج) 0

الحل : بالتعويض المباشر الإجابة ( ب ) -4.5



( د ) لا يمكن التعريف بالدالة


## الدوال الأم:



### \* الدالة الثابتة:

- تُعطي الدالة الثابتة بالعلاقة  $f(x) = c$
- الدالة الثابتة مجالها:  $\mathbf{R}$  ومداهها:  $\{c\}$ .
- منحناها متصل.


- المنحني متمائل حول محور  $y$ ; لذا فهي **دالة زوجية**.



### \* الدالة المحايدة ( الدالة الخطية ):

- تُعطي الدالة المحايدة بالعلاقة  $f(x) = x$  ويرمز لها بالرمز  $I(x)$
- مجال الدالة المحايدة:  $\{x|x \in \mathbf{R}\}$  ومداهها:  $\{y|y \in \mathbf{R}\}$
- منحناها متصل.


- المنحني متمائل حول نقطة الأصل; لذا **فالدالة فردية**.



### \* الدالة التربيعية:

- تُعطي الدالة التربيعية بالعلاقة:  $f(x) = x^2$
- مجال الدالة  $\{x|x \in \mathbf{R}\}$  ومداهها:  $\{y|y \geq 0, y \in \mathbf{R}\}$
- المنحني متصل.

- المنحني متمائل حول المحور  $y$ ; لذا **فالدالة زوجية**.



### \* الدالة التكعيبية:


- تُعطي الدالة التكعيبية بالعلاقة:  $f(x) = x^3$
- مجال الدالة التكعيبية:  $\{x|x \in \mathbf{R}\}$  ومداهها:  $\{y|y \in \mathbf{R}\}$
- المنحني متصل.

- المنحني متمائل حول نقطة الأصل  $(0,0)$ ; لذا **الدالة فردية**.


### \* دالة الجذر التربيعي:

- تُعطي دالة الجذر التربيعي بالعلاقة:  $f(x) = \sqrt{x}$
- مجال دالة الجذر التربيعي:  $\{x|x \geq 0\}$  ومداهها:  $\{y|y \geq 0\}$
- المنحني متصل.

- المنحني غير متمائل لذا **الدالة ليست فردية ولا زوجية**.









## \* دالة المقلوب :

- تُعطي دالة المقلوب بالعلاقة :  $f(x) = \frac{1}{x}$
- مجال دالة المقلوب :  $\{x|x \neq 0, x \in R\}$  ومداها :  $\{y|y \neq 0, y \in R\}$ .
- المنحنى لا يقطع أيّاً من المحورين.
- منحنى الدالة متماثل حول نقطة الأصل ؛ لذا الدالة ليست فردية ولا زوجية .



## \* دالة القيمة المطلقة :

- تُعطي دالة القيمة المطلقة بالعلاقة :  $f(x) = |x|$
- مجال دالة القيمة المطلقة :  $\{x|x \in R\}$  ومداها :  $\{y|y \geq 0, y \in R\}$  (  $R^+$  )
- المنحنى متصل.
- منحنى الدالة متماثل حول محور y ؛ لذا فالدالة زوجية.



## \* الدالة الدرجية ( دالة أكبر عدد صحيح ) :

- تُعطي الدالة الدرجية بالعلاقة :  $f(x) = [x]$
- مجال الدالة الدرجية :  $\{x|x \in R\}$  ومداها :  $\{y|y \in Z\}$ .
- منحنى الدالة ليس له تماثل ؛ أي أنه الدالة ليست فردية ولا زوجية.

س41/ إذا كانت  $f(x) = [x]$  فإن  $f(3.32) =$

- أ) 3.32      ب) -3.32      ج) 3      د) 4

**الحل :** 3 لأن في الدالة الدرجية إذا كان العدد < النصف فالعدد يجبر ، أما في حالة كان  $0 >$  فالعدد يبقى دون الكسر.

س42/ إذا كانت  $f(x) = [x]$  فإن  $f(-4.66) =$

- أ) -4.66      ب) 4.66      ج) -5      د) 5

**الحل :** -5 ، تذكر دائماً الدالة الدرجية ليست دالة قيمة مطلقة ! .


س43/ في الدالة الدرجية التالية  $h(x) = [3x] - 8$  طول الدرجة =

- أ) 3      ب) -3      ج) 1/3      د) -1/3

**الحل :** 1/3 ، والمطلوب طول الدرجة وليس قيمة العدد ، وقانون إيجاد طول الدرجة في الدالة الدرجية هو :  $\left| \frac{1}{x} \right|$  معامل

## - البرمجة الخطية والحل الأمثل :

- منطقة الحل في الجزء الأوسط ، والقيود الخطوط البارزة والممتدة.
- ومنطقة الحل نوعان مفتوحة ومغلقة .



س44/ الدالة التالية :  $f(x) = 4x - 3y > 12$  لها التمثيل البياني :

- (أ) (A)
- (ب) (B)
- (ج) (C)
- (د) (D)

**الحل :** في التمثيل البياني يكون الخط المتصل إذا كان يحتوي على علاقة مساواة ( $\geq$  ,  $\leq$ ) أما المنفصل إذا كان لا يحتوي على علاقة مساواة ( $>$  ,  $<$ ) ولذلك نستبعد كلا من (ج) و (د) ويتبقى لدينا (أ) ، (ب) . بعد ذلك نختبر هل 0 تشمل المنطقة المظللة أم لا ؟ نعوض بالقيم جميعها (x,y) بالصفير للاختبار الجزء المظلل .

$$4(0) - 3(0) > 12 ?$$

هل  $0 > 12$  الإجابة خاطئة لأن  $0 \ngtr 12$  وهذا يعني أن الجزء المظلل لا يشمل منطقة (0) ونظلم ما تحت الصفير وبالتالي الحل يكون: الإجابة (ب) B .


ملاحظة هامة جداً / متى يكون من الممكن تظليل منطقتين مختلفتين في الرسم البياني ؟

- عندما تكون x,y بداخل القيمة المطلقة  $|y| \leq |x|$  .

س45/ عدد الأعداد الصحيحة التي تحقق المتباينة  $|x| < \pi$  حيث  $\pi$  هي النسبة التقريبية هو:

- (أ) 5
- (ب) 6
- (ج) 7
- (د) 8

**الحل :** 7 ، القيم التي تأخذها النسبة التقريبية هي  $\{ 3- , 2- , 1- , 0 , 1 , 2 , 3 \}$  وهي 7.



س46/ ماهي مساحة المثلث ABC ؟

- أ) 5      ب) 6      ج) 7      د) 8

**الحل :** يُلاحظ أن النقاط هي A ( -1,4 ) و B ( -1,1 ) و C(-6,4)

$$| AB | = | 1 - (-4) | = | 3 | = 3 = \text{طول } AB$$

$$| AC | = | -6 - (-1) | = | -5 | = 5 = \text{طول } AC$$

ومن ذلك نستطيع أن نقول مساحة المثلث = طول القاعدة × الارتفاع / 2

$$\frac{3 \times 5}{2} = 7.5 =$$

س47/ أي مما يأتي يُعد وصفاً مناسباً للتمثيل البياني للمعادلتين :

$$y = 3x - 5, 4y = 12x + 16$$

ب) مستقيمان متعامدان

ج) مستقيمان متوازيان

**الحل :** بتبسيط المعادلة  $4y = 12x + 16$  فإنها  $y = 3x + 4$  وبما أنها متساوية في معامل x فسيكونان

أ) مستقيمان لهما المقطع y نفسه

ج) مستقيمان لهما المقطع x نفسه

المستقيمان متوازيان.

س48/ ميل المستقيم الممثل بيانياً على المستوى الإحداثي الآتي هو :

- أ) -3      ب)  $-\frac{1}{3}$       ج)  $\frac{1}{3}$       د) 3

**الحل :** بما أن التمثيل البياني ينحدر من اليسار إلى اليمين فإن الميل سالب ، لذا نستبعد

البديلين ( أ ، ب ) ، وبما أن التمثيل البياني نلاحظ أن يقطع المحور x في نقطة ( 3 )

لذلك يكون الحل هو ( أ ) .

س49/ على الشكل يُساره ، منطقة حل النظام :

$$y \leq \frac{1}{2}x - 2$$

$$y \leq -\frac{2}{3}x - 1$$

- أ) I      ب) II      ج) III      د) IV

**الحل :** المنطقة II ( بالتعويض ب 0 في كل القيم ) .




س50/ ما إحداثيات النقطة A في الشكل التالي :

- أ) A(8,10)      ب) A(10,8)      ج) A(6,8)      د) (6,10)

**الحل :** بتطبيق نص نظرية " عكس نظرية فيثاغورس " يتضح

$$10^2 - 8^2 = 100 - 64 = \sqrt{36} = 6$$

وبما أن A(x,y) فإن نقطة A تكون : A(6,8) والإجابة هي ( ج ) .



س50

س51/ في الدالة التالية  $f(x) = \frac{2}{x-3}$  تكون الدالة غير معرفة عند :

- أ) 3      ب) -3      ج) 2      د) 0

**الحل :** تكون الدالة غير معرفة عند 3 وذلك لأن  $f(3) = \frac{2}{3-3}$  تكون غير معرفة .

س51/ يكون مجال الدالة :  $h(x) = \frac{1}{x+2} - 1$  هو :

أ)  $h(x) = x | x \neq -1, x \in R$       ب)  $h(x) = x | x \neq 2, x \in R$

ج)  $h(x) = x \in R$       د)  $h(x) = x | x \neq -2, x \in R$

**الحل :** الإجابة ( د ) ، وذلك لأن الدالة تكون عند -2 غير معرفة ولذلك نستبعد ( -2 ) ، أما المدى فهو الإجابة ( أ ) . وهو الجزء المقطوع .

س52/ خط التقارب للدالة :  $f(x) = \frac{2}{x-6} + 4$  هو :

- أ) -6      ب) 6      ج) -4      د) 4

**الحل :** ( ب ) 6 وذلك لأن  $x-6 = 0$  فلذلك  $x = 6$  وهو يمثل خط التقارب .

س53/ في الدالة التالية :  $g(x) = \frac{x^2}{x+1}$  يكون خط التقارب الأفقي :

- أ) -1      ب) 1      ج) 2      د) 0

**الحل :** خط التقارب الأفقي = 0 ، ونستطيع إيجاد خط التقارب الأفقي بالعلاقة :

$$\frac{a(x)}{b(x)}$$

فإذا كانت درجة معامل  $a <$  معامل  $b$  فلا يوجد خط تقارب أفقي

أما إن كانت درجة معامل  $b <$  درجة معامل  $a$  فخط التقارب الأفقي هو المستقيم  $y = 0$

أما إن كانت درجة معامل  $a =$  درجة معامل  $b$  فخط التقارب هو  $\frac{a \text{ معامل}}{b \text{ معامل}}$

س54/ نقطة الانفصال للدالة :  $d(x) = \frac{x^2-16}{x-4}$

- أ) تكون 4 على محور  $x$       ب) تكون 4 على محور  $y$       ج) لا يوجد نقطة انفصال      د) نقطة الانفصال  $y=0$

**الحل :** نقطة الانفصال تكون 4 على محور  $x$  .

س55/ في الدالة التالية :  $f(x) = \frac{x^3+2x^2-9x-18}{x^2-9}$  تكون نقطة الانفصال ( على محور  $x$  ) :

- أ) 3      ب) -3      ج) 3 و -3      د) لا يوجد نقطة انفصال

**الحل :** ( ج ) -3 و 3 على محور  $x$  .

س56/ الدالة  $t(x) = \frac{1}{6x(x-1)}$  يكون خط التقارب الرأسي لها هو :

- أ) 1      ب) 0      ج) 0,1      د) -1,0

**الحل :** الإجابة ( ج ) 0 و 1 ( عوض بفرع الدالة في المقام بالقيم )

س57/ في الشكل التالي دالة متعددة التعريف ، الدالة المحدد عليها ( بعلامة الاستفهام ) تكون معادلتها :

$$f(x) = 3x, x \geq 1 \text{ (ب)}$$

$$f(x) = -\frac{1}{3}x - 2, x \leq -3 \text{ (أ)}$$

$$f(x) = 2, -3 < x < 1 \text{ (د)}$$

$$f(x) = -4x - 8, x \geq 0 \text{ (ج)}$$

**الحل :** لإيجاد دالة من خلال شكلها بياني نستعمل قانون الميل ونحدد الإحداثيات ،

نلاحظ أن النقاط هي تقريباً عند  $x_1(-3)$  ،  $y_1(-1)$  ، ولذلك النقطتين  $P(x_1, y_1) = (-3, -1)$  والنقطة الأخرى عند :  $x_2(-6)$  ،  $y_2(0)$  ، وتطبيق قانون الميل ، الحل =  $-1/3$  ثم بعد ذلك تطبيق معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع.

## الدالة العكسية :

- الدالة العكسية : هي الدالة الناتجة عن تبديل مجال الدالة ومداهما ويرمز لها بالرمز  $f^{-1}(x)$

وفي الرسم البياني لتحديد الدالة عكسية أما لا نستعمل اختبار الخط الأفقي.

ملاحظات هامة على الدالة العكسية :

- ليس لكل دالة ، دالة عكسية.   
 - الدالة العكسية رمزها  $f^{-1}(x)$  وليست  $\frac{1}{f(x)}$

س58/ الدالة  $f(x) = \frac{x-3}{5}$  ، الدالة العكسية لها هي :

$$f^{-1}(x) = \frac{5}{x-3} \text{ (أ)} \quad f^{-1}(x) = \frac{15x-15}{5} \text{ (ب)} \quad 5x+3 \text{ (ج)} \quad 3x+5 \text{ (د)}$$

**الحل :** نُعيد صياغة الدالة كمعادلة بمتغيرين  $x, y$  وتكون :

$$f(x) = \frac{x-3}{5} \quad \text{وضع مكان } y \quad y = \frac{x-3}{5} \quad \text{تبديل مكان } y \text{ بـ } x \quad x = \frac{y-3}{5} \quad \text{الناتج } 5x+3$$

## الدالة الزوجية والدالة الفردية :

- الدالة الزوجية : هي الدالة التي تحتوي على أسس زوجية - الدالة الفردية : هي الدالة التي تحتوي على أسس فردية.

س59/ الدالة :  $f(x) = x^3 - 2x$  هي دالة :

(أ) زوجية (ب) فردية (ج) لا زوجية ولا فردية (د) غير ذلك.

**الحل :** الدالة فردية حسب قيمة الأس .

س60/ الدالة  $h(x) = x^3 - 0.5x^2 - 3x$  هي دالة :

(أ) زوجية (ب) فردية (ج) لا زوجية ولا فردية (د) غير ذلك.

**الحل :** الدالة لا زوجية ولا فردية لاحتوائها على أس فردي وزوجي وبناءً على ذلك الإجابة ( ج ) .

س61/ الدالة  $g(x) = 4\sqrt{x}$  هي دالة :

(أ) زوجية (ب) فردية (ج) لا زوجية ولا فردية (د) غير ذلك.

**الحل :** لا زوجية ولا فردية .

## الفترات ورموزها :

### مجموعة الأعداد :

تعريفها	المجموعة العددية
هي جميع المجموعات والأعداد الرياضية.	الأعداد الحقيقية $R$
هي الأعداد التي تحتوي على الأعداد الموجبة والسالبة والصفر.	الأعداد الصحيحة $Z$
الأعداد الشاملة من الصفر إلى المالانهاية $0, 1, 2, \dots$	الأعداد الكلية $W$
الأعداد الشاملة من الواحد إلى المالانهاية $1, 2, 3, \dots$	الأعداد الطبيعية $N$
هي الأعداد السالبة بداخل الجذر مثل : $\sqrt{-3}$	الأعداد التخيلية $i$
الأعداد المركبة من أعداد تخيلية وأي عدد حقيقي آخر مثل : $2i + 5$	الأعداد المركبة $C$
الأعداد الصحيحة الأكبر من 1 ولا تقبل القسمة إلى على نفسها أو على الواحد مثل : $3, 5, 7, 11, \dots$	الأعداد الأولية $P$

\* الفترات 3 أنواع وهي :

- فترة مفتوحة، ويرمز لها بالرمز  $( )$  أو  $[ ]$

- فترة مغلقة، ويرمز لها بالرمز  $[ ]$  أو  $( )$

- فترة نصف مفتوحة أو نصف مغلقة، ويرمز لها بالرمز  $[ )$  أو  $( ]$

والفترة المفتوحة تشتمل على رمز المتباينتين  $\geq, \leq$  والفترة المغلقة تشتمل على رمز المتباينتين  $>, <$

- في الرسم البياني النقطة المظللة (المغلقة) ترمز للفترة المغلقة ، والنقطة (الغير مظللة) ترمز للفترة المفتوحة

س61/ رمز الفترة للمجموعة  $16 < x \leq -8$  هي :

أ)  $[ 8 , 16 ]$       ب)  $( 8 , 16 ]$       ج)  $[ 8 , 16 )$       د)  $( 8 , 16 )$

الحل :

يلاحظ أن رمز المتباينة  $\leq$  ولذلك تكون مغلقة أي  $[$  ، و  $-8$  تكون عندها الفترة مفتوحة أي  $)$  ولذلك الفترة هي  $[ 8 , 16 )$

س62/ رمز الفترة للمجموعة  $x < 11$  هي :

أ)  $[-\infty , 11 ]$       ب)  $[ \infty , 11 ]$       ج)  $(-\infty , 11 )$       د)  $( \infty , 11 )$

الحل : ( د )  $( \infty , 11 )$

س63/ رمز الفترة للمجموعة  $x \leq -16$  أو  $x > 5$  هي :

أ)  $(-\infty , 16 ) \cup [ 5 , \infty )$       ب)  $(-\infty , 16 ] \cup ( 5 , \infty )$

ج)  $(-\infty , 16 ) \cup ( 5 , \infty )$       د)  $(-\infty , 16 ] \cup ( 5 , \infty )$

الحل : الإجابة ( د ) .

س64/ الصفة المميزة لمجموعة الأعداد التالية :  $\{ 8, 9, 10, 11, \dots \}$  هي :

أ)  $\{ x | x > 8, x \in R \}$       ب)  $\{ x | x \geq 8, x \in R \}$

ج)  $\{ x | x > 8, x \in W \}$       د)  $\{ x | x \geq 8, x \in W \}$

الحل : الإجابة ( د )  $\{ x | x \geq 8, x \in W \}$  .



س65/ مجال الدالة :  $f(x) = \frac{2+x}{x^2-7x}$  هو :

ب)  $\{x|x \geq 7, x \in R\}$

أ)  $\{x|x \neq 0, x \neq 7, x \in R\}$

د)  $\{x|x \geq 7, x \in R\}$

ج)  $\{x|x \neq -2, x \in R\}$

**الحل :** الإجابة ( أ ) لأن كلا 7 ، 0 تجعل المقام = 0 وبالتالي المعادلة تكون غير معرفة.

س66/ مجال الدالة  $f(x) = \sqrt{x-5}$  هو :

ب)  $\{x|x \geq 5, x \in R\}$

أ)  $\{x|x \neq 5, x \in R\}$

د)  $\{x|x \geq -5, x \in R\}$

ج)  $\{x|x \neq 5, x \neq 0, x \in R\}$

**الحل :** الإجابة ( ب ) لأن في الدوال المحتوية على جذور يكون الحل كالتالي :

$x - 5 \geq 0$  إذا  $x \geq 5$  ولذلك المجال هو ( ب ) .

س67/ مجال الدالة  $f(x) = \frac{8x}{\sqrt{2x+6}}$  هو :

ب)  $\{x|x \geq -3, x \in R\}$

أ)  $\{x|x \neq 3, x \in R\}$

د)  $\{x|x > -3, x \in R\}$

ج)  $\{x|x \neq -3, x \in R\}$

**الحل :** الإجابة ( د ) بالتعويض بفرع الدالة في المقام  $2x + 6 > 0$  إذا  $x > -3$

( استبعدنا علاقة التساوي  $\geq$  لأن لو أصبح المقام = الصفر ، لأصبحت المعادلة غير معرفة ) .

س68/ رمز المجموعة المميزة للمجموعة " المضاعفات الموجبة للعدد 5 " :

ب)  $\{x|x = 5n, x \in W\}$


أ)  $\{x|x = 5n, x \in N\}$

د)  $\{x|x \geq 5n, x \in W\}$

ج)  $\{x|x \geq 5, x \in R\}$

**الحل :** الإجابة ( أ ) وذلك لأنها تحقق المعادلة أعلاه ، استبعدنا مجموعة الأعداد  $W$  لأن ال 0 ليس من مضاعفات ال 5 ! .

س69/ يُعتبر الشكل التالي :



د) ليس دالة

ج) دالة هندسية

ب) دالة فوقية

أ) دالة شاملة

**الحل :** ( د ) ليس دالة ، وذلك باستعمال خط الاختبار الرأسي.

س70/ مجال الدالة :  $b(x) = \sqrt{x+6} + 2$  هو :

ب)  $\{x|x \geq -6\}$

أ)  $\{x|x \geq 8\}$

د)  $\{x|x > -6\}$

ج)  $\{x|x > 8\}$

**الحل :** بما أن مجال دالة الجذر التربيعي يشمل فقط القيم التي تجعل ما تحت الجذر غير سالب فإن ..

$b(x) = \sqrt{x+6} + 2 \Rightarrow x \geq -6$  لذا الإجابة ( ب )

س71/ دالة الجذر التربيعي التي لها التمثيل البياني التالي هي :


ب)  $f(x) = \sqrt{x-4} - 6$

أ)  $f(x) = \sqrt{x-4} - 6$

د)  $f(x) = \sqrt{x+4} - 6$

ج)  $f(x) = \sqrt{x-6} - 4$

**الحل :** الإجابة ( ب ) نلاحظ أن نقطة (x,y) تكون عند (4,6) الجزء المقطوع يكون ل y .



س72/ مجال الدالة  $f(x) = \frac{1}{4}\sqrt{x-5} + 3$  هو :

- أ)  $\{x|x \geq 5\}$   
 ب)  $\{x|x > 5\}$   
 ج)  $\{x|x \neq 5, x \in \mathbb{R}\}$   
 د)  $\{x|x = 5\}$   
**الحل :** (أ)  $\{x|x \geq 5\}$  .

س73/ مدى الدالة  $f(x) = \frac{1}{4}\sqrt{x-5} + 3$  هو :

- أ)  $\{x|x \geq 5\}$   
 ب)  $\{x|x \geq 3\}$   
 ج)  $\{x|x \neq \frac{1}{4}, x \in \mathbb{R}\}$   
 د)  $\{x|x \neq 3\}$   
**الحل :** ( ب )  $\{x|x \geq 3\}$  ، دائماً في دوال الجذر التربيعي ، المدى يكون نفسه دون تغيير.

س74/ مجال الدالة  $f(x) < -\sqrt{x+2} - 4$  هو :

- أ)  $\{x|x \geq 2\}$   
 ب)  $\{x|x \geq -2\}$   
 ج)  $\{x|x \neq 2, x \in \mathbb{R}\}$   
 د)  $\{x|x < -4\}$   
**الحل :** ( ب )  $\{x|x \geq -2\}$  ..

س75/ القيمة التقريبية للمقطع  $y$  للدالة  $f(x) = \frac{-2x^3+4}{3}$

- أ) 3.2      ب) 1.33      ج) 0.75      د) 2.5

الحل : ( ب ) بالتعويض بقيمة  $x$  بـ 0 يكون الحل 1.33

س76/ مجال التمثيل البياني التالي هو :

- أ) (6, 4)      ب) (6, 4)      ج) (6, -2)      د) (-2, 6)  
**الحل :** ( د ) (-2, 6)

س77/ مجال الدالة التالي هو :

- أ)  $\{x | x \geq -8, x \neq -4, x \in \mathbb{R}\}$   
 ب)  $\{x | x \geq -8, x \in \mathbb{R}\}$   
 ج)  $\{x | x \neq -4, x \neq -8, x \in \mathbb{R}\}$   
 د)  $\{x | x \geq -4, x \in \mathbb{R}\}$   
**الحل :** الإجابة ( أ ) .

س78/ متوسط التغير للدالة  $f(x) = -x^3 + 3x$  عند الفترة  $[-2, -1]$  :

- أ) 4      ب) -4      ج) 1      د) -1

**الحل :** بتطبيق قانون متوسط التغير ( الميل ) والذي ينص على :



$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

وبالتعويض بالقانون ، مع التعويض بصيغة الدالة يكون متوسط التغير للدالة :


$$\frac{f(-1) - f(-2)}{-1 - (-2)} = \frac{[-(-1)^3 + 3(-1)] - [-(-2)^3 + 3(-2)]}{-1 - (-2)}$$

ولذا يكون الحل = -4

2.5 (د)




## الأعداد النسبية والأصفار :



س79/ عدد الأصفار التي تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية للدالة التالية :

- أ) 7      ب) 5      ج) 4      د) لا يوجد أصفار للدالة


**الحل :** الإجابة ( ج ) ، وذلك بتحديد عدد مرات قطع المحور x



س80/ الدالة التالية تُعتبر دالة :

- أ) دالة زوجية      ب) دالة فردية      ج) لا زوجية ولا فردية      د) غير ذلك

**الحل :** الدالة زوجية ، لأن عدد أصفارها = 2 .



## قانون ديكرات :

- يُستخدم قانون ديكرات لتحديد العدد الممكن من الأصفار الحقيقية الموجبة والسالبة لأي دالة كثيرة حدود.

ويُعطى قانون ديكرات بالعلاقة :  $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$

س81/ العدد الممكن للأصفار الحقيقية الموجبة للدالة  $h(x) = 2x^5 + x^4 + 3x^3 - 4x^2 - x + 9$  هو :

- أ) 5      ب) 0 ، 2      ج) 3 ، 1      د) 2 ، 4

**الحل :** عدد الأصفار الكاملة ( الحقيقية الموجبة والحقيقية السالبة ) هي 5 .

ولكن الأعداد الحقيقية الموجبة ، نطبق عليها قانون ديكرات ويكون الحل هو :

نحسب عدد مرات التغير للإشارات:

$$h(-x) = \ominus 2x^5 \oplus x^4 \ominus 3x^3 \ominus 4x^2 \oplus x \oplus 9$$

يُلاحظ أن مقدار التغير  $3 = 1+1+1$  ، ولذلك  $3 = 3$  ، ونجد أن الحل (ج) يتوافق مع ما هو مطلوب.

س82/ الدالة  $P(x) = 5x^3 - 2x^2 + 7x + 1$  عدد الأصفار الحقيقية السالبة هي :

- أ) 2 ، 0      ب) 1      ج) 3      د) 5

**الحل :** لحل الأعداد الحقيقية السالبة ، نعوض بقيمة سالبة في المجاهيل ! ونحدد مقدار التغير :

$$P(-x) = 5(-x)^3 - 2(-x^2) + 7(-x) + 1$$

$P(-x) = -5(x)^3 - 2(x^2) - 7(x) + 1$  إذاً عدد الأصفار السالبة = 1 وبناءً على ذلك فإن الإجابة (ب).


س83/ الأعداد الصحيحة المتتالية التي تنحصر بينها الأصفار الحقيقية للدالة  $f(x) = x^3 - 4x + 2$  في الفترة  $[-4, 4]$

- أ)  $[1, 2]$  ،  $[-3, 2]$  ،  $[-4, 4]$       ب)  $[1, 2]$  ،  $[0, 1]$  ،  $[-3, 2]$

- ج)  $[1, 4]$  ،  $[0, -3]$  ،  $[-4, 2]$       د)  $[4, 2]$  ،  $[-3, 1]$  ،  $[-4, 0]$

**الحل :** الإجابة (ب)  $[1, 2]$  ،  $[0, 1]$  ،  $[-3, 2]$  بالتعويض بقيم في الدالة من ( 4 إلى -4 ) وملاحظة هل هي تقطع محور

x أم لا ،



## العمليات على الدوال :

$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$	الجمع
$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$	الطرح
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$	الضرب
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$	القسمة

- يُقصد بالعمليات على الدوال : هو إجراء العمليات الحسابية المختلفة على الدوال.

س84/ إذا كانت  $f(x) = x^2 + 5x - 2, g(x) = 3x - 2$  فإن قيمة

$$= (f + g)(x)$$

$$(f + g)(x) = x^2 - 8x + 4 \text{ (أ)}$$

$$(f + g)(x) = x^2 + 8x + 4 \text{ (ب)}$$

$$(f + g)(x) = x^2 - 8x - 4 \text{ (ج)}$$

$$(f + g)(x) = x^2 + 8x - 4 \text{ (د)}$$

**الحل :** الإجابة ( د ) حسب قانون جمع الدوال :  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$  ولذلك فإنها =

$$(x^2 + 5x - 2) + (3x - 2) = x^2 + 8x - 4$$

س85/ إذا كانت الدالتين  $f(x), g(x) = \sqrt{9 - x^2} = f(x), g(x)$  فإن حاصل ضربهما =

$$x\sqrt{9 + x^2} - 4\sqrt{9 + x^2} \text{ (ب)}$$

$$x\sqrt{9 + x^2} + 4\sqrt{9 + x^2} \text{ (د)}$$

$$x\sqrt{9 - x^2} + 4\sqrt{9 - x^2} \text{ (أ)}$$

$$x\sqrt{9 - x^2} - 4\sqrt{9 - x^2} \text{ (ج)}$$

**الحل :** الإجابة ( ج ) حسب قانون ضرب الدوال .

س86/ مجال الدالة  $(f - h)(x)$  إذا علمت أن قيمة كلا من  $f(x), h(x)$  :

$$: f(x) = x^2 + 4x, h(x) = 3x - 5$$

$$[\infty, -\infty) \text{ (ب)}$$

$$[\infty, -\infty] \text{ (د)}$$

$$] \infty, -\infty [ \text{ (أ)}$$

$$(\infty, -\infty) \text{ (ج)}$$

**الحل :** بطرح الدالتين ثم استخراج المجال ، الإجابة ( أ ) هي الأنسب لأن [ هي نفسها ( ) ] .

## تركيب الدالتين :

- تركيب دالتين : هي أحد الطرائق التي تستعمل لدمج دالتين . وعند تركيب دالتين فإن قيمة منها تستعمل لحساب قيم أخرى.

- يرمز لتركيب دالتين بالرمز  $[f \circ g](x)$  أو  $f[g(x)]$

وتقرأ ( f بعد g ) أو ( f تحصيل g ) .

- يُمكن أن يكون تركيب دالتين غير مُعرّف .

س87/ قيمة  $[f \circ g](x)$  إذا علمت أن :  $f(x) = x^2 + 1, g(x) = x - 4$  هي :

$$x^2 + 8x - 17 \text{ (ب)}$$


$$x^2 - 8x + 17 \text{ (د)}$$

$$x^2 - 8x - 17 \text{ (أ)}$$

$$x^2 + 8x + 17 \text{ (ج)}$$

**الحل :** الإجابة " د " بالتعويض  $f(x - 4) = [f \circ g](x) = f[g(x)]$  وبالتعويض بقيمة f

يكون الحل :  $x^2 - 8x + 17$  وبفك مربعين يكون الحل  $x^2 - 8x + 17$  .



## المتجهات

- يرمز للمتجه بالرمز  $\langle x, y \rangle$

- المتجه الصفري : عند جمع متجهين متعاكسين لهما الطول نفسه ويرمز له بالرمز  $\vec{0}$

- الصورة الإحداثية لمتجه تُعطى بالعلاقة :  $\langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$

- الصورة الإحداثية لمتجه بدلالة زاوية معينة ، تُعطى بالعلاقة  $\langle |v| \cos\theta, |v| \sin\theta \rangle$

- متجه الوحدة يُعطى بالعلاقة :  $u = \frac{1}{|v|} v$  ،

-  $i, j$  هي عبارة عن تبسيط لصيغة المتجهات ، ويسمى  $xi + yj$  بالتوافق الخطي.

وتُعطى الصورة الإحداثي لمتجه توافق خطي بدلالة زاوية معينة بالعلاقة  $\langle |v| (\cos\theta)i, |v| (\sin\theta)j \rangle$

- مسقط المتجه ( القطعة المتوسطة للمتجهات ) يُعطى بالعلاقة :  $W_1 = \frac{u \times v}{|v|^2} \times v$  و  $u = w_1 + w_2$

$$W_2 = \frac{v \times u}{|u|^2} \times u \text{ وأيضاً}$$

س88/ الصورة الإحداثية لـ  $\overline{AB}$  ، الذي نقطة بدايته  $A(-4, 2)$  ونقطة نهايته  $B(3, -5)$  هي :

أ)  $\langle -7, 7 \rangle$  ب)  $\langle 7, -7 \rangle$  ج)  $\langle -1, 7 \rangle$  د)  $\langle 7, -1 \rangle$

الحل :  $\langle 7, -7 \rangle$  بالتعويض بقانون الصورة الإحداثية للمتجه  $\langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$ .

س89/ متجه الوحدة ، الذي له نفس اتجاه  $v \langle -2, 3 \rangle$  هو :

أ)  $\langle \frac{-2\sqrt{13}}{13}, \frac{3\sqrt{13}}{13} \rangle$  ب)  $\langle \frac{2\sqrt{13}}{13}, \frac{3\sqrt{13}}{13} \rangle$  ج)  $\langle \frac{3\sqrt{13}}{13}, \frac{2\sqrt{13}}{13} \rangle$  د)  $\langle \frac{3\sqrt{13}}{13}, \frac{-2\sqrt{13}}{13} \rangle$

الحل : الإجابة ( أ ) بالتعويض في قانون متجه الوحدة.

س90/ إذا كانت نقطة بداية المتجه  $\overline{DE}$  هي  $D(-2, 3)$  ، ونقطة نهايته  $E(4, 5)$  ، فإن  $\overline{DE}$  بدلالة متجهي الوحدة  $i, j$  :

أ)  $2i + 6j$  ب)  $6i + 2j$  ج)  $2i - 6j$  د)  $6i - 2j$

الحل : الإجابة (ب) ، بالتعويض بقانون الصورة الإحداثية للمتجه ، ثم كتابتها على صيغة  $xi + yj$  .

س91/ مسقط  $u$  على  $v$  ، إذا علمت أن  $u = \langle 3, 2 \rangle$  ،  $v = \langle 5, -5 \rangle$  هو :

أ)  $\langle -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$  ب)  $\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$  ج)  $\langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$  د)  $\langle 7, -1 \rangle$

الحل : الإجابة (ج)  $\langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$  وذلك بالتعويض في قانون مسقط المتجه .

# الفصل الثالث: المصفوفات



## المصفوفات :

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -8 \\ -2 & 19 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{صفوف} = m \\ \text{أعمدة} = n \end{matrix}$$

- المصفوفة : ترتيب على هيئة مستطيل لمتغيرات أو أعداد في صفوف أفقية وأعمدة رأسية محصورة بين قوسين .
- يرمز للمصفوفة - عادةً - باستعمال الأحرف الكبيرة مثل :  $A, B, C, \dots$ .
- يرمز لعناصر المصفوفة ( في الداخل ) بالأحرف الصغيرة مثل :  $a, b, c, \dots$ .
- تكون عناصر المصفوفة عبارة عن أعداد أو رموز أو أعداد ورموز معاً.
- للمصفوفات أنواع وهي : - مصفوفة الصف - مصفوفة العمود - المصفوفة المربعة - المصفوفة الصفيرية

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -8 \\ -2 & 19 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$$

س92/ في المصفوفة المجاورة رتبة  $B =$

أ)  $2 \times 3$

ب)  $3 \times 2$

ج)  $3 \times 3$

د)  $2 \times 2$

الحل :  $3 \times 2$  (  $m \times n$  ) وعدد العناصر = 6

س93/ في المصفوفة السابقة قيمة  $b_{32}$  :

أ) -8

ب) 10

ج) -1

د) 6

الحل : الإجابة (ج) -1 ، لأن  $m \times n$  حيث  $m = 3$  و  $n = 2$  ( أي في الصف الثالث من العمود الثاني ).

س94/ رتبة المصفوفة المجاورة :

أ)  $0 \times 3$

ب)  $0 \times 3$

ج)  $3 \times 1$

د)  $1 \times 3$

$$E = \begin{bmatrix} 2 \\ x \\ -3 \end{bmatrix}$$

الحل : الإجابة (ج)  $3 \times 1$  . أي عدد الأعمدة = 1 ، وعدد الصفوف = 3

س95/ قيمة  $y$  في المصفوفة المجاورة :

أ) 6

ب) 10

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -1 & 2x - y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

د) 2

ج) 4

الحل : بالتناظر نلاحظ أن  $x = 6$  ولذلك بما فإن  $-2(6) = 10 = 2$ .

## جمع المصفوفات وطرحها :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \pm \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \pm e & b \pm f \\ c \pm g & d \pm h \end{bmatrix}$$

- يجب عند جمع وطرح المصفوفات أن تكون من نفس الرتبة.

س96/ ناتج جمع المصفوفة المجاورة =

$$\begin{bmatrix} -9 & 8 & 3 \\ -12 & 4 & -7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -3 & 6 \\ -9 & -5 & 18 \end{bmatrix}$$

الحل :

$$\begin{bmatrix} -13 & 5 & 9 \\ -21 & -1 & 11 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} (-9) + (-4) & 8 + (-3) & 3 + 6 \\ (-12) + (-9) & 4 + (-5) & (-7) + (18) \end{bmatrix}$$

$$-5 \left( \begin{bmatrix} 4 & -8 \\ 8 & -9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & -6 \end{bmatrix} \right)$$

س97/ أوجد ناتج المصفوفة المجاورة :

$$-5 \begin{bmatrix} 8 & -10 \\ 5 & -15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-5) \cdot 8 & (-5) \cdot (-10) \\ (-5) \cdot 5 & (-5) \cdot (-15) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -40 & 50 \\ -25 & 75 \end{bmatrix}$$

الحل :

## ضرب المصفوفات :

- تضرب المصفوفات إذا وفقط إذا كان عدد أعمدة الأولى مساوياً لعدد صفوف الثانية .
- في الضرب لا يشترط تساوي العناصر في المصفوفتين ، عكس الجمع والطرح الذي يتطلب تساوي العناصر في المصفوفتين.

$$A_{4 \cdot 6} \cdot B_{6 \cdot 2}$$

س98/ هل عملية الضرب التالية معرفة ؟

الحل : عملية الضرب معرفة لأن أعمدة A = صفوف B ( $A_{m \cdot n} \cdot B_{m \cdot n}$ )

$$A_{3 \cdot 2} \cdot B_{3 \cdot 2}$$

س99/ هل عملية الضرب التالية معرفة ؟

الحل : عملية الضرب غير معرفة لأن عدد أعمدة A لا تساوي عدد صفوف B ( $A_{m \cdot n} \cdot B_{m \cdot n}$ ) .

$$U = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \cdot V = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$$

س100/ أوجد ناتج ضرب المصفوفة المجاورة :

الحل :

$$U \cdot V = \begin{bmatrix} 5(2) + 9(6) & 5(-1) + 9(-5) \\ (-3)(2) + (-2)(6) & (-3)(-1) + (-2)(-5) \end{bmatrix}$$

$$UV = \begin{bmatrix} 64 & -50 \\ -18 & 13 \end{bmatrix}$$


س101/ أوجد ناتج ضرب المصفوفة المجاورة :

$$\begin{bmatrix} -6 & 4 & -9 \\ 2 & 8 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

الحل :

$$\begin{bmatrix} (-6)(7) + 4(2) + (-9)(4) \\ 2(7) + 8(2) + 7(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -70 \\ 85 \end{bmatrix}$$

## المحددات وقاعدة كرامر :



المحددة : إذا كانت المصفوفة A مربعة فإن لها محددة ويرمز لها بالرمز |A|

مثال : إذا كانت المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ فإن } |A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

المُحددات نوعان :

\* مُحددة من الدرجة الثانية ( ثنائية ) وتكون رتبة مصفوفتها :  $2 \times 2$ .

\* مُحددة من الدرجة الثالث ( ثلاثية ) وتكون رتبة مصفوفتها :  $3 \times 3$ .

$$= \begin{vmatrix} -6 & -7 \\ 10 & 8 \end{vmatrix} \text{ س102/ قيمة المحددة :}$$

(د) -11

(ج) 11

(ب) -22

(أ) 22

الحل :

$$\begin{bmatrix} -6 & -7 \\ 10 & 8 \end{bmatrix} = (-6) \cdot (8) - (-7) \cdot (10) = 22$$

## قاعدة كرامر :

تنقسم قاعدة كرامر لقسمين :

(1) قاعدة كرامر لحل نظام من معادلتين ( ثنائية ).

(2) قاعدة كرامر لحل نظام من ثلاثة معادلات ( ثلاثية ).

ملاحظات /

- يكون للنظام حل وحيد إذا كانت قيمة |C| لا تساوي صفراً .

- يكون للنظام حل وحيد إذا كانت قيمة |C| = صفر

- للتحقق من الحل نعوض بالقيم في المعادلات الأصلية .

س103/ حل النظام التالي :

$$\begin{cases} 3y + 7x = 37 \\ -5x - 7y = -41 \end{cases} \text{ (د) } (2, 3) \quad \text{(ج) } (0, 4) \quad \text{(ب) } (3, 4) \quad \text{(أ) } (4, 3)$$

الحل :

أو الحل الأفضل / بالتعويض بالخيارات ..

$$C = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -5 & -7 \end{vmatrix} = 7(-7) - 3(-5) = -49 + 15 = -34$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 37 \\ -5 & -41 \end{vmatrix}}{-34} = \frac{7(-41) - 37(-5)}{-34} = \frac{102}{-34} = -3$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 37 & 3 \\ -41 & -7 \end{vmatrix}}{-34} = \frac{37(-7) - 37(-5)}{-34} = \frac{136}{-34} = -4$$

## النظير الضربي للمصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

س104/ أوجد النظير الضربي للمصفوفة :

الحل :

أولاً / نوجد قيمة مُحددة المصفوفة A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = [(2) \cdot (3) - (-4) \cdot (1)] = 10$$

ثانياً / نبدل بين موقعي **عنصري القطر الرئيسي** ونُغير إشارتي العُنصرين الآخرين

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

ثالثاً / نضرب المصفوفة الناتجة في  $\frac{1}{|A|}$

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{10} & \frac{-1}{10} \\ \frac{4}{10} & \frac{2}{10} \end{bmatrix}$$

# الفصل الرابع: اللوغاريتمات

## اللوغاريتمات :

- التعبير اللفظي : لوغاريتم  $x$  للأساس  $b$  يُساوي  $y$  .

$$\log_b x = y \longleftrightarrow x = b^y$$

- التعبير الرياضي :

## الخصائص اللوغاريتمية :

التبرير	الخاصية
$b^0 = 1$	$\log_b 1 = 0$
$b^1 = b$	$\log_b b = 1$
$b^x = b^x$	$\log_b b^x = x$
$\log_b x = \log_b x$	$b^{\log_b x} = x, x > 0$

تدريب 1 / أكتب  $\log_4 16 = 2$  على الصورة الأسية :

الحل : حسب القانون يكون الحل  $4^2 = 16$

تدريب 2 / أكتب المعادلة التالية على الصورة اللوغاريتمية :

الحل : حسب القانون يكون :  $15^3 = 3375$  ،  $b = 15, x = 3375, y = 3$

ولذلك يكون الحل  $\log_{15} 3375 = 3$

س105 / قيمة  $\log_{16} 4$  :

أ)  $\frac{1}{2}$  (ب) 2 (ج) 4 (د) 16  
 الحل : أولاً نضعها على الصورة الأسية  $4 = 16^y$  ، نبسطها :  $2^2 = (2^2)^{2y}$  ، وبعد التبسيط  $4y = 2$  ، إذاً  $y = \frac{1}{2}$

س106 / قيمة  $\log_3 81$  :

أ) 9 (ب) 3 (ج) 4 (د) 27  
 الحل :  $81 = 3^y$  ، بالتبسيط :  $(3^2)^2 = 3^y$  ، بعد التبسيط :  $3^4 = 3^y$  ، تساوت الأساسات إذاً الأسس متساوية  
 إذاً الحل (ج) = 4 .

س107 / قيمة  $\log_7 \frac{1}{49}$  :

أ) 7 (ب) -7 (ج) 2 (د) -2  
 الحل : (د) -2 ، بالتبسيط :  $\frac{1}{49} = 7^y$  ،  $7^{-2} = 7^y$  ، ولذلك قيمة  $y = -2$  .

س108 /  $\log (1000)$  :

أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4  
 الحل : إذا كان العدد 1000 فإننا نعد الأصفار فقط = 3 ، مثلاً  $1 = \log (10)$  ،  $-2 = \log (0.01)$  ، وهكذا..



## خصائص اللوغاريتمات :

$\log_b xy = \log_b x + \log_b y$	خاصية الضرب في اللوغاريتمات
$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$	خاصية القسمة في اللوغاريتمات
$\log_b x^m = m \log_b x$	خاصية لوغاريتم القوة
$\log_b \sqrt[m]{x} = \frac{\log_b x}{m}$	خاصية الجذر في اللوغاريتمات

تدريب 1/ اكتب العبارة اللوغاريتمية التالية بالصورة المطولة :  $\log_2 12x^5 y^{-2}$

**الحل :** حسب خاصية الضرب في اللوغاريتمات  $\log_2 12 + \log_2 x^5 + \log_2 y^{-2}$

بعد ذلك نقدم مكان الأس في بداية اللوغاريتم ( حسب خصائص اللوغاريتمات )

$$\log_2 12 + 5\log_2 x - 2\log_2 y$$

تدريب 2/ اكتب العبارة اللوغاريتمية التالية بالصورة المطولة :  $\log_{13} 6a^3 bc^4$

**الحل :** نستخدم خاصية الضرب في اللوغاريتمات  $\log_{13} 6 + \log_{13} a^3 + \log_{13} b + \log_{13} c^4$

$$\log_{13} 6 + 3\log_{13} a + \log_{13} b + 4\log_{13} c$$

تدريب 3/ اكتب العبارة اللوغاريتمية التالية بالصورة المطولة :  $\log_6 5x^3 y^7 z^{0.5}$

**الحل :** نستخدم خاصية الضرب في اللوغاريتمات  $\log_6 5 + \log_6 x^3 + \log_6 y^7 + \log z^{0.5}$

$$\log_6 5 + 3\log_6 x + 7\log_6 y + \frac{1}{2} \log z$$

تدريب 4/ اكتب العبارة اللوغاريتمية التالية بالصورة المختصرة :  $4\log_3 x - \frac{1}{3} \log_3 (x + 6)$

**الحل :**  $\log_3 x^4 - \log_3 \sqrt[3]{(x + 6)}$  وبما أن العلاقة طرح فإننا نُبدل العلاقة بالقسمة كما في خصائص اللوغاريتم

$$\log_3 \frac{x^4}{\sqrt[3]{x+6}}$$

س 109/ قيمة  $\log_4 32$  من  $\log_4 2 = 0.5$  هي :

د) 3.95

ج) 2.75

ب) 2.5

أ) 32.5

**الحل :** بتحليل قيمة 32 إلى عواملها الأولية ( للتخلص من قيمة أساس اللوغاريتم الرابع )

فتكون  $4^2 \times 2^1$  هذا يعني أنها  $\log_4 2^4 \times 2^1 =$  ، وبذلك تخلصنا من قيمة الأساس

$$\text{وهذا} = \log_4 4 + \log_4 2^1 = 2 + 0.5 = 2.5$$

2 32  
2 16  
2 8  
2 4  
2 2  
1 1

س110/ حل المعادلة  $\log_2(x^2 - 4) = \log_2 3x$  هو :

- أ) -2      ب) -1      ج) 2      د) 4

**الحل :** بحذف الـ  $\log_2$  من كلا الطرفين ، إذاً  $x^2 - 4 = 3x$  ومن ثم بالتعويض بالخيارات .. أو باستعمال فك مربعين .

س111/ إذا علمت أن  $\log_2 xy = 5$  ،  $\log_2 \frac{x}{y} = 3$  فإن قيمة  $x =$

- أ) 4      ب) 8      ج) 12      د) 16

**الحل :** 16 ، وذلك برفع الأس  $2^5, 2^3$  ،  $xy = 32 = 2^5$  ،  $\frac{x}{y} = 8$  ... وبما أن  $\frac{x}{y} = 8$  إذاً  $x = 8y$  وبالتعويض بالقيم  $8y \times y = 32$  ، وهذه قيمة  $y = 2$  ، إذاً قيمة  $x = 8 \times 2 = 16$

س112/ حل المعادلة  $2 \log_7 x = \log_7 27 + \log_7 3$

- أ) 30      ب) 9      ج) 3      د) 1.23

**الحل :**  $\log_7 x^2 = \log_7 (27 \times 3)$  ، فسيكون الحل :  $\log_7 x^2 = \log_7 81$  ، بشطب  $\log_7$  يكون الحل  $x^2 = 81$  إذاً :  $x = \sqrt{81} = 9$

س113/ حل المعادلة  $\log_6 x + \log_6 (x + 5) = 2$

- أ) 30      ب) 9      ج) 4      د) 2.25

**الحل :** بما أن العلاقة جمع فإننا نستعمل خاصية الضرب اللوغاريتمي  $\log_6 x (x + 5) = 2$  وتوزيع الضرب وأخذ الأساس للوغاريتم وتحويله لأس  $\log_6 x^2 + 5x = 2$  .....  $\log_6 x^2 + 5x = 2^6$  إذاً  $x^2 + 5x - 36$  ويفك مربعين سيكون الحل  $(x - 4)(x + 9)$  إذاً أما  $x = -9$  ،  $x = 4$  والحل السالب مرفوض لذا الحل  $x = 4$  ويُفضل التعويض بالمعادلة لأن بعض المسائل قد يكون الحل السالب مقبول - أحياناً -

## المتتابعات والمتسلسلات :

- المتتابعة : مجموعة من الأعداد مرتبة في نمط محدد أو ترتيب معين ويسمى كل عدد في المتتابعة حداً وقد تكون المتتابعة منتهية مثل : 1,2,3,4 ، وقد تكون غير منتهية مثل : 1,2,3,4,... .
- المتتابعات نوعان إما متتابعة حسابية أو متتابعة هندسية .
- قد يُطلق على المتتابعات لفظ : متسلسلات ، متتاليات ، متواليات ..
- المتتابعات دالة مجالها مجموعة الأعداد الطبيعية ( N ) ، ومداهها مجموعة الأعداد الحقيقية ( R )

نوع المتتابعة المقصود بها	المتتابعة الحسابية	المتتابعة الهندسية
مثال	متتابعة يمكن الحصول عليها عن طريق إضافة قيمة ثابتة للحد السابق 5,-6,-17,-28,... ↘↘↘ الحد ثابت ويساوي -11 ولذا المتتابعة حسابية.	متتابعة يمكن الحصول عليها عن طريق ضرب الحد السابق في عدد ثابت. 16,24,36,54,... ↘↘↘ يلاحظ أن قسمة كل عدد على سابقه يُعطي نفس العدد 54/36 = 36/24 = 16/24
تمثيلها البياني	على شكل دالة خطية	على شكل دالة أسية
قانون الحد النوني	$a_n = a_1 + (n - 1)d$	$a_n = a_1 r^{n-1}$
قانون المجموع الجزئي	$S_n = n \left( \frac{a_1 + a_n}{2} \right)$	$S_n = \left( \frac{a_1 - a_1 r^n}{a - 1} \right), r \neq 1$
معاني الرموز	$a_1, a_2, a_3$ , نوع الحد ( الحد الأول ، الحد الثاني ، الحد الثالث ، ... d : أساس المتتابعة ، n : عدد طبيعي ، $a_n$ الحد النوني ،	

س116/ مجال المتتابعة التالية 3,6,9,12,15 هو :

- أ) {0,1,2,3,4,5} ب) {1,2,3,4,5} ج) {3,6,9,12,15} د) R  
الحل : الإجابة (ب) دائماً المجال في المتتابعات هو مجموعة الأعداد الطبيعية (N) أما المدى فهو {3,6,9,12,15}

س117/ هل تمثل المتتابعة ، متتابعة حسابية أم لا ؟ 5,-6,-17,-28 ؟

- تمثل دالة حسابية لان الفرق ثابت وهو -11 .

س118/ هل تمثل المتتابعة ، متتابعة حسابية أم لا ؟ -4,12,28,42,... ؟

- لا تمثل دالة حسابية لأن الفرق ليس ثابتاً في الحدود.

س119/ الحد المئة في المتتابعة : 9,16,23,30,... :

أ) 756 (ب) 702 (ج) 1028 (د) 6002

**الحل :** نلاحظ أن الأساس (d) ثابت وهو 7 أي أن المتتابعة حسابية ، ولذلك عوض بالقانون  $a_n = a_1 + (n - 1)d$  وبالتعويض بالقانون :  $a_n = 9 + (100 - 1)(7) = 702$  وهذا يساوي : 702

س120/ صيغة الحد النوني للمتتابعة الحسابية التالية 5,-13,-31,... هي :

أ)  $a_n = 18n + 23$  (ب)  $a_n = -18n + 23$   
 ج)  $a_n = 18n - 23$  (د)  $a_n = -18n - 23$

**الحل :** الإجابة (ب) بالتعويض بالقانون  $a_n = a_1 + (n - 1)d$  ، يلاحظ أن الحد الأول  $a_1 = 5$  والأساس d (  $-13 - 5 = -18$  ) لذلك بالتعويض بالقانون  $a_n = 5 + (n - 1)(-18) = -18n + 23$

س121/ الوسطين الحسابيين 10,...,8- هما :

أ) -2,8 (ب) -2,4 (ج) -2,6 (د) 2,6

**الحل :** الإجابة (ج) بما أن هناك 4 حدود فإن  $n = 4$  ، والحد الرابع  $(a_4) = 10$  ،

وبالتعويض بالقانون  $a_n = a_1 + (n - 1)d$  يتضح أن :  $10 = -8 + (4 - 1)d$  إذاً  $d = 6$  وبذلك  $-8 + 6 = -2$  ،  $-2 + 4 = 6$

س122/ مجموع حدود المتسلسلة الحسابية التالية : 12+19+26+...+180 :

أ) 2400 (ب) 2600 (ج) 3600 (د) 9600

**الحل :**  $n = 5$  ،  $d = (19 - 12) = 7$  ،  $a_n = 180$  ،  $a_1 = 12$

وبالتعويض بقانون المتتابعة الحسابية لإيجاد قيمة n

تكون قيمة n = 25 ، وبالتعويض بقانون المجموع الجزئي في متسلسلة حسابية  $S_n = n \left( \frac{a_1 + a_n}{2} \right)$

$S_n = 25 \left( \frac{12 + 180}{2} \right) = 25 \left( \frac{192}{2} \right) = 25 \left( \frac{192}{2} \right) = 2400$  لذا تكون الإجابة (أ).

س123/ إذا كان الحد الأول في متسلسلة هندسية 5 ، وأساسها 2 ، ومجموعها 1275 ، فإن عدد حدودها :

أ) 5 (ب) 6 (ج) 7 (د) 8

**الحل :** بالتعويض بقانون مجموع المتسلسلة الحسابية  $S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1 - r}$

$n = 8 = 1275 = \frac{5 - 5 \times (2^n)}{1 - 2}$  وبالتعويض :  $a_1 = 5$  ،  $r = 2$  ،  $S_n = 1275$

رمز المجموع :

$$\begin{array}{ccc} \text{آخر قيمة لـ } k & \rightarrow & n \\ & & \sum_{k=1}^n f(k) \\ \text{أول قيمة لـ } k & \rightarrow & k=1 \end{array} \leftarrow \text{صيغة حدود المتسلسلة}$$

س124 / قيمة مجموع المتسلسلة الحسابية  $\sum_{k=4}^{18} f(6k-1)$  (أ) 23 (ب) 107 (ج) 975 (د) 1203

**الحل :**

- الخطوة الأولى / نعوض بقيم  $k$  ( الكبرى والصغرى ) في الدالة  $f(x)$  ..

أقل قيمة  $23 = (6(4) - 1)$  ، وأكبر قيمة  $107 = (6(18) - 1)$

- الخطوة الثانية / إيجاد عدد الحدود ( $n$ ) ، وذلك عن طريق طرح القيمة الكبرى من الصغرى وإضافة 1

$$15 = 1 + (4 - 18)$$

همسة / لماذا أضفنا 1 هنا ؛ حسب مبدأ العد ( من 4 إلى 18 ) يكون 15 حد.

- الخطوة الثالثة / نستعمل قانون صيغة المجموع :

$$S_n = n \left( \frac{a_1 + a_n}{2} \right) \text{ ، وبالتعويض : } S_{15} = 15 \left( \frac{23+107}{2} \right) = 975 = S_{15} (65) = 15$$

$$\sum_{x=4}^{31} (4x+1) : 64$$

س125 / قيمة المتسلسلة :

(أ) 6494 (ب) 6112 (ج) 1203 (د) لا يمكن الحل

**الحل :** الإجابة (ج) لا يمكن الحل ، لأن لا يمكن أن تكون القيمة الصغرى ل  $x$  < القيمة العليا ل  $x$  .

$$\sum_{k=3}^{10} 4(2)^{k-1}$$

س126 / قيمة المتسلسلة :

(أ) 131072 (ب) 2048 (ج) 4080 (د) -5010

**الحل :** الإجابة (ج) يُلاحظ أن المتسلسلة هندسية لاشتمالها على الدالة الأسية ..

لذا أقل قيمة ل  $k$  هي :  $4(2)^{3-1} = 4(2)^2 = 4(4) = 16 = 4(4)$  وأكبر قيمة بالتعويض 2048

وكذلك عدد الحدود ( $n$ ) = 6 ، وتطبيق قانون صيغة المجموع للمتتابعة الهندسية  $S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1-r}$

$$S_n = \frac{16 - 16(2)^8}{1-2} = 4080 \text{ : يكون الحل}$$

## المتسلسلات الهندسية غير المنتهية :

- المتسلسلات الهندسية الغير المنتهية : متسلسلات لها عدد لانتهائي من الحدود ، وهي نوعان :

\* متسلسلات متقاربة : يقترب المجموع من عدد حقيقي  $|r| < 1$  .

\* متسلسلات متباعدة : يتباعد المجموع من العدد الحقيقي  $|r| \geq 1$  .

س127 / هل المتسلسلة متقاربة أو متباعدة :  $54+36+24+\dots$

**الحل :** المتتابعة هندسية لذلك نقسم الحد التالي على سابقه  $\frac{36}{54} = \frac{2}{3}$  ويلاحظ أن  $\frac{2}{3} < 1$  لذا المتسلسلة متقاربة .

## مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية :

- مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية يرمز له بالرمز  $S$  حيث  $|r| < 1$  ويُعطى بالصيغة  $S = \frac{a_1}{1-r}$

$$\sum_{k=1}^{\infty} 18 \left( \frac{4}{5} \right)^{k-1}$$

س128 / قيمة المتسلسلة :

د) 90

ج) 95

ب)  $-\infty$

أ)  $\infty$

**الحل :** استخدام قانون المتسلسلة الهندسية اللانهائية  $S = \frac{a_1}{1-r}$

يُلاحظ أن :  $r = \frac{4}{5}$  ,  $a_1 = 18$  وبالتعويض المباشر  $S = 90$ .

## قانون مجموع الأعداد:

يُعطى قانون مجموع الأعداد بالعلاقة  $x \frac{x+1}{2}$

س129 / عدد الأعداد الصحيحة من 1 إلى 100 =

د)  $N$

ج) 5050

ب) 4950

أ) 200

**الحل :** الإجابة (ج)  $x \frac{x+1}{2} = 100 \frac{101}{2} = 5050$



# الفصل الخامس: الاحتمالات

## الاحتمالات :

- فضاء العينة لتجربة : مجموع جميع النواتج الممكنة ، ويمكن تمثيلة باستعمال القائمة المنظمة أو الجدول أو الرسم الشجري .

$$- \text{احتمال أي حدث منتظم} = \frac{\text{عدد عناصر الحدث}}{\text{عدد عناصر فراغ العينة}}$$

- مبدأ العد الأساسي :  $n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \dots n_k$

- المضروب : يكتب مضروب العدد الصحيح الموجب  $n$  على الصورة  $n!$  ، ويساوي حاصل ضرب جميع الأعداد الصحيحة الموجبة التي هي أصغر من أو تساوي  $n$  . أي :  $1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n = n!$  ويُعرّف  $0! = 1$  .

- التباديل : تنظيم لمجموعة من الأعداد ، يكون الترتيب فيه مهماً جداً . وقانونه يُعطى بالعلاقة :  $nPr = \frac{n!}{(n-r)!}$

حيث  $n$  : العناصر المتميزة ،  $r$  : عدد المرات .

$$- \text{التباديل مع التكرار} : \frac{n!}{r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_k!}$$

$$- \text{التباديل الدائرية} : \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

- التوافيق : تنظيم لمجموعة من الأعداد ، يكون الترتيب فيها غير مهم وقانونه يُعطى بالعلاقة :  $nCr = \frac{n!}{(n-r)! r!}$

$$- \text{الاحتمال الهندسي} : \frac{\text{طول القطعة المستقيمة}}{\text{طول القطعة المستقيمة كاملة}}$$

- القيمة المتوقعة  $E(x)$  .

س130/ في تجربة القاء حجر نرد مرة واحدة ، احتمال ظهور عدد زوجي :

- (أ)  $\frac{1}{6}$  (ب)  $\frac{2}{6}$  (ج)  $\frac{3}{6}$  (د) 6

**الحل :** الإجابة (ج)  $\frac{3}{6}$  ، حجر النرد يحتوي على  $\{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 \}$  والأعداد الزوجية 3 وهي  $\{ 2, 4, 6 \}$

وبالتعويض بقانون الاحتمالات يتضح أن الحل هو (ج) .

س131/ يريد أحمد شراء ثوب من بين البدائل التالية ، عدد الخيارات المتاحة له ليختار ثوباً مناسباً هو :

- (أ) 264 (ب) 441 (ج) 820 (د) 1080

**الحل :** الإجابة (د) باستعمال مبدأ العد الأساسي .

س132/ اختارت سارة زوج من الأحذية من بين المقاسات : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ،

بلون أسود أو بني أو رمادي أو أبيض ، ويمكن أن يكون من الجلد الطبيعي أو الصناعي ، وهناك 3

أشكال مختلفة للحداء ، فما عدد النواتج الممكنة في هذه الحالة ؟

- (أ) 24 (ب) 168 (ج) 321 (د) 514

**الحل :** الإجابة (ب)  $168 = 3 \times 2 \times 4 \times 7$  ،

س133/ بكم طريقة يمكن لأربعة أشخاص الجلوس في صف به 8 مقاعد ؟

- (أ) 161280 (ب) 1680 (ج) 510 (د) 32

**الحل :** باستعمال نظرية المضروب لـ أربعة أشخاص :  $1680 = 8 \times 7 \times 6 \times 5$  طريقة .

س134/ إذا كانت لدينا 7 قصص مختلفة وأردنا أن نوزع ثلاث منها على 3 أشخاص ، فكم عدد طرق توزيع القصص السبع على الأشخاص الثلاثة ؟

أ) 35      ب) 63      ج) 120      د) 210

**الحل :** (د) 2010 ، وذلك باستعمال نظرية المضروب :  $7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040$  أو مبدأ العد.

س135/ إذا كان لدينا 5 مقاعد ، فإن عدد الطرق التي يمكن بها إجلاس خمسة أشخاص على هذه المقاعد =

أ) 125      ب) 120      ج) 210      د) 240

**الحل :** الإجابة (ب) 120 ، باستعمال نظرية المضروب :  $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$  أو باستعمال قاعدة التباديل.

س136/ بكم طريقة يمكن أن يجلس 5 أشخاص في صف به 9 كراسي ؟

أ) 126      ب) 12096      ج) 15120      د) 60480

**الحل :** (ج) 15120 ، وذلك باستعمال قاعدة التباديل ، أو مبدأ العد ل 5 أشخاص بالنسبة لعدد الكراسي .

$9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 15120$  طريقة .

س137/ ما احتمال أن يكون 55652113 رقماً لهاتف مكون من 8 أرقام هي : 5,1,6,5,2,1,5,3 ؟

أ)  $\frac{1}{3360}$       ب)  $\frac{1}{3360}$       ج) 302010      د)  $\frac{1}{302010}$

**الحل :** الإجابة (ب) ، نلاحظ أن هناك تكرار في 5,1,6,5,2,1,5,3 لذلك نستعمل قانون إيجاد التباديل مع التكرار

$\frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$  ، وبالتعويض بالقانون :  $\frac{8!}{3! 2! 2!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1}$  وبالاختصار  $\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{2} = 3360$  ولكن

المطلوب الاحتمال وليس عدد الطرق ويكون الحل  $\frac{1}{3360}$  .

س138/ إذا رُتبت 6 نماذج لعب صغيرة في سوار دائري عشوائياً ، فما احتمال ظهورها ؟

أ) 120      ب)  $\frac{1}{120}$       ج) 360      د)  $\frac{1}{360}$

**الحل :** الإجابة (ب) وبالتعويض بقانون التباديل الدائرية :  $\frac{n!}{n} = (n-1)!$  يكون الحل  $5! = 120 = (6-1)!$

والمطلوب الاحتمال ، لذا يكون الحل :  $\frac{1}{120}$  .

س139/ أرادت النوادي الأربعة ( برشلونة ، ريال مدريد ، فالنسيا ، مالقا ) إقامة مباريات كرة القدم فيما بينها

بحيث تلعب هذه النوادي مثني مثني . فبكم طريقة يمكن إتمام ذلك ؟

أ) 6      ب) 36      ج) 9      د) 81

**الحل :** (أ) 6 ، بالتعويض بقانون التوافيق.

س140/ إذا كان لدينا كيس غير شفاف يحتوي على 6 كرات حمراوات و5 صفراوات فإذا سحبنا 4 كرات عشوائياً فما

احتمال ان تكون 3 حمراوات وكره صفراء ؟

أ) 330      ب)  $\frac{10}{33}$       ج)  $\frac{33}{10}$       د) 33

**الحل :** الإجابة (ج) ، عدد الكرات جميعها  $5+6 = 11$  ، عدد عناصر فراغ العينة = عدد الكرات الكلية = 11

عدد الكرات المسحوبة باستعمال قانون التوفيق  $4C11 = 330$  ، والمطلوب في صدر السؤال 3 حمراء وكره واحدة صفراء

باستعمال التوافيق أيضاً  $100 = 5C1 \times 3C6$  إذاً الاحتمال المطلوب  $\frac{100}{330} = \frac{10}{33}$  .

## احتمالات الحوادث :

- الحادثة المستقلة : هي الحادثة التي تستقل بذاتها أي لا يؤثر احتمال  $A$  في احتمال حدوث  $B$  .
- الحادثة الغير مستقلة : هي الحادثة التي لا تستقل بذاتها أي يؤثر احتمال  $A$  في احتمال حدوث  $B$  بطريقة ما .
- الحادثة المتنافية : الحادثة التي تنفي إحداهما الأخرى أي لا يوجد نواتج مشتركة بينهما .
- الحادثة الغير متنافية : الحادثة التي لا تنفي إحداهما الأخرى أي يوجد نواتج مشتركة بينهما .
- الحادثة المتممة : الحادثة التي تتم إحداهما الأخرى .

$$* \text{احتمال الحادثتين المستقلتين تُعطى بالعلاقة : } P(A \text{ و } B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$* \text{احتمال الحادثتين الغير مستقلتين تُعطى بالعلاقة : } P(A \text{ و } B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

يُسمى  $P(B|A)$  بالاحتمال المشروط .

$$* \text{الاحتمال المشروط يُعطى بالعلاقة : } P(B|A) = \frac{P(A \text{ و } B)}{P(A)}$$

$$* \text{الحوادث المتنافية تُعطى بالعلاقة : } P(A \text{ أو } B) = P(A) + P(B)$$

$$* \text{الحوادث الغير متنافية تُعطى بالعلاقة : } P(A \text{ أو } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ و } B)$$

$$* \text{الحوادث المتممة تُعطى بالعلاقة : } P(A') = 1 - P(A)$$

### تدريب 1/ حدد إذا كانت الحادثتان مستقلتين أم غير مستقلتين :

- إلقاء قطعة نقد مرة واحدة ، ثم إلقاء قطعة نقد أخرى مرة واحدة أيضاً .
- الحل : نلاحظ أن لم تؤثر الحادثة الأولى في الحادثة الثانية لذلك الحادثتان مستقلتين .
- سُحبت بطاقة من مجموعة بطاقات ، ثم أُعيدت للمجموعة ، ثم سُحبت بطاقة أخرى .
- الحل : نلاحظ أن البطاقة أثرت في ترتيب البطاقات ، لذلك الحادثتان غير مستقلتان .
- المسؤول طالب من الصف الثاني ثانوي أو من الصف الثالث ثانوي .
- الحل :** نلاحظ أن الحادثتان مفصولة بـ أو ، ولا يوجد بينهما نواتج مشتركة ، لذا الحادثتان متنافيتان .

## الدراسات الاحتمالية :

- الدراسة التجريبية : دراسة تتطلب تجربة ما لعينة من المجتمع ، لحل مشكلة ما .
- الدراسات بالملاحظة : دراسة لا تتطلب تجربة ، ولكن تتطلب ملاحظة لاستقصاء النتيجة.
- الدراسة المسحية : دراسة تتطلب جمع البيانات والحقائق لحل مشكلة ما .
- الدراسة المسحية المنحازة : دراسة جزء معين من المجتمع الكلي ، لهم رأي أو إجابة منحازة عن المجتمع .
- الدراسة المسحية الغير منحازة : دراسة جزء معين من المجتمع الكلي ، لهم رأي أو إجابة تمثل رأي المجتمع.

تدريب 2/ حدد ما إذا كانت كل دراسة مسحية منحازة أو غير منحازة فيما يأتي :

- استطلاع آراء أفراد في سوق الماشية ؛ لمعرفة ما إذا كان سكان المدينة يحبون تربية الماشية أو لا ؟  
الحل : دراسة مسحية منحازة ، لأنها تمثل جزء من المجتمع الكلي ، ورأيهم منحاز عن المجتمع.
- سؤال كل عاشر شخص يخرج من قاعة الندوات عن عدد مرات حضوره ندوات ثقافية ؛ لتحديد مدى دعم سكان المدينة للندوات الثقافية ؟  
الحل : دراسة مسحية منحازة ؛ لأنها تمثل جزء من المجتمع الكلي ، ورأيهم منحاز لأنهم من الطبقة المثقفة في المجتمع.

## مقاييس النزعة المركزية :

- أبرز مقياس النزعة المركزية هي : المتوسط ، الوسيط ، المنوال ، المدى .

\* المتوسط الحسابي يُعطى بالعلاقة :  $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}} = \text{المتوسط الحسابي}$ .

\* الوسيط : ترتيب للقيم إما تصاعدياً أو تنازلياً ، وهو قيمة تتوسط مجموعة من القيم.

\* المنوال: القيمة الأكثر شيوعاً أو تكراراً.

\* المدى : أكبر قيمة - أصغر قيمة.

تدريب 3/ المتوسط الحسابي للأعداد : 5,6,7,8,9 ؟

$$\text{الحل : } \frac{5+6+7+8+9}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

تدريب 4/ الوسيط الحسابي للأعداد 7,9, 3,5,2 ؟

بترتيب الأعداد تنازلياً أو تصاعدياً : 9,7,5,3,2 ويُلاحظ أن عدد القيم = عدد فردي لذلك

القيمة التي تقطع في الوسط أو المنتصف = 5 .

تدريب 5/ الوسيط الحسابي للأعداد 9,8,6,4,3,2 ؟

- يُلاحظ أن الأعداد مرتبة ، ويُلاحظ أيضاً أن عدد القيم = عدد زوجي ، وبالتالي نقوم بجمع القيمتين  $6+4/2$

أي = 5 .

## هامش الخطأ :

- عند سحب عينة  $n$  ، من مجتمع كلي ، فإن هناك خطورة وجود خطأ في المعاينة وكلما زاد حجم العينة قل هامش الخطأ ويُعطى قانون هامش الخطأ بالعلاقة :  $\pm = \frac{1}{\sqrt{n}}$  .

## مقاييس التشتت :

- مقاييس التشتت : هي مقدار تباعد البيانات أو تقاربها ، ويوجد مقياسان للتشتت هما :  
\* التباين \* الانحراف المعياري \*


## قانون الانحراف المعياري لعينة :

$$s = \frac{\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}}{n - 1}$$

## قانون الانحراف المعياري لمجتمع

$$\sigma = \frac{\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2}}{n}$$

## التوزيعات الطبيعية والملتوية :




× خصائص التوزيع الطبيعي :


- التمثيل البياني له منحنى يشبه الجرس ، ومتماثل بالنسبة للمتوسط.
- يتساوى فيه المتوسط والوسيط والمنوال وتقع في المركز.
- المنحنى متصل.
- يقترب المنحنى من المحور  $x$  في جزأيه الموجب والسالب ، ولكنه لا يمسه.

× التوزيعات الملتوية :

التواء سالب  
(ملتو إلى اليسار)



التواء موجب  
(ملتو إلى اليمين)



# الفصل السادس: الدوال المثلثية والزوايا



## الدوال المثلثية في المثلثات القائمة الزاوية :

- حساب المثلثات : دراسة العلاقات بين زوايا وأضلاع المثلث القائم الزاوية .

- الدوال المثلثية هي :  $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta, \csc\theta, \sec\theta, \cot\theta$  .

يُعرف  $\sin$  : بـ الجيب أو ( جا الزاوية ) ، ويُعرف  $\cos$  : بـ جيب تمام الزاوية ( أو جتا الزاوية ) ،

ويُعرف  $\tan$  : بـ ظل الزاوية أو ( ظا الزاوية ) ، وأما  $\csc$  فيُعرف على أنه قاطع تمام الزاوية ( أو قتا )

وكذلك  $\sec$  : بـ قاطع أو ( قا الزاوية ) ، وأخيراً  $\cot$  : بـ ظل التمام ( طتا ) .

## - قوانين الدوال المثلثية ( المتطابقات المثلثية ) :

$$\begin{aligned} \sin\theta &= \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} & \cos\theta &= \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} & \tan\theta &= \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} \\ \csc\theta &= \frac{\text{الوتر}}{\text{المقابل}} & \sec\theta &= \frac{\text{الوتر}}{\text{المجاور}} & \cot\theta &= \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} \end{aligned}$$

وكذلك :

$$\sin\theta = \frac{1}{\csc\theta} \quad \cos\theta = \frac{1}{\sec\theta} \quad \tan\theta = \frac{1}{\cot\theta} \quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

- ملاحظة /  $\csc$  هو معكوس  $\sin$  ، و  $\sec$  معكوس  $\cos$  و  $\cot$  معكوس  $\tan$  ..

## - متطابقات فيثاغورس :

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \quad \cot^2\theta + 1 = \csc^2\theta \quad \tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$$

## - متطابقات الدوال الزوجية والفردية :

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta \quad \cos(-\theta) = \cos\theta \quad \tan(-\theta) = -\tan\theta$$

## - متطابقات الزاويتين المتتامتين :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot\theta$$

س141/ العبارة  $\frac{\sin\theta \csc\theta}{\tan\theta}$  تكافئ :

$$1 \text{ (د)} \quad \frac{1}{\csc\theta \sec\theta} \text{ (ج)} \quad \frac{1}{\sec\theta} \text{ (ب)} \quad \frac{1}{\cot\theta} \text{ (أ)}$$

الحل : الإجابة ( أ ) أي  $\frac{\sin\theta \times \frac{1}{\sin\theta}}{\cot\theta} = \frac{1}{\cot\theta}$

س142/  $\sin - \theta =$

$$-\sec \text{ (د)} \quad -\sin \text{ (ج)} \quad -\theta \text{ (ب)} \quad \theta \text{ (أ)}$$

**الحل :** الإجابة (ج) ، بتطبيق متطابقة الدوال الزوجية والفردية.

- الزوايا الشهيرة لبعض قيم الدوال المثلثية :

$\theta$	$\theta = 0$	$\theta = 30$	$\theta = 45$	$\theta = 60$	$\theta = 90$	$\theta = 180$	$\theta = 360$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	0
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	1-	1
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	غير معرف	0	0

- المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما :

\* **متطابقات المجموع :**

$$\begin{aligned} \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ \cos(A + B) &= \cos A \cdot \cos B - \sin A \cdot \sin B \\ \tan(A + B) &= \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B} \end{aligned}$$

\* **متطابقات الفرق :**

$$\begin{aligned} \sin(A - B) &= \sin A \cos B - \cos A \sin B \\ \cos(A - B) &= \cos A \cdot \cos B + \sin A \cdot \sin B \\ \tan(A - B) &= \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \cdot \tan B} \end{aligned}$$

- المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية:

$$\begin{aligned} \tan 2\theta &= \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \\ \cos 2\theta &= 1 - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cdot \cos \theta \end{aligned}$$

- المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية :

$$\begin{aligned} \tan \frac{\theta}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}, \cos \theta \neq 1 \\ \cos \frac{\theta}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} \\ \sin \frac{\theta}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} \end{aligned}$$

$$= \sin 45 \cos 45 + \sin 15 \cos 45 \quad \text{س143}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{د})$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3} \quad (\text{أ})$$

الحل : بتطبيق قانون متطابقات المجموع

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin 45 + 15 = \sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{يتضح أن الحل :}$$

$$\text{س144 / العبارة } \frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} \text{ تكافئ :}$$

$$\tan \theta \quad (\text{د})$$

$$\sec \theta \quad (\text{ج})$$

$$\sec \theta \quad (\text{ب})$$

$$\cos \theta \quad (\text{أ})$$

الحل : الإجابة (ب)  $\sec \theta$  .. قم بالتفكير بحل هذه المسألة..

$$= \sin 15 \cos 15 \quad \text{س145}$$

$$0 \quad (\text{د})$$

$$1 \quad (\text{ج})$$


$$\frac{1}{4} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1}{2} \quad (\text{أ})$$

الحل :

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\frac{1}{2} (\sin (15 + 15) + \sin(15 - 15)) = \frac{1}{2} (\sin 30 + \sin 0) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{1}{4}$$



قوانين المثلثات :

- قانون الجيوب :

\* مساحة المثلث :

$$\frac{1}{2} ab \sin C = \text{المساحة}$$

$$\frac{1}{2} ac \sin B = \text{المساحة}$$

$$\frac{1}{2} bc \sin A = \text{المساحة}$$

\* مساحة المثلث بمعلومية قياس زاويتين فيه وطول أحد أضلاعه :

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$


- قانون جيب التمام :


$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

قيم الدوال المثلثية :





- دائرة الوحدة : هي دائرة نصف قطرها يساوي 1 .

س145/ إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية  $\theta$  في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة في

النقطة  $P\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  فإن قيمة  $\sin\theta =$

- (أ)  $\frac{1}{2}$  (ب)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (ج)  $-\frac{1}{2}$  (د)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

**الحل :** الإجابة (د)  $P(\cos\theta, \sin\theta)$  ولذلك قيمة  $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

س146/ زاوية  $130^\circ$  تكافئ :

- (أ) 490 (ب) -490 (ج) 560 (د) -560

**الحل :** 490 ، وذلك لأن (  $130 + 360 = 490$  ) أما الزاوية بالسالب فتكون (  $130 - 360 = -230$  )

س147/ القيمة الدقيقة لـ  $\cos 240$  :

- (أ)  $\frac{1}{2}$  (ب)  $-\frac{1}{2}$  (ج)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (د)  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

**الحل :** الإجابة (ب) وذلك لأن (  $240 - 180 = 60$  ) ، ولأن 240 تقع في الربع الثالث فإن  $\cos$  تكون قيمتها سالبة

و  $\cos 60 = \frac{1}{2}$  ولأن قيمتها سالبة فإن القيمة الدقيقة تكون  $-\frac{1}{2}$ .

## التحويل من القياس بالدرجات إلى القياس بالراديان والعكس :

من القياس بالراديان إلى القياس بالدرجات	من القياس بالدرجات إلى القياس بالراديان
$\frac{180}{\pi \text{ راديان}}$	$\frac{\pi \text{ راديان}}{180}$

س148/ إذا علمت أن قياس الزاوية بالراديان  $= \frac{5\pi}{2}$  ، فإن قياسها بالدرجات =

- (أ) 72 (ب) 450 (ج) -72 (د) -450

**الحل :** الإجابة (ب) 450 بالتعويض بقانون التحويل من راديان للدرجات .

س149/ قيمة الزاوية 120 بالراديان :

- (أ)  $\frac{\pi}{6}$  (ب)  $\frac{\pi}{216}$  (ج)  $-\frac{\pi}{6}$  (د)  $-\frac{\pi}{216}$

**الحل :** الإجابة (أ) بالتعويض بقانون الراديان.

## عدد الدورات :

- يُعطى قانون عدد الدورات بالعلاقة : عدد الدورات =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{محيط العجلة}}$

س150/ طول نصف قطر إطارات شاحنة 33in . المسافة التي تقطعها الشاحنة بعد أن تدور إطاراتها ثلاثة أرباع دورة هي :


- (أ)  $24.75\pi$  (ب)  $44\pi$  (ج)  $49\pi$  (د)  $55\pi$

**الحل :**  $\frac{3}{4} = \frac{x}{66\pi} = 49\pi$  . ( 66 من محيط العجلة وهي محيط الدائرة :  $2\pi$  ) .

## الدوال الدورية :


- يكون شكل الدالة وقيمها ( $y$ ) عبارة عن تكرار لنمط على فترات منتظمة متتالية ، ويسمى النمط الواحد الكامل منها دورة والمسافة الأفقية في الدورة بطول الدورة.

س151/ طول الدورة في الشكل التالي :




- (أ) -1 (ب)  $\pi$  (ج)  $2\pi$  (د)  $\frac{\pi}{2}$
- الحل :** الإجابة (ب)  $\pi$  ، وذلك لأن  $\pi - 0 = \pi$  وكذلك  $2\pi - \pi = \pi$

س152/ طول الدورة في الشكل التالي :



- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 4 (د) -1
- الحل :** طول الدورة = 2 ، وذلك لأن  $4-2 = 2$  ،  $6-4 = 2$  ، ...

س153/ طول الدورة في الشكل التالي :



- (أ) 6 (ب) 8 (ج) 4 (د) 10
- الحل :** الإجابة (ب) 8 ، وذلك لأن  $(6 = 4+2)$  ،  $(14 = 8+6)$  ، إذ  $(14-6 = 8)$  ...

## تمثيل الدوال المثلثية بيانياً :


دالة الجيب وجيب التمام		
$y = \cos \theta$	$y = \sin \theta$	الدالة المولدة ( الأم ) التمثيل البياني
$R$	$R$	المجال
$\{y   -1 \leq y \leq 1\}$	$\{y   -1 \leq y \leq 1\}$	المدى
1	1	السعة ( a )
$360^\circ$	$360^\circ$	طول الدورة

$y = a \sin b\theta$  ،  $y = a \cos b\theta$  ، السعة تكون  $|a|$  وطول الدورة  $\frac{360^\circ}{|b|}$




س154/ أحسب سعة الدورة وطول الدورة للدالة  $y = 4 \cos 3\theta$  ،

**الحل :** سعة الدورة = 4 ،  $|a| = |4| = 4$  ، طول الدورة  $\frac{360^\circ}{|b|} = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$

دالة الظل :

دالة الظل	
$y = \tan \theta$	الدالة المولدة ( الأم ) التمثيل البياني
	
$\{\theta   \theta \neq 90 + 180n, n \in Z\}$	المجال
$R$	المدى
غير معرفة ( U )	السعة ( a )
$180^\circ$	طول الدورة

دالة قاطع التمام والقاطع وظل التمام :


دوال قاطع التمام والقاطع وظل التمام			
$y = \cot \theta$	$y = \sec \theta$	$y = \csc \theta$	الدالة المولدة ( الأم ) التمثيل البياني
			
$\{\theta   \theta \neq 180n, n \in Z\}$	$\{\theta   \theta \neq 90 + 180n, n \in Z\}$	$\{\theta   \theta \neq 180n, n \in Z\}$	المجال
$R$	$\{y   1 \leq y \vee y \leq -1\}$	$\{y   1 \leq y \vee y \leq -1\}$	المدى
غير معرفة ( U )	غير معرفة ( U )	غير معرفة ( U )	السعة ( a )
$180^\circ$	$360^\circ$	$360^\circ$	طول الدورة

**الفصل السابع:  
القطوع المخروطية  
والنهايات  
وحساب التكامل  
والتفاضل**



## \* القطوع المخروطية :



- القطوع المخروطية : هي الأشكال الناتجة عن تقاطع مستوى ما مع مخروطين دائريين قائمين متقابلين بالرأس كليهما أو إحداهما.
- القطع المكافئ : هو المحل الهندسي لجميع نقاط المستوى والتي تبعد عن نقطة ثابتة تسمى البؤرة وبعد ثابت ويسمى الدليل.
- القطع الناقص : المحل الهندسي لجميع نقاط المستوى يكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتين يساوي مقداراً ثابتاً.
- القطع الزائد : المحل الهندسي لجميع نقاط المستوى التي يكون الفرق المطلق بين بعديها عن بؤرتين مقداراً ثابتاً.





## خصائص القطع المكافئ :

$(y - k)^2 = 4p(x - h)$	الصورة القياسية :	$(x - h)^2 = 4p(y - k)$	الصورة القياسية :
<p><math>p &lt; 0</math>      <math>p &gt; 0</math></p>	الشكل البياني :	<p><math>p &lt; 0</math>      <math>p &gt; 0</math></p>	الشكل البياني :
المنحنى مفتوح أفقياً	الاتجاه :	المنحنى مفتوح رأسياً	الاتجاه :
$(h, k)$	الرأس :	$(h, k)$	الرأس :
$(h + p, k)$	البؤرة :	$(h, k + p)$	البؤرة :
$y = k$	معادلة محور التماثل :	$x = h$	معادلة محور التماثل :
$x = h - p$	معادلة الدليل :	$y = k - p$	معادلة الدليل :
$ 4p $	طول الوتر البؤري :	$ 4p $	طول الوتر البؤري :

## خصائص القطع الناقص :

$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$	الصورة القياسية :	$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	الصورة القياسية :
	الشكل البياني :		الشكل البياني :
المحور الأكبر رأسي	الاتجاه :	المحور الأكبر أفقي	الاتجاه :
$(h, k)$	المركز :	$(h, k)$	المركز :
$(h, k \pm c)$	البؤرتان :	$(h \pm c, k)$	البؤرتان :
$(h, k \pm a)$	الرأسان :	$(h \pm a, k)$	الرأسان :
$(h \pm b, k)$	الرأسان المرافقان	$(h, k \pm b)$	الرأسان المرافقان :
$x = h$	المحور الأكبر :	$y = k$	المحور الأكبر :
$y = k$	المحور الأصغر :	$x = h$	المحور الأصغر :
$c^2 = a^2 - b^2$ أو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$	العلاقة بين a, b, c	$c^2 = a^2 - b^2$ أو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$	العلاقة بين a, b, c

## خصائص القطع الزائد :

$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$	الصورة القياسية :	$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$	الصورة القياسية :
	الشكل البياني :		الشكل البياني :
المحور القاطع رأسي	الاتجاه :	المحور القاطع أفقي	الاتجاه :
$(h, k)$	المركز :	$(h, k)$	المركز :
$(h, k \pm a)$	الرأسان :	$(h \pm a, k)$	الرأسان :
$(h, k \pm c)$	البؤرتان :	$(h \pm c, k)$	البؤرتان :
$x = h$	المحور المرافق :	$y = k$	المحور القاطع :
$y = k$	خط التقارب :	$x = h$	المحور المرافق :
$y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$	العلاقة بين a, b, c	$y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$	العلاقة بين a, b, c
$c^2 = a^2 - b^2$ $c = \sqrt{a^2 - b^2}$		$c^2 = a^2 - b^2$ $c = \sqrt{a^2 - b^2}$	


## الدائرة وخصائصها :

- الصورة القياسية لمعادلة الدائرة تُعطى بالعلاقة :

الصورة القياسية لمعادلة الدائرة التي مركزها  $(h, k)$  ونصف قطرها  $r$  هي :

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$


## - النهايات (Limits) :



س155 /  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  في الشكل التالي :

- أ) 0      ب)  $\infty$       ج)  $-\infty$       د)  $i$

**الحل :** الإجابة (ب)  $\infty$  ، يكون المحور ممتد إلى موجب المالانهاية في محور  $x$  ، ولذلك يكون محور الـ  $y$  أو  $f(x)$  ممتد إلى موجب المالانهاية أيضاً .




س156 /  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  في الشكل التالي :

- أ) 0      ب)  $\infty$       ج)  $-\infty$       د)  $i$

**الحل :** الإجابة (ب)  $\infty$  ، وذلك عندما تؤول أو تقترب  $x$  من  $-\infty$  ، تكون الدالة  $f(x)$  تقترب من موجب المالانهاية  $+\infty$


## أنواع عدم الاتصال :

عدم اتصال نقطي	عدم اتصال قفزي	عدم اتصال لانهاية
<p>سميت بعدم الاتصال النقطي ، لأن هناك نقطة غير متصلة بالدالة.</p>	<p>سميت بعدم الاتصال القفزي لأن الدالة تكون على شكل قفزة .</p>	<p>سميت بعدم الاتصال اللانهائية ، لأن الدالتين غير متصلتين وتمتد للمالانهاية من الطرفين.</p>



- يُسمى عدم الاتصال النقطي : عدم اتصال قابل للإزالة.

- يُسمى عدم الاتصال اللانهائي وعدم الاتصال القفزي : عدم اتصال غير قابل للإزالة.



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

س157 / في الشكل التالي :

أ) 0      ب)  $\infty$       ج)  $-\infty$       د) غير معرف


**الحل :** الإجابة (أ) 0 ، لأنه لا يوجد امتداد للمالانهاية وسالب المالانهاية على أو حول محور  $y$ .

## دوال التزايد والتناقص والثابتة :

في الدالة


**المتناقصة**

إذا كان  $x_1 < x_2$  فإن  $f(x_1) > f(x_2)$




**الثابتة**

إذا كان  $x_1 < x_2$  فإن  $f(x_1) = f(x_2)$




**المتزايدة**

إذا كان  $x_1 < x_2$  فإن  $f(x_1) < f(x_2)$



## - القيم القصوى المحلية والمطلقة :



- القيمة الصغرى المطلقة : أقل قيمة ممكنة للدالة في مجالها .
- القيمة الصغرى المحلية : أقل قيمة ممكنة للدالة من جميع القيم أو الفترات الأخرى.
- القيمة العظمى المطلقة : أكبر قيمة ممكنة للدالة في مجالها.
- القيمة العظمى المحلية : أكبر قيمة ممكنة للدالة من جميع القيم أو الفترات الأخرى.

## عدم اعتماد النهاية على قيمة الدالة عند نقطة :

- التعبير اللفظي : لا تعتمد نهاية  $f(x)$  عندما تقترب  $x$  من العدد  $c$  على قيمة الدالة عند  $c$ .

أمثلة :

$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$	$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$	$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$
$h(c) \neq L$	$g(c) = n$	$f(c)$ غير معرفة

النهاية من جهة واحدة :

النهاية من اليسار	النهاية من اليمين
إذا اقتربت قيم $f(x)$ من قيمة وحيدة $L_1$ ، عند اقتراب قيم $x$ من العدد $c$ من اليسار $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L_2$ فإن : وتقرأ : نهاية $f(x)$ عندما تقترب $x$ من $c$ من اليسار ، هي : $L_1$	إذا اقتربت قيم $f(x)$ من قيمة وحيدة $L_1$ ، عند اقتراب قيم $x$ من العدد $c$ من اليمين ، فإن : $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L_1$ وتقرأ : نهاية $f(x)$ عندما تقترب $x$ من $c$ من اليمين هي : $L_1$ .



النهاية عند نقطة :

- تكون نهاية  $f(x)$  عندما تقترب  $x$  من  $c$  ، إذا فقط إذا كانت النهايتان من اليمين واليسار موجودتين ومتساويتين ، أي أنه إذا كانت :

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

فإن  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$

نهايات الدوال :

نهاية الدوال المحايدة	نهايات الدوال الثابتة
	
نهاية الدالة المحايدة عند النقطة $c$ هي $c$ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ ويرمز لها بالرمز :	نهاية الدالة الثابتة عند أي نقطة $c$ هي القيمة الثابتة للدالة ، ويرمز لها بالرمز : $\lim_{x \rightarrow c} k = k$

حساب النهايات جبرياً :

$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$	خاصية المجموع
$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)$	خاصية الفرق
$\lim_{x \rightarrow c} [k f(x)] = k \lim_{x \rightarrow c} f(x)$	خاصية الضرب في ثابت
$\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$ حيث $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$	خاصية القسمة
$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)^n] = [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]^n$	خاصية القوة
$\lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$ إذا كان $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}$	خاصية الجذر النوني



## الصيغة الغير المحددة :

- يُسمى ناتج التعويض في النهايات على الصورة  $\frac{0}{0}$  بالصيغة الغير محددة ؛ لأنه لا يمكن تحديد نهاية الدالة مع وجود صفر ، ومثل هذه النهايات قد تكون موجودة ولها قيمة حقيقة ، أو غير موجودة أو متباعدة نحو  $-\infty, \infty$  .

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 - x - 20}{x + 4} \quad \text{س158/}$$

(أ) غير معرفة (ب) 0 (ج) -9 (د)  $\infty$

**الحل :** الإجابة (ج) وذلك بأخذ العامل المشترك الأكبر ثم التعويض بتأول x

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x-5)(x+4)}{x+4} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x-5)\cancel{(x+4)}}{\cancel{x+4}} = \lim_{x \rightarrow -4} (x-5) = (-4) - 5 = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \quad \text{س159/}$$

(أ) غير معرفة (ب) 0 (ج)  $\frac{1}{6}$  (د)  $-\frac{1}{6}$

**الحل :** الإجابة (ج) ، كما نلاحظ أن بالتعويض بقيمة 9 الحل =  $0/0$  ، وبعد ذلك يتم إنطاق المقام ومن ثم اختصار العوامل المشتركة

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \cdot \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 3} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{9} + 3} = \frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x} - 3) \quad \text{س160/}$$

(أ) 0 (ب) 1 (ج)  $\sqrt{6}$  (د) غير موجودة

**الحل :** الإجابة (د) غير موجودة. وذلك لأن بالتعويض بقيمة 2 يتضح أنها تُعطي عدد بجذر سالب أي غير موجود.

## نهايات دوال القوى عند المالانهاية :

- لأي عدد صحيح موجب  $n$  :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty \bullet$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \infty \bullet \text{ ، إذا كان } n \text{ عدداً زوجياً.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty \bullet \text{ ، إذا كان } n \text{ عدداً فردياً.}$$

## نهاية دوال كثيرات الحدود عند المالانهاية :

إذا كانت  $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$  دالة كثيرة حدود ، فإن

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} a_n x^n , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} a_n x^n$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 + 5x - 1) \quad \text{س161/}$$

(د) غير موجودة

(ج)  $-\infty$

(ب) 1

(أ) 0

الحل :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 + 5x - 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

## نهاية دالة المقلوب عند المالانهاية :

- إن نهاية دالة المقلوب عند موجب أو سالب المالانهاية هي : صفر .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

معدل التغير اللحظي :

- معدل التغير اللحظي للدالة  $f$  عند النقطة  $(x, f(x))$  هو ميل المماس عند النقطة  $(x, f(x))$ .

ويُعطى بالصيغة  $m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$  ، بشرط أن تكون النهاية موجودة .

## المشتقات وطريقة الاشتقاق :

- تُسمى عملية إيجاد المشتقات بالتفاضل .

\* مشتقة دالة عند نقطة :

- لإيجاد مشتقة دالة عند نقطة يتم تطبيق القانون :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- لإيجاد مشتقة القوة ، يتم تطبيق قاعدة مشتقة القوة :

$$\text{إذا كان } f(x) = x^n \text{ ، حيث } n \text{ عدد حقيقي، فإن } f'(x) = nx^{n-1} .$$

- قواعد أخرى للاشتقاق :

قانونها الرياضي	نوع المشتقة
مشتقة الدالة الثابتة تساوي صفرًا. أي أنه إذا كانت $f(x) = c$ ، حيث $c$ عدد ثابت ، فإن $f'(x) = 0$ .	مشتقة الثابت
إذا كانت $f(x) = cx^n$ ، حيث $c$ ثابت، و $n$ عدد حقيقي، فإن $f'(x) = cnx^{n-1}$ .	مشتقة مضاعفات القوى
إذا كانت $f(x) = g(x) \pm h(x)$ ، فإن $f'(x) = g'(x) \pm h'(x)$ .	مشتقة المجموع أو الفرق

## – قاعدة مشتقة الضرب والقسمة :

\* قاعدة مشتقة الضرب :

إذا كانت مشتقة كل من الدالتين  $f, g$  موجودة عند  $x$  ، فإن  $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$  ،

\* قاعدة مشتقة القسمة :

إذا كانت مشتقة كل من الدالتين  $f, g$  موجودة عند  $x$  ، وكان  $g(x) \neq 0$  ، فإن

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

ملاحظة هامة : يرمز لمشتقة  $y = f(x)$  أيضاً بالرموز  $\frac{df}{dx}$  ،  $\frac{dy}{dx}$  ،  $y'$  ، وإذا سبق الدالة  $\frac{d}{dx}$  ( المؤثر التفاضلي ) فإن ذلك يعني إيجاد مشتقة الدالة.

س162 / مشتقة الدالة  $f(x) = x^9$  :

أ)  $x^9$       ب)  $9x^9$       ج)  $8x^9$       د)  $9x^8$

**الحل :** الإجابة (د)  $f(x) = x^9$  ،  $f'(x) = 9x^{9-1} = 9x^8$

س163 / مشتقة الدالة  $g(x) = \sqrt[5]{x^7}$  :

أ)  $\frac{7}{5}\sqrt[5]{x^2}$       ب)  $\frac{5}{7}\sqrt[5]{x^2}$       ج)  $\frac{x^7}{5}$       د)  $\frac{x^5}{7}$

**الحل :** الإجابة (أ)  $g(x) = \sqrt[5]{x^7}$  ،  $g'(x) = \frac{7}{5}x^{7-1} = \frac{7}{5}x^2 = \frac{7}{5}\sqrt[5]{x^2}$

س164 / مشتقة الدالة  $t(x) = \frac{1}{x^8}$  :

أ)  $\frac{8}{x^9}$       ب)  $-\frac{8}{x^9}$       ج)  $8x^8$       د)  $9x^7$

**الحل :** الإجابة (ب)  $t(x) = \frac{1}{x^8}$  ،  $t'(x) = -8x^{-8-1} = -8x^{-9} = -\frac{8}{x^9}$

س165 / مشتقة الدالة  $f(x) = 5x^3 + 4$  :

أ)  $\sqrt[3]{15} + 4$       ب)  $15x^2$       ج)  $\sqrt[3]{19x}$       د)  $2x^{15}$

**الحل :** الإجابة (ب)  $f(x) = 5x^3 + 4$  ،  $f'(x) = 5 \cdot 3x^{3-1} + 0 = 15x^2$

س166 / مشتقة الدالة  $h(x) = (-7x^2 + 4)(2 - x)$  :

أ)  $-14x$       ب)  $14x$       ج)  $-21x^2 - 28x + 4$       د)  $21x^2 - 28x - 4$

**الحل :** فكر بالإجابة ..

## التكامل :

- التكامل : هو عبارة عن عملية عكسية عن التفاضل ، وهو عملية إيجاد دول أصلية ، والتكامل نوعان وهما :  
\* تكامل محدد  
\* تكامل غير محدد ( التكامل بالتعويض ) .
- التكامل المحدد : يُستخدم لحساب المساحة تحت المُنحنيات وكذلك الحجوم والسطوح، أي كلما اقترب عرض المستطيل من الصفر ، فإن عدد المستطيلات يقترب من المالانهاية ، لاحظ وجود  $(a, b)$
- التكامل غير المحدد : يُستخدم لحساب الدوال الجبرية والمثلثية ، ولقد سمي التكامل الغير محدد بهذا الاسم نظرا لاحتوائه علي ثابت للتكامل غير محدد القيمة مما يدل علي عدد لانهاية من الدوال

يُعبّر عن مساحة المنطقة المحصورة بين مُنحني دالة والمحور  $x$  في الفترة  $[a, b]$  بالصيغة

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \Delta x = \frac{b-a}{n}, x_i = a + i\Delta x$$

حيث  $a$  : الحد الأدنى ،  $b$  : الحد الأعلى ، وتسمى هذه الطريقة **مجموع ريمان الأيمن** .

## التكامل غير المحدد :

- يُعطى التكامل غير المحدد للدالة  $f$  بالصيغة :

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

حيث  $F(x)$  : دالة أصلية لـ  $f(x)$  و  $C$  : ثابت.

## الدوال الأصلية :

- قواعد الدالة الأصلية :

إذا كان $f(x) = x^n$ ، حيث $n$ عدد نسبي لا يساوي $-1$ ، فإن : $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ .	<b>قاعدة القوة</b>
إذا كان $f(x) = kx^n$ ، حيث $n$ عدد نسبي لا يساوي $-1$ ، $k$ عدداً ثابتاً، فإن : $F(x) = \frac{kx^{n+1}}{n+1} + C$ .	<b>قاعدة ضرب دالة القوة في عدد ثابت</b>
إذا كان $f(x)$ ، $g(x)$ دالتان أصليتان هما $F(x)$ ، $G(x)$ على الترتيب ، فإن : $F(x) \pm G(x)$ دالة أصلية لـ $f(x) \pm g(x)$ .	<b>قاعدة المجموع والفرق</b>

## النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل :

- هي نظرية تربط التكامل بالتفاضل ، أي تربط التكاملات والمشتقات ببعضهما البعض ، وهي تنص على أن :

- إذا كانت  $F(x)$  دالة أصلية للدالة المتصلة  $f(x)$  ، فإن :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

ويمكن التعبير عن الطرف الأيمن من هذه العبارة بالرمز  $F(x) \Big|_a^b$  .

س167/ احسب التكامل :

$$? \int (9x - x^3) dx$$

**الحل :** يُعتبر تكامل غير محدد لأنه لم يحدد أرقام بجانب رمز التكامل إذ أن الحل يكون

$$\begin{aligned} \int (9x - x^3) dx &= \frac{9x^{1+1}}{1+1} - \frac{x^{3+1}}{3+1} + C \\ &= \frac{9}{2} x^2 - \frac{x^4}{4} + C \end{aligned}$$

س168/ احسب التكامل

$$? \int_2^3 (9x - x^3) dx$$

**الحل :** يُعتبر تكامل مُحدد لأنه حدد أرقام ما بجانب رمز التكامل ..

$$\begin{aligned} \int_2^3 (9x - x^3) dx &= \left( \frac{9}{2} x^2 - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_2^3 \\ &= \left( \frac{9}{2} 3^2 - \frac{3^4}{4} \right) - \left[ \frac{9}{2} (2)^2 - \frac{2^4}{4} \right] \\ &= 20.25 - 14 = 6.25 \end{aligned}$$

## إيجاد المساحة تحت المنحنى :

س169/ مساحة تحت المنحنى للدالة  $f(x) = x^2$  في الفترة  $[0, 3]$  :

د) 55

ج) 12

ب) 9

أ) 4

**الحل :** التكامل يُعتبر تكامل مُحدد ، النقاط هي :  $x = 0, x = 3$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_0^3 x^2 dx$$

بالاشتقاق :

$$9 \text{ وحدات مربعة} = 3^2 = \frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{x^3}{3}, 0 \rightarrow 3$$