

سلسلة

التجمُع التَّعليمي



التجمُع التَّعليمي



القناة الرئيسية: t.me/BAK111

بوت التواصل: [@BAK1117_bot](https://t.me/BAK1117_bot)

الدورة المكثفة بمادة علم الأحياء للثالث الثانوي العلمي دورة 2022

(العاشر درس)

- ✓ **الأوراق التالية هي خلاصة موسعة للمنهج بطريقة متسلسلة تشبه نموذج الامتحان الأخير.**
- ✓ **من درس من الكتاب عليه أن يجعل هذه الأوراق مراجعة ثانية له ومن لم يدرس من أي مرجع يستطيع الاعتماد على هذه الأوراق.**
- ✓ **كتابك مرجعك الأول والأخير لمطلب الدرجة الناتمة وهذه الأوراق مكملة لذلك.**
- ✓ **مؤسسة العلوم الحيدرية للتعليم الإلكتروني غير مسؤولة عن أي نسخة مزورة يتم تداولها.**
- ✓ **عزيزي الطالب/ة لقد مررتنا بعام متعب أنت أصحك أن تجتهد وتصبح ابتسامة لنفسك وأهلك ومدرسيك يكفيك ما حل بنا ... انهاضي كافح أصبر أصر لتصل إن شاء الله.**
- ✓ **عزيزي الطالب أنت عصاد الأمة وأملها لا تضيع وقتك ولا تسأل كم درجة ستحصل من هذه الأوراق فهي شاملة اطمئن.**

✓ **تابع العلوم الحيدرية على اليوتيوب لتحقيق فائدة أكبر (العلوم الحيدرية)**

✓ **تابع العلوم الحيدرية على الفيس بوك**

[Facebook.com/haidariahscience](https://www.facebook.com/haidariahscience)

✓ **تابع العلوم الحيدرية على التلغرام t.me/oloom202**



العصبية

أولاً: اختر الاجابة الصحيحة (١٠٠ درجة) (أول سؤال يكون بورقة الامتحان النهائي، وعليه ثلث العلامات)

ـ الدرس ٩+٢+١

١	بنية عصبية تنقل السيالات العصبية بين نصفي الكروة المخية والمخيخ بعادته البيضاء:						
١	الحديبة الدخلفية	د	النخاع الشوكي	ج	البصلة السيسالية	ب	المهدان
٢	أحد العصبونات التالية يوجد بالعقد الشوكية:						
١	عصبون عديم المحوار	د	عصبون متعدد الأقطاب	ج	عصبون أحادي القطب	ب	عصبون نجمي
٣	خلايا دقيقة تسهم بتشكيل الحاجز الدماغي الدموي:						
١	دقيقة ظهارية	د	دقيقة قليلة الاستطلاطات	ج	البطانة العصبية	ب	دقيقة نجمية
٤	انسداد جزئي بأحد الفتوّات التي تصل بين بطينات الدماغ يؤدي لترانيم السائل الدماغي الشوكي:						
١	جميع ما سبق خطأ	د	البزل القطني	ج	الاستسقاء الدماغي	ب	السكتة الدماغية
٥	تجمعات من الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية الخشنة تتراكب من RNA لها دور في تركيب بروتينات الخلية العصبية						
١	السفينغوميلين	د	جسم الخلية	ج	الليفاف العصبية	ب	جيسيمات نيل
٦	انفصال الخلايا العصبية من الوريقية الجينينية الخارجية نهاية الأسبوع الرابع من الحمل وتوضعها فوق الانبوب العصبي:						
١	العرف الحصبي	د	الأنبوب العصبي	ج	الميزابة العصبية	ب	اللوحة العصبية
٧	يمر السائل الدماغي الشوكي من البطين الرابع إلى الحيز تحت العنقيبوتي عن طريق						
١	نقب ماجندى ونقبا لوشكا	د	البطين الثالث	ج	قناة السياساء	ب	قناة سيلفيوس
٨	غمديولي رقيق شفاف يحوي نوى عديدة، نواة في كل قطعة بين حلقة						
١	جميع ما سبق خطأ	د	أدب	ج	غدد النخاعين	ب	شد شوان
٩	حالة تحدث نتيجة عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ كحالة طيبة طارئة تبدأ فيها خلايا الدماغ بالموت بعد بضع دقائق من عدم وصول الأكسجين						
١	جميع ما سبق خطأ	د	السكتة الدماغية	ج	البزل القطني	ب	الاستسقاء الدماغي
١٠	أحد الأعراض التالية هي من أعراض السكتة الدماغية:						
١	جميع ما سبق سبب	د	والارتباك، ومشاكل في التحدث والرؤية	ج	عدم القدرة على تحريك الوجه أو الفم أو الساق	ب	الخدر المفاجئ أو الضعف
١١	ينشأ الجهاز العصبي خلال من الحياة الجينينية من الوريقية الجينينية الخارجية.						
١	جميع ما سبق خطأ	د	الاسبوع الثالث	ج	الاسبوع الاول	ب	الاسبوع الرابع
١٢	ينفصل الانبوب العصبي عن الوريقية الجينينية الخارجية في :						

أ	الأسبوع الرابع	ب	نهاية الأسبوع الرابع	ج	خلال الأسبوع الثالث	د	جميع ما سبق صح
١٣	كتلة رمادية في قاعدة كل بطين جانبي من نصف الكرة المخية تسمى:						
أ	البطين الثالث	ب	الوطاء	ج	المهد	د	الجسم المخطط
١٤	حبل عصبي أبيض لامع اسطواني الشكل عليه انتفاخان رقبي وقطني يمتد داخل القناة الفقرية حتى مستوى الفقرة القطنية الثانية:						
أ	البطين الثالث	ب	الوطاء	ج	المهد	د	النخاع الشوكي
١٥	إحدى هذه البنى ليست جزءاً من جذع الدماغ						
أ	الدماغ	ب	الوصلة السيسالية	ج	الدماغ المتوسط	د	الحديبة الحلقية
١٦	التراتيب الخاصة بالخلية العصبية:						
أ	جسيمات نيسيل	ب	الليف العصبي	ج	المهد	د	ألياف
١٧	تتواصل نهايات المحوار مع خلايا عصبية أخرى أو مع خلايا مستجيبة كالخلايا الغدية أو العضلية عبر						
أ	الأزرار	ب	العشابك	ج	نقاط تواصل	د	ألياف
١٨	محوار أو استطالة هيولية طويلة قد يحيط بأعماد						
أ	جسيمات نيسيل	ب	الأعصاب	ج	المهد	د	الليف العصبي
١٩	غمد أبيض لامع يكسب المادة البيضاء لونها يتربّب من مادة دهنية فوسفورية يحيط بالليف العصبي، ثخانته منتظمة						
أ	شد النخاعين	ب	غمد شوان	ج	اختتافات رانفيه	د	ألياف
٢٠	يتشكل غمد النخاعين في الجهاز العصبي المركزي بدءاً						
أ	البطانة العصبية	ب	الليفات العصبية	ج	الخلايا التجميمية	د	خلايا الدبق قليلة الاستطارات
٢١	يتشكل غمد النخاعين في الجهاز العصبي المحيطي بدءاً من :						
أ	خلايا شوان	ب	خلايا سائلة	ج	المهد	د	ألياف
٢٢	حبال بيضاء لامعة اللون مختلفة الأطوال والأقطار، تتالف من تجمع حزم من اللياف العصبية.						
أ	العصبونات	ب	الاعتصاب	ج	الليف العصبي	د	ألياف
٢٣	طينات دقيقة من الأم الحنون تبرز في بطينات الدماغ الأربع غنية بالأوعية الدموية تغطيها خلايا البطانة العصبية						
أ	الشقيقة الممتدة	ب	الليفات العصبية	ج	خلايا شوان	د	ألياف
٢٤	خلايا دقيقة تفرز السائل الدماغي الشوكي وتبطّن قناعة السيساء وبطينات الدماغ وتغطي سطوح الضفائر المشيمية:						
أ	خلايا البطانة العصبية	ب	التابعة	ج	التجيميمية	د	دقيقة قليلة الاستطارات
٢٥	خلايا دقيقة تعمل على إعادة امتصاص النواقل العصبية وتسهم بتشكيل الحاجز الدموي وتعمل على تنظيم التوازن الشاردي حول العصبونات:						
أ	خلايا البطانة العصبية	ب	التابعة	ج	التجيميمية	د	دقيقة قليلة الاستطارات
٢٦	خلايا دقيقة تعمل على إعادة امتصاص النواقل العصبية وتسهم بتشكيل الحاجز الدموي وتعمل على تنظيم التوازن الشاردي حول العصبونات:						
أ	خلايا دقيقة تشكل غمد النخاعين حول محاوير الخلايا العصبية بالعادة البيضاء						
٢٧							

د	التجمعية	ج	تابعة	ب	خلايا البطانة العصبية
د	دقيقة قليلة الاستطلاعات	ج	تابعة	ب	خلايا دقيقة تحيط ب أجسام العصبونات في العقد العصبية
د	دقيقة قليلة الاستطلاعات	ج	تابعة (السائل)	ب	خلايا دقيقة صغيرة

ـ الدرس الثالث

١	تتم السيطرة على استجابتي ظروف الضغط النفسي والغضب عن طريق	الجهاز العصبي الجسمي	تحرر الأستيل كولين من العصبونات بعد العقدية	القسم نظير الودي	القسم الودي
٢	واحد مما يأتي لا يمكن السيطرة عليه بالفکر الواعية	العضلات الهيكالية	الجهاز العصبي الذاتي	العصيبونات الحركية	
٣	بينما تجلس بهدوء لتقرأ هذه الجملة يكون جزء الجهاز العصبي الأكثر نشاطا هو	العصبي نظير الودي	العصبي الودي	الجسم الإرادى	
٤	الناقل الكيميائي بين العصبون قبل العقدة والعصبون بعد العقدة هو	الاستيل كولين	النور أدرينالين		
٥	الناقل الكيميائي بين الخلايا العصبية و الخلايا المستجيبة بالقسم الودي:	النورادرينالين	الاستيل كولين		
٦	الناقل الكيميائي بين الخلايا العصبية و الخلايا المستجيبة بالقسم نظير الودي:	الجهاز العصبي الجسمي	الاستيل كولين	النورادرينالين	
٧	بني تحوي تجمعات أجسام عصبونات وخلايا دقيقة تنشأ من العرف العصبي مدعاة بنسيج ضام تعمل كمحطة استقبال وإرسال للدفعات العصبية.	العضلات الهيكالية	الاستيل كولين	الجهاز العصبي الجسمي	
٨	العقد العصبي	العقد الشوكية	العقد الودية	العقد الفحامية	

ـ الدرس الرابع

١	هي الشدة التي تكفي لتوليد الدفعه العصبية، والتقلص العضلي خلال زمن تأثير معين	الزمن المفید	الريوباز	الكرتوناکسی	الشدة الحدية
٢	هو الزمن اللازم لحدوث التتبیه في نسيج ما إذا كانت شدة المتبیه تساوى العتبة الدنيا أو تزيد. ودونه تصبح تلك الشدة غير فعالة.	الكرتوناکسی	زمن الاستفاد	الزمن المفید	الزمن المفید الأساسي
٣	شدة محددة لا يحدث دونها أي تتبیه مهما طال زمن التأثير.	الكريوناکسی	زمن الاستفاد	الشدة الحدية	الريوباز (العتبة الدنيا)
٤	هو الزمن الأقصى الذي لا يزال عندة الريوباز فعالاً	الريوباز	الزمن المفید الأساسي	النور أدرینالين	الكريوناکسی

هو زمن محدد لا يحدث دونه أي تتبّه مهما ارتفعت شدة المتبّه

٥

الريوباز	د	زمن الاستنفاذ	ج	الكريوناكسي	ب	الزمن المفيد الأساسي
الزمن المفيد اللازم لحدوث التتبّه في نسخ ما عندما تستخدم تياراً شدّته ضعفاً الريوباز						
الشدة الحدية	د	الكريوناكسي	ج	الزمن المفيد	ب	الزمن المفيد الأساسي

ـ الدرس الخامس

٦

هو الفرق في الكمون في أثناء الراحة بين السطح الخارجي للليف الذي يحمل شحنات موجبة و السطح الداخلي للليف الذي يحمل شحنة سالبة	١
حد العتبة	د

٧

كمون الغشاء	ج	كمون العمل	ب	كمون الراحة	١
أحد الخيارات التالية يكون فيها قيمة كمون الغشاء ثابتة:					
خلايا الدبق العصبي	د	الخلية البيضية الثانية	ج	الخلايا العضلية	ب

٨

الشاردة الأكثر تأثيراً في نشوء كمون الراحة	٣
الكلور	د

٩

البوتاسيوم	د	البوتاسيوم	ج	البوتاسيوم	ب	الصوديوم	١
الشاردة الأكثر تأثيراً في نشوء كمون العمل							

١٠

اليود تدفق شوارد البوتاسيوم نحو خارج العصبون في نهاية كمون العمل إلى:	٥
عودة الاستقطاب	د

١١

انخفاض الاستقطاب	د	فرط الاستقطاب	ج	فرط الاستقطاب	ب	الكلور	١
حساسة للتبدلات الاستقطاب في غشاء الخلية، تؤدي لإزالة الاستقطاب وإعادة الاستقطاب							
قنوات التبويب الفولطية	د	كمون الراحة	ج	كمون العمل	ب	حد عتبة التتبّه	١

١٢

مجموعة من التبدلات في الكمون بشكل موجة مؤنقة وحيدة الطور	٧
كمون الغشاء	د

١٣

إن منبهها في عتبة الدنيا يسبب أقصى استجابة يستطيعها الليف الواحد، ولا تزداد شدة الاستجابة بزيادة شدة المتبّه فوق تلك العتبة	٨
كمون الغشاء	د

١٤

إحداث الاضطراب المفاجئ والموقت لكون الراحة استجابة للمتبّهات	٩
كمون الغشاء	د

١٥

أحد الخيارات التالية يكون فيها قيمة كمون الغشاء متغيرة:	١٠
جميع ما سبق نسخ	د

١٦

الخلايا العضلية	ج	الخلايا العضلية	ب	الخلايا العضلية	١
قنوات بروتينية توجد في غشاء الليف، تكون مفتوحة باستمرار، وتتحدد حركة الشوارد عبرها حسب معال (ندرج) التراكيز					
جميع ما سبق صح	د	قنوات التبويب الكيميائية	ج	قنوات التبويب الكيميائية	١

١٧

أحد الخيارات التالية ليس لها دور في تغيير كمون العمل بل لحفظ على تركيز الشوارد على جانبي الغشاء	١٢
المدرس: أحمد حيدر الشيخ	١

١				مضخة الصوديوم و البوتاسيوم		
١٣				قنوات بروتينية توجد في غشاء الليف، تفتح وتغلق حسب فرق الكمون على جانبي الغشاء		
١				قنوات التبويب الفولطية	ب	

ـ الدرس السادس

١				يؤدي ارتباط الناقل الكيميائي الغلوتامات بمستقبلاته في الغشاء بعد المشبكى		
١				خروج شوارد الصوديوم	ب	
٢				دخول شوارد الكلور	ج	
٣				قنوات تفتح وتغلق نتيجة تبدل في كمون (استقطاب) الغشاء		
٤				التبويب البروتينية	ب	
٥				هي منطقة غشائية متخصصة من المحوار يتم فيها إطلاق كمونات العمل، ويعود ذلك لاحتواها على كثافة عالية من قنوات التبويب الفولطية		
٦				المشابك	ب	
٧				تردد سرعة المسالك العصبية بوجود:		
٨				غدد التباين	ب	
٩				وبزيادة قطر الليف العصبي	ج	
١٠				هي قنوات بروتينية توجد في الغشاء بعد المشبكى، ترتبط معها مستقبلات نوعية للناقل الكيميائى العصبية التي تحكم بمرور الشوارد المختلفة عبرها		
١١				قنوات التبويب البروتينية	ب	
١٢				ناقل عصبي كيميائى يفرز من المادة السوداء لجذع الدماغ، وبكميات قليلة من لب الكظر، له تأثير مثبط، ومنشط في الحالات النفسية والعصبية		
١٣				المادة P	ب	
١٤				الغلوتامات	ج	
١٥				الدوبارمين	د	
١٦				الاستيل كولين		
١٧				ناقل عصبي كيميائى يفرز من المسالك الحسية والقشرة المخية، وله تأثير منهه غالبا		
١٨				الاستيل كولين	د	
١٩				الدوبارمين	ج	
٢٠				الغلوتامات	ب	
٢١				المادة D	ج	
٢٢				الاستيل كولين	د	
٢٣				المادة D	ب	
٢٤				الغلوتامات	ج	
٢٥				الدوبارمين	د	
٢٦				الاستيل كولين		

ـ الدرس السابع والثامن

١				بني عصبية حركية، تعمل بالتعاون مع القشرة المخية المحرزة والمrix للتحم بالحركات المعقّدة، تقع في مستوى الدماغ البني إلى الجانب الوحشي لكل مهداد، وفي عمق المادة البيضاء		
٢				شبكة منتشرة من العصبونات الموجودة في الدماغ المتوسط والحدبة الحلقية		
٣				الدوبارmine	ب	

التشكل الشبكي	د	النوى القاعدية	ج	الوطاء	ب	المهاد	١
باحة تتلقى السيالات من الباحات الحسية والحركية والترابطية الأخرى ومن المهاد، وتجمع المعلومات وتقوم باتخاذ القرار المناسب لإنجاز مجموعة من الحركات المتالية الهدافة							٢
الباحة البصرية	د	الترابطية الجدارية الففوية الصدغية	ج	الترابط الحافبة	ب	الترابط أمام الجبهية	٣
باحة تتلقى السيالات العصبية من جميع الباحات الحسية وتقوم بتحليلها وإدراكتها، وترسل سيالات عصبية نحو الباحات المحركة إذا كان الأمر يتطلب إنجازاً حركياً							٤
باحة بروكا	د	باحة فيرنرية	ج	الترابط الحافبة	ب	الترابط أمام الجبهية	٥
أحد الخيارات التالية لا تبع من مستقبلات الحس الخارجي:							٦
الاهتزاز	د	الآم	ج	الحرارة	ب	اللمس	٧
أحد الخيارات التالية لا تبع من مستقبلات الحس الداخلي:							٨
الآم	د	الحس الباطني	ج	الحس العميق	ب	حس الاهتزاز	٩
يقع جسم العصبون الثاني في مسار حس اللمس الدقيق :							١٠
المهاد	د	الحديبة الحلقية	ج	المصلحة السيسائية	ب	التخاع الشوكي	١١
تصدر القشرة المخية الأوامر الحركية بعد مرحلة نشاط مخي يحدث في:							١٢
المصلحة السيسائية	د	الباحثات المحركة	ج	الباحثات الترابطية	ب	الباحثات الحسية	١٣
تغير سعة الجهاز العصبي كاستجابة لنشاط تلك العصبونات؛ أي تقوى الارتباطات بين العصبونات أو تضعف حسب درجة النشاط بينها:							١٤
فتحات التبويب الفولطية	د	كمون الراحة	ج	المقوية العصبية	ب	العروق العصبية	١٥
تسجل الانطباعات التي تستقبلها الحواس، وتستمر أجزاء من الثانية، كما هو الحال عند النظر لجسم ما							١٦
كمون الغشاء	د	الذاكرة الحسية	ج	الذاكرة طويلة الأمد	ب	الذاكرة قصيرة الأمد	١٧
إحدى هذه العصبونات ليست من المسلك الحسي اللعمي الدقيق الصاعد							١٨
عصبون جسمه يقع في المصلحة السيسائية	د	عصبون جسمه يقع في المصلحة الرمادية للتخاع الشوكي	ج	عصبون جسمه يقع في المهاد	ب	عصبون جسمه يقع في العقدة الشوكية	١٩
جزء متطاول من مادة سنجدابية نهايته الأمامية متضخمة، ويمتد في أرضية البطنين الجانبيين لكل من نصفي الكثرة مخية							٢٠
السبيل القشرى النخاعي	د	تلفيف الحصين	ج	الذاكرة	ب	المهاد	٢١

الدرس العاشر والحادي عشر

١	هي مجموعة العصبونات التي تشكل مسار السialle العصبية في أثناء حدوث الفعل المنعكس	
٢	هو تقديم منبه ثانوي محاب (الجرس). مع منبه أولي طبيعي (اللحم) مرات عدّة، يصبح المنبه الثانوي وحده قادرًا على إثارة السلوك والاستجابة التي يشير لها المنبه الأولي عادة	
٣	الفعل المنعكس	الفعل المداعب المشرطي
٤	ال فعل المداعب المشرطي	ال فعل المداعب المشرطي

مراجعة مكثفة (العلوم البدنية) المدرس: أحمد حيدر الشيخ

٣	مرض يصيب المتقدمين بالعمر نتيجة تلف الخلايا العصبية في المادة السوداء مع التقدم بالعمر					
٤	الزهايمر	د	صرع	ج	الشلل الرعاشي	ب
٥	مرض يصيب بعض المتقدمين في العمر نحو من السنتين غالباً ويعاني المريض في ذكر الأحداث القريبة:					
٦	بـ+ج	د	التصلب اللويحي	ج	الزهايمر (الخرف العيالي)	ب
٧	توسيع فرع أو أكثر من الشريان المبكي يؤدي إلى تنبية الذهابات العصبية في هذا الشريان					
٨	أـ+ج	د	باركنسون	ج	الزهايمر	ب
٩	أحد الأمراض التالية بعد مرضاً مناعياً ذاتياً ينتج من خسارة خلايا الدميق قبلة الإستطلاع:					
١٠	بـ+ج	د	الشلل الرعاشي	ج	باركنسون	ب
١١	اختلال ناجم عن اضطرابات عصبية وفعالية مفرطة بشكل نوبات خارجة عن التحكم من النشاط الكهربائي الدماغي المنشوش					
١٢	باركنسون	د	الشقيقة	ج	الزهايمر	ب

نانياً (الوظائف والمواقع وأسلحة الرتب وسؤال ماذا ينتج برد منها ثلاثة أسئلة مع الرسمة (مسعيات أو أرسم) جميعها على درجة ٣٨ درجة ((سؤال حساس يحتاج التدقيق، يشكل حمل))

((الوظائف + المواقع)) مع الانتباه إن لم ترد ضمن هذا السؤال قد ترد سؤالاً اختياراً أو فارقاً

الدرس الأول والثانية

اسم البنية	الموقع	الوظيفة
✓ الخلايا العصبية الأولية عند البدنية	قاعدة كل من الطبقتين الخارجية و الداخلية على جانبي الهمامة المتوسطة لجدار جسم البدنية	توصيل السيالة العصبية بكافة الاتجاهات
✓ العرف العصبي	فوق الأنابيب العصبية	تشكل خلايا العقد العصبية
✓ السائل الدماغي الشوكي الخارجي	الحيز تحت العنقيوني	يشكل وسادة مائية تحيط بالدماغ و الشاع الشوكي وتحميء من الصدمات ويمنع انضغاط المراكز العصبية
✓ السائل الدماغي الشوكي الداخلي	قناة السيساء وبطينات الدماغ	يشكل وسادة مائية تحيط بالدماغ و الشاع الشوكي وتحميء من الصدمات ويمنع انضغاط المراكز العصبية
✓ الحاجز الدماغي الشمسي		يمنع وصول المواد الخطرة التي قد تأتى مع الدم إلى الدماغ وينظم البيئة الداخلية لخلايا الدماغ
✓ الحيز تحت العنقيوني	بين الغشاء العنقيوني و غشاء الام الحنون	
✓ الجسم التلفي	قاع الشق الامامي الخلفي للمخ	يصل بين نصف الكرة المخية
✓ مثلث المخ	تحت (قاع الشق الامامي الخلفي للمخ) الجسم التلفي	يصل بين نصف الكرة المخية
✓ الغدة الصنوبرية	أمام الحديبات التوعيمية الأربع في الدماغ	تفرز هرمون الميلاتونين الذي يقوم بتنشيط البشرة
✓ البصلة السيسائية	بين الحدية الحلقية (بالأعلى) و الشاع الشوكي (بالأسفل)	(مادتها الرمادية) مركز عصبي لتنظيم الفعالities الذاتية مثل حركة القلب و الضغط الشمسي و التنفس و البلع افراز اللعاب المعل
✓ الحدية الحلقية	أمام البصلة السيسائية	(مادتها البيضاء) طريق لنقل السيالة العصبية الحسية الصادرة والمحركة الصدرة عن الدماغ

ت تكون من مادة بيضاء تشكل طريقة للسائلات المحركة الصادرة عن الدماغ مركز تنظيم المنعكسات السمعية والبصرية	إلى الإمام من الحدبة الحلقية في الدماغ المتوسط بين المهادين في كل نصف كرة مخية	✓ السويقitan المخيتان ✓ الحدبات التوأميه الأربع ✓ البطين الثالث ✓ بطين جانبي
١- له دور في تنظيم حرارة الجسم، وفعالية الجهاز الهضمي ويحوي مراكز الشعور بالعطش والجوع والخوف ٢- يتحكم بالنخامة الأمامية ٤- ويتحكم بالجهاز العصبي الذائي له دور أساسى في تنظيم الفعالities القشرية الحسية، وذلك بتحديد وتسهيل وتنظيم السائلات العصبية الصادعة إليها	مكان تباعد السويقitan المخيتان أو يشكل أرضية البطين الثالث أو مكان ارتباط الغدة النخامية بالدماغ على جانبي البطين الثالث	✓ الوطاء ✓ المهادان ✓ تصالب العصبين البصريين ✓ الفص الشعري
١- مرحلة لمرور الحزم المحركة النازلة من القشرة المخية إلى المراكز العصبية في الدماغ المتوسط (آخر) ٢- وهما ضروريان لحفظ توازن الجسم، والحركات التلقائية (السير / الكلام / الكتابة)	في قاعدة كل بطين جانبي لنصف الكرة المخية	✓ الجسمان المخططان
بين المخ وجذع الدماغ	صلة وصل بين نصف الكرة المخية وبين جذع الدماغ .	✓ الدماغ البيني (المهادي)
يصلان بين البطين الثالث والبطينين الجانبيين	بين البطين الثالث والبطينين الجانبيين	✓ فرجتا مومنرو
تصل البطين الثالث مع البطين الرابع		✓ قناة سيلفيوس
يتصل بها البطين الرابع من الأسفل	مركز المادة الرمادية للنخاع الشوكي	✓ قناة السياساء
ينفتح بها البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتى ليمر منها السائل الدماغي الشوكي	ينفتح بها البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتى	✓ ثقب ماجندي وثقبا لوشكا
تعمل بالتعاون مع القشرة المخية المحركة والمخيخ للتحكم بالحركات المعقّدة	تقع في مستوى الدماغ البيني وإلى الوحشى لكل مهاد، وفي عمق المادة البيضاء	✓ النوى القاعدية
ضبط الفعالities العضلية السريعة انعكاسياً	خلف البصلة السيسانية و الحدبة الحلقية	✓ المخيخ
تعمل على تكامل المعلومات وتحدد فعالية عضلية تؤدي إلى حركة دقيقة مما يؤمن توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون.	في القشرة المخيخية	✓ خلايا بوركنج
١- يشكل مركزاً عصبياً انعكاسياً بعده الرمادية لمنعكسات التعرق والمشي اللاشعورى والأختام ٢- وطريقاً لنقل السائلة العصبية الحسية الصادعة والحركية الصادرة عن الدماغ بعده البيضاء	يتدنى داخل القناة الفقرية حتى مستوى الفقرة القطنية الثانية	✓ النخاع الشوكي
يثبت النهاية السفلية للنخاع الشوكي بنهاية القناة الفقرية	المادة الرمادية للنخاع الشوكي	✓ المركز العصبي للمنعكس الداعشي/الأختامي
	نهاية القناة الفقرية	✓ الخطيب الانتهائي
		الدرس الثاني

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
تنبه وتتفق التنبيه		✓ الخلايا العصبية (العصبونات)
لها دور في دعم العصباونات وحمايتها		✓ الخلايا الدقيقة
لها دور رئيس في الاستقلاب والتغذية		✓ جسم الخلية
لها دور بتركيب بروتينات الخلية	في جسم الخلية والاستطلاطات الهيولية وتعد في المحوار	✓ جسيمات نيسيل
تختزن فيها النواقل الكيميائية العصبية	في جميع أقسام العصبون تتوسع بشكل متواز في المحوار	✓ الليفونات العصبية
	التفرعات النهائيه للمحوار	✓ الأذدار

عصبونات أحادية القطب	عقد الشوكية	حسية
عصبونات ثنائية القطب	شبكة العين- البطانة الشمية	
عصبونات متعددة القطبية (نجمية)	في القرون الأمامية للنخاع الشوكي	حركية (توصيل المساللة المحركة عبر محاورها إلى العضلات المستجيبة)
عصبونات متعددة القطبية (هرمية)	قشرة المخ و خلايا بوركنج بالقشرة المخيخية	حركية
عصبونات حسية	عقد الشوكية	
عصبونات حركية	في القرون الأمامية للنخاع الشوكي - قشرة المخ	
عصبونات موصولة (бинية)	في المراكز العصبية	
غمد النخاعين	يحيط بالالياف العصبية ومعظم الاعصاب	يعزل الالياف العصبية كهربائيا، ويزيد من سرعة المساللة العصبية
اختناق رانفيه	انقطاعات على مسافات متساوية بالليف العصبي المغمدة بالنخاعين	
غمد شوان	يحيط بغمد النخاعين بالالياف العصبية المغمدة بالنخاعين و شوان و يحيط بالليف العصبي مباشرة بالالياف العصبية المجردة من النخاعين	له دور في مساعدة الالياف العصبية المحاطية على التجدد بعد انقطاعها
الالياف العصبية المغمدة بالنخاعين فقط	المادة البيضاء والعصب البصري	
الالياف العصبية المغمدة بالنخاعين شوان	معظم الاعصاب مثل العصب الوركي	
الالياف العصبية العارية	المادة الرمادية (المراكز العصبية)	
الالياف العصبية المجردة من النخاعين	في العصب الشمي	
خلايا شوان	في الجهاز العصبي المحاطي	تشكل غمد النخاعين حول بعض الالياف العصبية وتساهم في تجددها بعد تعرضاً للأذى
الخلايا التابعة (السائلة)	في الجهاز العصبي المحاطي	تحيط بأجسام العصوبونات في العقد العصبية الكبيرة وتقوم بدعم العصوبونات وتغذيتها
خلايا الدبق الصغيرة	في الجهاز العصبي المركزي	تقوم ببلعمة العصوبونات التالفة والخلايا الغريبة
خلايا الدبق قليلة الاستطالات	في الجهاز العصبي المركزي	تشكل غمد النخاعين حول محاور الخلايا العصبية بالمادة البيضاء
الخلايا الدبقية النجمية	في الجهاز العصبي المركزي	تسهم بتشكيل الحاجز الدماغي الدموي تعمل على تنظيم التوازن الشاردي حول العصوبونات وتقوم بتغذيتها
خلايا البطانة العصبية	في الجهاز العصبي المركزي	تعمل على إعادة امتصاص النوائل العصبية تبطئ قناة السيساء وبطينات الدماغ وتغطي سطوح الضفائر المشيمية وتفرز السائل الدماغي الشوكي

✓ الضفيرة المشيمية

الدرس الثالث

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
تعمل كمحطة استقبال وإرسال للدفقات العصبية.	تنشأ من العرف العصبي على الأعصاب القحفية على الجذر الخلفي الحسي للعصب الشوكي.	✓ العقد العصبية ✓ عقد قحفية (دماغية) ✓ عقد شوكية
تتر في السيالات العصبية الحسية القادمة من المستقبلات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي.	على العصب الشوكي	✓ الجذر الخلفي الحسي
تتر فيه محاوير الخلايا العصبية المحركة التي تنقل السيالات المحركة من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات والغدد	على العصب الشوكي	✓ الجذر الأمامي المحرك
يعتبر الجسم لمواجهة الخطر وتهيئته للانشطة الفورية	في القرون الجانبية للنخاع الشوكي في المنطقتين الظهرية والقطنية للنخاع الشوكي وفي الوطاء	✓ المراكز العصبية الودية
	في جذع الدماغ والمنطقة العجزية للنخاع الشوكي وفي الوطاء	✓ المراكز العصبية نظيرة الودية
	سلسلتان على جانبي العمود الفقري. - لب الكظر	✓ العقد العصبية الودية
يعمل على إعادة الجسم إلى حالة الراحة والهدوء	قرب الأحشاء أو في جدارها.	✓ العقد العصبية نظيرة الودية ✓ القسم الودي
		✓ القسم نظير الودي

الدرس الرابع

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
ابراز دور الزمن في مفهوم قابلية التبهـة، كما تسمح قيمته بمقارنة سرعة قابلية التبهـة		✓ الكروناكسي

الدرس الخامس+السادس

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
تحدد حركة الشوارد عبرها حسب مثال (ترجم) التراكيز (الانتشار).	في غشاء الليف	✓ فنواف التسرّب البروتينية
الحافظ على تركيز الشوارد على جانبي الغشاء	على جانبي غشاء الليف	✓ مضخة الصوديوم و البوتاسيوم
فتح وتفتح حسب فرق المكون على جانبي الغشاء	في غشاء الليف	✓ فنواف التبويب الكمونية (الفولطية)
يتم فيها اطلاق كائنات العمل	منطقة غشائية متخصصة من المحوار	✓ القطعة الأولى من المحوار
تسمح بانتقال كائنات العمل من اشتاق رائفيه لآخر	في اختلافات رائفيه	✓ فنواف التبويب الكمونية (الفولطية) في ليف مغدد بالخلايا
تحكم بمرور الشوارد المختلفة عبرها يودي ارتفاع تركيز $[K^+]$ إلى اندماج الحويصلات المثبتة مع الغشاء قبل المثبتى وتحرير الناقل الكيميائي في الفالق المثبتى	بين نهاية محوار (الزر النهائي) لعصيبون أول، واستطالة هيلوليه، أو جسم أو محوار لعصيبون ثان.	✓ المشابك الكيميائية
	بين الألياف العضلية للعضو الواحد، كالعضلة القلبية و عضلات الأحشاء	✓ المشابك الكهربائية
تحكم بمرور الشوارد المختلفة عبرها يودي ارتفاع تركيز $[K^+]$ إلى اندماج الحويصلات المثبتة مع الغشاء قبل المثبتى وتحرير الناقل الكيميائي في الفالق المثبتى	في الغشاء بعد المثبتى	✓ فنواف التبويب الكيميائية
	في الغشاء قبل المثبتى	✓ فنواف التبويب الفولطية لشوارد الكالسيوم

نطلق كمون عمل في الفضاء بعد المشبكى.	من نهايات قبل مشبكه عدة، أو من نهاية قبل مشبكه واحدة يفرز من الجهاز العصبي	تجميع (تراكم) الكمونات بعد مشبكه
له تأثير منه في العضلات الهيكالية، ويبطئ حركة عضلة القلب، وله دور مهم في الذاكرة	يفرز من المادة السوداء لجذع الدماغ، وبكميات قليلة من لب الكظر،	الاستيل كولين
له تأثير منبط، ومنشط في الحالات النفسية والعصبية، يزداد تأثيره بوجود التيكوتين والمادة المخدرة كالكوكائين له تأثير منه غالبا	يفرز من المسالك الحسية والقشرة المخية،	الدوابمين
لها تأثير منه وناقل للألم	تفرز من مسالك حس الألم في النخاع الشوكي	الغلوتامات
مستخدم في عمليات التجميس لازالة تجاعيد الوجه يودي إلى تثبيط تأثير الاستيل كولين، من ثم ارتخاء العضلات تثبيط تأثير المادة (M) وبالتالي منع وصول المسالات الألعنة إلى الدماغ	سم بروتونى مستخرج من بعض الجراثيم	المادة M
	تفرز من الدماغ	البوتوكس
		الإنكفيالينات - الاندروفينات

الدرس السابع

اسم البنية	الموقع	الوظيفة	ماذا ينتج عن تخريبها
الباحة الحسية الجسمية الأولية	في الفص الجداري خلف شق رولاندو	تستقبل المسالات الحسية الجسمية الأولية المسالات العصبية من قطاع جسمى محدد، من الجانب المعاكس من الجسم	يودي بالاستيل توسيع تباحثات الحسية الجسمية الاولية في نصف الكرة المخية في الخد
الباحة الحسية الجسمية الثانية	خلف الباحة الحسية الجسمية الاولية	الادراك الحسوى	العمه <u>الحسى</u>
الباحة الحسية البصرية الأولية	في الفصين القفريين	الاحساس البصري ((او تصل إليها الاياف البصرية القادمة من الشبكين بعد أن تتصادب ألياف العصب البصري أمام الوظاء تصالباً جزئيا))	يودي التحبيب تالى الجانب الى فقدان الرؤوية
الباحة الحسية البصرية الثانية	في المقصين القفريين	الادراك البصري	العمه <u>البصرى</u> (يودي لكنه عاجز عن تفسير الصور التي يراها)
الباحة الحسية السمعية الأولية	المقصين الصدغرين	الاحساس السمعى، ((او تصل إلى ألياف العصبية السمعية إلى الباھتين السمعيين الأوليين بعد أن يتصالب العصب المؤقسى جزئيا في جذع الدماغ))	فقدان السمع
الباحة الحسية السمعية الثانية	المقصين الصدغرين	إدراك الأصوات المسموعة (الإدراك السمعى)	العمه <u>السمعى</u>
الباحة المحركة الأولية	أمام شق رولاندو <u>مهاترة بالملص</u> الجبهى	تعصيب عضلات الجانب المقابل (المعاكس) من الجسم	خسارة كبيرة في الفعاليات الحركية للجسم
الباحة المحركة الثانية	أمام الباحة المحركة الأولية	تنسيق النقلصات العضلية و توجيهها نحو حركة هدفة	

نعمل هذه البداية على دراسة معنى كلمات بعض الكلمات المذكورة من لبحثنا لصلة <u>الثانية</u> المذكورة	تشرى ماطل جمع لقصص ثلاثة (الجدارى والفنقى والمندشى) عا ئى التي تتقىها البادى لصلة	ـ باحة انتراطية الجدارية الفنوية الصدغية
عند دراسة معنى الكلمات المذكورة والتالي عن <u>الصلة</u>	سوونة عن <u>الصلة</u> لفظ في الناحية الوحدة تصف الكرة المفهبة المجرى وسط باحة انتراط الجدارية الفنوية الصدغية	ـ باحة فريكة
<u>الصلة</u> تشير <u>الوجه</u> أو دراسة معنى المروبة والفن و الدرد والبريشة.	تنابل باحة فريكة بصف الكرة الصلة البنى	ـ باحة الفراسة
مركز الحكم بالتفعيلات الاختلاف والقيمة الاصنافية	تفع اسم البادى لحربي في تصفى الكرة المفهبة	ـ باحة انتراط امام الجبهة
تحى <u>الصلة</u> (العجز عن <u>الصلة</u> كلمات و تقطب).	ضمن باحة انتراط امام الجبهة تفرق الذكر من باحة فريكة وتفود بتحولها من كلمات	ـ باحة بروكه
ـ علاقه بنوى الشخص والمقداره ودوره نحو عنده النظر	في الناحية <u>صلة</u> تفصل <u>الجهتين</u> وألى الأمام من <u>العنى</u> الصدغين	ـ باحة انتراط الحافية
ـ يختلف عن شفاط الشفاغ في منظمه معينة من خلل التغيرات في تركيز الأوكجين في تلك المنظمه		ـ التصوير الرئيفي المقاططيسي الموثقفي
	التوزة	ـ مراكز الشعور بالحزن
	التوزة المذكورة من التزو المذكورة	ـ مراكز الشعور بالفرح
ثبات الدم	بعتقد بان له دورا في الترموم و البيضة	ـ التشكيل الشبكي
	في الدماغ المتوسط والحبة الحلقية	
	في التشكيل الشبكي وفي العهد	ـ مراكز الشعور بالألم
	تحديد مكان الالم و صفة	ـ نقشرة المفهبة (الباديات الحسية الجسمية)

الدروس الثامنة والتاسعة والحادي عشر

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
	في النخاع الشوكي	ـ تصاب مسك <u>العنى</u> الخشن والآلم والحرارة
	في البصلة السيسائية	ـ تصاب مسك <u>العنى</u> التدقق والأهتزاز والحس العميق
	في البصلة السيسائية	ـ جسم العصبون المذكي في مسك حس العنى التدقق والأهتزاز والحس العميق
	في النخاع الشوكي	ـ جسم العصبون المذكي في مسك حس العنى الخشن والآلم والحرارة
	عند المشابك	ـ ملثثة الذاكريتين

ـ تأليف الحصين	ويعد الحصين ضرورياً للتخلص من الذكريات الجديدة الطويلة الأمد لكن ليس للاحتفاظ بها	ويتمد في أرضية البطن الجنبي لكل من نصفي الكرة مخية
ـ السبيل الفشري النخاعي	انتاء نزوله يشكل السويقتين المخيتين في الدماغ المتوسط، ثم يشكل الأهرامات في البصلة السيسانية	يصدر عن العصبونات الهرمية في قشرة المخ
ـ تأثير الدوبامين على الجسمين المخططين	مثبط لعصبونات الجسمين المخططين	
ـ المادة السوداء	تفرز الدوبامين الذي ينتقل عبر محاورها إلى الجسم المخطط	تقع في الدماغ المتوسط
ـ محاور عصبونات المادة السوداء	تنقل الدوبامين إلى الجسم المخطط	
ـ العصبون البيني بالمنعكس الداخلي	تشبيط انتقال السيالة العصبية عن طريق تشكيل IPSP في العصبون الحركي	

ما ذا ستح عن كل مما يحيى

١. تلف بعض الليفبات العصبية عند البراميسيوم؟ تتوقف حركة الأهداب المتعلقة بها
٢. اللمس المفاجئ للوامس الهيدرية؟ تتكثف هيدرية الماء بأكملها
٣. عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ أو (موت خلايا الدماغ بعد بضع دقائق من عدم وصول الأكسجين)؟ السكتة الدماغية
٤. ثخانة في الوريقه الجينيّة الخارجيه على طول الوجه الظاهري الأوسط للجنبين؟ تشكيل اللويحة العصبية
٥. تشكيل طبستان جانبين مفصليتان عن بعضهما في اللويحة العصبية؟ تشكيل العيزابه العصبية
٦. بروز والتحام الطبستان الجانبيان في وسط العيزابه العصبية؟ تشكيل الأنوب العصبي
٧. انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقه الجينيّة الخارجيه وتوضعها فوق الأنوب العصبي؟ تشكيل العرف العصبي
٨. انسداد في إحدى القنوات التي تصل بين بطينات الدماغ أو فرط إنتاج السائل الدماغي الشوكي بمعدل أسرع مما يمكن امتصاصه؟ الاستسقاء الدماغي
٩. استدفاف النخاع الشوكي بنهائته السفلية؟ تشكيل المخروط النخاعي
١٠. مجموعة من الأعصاب بعد الفقرة القطنية الثانية حتى نهاية القناة الفقرية؟ تشكيل ذيل الفرس
١١. تجمع الأبواق الوعائية والأوعية الدموية المرتبطة بها؟ تشكيل الحاجز الدماغي الدموي
١٢. تجمع حزم الألياف العصبية مع بعضها البعض؟ تشكيل العصب
١٣. تجمع أجسام عصبونات وخلايا دبقية مع بعضها البعض؟ تشكيل عقد عصبية
١٤. إحداث الاضطراب المفاجئ والموقت لكمون الراحة استجابة للمنبهات؟ تشكيل كمون عمل.
١٥. وصول كمون العمل للغشاء قبل المشبك؟ إزالة الاستقطاب بالغشاء قبل المشبك
١٦. ارتفاع تركيز C_{Na^+} في الغشاء قبل المشبك؟ اندماج الحويصلات المشبكية مع الغشاء قبل المشبك وتحرير الناقل الكيميائي في الفالق المشبكى
١٧. ارتباط الناقل الكيميائي بمستقبلات نوعية موجودة على أقنية التبويض الكيميائية في الغشاء بعد المشبك؟ تفتح قنوات التبويض الكيميائية لمرور الشوارد المختلفة عبرها وتوليد كمونات بعد مشبكية بعضها تتباهى وبعضها تتشبّط
١٨. إرسال مستقبلات حس الألم السيلات الألمانية إلى النخاع الشوكي؟ يتم تحرير المادة (P) في مسالك حس الألم لتصل إلى الدماغ، فندرك حس الألم.
١٩. مرحلة نشاط مخي يحدث في الباحات الترابطية؟ تصدر القرحة المخية الأوامر الحركية
٢٠. تخريب الحصين؟ لا يستطيع الشخص تشكيل نكريات جديدة دائمة، ويذكر الأحداث التي جرت قبل اصابةه
٢١. موت العصبونات بالمادة السوداء لجذع الدماغ؟ الاصابة داء باركنسون
٢٢. ترسب بروتين الأميلونيد حول عصبونات في القرحة المخية؟ الاصابة داء الزهايمر
٢٣. نوبات من النشاط الكهربائي الدماغي المشوش؟ الصرع
٢٤. توسيع فرع أو أكثر من الشريان السباتي وتتباهي النهايات العصبية بهذا الشريان؟ الشقيقة أو الصداع الوعائي
٢٥. خسارة خلايا الديق قليلة الاستطارات؟ التصلب اللويحي المتعدد

رتب مراحل تشكيل الجهاز العصبي؟ وما منشأه؟

ينشا الجهاز العصبي خلال الأسبوع الثالث من الحياة الجنينية (الحمل) من الوريقه الجنينية الخارجيه.

مراحل تشكيل الجهاز العصبي:

- ١) ترداد ثانية الوريقه الجنينية الخارجيه على طول الوجه الظاهري الأوسط للجنين، بشكل لوبيه عصبية.
- ٢) تتشكل في اللوبيه العصبية طيستان جانبيتان مفصولتان بمعيزابه عصبية.
- ٣) تبرز الطيستان وتلتسمان مع بعضهما وتحول المعيزابه إلى أنبوب عصبي.
- ٤) ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقه الجنينية الخارجيه في نهاية الأسبوع الرابع من الحمل.
- ٥) يتشكل العرف العصبي من انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقه الجنينية الخارجيه و توضعها فوق الأنبوب العصبي.

رتب التبدلات في استقطاب الغشاء بدءاً من لحظة الوصول إلى حد العتبة؟

١- حد العتبة ٢- إزالة الاستقطاب ٣- عودة الاستقطاب ؛ فرط الاستقطاب ٤- الراحة

رتب مراحل انتقال السائلة في الألياف المجردة من غمد النخاعين

- ١) يؤدي تشكيل كمون عمل في القطعة الأولية للمحوار إلى إزالة الاستقطاب فيها تدريجياً نتيجة تدفق شوارد الصوديوم نحو الداخل وتتصبح شحنة الداخلي موجبة مقارنة مع الشحنة السلبية للسطح الخارجي.
- ٢) فتشكل تيارات محلية (موضعية) قادته من المناطق المجاورة ١ نحو المنطقة العنبلية ٢ خارج الليف وبالعكس داخله مما يؤدي لإزالة تدريجية للاستقطاب في المنطقة المجاورة ٢ فينتقل كمون العمل نحو المنطقة المجاورة ٢ بينما تبدأ القطعة الأولية ١ بمرحلة إعادة الاستقطاب
- ٣) ثم تعود لمرحلة كمون الراحة بعد أن تمر بزمن استعصاء .
- ٤) وهذا تذكر العملية بالآلية ذاتها ليصل كمون العمل إلى نهاية المحوار (الأزرار) في النقل الوظيفي .

رتب مراحل النقل المشيكي بدءاً من وصول كمون العمل إلى الغشاء قبل المشيكي حتى مرور الشوارد النوعية عبر قوات التبويض الكيميائية

٤- ينتشر الناقل الكيميائي في منطقة الفالق المشيكي ليرتبط بمستقبل نو على قنوات التبويض الكيميائية الموجودة في الغشاء بعد المشيكي مما يؤدي لفتحها ومرور الشوارد النوعية عبرها

٣- يؤدي ارتفاع تركيز Ca^{2+} إلى اندماج الحويصلات المشيكي مع الغشاء قبل المشيكي وتحرير الناقل الكيميائي في الفالق المشيكي

٢- تسبب إزالة الاستقطاب إلى فتح قنوات التبويض الفولطية لشوارد الكالسيوم فتنفذ هذه الشوارد نحو الداخل

١- يؤدي وصول كمون العمل إلى النزول إلى إزالة الاستقطاب في الغشاء قبل المشيكي

أرتّب العصبونات التي تشكل المسالك الناقلة لحس الحرارة أو الألم أو اللمس الخشن؟

- ❖ عصبون جسمه في العقدة الشوكية
- ❖ عصبون جسمه في النخاع الشوكي
- ❖ عصبون جسمه في المهداد.....(تتصالب جميع هذه المسالك بالنخاع الشوكي)

أرتّب العصبونات التي تشكل المسالك الناقلة للحس العصيق أو الاهتزاز أو اللمس الدقيق؟

- ❖ عصبون جسمه في العقدة الشوكية
- ❖ عصبون جسمه في البصلة السيسانية
- ❖ عصبون جسمه في المهداد.....(تتصالب جميع هذه المسالك بالبصلة السيسانية)
- ❖ إلى أين ينتهي كل من المسالك السابقة؟ إلى الباحة الحسية الجسمية الأولى

ما الحال التي تعبّرها الألياف الحسية الصاعدة في النخاع الشوكي؟ الحالان الأمامي والجانبي والخلفيان

رتب عناصر القوس الانعكاسية وحيدة المشبك، والقوس الانعكاسية ثنائية المشابك وعديد المشابك

القوس الانعكاسية وحيدة المشبك: ١- مستقبل ٢- عصبون حسي ٣- عصبون محرك ٤- عضلة مستجيبة

القوس الانعكاسية ثنائية المشابك: ١- مستقبل ٢- عصبون حسي ٣- عصبون بيني واحد فقط ٤- عصبون محرك ٥- عضلة مستجيبة

القوس الانعكاسية عديدة المشابك: ١- مستقبل ٢- عصبون حسي ٣- أكثر من عصبون بيني ٤- عصبون محرك ٥- عضلة مستجيبة

رتب مراحل حدوث الملاعken الداغص يبدأ من النقر على وتر العضلة رباعية الرؤوس حتى اندفاع الساق للأمام

١- النقر على وتر العضلة رباعية الرؤوس.

٢- تلتفت المستقبلات الحسية في الرباعية الرؤوس التنبهات وترسلها عبر العصبون الحسي للنخاع الشوكي.

٣- يقوم العصبون الحركي بنقل الأوامر الحركية للعضلة الرباعية الرؤوس بعد معالجة المعلومات في النخاع الشوكي.

٤- يقوم العصبون البيني بتشبيط انتقال السيالة عن طريق تشكيل (IPSP) في العصبون الحركي.

٥- يتم تشبيط تلتف عضلة الأوتار المأباضية لتعاكس بعملها العضلة رباعية الرؤوس فتدفع الساق نحو الأمام.

أهمية طيبا : للتأكد من سلامه الأعصاب والنخاع الشوكي .

فم الملاعken الداغص وحيد المشبك (سريع) ؟ لأنه لا يحوي على عصبون بيني

رتب القوس الانعكاسية الغريزية لإفراز اللعاب الآتية:

١- نهايات حسية في اللسان ٢- عصبون حسي (جادب) ٣- مركز عصبي في البصلة السيسانية ٤- عصبون مفرز


٥- غدد لعابية وإفراز اللعاب.


رتب القوس الانعكاسية الشرطية لإفراز اللعاب بتجربة بافلوف على الكلب الآتية:

١- صوت الجرس ٢- الأنف ٣- القشرة المخية ٤- البصلة السيسانية ٥- الغدد اللعابية وإفراز اللعاب

الرسومات جميعها (٨ درجة) إن كانت مسميات أما التي تتدريب عليها ارسم من قسم الحصص

هي ارسم مقطوع عرضي بالنخاع الشوكي أو ارسم الخلية العصبية





ثالثاً: اعط تفسيراً علمياً لكل مما يلى (يرجى التدقيق على سفال النفايس ٥٠ درجة ويتطلب الدقة)

الدرس الأول والثاني، الثالث

- ✓ تكاثر هيدرية الماء العنب بأكملها عند لمسها؟ بسبب وجود شبكة من الخلايا العصبية الأولية التي توصل السبلات العصبية بكافة الاتجاهات.
- ✓ بعد الجهاز العصبي عند دودة الأرض أكثر تطوراً من الجهاز العصبي لدى هيدرية الماء العنب؟ لأن دودة الأرض تمتلك جهاز عصب معقد نسبياً من حبل عصبي بطني واتصال وعقد امامي في الهيدرية تجد أنه مكون من شبكة خلايا عصبية أولية على جانبي شهادة المتوسطة.
- ✓ تكيف الحشرات مع بيئات مختلفة؟ لأنها تمتلك جهازاً عصبياً مركزياً موزعاً نسبياً يتكون من حبل عصبي بطني وعقد عصبية وأعصاب وجهاز عصب حشوي.
- ✓ انجداب دودة الأرض نحو الغذاء والرطوبة. يعود ذلك لنوع نسيب في جهازها العصبي الذي يتكون من حبل عصبي بطني وعقد واتصال.
- ✓ موت خلايا الدماغ عند الإصابة بالسكتة الدماغية؟ نتيجة عدم وصول الدم المحمل بالأنسجين إلى الدماغ
- ✓ أهمية السائل الدماغي الشوكي؟ لأنه يشكل وسادة مائية تحبط التهاب الدماغ والتهاب الشوك وتحميه من الصدمات ويمنع الضغط على المراكز العصبية
- ✓ اتساع مسطح القشرة الرمادية (السنجلارية) للمخ؟ لوجود عدد كبير من التلاقيف على سطحها
- ✓ نسمة نفس المتوسط بتنفس بطيء بالشدة؟ لوجود أنلام عرضية عليه

إصابة بعض الأطفال بالاستسقاء الدماغي؟ بسبب تراكم السائل الدماغي الشوكي في بطينات الدماغ فيزداد حجمها وتضغط على الدماغ تبدو المادة البيضاء مقسمة إلى قسمين متاظرين بالنخاع الشوكي؟ بسبب وجود التمرين الأمامي والخلفي تعمل خلايا بوركنج على تكامل المعلومات الواردة إليها من الباحثات المحركة بعد مقارنتها مع السيرارات العصبية الحسية؟ لتعمل على تكامل المعلومات وتحدث فعالية عضلية تؤدي إلى حركة دقيقة مما يؤمن توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون.

يجري البزل القطبي عادة بين الفترات القطنية الثالثة والرابعة؟ لأن النخاع الشوكي يمتد حتى مستوى الفقرة القطنية الثانية وبالتالي لا تتم أذيته عند سحب السائل الدماغي الشوكي

عدد الخلايا العصبية عند الإنسان في تناقص مستمر؟ لعدم احتوانها على جسم مرکزي وبالتالي لا تستطيع أن تنقسم وانثالف منها لا يعرض

بعد النقل مساقطباً في الخلية العصبية؟ لأنه ينقل السائلة العصبية باتجاه واحد من الاستطالات الهيولية عبر جسم الخلية ثم المحوار ثم التفرعات الانتهائية بعيداً عن جسم الخلية

الاستطالات الهيولية كثيرة العدد؟ لتحقيق أكبر عدد من إمكانية الالتقاء بالعصبونات الأخرى

بعد غمد شوان بمنابعه خلايا؟ لأنه يحوي نوى عديدة نواة بكل قطعة بين حلقة

لا يحيط غمد النخاعين بكامل الليف العصبي. لأنه يتقطع على مسافات متساوية مشكلًا اختلافات رانفيه والتي تسمح بانتقال السائلة العصبية على طول الليف العصبي

درس الثالث

الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي وطويلة في القسم نظير الودي؟ الألياف قبل العقدة قصيرة بالقسم الودي لأن العقد الودية سلسلتان تقعان على جانبي العمود الفقري وطويلة بالقسم نظير الودي لأن العقد نظير الودية تقع قرب الأحساء في جدرانها

يعالج الأطباء المرضى في أثناء نوبة الربو النورادرينالين؟ من أجل توسيع الطرق الهوائية التنفسية

درس الرابع

تعد المنبهات الكهربائية أفضل أنواع المنبهات وأكثرها استخداماً في التجارب المخبرية؟ لإمكانية التحكم بزمن وشدة التيار وسرعة الاستخدام واقتها ضرراً على الخلية.

لعناصر القوس الانعكاسية النخاعية الكروناكسي نفسه؟ لأن لها وظيفة واحدة متكاملة

لامسة جسم ساخن بسرعة لا تجعلنا نشعر بسخونته؟ لأن زمن التبيه أقل من زمن الاستفادة

درس الخامس

ينطبق مبدأ الكل أو اللا شيء على الليف ولا ينطبق على العصب؟ كون الاستجابة تعتمد على الطاقة المختبرنة في الليف لا على طاقة المنبه وفي العصب تزداد شدة الاستجابة بزيادة عدد الألياف العصبية المنبهة

نفونية الغشاء لشوارد البوتاسيوم تفوق نفوذية لشوارد الصوديوم في أثناء الراحة. لأن عدد أقنية التسرُّب البروتينية لشوارد البوتاسيوم أكثر من عدد القنوات الخاصة بشوارد الصوديوم

لا تستجيب الخلية العصبية للمنبهات في زمن الاستعصاء المطلق وتستجيب للمنبهات القوية في زمن الاستعصاء النسبي؟ في زمن الاستعصاء المطلق عدم فتح بوابات أقنية الصوديوم من جديد إلا بعد العودة إلى كمون الراحة

أما في زمن الاستعصاء النسبي، بقاء قنوات الصوديوم مغلقة وفرط الاستقطاب الناتج عن تدفق شوارد البوتاسيوم إلى خارج الخلية بكميات كبيرة مما يجعل تبيه الليف العصبي يحتاج لمنبه قوي

يبقى العصبون في حالة راحة رغم وصول عدة منبهات إليه؟ لأنها تكون غير قادرة على إيصال كمون الغشاء إلى حد العتبة

تكون قابلية التبيه في الألياف الثخينة أكبر منها في الألياف صغيرة القطر؟ لأن قيمة التغير في الكمون للوصول إلى حد العتبة في الألياف الصغيرة القطر أكبر من قيمتها في الألياف الثخينة.

بعد غشاء الليف مستقطباً كهربائياً أثناء الراحة؟ لأنه يفصل بين نوعين من الشحنات موجبة بالخارج وسالبة بالداخل

تكون قيمة كمون الغشاء ثابتة بخلايا الدبق العصبي؟ لأنها خلايا غير قابلة للتبيه

تكون قيمة كمون الغشاء متغيرة بالخلايا العصبية أو العضلية أو الغدية أو الحسية أو الخلية البيضية الثانوية؟ لأنها خلايا قابلة للتبيه

المدرس: أحمد حيدر الشيخ

مراجعة شاملة للمنهج بطريقة ورقة الامتحان الأخير

لدرس السادس

- ✓ تعد القطعة الأولية من المحوار مكان لانطلاق كمونات العمل لاحتواها على كثافة عالية من قنوات التبويب الفولطية بينما يكون عدد هذه القنوات في جسم الخلية والاستطارات الهيولية القصيرة مما يمنع تشكيل كمونات العمل فيها غالبا
- ✓ النقل بالالياف المغمدة بالنخاعين (قفزى) أسرع من النقل بالالياف المجردة من النخاعين؟ ينتقل كمون العمل من اختناق رانفيه إلى آخر فقزى غمد النخاعين، وهذا ما يسمى بالنقل القفزى أما في الألياف المجردة من النخاعين، يتم النقل من المنطقة المنبهة إلى المنطقة المجاورة
- ✓ يقتصر مكان نشوء كمون العمل على اختلافات رانفيه، لماذا؟ لأن قنوات التبويب الفولطية يقتصر وجودها على اختلافات رانفيه، كما يبدي ذلك مقاومة عالية لخروج التيارات الموضعية في المناطق التي يعطيها غمد النخاعين
- ✓ يوفر (يقل) النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين كميات كبيرة من الطاقة لعمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم؟ كون الضغط يحدث في اختلاف
- ✓ يمكن أن يكون الناقل منبهًا في بعض المشابك ومثبتا في مشابك أخرى؟ يتعدد نوع الكمون بعد المشبك المتشكل بنوع الناقل الكيميائي وطبيعة المستقبلات النوعية
- ✓ تنخفض سرعة السائلة عند مرورها بالمشبك الكيميائي أو يتصرف المشبك الكيميائي بالابطاء؟ بسبب الزمن اللازم لتحرر الناقل الكيميائي وانتهاء المشبك والزمن اللازم لتنبيه على المستقبلات وتشكيل كمون بعد مشبك
- ✓ تتصرف المشابك الكيميائية بالقطبية؟ تجتاز السائلة العصبية المشبك باتجاه وحيد، من الغشاء قبل المشبك إلى الغشاء بعد المشبك
- ✓ يكون تأثير النواقل العصبية مؤقتا في المشبك؟ بسبب زوالها بعد أن تؤدي دورها، إما بحلوها بأنظيمات نوعية أو بإعادة امتصاصها من المشبك وخلايا الدبق أو بانتشارها خارج الفالق المشبك.
- ✓ لا يحيط غمد النخاعين بالمحوار في المناطق الآتية : القطعة الأولية: لنشوء كمونات العمل (اختلافات رانفيه) لانتقال التيارات المحببة وكمونات (نهاية المحوار) لنقل السائلة إلى العصبونات التالية .

الدرس السابع والثامن

- ✓ تحديد وظائف مناطق معينة من الدماغ باستخدام التصوير الرئيسي المغناطيسي؟ لأنه ضمن هذا التصوير يتم وضع المريض في حقل مغناطيسي ويتم الكشف عن نشاط الدماغ في منطقة معينة من خلال التغيرات في تراكيز الأكسجين في تلك المنطقة .
- ✓ يبقى حس الألم بالرغم من تخريب الباحثات الحسية الجسمية في نصف الكرة المخية؟ تتوضع مراكز الشعور بلام في التشكيل الشبكي نجذع والمهادن بينما يقتصر دور القشرة المخية (الباحثات الحسية الجسمية) على تحديد مكان وصلة الألم.
- ✓ أهمية وجود مشبك واحد فقط على طول المسربل الفشري للنخاع؟ يكسب الحركات الإرادية السرعة والمهارة
- ✓ تعد العصبونات النجمية في القرون الأمامية للنخاع الشوكي محركة؟ لأنها توصل السائلة العصبية المحركة عبر محاورها إلى العضلات المستجيبة
- ✓ تعد المرونة العصبية أساسية في تشكيل الذكريات. لأن الذاكرة الطويلة الأمد والقصيرة الأمد تنشآن عند المشبك
- ✓ أهمية النوم في تشكيل الذكريات. لأن تحول المشابك المؤقتة في تلفيف الحصين (الذاكرة القصيرة الأمد) إلى روابط (مشابك) دائمة في القشرة المخية (ذاكرة طويلة الأمد) يحدث أثناء النوم.

الدرس العاشر والحادي عشر

- ✓ تترافق المنعكفات الشوكية باحساسات شعورية؟ لأن قسمًا من السبلات الحسية يصل إلى فقرة المخ
- ✓ المنعكفات عرضة للتعب؟ بسبب نفاد النواقل العصبية من الغشاء قبل المشبك نتيجة الاستخدام الزائد وعدم وجود آليات سريعة لتعويضها
- ✓ فقدان الوعي والسقوط أرضًا بحالة الصرع؟ بسبب حركة تشنجية لا إرادية ناتجة عن نوبات من النشاط الكهربائي الدماغي المفتوش

للمخ علاقة بالمنعكس الشرطي؟ لأن المخ كون رابطة بين المنبه الثانوي والإستجابة ✓

فقدان غم النخاعين بمناطق متعددة من المادة البيضاء بمرض التصلب اللويحي المتعدد؟ بسبب فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطارات وتفتكها إلى صفائح متصلبة ✓

تتمتع المنعksesات بالرتابة؟ أي تستجيب بالصورة ذاتها تحت تأثير المنبه ذاته. ✓

المنعksesات هادفة؟ لأنها تهدف لإبعاد الأذى عن جسم الكائن الحي غالباً ✓

يعالج داء باركنسون بطليعة الدوبامين؟ لأن الدوبامين لا يمر من خلال الحاجز الدماغي الدموي. ✓


المصاب بداء باركنسون لديه تقلصات مستمرة بمعظم العضلات الهيكيلية؟ بسبب موت العصبونات بالمادة السوداء الذي يؤدي لنقص الدوبامين وزيادة فعالية الجسمين المخططين ✓

موت الخلايا العصبية بالمخ في حالة الإصابة بالزهايمر؟ بسبب تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني (الأميلونيد) حول العصبونات في تلك المناطق، مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على التواصل مع العصبونات الأخرى. ✓

رائعاً: سؤال خارطة المفاهيم ((سنذكر بعض ما ورد منها من الكتاب أما التي تحتاج إلى ربط سنذكرها حالاً

الدوره على السورة علمًا أن من لم يحضر الدورة لا يقله، لأن المعلومات التي ستربط على السورة مذكورة

ضمن الأسئلة المتقدمة وهذه الأوراق) + مخططات بيانية (٣٠ درجة بالامتحان))




لهرنسر

أنواع العقد العصبية

مكتوب ترتيبهن


العقد العصبي الغطائي

يحد من



العقد العصبي المركب

يحد من



العقد الذاتية

عقد ودية وعقد
نظيرة ودية

العقد الشوكية

تقع : على الجذر
الخلفي الحسي
للعصب الشوكى

العقد القحفية

تقع على الأعصاب
الدماغية

حدثت تهاباً إلزاميًّا تسببت في فقدان الملفتين

الملف

مد الحصبة
في الملف

جاج المساج

المساج المتوسط





المساج العلوي

مساج العض

دوافع

المساج العلوي

من المساج



ملاحظة ١: (جميع الbahات الحسية/الحركية/التربطية) أقسام ومواقع ممكّن أن تكون خارطة مفاهيم

ملاحظة ٢ : أنواع الذاكرة قد تكون خارطة مفاهيم / أنواع الأقواس الانعكاسية وعصبوناتها/المسالك الحس

وعصبوناتها/المصابك بالدرس السادس/

١- أحدد التبدلات في استقطاب الغشاء المقابلة للأرقام في كل مرحلة.


١- حد العتبة ٢- إزالة الاستقطاب ٣- عودة الاستقطاب ٤- فرط الاستقطاب ٥- الراحة

٦- ما التبدلات التي تحدث في استقطاب الغشاء في (A) ؟ إزالة متدرجة في كمّون الغشاء ليصل إلى حد العتبة ٥٥-

٧- ما القنوات الشاردية التي تفتح وتغلق في (٤-٣-٢)

النقطة ٢: فتح قنوات التبويب الفولطية للصوديوم النقطة ٣: تغلق قنوات الصوديوم وتفتح قنوات البوتاسيوم

النقطة ٤: تغلق افقيّة الصوديوم والبوتاسيوم وتنشط مضخة الصوديوم والبوتاسيوم ليعود الغشاء لوضع الراحة.




١- أحدد المنبهات العتبوية ودون العتبوية؟

٢-٣-٤-٥-٦ دون العتبوية

٧- لماذا لا يستطيع المنبه (٣) توليد كمون عمل؟ لأن كمون الغشاء لا يصل لحد العتبة

٨- ماذا أسمى الكمونات التي تشير لها المنبهات (١٠٢٠٣) ؟ كمونات تحت عتبوبة

٩- ما هي قيمة التغير في الكمون اللازمة للوصول إلى حد العتبة؟ نحو ١٥ ملي فولط



مسئلتنا بالشكل المجاور الذى يوضح المسالك الحركية الصادرة عن قشرة المخ، وأجيب عن الأسئلة الآتية

١- ما العصبونات التي يصدر عنها السبيل القشرى النخاعى؟

وفي أي باحة توجد: عصبونات هرمية بالباحة المحركة

٢- يتألف السبيل القشرى النخاعى من مسلكين؛ أين يتصلب كل منهما؟

وأين ينتهي؟ في البصلة السيسانية و النخاع الشوكي وينتهي في سويات من القرون الأمامية للنخاع

الشوكي

٣- ما وظيفة العصبونات النجمية في القرون الأمامية للنخاع الشوكي؟ عصبونات محركة توصل السبلات العصبية المحركة عبر محاورها للعضلات المستجيبة (المنفذة)

٤- ما وظيفة السبيل القشرى النخاعى؟ يشكل السويقتن المخيتين في الدماغ المتوسط ثم يشكل الأهرامات في البصلة السيسانية

◀ عند دراسة تبيه عصبين وركيبي لضفدع: الأول في درجة الحرارة (٢٠) درجة منوية والثاني في الدرجة (١٠) درجة منوية . حصلنا على النتائج الآتية :


شدة التبيه بـ (mv)	t=20°C
1	1.2
10	6
2	2.3

شدة التبيه بـ (mv)	t=10°C
5	3.5
2	9

المطلوب: ١- مثل هذه النتائج في رسم بياني واحد مستخدما ورقا مليمتريا .

٢- حدد قيم الريوباز و الكروناكسي في التجربتين على الرسم .

٣- ما العصب الأكثر قابلية للتبيه ؟ ولماذا ؟ ماذ تستنتج ؟



٤- الريوباز (2) و الكروناكسي (1.5)

الريوباز (2) والكريوناكسي (1.5).

٥- الأول هو الأكثر قابلية للتبيه لأن قيم الريوباز و الكروناكسي اختلفت.

حيث تزداد ذليلة التبيه بارتفاع درجة الحرارة.

◀لاحظ الجدول الآتى الذى يوضح النتائج التجريبية التى تم الحصول عليها من دراسة العلاقة بين الشدة الحدية و الزمن المفید (في التجربة السابقة). وأجيب عن الأسئلة الآتية:

زمن التبيه ms	شدة التبيه mv	الاستجابة
5	4	x
34	35	x

١- ما قيمة الشدة التي لا يحدث دونها التبيه مهما طال الزمن؟ (الريوباز)؟ ٣٥ ملي فولط

٢- ما قيمة الزمن الذي لا يحدث دونه التبيه مهما زادت الشدة؟ (الاستفاد)؟ ١٠٠ ملي ثانية

٣- ما قيمة الزمن الذي يساوى شدة تساوى ضعفي الريوباز؟ (الكريوناكسي) ٣٠ ملي ثانية

٤- ما قيمة ضعفي الريوباز؟ (٧٠) ملي فولط

٥- ما العلاقة بين الشدة و الزمن؟ العلاقة عكسية: عند زيادة شدة التبيه يتلاقص زمن التأثير.

- ما الزمن الأقصى الذى لا يزال الريوباز فعالاً عنده؟ الزمن المفيد الأساسى
- ما الزمن اللازم لحدوث التنبؤ فى النسج إذا بلغت شدة المتباه ضعف الريوباز؟

الكروناكسى


- استنتج العلاقة بين قيمتى الريوباز والكر وناكسى في نسج ما وقابلية هذا النسج للتباه؟ ترداد قابلية التنبه بتناقض قيمتى الريوباز والكر وناكسى
- في أي من النقاط (أ - ب - ج) يكون المتباه فعالاً عنده؟ ولماذا؟ النقطة أ: فعالة لأنها تقع بمنطقة التنبهات الفعالة ب: فعالة لأن المتباه فعال ج: غير فعالة لأنها تقع بمنطقة التنبهات غير الفعالة تحت المحننى.

يظهر منحنى عتبات التنبه بشكل فرع من قطع زائد، يفصل بين منطقة التنبهات الفعالة فوقه ومنطقة التنبهات غير الفعالة تحته.

خامساً: المقارنات ((أحياناً تكون المقارنة من سوال الوظيفة أو حدد موضع وليس بالضرورة أن تكون مقارنة بين درسين تعتمد على مهارة الطالب بالتحليل والتركيب مع أهميه وضع المقارنه بجدول))

ووجه المقارنة	باحة فرنسا	باحة فرنسا
الموقع	تقابـل باحة فـيرنـكـة في نـصـف الـكـرـة الـيـمـنـيـ	في النـاحـيـة الـوـحـشـيـة لـنـصـف الـكـرـة الـمـخـيـة الـيـسـرىـ؛ وـسـطـ باحة التـرـابـطـ الجـدارـيـةـ الـقـفـوـيـةـ الصـدـغـيـةـ
الوظيفة	تعـبـيرـ الـوـجـهـ وـإـدـراكـ مـعـانـيـ الـمـوـسـيـقـاـ وـالـفـنـ وـالـرـسـمـ وـالـرـيـاضـةـ	تـنـقـلـ السـيـالـاتـ الـعـصـبـيـةـ مـنـ جـمـيعـ الـبـاحـاـتـ الـحـسـيـةـ وـتـقـوـمـ بـتـحـلـيـلـهـاـ وـإـدـراـكـهـاـ،ـ وـتـرـسـلـ سـيـالـاتـ عـصـبـيـةـ نـحـوـ الـبـاحـاـتـ الـمـحـرـكـةـ إـذـاـ كـانـ الـأـمـرـ يـتـطـلـبـ إـنجـازـاـ حـرـكـيـاـ وـهـيـ مـسـؤـولـةـ عـنـ الإـدـراكـ الـلـغـوـيـ

ووجه المقارنة	الذاكرة قصيرة الأمد	الذاكرة طويلة الأمد
نوع المشابك	مؤقت	دائمة
مكان تشكيل المشابك	تلفيف الحصين	قشرة المخ
الشكل	القرنان الأمامي بالنخاع الشوكي	القرنان الخلفيان بالنخاع الشوكي
الشكل	عریضان وقصیران	ضيقان وطويلان
	التلם الخلفي	التلם الأمامي
الشكل	ضيق وعميق يصل لحدود المادة الرمادية	عرض قليل العمق لا يصل لحدود المادة الرمادية
	الخلايا العصبية	الخلايا الدبقية
العدد والحجم	أقل عدداً وأكبر حجماً	أكبر عدداً من العصبية لكنها أصغر حجماً



الليفات العصبية

جسيمات نيس

في جميع أقسام العصبون
تتوسط بشكل متواز في المحوار

في جسم الخلية والاستطلاطات الهيولية وتتعدم في
المحوار

المكان

لها دور بتركيب بروتينات الخلية

الوظيفة

تشكلات خيطية دقيقة

تجمعت من الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية
الخشنة والريبيوزومات الحرجة

الشكل

عصبونات القرون الأمامية للنخاع الشوكي
(الجذر الأمامي المحرّك)

عصبونات العقد الشوكي (الجذر الخلفي الحس)

متعددة القطبية تجمبة

حادية قطب

الشكل

حركية

حسية

الوظيفة

المحوار

الاستطلاطات الهيولية

مفرد دوماً ومحروم احياناً

يختلف باختلاف العصبونات

العدد

ثابت على امتداد

تسقى بالابتعاد عن جسم الخلية

القطر

تخرج منها امتدادات جانبية
تنهي بتفرعات عديدة تدعى
الأزرار

تعطي تغصنات شجرية

التفرع

من جسم الخلية من منطقة
مخروطية تدعى الربوة البرزة.

من جسم الخلية

المنشأ

تنقل السائلة العصبية بعيداً عن
جسم الخلية

استقبال المعلومات الواردة ونقلها
نحو جسم الخلية

الوظيفة

تنعم

توجد بشكل تجمعات من الشبكة
السيتوبلاسمية الداخلية الخشنة
والريبيوزومات الحرجة

وجود جسيمات نيس

القسم انودي

القسم نظير الودي

في القرون الجانبية للنخاع الشوكي
في المنطقتين الظاهرية والقطنية للنخاع
الشوكي وفي الوطاء

في جذع الدماغ والمنطقة العجزية للنخاع
الشوكي وفي الوطاء.

المراکز العصبية

- سلسنان على جانبي العمود الفقري.
- لب الكظر

قرب الأحشاء أو في جدارها.

العقد العصبية

تخرج من العقد الودية إلى مختلف الأعضاء الداخلية	تخرج من جذع الدماغ كالعصب "المجهول" ومن المنطقة العجزية للنخاع الشوكي كالأعصاب الحوضية	الأعصاب
بعد الجسم لمواجهة الخطر وتهيئه للأنشطة الفورية	يعمل على إعادة الجسم إلى حالة الراحة والهدوء	الوظيفة
قبل العقدة: قصير بعد العقدة: طويل	قبل العقدة: طويل بعد العقدة: قصير	طول الألياف قبل العقدة والألياف بعد العقدة
الاستيل كولين	الاستيل كولين	نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية في العقدة الذاتية
التورادرينلين	الاستيل كولين	نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة
توسيع الحدقة	تضيق الحدقة	التأثير على الحدقة
تبطط إفراز اللعاب	زيادة إفراز اللعاب	إفراز اللعاب
توسيع القصبات	تضيق القصبات	التأثير على القصبات
يسرع ضربات القلب	يبطيء ضربات القلب	ضربات القلب
تحرر الغوköز	تخزين الغلوكوز	الغلوköز
تبطط	تنشيط إفراز	البنكرياس
نقص نشاط الجهاز الهضمي وافرازاته	زيادة نشاط الجهاز الهضمي وافرازاته	الجهاز الهضمي
استرخاء المثانة	تقلس المثانة	المثانة

الجهاز العصبي الذاتي	الجهاز العصبي الجسمي	
عصبونان	عصبون واحد	عدد العصبونات الصادرة عن كل منها إلى الخلايا المستجيبة
الأول: جسمه في المركز الذاتي الثاني: في العقدة الذاتية	في القرن الأمامي للنخاع الشوكي	موقع جسم كل عصبون

مشابك التثبيط	مشابك التثبيط	وجه المقارنة
حمض خاما والفلسين والأمينوبوتيريك	الغلوتامات والأستيل كولين في معظم حالاتها.	النواقل الكيميائية
لشوارد الكلور التي تنتشر إلى الداخل، أو لشوارد البوتاسيوم التي تنتشر إلى الخارج	لشوارد الصوديوم أو لشوارد الكالسيوم الثنائي تنتشران إلى الداخل.	أقنية التببيب الكيميائية التي يرتبط بها الناقل
فرط استقطاب	إزالة استقطاب متدرجة لأن كمون الغشاء يتوجه نحو حد العتبة	التبدل في الاستقطاب للغشاء بعد المشبك
(IPSP) كمون بعد مشبك تثبيطي لأنه يبعد كمون الغشاء عن حد العتبة	كمون بعد مشبك تثبيطي (EPSP) لأنه يوجه كمون الغشاء إلى حد العتبة	الكمون المتشكل وسبب تسميته
موجة نحو الأسفل	موجة نحو الأعلى	شكل المنحني على شاشة الأوسيلوسكوب

المشبك الكيميائي	المشبك الكهربائي	وجه المقارنة
غشاء قبل مشبكى فالق مشبكى غشاء بعد مشبكى	بنيتان غشائين متناظرتان لخلايا متجاورة يفصلهما فالق ضيق، ترتبان بواسطة قنوات بروتينية	المكونات
تحتاج	لا تحتاج	وجود الناقل الكيميائي
باتجاه واحد	بالتوجهين المتعاكسين	جهة نقل السائلة
أقل سرعة	أكثر سرعة لأنها لا يتميز بالإبطاء	السرعة
20 nm	3.5 nm	أبعاد الفالق
بين نهاية محوار عصبون أول وجسم أو استطالة أو عصبون جسم ثانى أو: بين نهاية محوار عصبون أول وخثرة مستجيبة (عضلية خفيفة)	بين الألياف العضلية للعضو الواحد (العضلة القلبية وعضلات الأحشاء)	مكان تواجدها في الجسم

عدد المشابك	نهاية المشابك	وحيدة المشبك	القوس
أكثر من عصبون واحد	عصبون بيني واحد	لا يوجد	عدد العصبونات البينية
الأقل	أقل سرعة	أكثر سرعة	السرعة

الجهاز العصبي الذاتي	الجهاز العصبي الجسمي	
عصبونان	عصبون واحد	عدد العصبونات الصادرة إلى الخلايا المستجيبة
عصبون جسمه في العقد الذاتية وعصبون جسمه في القرن الجانبي للنخاع الشوكي.	القرن الأمامي للنخاع الشوكي	موقع جسم العصبون

كمون العمل تناهى الطور	كمون العمل أحادي الطور	
نضع مصري راسم الاهتزاز المهبطي على نقطتين متبعدين من السطح الخارجي لليف المنبه	بوضع أحد مصري راسم الاهتزاز المهبطي على السطح الخارجي والأخر على السطح الداخلي	طريقة القياس
موجتان مؤنقتان متعاكستان استخدامات طبية تخفيط (قلب ، دماغ - عضلات)	موجة مؤنفة وحيدة الطور	الشكل

الذاكرة طويلة الأمد	الذاكرة قصيرة الأمد	نوع المشابك
مشابك دائمة.	مشابك مؤقتة.	
قشرة المخ.	تغليف الحصين.	مكان تشكل المشابك

المعكس الشرطي	المعكس الغريزي	
متعلم	طبيعي (فطري) غريزي	السلوك
تكوين رابطة بين المتباه الشرطي والاستجابة	لا دور للمخ	دور المخ

سادساً: درس الحالة (سؤال عليه ١٦ درجة برد آخر ورقة الامتحان وهذا السؤال البسيط يعتمد على الفروقات والربط بين الأفكار) سنحاول أن نسرد بعض الحالات كأمثلة

جاء رجل الى المشفى يعاني من ارتفاع حرارة وصداع وآفياً وعند الفحص السريري له اشتئه الطيب بالنهان السحايا فطلب فوراً اجراء بزل للمربيض للحصول على عينة من السائل الدماغي الشوكي لفحصها مخبرياً: ١- من الفقرات سيتم اجراء البزل للمربيض ٢- ما المضاعفات التي يمكن ان تحصل بعد اجراء البزل ٣- بعد ان ظهرت النتيجة وجود كربات بيضاء سم الحالة التي تم تشخيصها للمربيض؟

١- بين الفقرة القطنية الثالثة والرابعة لكي لا تتم أذية النخاع الشوكي لأنها ينتهي بمستوى الفقرة القطنية الثانية
 ٢- الألم أو عدم الارتجاع مكان إدخال الإبرة - الإحساس بالصداع بعد سحب السائل الدماغي الشوكي - تشكيل كتمة أو التهاب سحايا
 ٣- وجود كربات بيضاء تليل على حدوث التهاب سحايا / لو كان يوجد كربات حمراء لقلنا أن هناك نزف تحت عنقبوتي

صف ما يحدث لكل عضو من الأعضاء الآتية، إذاً طلب مثلك الوقوف لإلقاء محاضرة لم تعد لها: القلب - الأمعاء - الخد العايبة - حدقة العين؛ التبقيع معلم ضرباته / الأمعاء: تثبيط / الخد العايبة: تثبيط إفراز
 في أحد الأيام تلقيت خبر وفاة أعز شخص على قلبي فشعرت فجأة بألم بصدرى وبكاء شديد وانتابنى شعور بالحزن والألم لخسارة عزيز قلبي
 ١- حدد المركز العصبي الذي شعرت من خلاله بالحزن؟ اللوزة
 ٢- ما التقانة المستخدمة للكشف عن الشعور بالحزن و الفرح بالدماغ؟ وعلى ماذا تعتمد؟ التقانة: التصوير الرنيني المغناطيسي الوظيفي، تعتمد على الكشف عن نشاط الدماغ في منطقة معينة من خلال التغيرات في تركيز الأوكسجين بتلك المنطقة
 شعرت بألم في صدرى حدد مكان ذلك الشعور؟ وحدد مكان تحديد صفة الألم. مكان الشعور بالألم: في التشكيل الشبكي، وفي المياد أما تحديد في القشرة المخية (الباحثات الحسية الجسدية)

أعلم أن غاز المارجين متبطن لا تتفافسي لأنظيم الكولين أستيراز كيف أفسر موت الشخص اختلافاً عند استنشاق هذا الغاز .
 يستمر تأثير الأستيراز كولين المتباه لعضلة الحجاب الحاجز ، مما يؤدي لتشنجها نتيجة التقلص المستمر ، فتوقف عمله التنفس .
 أعلم أن عملية الإدمان من الظواهر السلبية التي تحدث من التعاطي المستمر للتبع مما يعطي للمدمن إحساساً مؤقتاً بالسعادة .
 لماذا نشعر بالقلق والاكتئاب عند محاولة الإقلاع عنه؟ لأن النيكتوتين يزيد من إفراز الدوبامين، ويؤدي الانقطاع لتناقص إفراز الدوبامين مما يعطي الاحساس المعاكس

أقدم بعض النصائح التي تحدث المدمنين على الإقلاع عن التدخين؟ يمكننا الإقلاع عن التدخين وبشكل تدريجي مما يسمح للجسم التأقلم مع الوضع الجديد وبالتالي عودة الدوبامين لوضعه الطبيعي وبالتالي التخلص من الإدمان.
 رجع هشام من المدرسة جائعاً وعندما دخل باب منزله شم رائحة طعام شهية قادمة من المطبخ فشعر بزيادة في إفراز اللعاب في فمه والمطلوب :

أ- ماذا أسمى هذا الفعل المععكس؟ ولماذا؟ منعكس شرطي لأن حدوثه مرتبط بوجود منه ثانوي (شرطي) يجعل المخ على ربطه مع الاستجابة
 ب- أرتب عناصر هذه القوس الانعكاسي: الأنف - عصبون جاذبة (حس) - القشرة المخية - البصلة السيسانية - عصبون نابذ (مفرز) - الخد العايبة واللعاب

ت- ما أهمية هذا الفعل في عملية الهضم؟ زيادة الشهية وزيادة معدل إفراز العصارات الهاضمة
 مراجعة شاملة للمنهج بطريقة ورقة الامتحان الأخير

حاجت سيدة الى المشفى تعانى من صيق تنفس وصداع شديد وخدر بالقسم الابسر من جسمها وارتباك بالتحدث ودودحة وكان برفقتها ابنها ١- ما الحالة المتوقعة لها؟ ٢- ما الأسئلة التي وجهها الطبيب المسعف لابنها ٣- ما السبب المباشر لها

١- السكتة الدماغية ٤- هل لديها ارتفاع في ضغط الدم، والكوليسترون، أو نقص في النشاط البدنى، هل التغذية لديها سلطة هل تدخن. ٥- عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ كحالة طبية طارئة تبدأ فيها خلايا الدماغ بالموت بعد بضع دقائق من عدم وصول الأكسجين

ولد لأحد أقربائى طفل وبعد فترة زمنية تبين أن لديه زيادة بحجم الرأس ما سبب هذه الحالة وماذا تسمى؟

الاستسقاء الدماغى نتيجة تراكم السائل الدماغ الشوكي فى بطينات الدماغ فى زداد حجمها وتضغط على الدماغ. وقد يؤدي ذلك إلى انلاف أنسجة الدماغ. وزيادة سرعة فى حجم الرأس يسعه تحلف عقلى لدى الرضيع.

عند زيارةى لجدى وجدتى بعطلة رأس السنة لاحظت على جدى أثناء طلبه لكأس ماء أن أحظرها له أن لديه ارتعاش بكلتا بديه وصعوبة بحركة كلتا بديه أما جدى فقد تحدث لنا عن أشخاص قد توفاهم الله منذ سنوات طوله ولديها صعوبة تذكر الأحداث القريبة ولعل أهمها تخرجى من درجة الماجستير أما أنا فتعرضت لصداع شديد بالجانب الأيسر من رأسي

ما السبب العاشر لكل من الحالات الثلاثة السابقة وماذا تسمى؟

الإجابة: جدي يعاني من مرض داء باركنسون الشلل الرعاشى والسبب المباشر له نتيجة تلف الخلايا العصبية في المادة السوداء لجذع الدماغ مع التقدم بالعمر أو نقص بعض المركبات الكيميائية أو سبب وراثي

اما جدى فتعانى من مرض الزهايمر (الخرف المبكر / شيخوخة مبكرة للدماغ) نتيجة تراكم لوکات بيتا النشواني (الأميلونيد) حول عصبونات القشرة المخية وتلف الحصين، مما يؤدي لفقدان العصبونات القدرة للتواصل مع العصبونات الأخرى ومن ثم ضمورها وموتها

اما أنا فأعاني من مرض الشقيقة أو الصداع الوعائى فسببه توسيع فرع أو أكثر من الشريان السباتي مما يؤدي لتتبه النهايات العصبية في هذا الشريان ويثار بعوامل آلية: بيلية أو نفسية محددة

تعرض مجموعة من الشبان لحادث على طريق أوتوستراد المزة وتم إسعافهم إلى مشفى الأسد الجامعى وبعد الفحص السريري لهم تبين أن الشاب الأول لديه خدر بالجانب الأيسر من جسمه أما الشاب الثاني فيعاني من صعوبة بتذكر ما جرى له ويستطيع بتذكر ما جرى قبل الحادث بشكل جيد أما الشاب الثالث فيعاني من عدم القدرة على تفسير الأصوات المسموعة والمطلوب ذكر مكان أذية كل حالة.

الإجابة: الشاب الأول: تخريب الباحة الحسية الجسمية الأولى بنصف الكرة المخية اليمنى
الشاب الثاني: تخريب تلف الحصين الممتد في أرضية البطين الجانبي لكل نصف كرة مخية
الشاب الثالث: تخرب ثالثي الجانب للباحة السمعية الثانوية

تقسم المشابك العصبية إلى نوعين كيميائية وكهرمانية

١- مم يتالف المشبك الكيميائى؟ ١- غشاء قبل مشبكي ٢- فالق مشبكي ٣- غشاء بعد مشبكي
٢- بماذا يتميز كل قسم؟ ١- يتميز الغشاء قبل المشبكي ببنية مناسبة لتناسق الحويصلات المشبكية، وتحrir الناقل الكيميائي في الفالق المشبكي
٢- يتميز الغشاء بعد المشبكي بوجود مستقبلات نوعية للنواقل العصبية الكيميائية التي ترتبط معها قنوات التبويب الكيميائية للشوارد المختلفة

٣- أين يتكون الناقل العصبي الكيميائي وما مصيره بعد أداء دوره؟ تتشكل إما في جسم الخلية ، أو في الزر النهائى مباشرة بفعل أنظمات نوعية ويكون تأثيرها مؤقتاً في المشبك، (عل) بسبب زوالها بعد أن تؤدي دورها، إما بحلمتها بأنظمات نوعية أو ب إعادة امتصاصها من الغشاء قبل المشبكي وخلايا الدبق أو بانتشارها خارج الفالق العشكى.

٤- كيف ندرك حس الألم؟ ترسل مستقبلات حس الألم السيلات الألمانية إلى النخاع الشوكي، حيث يتم تحرير المادة (P) في مسالك حس الألم لتصل إلى الدماغ، فندرك حس الألم . وكيف يمنع الدماغ دخول السيلات الألمانية إليه؟ يقوم الدماغ بإفراز الأنکيفالينات و الاندروفينات التي تنشط تحرير المادة (P) من خلال منع دخول شوارد الكالسيوم من الغشاء قبل المشبكي. ومن ثم منع وصول السيلات الألمانية إلى الدماغ

الباحة السمعية	الباحة البصرية
مكان التصالب للعصبين: جزئياً في جذع الدماغ	مكان التصالب للعصبين: جزئياً أمام الوطاء
السبيل القشرى النخاعي	مستقبلات اللمس
التصالب: البصلة السيسانية و النخاع الشوكي	التصالب: البصلة السيسانية أو النخاع الشوكي
يمر من الحبل الأمامي والجانبي	يمر من جميع الحبال بالنخاع الشوكي (أماميان - جانبيان-خلفيان)

المستقبلات الحسية

أولًا: اختبر الاحاجة الصحيحة (١٠٠ درجة) (أمثل سؤال يكون بورقة الامتحان النهائي وعليه نلت العلامات)

الدرس ١

خلايا في البرعم الفوقي تتضمن الخلايا الغاذية تحول إلى خلايا حسية فوقيه

النحو	المعنى	الكلمة	النحو	النحو	النحو
شولتز	د	الكيسية	ج	ج	ب
الفتوات الهاالية	د	الكيس	ج	القرنية	ب
خروج k+ خروج C ₂	د	خروج	ج	دخول k+ دخول C ₂	ب
الحلقة الطبلية	د	الكرة الفوقيه	ج	النافذه المدوره	ب
جمع ما سبق غلط	د	التبه	ج	غشاء اittel	ب
بعض	د	غشاء هلامي	ج	الغشاء الاسم (الغشاء الساقى)	ب
غشاء قاعدي	د	أدب	ج	القرنية	ب
فتحة عظميه مكونه من مجموعه فتوات واجواف محفورة في العظم الصدغي.					
جميع ما سبق غلط	د	الأفن الداخلية	ج	التبه الفشالي	ب
فتحات واجواف غلائية يمثلها التفت الناخي					
جميع ما سبق صح	د	التبه العظمي	ج	التبه الفشالي	ب
تحت مخروط متقد حول محور عظمي بمقدار مورتن و ثلاثة اربع الدورة يقسم بوسطه رف عظمي وغسانين الى تلات فتوات					
أدب	د	الحلزون	ج	الأفن الداخلية	ب
ختما تعدد بالمعبد ضمن بناء مؤلف من ١٠ طوابق يتولد لدى احسنس بالسرعة المتزايدة نتيجة لتبه المستقبلات الحسية في					
جميع ما سبق صح	د	اللطخات	ج	القرنية	ب
ختما يكتنل الجسم سعيا لتجدد الخلايا الحسية المهدبة بالأمبولات:					
جميع ما سبق غلط	د	متحركة	ج	غير نشطة	ب
قادمه الحائز حسنة التوتورات					
جميع ما سبق غلط	د	المتوسطة	ج	المرتفعة	ب
المنخفضة					
المنخفضة القرنية من ذروة الحائز حسنة التوتورات					

النهاية المنخفضة	ب	المرتفعة	ج	المتوسطة	د	جميع مسائل غلط
تتوزع الحساسية للتواترات الوسمطية بين القاعدة						١٤
ونروة الحزون	ب	والمنطقة القريبة من الذروة	ج	والكوة التوقفية	د	جميع مسائل غلط

الدرس الخامس والسادس

١	الجزء الأمامي الشفاف من الصلبية خالية من الأوعية الدموية:					
١	المتحدة	ب	المشيمية	ج	الخلايا الافتية	د
٢	طبقة مكونة من نسيج ضام وخلايا صباغية غنية بالأوعية الدموية تخذى الخلايا البصرية					
٣	المشيمية	ب	النافذة المدوره	ج	الشبكة	د
٤	يخضع عمل القرحية و الجسم الهدبى لتأثير:					
٥	الجهزة العصبى الذاتى	ب	الجهزة العصبى الجسبي	ج	الجهاز العصبى المركبى	د
٦	بادحة على الشبكية مقابل الحدقه تغزو فيها المخاريط و تقل العصي					
٧	اللطخة الصفراء	ب	الحفيرة المركبة	ج	الشبكة المحيطية	د
٨	منخفض صغير في مركز اللطخة الصفراء يبلغ فيه الابصار فروته:					
٩	الحطخة الصفراء	ب	الشبكة المحيطية	ج	أهاب	د
١٠	منطقة خروج الباف العصب البصري من الشبكية ينعدم فيها الابصار					
١١	النقطة العمياء	ب	القرص البصري	ج	أهاب	د
١٢	عندما يقترب الجسم المرئي من العين يسبب					
١٣	نقص القوة الكاسرة	ب	يزداد تحذق الجسم البلوري	ج	يزداد البعد المحرقي	د
١٤	مجموع النقاط التي يمكن رؤيتها بعين واحدة ثابتة في لحظة زمنية معينة ويتمثل مخروطاً في الفراغ فروته عند العين وفاسده بعيداً عنها					
١٥	المجال البصري	ب	القرص البصري	ج	العصى	د
١٦	المسافة بين مركز العدسة و نقطة تجمع الاشعة المنكسرة (المحرق).					
١٧	البعد المحرقي	ب	الحقل البصري	ج	أهاب	د
١٨	سائل شفاف له قوام الماء يملاً الحجرة الأمامية للكبة العين:					
١٩	الشريان الشبكي	ب	الخلط المعاكس	ج	الخط الرزاجي	د
٢٠	يتولد الإحساس بروية اللون الأبيض عند تنبيه أنواع المخاريط الثلاثة					
٢١	بنسب مختلفة	ب	بنسب متساوية	ج	بنسبة ٩٠ ناتومتر	د
٢٢	حالة يتوضع جزء من الخيال على الشبكية و أجزاء منه أمام أو خلف الشبكية، ويتم تصريح الرؤية باستخدام عدسات أو بمعنجه القراءة المصابة بالليزك					

انفصال الشبكية	ب	الساد	ج	الخط الزجاجي	د	اللابزورية
حالة تنمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط لتمتد إلى المسافة بين وريقتها ويتسرب الدم منها مما يسبب تضرر الخلايا البصرية وتناقص تكريبي في حدة الرؤية	١٣					
انفصال الشبكية	ب	اعتلال الشبكية		الساد	د	الماء الأبيض
يشكل فرط استقطاب كمون المستقبل في الخلايا الحسية :	١٤					
الشممية	ب	الضوئية		الذوقية	د	السمعة
خلايا حسية تحرر ناقلاً عصبياً مبطأ في حالة الراحة :	١٥					
الشممية	ب	الشممية		الذوقية	د	السمعة

انيا (الوظائف والمواقع وأسئللة الرتب وسؤال ماذا ينتج برد منها ثلاثة أسئلة مع الرسمة (مسننات وأرسن) جميعها على ٣٨ درجة ((سؤال حساس يحتاج التدقق بشكل جيد))

(الوظائف + المواقع) مع الانتباه إن لم ترد ضمن هذا السؤال قد ترد بسؤال احتياطي أو فارن

درس ٢١+٢+٣

اسم البنية	الموقع	الوظيفة
منشأ المكون المستقبل	في غشاء الخلية الحسية	
جيسيمات كراوس	في أديمة الجلد وتغزر أسفل القدمين.	مستقبلات للبرودة
جيسيمات باشيني	في مناطق عميقة من أديمة الجلد	مستقبلات آلية للضغط والاهتزاز
جيسيمات مايسنر	في المناطق السطحية من أديمة الجلد وتغزر في رؤوس الأصابع والشفاء وراحة اليد	مستقبلات للمس النقي
جيسيمات روفيني	في أديمة الجلد وفي المفاصل	١- مستقبلات تحديد جهة التبيه -٢- لها دور في حس السخونة دور كمستقبل للضغط.
اقراص ميركل	١- مستقبل ألي لحس اللمس ٢- يتبعه بالمتباينات العمودية على سطح الجلد و التي تغير من شكل هذا السطح	تلمس السطح الداخلي للطبقة المولدة في بشرة الجلد
النهيات العصبية الحرارة	مستقبلات للمس والحرارة والالم	في بشرة الجلد
	تنتبه بحركة الإشعار	في جذر الشعرة
مكان استقبال التخدير الموضعي بالعمليات	يستهدف النهيات العصبية الحرارة في بشرة الجلد	
الخلايا الحسية الشمية (شولتر)	في البطانة الشمية في الحفيرة الإنفية	يتم بواسطتها الاستقبال الشمي
الخلايا التاجية	في الفص الشمي	شكل محاويرها ألياف العصب الشمي

يتحول cAMP إلى ATP

يتم بواسطتها الاستقبال الذوقي	داخل الحليمات اللسانية وتوجد خارج الحليمات في البلعوم	النظم الأدينيل سيكلاز المبراعم الذوقية
	تتوسط في المبراعم الذوقية	الخلايا الحسية الذوقية

الدرس الرابع

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
حساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الافقية	في العقدة الحلزونية	الخلايا التي تشكل محاويرها ألياف العصب القوقي
حساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الشاقولية		اللطخات في القربيه
يعد المستقبل الصوتي في الأذن الداخلية	من ارتشاح المصورة الدموية	منشأ الملف الخارجي والداخلي
تشكل نفق كورتي	داخل القناة القوقيعة	عضو كورتي
نقل الاهتزازات الصوتية من خشاء الطبيل إلى غشاء النافذة البيضية	في الأذن الوسطى	عظيمات السمع
نقل الاهتزازات الصوتية من الملف الخارجي في القناة الدهليزية إلى الملف الداخلي في القناة القوقيعة .	بين القناة الدهليزية والقناة القوقيعة	غضاء رايسنر
	قاعدة الحلزون	حساسية التواترات العالية (المرتفعة)
	بين القاعدة والمنطقة القربيه من ذروة	حساسية التواترات المتوسطة
	المنطقة القربيه من ذروة	حساسية التواترات المنخفضة
نقل الاهتزازات الصوتية إلى الملف الخارجي في القناة الدهليزية		غضاء النافذة البيضية
امتصاص الضفتين المتوكد على جانبي خشاء النافذة البيضية		غضاء النافذة المدوره
تصل القناة الدهليزية بالقناة الطلبية في ذروة الحلزون	ذروة الحلزون	الكوة القوقيعة
تنقل العضلة الشادة الطلبية ، فتسحب المطرقة نحو الداخل ، مما يؤدي إلى شد خشاء الطبيل فتنخفض قدرته على الاهتزاز	في الأذن الوسطى	العضلة الشادة الطلبية
تنقل العضلة الشادة الركابية الصفيحة الركابية نحو الخارج مما يؤدي إلى تخفيف حركة الركاب على خشاء النافذة البيضية	في الأذن الوسطى	العضلة الشادة الركابية

تزوّدنا بياحصان التوازن سواء كان الجسم متحركاً أو ساكناً	في القربيّة والكيسين	
	في القنوات الهلاليّة الثلاثة	مستقبلات الحركات الدورانية للرأس
ينقل السبلات العصبية الناتجة عن تبّيه مستقبلات التوازن إلى مراكز التوازن في الدماغ		العصب الدهليزي
نقل السبلة العصبية المسموعة إلى مراكز السمع في قشرة المخ		العصب التوقي

لدرس الخامس والسادس

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
١- يختزن كميات كبيرة من فيتامين A الضروري لتركيب الأصبغة البصرية ٢- امتصاص الفانوس من الأشعة الضوئية التي تجذب الخلايا البصرية ويعتبر انعكاسها مما يسهم في وضوح الرؤية.	في الورقة الخارجية الصباغية للشبكة	الصباخ الأسود العيلاني
يتم بواسطتها الاستقبال البصري	في الطبقة الخارجية للورقة العصبية الداخلية للشبكة	العصبي والمخاريط
تغذي الخلايا البصرية في الشبكة	الطبقة الوسطى	المثبطة
تشكل الياف العصب البصري	في الطبقة الداخلية للورقة العصبية الداخلية للشبكة	محاوير العصبونات العقدية بالشبكة
تؤمن الاتصالات المشبكية الافقية بين الخلايا البصرية وعصبونات ثنائية القطب في طبقة المشابك الخارجية.		الخلايا الافقية
تساعد في تكامل السبلات العصبية البصرية الواردة من الخلايا البصرية إلى الخلايا العقدية قبل أن تغادر الشبكة إلى الفص التقوي للمخ		الخلايا المقرنية
	في أغشية أقراص القطعة الخارجية للخلايا البصرية	الأصبغة البصرية
ينتفع في الضوء الضعيف فيصبح فعالاً مما يؤمّن للعصبية رؤية البينة المحيطة بشرط الإضاءة الضعيفة	في أغشية أقراص القطعة الخارجية للعصبي	صباخ الرودوبيسين
تؤمن الطاقة اللازمة لعمل الخلية البصرية	في القطعة الداخلية للخلايا البصرية	الجيسيمات الكوندرية بالخلايا البصرية
يؤمن الاتصال المشبعي بين الخلية البصرية والعصبونات ثنائية القطب		الجسم المشبعي
	جزء من الخيال على الشبكة وأجزاء منه أمام وخلف الشبكة	الخيال في البابوية

تقوم بالدور الرئيس في مطابقة الخيال على الشبكية

يُنشط أنظيم فوسفو دي استيراز		مركب ترانسديوسين
يتحول مركب GMP إلى GMP، إلى		أنظيم فوسفو دي استيراز

السؤال ماذا ينتهي عن?

الدرس ١+٢+٣

- ١- زيادة قيمة الكمون المستقبل؟ زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها الكمون المستقبل
- ٢- تبيه تفرعات النهايات العصبية الحرة في بشرة الجلد بمنبهات تسبب أذية في النسج الضامنة؟ توليد حس الألم
- ٣- دخول شوارد الهيدروجين الحمضية إلى الخلية الحسية الذوقية. زوال استقطاب غشاءها
- ٤- ارتباط جزء الغلوكوز بمستقبله في غشاء أهداب الخلية الحسية الذوقية. تشويط بروتين G
- ٥- ارتباط مركب (cAMP) بقنوات الصوديوم الموجودة في أغشية أهداب الخلية الحسية الشمية. فتح أغشية شوارد الصوديوم ودخول شوارد الصوديوم للخلية مما يؤدي إلى زوال استقطاب الغشاء وتشكيل كمون مستقبل.
- ٦- ارتباط جزيئات المواد الكيميائية بالمستقبلات في أغشية أهداب خلايا شولتر؟ تشويط أنظيم أدنيل سيكلاز الذي يحول مركب ATP إلى cAMP.
- ٧- تبيه المستقبلات الذوقية بالبلعوم عند شرب الماء؟ ترسل سيالات عصبية إلى الوطاء الذي ينظم توازن الماء في الجسم عن طريق إفراز الحالة المضادة للإبالة
- ٨- اجتماع الإحساس الشهي مع الإحساس الذوقي لمادة ما؟ تشكيل النكهة

الدرس ٤

- ١- ارتفاع المصورة السمعية؟ تشكيل اللعف الخارجي والداخلي
- ٢- تقارب سلسلة عظيمات السمع؟ يخفف من قدرتها على نقل الاهتزاز من غشاء الطبيل إلى غشاء النافذة البيضية.
- ٣- تقلص العضلة الشاده الطلبية؟ تتنقص العضلة الشاده الطلبية، فتسحب المطرقة نحو الداخل، مما يؤدي إلى شد غشاء الطبيل فتختفي قدرته على الاهتزاز
- ٤- تقلص العضلة الشاده الركابية؟ تتنقص العضلة الشاردة الركابية فتسحب الصفيحة الركابية نحو الخارج مما يؤدي إلى تخفيف حركة الركبة على غشاء النافذة البيضية
- ٥- تتبه الخلايا الحسية المهدبة بالأمبولات؟ يؤدي لحركة اللعف الداخلي فيها
- ٦- تناقص في مرونة غشاء الطبيل أو المفاصل بين عظيمات السمع، أو غشاء النافذة البيضية؟ صمم توصيل
- ٧- أذيات ضعن المستقبل الصوتي في الحلزون أو في العصب القواعي أو المراكز العصبية؟ صمم عصبي
- ٨- اهتزاز الغشاء القاعدي بشكل موجي؟ تبدل العلاقة المنسية بين الخلايا الحسية والغشاء الساتر، فتتشتت الأهداب
- ٩- فتح بوابات قنوات البوتاسيوم وانتشار شوارد البوتاسيوم إلى الداخل؟ زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية وتشكيل كمون مستقبل.

الدرس ٤+٥

- ١- التوزع غير المنتجات للخلايا البصرية (العصبي والمخاريط) في الشبكية؟ يؤدي لاختلاف حدة الأ بصار في مناطق الشبكية المختلفة
- ٢- تبيه أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية؟ يتولد الإحساس بروزية اللون الأبيض
- ٣- تفعيل الرودوبيسين بالضوء الضعيف؟ تشويط مركب ترانسديوسين
- ٤- ثلاثة أنواع من المخاريط تختلف أصبغتها عن بعضها بنوع البوتاسيين؟ الاختلاف حساسيتها لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة
- ٥- خيالان على منطقتين متاظرتين من الشبكية يصلان عبر المسالك البصرية إلى المخ؟ يقوم المخ بدمجهما معًا مما يؤمن رؤية واضحة (مجسمة)
- ٦- تختثر الألياف البروتينية بعدسة العين (الجسم البلوري)؟ الساد (الماء الأبيض)
- ٧- نمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط لتعتد إلى المسافة بين وريقتها ويسرب الدم منها؟ اعتلال الشبكية السكري
- ٨- فقدان ارتباط وريقتى الشبكية ببعضهما نتيجة الرضق القوى المفاجئ أو نقص كمية الخلط الزجاجي مما يسبب العمى؟ انفصال الشبكية

وصول السيالات العصبية إلى قشرة المخ الناتجة عن تبليه نوع واحد من المخاريط أو نوعين منها أو أنواع المخاريط الثلاثة بنسب مختلفة؟ الإحساس بروية لون معين.

آلية الرتب في دروس المستقبلات الحسية

رتب مراحل عمل المستقبل الحسي (دون شرح) ٢٠٢٠:

الاستقبال: فتح أو إغلاق بوابات القنوات الشاردية في غشاء الخلية الحسية.

التحويل الحسي: تغير نفاذية الغشاء للشوارد مما يؤدي إلى تبدل استقطاب غشاء الخلية الحسية يسمى هذا التبدل كمون مستقبل.

النقل: تزداد قيمة كمون المستقبل إلى الحد الذي يكفي لإثارة كمونات عمل تنتقل بشكل سيالات عصبية إلى المركز العصبي.

الإدراك الحسي: يقوم المركز العصبي بمعالجة المعلومات الواردة مولداً إدراكاً حسياً للمنبه.

رتب شروط المادة لتبيه أهداب الخلية الحسية الشمية (آلية الاستقبال الشمي) ٢٠٢٠:

بنج عن ارتباط جزيئات المادة الكيميائية بالمستقبلات في أغشية الأهداب، تشريط أنظيم أدتيل سكلاز الذي يحول مركب ATP إلى AMP^c.

فتح قنوات الصوديوم في الغشاء نتيجة ارتباط مركب AMP^c بها وتدخل شوارد الصوديوم إلى الخلية مما يسبب زوال استقطاب الغشاء وتشكيل كمون مستقبل.

إثارة كمون عمل في محوار الخلية الشمية ينتقل عبر المشابك إلى الخلية التاجية فت تكون سيالة عصبية تنتقل عبر ألياف العصب الشمي إلى مراكز الإحساس الشمي.

رتب مراحل الاستقبال الذوقي (حلو - مر // مالح حامض) ٢٠٢١:

قنوات المالح والحامض

مستقبلات الحل والمر

١- إن انتشار شوارد الصوديوم للمحاليل الملحة والحمضية (شوارد الهيدروجين) إلى داخل الخلية الحسية الذوقية يؤدي إلى زوال استقطاب غشاءها.

ترتبط المادة ذات الطعم الحل أو المر بمستقبل وعي في الغشاء مما يؤدي لتشريط بروتين G مرتب بالمستقبل * يسبب زوال استقطاب في غشاء الخلية الحسية الذوقية.

يحفز زوال استقطاب الخلية الحسية الذوقية على تحرير النواقل العصبية الكيميائية ٣- وإثارة كمون عمل في بدايات الأعصاب الفحصية الذوقية ٤- التي ترسلها إلى المركز العصبي المختص.

رتب مسار الاهتزازات الصوتية بدءاً من اهتزاز غشاء الطلبل حتى اهتزاز الغشاء القاعدي؟

يجهز غشاء الطلبل ٢- تنتقل عظيمات السمع الاهتزازات إلى النافذة البيضية ٣- يجهز غشاء النافذة البيضية.

يجهز اللمف الخارجي في القناة الدهلizophية ٤- يجهز غشاء راسينر ٥- تنتقل الاهتزازات على اللمف الداخلي في القناة القوقةية ٦- اهتزاز الغشاء القاعدي شكل موجي:

رتب آلية عمل الخلية الحسية السمعية:

يؤدي اهتزاز الغشاء القاعدي على تبدل العلاقة المعاكسة بين الخلايا الحسية والغشاء الساتر، فتتتني الأهداب.

فتح بوابات قنوات البوتاسيوم وتنشر شوارد البوتاسيوم على الداخل، مسببة زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية وتشكيل كمون مستقبل.

يحفز ذلك تحرير النواقل العصبية في المشبك مما يؤدي إلى نشوء كمونات عمل في ألياف العصب القوقي الذي ينقلها على شكل سيالات عصبية إلى مركز السمع في قشرة المخ.

رتب طبقات الورقة الداخلية العصبية من الخارج إلى الداخل؟ ٢٠٢١:

الطبقة الخارجية: تحوى على الخلايا البصرية (العصبي والمخاريط) وهي عصبونات ثنائية القطب.


طبقة المشابك العصبية الخارجية.

الطبقة الوسطى: تحوى أنماطاً خلوية عددة (عصبونات ثنائية القطب، خلايا أفتانية، خلايا مقرنية).



طبقة المشابك العصبية الداخلية.


الطبقة الداخلية: تحوى عصبونات عقدية متعددة الأقطاب تشكل محاويرها ألياف العصب البصري

رتب المناطق المميزة للضوء على الشبكية؟ ١- اللطخة الصفراء ٢- الحفيرة المركزية ٣- الشبكية المحيطية
 رتب المناطق على الشبكية حسب حدة الإبصار من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض؟
 ١- الحفيرة المركزية ٢- اللطخة الصفراء ٣- الشبكية المحيطية ٤- الشبكية الأكثر محيطية
رتب مراحل عمل العصبة بالضوء الضعيف؟



البرعم الذوقي




الآن: التفاصير العلمية (٥٠ درجة)
لدرس ١+٢+٣

- ١- المستقبل الحسي يعمل كمحول بيولوجي؟ لأنّه يحول طاقة المنبه إلى سيالة عصبية تولد إحساس خاص في المركز العصبي المختص.
- ١- تتميز المستقبلات الحسية بال النوعية؟ إذ تكيف كل منها لاستقبال منبه نوعي خاص.
- ٢- زيادة شدة المنبه تؤدي لزيادة شدة الإحساس؟ بسبب ١- زيادة عدد الخلايا الحسية المنبهة ٢- زيادة عدد كمّونات العمل التي يتبرّأها الكمون المستقبل
- ٤- أمسك قطعة جليد بيدي فأشعر بالبرودة، ثم أشعر بالألم بعد مدة زمنية، ما تفسير ذلك؟ لأن جسيمات كراوس التي تستقبل حس البرودة عتبة تتبعها منخفضة فتستبه أولاً بينما النهايات العصبية التي تستقبل حس الألم عتبة تتبعها مرتفعة

- توصف الحساسية الجلدية بأنها نقطية؟ لأن توزع المستقبلات الحسية في الجلد يكون بشكل غير متجانس.
- أكثر مناطق الجسم حساسية للبرودة أسفل القدمين؟ بسبب غزارة جسيمات كراوس فيها
- أكثر مناطق الجسم حساسية للمس الدقيق رؤوس الأصابع والشفاه؟ بسبب غزارة جسيمات مايسنر فيها
- مستقبلات الألم لها دور مهم في حماية الجسم من الآذى؟ لأنها تستجيب للمنبهات المختلفة التي تبلغ شدتها حدًا يسبب أذية في النسيج فيتولد حس.
- السرعة العالية للرسالة العصبية الناتجة عن تنبيه جسم باشيني؟ لأن الليف العصبي الذي يدخل إلى المحفظة تخين ومغمد بالخاغعين.
- استمرار حاسة الشم لدى الإنسان بالرغم من العمر القصير للخلايا الحسية الشمية؟ لأنها تتعرض باستمرار من قبل الخلايا القاعدية.
- تعرض الخلايا الشمية والذوقية باستمرار؟ لأن عمرها قصير فتتعرض باستمرار من قبل خلايا قاعدية.
- تتد المستقبلات الحسية الشمية مستقبلات أولية والذوقية ثانوية؟ الشمية: من منشا غير عصبي
- ضرورة الاستنشاق للإحساس الشمي بالرائحة؟ تؤمن عملية الاستنشاق مرور المادة الغازية أو البخارية ذات التركيز المناسب في الحفيرة الأنفية فتنحل بالسائل المخاطي وتتبه أهداب الخلية الحسية الشمية.
- أهمية وجود غدد بومان في البطانة الشمية؟ لأنها تفرز مادة مخاطية تتغرس بها أهداب الاستطارات الهيولية للخلية الشمية

الدرس ٤

- ١- أهمية اندفاع غشاء النافذة المدور جهة الأنف الوسطى؟ لامتصاص الضغط المتولد على جنبي غشاء النافذة البيضاء
- ٢- يسبب انتاء أهداب الخلية الحسية الشمية زوال استقطاب غشائها؟ بسبب فتح بوابات قنوات البوتاسيوم وانتشار شوارد البوتاسيوم إلى الداخل
- ٣- انتشار شوارد البوتاسيوم إلى الداخل لدى فتح قنواتها في أهداب الخلية الحسية الشمية؟ إن اللمف الداخلي يحوي تراكيز مرتفعة من شوارد البوتاسيوم وتراكيز منخفضة من شوارد الصوديوم عكس اللمف الخارجي

الدرس ٥

- ١- تد العصي و المخاريط (الخلايا البصرية) مستقبلات أولية؟ لأنها من منشا عصبي
- ٢- ينعد الإبصار في منطقة القرص البصري (النقطة العمياء)؟ لأنها خالية من الخلايا البصرية
- ٣- العصبية مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة الضعيفة؟ لأن صباغ الرودوبيسين يتفاوت في الضوء الضعيف فيصبح فعالاً
- ٤- المخاريط قادرة على تمييز الألوان أما العصي فلا تمييز الألوان؟ العصي: لأن صباغ الرودوبيسين متساوي الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية المختلطة
- ٥- المخاريط مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة القوية؟ لأن أصبغتها تتفاوت بشروط الإضاءة القوية وتصبح فعالة
- ٦- حدة الإبصار عالية بالحفيزة المركزية؟ لأنها تحتوي على مخاريط فقط وكل مخروط يقابل ليف عصبي واحد من ألياف العصب البصري
- ٧- حدة الإبصار منخفضة بالشبكة الأكثر محبطية؟ لأنها تحتوي على عصى فقط وكل ٢٠٠ عصبة تقابل ليف عصبي واحد من ألياف العصب البصري
- ٨- تصبح عدسة الجسم البلوري غير نفودة للضوء عند الإصابة بالساد؟ بسبب تخثر الألياف البروتينية بالجسم البلوري
- ٩- يتشكل للجسم العرني خيال مقلوب ومعكوس على الشبكة؟ لأن عدسة العين (الجسم البلوري) محدبة الوجهين
- ١٠- تختلف حساسية أنواع المخاريط لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة؟ لأن في شبكة العين ثلاثة أنواع من المخاريط تختلف أصبغتها عن بعضها البعض

الفتوبيسين

- ١١- (مرض دالتون) وعسى اللون الأخضر يصيب الذكور أكثر من الإناث؟ لأن مورثة المرض المترتبة محمولة على الصبغى الجنسى لا وليس لها متمة على الصبغى الجنسى

- ١٢- فرط استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعصبية في الضوء الضعيف؟ بسبب توقف دخول شوارد الصوديوم إلى القطعة الخارجية للعصبية واستدراجهما من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم

- ١٣- تشبيط النقل في العصبون تنالى القطب في حالة الراحة؟ بسبب تحرير الناقل العصبي المثبط (غلوتامات)

- ١٤- قنوات الصوديوم مفتوحة بالعصبية أثناء الراحة (الظلام) ومغلقة أثناء العمل (الضوء الضعيف)؟

أثناء الراحة: بسبب ارتباط مركب GMP، بها


- أثناء الضوء الضعيف: لأن صباغ الرودوبيسين يصبح فعالاً فينشط مركب ترانسديبوسين الذي ينشط أنظيم فوسفو دي أستيراز الذي يحول GMP فتغلق بوابات قنوات الصوديوم

١- قيمة استقطاب عصاء القطعة الخارجية للعصبة - ٠، لأن شوارد الصوديوم التي تخرج من القطعة الداخلية تعمل مضخات الصوديوم ونيوتاسيوم تدخل إلى القطعة الخارجية عبر فنواتها.

١- تختلف آلية عمل المستقبلات الضوئية عن باقي المستقبلات؟ لأن الكمون المستقبل الذي ينشأ بالخلايا البصرية ينبع عن فرط الاستقطاب وليس عن زوال الاستقطاب كبقية المستقبلات الحسية.

١- تضرر الخلايا البصرية و تداقن تدريجي في حدة الرؤية في احتلال الشبكية المركزي؟ بسبب نمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط لتمتد إلى المسافة بين وريقتها ويتسرب الدم منها.

الإعجاز: سؤال حارطه المعاهم (سيذكر بعض ما ورد منها من الكتاب أما التي يحاج الي ربط سيذكرها حلال
يدوره على السورة علماء من لم يحضر الدوره لا يعلق لأن المعلمون ما الذي سيربط على السورة مذكورة
في الأسئلة المسوقة بهذه الأوراق) + محاط طلب بياسه ((٢٠ درجة بالامتحان))



خامساً: المقارنات

المستقبلات ذات العنشأ غير العصبي (المستقبلات الثانوية)	المستقبلات ذات المنشأ العصبي (المستقبلات الأولية)	
يوجد	لا يوجد	وجود المثبت
اداء الخلية الحسية	نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين	اداء الحسن
خلايا شولتر (حسية شمية)	الخلايا التاجية	
ثنائية القطب	متعددة الأقطاب	شكل العصبون
في البطانة الشمية	في الفص الشمسي	موقع العصبون
خلايا شولتر (حسية شمية)	الخلايا الذوقية	
من منشاً عصبياً	من منشاً غير عصبي	المنشا
مستقبل أولى	مستقبل ثانوي	نوع المستقبل
يتم بواسطتها الاستقبال الشمي	يتم بواسطتها الاستقبال الذوقي	الوظيفة
حس المخونة	حس اللمس الدقيق	
النخاع الشوكي	البصلة السياسية	مكان التصالب
جيسيات روفيتي	جيسيات مايسنر	المستقبل الحسي
مستقبلات غير محفظية	مستقبلات محفظية	
تفرعات لتهابية حسية حرارة مجردة من النخاعين	يتكون من نهاية عصبية مجردة من غدد النخاعين تحيط بها محفظة تأخذ شكلًا ملائماً للاستجابة المعتلى حسب طبيعة المتباه	البنية
عتبة تتبع مرتفعة	عتبة تتبعه منخفضة	عتبة التتباه
القناة الطبلية	القناة الدهليزية	وجه المقارنة
تحت الرف العظمي والغضاء القاعدي	فوق الرف العظمي وغضاء رايستر	الموقع
المدورة	البيضية	النافذة

الشبكة الأكثر محبطية	الحفرة المركزية	حدة الإبصار
منخفضة	مرتفعة	الخلايا البصرية
عصبي فقط	مخاريط فقط	الخلايا البصرية
كل ٢٠٠ عصبية تقابل ليف عصبي واحد من الليف العصب البصري	كل مخروط يقابل ليف عصبي واحد من الليف العصب البصري	تقابل كل خلية مع الليف العصب البصري

الخواص	العص	شروط الإضاءة
إضاءة قوية	إضاءة ضعيفة	تمييز الألوان
تمييز الألوان	لا تمييز الألوان	تمييز الألوان
الفوتوبيسين	السكوتوبسين	الجزر البروتيني

القطعة الخارجية للعصبة أثناء الضوء الضعيف	القطعة الخارجية للعصبة أثناء الظلام	
مفتاحه	مفتوحة	حالة قنوات الصوديوم
لأن صباح الروذوبسين يصبح فعالاً فعالاً في تحفيز مركب ترانسديبوسين الذي ينشط أنظمـة فوسفـوـدى أستـيرـازـ الذى بـحـولـ GMPـ الذىـ GMPـ فـتـقـعـ بوـابـاتـ قـنـواتـ الصـودـيـومـ	بـسبـبـ اـرـتـبـاطـ مـرـكـبـ GMPـ بـهاـ	التفسـيرـ

الطبقة الداخلية بالشبكة	الطبقة الخارجية بالشبكة	شكل العصبونات
عصبونات متعددة القطب	عصبونات ثنائية القطب	

المضلات الدائرية للفرجية	المضلات الشعاعية للفرجية	
الجهاز العصبي الذائي القسم تغير الودي	الجهة العصبي الذائي القسم الودي	القسم العصبي الذائي الذي يؤثر عليها
تضيق الحنفة	توسيع الحنفة	تأثير ذلك على حدقة العين

قد تأتي المقارنة بشكل سؤال رب مراحل رؤيه الحال في حال اسعاد او اندراط الجسم من العين

البعد المحرفي	القوة الكاسرة	تحدب العدسة	الأربطة المعلقة	الإلياف الدائرية في العضلة الهدبية	التبديلات
يكبر	تنقص	يتناقص	يزداد توترها	تسترخي	ابتعاد الجسم عن العين
يصغر	يزداد	يزداد	يتناقص توترها	تنقلص	اقتراب الجسم من العين

سادساً: درس الحال

- ـ في الشبكية نوعان من الخلايا البصرية هما: العصي والمخاريط.
- ـ أي منها يتتبه بالضوء الضعيف؟ العصي **يتتبه بالضوء الخفيف**.
 - ـ لماذا تختلف أصبغة المخاريط عن بعضها؟ وماذا ينتج عن تتبه أنواعها الثلاثة بنسب متساوية؟ تختلف أصبغة المخاريط بنوع الفوتوبسين وبالتالي تختلف حساسيتها لأطوال الموجات الضوئية؛ ينتج الإحساس بروية اللون الأبيض.
 - ـ ما اسم المنطقة على الشبكية التي تحوي مخاريط فقط؟ ولماذا تكون حدة الإبصار فيها عالية؟ الحفرة المركزية أو النقرة، وذلك لأنها تحوي مخ فقط ويتقابل المخروط الواحد مع ليف واحد من إلياف العصب البصري.
 - ـ ما أهمية الفيتامين A للخلايا البصرية؟ يشكل جذر الدهيد الفيتامين A (الريتينال) الضروري لتركيب الأصبغة الضوئية

السبب	العلاج	اعتلال الشبكية السكري	الفصال الشبكي	الحاد (لقاء الأبيض)
ـ تتمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط لتمتد إلى المسافة بين وريقتها ويتسرب الدم منها مما يسبب تضرر الخلايا البصرية وتناقص تدريجي في حدة الرؤية		ـ فقدان ارتباط وريقتي الشبكية ببعضهما نتيجة الارتطام القوي العفاجي أو نقص كمية الخاط الزجاجي مما يسبب العصي		ـ تصبح عدمة الحن معتمة تجاه الألياف البروتينية فيها
ـ تعالج الحالة بالليزر لسد تلك الأوعية الدموية وإيقاف تدفق الدم منها.	ـ استصال العدسة و زرع عدسة صناعية.	ـ لا بد من إعادة الارتباط بسرعة ويمكن ذلك بوساطة الإشعاعات الليزرية.		

ملاحظة: الأمراض الساقية قد تأتي ضمن سؤال درس الحال.

- ـ جاء إلى مركز قياس القدرة السمعية أشخاص متفاوتة أعمارهم الأول كان لديه ضعف كبير بالسمع ياحدي أذنيه و الثاني يعاني من فقدان تام للسمع على الرغم من أنه لم يتعرض لأى حادث ولم تتعرض الباحثة السمعية بفترته المخيبة لأى أذية
- ـ ماذا نسمى كل من الحالتين السابقتة - ٢ - ما الأسباب المتوقعة لكل من الحالتين السابقتين
- ـ صمم توصيلي أسبابه: نتيجة تناقص في مرونة غشاء الطبيل أو المفاصل بين عظيمات السمع ، أو غشاء النافذة البيضية .
- ـ صمم عصبي أسبابه: أذيات ضمن المستقبل الصوتي في الحلزون أو في العصب التوقيع أو المراكز العصبية .
- ـ في مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٠/١٩ وبينما أنا عائد إلى المنزل بعد انتهاءي من العمل أحسست بالبرد فجلست بجانب المدفأة فلمست المدفأة عدة مرات أشعر بالسخونة بيدي لكنني شعرت بها بجسدي ثم تصفحت الفيس بوك فلفت انتباхи صورة طائر فريد بألواته فأشهرتني
- ـ حدد الجسيمات الحسية المسئولة عن البرودة وأين تغير؟ جسيمات كراوس وتغير أسفل القدمين
 - ـ فسر ظاهرة لمس المدفأة عدة مرات بسرعة كبيرة ولم أحس بالحرارة؟ لأن زمن التتبه دون زمن الاستفاد

أين تقع الجسيمات الحسية المسئولة عن السخونة؟ وما هي الخلايا البصرية التي ميزت من خلاياها نون الطائر؟ جسيمات روفيني تقع في في أذمة الجلد وفي المفاصل أما الخلايا البصرية فهي المخاريط

التسليف الهرموني (العدد الصغرى)

ولا: اختار الاجابة الصحيحة: (الدرس الأول)

تنقل الجزيئات الإشارية عن طريق الدم من المحفز إلى الخلايا الهدف كهرمونات النخامة الإمامية والدرقية:						١
ج	ب	إشارات ذاتية	ج	إشارة عصبية	د	جميع ما سبق خطأ
تؤثر الجزيئات الإشارية في الخلايا القريبة جداً من مصدر الإشارة مثل هرمون الغاسترين						٢
ج	ب	الفيرومونات	ج	إشارة صفاوية	د	إشارة ذاتية صفاوية
تؤثر التواقيع العصبية في الخلايا المجاورة من خلال مشابك لتحفيز استجابات في الخلايا الهدف كالأصنيل دونين						٣
ج	ب	إشارة ذاتية	ج	إشارة مشبكية	د	إشارة صفاوية
ترتبط الإشارات المفرزة من الخلية بمستقبلات على ذات الخلية أو خلايا من النوع ذاته لتحفيز استجابتها بها مثل الاستروجين						٤
ج	ب	إشارات ذاتية	ج	الفيرومونات	د	جميع ما سبق خطأ
تشتت الهرمونات العصبية إلى مجرى الدم وتحفيز استجابات في الخلايا الهدف في أي مكان من الجسم (نور درينشن)						٥
ج	ب	الفيرومونات	ج	إشارة ذاتية صفاوية	د	إشارة ذاتية
مواد كيميائية تفرز من كائن وتنقل بوساطة الب lille لتأثير في كائن آخر						٦
ج	ب	الفيرومونات	ج	إشارة ذاتية	د	إشارة صفاوية
إحدى هذه الغدد مختلطة:						٧
ج	ب	الغدة العرقية	ج	البنكرياس	د	الغدة الصماء
يؤثر هرمون ADH في :						٨
ج	ب	نهاية الأنابيب البولى	ج	في الكلية	د	في النسأة
يوجد العديد من الخلايا الغدية الصفاوية العبعدرة أو المجنحة في أماكن متفرقة من الجسم مثل:						٩
ج	ب	النسج الكبدية والكلوية والتلبيني	ج	الوطاء ومخاطية المعدة	د	الأنفاء
هرمون يؤثر في النسج الضامنة والنسيج الظهاري لتحفيزها على الانقسام والتمدد						١٠
ج	ب	هرمون GH	ج	هرمون TSH	د	هرمون FSH
هرمون يؤثر بشكل رئيس في الكبد مودعا إلى تحريير عوامل النمو (السومنومين) التي دور في النم وتحفيز بثيل مهاتر نمو الغضروف والعظام						١١
ج	ب	هرمون GH	ج	هرمون TSH	د	هرمون FSH
أحد الصفات التالية تعد من صفات الطفل المصابة بنقص هرمون GH						١٢
ج	ب	طولة أقل من 1,2	ج	يتمتع بقوى عقلية طبيعية	د	جميع ما سبق صحيح

١	أحد الأعراض التالية ليست من أعراض الإصابة بمرض غريفز:					
	زيادة الوزن	د	أ+ب	ج	جحوظ العينين	نقصان الوزن
٢	أحد الأعراض التالية لا يعد صحيحاً لنقص إفراز الدرقية عند البالغ:					
	تخلف عقلي	د	حساسية مفرطة اتجاه البرد	ج	الخمول	زيادة الوزن
٣	أحد الأعراض التالية لا يعد صحيحاً لنقص إفراز الدرقية عند الأطفال:					
	جحوظ العينين	د	تأخر بالنمو الجسدي	ج	قمامدة بالشكل	تخلف عقلي
٤	أحد الثنائيات التالية بعد عمله متعاكس بتنظيم مستوى الكالسيوم بالدم:					
	ب+ج	د	PTH-CT	ج	PTH-TSH	PTH-GII
٥	أحد الثنائيات التالية بعد عمله متعاكس :					
	GH-PTH	د	أ+ب	ج	الميلاتونين-MSH	ACTH-PTH
٦	إحدى هذه الهرمونات لها دور في تنظيم الدورات التكاثرية لبعض الحيوانات بوجود فصول تكاثر محددة					
	الغدة النعابية	د	الباراثورمون	ج	الكالسيتونين	الميلاتونين
٧	أحد هذه الهرمونات يدخل اليود في تركيبها:					
	الميلاتونين	د	السيروتونين	ج	التيروكسين	التيرونين والتيروكسين
٨	البروتينات الانظمية التي تقوم هرمونات T_4 - T_3 بتركيبتها لها التأثيرات التالية:					
	جميع ما سبق صحيح	د	زيادة عدد الجسيمات الكوندرية	ج	زيادة إنتاج ATP والحرارة	تشفيط تفاعلات الاستقلاب
٩	أحد الترتيبات التالية يعتبر صحيح لسلسل عمل الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية:					
	رسول ثان - بروتين G - رسول أول	د	بروتين G - رسول أول - رسول ثان	ج	رسول أول - بروتين G - رسول ثان.	رسول أول - رسول ثان - بروتين G.
١٠	أحد هذه الثنائيات الهرمونية لا تعمل بشكل متعاكس:					
	ACTH-GH	د	الكالسيتونين-الباراثورمون-MSH	ج	الأنسولين - الجلوکاجون	
١١	يتم المحافظة على الحد الفيزيولوجي للهرمون في الدم بواسطة آلية					
	التلقييم الراجع السلبي	د	التلقييم الراجع الايجابي	ج	التلقييم الراجع	
١٢	زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما تؤدي إلى زيادة إفراز احدى هرمونات الوطاء و هرمون النخامة الإمامية وبالتالي زيادة إفراز هذه الغدة للهرمون في المرحلة الأخيرة.					
	جميع ما سبق صح	د	أ+ب	ج	التلقييم الراجع السلبي	التلقييم الراجع الايجابي
١٣	زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما فوق المستوى الطبيعي تؤدي إلى تشبيط الوطاء والنخامة الإمامية . فتقلل من إفراز العوامل المطلقة و الهرمون المنبه للغدة فيقل إفراز الغدة لهرموناتها وبالعكس					

اسم الهرمون	مكان الإفراز (موقع)	الطبيعة الكيميائية	مكان توضع المستقبل	الدور (الوظيفة)
هرمون MSH	النخامة الامامية	بروتينية	في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطحه	ينشط خلايا الجلد لإنتاج الميلانين
هرمون GH	النخامة الامامية	بروتينية	في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطحه	ينظم نمو العظام والأنسجة الأخرى
هرمون (ACTH)	النخامة الامامية	بروتينية	في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطحه	ينشط قشرة الكظر لإفراز هرموناتها
هرمون (TSH)	النخامة الامامية	بروتينية	في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطحه	ينشط الغدة الدرقية لإفراز هرموناتها
هرمون البرولاكتين (PRL)	النخامة الامامية	بروتينية	في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطحه	ينشط إنتاج الحليب في الغد الندي
الهرمون المانع لإدرار البول ADH	خلايا عصبية أجسامها بالوطاء	بروتينية	في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطحه	تحكم بكمية الماء المطرد مع البول عن طريق إعادة امتصاص معظم الماء المرتبط داخل الأنابيب البوئي إلى الدم
هرمون الأكسينتوسين (OXT)	خلايا عصبية أجسامها بالوطاء	بروتينية	في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطحه	عند الانثى: تقلص عضلات الرحم الملساء أثناء الولادة وعودة الرحم لحجمه الطبيعي بعد الولادة ويعدل على إفراط الحليب من ثديي الأم المرضع عن طريق تقلص العضلات الملساء المحاطة بالجيوب المفرزة للحليب بالثدي عند الذكر: تقلص العضلات الملساء بالأسهور والبروستات مسبباً نفع السائل المنوي في الأسهر وال nokf
هرمون الكالسيتونين (CT)	من الخلايا C في الغدة الدرقية			١- يضبط إخراج الكالسيوم من العظام - زيادة طرح الكالسيوم من البول تقوم الهرمونات T4 و T3 بتشريع المورثات لتركيب كم أكبر من البروتينات وهذه البروتينات على نوعين: ١- بنائية: تستخدم لبناء الخلايا في عملية النمو وخاصة الجملة العصبية في المرحلة الجنينية ومرحلة الطفولة. ٢- وظيفية (أنزيمات) : تستخدم بالإضافة لجزيئات الطاقة ATP التي يزداد إنتاجها من الجسيمات الكوندرية بتأثير الهرمونين في زيادة معدل الاستقلاب الأساسي ويرافق ذلك زيادة توليد الحرارة.
هرمون التيروينين T3 والتيروكسين T4	من الخلايا الظهارية في الغدة الدرقية	أمينية	في النواة والجسم الكوندرى	
هرمون الباراثورمون (PTH)	الغدد جارات الدرقية			يقوم مع الكالسيتونين المفرز من الدرقية بتنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفات بالدم
هرمون الألدوستيرون - هرمون الكورتيزول - القشرية الجنسية -	من قشر الكظر	ستيرويدية	داخل الهيولى	

مراجعة

له تأثير مثبط، ومنشط في العدالة والعصبية	في الغشاء الهيولي	أمينية	لب الكظر	هرمون الأدينيلين النورادرينالين
تفتح البشرة- تنظيم الساعة البيولوجية بالجسم	في الغشاء الهيولي	أمينية	المادة السوداء بجذع الدماغ وكميات قليلة من لب الكظر	الدوبارمين
يحفزان الغدد الجنسية لافراز هرمون	النواة	أمينية	الغدة الصنوبرية	هرمون الميلاتونين
	في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطحه	بروتينية	النخامة الأمامية	FSH/LH

الموقع

مبعثرة أو المجتمعة في أماكن متفرقة من الجسم (الوطاء- النسيج الكبدي- الكلوي- القلبي)	الخلايا الخدية الصحاوية	اسم البنية
على الوجه السفلي للدماغ وترتبط بالوطاء بوساطة السويقية النخامية	الغدة النخامية	
تقع في العنق أمام الرغامى تحت الحنجرة	الغدة الدرقية	
على السطح الخلفي لفصي الغدة الدرقية	الغدد جارات الدرق	
فوق القطب العلوي للكلية الموافقة	الغدة الكظرية	
أمام الحدبات التوعمية الأربع بالدماغ	الغدة الصنوبرية	

الوظيفة

يقوم بتنشيط إنزيم الأدينيل سيكلاز	G بروتين	اسم البنية
يقوم بتحويل ATP إلى cAMP	أنظيم الأدينيل سيكلاز	
يقوم بالعديد من التأثيرات منها تنشيط أنظيم تفاعل يؤدي إلى حدوث الإثر الهرموني المطلوب	cAMP	
ضبط مستوى سكر العنب (الغلوکوز) المنحل في الدم عند الحد الطبيعي (١٠٠ - ١١٠ مغ/ ١٠٠ مل من الدم)	هرمون الانسولين و الغلوكاغون	
يبعد عن الازдан الداخلي ويفاقم التغيير	التقييم الراجع الايجابي	
ضروري للارتفاع الداخلي ويميل نحو الحالة الطبيعية	التقييم الراجع السلبي	
يعاد امتصاص الشوارد المقيدة إلى الدم	الفرع الصاعد من عروة هائلة	
يعاد امتصاص الماء فيه إلى الدم	الفرع الهازي من عروة هائلة	

ثالثاً: اعط تفسيراً علمياً لكل معايير:

١. تعد الغدة النخامية أهم الغدد الصماء لأنها تسيطر على عمل معظم الغدد الصماء الأخرى.

٢. زيادة إفراز هرمون النمو لدى البالغين يسبب تضخم غير متناسب بعظام الأطراف؛ لأن عظام الأطراف تنمو عرضاً أكثر من نموها طولاً.

المدرس: أحمد حيدر الشنخ

مراجعة شاملة للمنهج بطريقة ورقة الامتحان الأخير

تكون غالبية الهرمونات المفرزة من الغدد الصماء مرتبطة ببروتينات بلازما الدم؛ لتشكل مخزن احتياطي للهرمون في الدم يتفاوت عند الحاجة كما ان نقص هرمون ADH بسبب الإصابة بالسكري الكاتب؟ لأن معظم الماء الذي يشربه المريض لا يعاد امتصاصه في نهاية الانابيب البولية (النفرونت) للثدي دور في نمو الغضاريف والعظام؛ لأن الثدي يحرر عوامل النمو والتي تحفز بشكل مباشر نمو الغضاريف والعظام بعد النسج الكبدي/ الكلوي/ القلبي/ المعدني غدة صماء؛ لأنه يحتوي خلايا غدية صماء يحقق ارتباط الوطاء بالغدة النخامية الخلفية اتصالاً عصبياً؛ لأن النخامة الخلفية تحتوي على محاوير لعصبونات توجد أجسامها بالوطاء وتفرز أجسام هذه العصبومنات هرمونات تنتقل عبر محاويرها إلى النخامة الخلفية.

بعد هرمون OXT هرمون مسهل للولادة؟ لأنه مسؤول عن تقلص عضلات الرحم الملساء في أثناء الولادة. تعدد هرمونات النخامة الخلفية عصبية؛ لأنها تفرز من خلايا عصبية أجسامها توجد بالوطاء ومحاوير الخلايا العصبية تنقلها للنخامة الخلفية. يفرز هرمون ADH عند الحيوانات الصحراوية بشكل كبير؟ لتقليل كمية الماء المطروح مع البول كونها تعيش في بيئة قليلة الماء. أهمية الغلوبولين الدرقي؟ لأنه يعد أساساً لهرمونات الدرقية. تمتلك الغدة الدرقية تروية دموية غزيرة جداً؟ لتسهيل عملية التبادل بين خلاياها والدم.

مرض تضخم الغدة الدرقية؟ بسبب نقص اليود بالغذاء الذي يؤدي لإستمرار النخامة الأمامية يافراز TSH وزيادة الدرقية من إفراز الغلوبولين فيزاد حجمها.

البالغ الذي لديه زيادة يافراز الدرقية يعني من جحود العينين؟ بسبب حدوث الوذمة الالتهابية بالأنسجة خلف كرة العين للميلاتونين دور في ضبط الدورة اليقاعية اليومية للجسم؟ لأن الميلاتونين يزداد إفرازه بساعات الليل (الظلام) ويقل بساعات النهار أي بوجود الضوء. تتميز الهرمونات بتأثيرات خلوبية نوعية؟ (أن الخلايا الهدف للهرمون تمتلك مستقبلات بروتينية نوعية تعرف إلى الهرمون دون غيره). تجتاز الهرمونات الستيرونية الغشاء الهيولي للخلية الهدف؟ (أن طبيعتها الكيميائية تسمح لها بعبور الغشاء الهيولي) يحفز التستوسترون زيادة حجم وقوه العضلات؟ لأنه يؤدي إلى زيادة إنتاج أنزيمات وبروتينات بنائية في ألياف العضليات الهيكلية يؤدي إلى زيادة حجم وقوه العضلات.

يتحول معظم التيروكسين إلى تيرونين في الهيولي؟ لأن فعالية التيرونين نحو أربعة أضعاف التيروكسين

وجه المقارنة	الإشارة (الرسالة)	السرعة ومدة التأثير	التنسيق الهرموني
نوع الارتباط مع الوطاء	نوافل كيميائية تسبب تشكيل سلالات عصبية	سريع قصير الأمد	بطيء وطويل الأمد
مصدر هرمونات لكل منها	الخلايا المفرزة فيها	النخامة الأمامية	مواد كيميائية (هرمونات)
وجه المقارنة	الأدرينالين	النخامة الخلفية	ارتباط عصبي
يعدان من (الهرمونات):	عندما يتم تحريرهما إلى مجرى الدم	عندما يتم تحريرهما في المشابك	تنتقل عن طريق الدم واللمف
وجه المقارنة	الأكسيتوسين	عصبية صماء	هرمون النمو
نوع الإشارة	البرولاكتين	عصبية صماء	عصبية صماء
مكان الإفراز	النخامة الأمامية	النخامة الأمامية	خلايا عصبية تقع أجسامها بالوطاء
الطبيعة الكيميائية	بروتينية	بروتينية	بروتينية
التأثير على الغدد المنتجة للحليب	ينشط إنتاج الحليب في الغدد الثدية	يعمل على إفراج الحليب من ثديي الأم المرضع عن طريق تقلص	يعمل على إفراج الحليب من ثديي الأم المرضع عن طريق تقلص

الهيكلات المنساء المحبيطة بالجريب المفرزة للحليب بالثدي		
البارانورمون	الكالسيتونين	وجه المقارنة
من الغدد جارات الدرقية	من الخلايا () في الغدة الدرقية	الغدة التي تفرز كل منهما
زيادة اخراج الكالسيوم من العظام	ينبسط اخراج الكالسيوم من العظام	تافر كل منها على نسج العظام
زيادة امتصاص الكالسيوم من البول وإعادته للدم	زيادة طرح الكالسيوم من البول	تافر كل منها في الأنابيب البولية

ماذا ينتهي عن:

- ١- زيادة افراز هرمون النمو عند الأطفال؟ العملقة
- ٢- نقص هرمون النمو عند الأطفال؟ القرامة
- ٣- زيادة افراز هرمون لدى الشباب؟ تسبب نمو العظام التي لا تزال تستجيب لهرمون النمو لعظم الوجه والبدن والقعنين مودية التي تضخمها غير متناسب حيث تنمو العظام عرضاً أكثر من نموها طولاً.
- ٤- فقدان اتصال الغدة النخامية بالوطاء؟ تفقد وظائفها لفقدانها الارتباط العصبي والنمي مع الوطاء.
- ٥- نقص افراز هرمون ADH عن الحد الطبيعي؟ يؤدي إلى زيادة كمية الماء المطرودة مع البول (سكر كائب).
- ٦- نقص البول بالغذاء استمرار النخامة الأمامية بافراز TSH وزيادة الدرقية من إفراز الغلوبولين فيزاد حجمها (مرض تضخم الغدة الدرقية)
- ٧- خلل الدرقية بافراز هرموني T3-T4 في الطفولة وعند البالغ؟ تأخر واضح في النمو الجسدي والعقلي أما عند الكبار: زبادة الوزن والخدول وحساسية مفرطة تجاه البرد.
- ٨- ارتباط الهرمون بمستقبله النوعي؟ يؤدي إلى تفعيل سلسلة من التفاعلات ضمن الخلية بحيث تؤدي كمية ضئيلة من الهرمون إلى فعل ضخم
- ٩- ارتباط الهرمون ذو المستقبل الغشائي بالسطح الخارجي لمستقبله؟ تشبيط عمل البروتين G
- ١٠- ارتباط الهرمون المستيرويدي مع المستقبل البروتيني بالهبولي؟ تشكيل معقد (هرمون - مستقبل)
- ١١- ارتباط قسم من الهرمونات الدرقية بالمستقبل على الجسم الكوندرى؟ يسرع إنتاج ATP

ترتيب كلام ملحوظ:

مراحل تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية:

- ١- ينتقل الهرمون المفرز من الغدة (رسول أول) بوساطة الدم والتلف ليصل إلى الخلايا الهدف
- ٢- يرتبط الهرمون بالسطح الخارجي للمستقبل مما يؤدي إلى تشبيط عمل البروتين G
- ٣- يقوم البروتين G بتشبيط أنزيم الأدينيل سكلاز الذي يقوم بتحويل ATP إلى cAMP (رسول ثان)
- ٤- يقوم cAMP (وظيفة)؟ يقوم بالعديد من التأثيرات منها تشبيط تنظيم تفاعل الذي يؤدي إلى حدوث الأثر الهرموني المطلوب

مراحل تأثير الهرمونات ذات المستقبلات داخل الخلوية:

الهرمونات المستيرويدية:

- A. تجذب الهرمونات المستيرويدية الغشاء الهبولي للخلية الهدف (فسر) ٢٠١٢: لأن طبيعتها المستيرويدية تسمح لها بعبور الغشاء الهبولي ذي النسمة
- B. ترتبط الهرمونات المستيرويدية بالمستقبل البروتيني في الهبولي لتشكل معقد (هرمون - مستقبل)
- C. ينتقل المعقد من الهبولي إلى النواة
- D. يقوم بتفعيل مورثات محددة مسؤولة عن تركيب بروتينات جديدة (أنزيمية - بنائية) تسبب حدوث الأثر الهرموني

الهرمونات الدرقية:



النيروكسين

تنقل معظم الهرمونات إلى النواة لترتبط بمستقبلات فيها.

يؤدي ذلك إلى تنشيط مورثات محددة مسؤولة عن تركيب إنزيمات استقلابية جديدة.

يرتبط الجزء المتبقى من الهرمونات بمستقبلات موجودة في الجسم الكوندرى لتسرع إنتاج ATP.

الوطاء



منطع مجيري في الدرقية

الغدة الدرقية

لاحظ الشكل المجاور، ثم اجيب:

. ما تأثير الوطاء على الغدة الدرقية؟

رُز الوطاء هرمون TRH الذي ينتقل بوساطة الأوعية الدموية إلى النخامة الأمامية فتفرز هرمون TSH الذي ينتقل بوساطة الدم ليؤثر في الغدة الدرقية فتفرز هرموني T_3 و T_4 .

. مَاذا ينتج من زيادة مستوى هرموني T_3 و T_4 ؟

نخاع مستوى الهرمونين T_3 و T_4 عن المستوى الطبيعي يؤثر ذلك في الوطاء فيقلل من إفراز TRH

وثر في النخامة الأمامية فتقلل من إفراز TSH فينتج عن ذلك العودة إلى وضع التوازن

. مانوع التلقيم الراجع في هذه الحالة؟ وما أهميته؟ تقييم راجع سلبي، لتحقيق التوازن الداخلي أو
استباب

لاحظ المخطط الآتي، ثم اجيب عن الأسئلة الآتية:

. ما تأثير زيادة إفراز الحليب لدى الأم المرضع؟

بـ الوطاء لإفراز المزيد من الأكسيتوسين.

. مانوع التلقيم الراجع في هذه الحالة؟

تقييم راجع إيجابي

. أين يقع المستقبل النوعي لهرمون الأكسيتوسين؟

الفشائ الهيولي للخلية الهدف.

التجمع _ التعليمي

@bak111

(الأوكسينات)

أولاً: اختر الإهادة الصحيحة لكل ممالي:

1							
إشارة عصبية	د	الجبرلينات	ج	الأوكسينات	ب	مواد التنسيق النباتية	النباتية
الاوكسين يتشكل في القمة وينتقل إلى المنطقة التي تليها بتأثير:							٢
جميع ما سبق	د	أ+ب	ج	الانتشار	ب	عامل الجاذبية الأرضية	٣
حموض عضوية ذات وزن جزيئي مرتفع تنتج بكميات قليلة وتنشط النمو في النبات							٤
إشارة عصبية صماء	د	الأوكسينات	ج	الفيرمونات	ب	التربع	٥
إن تعرض بعض النباتات المغيرة لدرجات الحرارة المنخفضة (+ درجة) لمدة ٢-٣ أسابيع تدفع معظم النباتات لازهار بسبب ازدياد							الجبرلينات
إشارة صماء	د	أ+ب	ج	الأوكسين	ب		
غاز له القدرة على الانتشار خلال المسافات بين خلويات النبات وتزداد كمية الهرمون المنتج كلما ازدادت الثمار نضجا							٦
السايتوكينين	د	أ+ب	ج	الإيتلين	ب	الأبيسيك	
ثمار مبايض أزهارها تحوي كميات كافية من الأوكسين لتشكل الثمرة							
أ+ب	د	التربع	ج	التكوين البكري الصناعي	ب	التكوين البكري الطبيعي	٧
أحد هذه الهرمونات النباتية مسؤول عن تسريع نضج الثمار وتساقطهاو تساقط الأوراق الهرمة							
الإيتلين	د	أ+ب	ج	الأوكسينات	ب		
أحد هذه الهرمونات النباتية مسؤول عن تشيط استطاله خلايا النبات و السيادة القمة النامية والانجداب الضوئي والارضي							٨
الإيتلين	د	الأوكسينات	ج	الأبيسيك	ب	الأوكسينات	
أحد هذه الهرمونات النباتية مسؤول عن تشيط انقسام الخلايا والنمو والتمايز وتأخير الشيخوخة							٩
السايتوكينين	د	أ+ب	ج	الأبيسيك	ب	الأوكسينات	
أحد هذه الهرمونات النباتية مسؤول عن تشيط إنشاش البذور وتشيط استطاله الساق ونمو الأوراق وتنشيط عمليات الإزهار ونمو							١٠
الإيتلين	د	أ+ب	ج	الجبرلينات	ب	الأوكسينات	
أحد هذه الهرمونات النباتية مسؤول عن تشيط نمو البراعم والبنور وإغلاق العسام خلال الجفاف							١١
حمض الأبيسيك	د	أ+ب	ج	الأبيسيك	ب	الأوكسينات	
غمد مسدود الذروة يحيط بالورقة الأولى لنباتات الفصيلة النجيلية							١٢

القوليبين	د	ا+ب	ج	الاغار	ب	دم ضوئي	١
				مادة جيلاتينية سكرية تستخرج من أحد الطحالب البحرية (محلول مائي).			١٣
القوليبين	د	الاغار	ج	دم انتزاعي	ب	دم ضوئي	١

الوظائف والواقع وماذا ينتج عن ذلك

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
	في القمم النامية	الخلايا الميرستيمية
تشطيط استدلة خلايا النبات زيادة القمة النامية الانجداب الضوئي والأرض	رشيم البذرة والقمم النامية والأوراق الفتية	الأوكسينات
تشطيط إنتاش البذور تشطيط استدلة السوق ونمو الأوراق تشطيط عمليات الإزهار ونمو الشعر	الأوراق الفتية والقمم النامية الجذور بكميات ضئيلة	الجبرلينات
تشطيط انقسام الخلايا ونمو وانتمايز تأخير الشيخوخة	الجذور	المایتوکینينات
تشطيط نمو البراعم والبنور إغلاق انسام خلل الجفاف	الأوراق و السوق	حمض الابسبيك
سرريع نضع التمار وتساقطها و تساقطة الأوراق الهرمة	التمار الناضجة والأوراق الهرمة جميع الخلايا الحية عموما	الإيتلين
ضخ البروتونات من السيتوبلازم إلى الجدار الخلوي.	في الغشاء السيتوبلاسمى للخلية	مضخات البروتون


ثلا: اعط تفسيرا علميا لكل معايير:

- عند تنشيط بروتين وتدí بجدار الخلية ترداد مرونة الجدار الخلوي؟ لأن عديدات السكر تصبح معرضة لتأثير أنزيم مفك يعمل على تفطع انسياب متعددة الرابطة بين ألياف السيلولوز فترداد مرونة الجدار الخلوي.
 - الاستطالة الناتجة عن تأثير الأوكسجين غير قابلة للعكس؟ بسبب ترسب ألياف سيلولوز ومواد جدارية جديدة تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس.
 - بعد انتقال الأوكسجينات بالنبات قطبي؟ تنتقل الأوكسجينات في اتجاه واحد داخل النبات من القمة إلى القاعدة.
 - لا تراكم الأوكسجينات ضمن النبات؟ لأن تأثيرها مؤقت فتتحلل الأوكسجينات بطيئتين:
 - هم ضوئي: يتفكك الأوكسجين داخل الخلايا بتأثير الضوء إلى مركبات بعضها مثبطة للنمو.
 - هم أنزيمي: تحتوي معظم أنسجة النباتات على الأنزيمات المؤكسدة للأوكسجينات.
 - نمو النبات المزروع في العتزل باتجاه مصدر الضوء؟ نتيجة لزيادة تركيز الأوكسجين في الجانب المظلل أكثر من نمو الجانب المضاء.
 - يختلف تركيز الأوكسجين بين طرفي كوليوبتيل المعرض لضوء جانبي المظلل؟ الأوكسجينات في الطرف المضاء تتخرّب بفعل الضوء وينتـج عن ذلك مركبات تعقـل النمو.
 - الجذور الموضوعة أفقـياً تنمو نحو الأعلى؟ تتجـمع الأوكسجينات بتركيز مرتفـع بالجزء السفلي للساـق بتأثير الجاذبية الأرضية والتركيز العالـي مثـبـطة للنمو في الجذر فـينـمو الجزء العـلـوي أكثر من الجزء السـفـلي.

- ٨- الانجداب الأرضي للساقي والجذر ليادرة موضوعة أفقياً؟ ينمو الساق نحو الأعلى أي انجداب ارضي سالب بينما ينمو الجذر نحو الأسفل أي انجداب ارضي موجب
- ٩- رشّ أزهار العنبر بالأوكسجينات يسمح بنمو النمار بشكل أكبر
رابعاً: ماذا ينتج عن:
- ١- وصول الأوكسجين للخلية الهدف؟ تتشطط الأوكسجينات مضخات البروتون في الغشاء السيتوبلازمي للخلية فتعمل هذه المضخات على ضخ البروتونات إلى السيتوبلازم إلى الجدار الخلوي.
 - ٢- انخفاض درجة (III) في الجدار الخلوي؟ ونشط بروتين وتدى (شكل إسفين) يعمل على فصل ألياف السيلولوز عن عديدات السكر.
 - ٣- تنشيط بروتين وتدى بجدار الخلية؟ يعمل على فصل ألياف السيلولوز عن عديدات السكر.
 - ٤- تعرض النباتات لتيار هوائي أو تعرضها لغاز CO_2 المتباطل لهرمون الإيثيلين؟ يتاخر نضج ثمارها
 - ٥- تغمس قواطع العقل النباتية وخاصة صعبنة التجذير بمحلول منخفض التركيز للأوكسجين؟ لتنشيط تكوين الجذور العرضية في قواطعها
 - ٦- رشّ الأزهار غير الملقة بالأوكسجينات؟ يؤدي إلى تكون بكري للثمرة (ثمار بلا بذور)
 - ٧- ثمار الموز لا تحتوي بذوراً لأن مبايض أزهارها غير الملقة تحتوي كميات كافية من الأوكسجين لتشكيل الثمرة
 - ٨- رشّ أزهار العنبر بالأوكسجينات؟ تزيد طول السلاميات (المسافات بين الأزهار) مما يسمح بنمو النمار بشكل أكبر.

خامساً: رتب/مخطط/مقارنات....رتب مراحل استطالة خلية نباتية بتأثير الأوكسجينات:

- ١- يصل الأوكسجين إلى الخلية الهدف تنشط الأوكسجينات مضخات البروتون في الغشاء السيتوبلازمي للخلية فتعمل هذه المضخات على ضخ البروتونات إلى السيتوبلازم إلى الجدار الخلوي.
- ٢- ينتج عن ذلك انخفاض درجة (III) في الجدار الخلوي (وسط حمضي).
- ٣- الوسط الحمضي للجدار ينشط بروتين وتدى (شكل إسفين) يعمل على فصل ألياف السيلولوز عن عديدات السكر.
- ٤- تصبح عديدات السكر معرضة لتأثير أنزيم مفكك يعمل على تقطيع السكريات متعددة الرابطة بين ألياف السيلولوز فترتّد مرنة الجدار الخلوي.
- ٥- يدخل الماء إلى داخل الخلية بتأثير الحلول وتستطيل الخلية بتأثير الضغط الانتباجي وتترسب ألياف سيلولوز ومواد جدارية جديدة تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس.



- ١- ما تأثير تغير تركيز الأوكسجين على نمو واستطالة خلية الساق في الشكل البياني (أ)؟ تزداد سرعة النمو والاستطالة حتى حد معين 10^{-5} M يتراجع معدل النمو بزيادة التركيز
- ٢- أحدد التركيز الأمثل لنمو كل من الساق والجذر والبراعم في الشكل البياني (ب)؟ السوق 10^{-5} البراعم 10^{-4} الجذر 10^{-10}
- ٣- ما تأثير التركيز الأمثل لنمو الساق على نمو البراعم والجذور؟ التركيز المناسب لنمو الساق ترتبط نمو البراعم والجذور

الجذر	الساق	تجمع الأوكسجين
يتجمع الأوكسجين بتركيز مرتفع في الجهة الأرضية للجذر بتأثير الجاذبية الأرضية	يتجمع الأوكسجين بتركيز مرتفع في الجهة السفلية للساق بتأثير الجاذبية الأرضية	التركيز المرتفع للأوكسجين
التركيز المرتفع للأوكسجين في الجذر منشط للنمو فلتنمو الجهة السفلية ذات التركيز المرتفع أكثر من الجهة العلوية ذات التركيز المنخفض	فتشتمل الجهة السفلية ذات التركيز المرتفع أكثر من الجهة العلوية	

الوحدة الثانية

الفيروسات-التكاثر عند الأحياء-التقانات الحيوية-التكاثر الجنسي
ولأن احتوى الاحيان الصحيحة: (سؤال ١٠٠ درجة)

يوضح الشكل المجاور بنية فيروس الإيدز، أي الترتيبات الآتية يوافق الأرقام المحددة للشكل



جميع مasic خطأ	د	١- غلاف ذو طبيعة دسمة ٢- كابسيد ، ٣- أنظيم RNA - ٤	ج	١- كابسيد ٢- أنزيم ، ٣- غلاف بروتيني ؛ DNA	ب	١- كابسيد ٢- أنظيم .٣- DNA ٤- غلاف بروتيني	١
----------------	---	--	---	--	---	---	---

تصف الفيروسات بمجموعة من الصفات التي تميزها إحدى العبارات الآتية لا تصف الفيروسات بدقة:

طفيليات أجبارية	د	خلية من الأنزيمات	ج	لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني	ب	أكثر عدداً من جميع الكائنات الحية.	١
-----------------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	------------------------------------	---

٢ أحد الفيروسات التالية حمضها النووي ليس (RNA)

فيفاء النبع	د	الإنفلونزا	ج	الفيروس الغدي وفيروس أكل الجراثيم	ب	الإيدز	٣
-------------	---	------------	---	-----------------------------------	---	--------	---

٤ بنى لا خلوية لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني، مجبرة على التغطيل الداخلي، لخلوها من الأنزيمات الاستقلالية

جميع مasic خطأ	د	التقانة الحيوية	ج	الجراثيم	ب	الفيروسات	٤
----------------	---	-----------------	---	----------	---	-----------	---

٥ أحد الخيارات التالية ليس صحيحاً لتصنيف الفيروسات:

طريقة تخذلته	د	نوع الكائن المضيق	ج	شكل الفيروس	ب	نوع مادتها الوراثية	٦
--------------	---	-------------------	---	-------------	---	---------------------	---

٦ تكون الفيروسات من عدد من البني التي تتشابه بين جميع أنواع الفيروسية، وقد يختص بعضها ببني لا توجد لدى غيرها من الفيروسات، إحدى الأوصاف العلمية الآتية صحيحة بالنسبة للفيروسات

تساعد بروتينات غلاف الفيروس على الارتباط بسطح الخلية المضيفة	د	الـ DNA هو المادة الوراثية لجميع أنواع الفيروس	ج	تتألف الوحيدة البروتينية من أجزاء صغيرة تسمى كابسيدات.	ب	تحوي جميع الفيروسات على غلاف خارجي من طبيعة دسمة.	٧
--	---	--	---	--	---	---	---

٧ يهد فيروس أكل الجراثيم من أشهر الفيروسات، و أكثرها دراسة من الباحثين إن كان من حيث البنية أو دورة التكاثر، إحدى العبارات العلمية الآتية لا تعد صحيحة فيما يخص فيروس أكل الجراثيم.

يتم تفكك الخلية الوراثية في دورة التحلل	د	يمكن أن ينتقل الفيروس من دورة الاندماج إلى دورة التحلل.	ج	يندمج RNA الفيروسي مع المادة الوراثية للخلية المضيفة في دورة الاندماج.	ب	تنتج في دورة التحلل فيروسات جديدة و تطلق خارج الخلية المضيفة.	٨
---	---	---	---	--	---	---	---

٩ إحدى العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لفيروس الإيدز غلافه الخارجي من طبيعة:

١٠

بروتينية و مادته الوراثية RNA و يحوى على أنتيزيمات النسخ التعاكس	د	بروتينية و مادته الوراثية RNA و يحوى على أنتيزيمات النسخ التعاكس	ج	بروتينية و مادته الوراثية RAN ولا يحوى على أي نوع من الأنتيزيمات.	ب	بروتينية و مادته الوراثية DNA أو يحوى على أنتيزيم نسخ تعاكس	أ
--	---	--	---	--	---	---	---

التكاثر عند الاحياء الدريس الثاني

إنتاج افراد جديدة بدءاً من بعضة ملقة وهذه الافراد تختلف عن الابوين ببعض الصفات

التكاثر البكري	د	التكاثر	ج	التكاثر الاجنسي	ب	التكاثر الجنسي	أ
جميع ما سبق خطأ	د	التكاثر الاجنسي	ج	التكاثر الجنسي	ب	التكاثر	أ
عملية حيوية أساسية تحفظ النوع من الانقراض و تؤمن له الزيادة العددية بما يتناسب مع الوسط المحيط	د	التكاثر الجنسي	ج	الانشطار الثنائي	ب	التجزو	أ
التكاثر	د	التكاثر الجنسي	ج	الانشطار الثنائي	ب	التجزو	أ
تطور الخلايا الجنسية الأنثوية (البيوض غير الملقة) من دون إلفاع معطية افراداً جديدة	د	التكاثر البكري	ج	التبرعم	ب	الانشطار الثنائي	أ
التكاثر الجنسي	د	التكاثر البكري	ج	التبرعم	ب	الانشطار الثنائي	أ
زيادة في كثافة المادة الحية عن طريق تركيب المواد التي تتكون منها، ولا سيما البروتينات		الكلانشو	ج	الهيذرية	ب	البرامسيوم والجرائم	أ
التجزو		أ+ب	ج	التكاثر الجنسي	ب	النمو	أ
احد الكائنات التالية يتکاثر لاجنسيا بطريقة الانشطار الثنائي:							٦
الاضاليا		الكلانشو	ج	الهيذرية	ب	البرامسيوم والجرائم	أ
احد الكائنات التالية يتکاثر لاجنسيا بطريقة النبوغ:							٧
فطر عفن الخبز		البطاطا	ج	الهيذرية	ب	البلاناريا	أ
احد الكائنات التالية يتکاثر لاجنسيا بطريقة التبرعم :							٨
برغوث الماء		عنف الخبز	ج	البرامسيوم	ب	الكلانشو والهيذرية	أ
احد الكائنات التالية يتکاثر لاجنسيا بطريقة التجزو والتجديد:							٩
الاضاليا		البرامسيوم	ج	البطاطا	ب	البلاناريا والهيذرية	أ
تکاثر البطاطا لا جنسيا بطريقة:							١٠
اج		العقل	ج	السوق الدرنية	ب	الجذور الدرنية	أ
تکاثر الاصلاليا لاجنسيا بطريقة:							١١
جميع ما سبق ف		السوق الدرنية	ج	الجذور الدرنية	ب	التبرعم	أ
التخصص الشكلي والوظيفي للخلايا لتشكيل النسج والأعضاء المختلفة							١٢
جميع ما سبق ص		أ+ب	ج	النمو	ب	التمايز الخلوي	أ

أحد الخلايا التالية تعتبر جذعية متعددة الإمكانيات:						١
نقى العظام	د	لب السن	ج	خلايا الكتلة الداخلية للكيسة الأرومية	ب	التوبيه
أحد الخلايا الجذعية التالية محدودة الإمكانيات:						٢
أ+ب	د	الكيسة الأرومية	ج	نقى العظام	ب	لب السن والخلايا الأرومية
أحد الخلايا الجذعية التالية كاملة الإمكانيات:						٣
التوبيه	د	الكيسة الأرومية	ج	نقى العظام	ب	لب السن

مائر الجنس الدرس الرابع

يمكن للخلية الجرثومية الدخول في عملية الانشطار الثنائي بوجود:						١
قناة الإقتران	د	أ+ب	ج	الجسم المتوسط	ب	الجسم الوسيط
أحد الخيارات التالية صحيح فيما يخص الخلية الجرثومية الذي له دور في هجرة الصبغين إلى طرفي الخلية في أثناء انتصافها من المنتصف						٢
الجسم الوسيط	د	الخيوط البروتينية	ج	قناة الإقتران	ب	البلاسميد

أ) الوظائف والموقع وأسئلة الرتب وسؤال ماذا ينتج بعد منها ثلاثة إسئلة مع الرسمة (مسمايات وأرسم) حميتها على ما ٣٨ درجة ((سؤال حساس، يحتاج التدقيق، بشكل جيد))

(الوظائف + الموضع) مع الانتباه إن لم ترد ضمن هذا السؤال قد ترد سؤال اختر اجابة او قارن بـ كل ما يلى:

ـ مراحل دورة التحلل لفيروس اكل الجراثيم (دون شرح/الشرح اختيار متعدد)

ـ الإنصالق : ترتبط خيوط الذيل بنقاط استقبال نوعية (موقع) موجودة على جدار الخلية.

ـ الحقن : يتلقى عصر الذيل المحيط بالمحور الم giof (ماذا ينتج) مما يمكن نهاية المحور من الدخول إلى الخلية الجرثومية حتى الماء الوراثية ويبقى الغلاف البروتيني خارجا .

ـ التضاعف : يتم تفكك DNA الخلية ويتضاعف الـ DNA الفيروس على حسابها ، كما يتم تركيب بروتينات الغلاف والذيل وأنظم التيزوزيم .

ـ التجميع : يتم تجميع مكونات الفيروس وتكوين فيروسات جديدة .

ـ الانفجار والتحرر : يتم تحرر نحو ١٠٠ إلى ٢٠٠ فيروس جديد بعد تحلل جدار الخلية الجرثومية .

ـ مراحل دورة الاندماج في فيروس اكل الجراثيم

ـ الإنصالق : ترتبط خيوط الذيل بنقاط استقبال نوعية موجودة على جدار الخلية .

ـ الحقن : يتلقى عصر الذيل المحيط بالمحور الم giof ، مثل يمكن نهاية المحور من الدخول إلى الخلية الجرثومية حتى الماء الوراثية ويبقى الغلاف البروتيني خارجا .

ـ ينبع DNA الفيروس مع DNA الموجودة في صبغ الخلية المضيفة ويتضاعف DNA الفيروس كلما تكاثرت الخلية وفي ظروف معينة يمكن أن ينفصل DNA الفيروس عن DNA الخلية ويتبع التضاعف ضمن دورة التحلل

ـ مراحل نكاثر فيروس الإيدز : ((أو رتب مراحل تكاثر فيروس الإيدز بدءاً من تضاعف DNA العبروسى ، حتى ترمع الفيروس خارج الخلية المضيفة))

ـ يُعرف فيروس الإيدز المغيبات التائية بوساطة مستقبلات بروتينية موجودة على سطحها .

ـ يندمج الفيروس مع غشاء الخلية المضيفة ، وتتفكك بروتينات الكابسيد محررة بروتينات الفيروس والRNA

ـ يقوم أنظيم النسخ التعاكسى بنسخ سلسلة من DNA الفيروسي عن سلسلة من RNA الفيروسى .

ـ تضاعف سلسلة DNA الفيروسي ويندمج خيط الـ DNA الفيروسي مع DNA الخلية المضيفة .

٥. يتم انتساخ ال RNA الفيروسي من DNA الفيروسي ويتم تركيب بروتينات الفيروس وأنظيم النسخ التعاكسي بواسطه mRNA الفعال وتنقل حوصلات من الشبكة الهيولية الداخلية الخشنة بروتينات الغلاف الخارجي للفيروس إلى الضاء الهيولي للخلية .
٦. يتم تجميع الوحدات البروتينية للكابسيد حول جزيئي RNA وأنظيمي النسخ التعاكسي .
٧. يغادر الفيروس الجديد مع الغلاف البروتيني للخلية بطريقة التبرعم .

الحلاما التي رها حملها فيروس الإيدز :

- ١- الحالاب الكسرة : يعبر تركيزها الوراثي فتصبح غير قادره على التعرف على التعرف على مولد الصد .
- ٢- الحالاب الثانية المساعدة : بحلها وبالتالي تعطل آلية الاستجابة المناعية .

C. مراحل المحو : (حارطه معاهم)

- ١- زياده عدد الحالاب : عن طريق الانعسام الحيطي .
- ٢- زياده حجم الحالاب : عن طريق تركيب المادة الحية .
- ٣- المعاير الحلوى : البصوص السكري والوطيعى للحالاب لتشكل النسخ والأعضاء المختلفة .
- D. أرب مراحل المحو الآنه لكان حتى كنتر الحالاب :
- ٤- زياده عدد الحالاب ٣- تركيب البروس ٥- زياده حجم الحالاب ٦- تعاير ١- بصلة ملطفه ٢- انفسامات حبيطه

الحالاب

- E. رب مراحل كيف تحصل على نبات من خلايا عروضية In ١١ :
- ١- حبة طلع فتية في أنبوب يحوى مواد نحو ٢- تنقسم خيطياً ٢- كتلة خلوية غير متباينة ١١ ٤- تعلق بالكوليشين ٥- كتلة خلوية غير متباينة ٢١
- ٦- تجزأ وتوزع في أنابيب مغذية ٧- تنمو معطرية نباتات جديدة مطابقة للأصل .

F. استساح الأنمار عالية الجودة :

- ١- تعزل نوى المضفة في مرحلة ٢٢ خلية قبل التمايز من أبقار عالية الجودة .
- ٢- تؤخذ بويضات من أبقار عادي وتترعرع نواتها .
- ٣- تحقن النوى المعزولة من خلايا المضفة في البويليات متزوعة النوى .
- ٤- توضع البيوض في أنابيب زجاجية تحوى أوساطاً مغذية ، فتنقسم كل منها معطرية مضفة وتترعرع المضف في أرحام أبقار حاضنة فتمو معطرية أبقار عالية الجودة .

- G. رب مراحل التكاثر الجنسي بفطر عفن الخبز بدءاً من تقابل حبطة من حبوب العطر حتى تشكل البه الملقحة .

- ١- تقابل خبيطان من خيوط الفطر يعودان لسلالتين مختلفتين ٢- ينمو بروز جانبي لكل خيط يسمى طليعة الكيس العروسي يحوى نوى جديدة وهذا يظهر حاجز عرضي يفصل كل طليعة عن الخيط وتحول الطليعة لكيس عروسي ٤- ينفتح الكيس العروسي على بعضهما وتندمج النوى - وتشكل بيضة ملقحة عديدة النوى ٢١

H. رب التبدلات التي تطرأ على البه الملقحة بعد تحسن الظروف السننة؟

- ١- بعد تحسن الظروف يطرأ على نوى البيضة العلاقة انقسامات عديدة وانتاش ٢- تعطي حامل الكيس البوغي الذي يحوى أبواغ جنسية ٣- ينفتح الكيس البوغي وتتحرر الأبواغ وتنتش كل بوغة ١١ معطرية خيوط فطرية جديدة تتبع تكاثرها لا جنسياً

الوظيفة	الموقع	اسم السننة
في مرحلة الحقن: يمكن نهاية المحور المجري من دخول الخلية الجرثومية	في الصفيحة القاعدية لفيروس اكل الجراثيم	تنظيم الليزوژيم
في مرحلة الانفجار: يحل جدار الخلية الجرثومية		
يقوم بنسخ سلسلة من DNA الفيروسي عن سلسلة من RNA الفيروسي	بجوار كل جزيئ RNA داخل الكابسيد بفيروس الايدز	تنظيم النسخ التعاكسي
يحفظ بداخله البيض البكري حتى يفقس		الجيب الحاضن عند أنثى برغوث الماء
مضاعفة الصبغة الصبغية للخلايا تصبح ٢٠		الكوليشين
	من القمم الهوائية النامية او قمة الجذر	الخلايا الغير متباينة
تعطي عدد محدود من الخلايا	نق العظام ولب السن والخلايا الأزومية	الخلايا الجذعية محدودة الامكانيات
تعطي أي نوع من الخلايا عدا المشيماء	خلايا الكتلة الخلوية الداخلية للكيسة الأزومية	الخلايا الجذعية متعددة الامكانيات
تعطي أي نوع من الخلايا	خلايا التويته	الخلايا الجذعية كاملة الامكانيات

الجسيم الوسيط (المتوسط)	مرتبط بالصبغى الجرثومي	يحتوى أنظيمات تضاعف الـ DNA ويعطى الخيوط البروتينية
قناة الاقتران الجرثومية	بين الخلتين الجرثوميتين المانحة والمستقبلة	تسمح بمرور إحدى سلسلتي DNA بلا سميد الإخصاب من الخلية الجرثومية المانحة إلى الخلية الجرثومية المستقبلة وتتضاعف في القناة أثناء مرورها
بلا سميد الإخصاب	في الخلية الجرثومية المانحة	يبحث على تشكيل قناة اقتران بين الخلتين الجرثوميتين المانحة والمستقبلة.
الخيوط البروتينية	في الخلية الجرثومية أثناء التضاعف	له دور في حجرة الصبغين إلى طرف الخلية في أثناء انبعاثها من المنتصف

ثالثاً: أعط تفسيراً علمياً

- ١- الفيروسات طفيليات نوعية؟ لأن كل نوع من الفيروسات يتغذى على نوع محدد من الخلايا غالباً ويعرف إلى الخلية الضيفة عن طريق نقاط استقبال نوعية موجودة على سطحها.
- ٢- فيروس الإيدز فيروس ارتجاعي؟ لأن مادته الوراثية RNA ويحتوى أنظيم النسخ التعاكسى الذى ينسخ سلسلة DNA الفiroسي عن سلسلة RNA الفيروسي
- ٣- الفيروسات مجبرة على التغذى الداخلى؟ لخلوها من الانظيمات الاستقلالية
- ٤- يسيطر الفيروس على الخلية الضيفة؟ ليصطعن نسخاً فيروسية عدّة عنه
- ٥- تسمية دورة التحلل بفيروس أكل الجراثيم بهذا الإسم؟ لأنّه يتم تحلل جدار الخلية الجرثومية وانفجارها ليتحرر منه فيروسات جديدة بنهاية دورة التحلل
- ٦- زيادة كتلة المادة الحية أثناء عملية النمو؟ بسبب تركيب المواد التي تتكون منها المادة الحية ولا سيما البروتين.
- ٧- تضاعف المادة الوراثية شرط لازم لبدء عملية الانشطار الثنائي؟ لكي تحصل كل خلية بنت ناتجة على نفس الكمية من الـ DNA أو للتوزع النسبي للوراثية على الخليتان الناتجتان.
- ٨- تكون الصيغة الصبغية للبيوض غير الملقحة 2n عند أنثى برغوث الماء؟ بسبب عدم انفصال الصبغيات في طور الهجرة من الانقسام المنصف.
- ٩- اختلاف الأفراد الناتجة بالتكاثر الجنسي عن أبياتها بعض الصفات؟ لأن المادة الوراثية نصفها من الأب ونصفها من الأم
- ١٠- تطابق الأفراد الناتجة مع الأصل في التكاثر اللاجنسي؟ لأن الأفراد الناتجة تملك نسخة من المادة الوراثية طبق الأصل عن أبيها
- ١١- تعتبر خلايا التوين كاملاً الإمكانيات؟ لأنها تعطي أي نوع من الخلايا، فهي تستطيع التعبير عن مورثاتها كاملة.
- ١٢- لا تستطيع الخلايا الأزوية إعطاء إلا عدد محدود من الخلايا؟ لأنها من الخلايا الجذعية محدودة الإمكانيات عند البالغ.
- ١٣- الخلايا الجذعية للبالغ أكثر فائدًة علاجية من الخلايا الجذعية الجنينية؟ لأن خطر الرفض غير موجود لدى الحصول على الخلايا الجذعية البالغة من الشخص ليعاد زراعتها في جسمه بعد معالجتها (الطعم الذاتي)، بعكس خلاياه الجذعية الجنينية التي أخذت منه في وقت سابق، لأن معدّ التوافق النسيجي الأعظمي يتميز خلال مراحل نمو الفرد.
- ١٤- تستخدم الانظيمات مع الخلايا البرانشيمية لإنتاج نباتات الأنابيب؟ لإزالة جدارها الخلوي مع الإبقاء على نشاطها الحيوي.
- ١٥- تعالج الكتلة الخلوية الناتجة عن تقسم حبة الطبع الناضجة بالكولشيسين؟ لمضاعفة صيغتها الصبغية لتصبح 2n.
- ١٦- أثر استنساخ النعجة دولي ضجة عالمية؟ لأننا حصلنا عليها من خلية متمايزة أخذت من ضرع النعجة
- ١٧- الكائن الناتج في عملية الاستنساخ يشابه الكائن مصدر النواة دالماً؟ لأن النواة تحوى المعلومات الوراثية كاملة المؤولة عن ظهور الصفات كاملة
- ١٨- تسمية النباتات السابقة بنباتات الأنابيب؟ لأنها نمت في أوساط مركبة معينة وداخل الأوعية الزجاجية وضمن المخبر
- ١٩- تستطيع البيضة الملقحة لدى فطر العفن مقاومة الظروف غير مناسبة لأنها تحافظ بخلاف أسود ثixin مقاوم للظروف غير المناسبة
- ٢٠- تتبع الخيوط الفطرية الناتجة عن إنشاش الأبواغ الجنسية تكاثره بالأبواغ؟ بسبب تحسن الظروف البيئية

- ٢١ - للجسم الوسيط دور مهم في عملية الانشطار الثنائي؟ لأنّه يحتوى على أنظيمات تضاعف DNA ويعطى الخيوط البروتينية التي لها دور في نقل الصبغين إلى طرق الخلية في أثناء انقسامها من المنتصف
- ٢٢ - بعد عملية الاقتران تصبح الخلية المنقبلة خلية مائلة؟ لأنّها أخذت بلاسماً من الإخصاب
- ٢٣ - بعد عملية الانشطار الثنائي نوع من التكاثر اللاجنسي؟ لعدم تشكيل أعراض وعدم حدوث القاح والأفراد الناتجة مطابقة للأصل

المعاريات التالية قد ترد منها سؤال ماذا ينبع عن:::

والبيض في الربيع والصيف عند انثى بـ رغوث الماء	البيض البكري عند ملكة نحل العسل	
2n	In	الصيغة الصبغية
إناث فقط	ذكور فقط	ماذا ينبع عن كل منهما

البيض البكري عند بـ رغوث الماء الخريف	البيض البكري عند بـ رغوث الماء الخريف	
2n	In	الصيغة الصبغية
إناث فقط	ذكور فقط	ماذا ينبع عن ظهور كل منها

بيض الخريف البكري In (برغوث الماء)	البيض البكري في الصيف 2n (برغوث الماء)	
ذكور فقط	إناث فقط	ماذا ينبع عن كل منهما

اقررنا بين نوعي الأبواغ في كل من التكاثر الجنسي واللاجنسي لدى ذهر عفن الخبز من حيث: ظروف الوسط الذي تتشكل فيه - نوع الانقسام الذي تنتجه عنه - صيغتها الصبغية - ناتج إنتباها

تكاثر جنسي	تكاثر لا جنسي	وجه المقارنة
غير مناسبة	ال المناسبة	ظروف الوسط الذي تتشكل فيه
انقسام منصف	انقسام خططي	نوع الانقسام الذي تنتجه عنه
In	In	صيغتها الصبغية
خيوط فطرية (+) وأخرى (-)	خيوط فطرية من نوع واحد	ناتج إنتباها

فيروس الإيدز	فيروس أكل الجرائم	
RNA	DNA	المادة الوراثية
اللمفياط الثانية المساعدة و البالغات الكبيرة	جرائم العصبية القولونية	الخلايا المختبرة
التبرعم	الانفجار والتحرر بعد تحلل جدار الخلية الجرثومية بتاثير انظيم الليزو زيم	التحرر

ملاحظة: أنماط التكاثر اللاجنسي التي وردت سفال آخر احتجة قد تأتي مقارنة من حيث نوع التكاثر اللاجنسي

الجيل البوغي بالالقاح	الجيل العروسي بالانقسام المنصف	يم يبدأ
٢١ تكوين الببضة الملقحة	١٦ تكوين الأعراس	الصيغة الصبغية لخلاياه
تكوين الأبواغ الجنسية من الانقسام المنصف	تكوين الأعراس من الانقسام الخيطي	نوع الانقسام الذي ستنتج عنه الأعراس والأبواغ

الخلية الجرثومية المانحة صبغي جرثومي	الخلية الجرثومية المانحة بلاسميد إخصاب + صبغي جرثومي	ماذا تحتوي (كيف نميز بينهما)
---	---	------------------------------

قد ترد هذه الأمراض من خلال أعراضها ضمن سؤال ادرس حالة

العامل الممرض	الرشح	الكريبي	المتلازمة التنفسية العادة
	الفيروس الأنفي	فيروس الإنفلونزا	فيروس كورونا COVID-19
الأعراض	سيلان أنفي - التهاب حلق	ارتفاع حرارة- عطاس- ضيق تنفس- التهاب رئوي شديد- سيلان مخاط من الأنف	

درسين الحالات التالية

١- أصيب زميلي بذات الرئة أخبره الطبيب أن الالتهاب الجرثومي انتشر بسرعة داخل الرئتين بعد التقاطه العدوى من شخص مريض


١- تسأله كيف زادت كمية الجراثيم التي دخلت إلى الرئتين مع الشهيق إلى كمية هائلة انتشرت في معظم الرئتين خلال يوم من فقط من خلالها تشارتها لا جنسياً بالظروف المناسبة بطريقة الإنشطار الثنائي

١- نظر زميلي إلى الصاد الحيوي الذي وصف له متسائلاً عن اختلافه عن الذي تعالج به قبل ثلاثة أعوام ، فأخبره الطبيب أن المرض المغير اثبت أنه مصاب بسلالة جرثومية جديدة من المكورات الرئوية. كيف تنشأ السلالات الجديدة لداء الجراثيم ؟ من خلال تشارتها جنسياً في ظروف البيئة غير المناسبة


٢- يوجد لدى حيدر شجرة عنب ذات نوعية ممتازة وأراد أن يزرع بستانًاً كاملاً من الشجرة نفسها .
كيف يمكن الحصول على عدد كبير من الشتلات المطابقة لشجرة حيدر ليحقق مراده مع ذكر أسماء الطرق دون شرح؟

طريقة نباتات الأنابيب بحالات ثلاث بدءاً من :
١- خلايا عروسية ٢- خلايا متمازية

نماذج التكاثر اللاجينسي



دسم فیروس أكل الحراثم وندره على باقى الأسلكال مسميات



التكاثر الجنسي عند الصنوبر

يتناول من تمايز أحد الطلاع الرشيمية بالصوب على حساب الأخرى:

١٠	يتناول رشيم الصوب النهائي من :	رشيم واحد	ب	رشيمان	ج	ثلاثة رشيمات	د	اوب	ج
١	جذير جذير	سوقة وعجز	ج	ملفات	د	جميع ملخص درس	د	ج	ج

اساء الوظائف والمواضع

الوظيفة	الموقع	اسم البهنة
بنفسك بداخلها حبات الطاعم	على الوجه المضلي لكل حرشفة بالمخروط المنكر	الكمان الطلعيان
	على السطح العلوي لكل حرشفة بالمخروط المورث	البذرية الفتية
	فأعلى كل مخروط منكر	القناية بالمخروط المنكر
	أسفل كل حرشفة بالمخروط المورث	القناية بالمخروط المورث
نعش بقصامها المنصف؟ أربع حبات طبع فمه	داخل الأكياس الطلعية الفتية	الخلايا الام لحبات الطاعم 2n
نعش بقصامها المنصف؟ أربع خلايا In تدعى الأبواغ الكبيرة	بداخل نوسيل البذرية الفتية	خلية ام مولدة للأبواغ الكبيرة 2n
تصبح حبات الطاعم إلى الحجرة النفعية	سطح النوسيل	ظرف النفاح
تنمو بعد ملامسة حبة الطاعم لسطح التوسل تحيط الأنابيب النفعية	داخل حبة الطاعم الناضجة	الخلية الاعائية
تنقسم النقساما خطيطاً تحيط خلية جسمه وتحتها قاعدية . تقسم الخلية الجسمية خطيطاً تحيط نطفتين مجردين من الأهداف	داخل الخلية الاعائية	الخلية التوالدية بحبة الطاعم الناضجة
	بين طبقة حوامل الأجنة بالأصل وطبقة العلوية بالأصل	طبقة الوريدية
	بين الطبقة الوريدية من الأعلى وطبلاع الرشيمية من الأسفل .	طبقة حوامل الأجنة (الملفات)
	من لحافه البذرية	منثرا الغلاف المتخشب المجنح للبذرة
	من تمايز بعض خلايا الإندوسبروم .	منثرا الأرحام بالصوب
	من نمو الخلية الاعائية لحبة الطاعم على سطح التوسل	منثرا الأنابيب الطاعمية
	من انقسام الخلية التوالدية في الأنابيب الطاعمية انقساما خطيطيا	منثرا النططة النباتية
	من تناول المويقة	محور تحت الملفات
	من نمو العجز	محور فوق الملفات
	داخل بطين الرحم	العروق الانتوية في بذرية الصوب

بالنهاية اعطي نفسك علمياً لكل مما يلقي

- ١- تسمية عاريات البذور بهذا الاسم ؟ لأن مبادضها مفتوحة والبذرة عارية .
 - ٢- تسمية مخلفات البذور بهذا الاسم ؟ لأن مبادضها مغلقة والبذور ضمنها .
 - ٣- الصنوبر متصل الجنس أحادي المسكن ؟ لأنها يحتوى على مخاريط مذكره ومخاريط مؤنثه على نفس النبات .
 - ٤- تسمية الصنوبريات بالمحفروطيات ؟ لأنها ينکاثر باعضاء نکاثرية خاصة تسمى المخاريط .
 - ٥- اختلاف لون وحجم المخاريط المؤنثة ؟ بسبب اختلاف نوع الصنوبر وعمر المحفروط .
 - ٦- المخروط المذكر زهرة واحدة ؟ لوجود فناية واحدة بقاعدته .
 - ٧- المخروط المؤنث مجموعه ازهار ؟ لأنه يتالف من محور مركزي ترتكز عليه مجموعة من الحرافش وتختلف كل زهرة أنثوية من حرشفة تحمل في بذيرتان عاريتان وأسفل كل حرشفة فناية .
 - ٨- انتاش بذرة الصنوبر هواما ؟ لأن النسوقة تنمو لتعطى المحور تحت اللقاحات الذي يرفع اللقاحات فوق التربة .
 - ٩- توقف نمو الانبوب الطعمي لمدة عام في عاريات البذور ؟ حتى تتضخم البذيرة وتشكل الارحام .
 - ١٠- تدخل بذرة الصنوبر في حالة حياة بطينية بعد تشكيلها ؟ لأنها فقدت الجزء الأكبر من الماء الموجود فيها .
 - ١١- زوال التوصيل ببذرة الصنوبر ؟ يهضم الاندوسيروم التوصيل ، ويحتل مكانه كما يتضخم (فسر) نتيجة تراكم المدخرات الغذائية (نشاء ، بروتينات ، زيوت) في خلاياه .
- ماذا ينتهي عن:
- ١- ثلاث انقسامات خيطية على الخلية الكبيرة ١n البعيدة عن الكوة للبذيرة الفتية ؟ تعطي نسج مغذي يدعى: الاندوسيروم
 - ٢- تمايز بعض خلايا الاندوسيروم ١n ؟ تشكل الأرحام وكل رحم يتالف من عنق وبطن بداخله العروس الانثوية 2n
 - ٣- وصول حبة الطلع الناضجة الى كوة البذيرة الفتية ؟ تفرز الكوة مادة لاصقة تعمل على لصق حبات الطبع . كما يفرز سطح التوصيل قطرة اللقاح تسحب حبات الطبع الى الحجرة الطلعية .
 - ٤- ملامسة حبة الطلع الناضجة نوسيل البذيرة الفتية ؟ تنمو الخلية الإاعاشية في حبة الطلع الناضجة وتعطي الانبوب الطعن الذي يمتص وينخرس بذرة .
 - ٥- وصول الانبوب الطلعي لعنق الرحم ؟ تتقسم الخلية التوالية في حبة الطلع إنقساماً خيطياً لتعطي خلية جسمية وخلية قاعدية . تقسم الخلية الجسمية لتعطى نطفتين مجردتين من الاهداف
 - ٦- أربعة انقسامات خيطية على البيضة الملقحة بالصنوبر ؟ ينتج عنها ١٦ طبقة خلوية بكل طبقة ؛ خلايا 2n

الاندوسيروم	التوصيل	الصيغة الصبغية
1n	2n	
في البذيرة الناضجة وبذرة الصنوبر	في البذيرة الفتية والناضجة	الموقع
نسج مغذي تبذرة الناضجة وبذرة الصنوبر	النسج الأساسي المغذي للبذيرة	الوظيفة

المخاريط المذكره	المخاريط المؤنثة	وجه المقارنة
أصفر(فتى) — ببرتقالي (ناضج)	يختلف حسب عمر من الأخضر المخروط ونوع الى البنى الداكن الصنوبر عن النضج	اللون
صغر	كبير	الحجم
ثير	قليل	العدد
قواعد الفروع الفتية	نهاية الفروع الفتية	مكان ظهورها على النباتات
متعدد ومجتمع	شكل مفرد أو مزدوج	توضعها على النباتات

البذيرة الناضجة	البذيرة الفتية	النسج المغذية
التوصيل 2n والاندوسيروم 1n	التوصيل 2n	

بفرة الصنوبر	البذيرة الناضجة	
الأندوسبرم In	التوسيل $2n$ والأندوسبرم $1n$	النسج المغذية
خلاف منخشب مجنب	لحافة واحدة	الأغلفة

المحور فوق الفلقات	المحور تحت الفلقات	
من نمو العجز	من تطاول السويفية	المنشا
يحمل الأوراق	يرفع الفلقات فوق التربة	الوظيفة

تكتب كلاماً ملحوظاً

مراحل تشكل البذرة :

شكل الرشيم : يحدث الإخصاب في كل الأرحام ، وتنتطور كل ببيضة ملقة إلى جنين ، لكن البذرة الناضجة لن يبقى فيها إلا جنين واحد .

٢ يتسرع نمو أحد الطلائع الرشيمية
بالانقسامات الخيطية ويتمايز إلى رشيم
نهائي في وسط الأندوسبروم وتزول باقي
الطلائع الرشيمية .

٢ ينتج عنها ١٦ خلية $2n$
تتوسط في أربع طبقات في
كل طبقة أربع خلايا .

١ ببيضة ملقة $2n$ في بطن
هرسم تنقسم أربع انقسامات
خيطية متالية .

ما مراحل الإنماح ؟

لتابير ثم إنشاش حبة الطلع ثم الإخصاب

شكل الأندوسبروم: بوغة كبيرة $1n$ بعيدة عن الكوة تنقسم إنقسامات خيطية عديدة وتعطي نسيج مغذ يدعى: الأندوسبروم

رتب كيف تحول البذيرة الفتية إلى بذيرة ناضجة ؟




٣ بذيرة ناضجة بداخلها إندوسبروم
وأرحام In .

٢ يطأ على الخلية الأم للأبوااغ
الكبيرة $2n$ انقسام منصف وينتج
أربع خلايا $1n$ تتلاشى ثلاثة وتبقى
واحدة تنقسم خيطياً لتعطي نسيج
الأندوسبروم .

٢ بذيرة فتية تحوي بداخلها
خلية أم للأبوااغ الكبيرة $2n$
ووسط التوسيل .

رتب مراحل تشكل حبات الطلع عند الصنوبر بدءاً من الخلايا الأم المولدة لحبات الطلع $2n$:
خلايا أم لحبات الطلع $2n$ ← ٢ يطأ على كل منها ← ٣ ينتج عن كل منها ← ٤ تتمايز إلى حبات
في الأكياس الطبيعية الفتية ← ٥ أقسام منصف ← ٦ أربع حبات طلع ← ٧ طبع ناضجة
فتية In

رسومات: تدرب على رسم حبة الطلع والبذيرة



تعتبر أشجار الصنوبر من الأشجار المعمورة وتشير بضمائمهما وإن اوراقها دائمة الخضراء وتشير بظاهر المخربط

١. لماذا تند اوراقها دائمة الخضراء؟ لأنها لا تساقط دفعة واحدة

٢. مم تختلف السداة في المخروط المنكر والحرشفة في المؤنث الفنى؟ المنكر المدعا: حرشفة على وجهها المقطى كيسان طلعيان يمثل المؤنث: تختلف الزهرة من حرشفة على وجهها العلوى بذور نان هارينان

٣. ماذأ يمثل النبات العرومى المنكر و المؤنث في الصنوبر؟ المنكر: حبة الطبع الناضجة المؤنث: الأندوسبرم والأرخام

٤. ما مراحل الالقاح بالصنوبر؟ ١- النابير ٢- الناش ٣- حبة الطبع ٤- الاخشاب المفردة

٥. ما مراحل تشكل بذرة الصنوبر؟ ١- تشكيل الرشيم ٢- تحول لحافلة البذيرة التي تختلف من حيث مجتمع البذيرة ٣- بهضم الأندوسبرم التوصيل مكانه

٦. ما أقسام الرشيم النهائي بالصنوبر؟ ١- جذير ٢- سوبقة ٣- عجز ٤- فلفت (١٩٠٦)

٧. مم يتالف المخروط المؤنث الناضج؟ حرشفة تحمل في اعلاها بذرتين مجنحتين عريتين تمت مجموعة من التغزير وتحت تلحقة الصنوبر

٨. ما نوع الانعاش بالصنوبر؟ هواني (المذا)؛ لأن السوبقة تتطلّل فوق التربة حاملة معها المعور تحت اللقفات الذي يرفع اللقفات فوق الأرض

لدينا الشكل المحاور والمطلوب:

١. ماذأ يمثل هذا الشكل؟ البذيرة الناضجة بالصنوبر
٢. ضع المسننات الموافقة للأرقام المحددة على الشكل. ١- الحافة ٢- حجرة طعية ٣- الرحم ٤- التوصيل ٥- الأندوسبرم
٦. ما مصير البنية رقم ؟ بعد حدوث الإخصاب؟ يهضمه الأندوسبرم ويحتل مكانه

مغلفات البذور

مقدّمات البذور	عارضات البذور	المبيض
مقلل وبدائله البذيرات	مفتوح والبذيرات عارية	النبات العرومى الأنثوي
كيس الرشيم	الأندوسبرم والأرخام	موقع الخلية الأم لحبات الطبع
داخل الرسبر (الفن) (كيس طعن، قشر)	داخل الأكياس الطعوية الفتية	عدد الأكياس الطعوية
أربطة الكيس طعوية	كيسان طلعيان	عدد لحافلات البذيرة
المطفئات	لحافلة واحدة	موقع البذيرة
داخل المبيض	الوجه العلوى لحرشفة المخروط المؤنث	موقع العروس الأنثوية (البويضة الكروية)
في نوسيل البذيرة الفتية	في نوسيل البذيرة الفتية	موقع العروس الأنثوية للأبوااغ الكبيرة
ثلاثي ثلاثة وتبقى واحدة تعطي لحافلة الماء	ثلاثي ثلاثة وتبقى واحدة تعطي الأندوسبرم	مصير الأبوااغ الكبيرة
الرشيم	بطن الرحم	موقع العروس الأنثوية (البويضة الكروية)
في القطب القريب من الكوة في الكيس الرشيم	ملامسة حبة الطبع الناضجة لносيل البذيرة الفتية	مكان الناش حبة الطبع
تدريض كيسان على النسم	الأولى: تتحد مع البويضة الكروية وتعطي بيضة ملقحة.	مصير النطفتين
نطفة ١ + البويضة الكروية		

نطفة ٢ + نواة ثانوية ٢١١ — بيضة إضافية	والثانية تتشاشه	
من الخلية الإعashية لحبة الطلع الناضجة والغلاف الداخلي لها	عند ملامسة حبة الطلع الناضجة نوسيل البذيرة الفتية تنمو الخلية الإعashية معطية الأنابيب الطاعي	منشأ الأنابيب الطاعي
نواة الخلية الإعashية: توجيه الأنابيب الطاعي و المحافظة على حيوتها	تعطي الأنابيب الطاعي	وظيفة الخلية الإعashية
عند وصول الأنابيب الطاعي إلى عنق الرحم		موعد انقسام الخلية التوالية
خلية كبيرة موجهة نحو كوة البذيرة ، وخلية صغيرة موجهة نحو مركز الكيس الرشيمى	أربع طبقات من الخلايا في كل منها أربع خلايا	انقسام البيضة الملقحة (الأصلية عند المظفات)
الكبيرة تعطي طبقة العلقة الصغيرة تعطي طبقة الكيس الرشيمى	السفلى تعطي طلائع رشيمية، تتمايز طبعة واحدة لتعطي رشيم نهائى يتالف من جذير وسوقة و عجز وفقات من ١٢-٦	مصير الخلايا الناتجة عن انقسام البيضة الملقحة
١ او ٢	٦ - ١٢ طبقة	عدد ففات الرشيم
من مدخلات الغذائية في السويداء ، الفلقان	من المدخلات الغذائية في الأندوسبيرم	النسج المغذية للرشيم (مصدر تغذية الرشيم أثناء الانتاج)
- يهضمها التوسيل - ترول اللحافة الداخلية : تبقى الخارجية وتحول لغلاف مفرد للبذرة أو تتضاعف الخارجية إلى غلافين سطحي متآكل و داخلي رقيق	تحول لغلاف متآكل مجنب للبذرة	مصير اللحافات
تهضم البيضة الأصلية والإضافية أثناء نموها	يهضمها الأندوسبيرم	مصير التوسيل

المخروط المؤنث الناضج	المخروط المؤنث الفتى	
بذرتان عاريتان مجنبتان	بذرتان عاريتان	ما تحمله الحرشفة على الوحدة الطوي
ثمرة	زهرة واحدة	ما تحمله الحرشفة
مجموعة من التمار	مجموعة من الأزهار	ما يحمله المخروط

مثال	الكوة	الحبل السري	
الجوز ، القرacs	على استقامة واحدة مع النغير	قصير	البذيرة المستقيمة
الفاصليناء و القرنفل	تقرب من النغير	قصير	البذيرة المنحنية
الورد ، الخروع	تقرب كثيراً من النغير الظاهري	طويل التحتمت به اللحافة الخارجية	البذيرة المقلوبة

بذيرة المخلفات	بذيرة العاريات	
لهافتان	لهافة واحدة	عدد الهافات
الكيس الرشيمى في القطب القريب من الكوكب	بطن الرحم	موقع العروس الانثوية
التوسيل	النوسيل و الأندوسيبرم	الأنسجة المغذية

التعاليل

- ١- بعد الإخصاب مضاعف عند مخلفات البذور ؟ - نطفة ١١ + بويضة كروية ١١ — ببضة أصلية ٢١
- ٢- بعد بذرة الفول والفاصولياء عديمة السواداء ؟ لأن الرشيم في مراحل تكونه الأخيرة بهضم السواداء فتتمو الفلقتان وتعتلدان بالمعذرات الغذائية.
- ٣- يحيط ببذرة الحمص غلاف مفرد ؟ لأن اللحافة الداخلية تزول وتبقى الخارجية التي تفقد ماءها وتتصلب.
- ٤- تكون حبة القمح غلاف كاذب للبذرة ؟ لأن التوسيل هضم الحافتين معاً فقامت الثمرة بتكون غلاف كاذب للبذرة.
- ٥- زوال التوسيل عند بذرة مخلفات البذور ؟ لأن الببضة الأصلية والإضافية يهضمانه في أثناء نموهما.
- ٦- زيادة الأكسدة التنفسية أثناء انتشار البذور ؟ لتأمين الطاقة اللازمة لنمو الرشيم.
- ٧- انتشار الحرارة أثناء انتشار البذور ؟ لأن قسم من الطاقة الناتجة عن الأكسدة التنفسية لا تستخدم في النمو، فينتشر بشكل حرارة.
- ٨- الانتشار أرضي عند، البازلاء، الفول، الكستاء ؟ لأن السويقة لا تتطاول ومن ثم لا تخرج الفلقتان فوق التربة.
- ٩- الانتشار أرضي عند القمح ؟ لأن السويقة لا تتطاول ولا تخرج الفلقة فوق التربة.
- ١٠- الانتشار هواني في الفاصولياء ؟ لأن السويقة تتطاول حاملة معها الفلقتان والعجز فوق التربة.
- ١١- الثمرة كافية في التفاح ؟ لأن كرسي الزهرة يشارك مع المبيض في تشكيل الثمرة.
- ١٢- الثمرة مركبة في التين والتوت ؟ لأنها تتشكل من أزهار عدة (نورة)، تتحول كل زهرة فيها بعد إلقاءها إلى ثمرة.
- ١٣- الثمرة متجمعة في الفريز ؟ لأنها تتشكل من أخيبة عدة منفصلة لزهرة واحدة تتركز جميعها على كرسي الزهرة.
- ١٤- الثمرة بسيطة في التفاح والبرتقال ؟ لأنها تتشكل من زهرة واحدة تحوي أخيبة عدة ملتحمة.
- ١٥- الثمرة في العمش و الكرز بسيطة ؟ لأنها تتشكل من زهرة واحدة تحتوي على خباء واحد.
- ١٦- وجود سائل حلو في وسط ثمرة جوز الهند ؟ بسبب توقف نمو خلايا السواداء ٣١ عند حد معين.
- ١٧- عدم إمكانية حدوث التأثير الذاتي في أزهار نبات الشوندر السكري والجزر ؟ بسبب اختلاف موعد نضج الأعضاء التكاثرية في الزهرة الختنوية مبكرة الذكورة.
- ١٨- عدم إمكانية حدوث التأثير الذاتي في أزهار نبات الأفوكادو ؟ بسبب اختلاف موعد نضج الأعضاء التكاثرية في الزهرة الختنوية وهي مبكرة الذكورة.
- ١٩- عدم إمكانية حدوث التأثير الذاتي في زهرة الهرجاية ؟ بسبب اختلاف أطوال الأسدية والأقلام في الزهرة.
- ٢٠- عدم إنتشار حبات طلع من نوع معين على مياسم أزهار نوع آخر ؟ نتيجة عدم التوافق بين مفرزات العيسم مع المواد التي يكتسبها بروتينية في غلاف الطلع.
- ٢١- لحبة الطلع أهمية تصنيفية ؟ تختلف حبات الطلع بالشكل والحجم والتزيينات النوعية لغلافها الخارجي
اختر الإجابة الصحيحة لكل معايير

جميع ما سبق خط	د	أب	ج	الثمرة	ب	الزهرة	١
أندوسيبرم	د	المدققة	ج	عيسم	ب	الثمرة	١
غلاف	د	الانتشار الهوائي	ج	الانتشار الأرضي	ب	الثمرة	٢
جميع ما سبق خط	د	الطبقة الآلية	ج	الطبقة المخزنة	ب	فتحات الانتشار	٣

١- مبيض زهري ناضج يحوى بذرة أو أكثر ويعود عضواً متخصصاً لحماية البذور وتسهيل انتشارها

٢- أحد أجزاء الزهرة، وبعد الجهاز التكاثري الانثوي فيها.

٣- مجموعة المظاهر التي ينتقل فيها رشيم البذرة الناضجة من حالة الحياة البطيئة إلى حالة الحياة النشطة

٤- طبقة في جدار الكيس الطليع لها دور في تفتح المنبر عند النضج

٥- أحد النسج الآتية صبغته الصبغية ٣١:

١															
٦	اللحافة	د	السويداء	ج	الأندوسيبرم	ب	التوسيل								
٧	شجرة تحوي نوعاً واحداً من الأزهار المكونة من كأس وتويج وأسدية فقط فهي تعود لنبات:		الخلية الأم المولدة للأبوااغ	د	الكيس الرشيمي	ج	التوسيل	ب	اللحافة						
٨	تعد ثمرة التين:		أحادي الجنس وحيد المسكن	د	منفصل الجنس ثنائي المسكن	ج	منفصل الجنس وحيد المسكن	ب	خنثوي						
٩	ثمرة تتضمن أخبية عدة منفصلة لزهرة واحدة تتركز جميعها على كرسي الزهرة كالفرizable:		بسطحة حقيقة	د	بسطحة كاذبة	ج	مركبة كاذبة	ب	متجمعة						
١٠	بذيرة حبلها السري طويل والتحتمت به اللحافة الخارجية واقتربت فيها الكوة كثيراً من النغير الظاهري مثل الورد.		أدب	د	الثمرة المجتمعية	ج	الثمرة المركبة	ب	الثمرة البسيطة						
١١	نسيج مغذى ١٢ أساسى في البذيرة:		جميع مasicق ص	د	البذيرة المنحنية	ج	البذيرة المقلوبة	ب	البذيرة المستقيمة						
١٢	نسيج خاص غني بالمخدرات الغذائية يملأ الكيس الرشيمي ينتج من انقسام نواة البيضة الملقة الإضافية ١٣ انقسامات خطية عديدة		جميع مasicق ص	د	التوسيل	ج	الأندوسيبرم	ب	السويداء						
١٣	أحد الثمار التالية لا تعد ثمرة كاذبة:		جميع مasicق ص	د	السويداء	ج	التوسيل	ب	الأندوسيبرم						
١٤	انتقال حبات الطلع الناضجة من الماء إلى العياسم		الكرز	د	التفاح	ج	الرمان	ب	الأجاص						
١٥	جزء يصل البذيرة بجدار المبيض في منطقة تسمى المشيمة:		جميع مasicق ص	د	التاير	ج	التاير التصالبي	ب	التاير الذاتي						
١٦	مكان اتصال البذيرة بالحبل السري:		ب+ج	د	السرة	ج	النغير	ب	الحبل السري						
١٧	طبقات في جدار الكيس الطليعي تتهم لينتج عنها سائل مغذي للخلايا أم لحبات الطلع:		جميع مasicق ص	د	البشرة	ج	الطبقة الآلية	ب	الطبقات المغذية						
١٨	مواد لها دور هام في التوافق مع مفرزات الميسم الذي يستقبلها اثناء عملية التاير:		جميع مasicق غلط	د	غликوبروتينية	ج	نشاء	ب	غликوجين						
١٩	زهرة الشوندر السكري و الجزر خنثوية ومع ذلك يتم فيها التاير الخلطي لأنها:														

أ	عدم إتمام نمو حبات الطع	ب	اختلاف اطوال الأقلام و الأسدية	ج	مبكرة الذكورة	د	مبكرة الأنوثة
٤٠	بذيرة حبلها السري قصير والكوة والنغير على استقامة واحدة مثل الجوز.						
١	البذيرة المستقيمة	ب	البذيرة المقلوبة	ج	البذيرة المنحنية	د	جميع ماسبق صع
٤١	بذيرة حبلها السري قصير والكوة اقتربت من النغير مثل الفاصلين:						
١	البذيرة المستقيمة	ب	البذيرة المقلوبة	ج	البذيرة المنحنية	د	جميع ماسبق صع
٤٢	ثمرة تتضمن زهرة واحدة تحوى خباء واحد مثل المشمش أو أخبية عدة ملتحمة مثل التفاح:						
١	الثمرة البسيطة	ب	الثمرة المركبة	ج	الثمرة المجتمعه	د	جميع ماسبق صع
٤٣	تنفذى البيضة الأصلية والبيضة الإضافية في أثناء نموهما من الخلية المولدة						
١	اللحفتين	ب	الذوسيل	ج	الخلية الإاعشية	د	الخلية المولدة
٤٤	يقتل النبات العروسي المذكر في نبات الصنوبر ومغلفات البذور:						
١	حبة الطبع الناضجة	ب	الكيس الرشيعي	ج	الأرحام	د	جميع ماسبق صع
٤٥	أحد الثمار التالية لا تعد من الثمار الحقيقية						
١	الرمان	ب	الكرز	ج	مشمش	د	برتقان
٤٦	زهرة الهرجاية تابيرها خلطى لأنها:						
١	مبكرة الأنوثة	ب	مبكرة الذكورة	ج	متطاولة	د	حبات طبعها جاف

المواقع والوظائف

اسم البنية	الموقع	الوظيفة
فتحات الانثناء	سطح حبات الطبع	يخرج منها الأنابيب الطعوي
العيسم	نهاية القلم المعتمد من المبيض	توجيه نمو الأنابيب الطعوي والمحافظة على حيويته
نواة الخلية الإاعشية بحبة الطبع المنتشرة		تنمو لتعطي الرشيم
البيضة الأساسية		تنمو لتعطي نسيج السويداء
منشا النواة الثانوية ٢n	من اندماج نواتي الكيس الرشيعي أثناء الإخصاب	تتحد مع النطفة النباتية ١n لتشكل ببيضة إضافية ٣n
خلية أم مولدة للأبوااغ الكبيرة ٢n (خلية أم للكيس الرشيعي)	في نوسيل البذيرة الفتية	تعطي بانقسامها المنصف؛ أربعاء أبوااغ ١n
الخلية الأم للكيس الرشيعي	في نوسيل البذيرة الفتية	
البذيرة	داخل المبيض	

	في الانبوب الطلع	نواة الخلية الاعashية في حبة الطلع المنتشة
	مكان اتصال الحبل السري مع البذيرة	السرة (النغير)
	من انقسام نواة الخلية التوالية (In)	منشا النطفتان النباتيتان
	من خلية الكيس الرشيمى ومحتواه ينتج عن انقسام نواتها ثلاثة انقسامات خيطية	منشا الكيس الرشيمى
	من نمو الخلية الصغيرة الناتجة عن انقسام البيضة الأصلية .	منشا الرشيم
تعد عضوا متخصصا في حماية البذور وتسهيل انتشارها.		الثمرة
تفتح المنبر عند نضج حبات الطلع داخله	في جدار الكيس الطلع	الطبقة الالية
(تغذية الخلية الأم لحبات الطلع) من السائل الناتج عن تهلم الطبقات المغذية بجدار الكيس الطلع	في جدار الكيس الطلع	الطبقات المغذية

مذا ينتج عن :

١. انقسام الخلية التوالية بحبة الطلع؟ معطية نطفتين نباتيتين (In) .
٢. وصول الانبوب الطلعى الى كوة البذيرة؟ ت分成 الخلية التوالية معطية نطفتين نباتيتين ثم تنهى الانبوب الطلعى وترول نواة الخلية الاعاشية
٣. التوافق بين مفرزات الميسن والمواد على سطح حبة الطلع؟ انتشار حبة الطلع على الميسن بتحريض كيميائى من الميسن
٤. اتحاد نطفة In + بويضة كروية In؟ بيضة أصلية 2n
٥. اتحاد نطفة In + نواة ثانوية؟ بيضة إضافية 3n
٦. انماج نواتا الكيس الرشيمى اثناء الاخصاب المضاعف؟ تشكيل نواة ثانوية 3n
٧. نمو وتضخم جدار المبيض بعد الاخصاب المضاعف؟ يتحول الى ثمرة حقيقية
٨. مشاركة اجزاء زهرية اخرى مع المبيض لتشكيل الثمرة؟ تشكيل ثمرة كاذبة
٩. نواة الخلية الصغيرة التي تقع بوسط الكيس الرشيمى؟ تعطي طبيعة الرشيم الذى يتميز الى رشيم نهائى المؤلف من جذير وسويدة وعجز وفقدان فقة
١٠. انقسام الخلية الكبيرة التي تقع بجهة الكوة؟ تعطي خيط خلوي يدعى المطرع
١١. عدم وجود خلايا أم لحبات الطلع في الأكياس الطلعية؟ عدم تشكل حبات طلع
١٢. افتتاح كل كيسين طبعيين على بعضهما؟ تشكيل مسكن طبع
١٣. انقسام كل حبة طلع فتية In انقساما خيطيا؟ تعطي خلية اعashية وخلية توالية
١٤. انقسام الخلية الأم للأبوااغ كبيرة 2n انقسام منصف؟ تعطي أربعة أبواغ كبيرة 4n
١٥. انقسام نواة خلية الكيس الرشيمى ثلاثة انقسامات خيطية؟ تعطي ثمانية خلايا In تشكل محظوظ الكيس الرشيمى
١٦. اختلاف موعد نضج الأعضاء التكاثرية في الزهرة الخنثوية؟ حدوث تأثير خاطئ
١٧. انقسام البيضة الأصلية انقسام خيطي؟ تعطي خليتان خلية كبيرة موجهة نحو كوة البذيرة و خلية صغيرة موجهة نحو مركز الكيس الرشيمى

- يضمن الانتشار مرحلتين أساسيتين هما: (ادرس حالة)
١. زيادة النشاط الاستقلابي ، ويتجلى ذلك في المظاهر الآتية :
 ٢. زيادة نفادية أغلفة البذرة للماء والأوكسجين .
 ٣. زيادة الأكسدة التنفسية بهدف تأمين الطاقة اللازمة لنمو الرشيم ، ولكن قسما من هذه الطاقة لا يستخدم في النمو ، فينتشر بشكل حرارة ، مما يفسر انتشار الحرارة من البذور المنتشة .
 ٤. هضم المدخلات الغذائية الموجودة في القلقتين أو السويداء ، واستهلاكها من قبل الرشيم .
٥. ت分成 نواة البيضة الإضافية الى سويداء :
٦. ت分成 نواة البيضة الإضافية (3n) ن انقسامات خيطية عديدة إلى عدد كبير من النوع (3n) يحيط بكل منها قسم من الهيولى ، تتنظم على السطح الشاهلي لجدار الكيس الرشيمى ، فتشكل الطبقة الأولى من السويداء .
 ٧. يستمر الانقسام حتى يمتثل الكيس الرشيمى غالبا بنسيج خاص غنى بالمدخلات الغذائية هو السويداء .
 ٨. يتطلب نجاح التأثير شرطين هما :
 ٩. التلامس بين حبات الطلع وسطح الميسن .
 ١٠. التوافق بين مفرزات الميسن مع المواد الغليكوبروتينية في غلاف حبة الطلع .

٧- تختلف حبات الطبع المنقول بالهواء عن تلك المنقوله بالحشرات بـ

- أقارن بين الصنوبر والفاصلوليا من حيث:
 أ- عدد لحافات البذيرة الناضجة. ب- مكان وجود العروس الأنثوية. ج- مصدر تغذية الرشيم في اثناء إنتash البذرة. د- الإخصاب.

الفاصلوليا	الصنوبر	وجه المقارنة
لحافتان خارجية وداخلية	لحافة واحدة	أ-
داخل الكيس الرشيمي في القطب القريب من كوة البذيرة الناضجة بين الخلتين المساعدتين.	داخل بطن الرحم في البذيرة الناضجة.	ب-
الفلقتان	الأندوسبرم	ج-
مضاعف	مفرد	د-

خلية أم للأبوااغ الكبيرة (2n) في نومبل البذيرة الفتية.

١


اربعة أبواغ كبيرة (1n)
تنامي منفرد
تنلاشى ثلاثة وتبقى واحدة تكبر وتشكل خلية الكيس الرشيمي (1n).

٢

بطرا على نواة خلية الكيس الرشيمي (1n) ثالث انقسامات خطبية متتالية مخطبة ثم تى نوى (1n)
تشكل محتوى الكيس الرشيمي.

٣

ترتيب مراحل تشكيل الكيس الرشيمي



التكاثر عند الإنسان

(الدرس ٨+٧)

أولاً: اختار الاحياء الصحيحة:

إن جنس الجنين الناتج من المضفة التي تمتلك الشفع الصبغي الجنسي Y ذكر، ويعود ذلك لأحد الأسباب العلمية الآتية:						١
أ ب	د	نماذيب مولر	ج	نماذيب وولف	ب	الصبغي Y يحمل المورثة SRY التي تنشط تشكيل الخصية
يتشكل جهاز التكاثر (المناسل) لدى الإنسان خلال:						٢
الأسبوع الثامن من الحمل	د	الأسبوع السابع من الحمل	ج	الأسبوع الثالث من الحمل	ب	الأسبوع الرابع من الحمل
أحد الخيارات التالية يعتبر مكاناً صحيحاً تشتق منه المناسل:						٣
جميع ما سبق صح	د	الوريقة الجنينية المتوسطة	ج	الوريقة الجنينية الداخلية	ب	الوريقة الجنينية الخارجية
تكتسب النطاف فيه القدرة على الحركة الذاتية عند اختلاطها بمفرزات الحويصلين المنوبيين في :						٤
خلايا سرتوني	د	الاحليل	ج	البربخ	ب	الأشهر

ثانياً: الوظائف والمواقع

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
يشبط نماذيب مولر	من الخصية	الهرمون AMH
تشكل بروتين يقوم بتحويل بدانة العنسيل إلى خصية	تقع على الصبغي Y	مورثة SRY
ينموان إلى أقنية تناسلية أنثوية.		أنبوبي مولر لدى المضفة الجنينية XX
ينموان إلى أقنية تناسلية ذكرية.		أنبوبي وولف لدى المضفة الجنينية XY
إنتاج النطاف	تقع ضمن فصوص الخصية	الأنابيب المنوية
إفراز الاندروجينات ومنها التستوسترون	بين الأنابيب المنوية في الخصية	خلايا ليديج (بنينية)
ويعد المستودع الرئيس للنطاف، وتكتسب فيه النطاف القدرة على الحركة الذاتية عند اختلاطها بمفرزات الحويصلين المنوبيين.	ملتصق بالخصية	البربخ
يقوم بنقل النطاف إلى الإحليل، وبإمكانه تخزين النطاف لمدة شهر تقريباً.		الأشهر
تفرز سائلاً مخاطياً يضاف إلى النطاف	في وسط القضيب الذكري	الاحليل
يمر الحبل المنوي عبرها	طريق عبر البنية العضلية البطنية	القناة الإربية
تفرز نحو ٦٠ % من السائل المنوي وتكون مفرزاتها قلوية تحتوي على : تركيز مرتفع من الفركتوز (سكر الفواكه) ويتم استقلابه بسهولة من قبل النطاف .	خلف قاعدة المثانة	الحويصلان المنويان

تفرز سائلًا قلويًا حليبيًا يشكل (٢٠٪) حجم السائل المنوي يخفف من لزوجة المنوي ويحتوي على شوارد الكالسيوم لتنزيل حركة النطاف.

يساعد على منع حدوث التهابات المعدة في التناسلي الذكري.

تفرزان مادة مخاطية أساسية تخفف حموضة البول المتبقى في الإحليل.

تحت على تقلص العضلات الملساء في المجرى التكاثري الذكري وتقلص عضلات المجرى التكاثري الأنثوي في أثناء الاقتران لتأمين وصول النطاف إلى أعلى الرحم.

تحيط بالجزء الأول من الإحليل

غدة البروستات

يفرز من البروستات

البلاسمين المنوي

تقعان قرب قاعدة القضيب الذكري

غدتا كوبر

من الحويصلان المنويان

البروستاغلاندين عند الذكر

ثالثاً: اعطي تفسيراً علمياً لكل مما يلى:

- ١- تعد الخلايا البينية غدة صماء؟ لأنها تفرز الاندروجينات ومنها التستوسترون وتلتقي بها بالدم
- ٢- تعد الخصية غدة مضاعفة الإفراز (داخلي وخارجي)؟ ذات إفراز داخلي لأنها تفرز الهرمونات الجنسية الذكرية إلى الدم وذات إفراز خارجي تنتج الأعراض الذكرية وتلتقي بها في القنوات الناقلة إلى الوسط الخارجي.
- ٣- الرجال الذين يستحمون بماء ساخن جداً بشكل دائم يكون عدد نطافهم قليلاً غالباً. لأن درجات الحرارة المرتفعة تعيق تشكل النطاف.
- ٤- تعد حالة الفتق الإربي شائعة لدى الذكور؟ لأن الحبل المنوي يمر من القناة الإربية مما يخلق نقاط ضعف فيها فقد تبادر بعض الأنسجة الأحسائية عبر هذه القناة
- ٥- حالة الفتق الإربي نادرة لدى الإناث؟ لأن القناة الإربية صغيرة جداً
- ٦- ضرورة إجراء اختبارات فحص البروستات لدى الذكور بعد سن الخمسين. لأن البروستات تتضخم تلقائياً لدى معظم الرجال بعد سن الخمسين وقد يكون سبب التضخم في بعض الأحيان ورماً حميداً أو خبيثاً.
- ٧- تعدل مفرزات الغدد الملحقية القلوية حموضة المهبل والبول المتبقى في الإحليل. (لأن النطاف لا تصبح متزرعة بشكل مثالي إلا عندنما:
- ٨- يسبب قصور إفراز البروستات التهابات في المجرى البولي التناسلي للذكر؟ لأن البروستات تفرز بروتين مضاد للجراثيم (بلاسمين منوي) به على منع حدوث التهابات المجرى البولي التناسلي لدى الذكور
- ٩- مفرزات الحويصلين المنويين (قلوية)؟ لتخفيض حموضة المهبل لدى الأنثى والبول المتبقى في الإحليل لدى الذكر.

رابعاً: ماذا يفتح عن:

- ١- إفراز هرمون التستوسترون لدى المضافة الجنسية قبل تمايزها الجنسي؛ نمو أنبوبى وولف إلى أقنية تناسلية ذكرية
- ٢- إفراز هرمون AMH لدى المضافة الجنسية قبل تمايزها الجنسي؛ ضمور أنبوبى مولر.
- ٣- غياب التستوسترون لدى المضافة الجنسية قبل تمايزها الجنسي؛ يسبب ضمور أنبوبى وولف
- ٤- غياب الـ AMH لدى المضافة الجنسية قبل تمايزها الجنسي؛ يسبب نمو أنبوبى مولر
- ٥- تجمع الأنابيب المنوية؛ تشكيل شبكة هالر (شبكة الخصية)
- ٦- ركود جريان الدم في الأوردة المنوية داخل الحبل المنوي؟ دوالي الخصية
- ٧- بروز أنسجة أحشائية في القناة الإربية؟ الفتق الإربي

خامساً: ادرس الحالات الآتية:

- ١- ترغب بعض الأسر في إنجاب الأبناء الذكور وبعضها الآخر في إنجاب الإناث: وبما أن الصبغي X يُعد مسؤولاً عن تحديد جنس الذكر والأنثى يمكن أن تحمل الصبغي X أو الصبغي X فكيف يمكن التحكم بجنس الجنين؟ وما النتائج المتوقعة في هذه الحالة؟
- ٢- تبين للباحثين أن النطفة التي تحمل الصبغي X أسرع من النطفة التي تحمل الصبغي X لذلك يقوم بعض الأطباء بعزل ٨٠٪ من النطفة على سرعاتها مما يزيد احتمالية تحديد جنس المولود
- ٣- لاحظت إحدى السيدات لدى مولودها أن الخصيتين غير موجودتين خارج البطن وعندما أخذته إلى الطبيب أخبرها بضرورة إجراء مداخلة جراحية لإخراجهما.

- ما هو هرمون المسؤول عن هجرة الخصيتيين إلى الخارج؟ هرمون التستوستيرون
- ما هي درجة المثلث لتشكل النطاف؟ ٣٥ درجة أقل بدرجتين من درجة حرارة الجسم الطبيعية
- ما تأثير بقاء الخصيتيين داخل التجويف البطني؟ عدم تشكيل النطاف بسبب حرارة الجسم
- ما ضرورة هجرة الخصيتيين قبل الولادة إلى تجويف كيس الصفن؟ لتأمين درجة الحرارة المثلث لانتاج النطاف وهي ٣٥ درجة مئوية أقل من درجة حرارة الجسم

ما سبب عدم هجرة الخصيتيين؟ قلة إفراز (نقص إفراز) التستوستيرون قبل الولادة

ما الخلايا التي لا تتأثر بالحرارة المرتفعة بالخصية؟ الخلايا البنية (اللديغ) وتستمر بإفراز الهرمونات الجنسية الذكرية بما فيهم الحالب المنوي؟ الأسهور والأوعية الدموية واللمفاوية والأعصاب المرتبطة مع بعضها بنسيج ضام

ما يسمى التجويف الذي تهاجر إليه الخصيتيين خارج الجسم قبل الولادة؟ كيس الصفن... وكيف

يؤثر الحرارة المثلث لتشكل النطاف؟ تقلص العضلات الملساء في جدار كيس الصفن في درجات حرارة المنخفضة واسترخانها في درجات الحرارة المنخفضة؟ لتأمين درجة الحرارة المثلث لانتاج النطاف وهي ٣٥ درجة مئوية.

إذابة الشكل المجاور وأجيب:



اسم البني المشار إليها بالأرقام. ١ جسيم طرفي ٢ جسيمات كوندرية ٣ قطعة متوسطة

ما المستودع الرئيسي للنطاف؟ البربخ


ما وظيفة المسمى رقم (١)؟ يحرر أنظيمات حالة تفيدة بمرحلة الاختراق وتفكيك الأكليل المنشئ أثناء الالقاح ويعطي خيط يرتبط بمستقبلات نوعية في غشاء الخلية البيضية الثلوية

ما هي تكون ذيل النطفة؟ سوط يحيط بمعظمها غد ليفي وتبقى نهايته حرة


الإجابات



متشر خلالي للأندروجينات بجهة التشتت النسوي



متشر مغير ومتشر عرض غير الآمن المنور



رسن متضرر متضرر غير المنور

الدرس ٩

الإناث والإناث اللاحية الصديقة

تنتفق العملية الكاملة لتشكل النطاف نحو:

جميع ما يسبق خطأ	د	٨٠ يوم	ج	٦٦ يوم	ب	٦٤ يوم
كم عدد النطاف المتشكلة من مليون خلية منوية أولية:						
أدب	د	٦ مليون	ج	٢ مليون	ب	٤ مليون
أحد الخلايا التالية تسهم بتشكيل الحاجز الدموي الخصيوي:						

خلايا الظهارة المنشئة

خلايا سرتولى

المدرس: أحمد حيدر الشيخ

يكون الذكر الطبيعي الخصب عند الإنسان لديه نسبة من نطافه طبيعية في المظاهر والحركة

ج	%٢٠	ج	%٤٠	ب	%٦٠
د					١

ناتجاً: اعطي عسراً علمياً لكل مما يليه:

- أهمية حدوث الانقسام المنصف الأول؟ لاختلاف كثافة المنشاعفة في التطور البيني.
- تبقى المعنويات الأربع المتعلقة من منصبه واحدة متراقبة من خلال جسور الصيتو بلازما؟ بسبب وجود جسور الصيتو بلازما تربط بعضها البعض
- أهمية تخلص المعنوية من معظم هيلولاتها وفقدان النطفة الناضجة العديدة من العضيات الهيولية؟ لتسهيل حركة النطفة
- منع الحاجز الدموي الخصيوي خلايا جهاز المناعة من مهاجمة النطف؟ لأن غشاء النطفة يمتلك مولدات خاصة لا توجد في أغشية الخلايا الأخرى لذلك يتم التعارف إليها على أنها مواد غريبة
- أهمية الحاجز الدموي الخصيوي (وظيفة)؟ يمنع وصول مواد ضارة على الخصيصة ويمنع خلايا جهاز المناعة من مهاجمة النطف.
- أهمية الرياضة وعدم ارتداء الملابس الضيقة لدى الذكور البالغين؟ تنشط الدورة الدموية وتتشكل تشكيل النطف.
- عدم هجرة الخصيبيين لدى بعض الذكور في نهاية المرحلة الجنينية؟ بسبب عدم إفراز التستوسترون بكفيات كافية في نهاية المرحلة الجنينية
- تفوق الكتلة العضلية والعظمية لدى الذكور مثيلتها لدى الإناث، لأن التستوسترون يبحث على تركيب البروتينات وزيادة ترب الكالسيوم في
- تكون الحمية الغذائية التي تمنع تناول الدسم ذات تأثير سلبي على القدرة الإخصابية للذكور، لأن الهرمونات الجنسية الذكورية ذات طبيعة كسرية.
- العمر الأعظم للنطف يترواح في الأقنية التناسلية الأنثوية بين (48-24) ساعة فقط، لأن ذلك يتوقف على PH الأقنية التناسلية الأنثوية والغذاء للنطفة.
- تأثير الأشعة في الخلايا المعنوية المنقسمة بشكل أكبر بكثير من المعنويات. لأن المعنويات تكون في مرحلة التمايز.
- ينشط هرمون FSH تشكيل النطف بشكل غير مباشر من خلال تأثيره على خلايا سرتولي؟ لأنها وحدها تمتلك في غشاها الهيولي تشكيل لهذا الهرمون.

ثالثاً: درس الحالات الثالثة

- يفرز أندروجين DHEA من المنطقة الشبكية لفتر الكظر لدى الذكر والأنثى بكفيات قليلة وهو منشط تجنبية ويزيد القوة وكثرة النطفة منه دواء خارق لزيادة الحيوية والقوة، لذا منع الاتحاد الأولمبي العالمي الرياضيين من استخدامه؟
- لقد تبين ارتباط المستويات العالية من DHEA لدى النساء بزيادة فطر الإصابة بسرطان المبيض وزيادة الصفات التكورية عنهن لأن DHEA يتحول إلى تستوسترون، كذلك تأثيراته السلبية على عضلة القلب
- زار موجه الوزارة الأول مدرستي ودخل إلى صفي ووجدني أستعد لشرح مراحل تشكيل النطف على السبورة وشاهد مجموعة من الأشكال الخلوية التي رسمت على السبورة ووجه بعد انتهاء الدرس مجموعة من الأسئلة لبعض الطلاب:
ـ الطالب الأول: أستاذ أحمد رسم على السبورة المعنوية ما مصير جهاز غولجي فيها عندما تتمايز إلى نطفة وأن تووضع هذه البنية الجديدة؟ يتحول إلى جسم طرفي يتوضع بمقدمة رأس النطفة
- ـ الطالب الثاني: نلاحظ يا بني فقدان المعنوية لمعظم هيلولاتها (الصيتو بلازما) ما أهمية ذلك برأيك؟ لتسهيل حرثتها ... وما البنية المسؤولة عن بلعمة هذه الهيولي؟ الخلايا الحاضنة (خلايا سرتولي) وأين توجد؟ في جدار الأنابيب المعنوي في الخصيصة.
- ـ الطالب الثالث: ما العضيات التي تزود النطفة بالطاقة الفضلى لاداء عملياتها الحيوية؟ الجسيمات الكوندرية وأين تتواجد؟ في الأقطعة المتوسطة للنطفة
- ـ الطالب الرابع: ما الأجزاء الرئيسية للنطفة؟ رأس، قطعة متوسطة، ذيل، ومن المصدر الغذائي للمعنويات لتتمايز إلى نطف؟ خلايا سرتولي
- ـ الطالب الخامس: مم يمكن ذيل النطفة وما منشأ مكونه؟ وما دوره؟ يمكن ذيل النطفة من سوط مؤلف من أنبيبات دقيقة من أين تنشأ؟ تنشأ من المريكلز البعيد وهو الموطن الوحيد لدى خلايا الإنسان، مادوره؟ تحريك النطفة.
- ـ الطالب السادس: بما تشبه حركة النطفة؟ تكون حركة النطفة ذاتية لولبية المحركة البراغي، وماذا لو كانت حركة النطفة دائرة 180 درجة؟
- ـ الطالب السابع: أرسم لي شكلاً للنطفة وحدد على الشكل الأجزاء الرئيسية لها كما أجاب الطالب الرابع؟
- ـ الطالب الثامن: ما العمر الأعظم لبقاء النطف بالطرق الذكرية والأنثوية وعلى مذا يعتمد ذلك؟ عدة أسابيع بالطرق الذكرية ومن ٨٢٤ ساعة بالطرق الأنثوية ويعتمد ذلك على المدخلات الغذائية للنطفة ودرجة PH الأقنية التناسلية الأنثوية

نحو مداخل تمایز المنيوية إلى نطفة؟

يدخل جهاز خولجي على جسم طرفى يتوضع في مقدمة رأس النطفة .
تقى المنيوية معظم هبولها .
نطفة الجسيمات الكوندرية حول بداية السوط في القطعة المتوسطة . ٤- يظهر لها ذيل .

نحو مداخل تمایز المنيوية إلى نطفاف

المرحلة	نوع الخلية	نطاف	منويات	خليتين منويتين ثانويتين	خلية منوية أولية	منسليات منوية	خلايا الظهارة المنشئة
		1n	1n	1n		2n	2n

ما مذا ينتهي عن كل مما يلحى

نطاف أقل من ٢٠ مليون نطفة/مل؛ يكون الذكر في حالة عقم فيزيولوجي غالباً

نسبة LH في أقنية الأنثى (٥ مثلاً) بعد دخول النطاف إليها؟ تموت النطاف أو تفقد حركتها .

تأثير الحرارة على المنسليات المنوية؟ تشكل منسليات منوية مشوهة (عديدة النوى)

نقص فيتامين A-E بالخصية؟ يسبب قصوراً في تشكيل النطاف

نقص مرور الدم في الخصية؟ يعيق تشكيل النطاف

إفراز خلايا سرتولي للأنثيين؟ يُبطئ إفراز FSH

نحو المنسليات المنوية؟ تعطي خلية منوية أولية 2n

القسام منصف أول على الخلية المنوية الأولى؟ خليتين منويتين ثانويتين 1n

القسام منصف ثان على الخليتين المنويتين الثانويتين 1n؟ منويات 1n

نطاف المنويات 1n؟ نطاف 1n


زيادة تركيز التستوسترون في الدم؟ يُبطئ إفراز LH و GnRH (تقييم راجع سلبي)

دوران النطفة حول نفسها ١٨٠ درجة؟ العقم


إفراز خلايا سرتولي للأنثيين؟ تقييم راجع سلبي إذ يُبطئ الوطاء والنخامة الإمامية ويتوقف إفراز هرمون الـFSH وإنتاج النطاف .
لكل

الأنبوب المنوية الخامدة	الأنبوب المنوية النشطة	شكل خلايا سرتولي
تكون صغيرة وغير متطاولة	متطاولة على شكل عمود سيتوبلاسمي يحمل نطاها	

ال حاجز الدموي الخصيوى	الماء في تشكيله خلايا الدبق التجمية
يسهم في تشكيله خلايا سرتولي	



المدرس: أحمد حيدر الشيع



الوظيفة

الموقع

اسم البنية

تنقسم سلسلة انقسامات خيطية مشكلة منسليات منوية . ٢٧	في القسم المحيطي من الأنابيب المنوية	خلايا الظهارة المنشئة
مصدر غذائى للمنويات التي تتمايز على نطاف . تسهم في تشكيل الحاجز الدموي الخصبوى بلغمة الهبوب المفقودة من المنويات التي تتمايز إلى نطاف	في جدار الأنابيب المنوي	الخلايا الحاضنة (سرتولى)
يمنع وصول مواد ضارة على الخصبة ويمنع خلايا جهاز المناعة من مهاجمة النطاف.		ال حاجز الدموي الخصبوى
يبحث الأنابيب المنوية في الخصبة على تشكيل النطاف بشكل غير مباشر	النخامة الأمامية	FSH ذكر
يبحث الخلايا البنينية على إفراز التستوسترون والذي ينشط تشكيل النطاف	النخامة الأمامية	LH ذكر
يشبط إفراز GnRH FSH	من خلايا سرتولي	الإنبيين عند الذكر
يحرض النخامة الأمامية فتفرز هرمون LH/FSH	من الوطاء	GNRH
١ - ظهور الصفات الجنسية الثانوية (المميزة للذكر البالغ) ما هي ؟ ظهرت في الجسم وزيادة حجم الأعضاء التناسلية. ٢ - تنشيط تشكيل النطاف وزيادة عمر النطاف الصخرنة.	الخلايا البنينية (الدبر)	التستوسترون في مرحلة البلوغ
هجرة الخصيتيں إلى كيس الصفن + نمو أنابيب وولف ظهور الصفات الجنسية الأولى (تشكل الأعضاء الجنسية للجنسين)	الخلايا البنينية (الدبر)	التستوسترون بالمرحلة الجنينية
	في الغشاء الهبولي لخلية سرتولي	مستقبل هرمون FSH ذكر
	في الغشاء الهبولي لخلية ليدبغ (بنينية)	مستقبل هرمون LH ذكر

١٢ سنة	ج	٥٠ سنة	ب	٣٨ سنة
--------	---	--------	---	--------

في حال اعطيت هذه الآئتمان في الاختيار الاول منشط اباضة بعد من الخمسين سبعة:

ناعط نفسنا علمنا لكل مما يلي:

١. أهمية دخول الأوعية الدموية من سرة المبيض إلى داخل المبيض؟ لتنمية المبيض .
 ٢. أهمية الكتلة الكبيرة لعضلة الرحم؟ من أجل تأمين وحماية الحمل وتتفقّص في أثناء الولادة لتسهيل خروج الجنين.
 ٣. تكون بطانة الرحم الداخلية غنية بالأوعية الدموية والغدد المخاطية؟ لتأمين متطلبات وحاجات الجنين في أثناء تشكّله .
 ٤. أهمية المهيبل أثناء الولادة؟ طريق لمرور الجنين في أثناء الولادة الطبيعية .

٥. تكون الصيغة الصبغية للخلية الموجودة في الجريب الثانوي ٢١١ والخلية في الجريب الناضج صيغتها الصبغية ١٧٧ ؛ الخلية البيضية الأولى ٢٨٨ بسبب نمو المنسالية البيضية ٢١١ ، الخلية البيضية الثانية ١١١ بسبب الانقسام العنصري الذي يطرأ على الخلية البيضية الأولى ٢٨٨ أثناء تحول الجريب الثانوي إلى ناضج .

٦. يُعد المبيض غدة مضاعفة الوظيفة؛ لأنّه ينتج الأعراس الأنثوية (البيويضات) ويُلقى بها إلى الوسط الخارجي ويفرز هرمونات ويلقى بها في الدم والجريب الناضج غدة صماء ؟ لأنّه يحوي على خلايا الحبيبية والخلايا القرابية التي تفرز الهرمونات الأنثوية الاستروجينات والبروجسترونات وتلتقي بها في الدم

٧. الصيغة الصبغية للخلية البيضية الثانية ١١١ ؛ بسبب حدوث انقسام منصف أول على الخلية البيضية الأولى .

٨. يكون عمر الخلية البيضية الثانية مطابقاً لعمر الأنثى الصادرة عنها . لأن المنسالية البيضية تتشكل في المرحلة الجنينية

والآن درس الحالات الآتية:

- تُقدِّمُ أحياناً أكياس ملبدة بالسوائل في المبيض أو على سطحه تسمى الكيسات المببضية بالاستعانة بمصادر التعلم المتوافرة أو بطلب مختص أبحث
فيها: أ- تأثيرها على تطور الجريبات بـ. الطريقة الطبية لازالتها ثم اذكر الأقسام الرئيسية لجهاز التكاثر الأنثوي
التي تكون ضارة ولكن قد تسبب عدم حدوث إباضة وعدم حدوث حمل وقد تكون الكيسات موجودة خلال فترة الحمل وترول بعد مدة وقد تتلف وتسبب
لرها ما يعود إلى الجراحة لازالتها (جراحة تنظيرية) .

الثالث الثانوي العلمي دورة 2022

٦. يحتوي المهبل مجموعة من الجراثيم المفيدة وتكون عادة غير ضارة تنتج ببلاة حمضية نتيجة نشاطها الاستقلابي تمنع نمو العديد من العوامل المعرضة. ما تأثير هذه البلاة الحمضية على النطاف؟ وكيف تكيف النطاف مع هذه المشكلة لتحقق مهمته الانفاس الناجح؟ تحد من حركتها وقد تقترب وتستكفي النطاف مع هذه المشكلة لتحقق مهمته الانفاس الناجح : عن طريق تخفيض الحموضة بواسطة المعززات القوية للغدد الملحقة بجهاز التكثير الذكري .

بابعاً: فارن بيتا

١. النطاف والبويضات من حيث توزع النسب وبلاسما أنتاء الانقسام المنصف؟ النطاف (توزيع منتظم/متوازي) - البويضات (توزيع غير منتظم/غير متوازي)
٢. كمية الـ DNA في كل من البويضة والخلية البيضية الثانوية؟ نصف كمية الـ DNA الموجودة في الخلية البيضية الثانوية .
٣. بالاستعانة بالأشكال التي تعلم اقسام الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي أفارن بينهما من حيث: الفصل المجرى البولي عن المجرى التناسلي انحر مجرى مشترك اما لدى الانثى ينفصل المجرى البولي عن المجرى التناسلي

خامساً: رب كل مماليكت


- ١- أرب المساطق التي على النطاف احتياطها للوصول إلى نواه الحلية السصبة النابية .
- ٢) منطفعه الشعاعيه (٢) محل حول الحلية السصبة النابية (٤) عنساء هولى (٥) اكليل منشع (٦) نواه .

٤- رب مراحل نطور الجنين والبويضات في صبيص امراءه

الناضج	الثانوي	الأولى	الابتدائي	اسم الجريب
خلية بيضية ثانوية	خلية بيضية أولية	خلية بيضية أولية	منسلية بيضية	الخلية الموجودة فيه
In	2n	2n	2n	الصيغة الصبغية

ماذا ينتج عن كل مماليكت:

- ١- الانقسام المنصف الثاني على الخلية البيضية الثانوية؟ بويضة In وكرية قطبية ثانية In .
- ٢- احاطة المنسليات البيضية بطبقة واحدة من الخلايا الجريبية؟ تشكيل جريبا ابتدائيا
- ٣- احاطة الخلية البيضية الأولى بعد طبقات من الخلايا الجريبية؟ تشكيل جريبا أولى



الوظيفة	الموقع	اسم البنية
تشكل منها المنسليات البيضية	قشرة العبيض	خلايا الظهارة المنشئة
تسهم أهدافها في تحريك العروس الأنثوية باتجاه الرحم	تبطن المثانة النافلة للبويض	الخلايا الظهارية المهدبة بالقناة النافلة للبويض
النقط البويضات بعد خروجها من المبيض	في بداية المثانة النافلة	النوق
تنتج الهرمونات الجنسية الأنثوية (الإستروجينات والبروجسترونات)	في الجريبات المبيضية	الخلايا الحبيبية والقرابية
يؤمن الإنليل المنبع حماية الخلية البيضية الثانوية من الانتصاص بماي مكان قبل وصولها الرحم	من الخلايا الجريبية المحاطة بالخلية البيضية الثانية بعد تمزق الجريب الناضج .	الإكيليل المنشع
طريق لمرور الجنين في أنتاء الولادة الطبيعية .		المهبل أنتاء الولادة

الإجابة الصحيحة (الدرس الحادي عشر)

مجموعة تبدلات دورية تطرأ على المبيض ومخاطية الرحم وتتكرر كل ٢٨ يوماً تقريباً تبدأ في سن البلوغ وتتوقف في سن الإياس (الضئي ٤٥ - ٥٠ سنة)

الدورة المبيضية	د	الدورة الرحمية	ج	الدورة الجنسية	ب	الطمث
الحادنة الأكثر وضوحاً في مرحلة البلوغ هي بدء خروج الدم والذي يستمر من ٧ - ١٥ أيام:						
أ+ج	د	الحيض	ج	الدورة الجنسية	ب	الطمث
مدة الدورة الجنسية الطبيعية ٢٨ يوماً ويمكن أن تقل حتى عشرين يوماً أو تزيد حتى ٤٤ يوماً لأسباب متعددة						
ورم الخدة النخامية	د	أ+ب	ج	الصدمات العاطفية القوية	ب	كالإجهاد
أحد الهرمونات التالية بعد محفزاً للغدد الثدي لإنتاج الحليب:						
جميع ما سبق صح	د	البرولاكتين	ج	البروجسترون	ب	خلايا الظهارة المنشطة

الوظائف والمواقع

اسم البنية	الموقع	الوظيفة
FSH اثنى	من النخامة الأمامية	تطور جريبات وحدوث إباضة
LH اثنى	من النخامة الأمامية	حدوث الإباضة وتشكل الجسم الأصفر
الاهلين	من الجريب المسيطر	مثبطاً لنمو بقية الجريبات التي بدأت بالنمو مع الجريب المسيطر
أنزيم الأروماتاز		تشكيل ٧٠٪ من الاستراديول من التستوسترون
البروجسترون	من الجسم الأصفر في الطور الأصفر ومن المشيمة بعد الشهر الثالث	يتعاون مع الاستروجينات في تهيئة مخاطية الرحم للحمل، وينقص من توافر النقصانات الرحمية ، لماذا ؟ من أجل استقبال الكيسة الأرومية والتهيئة للحمل . نمو فصوصات واسناخ الثدي ، وإعدادها لإنتاج الحليب . يزيد من عمليات الأكسدة التنفسية.
الاستراديول	يفرز من الجريب الناضج في الطور الجريبي والجسم الأصفر في الطور الأصفر ومن المشيمة بعد الشهر الثالث	في المرحلة الجنينية : ظهور الصفات الجنسية الاولية (تشكل الأعضاء الجنسية للأنثى) يسهم في تغذية الجنين ، إذ يزيد من نمو خد مخاطية الرحم في مرحلة البلوغ: ظهور الصفات الجنسية الثانية: نمو الثديين بأخذ الحوض شكل بيضوي ، زيادة حجم المبيضين والرحم والمهبل ونمو العظام وتعظم غضاريف النمو بشكل أسرع من تأثير التستوسترون لدى الذكر


ثالثاً: اعطي نفسياً علمياً لكل مما يليه

- ١- تتوقف الدورة الجنسية بين سن ٤٥-٥٠ سنة؛ لأن المبيض يصبح غير نشط وظيفياً
 - ٢- تسمية الجريب الناضج بالجريب المسيطر؟ لأنه يفرز هرموناً مثبطاً للنمو بقية الجريبات التي بدأت بالنمو معه يسمى: الانهبيين.
 - ٣- أهمية وجود الكوليسترون في الصباغ اللوتيني في الجسم الأصفر؟ لأن الهرمونات الجنسية الأنوثية تشق من الكوليسترون.
 - ٤- حدوث اضطرابات جسمية ونفسية أحياناً لدى الأنثى في سن الإياس؟ بسبب انخفاض تركيز الهرمونات الجنسية مما يسبب ارتفاع في تركيز الهرمون.
 - ٥- يتوقف النمو الطولي لدى الإناث في سن أقل من توقيفه لدى الذكور؟ لأن الاستراديول يسبب نمو العظام وتعظم غضاريف النمو بشكل أسرع من تثبيط نمو التستوسترون لدى الإناث.
 - ٦- ينمو الجريب الأولى المسيطر وحده متولاً إلى جريب ناضج. لأنه يفرز هرمون التستوسترون يثبط إفراز هرمون FSH النامي
 - ٧- توقف تطور جريبات جديدة لدى الأنثى الحامل. لأن ارتفاع تركيز البروجسترون يثبط إفراز هرمون LH في مرحلة البلوغ.
 - ٨- ظهور صفات جنسية ثانية عديدة لدى الأنثى في مرحلة البلوغ. بسبب إفراز الاستروجينات (الاستراديول) في مرحلة البلوغ.
- رابعاً: المخططات البيانية** **بملاحظة:** لحل المخططات البيانية يجب عليك مراجعة ما يلى

- ١) **الدورة المبيضية :** يبدأ بنمو جريبات أولية عدة في أحد المبيضين غالباً بتأثير هرمون الـ FSH المنبه للجريب ، وأحد هذه الجريبات يتحول إلى جريب ثانوي ثم ناضج ويسمى : الجريب المسيطر (عل) : لأنه يفرز هرموناً مثبطاً للنمو بقية الجريبات التي بدأت بالنمو معه يسمى : الانهبيين.
 - ٢) **الدورة الرحمية :** تبدأ الدورة الرحمية بحدوث الطمث الناتج عن تمزق بطانة الرحم ، وخروج خلايا الدم ، وأنسجة متخرجة إلى الخارج ، ولا تتعرض خلايا بطانة القاعدية الرحمية للتلف ، وتزداد ثخانتها من جديد وتتصبح غنية بالخد المخاطية والأوعية الدموية والغlikogenin . ماذا يحدث للبطانة الرحمية إذا لم يحدث إفراز وحمل ؟
 - ٣) **تنزق أو تنخرب و يحدث الطمث .** الخلايا الخدية الصماء كالخلايا جيبية والقرايبية في الجريب الناضج هي التي تنتزع الهرمونات السيترونيدية الجنسية الأنوثية .
 - ٤) **الاستراديول :** من أين يفرز في الطور الجريب ؟ وإلى متى يستمر الجسم الأصفر بإفرازه ؟ إذا حصلت حمل تقوم المشيمة بإفرازه بعد الشهرين الثالث من الحمل حتى الولادة .
 - ٥) **أذكر وظيفة أنظيم الأروماتاز ؟** تشكيل ٧٠٪ من الاستراديول من التستوسترون . يوجد في خلايا الذكور البالغين كميات قليلة من الاستراديول ويزداد إنتاجه لدى الرجال المتقدمين في السن .
- من أين يفرز الاستراديول : يفرز من الجريب الناضج في الطور الجريبي والجسم الأصفر في الطور الأصفر ومن المشيمة بعد الشهرين الثالث .
- أهمية الاستراديول في المرحلة الجنينية :** ظهور الصفات الجنسية الاولية (تشكل الأعضاء الجنسية للأنثى) يسهم في تخصية الجنين ، إذ يزيد من نمو عدد مخاطية الرحم .

- ٦) **في مرحلة البلوغ :** ظهور الصفات الجنسية الثانية (المعيبة للأنتى البالغة) ماهي ؟ نمو الثديين بأخذ الحوض شكل بيضوي ، زيادة حجم المبيضين والرحم والميبل ونمو العظام وتعظم غضاريف النمو بشكل أسرع من تأثير التستوسترون لدى الذكر .
 - ٧) **البروجسترون :** (الهرمون المهيء للحمل) . من أين يفرز في الطور الأصفر ؟ إذا حصلت حمل تقوم المشيمة بإفرازه بعد الشهرين الثالث حتى الولادة .
 - ٨) **وظائف البروجسترون (أهمها) :** يتعاون مع الاستروجينات في تهيئة مخاطية الرحم للحمل ، وينقص من تواتر التقلصات الرحمية ، لماذا ؟ من أجل استقبال الكيسة الأروماتية للحمل .
 - ٩) **نمو فصوصات واسناخ الثدي ، وإعدادها لإنتاج الحليب .** يزيد من عمليات الأكدة التنفسية .
- لديك المخططات البيانية التالية أحب عن الأسئلة:**

- ١- يرتفع تركيز الهرمون المثبط انهبيين في اليوم العاشر تقريباً من الدورة الجنسية، كيف يؤثر ذلك على تركيز FSH ؟ وما نوع التلقيم الرابع في هذه الحالة؟ نوعه راجع سلبي وينبئ إفراز الـ FSH .
- ٢- ما الهرمونات النخامية التي تسهم في حدوث الإباضة في منتصف الدورة الجنسية عادة ؟
- ٣-لاحظ زيادة تركيز الأستروجين عند تشكيل الجريب الناضج، ثم انخفاض تركيزه عند تمزقه ثم زيادته مرة ثانية حين تشكيل الجسم الأصفر ، من أين يفرز هذا الهرمون ؟ يفرز الأستروجين من الجسم الأصفر في الجسم الأصفر والجريب الناضج.



١- بزداد تركيز البروجسترون بعد الإباضة وتشكل الجسم الأصفر، ما تأثير ذلك على مخاطية الرحم؟ تزداد ترانشة مخاطية الرحم.

من أين يفرز البروجسترون؟ من الجسم الأصفر في الطور الأصفر.

٤- يصل تركيز هرمون الاستروجين، هذا أعلى مما في الأيام الثلاثة التي تسبق الإباضة، مانع التلقيم الراجع على الوطاء والغدة النخامية في هذه الحالة؟ ما دليلك على ذلك من المخطط؟ تقييم راجع إيجابي والدليل زيادة إفراز GnRH و FSH و LH.

٥- هناك عدة أدلة على أن هذه الأنثى غير حامل، أحدها انخفاض تركيز الهرمونات الجنسية في نهاية الدورة الجنسية، ذكر دليلاً آخر على الأقل من الشكل.

٦- ارتفاع الهرمونات النخامية FSH و LH و هرمون الوطاء GnRH.

٧- ضمور الجسم الأصفر دليل على أن الأنثى غير حامل.

٨- تزق مخاطية الرحم وحدث الطمث.

٩- انخفاض حرارة الأنثى في نهاية الدورة الجنسية.

١٠- فسر: ارتفاع حرارة جسم الأنثى في الطور الأصفر؟


يسبب إفراز هرمون البروجسترون فيسبب زيادة في الأكسدة التنفسية.

١١- الاحظ انخفاض تركيز FSH عند زيادة تركيز البروجسترون في دم المرأة. ما تأثير ذلك على تطور جريبات جديدة؟ نوع التلقيم راجع سلبي. تأثيره يوقف تطور جريبات جديدة.

١٢- فسر: توقف الدورة الجنسية خلال الحمل؟ لأن البروجسترون يبطئ FSH فيتوقف تطور جريبات جديدة.

١٣- لماذا يستخدم البروجسترون في حبوب منع الحمل؟ لأنه يبطئ إفراز الـ FSH، فتوقف تطور جريبات جديدة.

١٤- يفرز الوطاء هرمون GnRH والذي يحرض النخامة الأمامية فتفرز هرموني FSH و LH، ما تأثيرهما في المبيضين لدى المرأة؟



هرمون FSH تؤدي إلى تطور جريبات وحدث الإباضة.

هرمون LH تؤدي إلى حدوث الإباضة وتشكل الجسم الأصفر.

١- ماذا ينتج عن زيادة تركيز هرموني الإستراديلول والبروجسترون على كل من الوطاء والنخامة الأمامية؟ تقييم راجع سلبي.

٢- من وظائف البروجسترون إعداد الخد الثديية لأغتنانج الحليب، ما الهرمون النخامي الذي يحفزها على إنتاج الحليب؟ وأين يقع مستقبله النوعي؟

٣- البرولاكتين ويقع مستقبله النوعي في الغشاء الهيولي للخلية الهدف.

ماذا ينتهي عن كل مما يلحوظ

٤- تزق الجريب الناضج والجزء العلامس له من قشرة المبيض في نهاية

الطور الجنسية؟ حدوث الإباضة وتحرر الخلية البيضية الثانوية

٥- تأثير عدم حصول القاح وحمل على بطانة الرحم؟ تزق أو تخترب ويحدث الطمث

٦- عدم تعرض خلايا المنطقة القاعدية في البطانة الرحمية وتزداد ترانشتها من جيد وتصبح غنية بالغدد المخاطية والأوعية الدموية والغликوجين

٧- إصابة الغدة النخامية بورم؟ غياب الدورة الجنسية

الدرس الثاني عشر

أولاً: اختبر الاجابة الصحيحة لكل ممائلحة

١- تبقى الخلية البيضية الثانوية محفوظة بحبيتها بعد خروجها من المبيض لمدة:

٣٦ ساعة	٤٨ ساعة	٤٨-٤٤ ساعة
د	ج	ب

٢- تتفق الخلية البيضية الثانوية بـ ١٠٠٠-٣٠٠٠ نطفة في :

٣٠٠٠-١٠٠٠ نطفة في :

أ	القناة الناقلة للبيوض	ب	الرحم	ج	الثُلث الأعلى للقناة الناقلة للبيوض (نفير فالوب)	د	أ+ج
٣	أحد الأقسام التالية تسبب تلاشي الخلايا والتطاف المحيطة بالخلية البيضية						
٤	تقابض طبيعية النواة الذكرية مع النواة الأنثوية في :	ب	غشاء الإخصاب	ج	FSH	أ+ب	أنزيم الهيلالورونيز
أ	مركز الخلية البيضية الثانية	ب	مركز البوسطة	ج	مركز النطفة	د	جميع ما سبق مع

اعطى عسراً علمياً لكل مما يلى:

- أهمية وصول (3000-1000) نطفة إلى موقع الإخصاب مع العلم أن نطفة واحدة فقط تلقع الخلية البيضية الثانية لأن النطفة الواحدة لا تتوفر أنظيمات كافية فتقوم التطاف التي تصل إلى جوار الخلية البيضية الثانية ياطلاق دفعات من الانظميات تفك الإكليل المشع فتسمح لإحدى النطف بالدخول.
- لا تلقع الخلية البيضية الثانية إلا بنطفة النوع نفسه؟ لوجود مستقبلات نوعية في غشاء الخلية البيضية الثانية ترتبط مع خيط من الجين ذي النطفة.
- لا تلقع الخلية البيضية إلا بنطفة واحدة؟ بسبب إزالة استقطاب غشاء الخلية البيضية الثانية من ٦٠ - ٢٠ + وبسبب التفاعل الفشري.
- تلاشي النطف والخلايا المحيطة بالخلية البيضية عند حدوث الإلقاء؟ بسبب تشكل غشاء الإخصاب

ماذا ينتهي عن كل مما يلى:

- انفجار الحبيبات الفشرية في المجال حول الخلية البيضية الثانية؟ تلاشي الخلايا والتطاف المحيطة بها
- اندماج طبعي النواة الذكرية مع الأنثوية وتقابض الصبغيات؟ تشكيل بيضة ملقحة ٢١
- إزالة كمون غشاء الخلية البيضية الثانية من إلى ٦٠ - ٢٠ +؟ منع دخول أي نطفة جديدة إليها
- انقسام نواة الخلية البيضية الثانية انقسام منصف ثانٍ؟ بوبيضة ١n + كريمة قطبية ثانية ١n

ادرس الحاله التالية:


أثناء اعطائى لدرس التامى الجنيني ضمن الثانوية المحسنة فطرحت على الطالب مجموعة من الأسئلة :

- بعد أن تعبر بعض النطف الرحم تسمى المنطقة التي تصل إليها القناة الناقلة للبيوض ماذا يطلق عليها اسم آخر أيضاً؟ نفير فالوب وكم يستغرق الوقت لكي تصل النطف إليها؟ بغضون نصف ساعة إلى ساعتين وما الذي ساعدها بالوصول؟ بفضل تقلصات الرحم والقناة الناقلة للبيوض ومن دون تحرض؟ يحرض هذه التقلصات الأكسينوسين في أثناء الجماع وحاثة البروستاغلاندين المفرزة من الحويصلين المنويين أثناء الإقتران
- ما الذي يسهل دخول الخلية البيضية الثانية للقناة الناقلة للبيوض؟ وجود ظهارة مهدبة للصيوان وتيار من السائل الجريبي يخرج في أثناء الإباضة
- رتّب مراحل الإلقاء بدءاً من الاختراق وحتى تشكيل البيضة الملقحة؟

الاختراق، التعارف، الالتحام، تشكيل غشاء الإخصاب، دخول نواة النطفة، متابعة نواة الخلية البيضية الثانية الانقسام المنصف الثاني، تشكيل نواة الذكرية وتقابليها مع طبيعية النواة الأنثوية، اندماج النواتين وتشكل البيضة الملقحة.
لاحظ الشكل الآتي الذي يمثل بنية الخلية البيضية الثانية، واجيب عن الأسئلة المجاورة:

- اكتب الأرقام المحددة على الشكل مع المسمى المناسب.
- أين تتوضع صبغيات النواة؟ ولماذا؟
- ما وظيفة المسماة ١؟ وما مصدره؟
- من أي المكونات يتشكل غشاء الإخصاب؟

- المسماة ١ - إلمايل شمع ٢ - مذملة شفافة ٣ - بكرة الدلبية أولى ٤ - حبيبات قشرة ٥ - حولي
- فتؤمن صبغات النواة على المراحلة الاستوانية لاته توافق ذروها الانقسام المنصف الثاني في المذول
- والمذمة المسماة ١ حسكة الخلية البيضية الثانية من الانقسام يعني مكان فعل وصولها الرحم المتزرق
- من الحداب الجزءية في الحبيب الدامض يتشكل غشاء الإخصاب بدءاً من المكون رقم ٤ (الحبسيت الفشرية)

**الخلية البيضية الثانية**

بسبلات التنويعة للنطفة

نهرة المهدية للصيوان

نهراء الانصار

بروتينات المنبطحة النطاقيّة

ثقب الهيالورونيداز المفرز من جسم الطرفى للنطفة

ثقب الأكروسين

الوظيفة	الموقع	اسم البنية
يرتبط بها خط من الجسم الطرفي للنطفة لتنمية التعارف	في غشاء الخلية البيضية الثانوية	
ويسهل دخول الخلية البيضية الثانوية في القناة الناقلة .	حول الخلية البيضية الثانوية	
تلاثي الخلايا والنطاف المحاطة بالخلية البيضية الثانوية	في غشاء الخلية البيضية	
تقوم بإيقاف تنشيط مستقبلات النطاف في غشاء الخلية البيضية وجعل المنطقة الشفيفية قاسية ، مما يمنع دخول أية نطفة أخرى .	من الجسم الطرفي بعقصمة رأس النطفة	ثقب الهيالورونيداز المفرز من جسم الطرفى للنطفة
يفك الروابط بين الخلايا الجريبية	من الجسم الطرفي بعقصمة رأس النطفة	
مفك للبروتين		

درس الثالث عشر**أ- انترا الإجابة الصحيحة لكل مماليٍ:**

١	قد يحدث الانغرس في القناة الناقلة للبيوض أحياناً ولا ينتج عنه مضافة قادرة على الحياة ويمكن أن يشكل تهديداً لحياة الأم ويسمى:	الحمل المهاجر	خارج الرحم	ج	أ+ب	د	جميع ما سبق صح	١
٢	وصول الكيسة الأروميه تجويف الرحم بعد:							
٣	زوال بطانة الرحم	ب	زوال المنطقة الشفيفية	ج	أ+ب	د	جميع ما سبق خلطة	١
٤	تنفذى الخلايا المنقسمة والتويته من :							


قط نفسياً علمياً لكل مماليٍ:

لا تكون التويته أكبر حجماً من البيضة الملقة ؟ لأنها لا يرافق الانقسامات الخيطية للبيضة الملقة أي زيادة في الحجم.
 لا يؤثر خروج كمية من دم الأم مع المشيمة في أثناء الولادة لأن حجم دم الأم يزداد خلال الحمل نتيجة تدفق الدم إلى المشيمة
 لأن الاختلاط بين دم الأم والجنين ؟ لأن طبقات الزغابات الكوريونية تفصلهما عن بعضها
 تحتاج النساء الحوامل إلى التبول بشكل مستمر ؟ لأنه يزداد معدل الترشيح الكببي في الكلية بنسبة ٥٠٪
 تتحوى خلايا الكيسة الأرمومية على أنزيم الهيالورونيداز ؟ لأنه يفك البروتينات السكرية في بطانة الرحم مما يسمح للكيسة الأرمومية بالانغرس
 تحدث تغيرات في أجهزة الأم تؤدي إلى زيادة في معدل التنفس والسعنة الحياتية للرلتين نهاية الحمل ؟ لمواجهة متطلبات الجنين التنفسية التي ترداد
 بشدة وزيادة حجمه
 تنمو الجنين بسرعة وتشعر الأم بحركة جنينها في الشهر الرابع ؟ بسبب تشكل الجهاز العصبي لدى الجنين
 تعدد الحوض وتوسيع عنق الرحم في أثناء الولادة ؟ لأن الريلاكسين يزيد من مرونة الارتفاق العانى مما يسمح بتمدد الحوض وتوسيع عنق الرحم في
 أثناء الولادة
 تدع المشيمة شدة صماء ؟ لأنها تنتج هرمونات الاستروجينات والبروجسترونات منذ نهاية الشهر الثالث من الحمل وتسمى في استمراية
 الـ هيموغلوبين الجنيني الخاص بالجنين يمكنه من نزع الأكسجين من هيموغلوبين الأم

- ١١- نمو الجوف الأمينوسي وتطوره وضمور الكيس المحي خلال الحمل؟ يحتوي الجوف الأمينوسي على السائل الأمينوسي الذي يدعم القرص الجنيني ويحيط به من الصدمات ويحمي الجنين من الصدمات بالمراحل اللاحقة.
- ١٢- زيادة حجم دم الأم نتيجة تدفق الدم إلى المشيمة؟ لأن الجنين ينتصض ضغط دم O_2 ويزيد ضغط CO_2 في الدم، مما يحفز إنتاج هرمون الإبروستروبوبين فيزيد حجم الدم لدى الأم خلال الحمل.
- ١٣- انتقال O_2 إلى دم الجنين بسرعة؟ يكون الهيموغلوبين الجنيني الخاص بالجنين ذا انجذاب أكبر للأوكسجين من هيموغلوبين الأم مما يمكنه من نزع الأوكسجين من هيموغلوبين الأم.
- ٤- السطح الواسع للزغابات الكوربيونية التابعة للمشيمة؟ لتسهيل المبادلات بين دم الجنين ودم الأم.

مادا يحيى عن كل مما يليه:

- ١- هجرة بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الجوف الأمينوسي؟ تشكل غشاء الأمينوسي.
- ٢- هجرة بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الجوف المحي؟ تشكل غشاء الكيس المحي.
- ٣- نمو خلايا الأرومة المغذية؟ تشكل غشاء الكوربيون أو المشيمة.
- ٤- عدم إنتاج HCG في الشهر السابع من الحمل؟ لا يؤثر على الحمل لأن المشيمة تقوم بإفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية التي توفر من استمرار الحمل.
- ٥- استمرار نمو الزغابات الكوربيونية وتفرعها في منطقة محددة من بطانة الرحم؟ تتشكل المشيمة.
- ٦- تشكل طبقة ثانية بين طبقتي القرص الجنيني الخارجية والداخلية؟ تشكيل وريقات ثلاث مستقلة.



حل المخطط الساني المجاور:

- ٠ من خلال المخطط البياني المجاور:

- ١- في أي أسبوع تبدأ زيادة حجم دم الأم؟ في الأسبوع ٢٠
- ٢- ما حجم دم الأم في نهاية الحمل تقريباً؟ ٦ لتر
- ٣- متطلبات الأم من المواد الغذائية، لماذا تكون شهية النساء الحوامل للطعام عالية؟ لتأمين المبادلات واحتياجات الجنين المتزايدة.


حل المخطط الساني المجاور:

- ١- ما التسلل على أن هذه المرأة حامل؟ ارتفاع تركيز الاستراديل والبروجسترون و HCG

- ٢- ماذا يحدث للجسم الأصفر إذا توقف إنتاج HCG في الأسبوع الثامن؟ وما تأثير ذلك على الحمل؟ ضمور الجسم الأصفر وتوقف إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية و يؤدي إلى الإجهاض.
- ٣- متى يبدأ تراجع تركيز HCG؟ لماذا برأسك؟ بعد الأسبوع ١٢ / بسبب تشكل المشيمة التي تقوم بإفراز البروجسترون والاستراديل.
- ٤- ما تأثير HCG على حدوث الإباضة؟ لا تأثير له

ادرس الحالات التالية:

- ١- لماذا تقوم المشيمة بدور جهاز تنفس وجهاز هضم وجهاز إطراح بالنسبة للجنين؟



تفس : لأنها تخلص الجنين من CO_2 وتروده بـ O_2 .

هضم : لأنها تنتص الأغذية المنحلة من دم الأم إلى دم الجنين.

إطراح : لأنها تزيل الفضلات الأذوية من دم الجنين وتطرحها في دم الأم.

- ٢- تحصل المضفة الجنينية على المناعة من الكيس المحي خلال الأسابيع الأولى، فما مصدر المناعة لاحقاً؟ من الأضداد الموجودة بدم الأم
- ٣- الورنيات الجنينية الثلاثة ما دور كل منها؟ الورنيقة الخارجية : تشكل الجهاز العصبي / الورنيقة الوسطى : الجهاز الهيكلي والعضلي والتنسلي / الورنيقة الداخلية : السبيل الهضمي ويتحوال بعد ذلك القرص الجنيني إلى مضفة

٤- أربّ مراحل التشكيل الجنيني الآتية لنصبح صحيحة :

الترتيب هو: البصمة الملحقة ، البؤبة ، الكيسة الأرومية ، القرص الجنيني ، المضفة

الوظيفة	الموقع	المستقبلات النوعية للنطفة
يرتبط بها خيط من الجسيم الطرفي للنطفة لتم عملية التعارف	في غشاء الخلية البيضية الثانوية	الظهارة المهدبة للصيوان
يسهل دخول الخلية البيضية الثانوية في القناة الناقلة .	حول الخلية البيضية الثانوية	غشاء الإخصاب
تلاشى الخلايا والنطاف المحاطة بالخلية البيضية الثانوية	في غشاء الخلية البيضية	البروتينات المثبتة النطاقة
تقوم بايقاف تنشيط مستقبلات النطاف في غشاء الخلية البيضية وجعل المنطقة الشفيفية قاسية ، مما يمنع دخول نطفة أخرى .	من الجسيم الطرفي بمقدمة رأس النطفة	أنظيم الهيالورونيداز
الوظيفة	الموقع	اسم البنية
يفك الروابط بين الخلايا الجريبية	من الجسيم الطرفي بمقدمة رأس النطفة	أنظيم الأكروسين
مفكك للبروتين		
الوظيفة	الموقع	اسم البنية
ستعطي بعض أغشية الجنين وتفرز أنزيمات تفكك المنطقة الشفيفية كما تزود المضافة الجنينية بالمواد المغذية		خلايا الأرومة المغذية
ستقوم بتشكيل المضافة وتشكل بعض الأغشية الملحة بالمضافة		الكتلة الخلوية الداخلية
فتتفكك جدران الشعيرات وينتقل دم الأذم إلى الفضلات التي فتحتها الأرومة المغذية .	المنشا: نمو امتدادات الأرومة المغذية	زغابات أرومية
يدعم القرص الجنيني ويحميه من الصدمات		السائل الأمنيوسي
يعد مصدر الغذاء الأساسي للتنامي الأذلي للقرص الجنيني ويصبح مركزاً لإنتاج خلايا الدم وخاصة الخلايا المناعية خلال الأسبوع الأول من الحمل .		الكيس المحي
يزود الجنين بالمواد التي تبقيه على قيد الحياة ويخلصه من الفضلات .		الحبل السري
الوظيفة	الموقع	اسم البنية
يفك البروتينات السكرية في بطانة الرحم .	مفرز من الكيسة الأرومية	انزيم الهيالورونيداز المفرز من الكيسة الأرومية

يحافظ على الجسم الأصفر ويدعم إفرازه لهرمون البروجسترون والاستراديول حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل	خلباً الأزومة المغذية خلال الانفاس ثم تتنفس المشيمة	هرمون HCG
يزيد من مرنة الارتفاع العاني مما يساعده تمدد الحوض وتوسيع عنق الرحم في أثناء الولادة .	تفوزه المشيمة والجسم الأصفر	هرمون الريلاكسين
يزيد حجم الدم لدى الأم خلال الحمل		هرمون الإبروثيروبوتين

الدرس 14+15

أولاً: احمر الاحاره الصحيحه لكل ممارى:

يسعى توسيع عنق الرحم وبدء الجنين بالتحرك نحوه بتأثير التقباضات الرحم التي تحدث بمحل مورة كل نحو نصف ساعة	أ	مغص الولادة	ج	الولادة	د	المخاض	ب	أدب
تسمى الولادات التي تحدث في الشهرين السابع والثامن عادة ويستكمل المولود فيها فرصة جيدة للتجارة بوجود العناية	ج	ولادات الخدج	ب	ولادات الطبيعية	د	أدب	أ	أدب
يصاب بعض المواليد خلال الأيام الأولى من ولادتهم بـ تيرفان الوليدي فيبدو الجلد والطبقة الصلبة في العين بنون أصفر ويكون النبض الأكثـر دقة لذلك	ج	ولادات الطبيعية	ب	ولادات الخدج	د	أدب	أ	أدب
عدم قدرة الكبد على تكوين بروتينات بلازما الدم المولود	ج	كبد المولود غير مهيأ للعمل بصورة كافية عند الولادة	ب	ارتفاع تركيز البيليروبين	د	ضعف الدوران الدموي لدى المولود	ج	ج
يتعرض بعض المواليد لخطر نقص الناكسج في أثناء الولادة والذي يمكن تحمله لمدة ٢٠ دقائق وقد يسبب الاشتقاق والموت وخاصة لدى الخدج ، أحد العوامل الآتية لا يبعد من مسببات نقص الناكسج	ج	غير نفع تركيز البيليروبين في دمه	ب	الضغط الحبل السري .	ج	النفخة المفترطة للرحم	ج	النفخة المفترطة للألم والانفصال المبكر للمشيمة
هي الرسول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في الأمور المتعلقة وظائف الجهاز التناسلي	ج	الصحة العالمية	ب	الصحة الاجتماعية	د	النفخة المفترطة للألم والانفصال المبكر للمشيمة	ج	النفخة المفترطة للرحم
قطعة بلاستيكية يلف ليهلل لولب نحاسي ينتهي بخيط . تتراءع داخل الرحم لمنع التعبير	ج	الولب	ب	الثلثة	د	النفخة المفترطة للألم والانفصال المبكر للمشيمة	ج	النفخة المفترطة للألم والانفصال المبكر للمشيمة
الذهابات مهبلية وتقرحات يرافقتها ملزقات وبضائع وحدة شديدة يسببها جمع ماء سقي غط	ج	Candida	ب	فطر خمرة الخبيز	ج	Candida	ج	فطر خمرة الخبيز
الولبية الشافية	ج	III	ج	فطر خمرة الخبيز	ج	فطر خمرة الخبيز	ج	فطر خمرة الخبيز

اعطى بعسى أعلم ما لكي ممارى

- طرح المشيمة وفقدان ثمية من دم الأم ولكن يمكن تحمل ذلك دون صعوبة؛ لأن حجم دم الأم يزداد خلال فترة الحمل .
- يموت الجنين الناتج عن ولادات الخدج إذا كان وزنه أقل من ١ كغم؛ لأن جهاز التنفس والدوران والأطراف غير قادر على تأمين بقائه .
- أهمية الباب للطلل بعد الولادة؛ لأنها يوم من تراكم عاليه من الاصدارات ضد طيف واسع من الامراض .
- لا يستخدم اللولب إلا من النساء سهل وان انجين؛ لأنه قد يسبب عقم

مراجعة شاملة للمنهج بطريقة ورقه الامتحن الأخير

١. توقف الدورة الجنسية لدى معظم الأمهات خلال مدة الإرضاع؟ لأن البرولاكتين يثبط GnRH و FSH . وبالتالي يمنع نمو وتطور جريبات جديدة
 ٢. ترداد فرصة ولادة التوائم في الأخصاب المنسدلة؟ لأنه لا يتم زراعة أكثر من مضافة (توبته) في رحم الأم
 ٣. بعد المولود الناتج في هذه التفانة طفلًا شرعاً من الناحية الأخلاقية؟ لأن النطفة من الأب والبويضة من الأم وترعرع المضافة في رحم الأم نفسها

مادا يسمى بـ كل معلم بالجزء

١. استدال الانقباضات الرحيمية وتمزق الغشاء الأمينوسى؟ ماء الرأس
٢. استئام الطفل إلى ضربات قلب أمه في أثناء الرضاعة وكانتها عزف منفرد جميل في قاعة موسيقية هادئة؟ يؤمن الطمانينة والنمو النفسي والجسمي
٣. زيادة تركيز البرولاكتين في الدم؟ يثبط إفراز GnRH و FSH

التوائم غير الحقيقة	التوائم الحقيقية	الجنس
جنس واحد أو جنسين	من جنس واحد	التشابه
تشابه الأخوة	متطابقين	النشأ
من بيضتين ملقحتين منفصلتين أو أكثر	من بيضة ملقحة واحدة	

الوقاية	العرق	بعض الأعراض	العامل المسبب	المرض
تجنب العلاقات الجنسية مع المصابين	العلاقات الجنسية مع المصابين	صعوبة وألم في أثناء التبول مع قيء	جرائم المكورات البنية	السيلان (التعقيبة)
تجنب العلاقات الجنسية مع مصابين ، تجنب الحمل إذا كانت الأم مصابة	العلاقات الجنسية مع مصابين من الأم إلى جنينها	ذب في الأعضاء التناسلية	جرائم اللولبية الشاحبة	الزهري (السفل) الزهري (السفل)
عدم الاتصال الجنسي . فحص الدم قبل نقله.	الاتصال الجنسي مع مصاب أو مصابة بنسبة أكثر من ٨٠٪ .	تضخم عقد لمفيه . ارتفاع متكرر في الحرارة . تعرق غير ليل .	فيروس الإيدز	الإيدز (السيدة) العوز المناعي البشري المكتسب
عدم استخدام أدوات المصاب . تجنب الحمل إذا كانت الأم مصابة . عدم نقل وزراعة الأعضاء .	نقل الدم الملوث أو الحقن الملوثة وأدوات ثقب الجلد المتنوعة (وشم، حلقة، معالجة أسنان) . من الأم إلى جنينها عبر المشيمة لماذا لأن هذا الفيروس يتجاوز حاجز المشيمة أثناء الحمل أو الولادة نقل وزراعة الأعضاء .	التهابات وإصابات في أجهزة الجسم المختلفة نتيجة نقص المناعة فتظهر أمراض في كامل الجسم . يصاب الجلد بسرطان ساركتو ماكابوسي .		
تجنب الاتصال الجنسي . النظافة الشخصية للأنتى	الاتصال الجنسي التلامس المباشر	التهابات وتقرحات يرافقها مفرزات بيضاء وحكة شديدة	فطر خميرة	البيضات المهيبلة

درس الحالات التالية:**نقطة الأولى:**

ساعت في القرن الحالي عمليات الولادة القيصرية لدى كثير من السيدات في حين كانت الولادة الطبيعية سابقاً تحدث لدى غالبية النساء.
 لماذا تجأ بعض السيدات إلى الولادة القيصرية ما سبب حدوث المخاض والولادة ؟

قد ترغب بعض النساء في إجراء الولادة ضمن وقت محدد لأسباب تتعلق بظروف الحياة ويمكن أن يؤدي وضع الجنين ضمن الرحم إلى تعذر خروجه أثناء الولادة الطبيعية

أما المخاض فيحدث لعدة أسباب:

- ١) زيادة وزن الجنين تسهم في تمدد وتمزق بطانة الرحم .
- ٢) تحرر الأوكسيتوسين OXT من النخامة الخلفية ، مما يزيد من تواتر النقلصات الرحيمية .
- ٣) إفراز البرومستاغلاندين من المشيمة بتحريض من الأوكسيتوسين فتردد النقلصات الرحيمية .
- ٤) إفراز الريلاكتين من المشيمة . مادوره ؟ تبين الارتفاع العائلي .
- ٥- ما هي مراحل الولادة أنكرها (دون شرح) وحدد الفترة الزمنية لكل منها؟

١- مرحلة الاتساع : توسيع عنق الرحم وبدء الجنين بالتحرك نحوه بتأثير انقباضات الرحم التي تحدث بمعدل مدة كل حوالي نصف ساعة (مفص الولادة) تتشدّد الانقباضات فيتمزق الغشاء الأمينوسي (ماء الرأس) وتستمر هذه المرحلة ٨ ساعات تقريباً .

٢- مرحلة الإطلاق : تصل الانقباضات الرحيمية ذروتها حتى خروج الجنين وحدوث الولادة وتستمر هذه المرحلة بحدود (ساعة - ساعتين) مرحلة خروج المشيمة : بسبب زيادة نقلصات الرحم إلى تمزق الروابط بين بطانة الرحم والمشيمة وخلال ساعة من الولادة يتم عدّة طرح المشيمة وفقدان كمية من دم الأم .
٤- لماذا تتجأ بعض السيدات إلى الرضاعة غير الطبيعية؟ مارأيك في ذلك؟ بسبب مرض الأم الذي يمنعها من الإرضاع الطبيعي أو عدم إنتاج حليب يمكن كافية أو سبب نفسى لدى الأم يسبب لدى الطفل أو يوثر لدى الطفل بالحالة النفسية والجسدية
٥- ماذا يسمى الجهاز الذي يتم من خلاله الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ التصوير الشعاعي

٦- ما الهرمون الذي يسبب إنتاج الحليب؟ وما الهرمون الذي يسبب إفراجه؟ ومن أين ينتج كل منهما؟ الأوكسيتوسين تفرزه خلايا حساسية في الوطاء، إفراز الحليب بالبرولاكتين تفرزه النخامة الأمامية / إنتاج الحليب .
مراحل إنتاج الحليب وإفراجه :

- ١- تحفيز مستقبلات اللقس : مص الرضيع حلمة الثدي ينشط مستقبلات حسية في الثدي .
- ٢- نقل السيالة العصبية : تتشكل سيالة عصبية تنتقل عبر النخاع الشوكي إلى الوطاء .
- ٣- إفراز الأوكسيتوسين : يفرز الوطاء هرمون الأوكسيتوسين الذي ينتقل إلى النخامة الخلفية .
- ٤- تحرر الأوكسيتوسين : ينتقل الأوكسيتوسين عبر الدم إلى العضلات الملساء المحيطة بجيوب الثدي .
- ٥- إفراج الحليب : تتنقص هذه العضلات بتأثير الأوكسيتوسين مما يسبب إفراج الحليب .

الحالة الناتجة:


إذا تعذر الإنجاب لدى الزوجين لفترة طويلة دون أسباب محددة تتجأ بعض الأسر إلى الإنجاب بطريقة الإخصاب المساعد استناداً إلى هذه التقنية، وأجيب عن الأسئلة المرافقة

- ١- تزداد فرصة ولادة توائم في هذه التقنية، لماذا برأيك؟ لأنه لا يتم زراعة أكثر من مضغة حيوية في رحم الأم .
- ٢- يلجأ إلى هذه الطريقة في حالات ماهي؟
- ١- انسداد القناتين الناقلتين للبيوض .
- ٢- قلة عدد نطاف الزوج أو ضعف حركتها .
- ٣- العقم لمدة طويلة من دون معرفة الأسباب .

٢- لماذا يعد المولود الناتج في هذه التقنية طفلاً شرعاً من هذه الناحية؟ لأن النطفة من الأب والبويضة من الأم وتزرع البويضة في رحم الأم نفسها


١) ما المرض الأكثر أهمية في اختبارات فحص الزواج في رأيك ؟ ولماذا؟
الإيدز: لأنه أكثر الأمراض خطورة إذ ينتقل فيروس الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي مع مصاب ، وينتقل من الأم إلى جنينها في أثناء الولادة ، ولا يمكن علاجه علماً أن الشخص قد يكون حاملاً للفيروس دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة.

٢) إذا تمت زراعة خمس تويتات في تقانة الإخصاب المساعد وحدوث التعشيش في جميعها ، ماعدد المواليد المحتمل إنجابها، ما الطريقة التي يلجأ إليها الأطباء لمنع حدوث ذلك ؟
عدد المواليد المحتمل إنجابها : خمس مواليد على الأقل لأنه قد تحصل انشطارات في التويتات المتسلكة ويتشكل توائم حقيقية أحيلنا .
الطريقة التي يلجأ إليها الأطباء لمنع حدوث ذلك تم إزالة عدد من المضبغ بعد حدوث الانقسام .




- ١- ماذا يحدث للأنثى الحامل السابقة إذا توقف إنتاج HCG في اليوم ١٥ من عمر المضافة؟ ضمور الجسم الأصفر وتوقف الهرمونات الجنسية وحدوث الإجهاض.

يمثل الشكل الآتي حادثة الإلقاء ومراحل التشكيل الجنيني لدى الإنسان، والمطلوب:



- ١- اذكر المعنى المعاون للأرقام المحددة على الشكل. ١- نطفة ٢- خلية بيضية ثانوية ٣- بيضة ملقحة ٤- مرحلة الخلتين ٥- متويته ٦- الكيسة الأروممية ٧- رويقات جنينية ٨- المضغف ٩- الجنين
- ٢- حدد الصيغة الصبغية لخلايا كل من الأقسام السابقة. ١/١n/٢ / ١n/١ / ٢n/٩+٨+٧+٦+٤+٣
- ٣- في أي المراحل المذكورة يبدأ تشكيل الجهاز العصبي؟ في المرحلة ٨
- ٤- إذا أردنا الحصول على خلايا جذعية كاملة الإمكانيات، ففي المراحل هي الأفضل؟ في المرحلة ٥

أتفق جيداً في المخطط البياني الآتي الذي يبين معدل إنتاج التستوسترون و النطاف، وأجيب عن الأسئلة:



- ١- ما أهمية التر��يز المرتفع نسبياً للتستوسترون في الجنين خلال الثلاث الأخيرة من الحمل؟ لهجرة الخصيـتـين
- ٢- لماذا يكون ترڪيز التستوسترون مرتفعاً عند حدث الولادة؟ من أجل نمو الأعضاء الجنسية لدى المولود

٣- ما العلاقة بين معدل تركيز التستوسترون وانتاج النطاف؟ ولماذا يقل انتاج النطاف بعد سن السبعين؟ يزداد انتاج النطاف بزيادة معدل تركيز التستوسترون ويقل انتاج النطاف بعد سن السبعين بسبب انخفاض تركيز التستوسترون تكون الخلايا البنية غير فعالة في خصبة الطفل وفعالية لدى حدث الولادة والبالغ ، ما تأثير ذلك على ذلك؟ يكون تركيز التستوسترون منخفض جداً بين عمر سنة و ١٠ سنوات في حين يكون مرتفع لدى حدث الولادة وبعد البلوغ

يمثل الشكل الآتي مرحلة من مراحل النماء الجنيني لدى الإنسان والمطلوب:

١- ماذا تسمى هذه المرحلة؟ ومتى تبدأ بلاماسة بطانة الرحم في اليوم السابع من الاخصاب

٢- اكتب المسمى الموافق للأرقام المحددة على الشكل. ١- كتلة خلوية داخلية ٢- جوف أروم ٣- أرومة غذية

٤- ماذا ينتج عن نمو الخلايا ذات الرقم ٣؟ تشكيل غشاء الكوريون /المشيميا/

٥- أي من المكونات الثلاثة تساهم في تشكيل الغشاء الأمينوسي. رقم ١ (الكتلة الخلوية الداخلية)

لديك الشكل الآتي الذي يمثل موازنة بين تشكل النطاف لدى الذكر وتشكل البوopiesات لدى الأنثى والمطلوب

١- املأ الفراغات المحددة على الشكل مع المسمى العلمي المناسب.

٢- كيف توزع الهيولى في مرحلة الانقسام المنصف لدى الجنسين؟

وما تأثير ذلك على عدد الأعراض الناتجة؟

٣- انفراد

حيط مسلبة متوبة من، منصف أول

متوبة ثانية (٢٥) ، منصف أول



متوبة ثانية (٢٦) ، منصف ثان

نماز

كرينة ثانية

دورة ميتمها الصغيرة (٦)

٤- توزع نسائي لدى الذكر فيبلغ أربع عذاف، أما الأنثى فلا توزع السنوية مما يتساوي وينبع تشكل بوopiesات واحدة فقط



الوظيفة	الموقع	اسم البنية
تردد النقصانات الرحيمية	من المشيمية يتحرر من الأوكسيتوسين	البروستاغلاندين عند الأنثى
انتاء الولادة: تثبيت الإرتفاع العانى مما يسهل الولادة	انتاء الولادة يفرز من المشيمية	الريلاكسين

المراثة**درس الأول****فتر الإجابة الصحيحة:**

١	مجموعة من أفراد النوع الواحد تتمايز بصفة وراثية واحدة أو أكثر، التراوّح فيما بينها يعطى <u>أفراداً تمايز الآباء</u> من حيث الصفة المدرّسة	الهجهونة	د	التهجين	ج	السلالة الهجينية	ب	السلالة الصافية
٢	مجموعة من أفراد النوع الواحد تتمايز بصفة وراثية واحدة أو أكثر، التراوّح فيما بينها يعطى <u>أفراداً بعضها</u> <u>بعضها</u> <u>معاً</u> <u>لآباء</u> . وبعضها يختلف من حيث الصفة المدرّسة.							
٣	عملية تراوّح بين سلالتين إما صافيتين، أو هجينتين من نوع واحد، تختلفان بشفع واحد من الصفات الوراثية المتقابلة.	جميع ما سبق خطأ	د	السلالة الهجينية	ج	الهجهونة	ب	السلالة الصافية
٤	عملية تراوّح بين سلالتين إما صافيتين، أو هجينتين من نوع واحد، تختلفان بشفع واحد أو أكثر من الصفات الوراثية المتقابلة.	النظرية الصبغية	د	الهجهونة الثانية	ج	الهجهونة الأحادية	ب	الهجهونة
٥	يفرق عامل الصفة الواحدة عند تشكيل الأعراس، ويذهب كل منها إلى عروس يعود ذلك إلى	كل ما سبق على	د	الهجهونة الثانية	ج	الهجهونة	ب	الهجهونة الأحادية
٦	الوراثات محمولة على الصبغيات، وتنتقل عبرها من جيل لآخر.	الهجهونة	د	أب	ج	قانون الانفصال	ب	قانون مندل الأول
٧	دقائق مادية صغيرة تتوضع بصفة خطية واحدة على طول الصبغي بحيث يكون لكل وراثة موقع محدد وثابت عليه.	الوراثات	د	أب	ج	الصبغيات	ب	النظرية الصبغية
٨	عند تكوين الأعراس فإن كل زوج من الأليلات الخاص بصفة وراثية واحدة:	كل ما سبق خطأ	د	أب	ج	الصبغيات	ب	الوراثات
٩	أحد الانماط الوراثية الآتية يعد هجينًا بالنسبة للصفتين:	يتضاعف	د	يتجمع	ج	يتحد	ب	يفترق
١٠	نحصل على أربعة أنماط من الأعراس إذا كان النمط الوراثي للفرد هو:	Rr Bb	د	Rr BB	ج	rr Bb	ب	RR bb
١١	إذا كان النمط الوراثي لنصف الجيل الناتج هو: (RR) فإن النمط الوراثي للأبوبين هو:	aaBb	د	AaBB	ج	AaBb	ب	Aabb
	مراجعة شاملة للمنهج بطريقة ورقة الامتحان الأخير	rr x RR	د	Rr x Rr	ج	Rr x RR	ب	Rr x rr

ظهور سلالات وراثية جديدة في الجيل الثاني التertiariale؟ لعدم وجود ارتباط بين الصفتين

الأعراس نقية دوماً؛ لأن العروس أحادية الصبغة الصبغية فهي تملك عاملًا وراثياً واحداً من عاملين الصفة الواحدة

المدرس: احمد حيدر الشيخ

مذكرة (١): أجري التهجين بين كبش أغنام صوفها أبيض (A) وأغنام صوفها أسود (a) فكانت جميع الأغنام الناتجة صوفها أبيض والمطلوب:

- ١- ما نمط الهجونة؟ رجحان تام لرجحان صفة الصوف الأبيض على الصوف الأسود
- ٢- وضعجدول وراثي نتائج هجونة الآباء وأفراد الجيل الأول:
 - ١- رحمل تام لظهور مذكرة أحد الآباء في الجيل الأول.
 - ٢- هجونة الآباء.

أسود × أبيض	النمط الظاهري للأبوين ١
AA × aa	النمط الوراثي للأبوين ١
A × a	احتمال أعراض الآباء ١
Aa	النمط الوراثي للجيل الأول ١

أبيض × أبيض	النمط الظاهري للجيل الأول
AA × AA	النمط الوراثي للجيل الأول
($\frac{1}{2}$ A + $\frac{1}{2}$ a) × ($\frac{1}{2}$ A + $\frac{1}{2}$ a)	احتمال أعراض للجيل الأول
$\frac{1}{4}$ AA + $\frac{1}{4}$ Aa + $\frac{1}{4}$ aA + $\frac{1}{4}$ aa	النمط الوراثي للجيل الثاني ١:٢
أبيض أبيض أسود (هجين) (صف)	النمط الظاهري للجيل الثاني ١:٢

مذكرة (٢): تم التهجين بين سلالتين صافيتين من نبات البازلاء؛ الأول: بذوره خضراء (Y) مجده (yy) ثالث: جميع نباتات الجيل الأول بذور صفراء ملساء (R) والثاني: بذوره خضراء (Y) مجده (yy) (دورة 2009/2019)

- ١- ما نمط الهجونة لكل من الصفتين مع التعليل؟
رجحان تام للصفتين؛ لظهور صفتى أحد الآبوين (صفراء ملساء) في جميع أفراد الجيل الأول
- ٢- اكتب النمط الوراثي للأبوين واحتمالات أعراضهما والنط الوراثي للجيل الأول؛ ثم اكتب احتمال اعراض الجيل الأول؟
- ٣- اكتب الأنماط الوراثية والظاهرة للجيل الثانية بالصيغة العامة وطريقة شبكة بانيت؟

صفراء ملساء × خضراء مجده	النمط الظاهري للأبوين (p):
rr yy × RR YY	النمط الوراثي للأبوين (p):
1/1 r y × 1/1 R Y	احتمال أعراض الآبوين (P):
1/1 R r Y y	النمط الوراثي للجيل الأول F1:
كلها صفراء ملساء	النمط الظاهري للجيل الأول F1:

$$\text{احتمال أعراض الجيل الأول: } F1 = (1/4 ry + 1/4 rY + 1/4 Ry + 1/4 RY)$$

الحل بالصيغة العامة:

النسبة لـ F2	النمط الظاهري لـ F2	النمط الوراثي لـ F2
9	صفراء ملساء	R - Y -
3	خضراء ملساء	R - yy
3	صفراء مجده	Y - rr
1	خضراء مجده	rr yy

فسر: ظهور سلالات وراثية جديدة بالجيل الثاني؟ لعدم وجود ارتباط بين الصفتين

السؤال ٣: أجري التهجين بين سلالتين من نبات البندوره ثمارها كبيرة (b) لا تقاوم الفطر (F) والثانية ثمارها صغيرة (B) وتقاوم الفطر (f) فحصلنا على جيل أول ثماره صغيرة لا تقاوم الفطر، والمطلوب: ١- ما نمط الهجونة للصفتين معاً؟ - ٢- ما النمط الوراثي للأبوبين وأعراضهما المحتملة؟ وما النمط الوراثي لفراد الجيل الأول للصفتين معاً؟ - ٣- ما الأعراض المحتملة للجيل الأول؟ - ٤- ما الانماط الوراثية للجيل الثاني بالصيغة العامة؟ وما الانماط الظاهرية لموافقة لها؟ ٥- رجحان تام للصفتين معاً

ثمارها كبيرة لا تقاوم الفطر		ثمارها صغيرة وتقاوم الفطر		النمط الظاهري للأبوبين (p)
ff		BB		النمط الوراثي للأبوبين (p)
$\frac{1}{2}$		X		احتمال أعراض الأبوبين (p)
$\frac{1}{2}$		FF		النمط الوراثي للجيل الأول
$\frac{1}{2}$		bb		النمط الظاهري للجيل الأول
100%		ثماره صغيرة لا تقاوم الفطر		

٦- ما احتمالات أعراض نبات من الجيل الأول؟

$$(bf \quad \frac{1}{4} + bF \quad \frac{1}{4} \quad BF \quad \frac{1}{4} + Bf \quad \frac{1}{4}) \leftarrow Bb Ff$$

$$\begin{aligned} & - (F_B) \text{ ثمار صغيرة لا تقاوم الفطر} + \frac{3}{16} \\ & - (F_f) \text{ ثمار صغيرة تقاوم الفطر} + \frac{1}{16} \\ & - (b_b) \text{ ثمار كبيرة لا تقاوم الفطر} + \frac{3}{16} \end{aligned}$$

السؤال ٤: أجري التهجين بين سلالتين من نبات البطاطا الأولى درناتها كبيرة (A) غير مقاومة للمرض (B)، والثانية درناتها صغيرة (a) ومتزومة تترض (A) وكانت جميع أفراد الجيل الأول (F1) صغيرة الدرنات وغير مقاومة للمرض، والمطلوب: ١- ما نمط هذه الهجونة الشائبة؟ - ٢- ما نمط الوراثة لكل من أبوين؟ وما احتمال أعراضهما؟ - ٣- ما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول؟ - ٤- ما احتمال الأعراض التي ينتجها الجيل الأول؟ - ٥- ما الانماط الوراثية والظاهرية لفراد الجيل الثاني وفق الصيغة العامة؟

الحل: ١- نمط الهجونة رجحان تام للصفتين.

٢- النمط الظاهري للأبوبين p: كبيرة غير مقاومة × صغيرة مقاومة

bb AA × BB aa النمط الوراثي للأبوبين p:

$\frac{1}{1}$ bA × $\frac{1}{1}$ B a احتمال أعراض الأبوبين P:

$\frac{1}{1}$ Aa Bb ٣- النمط الوراثي للجيل الأول:

٤- احتمال أعراض الجيل الأول: $(\frac{1}{4} ab + \frac{1}{4} aB + \frac{1}{4} Ab + \frac{1}{4} AB)$

٥- الصيغة العامة والانماط الظاهرية ونستبعاً في الجيل الثاني

النوع	النوع	النوع
F1	F2	F2
9	3	3
3	3	1
1	1	1

السؤال ٥: لدى إجراء التهجين بين سلالتين من نبات البازلاء الأولى طولية الساق (T)، حمراء الأزهار (R) صفتان راجحتان، والثانية قصيرة الساق (t) بفأاء الأزهار (r) حصلنا على (٥٠٪) من النباتات طولية الساق حمراء الأزهار و (٥٠٪) طولية بيضاء . المطلوب: بين بجدول وراثي نتائج هذه الهجونة دوره 2013 تكميلية

طويل الساق حمراء الأزهار	\times	قصير الساق ببيضاء الأزهار	النوع الظاهري للأبوين (p)
$rr\ tt$	x	$Rr\ TT$	النوع الوراثي للأبوين (p)
$(rr \frac{1}{1})$	x	$(RT \frac{1}{2} + rT \frac{1}{2})$	احتمال أعراض الأبوين (p)
$Tt\ Rr \frac{1}{2}$	$+$	$Tt\ rr \frac{1}{2}$	النوع الوراثي للجيل الأول (F_1)
50% طولية الساق ببيضاء + 50% طولية الساق حمراء		النوع الظاهري للجيل الأول (F_1)	

المسئلة ٦: أجري التراوّج بين فار ذو شعر أسود وخشن وفارة ذات شعر أبيض وناعم فكان من بين النواتج فار ذو شعر أسود وناعم وفار آخر ذو شعر أبيض وخشن فإذا كان البيل الشعر الأسود (B) راجع على البيل الشعر الأبيض (b) وأليل الشعر الخشن (H) راجع على أليل الشعر الناعم (h) وهذه الصفات غير مرتبطة بالجنس المطلوب :
أ - ما النوع الوراثي لكل من الأبوين وأعراضهما المحتملة؟
ب - بين بجدول النوع الوراثي والظاهري من الأفراد

فارة وبيرها أسود خشن	\times	فار وبره أبيض ناعم	النوع الظاهري للأبوين (p)
$bb\ hh$	x	$Bb\ Hh$	النوع الوراثي للأبوين (p)
$(bh \frac{1}{1})$	x	$(BH \frac{1}{4} + Bh \frac{1}{4} + bh \frac{1}{4} + bH \frac{1}{4})$	احتمال أعراض الآباء
$Bb\ Hh \frac{1}{4}$	$+$	$bb\ Hh \frac{1}{4}$	النوع الوراثي لـ F_1
25% أبيض ناعم + 25% أسود ناعم + 25% أبيض خشن + 25% أسود خشن		النوع الظاهري لـ F_1	

المسئلة ٧: دورة ٢٠٠٨

تم التهجين بين سلالتين صافيتين من الأغنام الأولى صوفها أبيض (A) وقصير (b) والثانية صوفها أسود (a) وطويل (B)
فكان الجيل الأول كله ذو صوف أبيض وطويل مع العلم أن هذه الصفات غير مرتبطة والمطلوب:
١- ما نوع هذه الهجونة الثانية؟ رجحان تام للصفتين معا
٢- ما النوع الوراثي لكل من السلالتين الصافيتين (الآباء) و لأفراد الجيل الأول بالنسبة للصفتين معا؟

أشنام صوفها أبيض قصير	\times	أغنام صوفها أسود طويل	النوع الظاهري للأبوين (p)
$BB\ aa$	x	$bb\ AA$	النوع الوراثي للأبوين (p)
$B\ a \frac{1}{1}$	x	$Ab \frac{1}{1}$	احتمال أعراض الآباء (p)
$Aa\ Bb \frac{1}{1}$		النوع الوراثي للجيل الأول	
100% صوف أبيض طويل		النوع الظاهري للجيل الأول	

٣- تم التهجين بين كبش من الجيل الأول مع سلالة صافية صوفها أسود وقصير وضح بجدول وراثي الانماط الوراثية والظاهرية للأفراد الناتجة بالنسبة للصفتين معا.

كبش بصوف أبيض طويل	\times	نعامه بصوف أسود قصير	النوع الظاهري للأباء الجدد
$aabb$	x	$Aa\ Bb$	النوع الوراثي للأباء الجدد
$(ab \frac{1}{1})$	x	$(AB \frac{1}{4} + ab \frac{1}{4} + AB \frac{1}{4} + Ab \frac{1}{4})$	الأعراض

$$(aaBb \frac{1}{4} + aabb \frac{1}{4} + AaBb \frac{1}{4} + Aabb \frac{1}{4})$$

أبيض قصير / أبيض طويل / أسود قصير / أسود طويل

النطط الوراثي للأبناء

النطط الظاهري للأبناء

٤. كيف يمكن معرفة النطط الوراثي لكبش صوفه أبيض وطويل فيما إذا كان متمايل اللواعق (صاف) أو متخالف اللواعق (هجين) دون جداول. يتم ذلك بإجراء اختبار مع نعاج بصوف أسود قصير (تحمل الصفة المقابلة المتنحية).

المسألة ٨: دورة 2019/2003 (للتدريب)

أجري تهجين بين سلالتين صافيتين من نبات القمح الأولى وافرة المحصول (R) والثانية قليلة المحصول (r) ومبكرة النضج (r) وكانت جميع نباتات الجيل الأول قليلة المحصول ومتاخرة النضج والمطلوب:

- ١- ما نمط الهجونة للصفتين؟ رجحان تام لكل من الصفتين
- ٢- ما النطط الوراثيان للنباتين الأصليين (الأبوبين)؟ وما أعراض الأبوبين؟ وما النطط الوراثي للجيل الأول؟
- ٣- أكتب احتمال اعراض الجيل الأول ؛ - أكتب الأنماط الوراثية و الظاهرة للجيل الثاني بالصيغة العامة.

الدرس الثاني

ولأن اختيار الإجابة الصحيحة لكل مماراتي:

١	نطط من الهجونة لا يرجع إلى صفة أحد الآبوبين على الإيل صفة الآب الآخر بشكل تام، إنما يحدث بينهما تفاعل مما يؤدي إلى ظهور نطط ظاهري جديد في الفرد متخالف اللواعق (صفة وسطية) غير موجودة لدى الآبوبين.	الهجونة	د	الرجحان المشترك	ج	الرجحان غير التام	ب	الرجحان التام
٢	حالة من التوازن بين الإيلين الصفة الواحدة لدى وجودها في فرد متخالف اللواعق؛ بحيث يعبر كل من الآيلين عن نفسه لتشكيل النطط الظاهري (تظهر لديه صفتًا الآبوبين معاً).							
٣	حالة يعمل فيها الإيل سائد لمورثة أولى على إتام عمل وظيفي لإيل سائد لمورثة ثانية (هاتان المورثتان غير متقابلتين، وغير مرتبطتين) لإعطاء نمط ظاهري معين لا يستطيع أي من الآيلين إعطائه بمفرده	جميع ما سبق خطأ	د	السلالة الهجينة	ج	الرجحان المشترك	ب	الرجحان التام
٤	الإيل راجح (A) لمورثة أولى يحجب عمل الإيل راجح (B) لمورثة أخرى غير مقابل له، وغير مرتبط معه إذا اجتمعا معاً في فرد واحد أي $A > B$	كل ما سبق خطأ	د	المورثات المتنامية	ج	الحجب المتنحي	ب	الحجب الراجح
٥	شفع الإيل متاح لمورثة أولى يحجب عمل الإيل راجح لمورثة ثانية غير مقابل وغير مرتبط معه إذا اجتمعا معاً في فرد واحد أي $B > A$	الحجب	د	أ+ب	ج	الحجب المتنحي	ب	الحجب الراجح
٦	تشمل موقع المورثات المحمولة على الصبغى من حيث ترتيبها والمسافات الفاصلة بينها. ويمكن تحديد ذلك من خلال النسب الملونة للعبور بين المورثات، ومن ثم رسماها.	جميع ما سبق خطأ	د	الصفة الراجحة	ج	الحجب الراجح	ب	الحجب المتنحي
٧	صفات لها أنماط ظاهرية عديدة متدرجة تختلف عن بعضها بمقادير كمية، ولنست نوعية	المورثات	د	أ+ب	ج	الصبغيات	ب	الخارطة الوراثية
٨	في الهجونة الأحادية المتعددة نسبة الجيل الثاني:	كل ما سبق خطأ	د	الصفات الكمية	ج	الصبغيات	ب	الصفات النوعية
٩	٩:٧	د	١٢:٣:١	ج	٩:٣:٣:١	ب	٣:١	

٩- في الحجب الرابع نسبة الدليل الثاني:

٢:١	٢	٩:٧	٤	١٢:٣:١	٦	٩:٣:٣:١	١
٩:٧	٣	٩:٣:٣:١	٤	٣:١	٦	٢:١	١
٩:٣:٣:١	٤	٩:٣:٣:١	٤	٣:١	٦	٢:١	١
٩:٣:٣:١	٤	٩:٣:٣:١	٤	١٢:٣:١	٦	٩:٧	١
١٢:٣:١	٤	٩:٣:٣:١	٤	١٢:٣:١	٦	٩:٧	١

ناتج: ١٠٥٪ مصادر خارجية

١- يغير الأليل β عند الفراغ الصفراء متعدد المآثر لأنها مسؤولة عن تكون الأصفر، وعن موته الفراغ في المرحلة التجينية في حال نشره (٧٧).

٢- إظهار الأنماط من الارتفاع عند نهاية الخل بحسب التوجه إلى النهجين التحفيز والبعض ليس النهجين نفس الأنواع تحمل الأول لأن النهج غير واضح.

الخرج في لون الجلد، وطول القامة عند الإنسان، ولون بنور الفم، وكثافة مساحة العيارات في القرحة، تخص هذه الصفات التي تظهر بعد الفراغة التجينية لغير المتقدمة وقد تكون مرتديبة أو غير مرتبطة، وليس تغير راجع منها بصفة تأثيره على الأحداث التي تحدث في نفس الشخص، بحيث يحدد النطء الظاهر بعد الآثار التجينية لفراغة في تسطير غيرها **مسئلة (٩)** لم النهجين وبين مسالتيين من الدجاج الانثى الأولى ربضها أسود (B) والثانية ذات ريش أبيض (W) فشأن النطء الأول يظهر في وردي الزهراء والمطابق: ((التأثير يغير فصل الجنسية))

- ١- ما نطء النهجون؟ رجحان مشترك لأنه في الفرد مختلف التوأقيع، بحيث يغير كل من الآباء عن نفسه لتشكل النطء المطابق
- ٢- وضع بجدول وراثي لنتائج هجوبه الآباء وأفراد الجيل الأول
- ٣- وضع بجدول وراثي لنتائج هجوبه ذيكل من الجيل الأول مع دجاجات ذات ريش أسود

مسئلة (١٠) لم النهجين وبين مسالتيين من نبات لم السيدة، الأولى حمراء الزهراء (R) والثانية بيضاء الزهراء (W) فشأن النطء الأول وردي الزهراء والمطابق: ((التأثير يغير فصل الجنسية))

- ١- ما نطء هذه الهجوبة الاصغرية؟ و لماذا؟
- ٢- وضع بجدول وراثي لنتائج هجوبه الآباء و هجوبه الفرد البالغ الأول
- ٣- وضع بجدول وراثي لنتائج التزاوج بين فرق من الجيل الأول مع فرق أصفر الزهراء.

استنتاج: بمقارنة النطء الهجوبية الثلاث من حيث النطء الظاهري للهجوب والهجوب الأولى أجد:

نطء الهجوب	الرجحان الشير	الرجحان اللام
نطء أحد الآباء، الذي يحصل نطء الآباء لم رجيج		
نطء وسط بين الآباء		
نطء كل من الآباء		

٣- المآل المترافق للهجرة الاصغرية وضع بجدول المآل المترافق للهجرة الاصغرية

ويجد في نبات التشير **Hedera** هجرة واحدة تشير له جنس مختلف ثلاثة مستويات وطول الفصلية، ومسار الجفون على صفات المسالك المائية ولمسار الماء المائية، وظهور نتائج الهجوب وتشكل مسالك هجوبية لاحدوية من حيث نسبة ظهوره في الجيل الثاني.

الموريات المهممه: **م** موريات مترافقه في الجيل الثاني، **ج** موريات مترافقه في الجيل الثالث، **د** موريات مترافقه في الجيل الرابع.

مراجعة شاملة للمنهج بطربيدة ورقة الاستعمال الأخير

مسألة ١١ أوضح بجدول وراثي نتائج التهجين بين سلالتين من الدجاج الزاحف (A) مع العلم أن مورثة الدجاج الطبيعي a

نطاط الظاهري للأبوين: p:	دجاج زاحف × دجاج زاحف
نطاط الوراثي للأبوين: p:	Aa × Aa
احتمال الأعراس للأبوين: p:	(1/2 a + 1/2 A) × (1/2 A + 1/2 a)
النطاط الوراثي للأبناء:	1/4 aa + 1/4 Aa + 1/4 AA
النطاط الظاهري للأبناء:	زاحف بموت زاحف حي طبيعي حي جنينياً (متخالف)
النسب الظاهرية للأفراد الحية:	1 : 2

لاحظ تحول النسبة المتناسبة (١:٣) إلى النسبة (٢:١)، بسبب موت الأفراد المتماثلة المورثة الواقع (AA) في المرحلة الجنينية.

استنتج: المورثة المسئولة عن صفة الزحف لدى الدجاج تمثل حالة خاصة للمورثة ذات التأثير المتعدد.

مسألة ١٢: وضع فران في أقسام التراوّج كما يلي:

الفص الأول: رمادية x رمادية تعطي فران كلها رمادية اللون. الفص الثاني: فران صفراء x فران صفراء تعطي $\frac{2}{3}$ صفراء اللون + $\frac{1}{3}$ رمادية اللون

الفص الثالث: فران صفراء x فران رمادية تعطي $\frac{1}{2}$ صفراء + $\frac{1}{2}$ رمادية

١- وضع بجدول وراثي نتائج هذه الأقسام.

في الفران	التراوّج الثالث	التراوّج الثاني	التراوّج الأول
النطاط الظاهري للأبوين P	أصفر × رمادي	فران صفراء × فران صفراء	رمادي × رمادي
النطاط الوراثي للأبوين P	yy × Yy	Yy × Yy	yy × yy
احتمال أعراس الأبوين P	y 1/1 × (Y 1/2 + y 1/2)	(Y 1/2 + y 1/2) (Y 1/2 + y 1/2)	y 1/1 × y 1/1
النطاط الوراثي للأفراد الناتجة	Yy 1/2 + yy 1/2	yy 1/4 + Yy 1/2 + YY 1/4	yy 1/1
النطاط الظاهري للأفراد الناتجة	رمادي	أصفر بموت صفراء	رمادي
النتيجة	يعيش	يعيش	كلها تعيش
النسب	٥٠٪ رمادي	٢/٣ صفراء + ١/٣ رمادي	١٠٠٪ أصفر

مسألة ١٣: تم التراوّج بين فار أصفر (Y) وبره طويل (L) مع فارة رمادية (y) وبرها قصير (l) وكانت بعض الفران الناتجة صفراء ووبرها قصير (Ll)، تكميلي ١- وضع بجدول وراثي تراوّج الأبوين، علماً أنّ صفة اللون تخضع لظاهرة المورثات المميّة والشكل تخضع لترجمة التام:

النطاط الظاهري للأبوين	أصفر اللون وبره طويل x رمادي اللون وبرها قصير
النطاط الوراثي للأبوين	ll yy x Ll Yy
الأعراس	(1y 1/1) x (1Y 1/4 + 1y 1/4 + Ly 1/4 + LY 1/4)
النطاط الوراثي لأفراد الجيل الأول	(ll Yy 1/4 + 1l yy 1/4 + Lly y 1/4 + LLYy 1/4)
النطاط الظاهري لأفراد الجيل الأول	٢٥٪ أصفر طويل + ٢٥٪ رمادي طويل + ٢٥٪ رمادي قصير + ٢٥٪ أصفر قصير

لماذا يعتبر الأليل l عند الفران الصفراء متعدد التأثير، لأنّه مسؤول عن اللون الأصفر في حال تختلف اللوحة Yy ، وعن موت الفران في المرحلة

الجنينية في حال تمايل اللوحة (YY)

مسألة ١٤: تم التهجين بين سلالة من الدجاج الزاحف (A) ريشها طويل (L) ودجاج طبيعي (a) ريشه قصير (l) وكان من بين النتائج دجاج زاحف ريشه

١- مانع هذه الهجنة ٢- وضع بجدول وراثي تراوّج الأبوين ((التدريب ضمن الجلسة))

المسئلة ١٥: أجري التهجين بين سلالتين من نبات النر ذات البذور البيضاء، فكان الجيل الأول كل بذوره أرجوانية، ولدى تراوّج أفراد الجيل الأول قدر في الجيل الثاني 9/16 بذور أرجوانية و 7/16 بذور بيضاء. والمطلوب : (دورة ٢٠٢١) تكميلية

- بين بجدول وراثي الهجونة بين الأبوين؟
- ما احتمالات أعراس الجيل الأول؟
- ما الأنماط الظاهرية المحتملة في الجيل الثاني؟ وما الأنماط الوراثية المقابلة لها مع النسب الموافقة؟ ووضح ذلك من خلال الصيغة العامة.
- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

بذور بيضاء × بذور بيضاء	النطط الظاهري للأبوين p:
AA bb × aa BB	النطط الوراثي للأبوين p:
1/1 A b × 1/1 a B	احتمال الأعراس للأبوين:
1/1 Aa Bb	النطط الوراثي للجيل الأول F1:
100% بذور أرجوانية (فسر) لأن المورثة الراجحة B أتعمت عمل المورثة الراجحة A غير مقابلة لها وغير مترتبة بها	النطط الظاهري للجيل الأول F1:
(1/4 ab + 1/4 aB + 1/4 Ab + 1/4 AB)	احتمال أعراس الجيل الأول:

النسبة الظاهرية لـ F2	النسبة الوراثية لـ F2	النطط الظاهري لـ F2	النطط الوراثي لـ F2
9	9	بذور أرجوانية	A- B-
7	3	بذور بيضاء	A- bb
	3	بذور بيضاء	B- aa
	1	بذور بيضاء	aa bb

استنتج أن نسب الأنماط الظاهرية (9:7) أصبحت غير متوافقة مع النسب المندلية (9:3:3:1).

المسئلة ١٦: بتهجين نباتتين من الكوسا الأول ثماره بيضاء (W) ونبات آخر ثماره صفراء (Y) كانت ثمار الجيل الأول بيضاء اللون، وبالتالي كانت نباتات الجيل الأول كانت ثمار الجيل الثاني نسبها: 12/16 بيضاء + 3/16 صفراء + 1/16 خضراء. والمطلوب:

- بين بجدول وراثي الهجونة بين الأبوين؟ كيف تفسر ظهور اللون الأبيض في ثمار الجيل الأول؟
- ما احتمالات أعراس الجيل الأول؟
- ما الأنماط الظاهرية المحتملة في الجيل الثاني؟ وما الأنماط الوراثية المقابلة لها مع النسب الموافقة؟ ووضح ذلك من خلال الصيغة العامة.
- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

ثمار صفراء × ثمار بيضاء	النطط الظاهري للأبوين p:
WW yy × ww YY	النطط الوراثي للأبوين p:
1/1 Wy × 1/1 wY	احتمال الأعراس للأبوين:
1/1 Ww Yy	النطط الوراثي للجيل الأول F1:
100% ثمار بيضاء	النطط الظاهري للجيل الأول F1:

استنتج: الأليل الراجم (W) للون الأبيض حجب عمل الأليل الراجم (Y) للون الأصفر غير مقابل له، وغير مرتبط معه لدى اجتماعهما في فرد واحد.

مراجعة شاملة للمنهج بطريقة ورقة الامتحان الأخير

$$(1/4 W Y + 1/4 w Y + 1/4 W y + 1/4 w y)$$

النسبة الظاهرة لـ F2	النسبة الوراثية لـ F2	النمط الظاهري لـ F2	النمط الوراثي لـ F2
12	9	ثمار بيضاء	W - Y-
	3	ثمار بيضاء	W - yy
3	3	ثمار صفراء	ww Y-
1	1	ثمار خضراء	ww yy

استنتج أن نسب الأنماط الظاهرة (12:3:1) أصبحت غير متوافقة مع النسب المندلية (9:3:3:1).

٤- فسر ١٦/١٢ ثمار بيضاء و ١٦/١ ثمار خضراء؟

٣- (Y- Y- 9/16) تعطي ثماراً بيضاء لأن الأليل الراجم W حجب عمل الأليل الراجم y.

(W- yy 3/16) لأن الثمار ذات الأليل الراجم W لا تمتلك القدرة على تركيب الأنظيم I فتبقى بلون أبيض.

٤- النمط الوراثي yy ww: يقوم WW بتركيب الأنظيم I الذي يحول المركب عديم اللون إلى المركب ذو اللون الأخضر. بينما لا يقوم الأليلان yy بتركيب الأنظيم II الذي يحول المركب الأخضر إلى المركب الأصفر، لذلك تكون الثمار خضراء.

نسلة ١٧: (٢٠١٩/٢٠٠٧)

١- أجري التهجين بين سلالتين صافيتين من ذبابة الخل طويلة رمادية مع ضامرة سوداء كان الجيل الأول كله طويلاً رمادي، ووضح ذلك بجدول وراثي:

النمط الظاهري للأبوين	النوع الوراثي للأبوين	جناح طويل رمادي الجسم × جناح ضامر أسود الجسم
النوع الوراثي للأبوين	النوع الوراثي للأبوين	I I × L L g g G G
احتمال أعراض الأبوين	احتمال أعراض الأبوين	I 1/1 × L 1/1 g G
النوع الوراثي للجيل الأول	النوع الوراثي للجيل الأول	L I 1/1 G g
النوع الظاهري للجيل الأول	النوع الظاهري للجيل الأول	جناح طويل رمادي الجسم

٥- وبالهجين الاختباري بين ذكور الجيل الأول مع إناث الذبابة المتحي (ضامرة سوداء) حصلنا على جيل أول نصفه طويل رمادي، ونصفه الآخر ضامر أسود، ووضح ذلك بجدول وراثي:

النوع الظاهري للأبوين	ذكور طويلة الجناح رمادي × إناث ضامرة الجناح سوداء
النوع الوراثي للأبوين	I I × L I g g G g
احتمال أعراض الأبوين	I 1/1 × [L 1/2 + G 1/2]
نوع وراثي للأفراد الناتجة	I I 1/2 + L I 1/2 g g G g
نوع الظاهري للأفراد الناتجة	٥٥% طويل رمادي ٤٥% ضامر أسود

٣. وبالتجين الاختباري بين إناث الجيل الأول مع ذكور ذات جناح ضامر وجسم أسود، تم الحصول على جيل أفراده موزعة ١٥٪ طويل رمادي، و٨٪ ضامر أسود، و٥٪ طويل أسود، و٨٪ ضامر رمادي.

النوع المظاهري للأبوين	ذكور ضامرة مسوداء	إناث طولية رمادية هجينة ×	ذكور ضامرة مسوداء
النوع الوراثي للأبوين	$\begin{array}{c} \\ G \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ G \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \\ L \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ g \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ g \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ g \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \\ L \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ g \end{array}$	النوع الوراثي للأبوين
أعراض الأبوين	$\begin{array}{c} \\ G \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ G \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \\ L \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ g \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ g \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ g \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \\ L \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ G \end{array}$	أعراض الأبوين
النوع الوراثي للأبناء	$\begin{array}{c} \\ G \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ g \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \\ L \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ g \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ g \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ g \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \\ L \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ G \end{array}$	النوع الوراثي للأبناء
النوع الظاهري للأبناء			النسبة:
طويل رمادي ضامر أسود طويل أسود ضامر رمادي			٨٪ ٤١.٥٪ ٨٪ ٤١.٥٪
سلالات وراثية أبوية تراكيب وراثية أبوية			ما يسفر عن العبور

ما يسفر عن العبور:

- ١- ارتباط صفتى شكل الجناح ولون الجسم عند ذبابة الخل هو: ارتباط كامل عند الذكور (لا يحدث عبور) وارتباط جزئي عند الإناث، أي يكسر بالعبور
 ٢- ظاهرة الارتباط الكامل والجزئي تختلف من كان إلى آخر سواء أكان نباتاً أم حيواناً.

٣- لإظهار هذه الأنماط من الارتباط يجب اللجوء إلى التجين التحليلي وليس إلى التجين الذاتي لأن النتائج تكون غير واضحة.

مٖ١٨ : تم التجين بين سلالتين من نبات فم السمة إحداها بأزهار حمراء (R) وطويلة الساق (L) والأخرى بأزهار بيضاء (W) قصيرة الساق (l)
 فكان الجيل الأول كله بأزهار وردية طويلة الساق. والمطلوب:

- أ- ما نمط الهجونة لكل من الصفتين؟ ب- ما النوع الوراثي للأبوين وأفراد الجيل الأول؟ ج- وضع بجدول وراثي نتائج التجين بين فرد من الجيل الأول وردي طويل مع فرد أبيض قصير

الحل: أ- نمط الهجونة: الرجحان غير دائم بالنسبة لصفة اللون، رجحان دائم لصفة الشكل.

ب- النوع الظاهري للأبوين: حمراء طولية × بيضاء قصيرة

النوع الوراثي للأبوين: $WW \times ll$

النوع الوراثي للجيل الأول: $I/I \quad I.I \quad RW$

- ج -

النوع الظاهري للأبوين	وردية طولية × بيضاء قصيرة	وردية طولية × بيضاء طولية
النوع الوراثي للأبوين	$WW \times ll$	$WW \times Ll$
احتمال الأعراض للأبوين	$(I/I \quad ll) \times (I.I \quad WW)$	$(I/I \quad ll) \times (I.I \quad LW + lW + IMIR + IMIL + MLLR)$
النوع الوراثي للأفراد الناتجة	$I/I \quad I.I \quad RW$	$I/I \quad I.I \quad RW + I/I \quad ll \quad WW + I/I \quad ll \quad LW + I/I \quad ll \quad lW + I/I \quad ll \quad MLLR$

مٖ١٩ (للتدريب) : تم التزاوج بين سلالتين من خيول البالمنيو الأولى لوتها أبيض A شعرها طويل ، و الثانية لوتها أحمر B شعرها قصير A كانت جيدة في الخيول الناتجة سراء طولية الشعر ١- مانعطف هذه الهجونة للصفتين معاً ٢- اكتب النوع الوراثي للأبوين واحتمالات أعراضهما والنوع الوراثي للجيل الأول وضع نتائج تراوّج خيل أسر طويل من الجيل الأول مع خيل أحمر قصير مبيناً نتائج هذه الهجونة بجدول وراثي.

مٖ٢٠ (للتدريب) : تم التجين بين سلالتين من القرع الأولى خضراء G كبيرة الحبة B والثانية صفراء L صغيرة الحبة A كانت جميع الثمار الناتجة مخضفة بالأصفر والأخضر معاً وكبيرة الحبة ١- ما نمط هذه الهجونة للصفتين معاً ٢- اكتب النوع الوراثي للأبوين واحتمالات أعراضهما والنوع الوراثي للجيل الأول وضع نتائج هجونة فرد من الجيل الأول مخطط كبير الحبة مع ثمار صفراء حبتها صغيرة مبيناً ذلك بجدول وراثي.

الدرس الثالث

لمعرفة المسألة كانت مرتبطة بالجنس أو لا تنطر إلى السائحة ذكر كل منها (ذكر-ذكر/ إناث/ إناث)، يعني أن المسألة مرتبطة بالجنس وتحل $X0$ للذكر و XX للأنثى عند الإنسان وذبابة الخل، و ZZ للذكر و ZW للأنثى عند الطيور والفراشات والأسماك و $X0$ للذكر و XX للأنثى عند الحشرات

١- ينعدم الجنس عندها بأعراض من الأنثى:

الإنسان	ب	التطور	ج	الجراد	د	ب+ج
دور الصفي ١ عند الإنسان هو						
تحديد الذكورة	ب	تحديد الجنس	ج	تحديد الانوثة	د	جميع ما سبق خطأ
نظام تحديد الجنس عند الإنسان و ذيابة الخل:						
XX-XY	ب	XX-XO	ج	ZZ-ZW	د	ZX-XZ
نظام تحديد الجنس عند معظم الطور و المراشات و الأسماك:						
ZZ-ZW	ب	XX-XO	ج	XX-XY	د	كل ما سبق خطأ
نظام تحديد الجنس عند الجراد:						
XX-XO	ب	ZZ-ZW	ج	XX-XY	د	جميع ما سبق صح
صفة ظهور الفرون و انعدامها عند الأغنام هي صفة:						
مرتبطة بالجنس	ب	متاثرة بالجنس	ج	محمولة على الصفي X	د	كل ما سبق خطأ
حالة البيلات لصفات جسمية محمولة على الصفي الجنسي X دون مقابل لها على الصفي الجنسي Y						
وراثة مرتبطة بالصفي X	ب	وراثة مرتبطة بالصفي الجنسي Y	ج	XX-XY	د	جميع ما سبق صح
تكون المورثات المسؤولة عن هذه الصفات محمولة على الصبغيات الجسمية، ولكن النمط الوراثي مختلف الواقع يعبر عن نفسه بمنطق تناهري عند الذكر مختلف عنه عند الأنثى ويعود ذلك إلى أثر الحاثات الجنسية على عمل المورثات في كلا الجنسين.						
الوراثة المتاثرة بالجنس	ب	الوراثة المرتبطة بالجنس	ج	محمولة على الصفي X	د	كل ما سبق خطأ

٢- اخط تلمسرا علميا :

- النمط الوراثي III يسبب ظهور الفرون عند ذكور الأغنام وانعدامها عند الإناث؛ لأن البيل الراجع II المسؤول عن تشكيل الفرون راجع على البيل I.

ذكور ومتاح عند الإناث يسبب أثر الحاثات الجنسية على عمل المورثات في كلا الجنسين.

- تكون أنثى ذيابة الخل بيضاء العيون متماطلة الواقع دوماً. لأن صفة لون العيون البيضاء صفة متتحبة.

- ذكر ذيابة خل عقيم $7 = X + 6A = 21$ (فسر)؛ لعدم وجود الصفي Y المسؤول عن تحديد الخصب الجنسي.

- أعراض الذكر هي التي تحدد الجنس عند الإنسان (فسر)؛ لوجود نمطين من الأعراض $Y = 22A + X$ و $Y = 22A + X$.

سلة ٢١: أجري التهجين بين ذكور ذيابة الخل عيونها حمراء (R) وإناث عيونها بيضاء (r) متماطلة الواقع فنتجت ذكور عيونها بيضاء وإناث حمراء (D).
الخطوات: (دوره ٢٠٠٥ - ٢٠١١)

السؤال: ظهور النتائج السابقة؟ مورثة لون العيون صفة مرتبطة بالجنس محمولة على جزء من الصفي (X) وليس لها البيل مقابل على الصفي الجنسي (Y).

٣- ما النمط الوراثي لكل من الآبوبين؟ وما احتمال أعراض كل منها؟

٤- ما الأنماط الوراثية لكل من الذكور والإثاث الناتجة؟

ذكور ذيابة خل عيون حمراء X	إناث ذيابة خل عيونها بيضاء Y ₍₀₎	النمط الظاهري للأبوبين (P)
X _(r) X _(r)	X	X _(R) Y ₍₀₎

$(X_{(r)} \frac{1}{1}) X (X_{(R)} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} Y_{(0)})$	احتمال أعراض الأبوين (p)
$X_{(R)} X_{(r)} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} X_{(r)} Y_{(0)}$	النمط الوراثي للجيل الأول (F1)
50% ذكور أبيض العيون + 50% إناث حمراء العيون	النمط الظاهري للجيل الأول (F1)

٤- أجري التراوّج بين الذكور والإناث الناتجة، فما الأنماط الوراثية والظاهرية للذكور والإناث عن هذا التراوّج؟

النوع	النوع	النوع	النوع
ذكور أبيض العيون	إناث حمراء العيون	x	ذكور أبيض العيون
$X_{(R)} X_{(r)}$	$X_{(r)} Y_{(0)}$	x	$X_{(R)} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} Y_{(0)}$
$(X_{(R)} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} X_{(r)})$	$(X_{(r)} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} Y_{(0)})$		النمط الوراثي للجيل الأول
$\frac{1}{4} X_{(r)} X_{(r)} + X_{(R)} Y_{(0)} \frac{1}{4} + X_{(R)} X_{(r)} \frac{1}{4} + X_{(r)} Y_{(0)} \frac{1}{4}$			الأعراض
%25 ذكور بعيون بيضاء + %25 إناث بعيون حمراء	%25 ذكور بعيون حمراء + %25 إناث بعيون بيضاء		النمط الظاهري لأفراد الجيل الثاني (F2)
			النمط الظاهري لأفراد الجيل الثاني (F2)

المسألة (٢٢) [التدريب] أجري التهجين بين ذكر ذبابة الخل أحمر العينين (R) من أنثى بيضاء العيون (L) من جناحها قصير (l) فكانت جب الذكور بيضاء ومنها جناحها قصير والمطلوب: ضع تحليلًا ورائياً لهذه الهجونة؟

المسألة (٢٣):

تم التهجين بين ذكر ببغاء يحمل صفة اللون الكستاني (G) لريش (صفة راجحة)، مع أنثى كستانية (G)، كان بين الأفراد الناتجة ذكور عديمة المطلب:

١- وضع بجدول ورائي نتائج هذه الهجونة؟

النوع	النوع	النوع	النوع
أنثى كستانية لون الريش	ذكر ذو ريش بلون كستاني	x	ذكور ذو ريش بلون كستاني
$Z_{(G)} Z_{(g)}$	$Z_{(G)} W_{(0)}$	x	$Z_{(G)} \frac{1}{2} + W_{(0)} \frac{1}{2}$
$(Z_{(g)} \frac{1}{2} + Z_{(G)} \frac{1}{2}) x (Z_{(G)} \frac{1}{2} + W_{(0)} \frac{1}{2})$			احتمال أعراض الأبوين
$Z_{(G)} \frac{1}{4} + Z_{(g)} W_{(0)} \frac{1}{4} + Z_{(G)} Z_{(g)} \frac{1}{4} + Z_{(G)} W_{(0)} \frac{1}{4}$			النمط الوراثي L (F1)
إناث كستانية + ذكور كستانية + إناث عديمة + ذكور عديمة			النمط الظاهري L (F1)

٢- كيف تفسر هذه النتائج؟

لتفسير النتائج نجد أن مورثة لون الريش محمولة على جزء من الصبغي (Z) وليس لها مقابل على الصبغي الجنسي (W).

المسألة (٢٤): تم تهجين بين ذكر فراشة عثة الغراب شاحب اللون n مع أنثى طبيعية اللون N فكانت جميع الذكور طبيعية اللون وجميع الإناث شاحبة اللون.

المطلوب: ١- ما نمط الهجونة؟ ٢- ضع تحليلًا ورائياً لهذه الهجونة؟ ٣- كيف تفسر هذه النتائج؟ ٤- وضع نتائج هجونة أفراد الجيل الأول [التدريب]

١- نمط الهجونة: رجحان تام

٢-

النوع	النوع
أنثى ملبيعة اللون X ذكر شاحب اللون	النطط الظاهري للأبوين
$Z_{(n)} Z_{(N)} W_0$	النطط الوراثي للأبوين
$(1/1 Z_n) X (1/2 Z_N + 1/2 W_0)$	احتمال أعراض الأبوين
$1/2 Z_n + 1/4 Z_n W_0$	النطط الوراثي للأباء
إناث شاحبة + ذكور عديمة	النطط الظاهري للأباء
٣- تفسر هذه النتائج لأن اللون n محمول على الصبغي الجنسي / ولا مقابل له على الصبغي	الجنسي

مثل: صفة ظهور القرؤن وانعدامها عند الأغنام. حدد موقع مورثة القرؤن عند الغنم؟ محمولة على أحد الصبغيات الجسمية الآليل **II** المسبب لظهور القرؤن عند الأغنام يكون راجحاً عند الذكور على الآليل **I** الذي يسبب غياب القرؤن ومتاحاً عند الإناث كما يظهر الجدول الآتي:

النمط الظاهري للإناث	النمط الظاهري للذكور	النمط الوراثي
مع قرون	مع قرون	III
بدون قرون	بدون قرون	hh
بدون قرون	مع قرون	IIh

لمسالة **(٢٥)**: تم تهجين بين كبش أغنام صوفه ناعم(**S**) وليس لها قرون ، مع نعجة صوفها خشن(**R**) وليس لها قرون ، فكان من بين الأفراد الناتجة ذكر صوفه متماوج وله قرون وأنثى صوفها متماوج وليس لها قرون.
مطلوب : إذا علمت أن الصفتين غير مرتبطتين وضع تحليلاً ورائياً لهذه الهجونة آليلاً ظهور القرؤن **II** أو ليلاً غياب القرؤن **h**

الحل:

ذكر صوف ناعم بلا قرون X أنثى صوف خشن بلا قرون	النمط الظاهري للأبوين
IIh RR X hh SS	النمط الوراثي للأبوين
<hr/> X 1/1 hS 1/2 HR + 1/2 hR	احتمال الأعراض
<hr/> 1/2 IIh RS + 1/2 hh RS	النمط الوراثي للأبناء
1/2 صوف متماوج و بلا قرون : 1/2 صوف متماوج لكلا الجنسين (بقرؤن للذكور ، بلا قرون للإناث)	النمط الوراثي للأبناء

الدرس الرابع (الوراثة عند الإنسان)

هي الصعوبات التي تواجه دراسة الوراثة عند الإنسان؟

الإنسان غير خاضع للتجربة - لا يمكن عزل سلالات أبوية صافية - قلة عدد الأفراد في الأسرة - طول عمر الإنسان.

ذلك تجأ إلى ما يعرف بـ **شجرة النسب** : وهو مخطط يبين توارث صفة ما بين أفراد أسرة معينة.

في المخطط استعمال مجموعة من الرموز والمصطلحات كما هو مبين في الجدول الآتي:

الرمز	الأفراد	الرمز	الأفراد	الرمز	الأفراد
—	خط التزاوج	□	الذكر	○	الأنثى
I	جيل الأباء	■	ذكر مريض	●	أنثى مريضة
II	جيل الأبناء	□■	ذكر ناقل للصفة	○●	أنثى ناقلة للصفة

اللاحظة: جمع مسنان الإنسان رجحان تمام عدا الدم المنجلى رجحان مشترك

Denis Heschong: يتبع هذا المرض نمط الرجحان التام. حدد موقع البيل مرض **Heschong** (محمولاً على أحد صبغيات الشغاف الرابع)

سب هذا المرض البيل راجحاً طافراً (**H**) ومن أعراض هذا المرض 1- اضطرابات حرارية على شكل هركات مقاومة وغير منتظمة - 2- اضطرابات بالذكري

هذا المرض نشوء سن 40 سنة.


المدرس: أحمد حيدر الشيخ

مراجعة شاملة للمنهج بطريقة ورقة الإمتحان الأخير

ماذا ينتج عن : تأثير مرض هنتغتون على العصبونات؟ تصبح فانقة الحساسية للناقل العصبي غلوتامات مما يؤدي إلى تهتك في هذه العصبونات. وبذلك يكون لدينا الأنماط الآتية:

hh	IIIh	III	النمط الوراثي
سليم	مصاب	مصاب	النمط الظاهري

ملاحظة: لحل شجرة نسب هنتغتون ننظر إلى الآباء ظمورأى ابن سليم هذا يعني أن أبي من الآبوبين



الآبوبين إن كان مصاب س يكون نمطه الوراثي (Hh)

مسئلة ٢٦: لديك شجرة النسب المجاورة تبين توارث مرض هنتغتون و المطلوب : ضع تحليلًا وراثيا لها.


الحل:

من البنت (١) والصبي (٢) نستنتج أن الأم متختلفة اللوائح


الآب سليم	الأم مصابة	النمط الظاهري للأبوبين
Hh	hh	النمط الوراثي للأبوبين
($\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}H$)	x	احتمالات الأعراض
$\frac{1}{2}hh$	+ $\frac{1}{2}Hh$	النمط الوراثي للأبناء
سليم	مصاب	النمط الظاهري للأبناء
الصبي ١ / البنت	الصبي ٢	

تمرير: اعتمادا على بيانات الشجرة هل أليل المرض راجح أم مت recessive؟ فسر إجابتك.

الجواب: ١- أليل المرض هو أليل راجح لظهور صفة المرض في الآبوبين متختلفي اللوائح وجود أبناء غير مصابين.



٢- النمط الوراثي لـ ١ هو III، والنمط الوراثي لـ ٣ هو III
والنمط الوراثي لـ ٢ هو II، وهو II



المسئلة ٢٧: تمثل شجرة النسب المجاورة توريث حالة المهدق لإحدى الأسر

والمطلوب: ١- هل صفة المهدق راجحة أم مت recessive؟ علل إجابتك. صفة المهدق مت recessive لأن الآبوبين غير مصابين وظهرت صفة المهدق في بعض الأفراد الناتجة لذلك تعتبر مت recessive
٢- هل وراثة هذه الصفة مرتبطة بالصفي الجنسي X؟ علل إجابتك؟ هذه الوراثة ليست مرتبطة بالصفي الجنسي X لأنها لو كانت مرتبطة بالصفي الجنسي X لما كان الآب حامل لصفة وإنما مصاب

٣- بفرض أليل الصفة المدرosa (A) والأليل المقابل (a) اكتب

الحل: من الحس ٢ وابنته ٤ نستنتج أن الآبوبين متختلفا اللوائح

الأنماط الوراثية للأفراد ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦:

النمط الوراثي لـ ١ هو Aa والنمط الوراثي لـ ٣ هو Aa

النمط الوراثي لـ ١ هو Aa (A) نمط وراثي غير منتظم أو عشوائي

النمط الوراثي لـ ١ هو aa

ليل طبيعي راجع N : (يسبب إنتاج خضاب دم طبيعي ، تكون الكريات الحمراء طبيعية).

ليل طافر راجع S : (يسبب إنتاج خضاب دم منجل، تكون الكريات الحمراء منجلية الشكل لا تقبل الأوكسجين بشكل جيد ، وتكون مرونته قليلة. يمكن أن تسد المنطقة الوريدية من الشعيرات الدموية عندما تمر فيها).

علاقة بين الأليل N والليل S علقة رجان مشترك، وبالتالي يكون لدينا ثلاثة أنماط وراثية تحدد ثلاثة أنماط ظاهرية

ما يأتي:

النمط الظاهري	النمط الوراثي
خضاب دم طبيعي	NN
خضاب دم منجل غثباً مميت في مرحلة الطفولة.	SS
له صفة الخلايا المنجلية حيث يوجد نوعان من كريات الدم الطبيعي والمنجلية	NS

نمط الوراثي NS (الفرد مختلف الواقع) يحمل في كل كرياته الحمراء نمطي الخضاب معه الطبيعي والمنجل. (نصف كمية الخضاب في كل ربيبة طبيعي ونصفه الآخر منجل)

مسئلة (٢٨) زوج رجل لا يبدو عليه الإصابة بفقر الدم المنجل من امرأة لا تبدو مصابة بفقر الدم المنجل. فتتجذر طلاقاً معاً بفقر الدم المنجل مطلوب:

- ما النمط الوراثي للأبدين؟ وما احتمالات أعراس كل منها؟
- ما الأنماط الوراثية والظاهرة للأبناء الناتجة عن هذا التزاوج .

النمط الظاهري للأبدين (P)	أب له صفة الخلايا المنجلية × أم لها صفة الخلايا المنجلية
النمط الوراثي للأبدين (p)	NS × NS
احتمال أعراس الآبدين	(N $\frac{1}{2}$ + S $\frac{1}{2}$) × (N $\frac{1}{2}$ + S $\frac{1}{2}$)
النمط الوراثي لأفراد (F1)	NN $\frac{1}{4}$ + NS $\frac{1}{4}$ + SS $\frac{1}{4}$
النمط الظاهري لأفراد (F1)	25% مصابين + 50% لهم الصفة المنجلية + 25% سليمين


ما علاقة الرجحان بين الأليلين (NN) و (SS) ولماذا؟ هي رجان مشترك متساوي لأن كل أليل من الأليلين خضاب دم غير عن نمطه الظاهري فتثير مثل كرينة حمراء نوعين من خضاب الدم (طبيعي ومنجل)

النمط الظاهري	النمط الوراثي	مكونات الصد على سطح الكريات الحمراء
Zمرة دم A	I ^A I ^A - I ^A I	A
Zمرة دم B	I ^B I ^B - I ^B I	B
Zمرة دم O	I I	لا يوجد مولد صد
Zمرة دم AB	I ^A I ^B	B & A

في النمط AB توجد حالة رجحان مشترك بين الأليلين A و B معاً بحيث عبر كل منهما عن نفسه ظاهرياً
نحو زمرة دم عند الإنسان إلى نمط الأليلات المتعددة المتناظرة ، حيث يوجد للصفة الواحدة أكثر من أليلين في حوض مورثات الجماعة البشرية ولكن لفرد الواحد لا يملك سوى أليلين منها فقط. وهذه الأليلات نشأت بفعل الطفرات التي حدثت على ذات الموقع المورثي.


المسالك

نطقي: شيك شدرا المد لازمه: منع تحفلا ورثة الاما



من الممكن تثبيت ملائحة غير آلات مختلفة التوالي.

النسل المذكور للأبوين	الأم زمرة AB	الاب زمرة B
المعطى الوراثي للأبوين:	$I^A I^B$	$I^B I^B$
اعتمد أباء الأبوين:	$I^A_1 I^B_1$, $I^A_2 I^B_2$	$I^B_1 I^B_2$, $I^B_2 I^B_2$
المعطى الوراثي للأباء:	$I^A_1 I^A_2$, $I^B_1 I^B_2$	$I^A_1 I^A_1$, $I^B_1 I^B_1$
المعطى الظاهري للأباء:	B	B
الإرداد:	نسل A	نسل B



سید جواد شفیعی

17

1

1

$$\left(\frac{1}{2}I^2 + \frac{1}{2}i\right) \times \left(\frac{1}{2}I^4 + \frac{1}{2}i\right)$$

$$\frac{1}{4}I^E I + \frac{1}{4}I^A I^E + \frac{1}{4}I^A I + \frac{1}{4}II$$


Bijdragen tot de Taalwetenschap

البرلمان المصري 3 لسنة 2 فصل 1

يُوحَدُ لِهَذِهِ الصَّفَةِ نَمْطَانٌ مِنَ الْأَدَلَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُتَقَابِلَةِ

المسألة (٣)

تطبيقات: تذكر شعرة لفترة الـ 24 ساعة، وهذه امثلة (Rh)، مع تفاصيل وبيانات.



من (السنة ١) نفس للنحوين ملوكها وفتح

النقطة الظاهرية للأدواء	النقطة الوراثية للأدواء	النقطة المختلطة للأدواء	النقطة المختلطة للأدواء	النقطة الوراثية للأدواء	النقطة الظاهرة للأدواء
R_{t1}	R_{t2}	R_t	R_t	R_{w1}	R_{w2}
$(R_{\frac{1}{2}} + R_{\frac{1}{2}})$	$(R_{\frac{1}{2}} + R_{\frac{1}{2}})$	$"$	$"$	$R_{w1} + R_{w2}$	$R_{w1} + R_{w2}$
R_{w1}	R_{w2}	R_w	R_w	R_{w1}	R_{w2}
R_{h1}	R_{h2}	R_h	R_h	R_{h1}	R_{h2}
النقطة الوراثية للأدواء	النقطة الظاهرة للأدواء	النقطة المختلطة للأدواء	النقطة المختلطة للأدواء	النقطة الوراثية للأدواء	النقطة الظاهرة للأدواء

المسألة ٢٣

زمرته الدموية (O) سلبي الريزوس . المطلوب: دورة ٢٠٢١ ((للتدريب))


- ١- ما نمط الهجونة؟ رجحان تام للصفتين معا
 - ٢- ما الأنماط الوراثية المحتملة للأبوبين ؟ و لأعراسهما المحتملة ؟
 - ٣- ما النمط الوراثي للطفل السابق ؟ و ما احتمالات أعراسه ؟ وما احتمال ولادته لهذه الأسرة ؟

الوراثة والجنس: الوراثة المرتبطة بالصفات الجنسية: مورثات لصفات جسمية محمولة على جزء من الصبغي الجنسي X وليس لها مقابل على الصبغي الجنسي Y.

- 1- مرض الكساح المقاوم للفيتامين D : يسببه أليل طافر (R) وهو محمول على الصبغي الجنسي X ويتصف بأنه راجحة وبذلك يكون لدينا الحالات الآتية ((لحل مسائل الكساح ننظر إلى الأبناء ظهور أي ذكر سليم هذا يعني أن الأم المصابة سنكون من خالفة اللوائق))

من الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغي X وتحل XX للذكر و XY للأنثى	
١- وراثة مرض عمى الألوان.	
٢- مرض حمى الفول.	
٣- مرض الضمور العضلي.	
٤- مرض تصلب مشيمية العين.	
٥- العشا التلبي	
٦- الناعور	
جميع هذه الأمراض ننظر إلى الأبناء ظهور أي ابن مصاب هذا يعني أن الأم حسراً ناقلة للمرض أي متخلفة اللوائق	

المسألة ٢٢




مأساة: لديك شجرة النسب الآتية لتوريث مرض الكساح المقاوم للفيتامين D، ضع تحليله وراثتها.

الحل:

من الصبغي (3) تستنتج أن الأم متخلفة للوائق $X_R X_r$

الأم مصابة × الأب مصاب	النمط الظاهري للأبوين
$X_R Y_0 \times X_R X_r$	النمط الوراثي للأبوين
$(X_R^{1/2} + Y_0^{1/2}) \times (X_R^{1/2} + X_r^{1/2})$	احتمالات الأعراض
$X_R X_R^{1/4} + X_R X_r^{1/4} + X_R Y_0^{1/4} + X_r Y_0^{1/4}$	النمط الوراثي للأبناء
ذكر سليم ذكر مصاب أنثى مصابة أنثى مصابة	النمط الظاهري للأبناء
الصبي 3 لم يولد بعد الباقي المصابة 1 و 2 لم يحملوا الوراثي غير محدد	الأولاد ولنفال الشجرة الموضحة

مرض الناعور آليل المرض h ((أما باقي الأمراض سيكون لها نفس الحالات أدناه مع تغير رمز آليل المرض فقط يعني دالتون d الفوال f الضمور العضلي m))



النمط الظاهري	النمط الوراثي	الجنس
مصاب	$X_{(h)} Y_{(0)}$	ذكر
سليم	$X_{(H)} Y_{(0)}$	ذكر
مصابة	$X_{(h)} X_{(h)}$	أنثى
ناقلة	$X_{(H)} X_{(h)}$	أنثى
سليمة	$X_{(H)} X_{(H)}$	أنثى

مأساة (٣٤): إذا علمت أن المخطط جانباً يمثل شجرة نسب لتوريث مرض ناغد المرتبط بالجنس بفرض آليلي الصفة H / h المطلوب:

١- هل أليل المرض راجح أم متنج؟ ولماذا؟ ٢- حدد موقع الصبغى الجنسى الحامل لأليل المرض على إجابتك.

٣- أستنتج الأنماط الوراثية للأفراد ١١٣، ١٢١، ١١٣، ١٢٣.

الحل :

- ١- بما أن الآبوبين غير مصابين وظهرت الصفة في بعض الأفراد فهي صفة متنجية.
 ٢- الأليل محمول على الصبغى الجنسى X وليس له مقابل على الصبغى الجنسى Y بدليل ظهور ذكور سليمة وذكور مصابة في أبناء الجيل

النمط الوراثي لـ : ١ هو $X_H X_H$ ، ٢ هو $X_H Y$ ، ٣ هو $X_h Y$ غير محدد : $(X_H X_h)$.

ملاحظة: الإناث المصابة بالناعور حصرًا تموت في المرحلة الجنينية غالباً وفي حالات نادرة تصيب على سن البلوغ وتموت عند أول طمث.

المسألة ٣٥: زوج رجل زمرته الدموية (AB) ومصاب بمرض الناعور بأمرأة زمرتها (O) وسليمة من المرض فإذا علمت أن أليل (H) راجح على أليل المرض (h) وهذا مرتبطان بالجنس. والمطلوب :

- ١- ما الأنماط الوراثية والظاهرية المحتملة للأبناء؟
 ٢- ما الأنماط الوراثية وأعراضهما؟

النمط الظاهري للأبوبين	النوع الوراثي للأبوبين
رجل زمرته (AB) مصاب بالناعور امرأة زمرتها (O) سليم	النوع الوراثي للأبوبين
$(X_{(H)} X_{(H)} H) \times (X_{(h)} Y_{(0)} I^A I^B)$	احتمال أعراض الأبوبين
$\left(X_{(H)} \frac{1}{4} \right) \times \left(X_{(h)} I^A \frac{1}{4} + X_{(h)} I^B \frac{1}{4} + Y_{(0)} I^A \frac{1}{4} + Y_{(0)} I^B \frac{1}{4} \right)$	النوع الوراثي لأفراد الجيل الأول (F1)
$+ X_{(H)} X_{(h)} I^B \frac{1}{4} + X_{(H)} Y_{(0)} I^B \frac{1}{4}$ $X_{(H)} X_{(h)} I^A \frac{1}{4} + X_{(H)} Y_{(0)} I^A \frac{1}{4}$	النوع الظاهري لأفراد الجيل الأول (F1)
$25\% \text{ ذكور بزمرة (B)} + 25\% \text{ إناث بزمرة (B)}$ $25\% \text{ ذكور بزمرة (A)} + 25\% \text{ إناث بزمرة (A)}$	النوع الظاهري لأفراد الجيل الأول (F1)

المسألة ٣٦: تزوج رجل سليم من مرض **الضمور العضلي** وزمرته الدموية (A) من فتاة لا تظهر عليها علام المرض وزمرتها الدموية (B) فأنجبا ذكراً مصاباً بالمرض وزمرته الدموية (O) والمطلوب :

- ١- ما النوع الوراثي للأبوبين وأعراضهما المحتملة؟
 ٢- ما احتمال أنجب ذكر مصاب بالمرض وزمرته الدموية (AB) من بين الأبناء؟ إذا علمت أن أليل الضمور العضلي (m) وأليل الصحة (M)

النوع الظاهري للأبوبين (p)	النوع الوراثي للأبوبين (p)
رجل سليم من الضمور العضلي بزمرة (A) فتاة لا تظهر عليها علام المرض وزمرتها (B)	رجل سليم من الضمور العضلي بزمرة (A) فتاة لا تظهر عليها علام المرض وزمرتها (B)
$I^B i \quad X_{(M)} X_{(m)}$	$I^A i \quad X_{(M)} Y_{(0)}$
$i X_{(M)} \frac{1}{4} + i X_{(M)} \frac{1}{4} + I^A Y_{(0)} \frac{1}{4} + i Y_{(0)} \frac{1}{4}$ $+ i X_{(M)} \frac{1}{4} + I^B X_{(m)} \frac{1}{4} + i X_{(m)} \frac{1}{4}$	$I^B X_{(M)} \frac{1}{4}$
$\frac{1}{4} I^A X_{(M)}$ $\frac{1}{16} I^A i X_{(M)} X_{(m)}$ أنثى ناقلة بزمرة A	$\frac{1}{4} i X_{(M)}$ $\frac{1}{16} i i X_{(M)} X_{(m)}$ أنثى ناقلة بزمرة O
$\frac{1}{16} I^A I^B X_{(M)} X_{(m)}$ أنثى ناقلة بزمرة AB	$\frac{1}{16} I^A Y_{(0)} \frac{1}{4}$ ذكر مصاب بزمرة A $\frac{1}{16} I^B i X_{(m)} Y_{(0)}$ ذكر مصاب بزمرة B
	$\frac{1}{4} i Y_{(0)}$ الأعراض $\frac{1}{16} i X_{(m)}$

$\frac{1}{16} I^A l X_{(M)} X_{(M)}$	$\frac{1}{16} ll X_{(M)} X_{(M)}$	$\frac{1}{16} I^A i X_{(M)} Y_{(0)}$	$\frac{1}{16} ll X_{(M)} Y_{(0)}$	$\frac{1}{4} l X_{(M)}$
أنثى سليمة بزمرة A	أنثى سليمة بزمرة 0	ذكر سليم بزمرة A	ذكر سليم بزمرة 0	

$\frac{1}{16} I^A I^B X_{(M)} X_{(M)}$	$\frac{1}{16} I^B l X_{(M)} X_{(M)}$	$\frac{1}{16} I^A I^B X_{(M)} Y_{(0)}$	$\frac{1}{16} I^B l X_{(M)} Y_{(0)}$	$\frac{1}{4} I^B X_{(M)}$
أنثى سليمة بزمرة AB	أنثى سليمة بزمرة B	ذكر سليم بزمرة AB	ذكر سليم بزمرة B	

- احتمال أنجب ذكر مصاب بالمرض وزمرته الدموية (AB) هو $\frac{1}{16} I^A I^B X_{(m)} Y_{(0)}$

الوراثة العريجية بالصبغين 7 :

يعود إلى مورثات محمولة على الصبغي الجنسي Z دون مقابل لها على الصبغي الجنسي X

الآل: زرارة حزمه شعر على حافة صيوان الأذن: (حدد موقع)

الأب الحامل للصفة يورثها إلى جميع أبنائه الذكور. لأن المورثة المسؤولة عن هذه الصفة محمولة على الصبغي الجنسي Z الموجود لدى ذكور فقط.

- لا توجد إناث تملك حزمه شعر على صيوان الأذن. لأن المورثة المسؤولة عن هذه الصفة محمولة على الصبغي الجنسي Z والأنثى لا تملك الصبغي.

سنة ٣٧:

ووج رجل عادي المظهر (A) ويبulk حزمه شعر زائدة (z) على حافة صيوان الأذن ، بأمرأة عادية المظهر (A) فولد لها عدة أطفال أحدهم نكر مظاهره Z ويبلوك حزمه شعر زائدة على حافة صيوان الأذن وأخرى أنثى مهقاء (a) ولا تملك حزمه شعر على حافة صيوان الأذن.

طلب:

ما الأنماط الوراثية لكل من الآبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منها؟

ـ ما الأنماط الوراثية لكل من الأولاد الذكور والإإناث؟ وما احتمالات أعراس كل منها؟

ـ ما احتمال ولادة طفل نكر أمهق ويبلوك حزمه شعر زائدة على حافة صيوان الأذن لهذه الأسرة؟

لنساء	اب له حزمه شعر عادي ناقل × ام لا تملك حزمه شعر عادي ناقلة للمهق	الظاهري
لأنثوي:		
AaX ₀ X ₀ × AaX ₀ Y _r		النض الوراثي
لأنثوي:		
$\left(\frac{1}{2} AX_0 + \frac{1}{2} aX_0\right) \times \left(\frac{1}{4} AX_0 + \frac{1}{4} AY_r + \frac{1}{4} aX_0 + \frac{1}{4} aY_r\right)$	احتمال	
	أعراس	
	الآبوين:	
$\frac{1}{8} AAX_0X_0 + \frac{1}{8} AAX_0Y_r + \frac{1}{8} AaX_0X_0 + \frac{1}{8} AaX_0Y_r$		
ذكر لديه حزمه شعر عادي - أنثى عادية - ذكر لديه حزمه شعر عادي + أنثى لا تملك حزمه شعر عادي		النض الوراثي
ـ سليمة		
$+ \frac{1}{8} AaX_0X_0 + \frac{1}{8} AaX_0Y_r + \frac{1}{8} aaX_0X_0 + \frac{1}{8} aaX_0Y_r$	والظاهري	
	للبناء:	
ـ ذكر له حزمه شعر أمهق + أنثى لا تملك حزمه شعر منهقاء + ذكر له حزمه شعر عادي +		
ـ أنثى لا تملك حزمه شعر عادية		

- احتمال ولادة ذكر عادي له حزمه شعر هو 3/8.

سنة ٢٨ (التدريب) تروج رجل زمرته الدموية(A) ويبulk حزمه شعر زائدة على حافة صيوان الأذن(z) (من امرأة زمرتها الدموية (A))

ـ فولوك لها بنت زمرتها الدموية(B) وذكر زمرته (A) وله حزمه شعر زائدة

ـ المطلوب:

ـ ما الأنماط الوراثية للأبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منها؟

ـ ما الأنماط الوراثية والظاهري للبناء الناتجة عن هذا التزاوج؟

يوجد للصفة أليل محمول على الصبغى الجنسى X وله أليل مقابل على الصبغى الجنسى Y
أمثلة: - وراثة العمى الكلى للألوان. - وراثة بعض سرطانات الجلد.

الوراثة المتأثرة بالجنس: في هذه الحالة يختلف تعبير النمط الوراثي متعدد الواقع عند الذكر عنه عند الأنثى ويعود ذلك إلى أنثى الحالات الجنسية على عمل المورثات في كلا الجنسين.

صفة الصلع عند الإناث: يبدو على أحد أقربائك صفة الصلع الجبهي وهو ما يجعلهم حرجاً بين رفقاء، كيف يمكنك إقناعه بأن هذه الصفة طبيعية وليس حالة مرضية.
نوع صفة الصلع تحت تأثير أليل راجع B محمول على أحد الصبغيات الجسمية ويحدد الأليل المقابل المختلي (A) يحدد التوزيع الطبيعي للشعر عند كل من الجنسين.

وبذلك يحدد النمط الوراثي Bb صلعاً جبهياً عند الذكور وتوزع طبيعي للجنس عند الإناث

الأنثى	الذكر	النمط الوراثي
شعر خفيف	أصلع	BB
طبيعي	أصلع	Bb
طبيعي	طبيعي	bb

اعطى تفسيراً علمياً لكلِّ مما يأتي :
١- عدم وجود إناث يملأن حزمة شعر على حافة صيوان الأنف. لأن المورثة المسؤولة عن هذه الصفة محمولة على الصبغى الجنسى Y والأنثى لا تملك هذا الصبغى.

٢- لا يمكن ولادة طفل زمرة الدموية O لأبوين أحدهما زمرة الدموية AB. لأن الزمرة O تحتاج إلى أليلين متتجين ii غير موجودين في الزمرة AB


٣- الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغي الجنسى X تكون عند الذكور شائعة أكثر منها عند الإناث. لأن إصابة الذكر تتطلب أليلًا واحدًا متتجيًا أما إصابة الأنثى تتطلب أليلين متتجين وهذا أقل احتمالاً

٤- تعد وراثة عامل الريزوس لا مندلبية لأن وراثة زمرة الدم عند الإنسان إلى نمط الأليلات المتعددة المترافق ، حيث يوجد للصفة الواحدة أكثر من أليل في حوض مورثات الجماعة البشرية ولكن الفرد الواحد لا يملك سوى أليلين منها فقط

المأساة ٣٩

تمثل شجرة النسب المجاورة وراثة مرض مرتبط بالجنس. أجبُ عن الأسئلة الآتية

- ١- ما الصبغي الحامل لأليل المرض؟ علل إجابتك.
 - ٢- هل أليل المرض راجع أم متتجي مع تعليق إجابتك؟
 - ٣- إذا علمت أنَّ الأليل الراجع (A) والأليل المتتجي (a) ، اكتب الأنماط الوراثية للأفراد :
- ٤- ما احتمال ولادة طفل ذكر مصاب من زواج III من رجل سليم؟



٦- الاحتمال 1/4.

التفسير: الأم III مصابة X_h سليم

X_hY₀ X_hX_h

$$(1/2 X_h + 1/2 Y_0) X \quad (1/2 X_h + 1/2 X_h)$$

$$1/4 X_h Y_0 + 1/4 X_h X_h + 1/4 X_h X_h + 1/4 X_h Y_0$$

ذكر سليم ذكر مصاب أنثى سليمية أنثى مصابة

المأساة ٤٠: تزوج رجل سليم من مرض هنتغتون (h) إيجابي الريزوس من امرأة مصابة بالمرض (H) سلسة الريزوس فأنجحا عدة أطفال سليم سلبي الريزوس ((للتدريب))

المأساة ٤١: تزوج رجل مصاب بالكساح زمرة الدموية (O) من امرأة مصابة بالمرض زمرة الدموية (A) فأنجحا أطفالاً أحدهم ذكر سليم زمرة الدموية A ((للتدريب))

م^{٤٢}: نروح رجل يأكل للمهق ايجابى الريزوس من امرأة يأكله للمهق سلبيه الريزوس فانجا أطفالاً ددهم مصاب بالمرض سلبي الريزوس ((للتدريب))

م^{٤٣}: نروح رجل مصاب بمرض فقر الدم المنجلى ايجابى الريزوس من امرأة لا تبدو عليها علامات إصابة سلبيه الريزوس فانجا أطفالاً أحدهم مصاب سلبي ((للتدريب))

(جمع المسائل أعلاه تستطيع استبدال الرممه بالريزوس أو العكس الريزوس بالرممه)

((تستطيع ربط أي مسألة بأخرى فنلا المهم مع زمرة/مع ريزوس/مع حزمه شعر/مع صلع)) وقس على ذلك:

أكتب الانماط الوراثية المحتملة لرجل زمرة A ايجابى وأمرأة زمرة B سلبي ((ستستطيع كتابة الانماط الوراثية المحتملة لكافة الرممه بالربط مع الريزوس))

أكتب الانماط الوراثية المحتملة لرجل أصلع زمرة O وأمرأة شعرها طبيعيه زمرة AB

لأن اختيار الإجابة الصحيحة يكفي مما يأتي:

- يكون في الحجب المشتكي:

$$B > A > a \quad B > a - \quad aa > B \quad d$$

- النمط الوراثي الذي يعطي لوناً وسطياً لحبوب القمح هو:

$$R1r1 R2r2 R3r3 - r1r1 r2r2 r3r3 \quad R1R1 R2r2 R3r3 - b -$$

- الصيغة الصبغية لأنثى ذبابة الذيل الطبيعية من الشكل:

$$2n = 6A + XO \quad 2n = 6A + XX - \quad 2n = 6A + XXY - \quad 2n = 6A + XY -$$

سلة وراثية غير مرتبطة بالصبغي X عند الإنسان :

- زمرة الدم ABO، بـ - الناعور. - ج - حمى الفول. - د - الضمور العضلي.

ثـ: أكتب المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات الآتية:

ـ حلقة من التوازن بين البلي الصفة الواحدة لدى وجودهما في فرد مختلف الواقع. رجحان مشترك

ـ حالة يقوم فيها البيل راجح لمورثة أولى يحجب عمل البيل راجح لمورثة أخرى غير مقابل له، وغير مرتبطة بهـ: الحجب الراجح

ـ بجزيئات DNA حلقيـة ، توجد في بعض الجراثيم. البلاسيدات

الطفرات

ـ ما هي أسبابها؟

ـ في بعض صفات الفرد مرتبطة بالتبديل الوراثي الطفرة: التغير المفاجئ

ـ أسباب الطفرة: عوامل (فيزيائية و كيميائية و تقانية يمكن أن تظهر أثناء تضاعف (DNA) منها الضار ومنها النافع وتورث للأبناء.

ـ ما هي الخلايا التي تطرأ عليها الطفرات؟ ماذا نسمى الطفرات في كل حالة؟ ما النتائج المترتبة على كل منها؟

ـ ١. قد تتراوـل الطفرات خلايا جسمـية وندعـوها الطفرات الجسمـية هذا النوع من الطفرات لا يورث إلى الأجيـال التـالية

ـ ٢. قد تتراوـل الطفرات الأعـراس و مولدـاتها وندعـوها الطفرات الجنسـية وهي تورث إلى الأجيـال اللاحـقة من أمـتها ذلك: (عـيـلـيـاتـ الـأـجيـالـ الـلـاحـقـةـ)

الـعـضـلـيـاتـ

ـ كيف تصنـفـ الطـفرـاتـ منـ حيثـ مـكانـ حدـوثـهاـ؟ـ ١ـ طـفرـاتـ مـورـثـيـةـ ٢ـ طـفرـاتـ صـبـغـيـةـ

ـ ١ـ طـفرـاتـ مـورـثـيـةـ: تـضـمـنـ استـبـدـالـ أوـ حـذـفـ أوـ إـضـافـةـ نـكـلـيـوـتـيدـ أوـ أـكـثـرـ فيـ DNAـ وـ تـسـمـيـ الـطـفرـةـ النـقـطـيةـ

ـ تـكـثـ هـذـهـ طـفرـاتـ أـنـتـاءـ عـمـلـيـةـ تـضـاعـفـ DNAـ فـيـ الـخـلـيـةـ

ـ مـاـ بـدـعـتـ إـذـاـ تـقـابـلـ أـسـاسـ الـأـدـنـينـ مـعـ السـيـتوـزـينـ؟ـ طـفرـةـ

ـ هلـ تـسـتـقـعـ حدـوثـ تـأـثـيرـ عـلـىـ تـرـكـيبـ البرـوتـينـ وـلـمـاـ؟ـ نـعـمـ لـأـنـ كـلـ ثـلـاثـ نـكـلـيـوـتـيدـاتـ تـرـمـزـ حـمـضـ آـمـيـنـيـاـ واحدـاـ مـنـ الـبـرـوتـينـ

ـ يـقـرـرـ الـحـمـضـ آـمـيـنـيـ المـوـافـقـ لـهـ

لـمـلـطـ الطـفرـاتـ المـورـثـيـةـ

ـ ١ـ الـاستـبـدـالـ: استـبـدـالـ نـكـلـيـوـتـيدـ بـآـخـرـ

ـ ٢ـ مـاـ الـأسـاسـ الـذـيـ تمـ استـبـدـالـهـ فـيـ الشـيـفـرـةـ السـادـسـةـ لـمـورـثـةـ خـضـابـ الدـمـ المنـجـلـيـ؟ـ تمـ استـبـدـالـ الـأسـاسـ الـأـزوـتـيـ الـأـدـنـينـ بالـتـايـمـينـ فـيـ الشـيـفـرـةـ الـورـاثـيـةـ

ـ تـسـاسـةـ لـمـورـثـةـ خـضـابـ الدـمـ المنـجـلـيـ

ـ ٣ـ لـمـاـ تـغـيـرـتـ نوعـيـةـ الـبـرـوتـينـ؟ـ بـسـبـبـ تـغـيـرـ أحدـ الـحمـضـ آـمـيـنـيـ الـفـالـينـ محلـ الـحـمـضـ آـمـيـنـيـ الـجـلوـتـامـيكـ

ـ ٤ـ الـإـخـالـ: يـتمـ فـيـهـ اـنـخـالـ نـكـلـيـوـتـيدـ أوـ أـكـثـرـ

- ٣- **الحذف:** يتم فيها حذف نوكليوتيد أو أكثر طفرات إزاحة الإطار: بما أن كل ثلاثة نوكليوتيدات تشكل شبيهة وراثية فإن حذف أو إضافة نوكليوتيد يحدث تغير في المورثة والمرسال mRNA فينتج بروتين جديد مما يؤدي إلى تغيير الصفة الوراثية
- طفرات صبغية:** تشير الإحصاءات إلى أن 50% من الإجهاضات الغوية في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل وفي 20% في الأشهر الثلاثة من العمل يكون سببها الأضطرابات الصبغية وتحدث عند أحد الآباء أو كليهما في أثناء الانقسام المنصف وتشكل الأعراض خلال المراحل الأولى من التشكيل الجنيني.
- تكون الأضطرابات الصبغية إما على مستوى بنية الصبغي نفسه أو على مستوى عدد الصبغيات.
- ٤- **الأضطرابات البنوية:** تحدث نتيجة كسر أو كسور في بنية الصبغي في أثناء الانقسام المنصف ويمكن أن تحدث في أي منطقة من الصبغي

١- في أي من الحالات السابقة يحدث ضياع للمورثات؟ وما تأثير ذلك على الفرد؟ في طفرة الحذف يؤدي إلى غياب بعض الصفات الوراثية

٢- أي من الحالات السابقة يغير الترتيب الخطى للمورثات؟ في طفرة الإنقلاب

٣- في نقطة الانتقال ينتقل جزء من صبغي إلى آخر غير قرين لكن قد يحدث أحياناً انتقال صبغي بكماله والتحامه مع صبغي آخر غير قرين.

فـ: ولادة أطفال مصابة بمتلازمة داون؟ بعض إناث البشر انتقل صبغي من الشعاع 14 والتحم مع صبغي من الشعاع 21 ليصبح عدد صبغيات الأنثى 45 وتعطي هذه الأنثى نمطين من الأعراض طبيعية وغير طبيعية

٤- **الأضطرابات على مستوى العدد الصبغي:**

أ- **حالة تعدد الصبغة الصبغية:** يشمل الخلل في هذه الحالة صبغيات الأعراض $1n$ وفي حال تعدد الصبغة الصبغية يصبح عدد الصبغيات $3n$ أو $4n$.

بـ: وتكون معظم حالات الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل لدى الإنسان بسبب تعدد الصبغة الصبغية.

وقد يحدث التعدد الصبغي لدى النوع نفسه ويسعى الذاتي من مثل طفرة الزهرة العلاقة في نبات

الأنواع إذاً يكون في النبات العادي ذي الأزهار الصغيرة $14 = 2n$ بينما في النبات الطافر كبير الأزهار $28 = 4n$

وقد يحدث لدى نوعين مختلفين أحياناً ويسعى الخلط

١- **لماذا يكون الهجين AB عقيماً؟** لعدم تشافع صبغياته

٢- **يمعن مركب الكوليشين هجرة الصبغيات في الخلية المنقسمة إلى القطبين** فكيف يصبح الهجين AB خصباً؟

يصبح خصباً بمساعدة صبغته الصبغية وذلك بإضافة الكوليشين.

بـ- **اختلاف الصبغة الصبغية:** يتمثل بزيادة صبغي واحد أو أكثر ($2n+1$ ، $2n+2$) أو نقصان صبغي واحد أو أكثر ($2n-1$ ، $2n-2$).

جدول يبين بعض الحالات الناتجة عن تغير العدد الصبغي بشكل غير متاجنس



أنثى مصابة بمتلازمة تيرنر



متلازمة داون

اسم المتلازمة	الصبغة الصبغية	الاعراض
متلازمة كلينفلتر Klinefelter,s Syndrom	$2n = 44A + XXY = 47$	٢- ذكر يملك صفات جنسية ثانوية أنثوية ٣- عقيم وينخفض انتاج الأنثى وجينات بسبب وجود صبغي X إضافي.
متلازمة تيرنر Turner,s syndrome	$2n = 44A + X = 45$	أنثى: لا تمتلك صفات جنسية ثانوية طبيعية، قصيرة القامة
Y متلازمة ثانية الصبغي : XYY syndrome	$2n = 44 + XY = 47$	ذكر طويل القامة، نكارة منخفض يمكن أن يقوم بأعمال دعائية
متلازمة داون Down,s syndrome	$2n+1 = 46 + 1 = 47$	وجود ثانية إضافية على الجفن العلوي تشبه السلالة المنقولية وبصمات أصابعهم مختلفة، ويعلنون من تأخر عقلي

هل يمكن الكشف عن هذه الحالات قبل الولادة؟

نعم يمكن ذلك من خلالأخذ عينة من السائل السلوكي وتحليل الخلايا الجنينية التي يحتويها ويمكن لهذه الطريقة تحديد أكثر من 20 حالة منها متلازمة داون.

ملاحظة: كل أم عمرها يتجاوز 35 سنة يمكن أن تتعرض عن متلازمة داون في حال حدوث حمل.

العامل المسئولة للطفرات:

عوامل فيزيائية:

الأشعة : ومنها أشعة (X) وأشعة (UV) حيث تعمل الأشعة على زيادة لزوجة السيتوبلاسما وتقطع الصبغيات عادة التحامها بتسقيقات جديدة.

الحرارة : تسبب الحرارة انشطار سلسلتي ال DNA عن بعضهما وإعادة بناء سلاسل غير نضامية لا تثبت أن تسلكه لتعيد بناء سلاسل جديدة بعضها أفر.

وأمثل كيميائية :

فمها الملونات والأصبغه التي تضاف للأطعمة وأملح المعادن الثقيلة من مثل أملاح الرصاص والزنبق، والمواد الموجودة في دخان السجائر والدهانات المبيدات الحشرية و الفطرية.

لسؤال الأول : اختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١- يتمثل بزيادة صبغي واحد في المجموعه 21 متلازمة : (داون ، تيرنر ، كلابنفلتر ..).

٢- إحدى الطفرات الأتية تسبب تغير الترتيب الخطى للمورثات (الانقلاب - الانقلاب). الحذف التعدد الصبغي الذاتي.

٣- النمط XXV يمثل متلازمة : (داون ، تيرنر ، كلابنفلتر ، جميع الإجابات خطأ).

لسؤال الثاني : ماذا ينتج من كل مما يأتي ؟

١- زيادة صبغي واحد ٧ عند ذكر الإنسان : متلازمة تنالي الصبغي ٧ ذكر طويل القامة، ذكاوه منخفض يمكن أن يقوم باعمال عدوانية

٢- تهجين قمح رباعي 28 ص مع نجيل 14 ص. هجين خلطي الصبغيات فيه غير متشافعة

٣- طفرات الحذف الصبغية. يحدث ضياع للمورثات

٤- استبدال نكليوتيد A محل نكليوتيد T في الشيفرة السادسة من مورثة الهيموغلوبين الطبيعي. خضاب دم منجي (مرض فقر الدم المنجبي).

لسؤال الثالث : أكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يأتي:

١- تغير مفاجئ في بعض صفات الفرد مرتبط بالتبديل الوراثي الطفرة.....

٢- أنظيمات تعمل على إصلاح الطفرات المورثية في أثناء تضاعف الـ (DNA): أنظيمات القطع الداخلية

لسؤال الرابع : أعطى تفسيرا علميا لكل مما يأتي:

١- بعض أنواع البكتيريا الطافرة أهمية بيئية. لأنها تخلصنا من النفايات مثل جراثيم النايلون التي تنتج أنظيم قادر على حلقة جزيئات النايلون من النفايات

٢- تؤدي الطفرات المورثية إلى زيادة المخزون الوراثي للجماعة. لأنها تؤدي إلى تشكيل العديد من الآليلات المورثية

٣- تسبب طفرات إزاحة الإطار تشكل بروتين غير وظيفي. لأن كل حذف أو إضافة نكليوتيد على الشيفرة الوراثية يحدث تغير في المورثة والمرسل

mRNA فينتج بروتين جديد مما يؤدي إلى تغيير الصفة الوراثية

٤- تعد الأشعة من العوامل المحرضة للطفرات. لأن الأشعة تعمل على زيادة لزوجة السيتوبلاسما وتقطع الصبغيات وإعادة التحامها بتسقيقات جديدة.

الدرس السادس : الهندسة الوراثية

في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين استطاع العلماء الحصول على بروتين هرمون النمو البقري **BGH** ببنقانات الهندسة الوراثية واستخدمن بعد ذلك ذاتها للحصول على هرمون النمو البشري ما مراحل العمل؟

تطلب الهندسة الوراثية:

١- ناقل وهو DNA حلقي من خلية جرثومية لإدخال المورثة المرغوبة يسمى البلاسمي

٢- إنزيم قطع لفتح البلاسمي وقطع المورثة - إنزيم ربط لربط DNA المورثة مع DNA البلاسمي

٣- جرثوم حاضن لإدخال البلاسمي المؤشب.

ما أمهن نوافل الاستنساخ المستخدمة في الهندسة الوراثية:

البلاسميات Plasmids : جزيئات DNA حلقيه توجد في بعض الجراثيم.

الفيروسات : تحوي جزيء DNA من مثل الفيروس آكل الجراثيم.

الكونسنيديات Cosmids : وهو بلاسميدات متدمجة مع DNA الفيروسات.

البروتوكول الصناعي : يتم تركيبها في المختبرات

أمثل وأستنتاج تطبيقات هامة لحياتنا في الهندسة الوراثية :

يعتني الكثير من الناس من الجوع فكيف تستطيع الهندسة الوراثية إطعام الجياع ومعالجة سوء التغذية والتقليل من مشكلة ضعف الرؤية.

لتحل وأستنتاج تطبيقات هامة لحياتنا في الهندسة الوراثية :

لعل فيتامين A يشكل طليعة للأصبغة الحساسة للضوء بالخلايا البصرية.

لذلك علاجية مستقبلية ١- علاج الإيدز : عن طريق التعديل المورثي للخلايا الثانية المساعدة ، بحيث يتم تغيير المستقبلات النوعية للفيروس على غشاء

الخلايا المضيفة ، فلا يتمكن الفيروس من مهاجمتها.

- 2- تتعديل الخلايا السرطانية: لتنتج أحد عوامل النمو للخلايا المقاومة للسرطان وتقوم هذه الخلايا نفسها بتفعيل الخلايا الثانية التي تهاجمها مما يقوى الاستجابة المناعية ضد خلايا الورم.
- بنك المورثات: تخزن فيه المعلومات الدقيقة لجينوم عدد كبير من الأحياء ، بحيث يمكن الرجوع إليه لأغراض التطوير والبحث كما في بعض مراكز الأبحاث الزراعية في الجمهورية العربية السورية.

ثالثاً: أكتب المصطلح العلمي الموافق لما يأتي:

1. بلامسيدي ينتج من ربط المورثة المرغوبة مع DNA حلقي من الجرثوم. **اللامسيدي الموشب**
 2. بلامسيدات متدمجة مع DNA الفيروسات. **الكونزيمات**
 3. العلاج الذي يتم فيه زراعة مورثات صحيحة وتنظيم عملها. **العلاج الجيني**
- ثلاثة : أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي: (الإجابة أسفل السؤال)
- ١- تمكن الهندسة الوراثية الإنسان من تلوث المياه الجوفية والتربة.
 - ٢- تستخدم الهندسة الوراثية في الحد من انتشار عدوى الإيدز.
 - ٣- يمكن التحكم بزيادة أو إنقاص معدل نسخ المورثة لـ mRNA.
 - ٤- يستطيع الأرز الذهبي تحسين الأداء البصري للعين والتقليل من مشكلة العمى.

- ١- بإنتاج نباتات ذرة تقتل الحشرات وتتغذى عليها، وهكذا تصبح النباتات مقاومة للحشرات دون رش المبيدات الحشرية التي تلوث التربة والمياه الجوفية،
- ٢- يتم علاج الإيدز عن طريق التعديل المورثي للخلايا الثانية المساعدة، بحيث تغير المستقبلات النوعية للفيروس على غشاء الخلية المضيفة فلا يتمكن من مهاجمتها.
- ٣- عن طريق بروتينات معينة بعضها ينشط عملية النسخ وبعضها يوقف عملية النسخ عن طريق التأثير على أنظيم RNA بوليمراز.
- ٤- لأن الأرز الذهبي ينتج كمية أكبر من البيتا كاروتين مما يزيد كمية الفيتامين A الذي يعد طليعة الأصبغة الحساسة للضوء للخلايا البصرية.

- عزيزي الطالب حاولت جاهداً في طبعة ٢٠٢٢ أن أقدم لكم بهذه الدورة المكثفة الفائدة المرحورة وأن أكون شاملًا كما عودتكم في كل عام لأن ((مستقبلك ليس لعبة بيـد أحد كائناً من كان))
- عزيزي الطالب إن وحدت هذه الأوراق كثيرة لا تحزن لأنها خلاصة المنهاج وتذكر أن كتابك ٢٨٧ صفحة وتدرك أيضاً حجم المساحة التي أخذتها أسلئلة الاختبار المتعدد والرسومات بهذه الأوراق وتدرك أنه ليست من الذين يقسمون أوراقهم بالمنتصف والهدف تقليل الأوراق لكن النتيجة عدم دراسة تلك الأوراق
- عزيزي الطالب الدورة المكثفة يجب أن تكون شاملة وإلا لما أسميناها مكثفة
- عزيزي الطالب بعد دراستك لعام كامل ستثال رضاك هذه الأوراق أما إن كنت من الذين لم تدرسون بشكل جيد خلال السنة تستطيع التركيز معى خلال الدورة واختصار هذه الأوراق
- عزيزي الطالب أتمنى لك امتحانات موفقه ونتائج مرضية.

التجمع_التعليمي

محبكم بالله : الأستاذ الباحث أـحمد حـيدـر الشـيخ

#دورـه_الإصـرار_2022

#العلوم_الحـيدـرـية_2022

جميع الحقوق محفوظة © ٢٠٢٢

@bak111

COPY-RIGHT©HAIDARIAH-SCIENCE


T.me/oloom2022

سلسلة

التجمع التعليمي



التجمع التعليمي



القناة الرئيسية: t.me/BAK111

بوت التواصل: [@BAK1117_bot](https://t.me/BAK1117_bot)