

1

تذكرة بالمتتاليات الإثبات بالتدرج

1 عموميات عن المتتاليات

2 الإثبات بالتدرج أو الاستقراء الرياضي

نقاط التعلّم الأساسية في هذه الوحدة

- التذكرة بخواص المتتاليات الحسابية والهندسية.
- التذكرة بطرائق دراسة المتتاليات المطّردة.
- تعلّم صياغة البرهان بالتدرّج، وحلّ مسائل على ذلك.

تدرب صفحة 18

① ليكن $u_n = \frac{2^n}{3^{n+1}}$ في حالة $n \in \mathbb{N}$. أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية وجد أساسها.

الجل

لاحظ أن $u_n = aq^n$ حيث $a = \frac{1}{3}$ و $q = \frac{2}{3}$ فهي متتالية هندسية حددا الأول $a = \frac{1}{3}$ وأساسها $q = \frac{2}{3}$.

② الأسئلة الآتية تتعلق بمتتاليات حسابية أو هندسية :

① $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية حسابية فيها $u_2 = 41$ و $u_5 = -13$. احسب u_{20} .

الجل

من العلاقة $u_5 - u_2 = (5 - 2)r$ نستنتج أن أساس هذه المتتالية الحسابية يساوي

$$r = \frac{u_5 - u_2}{3} = -18$$

وعليه يكون $u_{20} = u_2 + r(20 - 2) = 41 - 324 = -283$

② $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية فيها $u_7 = \frac{1}{1080}$ و $u_{10} = \frac{25}{2197}$. احسب u_{30} .

الجل

من العلاقة $u_m = u_p q^{m-p}$ نستنتج أن $u_{10} = u_7 \cdot q^{10-7}$ ومنه $\frac{25}{2197} = \frac{1}{1080} q^3$ أي

$$q^3 = \frac{5^3 \times 6^3}{13^3}$$

وعليه $q = \frac{30}{13}$ إذن $u_{30} = u_{10} \cdot \left(\frac{30}{13}\right)^{30-10} = \frac{25}{2197} \cdot \left(\frac{30}{13}\right)^{20}$

③ $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية حسابية أساسها 3 وفيها $u_1 = -2$. احسب u_n بدلالة n ، واستنتج قيمة

المجموعين $u_1 + u_2 + \dots + u_{20}$ و $u_{30} + u_{31} + u_{32}$

الجل

من العلاقة $u_n - u_1 = 3(n - 1)$ نستنتج أن $u_{31} = 88$ ، ومنه $u_{30} + u_{31} + u_{32} = 3u_{31} = 264$

$$u_1 + u_2 + \dots + u_{20} = 20 \times \frac{u_1 + u_{20}}{2} = 10 \times (-2 + 55) = 530$$

④ $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية أساسها 3 وفيها $u_1 = -2$. احسب u_n بدلالة n ، واستنتج قيمة

المجموعين $u_1 + u_2 + \dots + u_7$ و $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{2n}$

الحل

$$u_1 + u_2 + \dots + u_7 = 1 - 3^7 = -2186$$

وبملاحظة أن $(v_n)_{n \geq 0}$ حيث $v_n = u_{2n}$ هندسية أساسها 9 نجد

$$u_2 + u_4 + u_6 \dots + u_{2n} = u_2 \frac{1 - 9^n}{1 - 9} = -\frac{3}{4}(9^n - 1)$$

5 $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية حسابية أساسها -2 وفيها $u_0 = -3$. احسب $u_{25} + u_{26} + \dots + u_{125}$.

الحل

$$u_{25} + u_{26} + \dots + u_{125} = (125 - 24) \times \frac{u_{25} + u_{125}}{2} = -15453$$

6 $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية أساسها 2 وفيها $u_0 = 1$. احسب $u_3 + u_4 + \dots + u_{10}$.

الحل

$$u_3 + u_4 + \dots + u_{10} = u_3 \frac{1 - 2^8}{1 - 2} = 2040$$

7 احسب المجموع $10 + 3 + \frac{5}{2} + 2 + \frac{3}{2} + 1 + \frac{1}{2}$.

الحل

$$2S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + 20 = \frac{20 \times 21}{2} \quad \text{نلاحظ أن } S = 105$$

8 a و b و c ثلاثة حدود متوالية من متتالية هندسية. احسبها علماً أن

$$abc = 343 \quad \text{و} \quad a + b + c = 36.75$$

الحل

المتتالية هندسية إذن $ac = b^2$ ومنه $b^3 = 343 = 7^3$ إذن $b = 7$ ، فإذا كان $q = \frac{c}{b}$ كان $a = \frac{7}{q}$

و $c = 7q$ ، ومن ثم $7\left(q + \frac{1}{q}\right) = 36\frac{3}{4} - 7 = \frac{119}{4}$ أو $q + \frac{1}{q} = \frac{17}{4} = 4\frac{1}{4}$. هذه تؤول إلى معادلة

من الدرجة الثانية $(q - 4)(4q - 1) = 0$. ومنه الحلان

$$(a, b, c) = \left(27, 7, \frac{7}{4}\right) \quad \text{أو} \quad (a, b, c) = \left(\frac{7}{4}, 7, 28\right)$$

3 $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية معرفة تدرجياً وفق $v_0 = 1$ و $v_{n+1} = \frac{v_n}{1 + v_n}$.

1 تحقق أن $v_n > 0$ أي كان العدد الطبيعي n .

2 أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة $u_n = \frac{1}{v_n}$ متتالية حسابية.

3 استنتج عبارة v_n بدلالة n .

1 لتكن $E(n)$ الخاصة $v_n > 0$. لما كان $v_0 = 1 > 0$ استنتجنا أن $E(0)$ صحيحة. وإذا افترضنا أن $E(n)$ صحيحة كان $v_n > 0$ وكان من ثم $v_n + 1 > 1 > 0$. إذن $v_{n+1} > 0$ بصفته ناتج من قسمة عددين موجبين تماماً. إذن $E(n+1)$ صحيحة. فنكون قد أثبتنا بالتدريج أن $v_n > 0$ أيًا كان n .

2 نلاحظ أن $u_{n+1} - u_n = \frac{1+v_n}{v_n} - \frac{1}{v_n} = 1$ فالمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 1$ وأساسها 1. إذن $u_n = n + 1$.

3 نستنتج مباشرة أن $v_n = \frac{1}{u_n} = \frac{1}{n+1}$ أيًا كانت n .

4 ادرس جهة اطراد كل من المتتاليات الآتية.

$$\begin{array}{lll} u_n = \frac{2n-1}{n+4} & \textcircled{3} & u_n = \sqrt{3n+1} & \textcircled{2} & u_n = \frac{3}{n^2} & \textcircled{1} \\ u_n = \frac{n}{10^n} & \textcircled{6} & u_n = \frac{3n+1}{n-2} & \textcircled{5} & u_n = \frac{1}{n^2+1} & \textcircled{4} \\ \begin{cases} u_0 = 1, \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases} & \textcircled{9} & \begin{cases} u_0 = 1, \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n \end{cases} & \textcircled{8} & \begin{cases} u_0 = 2, \\ u_{n+1} = u_n - 3 \end{cases} & \textcircled{7} \end{array}$$

1 عندما يكبر مقام كسر يصغر. ولأن $(n+1)^2 > n^2$ أيًا كان العدد الطبيعي n استنتجنا أن $u_{n+1} < u_n$ في هذه الحالة، ومن ثم $(u_n)_{n \geq 1}$ متناقصة.

ويمكن أيضاً أن نحسب الفرق $u_n - u_{n+1} = 3 \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{3(2n+1)}{n^2(n+1)^2}$ لنجد أنه موجباً فنستنتج مجدداً أن $(u_n)_{n \geq 1}$ متناقصة.

ويمكن أيضاً أن نحسب النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2$ لنجد أنها أصغر من 1 فنستنتج مرة ثانية أن $(u_n)_{n \geq 1}$ متناقصة.

2 تابع الجذر التربيعي متزايداً، فإذا كان n عدداً طبيعياً كان $3(n+1) + 1 > 3n + 1$ ومن ثم

$$u_{n+1} = \sqrt{3(n+1) + 1} > \sqrt{3n + 1} = u_n$$

فالمتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة. وهنا أيضاً يمكن أن نحسب الفرق أو النسبة لنصل إلى النتيجة.

3 نلاحظ هنا أن

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+5} - \frac{2n-1}{n+4} = \frac{9}{(n+4)(n+5)} > 0$$

فالمتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة.

4 عندما يكبر مقام كسر يصغر. إذن من الواضح أن $u_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2 + 1} < \frac{1}{n^2 + 1} = u_n$

ومن ثمّ $(u_n)_{n \geq 1}$ متناقصة.

5 في حالة $n > 2$ لدينا $u_{n+1} - u_n = \frac{-7}{(n-1)(n-2)} < 0$ إذن المتتالية متناقصة. كما يمكن

أن نكتب $u_{n+2} = \frac{3n+4}{n} = 3 + \frac{4}{n}$ وعندما يكبر المقام يصغر الكسر إذن $u_{n+3} < u_{n+2}$ في حالة $n \geq 1$ ، والمتتالية متناقصة.

6 في حالة $n \geq 1$ لدينا $u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{10^{n+1}} - \frac{n}{10^n} = \frac{-9n+1}{10^{n+1}} < 0$ فالمتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متناقصة بدءاً من الحد ذي الدليل $n_0 = 1$.

7 متتالية حسابية أساسها سالب فهي متناقصة.

8 متتالية هندسية حدودها موجبة وأساسها أصغر من الواحد فهي متناقصة.

9 متتالية هندسية حدودها موجبة وأساسها أكبر من الواحد فهي متزايدة.

تَدْرِبْ صَفْحَةَ 21

1 نعرف في حالة عدد طبيعي $n \geq 1$ المقدار $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

1 احسب S_1 و S_2 و S_3 و S_4 . ثمّ عبر عن S_{n+1} بدلالة S_n و n .

2 أثبت بالتدرّج أنّه في حالة أية عدد طبيعي $n \geq 1$ لدينا :

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

1 **الحل**

n	1	2	3	4
S_n	1	5	14	30

ونلاحظ أنّه للانتقال من S_n إلى S_{n+1} نجمع $(n+1)^2$ ، أي $S_{n+1} = S_n + (n+1)^2$.

2 لتكن $E(n)$ الخاصة $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

• الخاصة $E(1)$ صحيحة لأنّ $S_1 = 1 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6}$

• نفترض $E(n)$ صحيحة عندئذ تكون $E(n+1)$ صحيحة لأنّ

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

فالخاصة $E(n)$ صحيحة أيّاً كانت $n \geq 1$.

② ليكن $x \geq -1$. في حالة عدد طبيعي n نرمز $E(n)$ إلى المتراجحة $(1+x)^n \geq 1+nx$. أثبت أن المتراجحة $E(n)$ محققة أياً كان العدد الطبيعي n .

الحل

- الخاصة $E(0)$ صحيحة لأن $(1+x)^0 = 1 \geq 1+0x$.
 - نفترض $E(n)$ صحيحة عندئذ تكون $E(n+1)$ صحيحة لأنّ

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)(1+x)^n \\ &\geq (1+x)(1+nx) \\ &\geq 1+(n+1)x+nx^2 \\ &\geq 1+(n+1)x \end{aligned}$$
- فالمتراجحة $E(n)$ صحيحة أياً كانت n .

تمارين ومسابقات

1 بين أي المتتاليات $(u_n)_{n \geq 0}$ الآتية مطّردة (ربما بدءاً من حدّ معين n_0).

$u_n = 2^n$	③	$u_n = \frac{n+1}{n+2}$	②	$u_n = -3n+1$	①
$u_n = \frac{n^2}{n!}$	⑥	$u_n = 1 + \frac{1}{n^2}$	⑤	$u_n = \left(-\frac{1}{n}\right)^n$	④
$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + 2 \end{cases}$	⑨	$\begin{cases} u_0 = 8 \\ u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + 2 \end{cases}$	⑧	$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}$	⑦

تذكّر أنّ $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$ في حالة $n \geq 1$.

الحل

- | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| ③ متزايدة. | ② متزايدة. | ① متناقصة. |
| ⑥ متناقصة بدءاً من الدليل $n_0 = 2$. | ⑤ متناقصة. | ④ ليست مطّردة. |
| ⑨ متزايدة. | ⑧ ثابتة. | ⑦ متزايدة. |

مثلاً في حالة ⑥ لدينا عندما $n \geq 2$ ما يأتي:

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{n^2}{n+1} = \frac{n+n(n-1)}{n+1} \geq \frac{n+2 \times 1}{n+1} > 1$$

وفي حالة ⑨ لدينا $u_{n+1} - u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n (u_1 - u_0) > 0$ (لماذا؟)

2 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 2u_n - 3$ في حالة أي عدد طبيعي غير معدوم n .

- ① احسب u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 ثم خمن عبارة u_n بدلالة n .
 ② بحساب عبارة $u_n - 3$ عند كل $n \geq 0$ ، عبّر عن u_n بدلالة n .

الحل

① لدينا

n	0	1	2	3	4	5
u_n	2	1	-1	-5	-13	-29

ولكن نلاحظ أيضاً أننا عند حساب حدود المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ نضرب في كل مرة بالعدد 2 ثم نعدّل الناتج بطرح العدد 3، فنتوقع أن قوى العدد 2 تؤدي دوراً ما في هذه المتتالية، لذلك ننشئ جدولاً يضم الحدود المطلوبة وقوى العدد 2 في آن معاً لنجد

n	0	1	2	3	4	5
u_n	2	1	-1	-5	-13	-29
2^n	1	2	4	8	16	32

وهنا سرعان ما نرى أن مجموع كل عنصر من السطر الثاني مع العنصر الذي تحته ثابت، ويساوي 3، أي إن $u_n + 2^n = 3$ ومنه التخمين $u_n = 3 - 2^n$.
 ② بملاحظة أن $u_{n+1} - 3 = 2(u_n - 3)$ نرى أن المتتالية (v_n) المعطاة بالصيغة $v_n = u_n - 3$ متتالية هندسية أساسها 2 وحدها الأول -1. إذن $v_n = -2^n$ ومنه $u_n = v_n + 3 = 3 - 2^n$ ، أي كانت n .

3 المتتالية (u_n) معرفة وفق $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = -u_n + 4$ في حالة أي عدد طبيعي غير معدوم n . احسب u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 وخمن عبارة u_n بدلالة n ثم حدد u_n بدلالة n .

الحل لدينا

n	0	1	2	3	4	5
u_n	3	1	3	1	3	1

وهكذا نرى أن

$$u_n = \begin{cases} 3 & : \text{زوجي } n \\ 1 & : \text{فردى } n \end{cases}$$

ويمكن التعبير عن u_n بصيغة أخرى $u_n = 2 + (-1)^n$ ، التي يمكن إثبات صحتها بدلالة n . وكذلك يمكن اتباع أسلوب التمرين السابق.

4 نذكر في حالة عدد طبيعي غير معدوم n بالرمز $n!$ دلالة على الجداء $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ ،

الذي نقرأه « n عاملي». أثبت بالتدرج الخاصتين الآتيتين

$$.1 + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + n \times n! = (n + 1)! - 1 \quad \textcircled{1}$$

$$.n! \geq 2^{n-1} \quad \textcircled{2}$$

الحل

① لتكن $E(n)$ الخاصة $E(n) = (n + 1)! - 1$ الخاصة

$$\bullet \text{ الخاصة صحيحة } E(1) \text{ لأن } 1 \times 1! = 2! - 1$$

• لنفترض الخاصة $E(n)$ صحيحة عندئذ

$$1 + 2 \times 2! + \dots + n \times n! + (n + 1) \times (n + 1)! = (n + 1)! - 1 + (n + 1) \times (n + 1)! \\ = (n + 2)! - 1$$

فبالخاصة $E(n + 1)$ صحيحة، والخاصة $E(n)$ صحيحة مهما كان $n \geq 1$.

② لتكن $E(n)$ الخاصة $E(n) \geq 2^{n-1}$

$$\bullet \text{ الخاصة صحيحة } E(1) \text{ لأن } 1! = 1 = 2^0$$

• لنفترض الخاصة $E(n)$ صحيحة في حالة $n \geq 1$ عندئذ

$$(n + 1)! = (n + 1) \cdot n! \geq 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

فبالخاصة $E(n + 1)$ صحيحة، والخاصة $E(n)$ صحيحة مهما كان $n \geq 1$.

5 في حالة عدد طبيعي $n \geq 1$ ، ليكن $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ و $v_n = u_{2n} - u_n$. أثبت

أن المتتالية (v_n) متزايدة.

الحل

لاحظ أن u_n يساوي مجموع مقاليب الأعداد الطبيعية بين 1 و n . إذن

$$v_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$$

$$v_{n+1} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$$

وعليه

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \\ = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \\ = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0$$

فالمتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$ متتالية متزايدة تماماً.

6 a و b و c ثلاثة أعداد حقيقية و $a \neq 0$. نعلم أنّ a و b و c هي ثلاثة حدود متعاقبة من متتالية هندسية، نرمز إلى أساسها بالرمز q . كما نعلم أنّ $3a$ و $2b$ و c هي ثلاثة حدود متوالية من متتالية حسابية. احسب q .

الحل

الحدود الثلاثة هي إذن $(a, b, c) = (a, qa, q^2a)$ ولأنّ $(3a, 2b, c)$ حدود متوالية من متتالية حسابية كان $3a + c = 2(2b) = 4b$ ومنه (لأنّ $a \neq 0$) $q^2 - 4q + 3 = 0$ ، وهذا يعطي $q \in \{1, 3\}$.



لنتعلم البحث معاً

7 صغ افتراضاً ثم تحقق من صحته

نتأمل المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً وفق $u_0 = 7$ و $u_{n+1} = 10u_n - 18$ عند كل عدد طبيعي n . نهدف في هذا التمرين إلى التعبير عن u_n بدلالة n .

نحو الحل

نعلم أنّه في حالة متتالية معرفة بعلاقة تدريجية، يمكننا حساب u_n بشرط أن نكون قد عرفنا الحدود التي تسبقه. والمطلوب هنا هو إيجاد طريقة لحساب u_n مباشرةً بدلالة n . في هذا النمط من المسائل، نحسب حدوداً أولى من المتتالية ثم نحاول في كل حالة الربط بين قيمة الحدّ ودليله. احسب $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, \dots$

لدينا

n	0	1	2	3	4	5
u_n	7	52	502	5002	50002	500002

نجد أنّ كل حد من الحدود المحسوبة يبدأ بالرقم 5 وينتهي بالرقم 2، ويوجد بينهما عددٌ من الأصفار يتعلق بقيمة n ، أي بدليل هذا الحد. بالتأكيد، سيسمح لك هذا بالتعبير عن u_n بدلالة n .

- عيّن عدد الأصفار المشار إليه أعلاه عندما تأخذ n القيم 1، 2، 3، 4 و 5.
- ما عدد الأصفار بدلالة n .
- تحقق أنّ $u_k = 5 \times 10^k + 2$ في حالة k من $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- اقترح صيغة للحدّ u_n بدلالة n . ثم أثبت صحة اقتراحك أيّاً كانت n .

من الواضح أنّ عدد الأصفار في الكتابة العشرية للحد u_n يساوي $n-1$ في حالة $1 \leq n \leq 5$. نستنتج إذن الصيغة $u_k = 5 \times 10^k + 2$ في حالة k من $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. لنبرهن إذن صحة الخاصة

$$E(n) : u_n = 5 \times 10^n + 2 \quad n \geq 0$$

• الخاصة $E(0)$ صحيحة لأنّ $5 + 2 = 7$.

• لنفترض صحة الخاصة $E(n)$. عندئذ

$$u_{n+1} = 10u_n - 18 = 10(5 \times 10^n + 2) - 18 = 5 \times 10^{n+1} + 2$$

فبالخاصة $E(n+1)$ صحيحة، والخاصة $E(n)$ صحيحة مهما كان $n \geq 1$.

8 متتالية هندسية مخفيّة

نتأمّل المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً وفق $u_0 = s$ و

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + n^2 + n \quad (*)$$

① عيّن كثير حدود من الدرجة الثانية P بحيث تُحقّق المتتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ التي حددها العام

$$t_n = P(n) \quad \text{العلاقة التدريجية } (*) \text{ نفسها أي } t_{n+1} = \frac{1}{2}t_n + n^2 + n \text{ أيأ كانت } n.$$

② أثبت أنّ المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ التي حددها العام $v_n = u_n - t_n$ هي متتالية هندسية.

③ اكتب عبارة v_n ثمّ u_n بدلالة n و s .

نحو الحل

نبحث عن كثير حدود من الدرجة الثانية P . لنكتبه إذن بالصيغة $P(n) = an^2 + bn + c$. لتعيين الأمثال a و b و c نستفيد من كون المتتالية التي حددها العام $t_n = P(n)$ تُحقّق العلاقة التدريجية.

1. بين أنّ $(t_n)_{n \geq 0}$ تحقق العلاقة التدريجية $(*)$ إذا فقط إذا كان

$$\left(\frac{a}{2} - 1\right)n^2 + \left(2a + \frac{b}{2} - 1\right)n + \left(a + b + \frac{c}{2}\right) = 0$$

أيّاً كان العدد الطبيعي n .

2. استنتج من ذلك جملة بسيطة من المعادلات تحققها a و b و c . ثمّ عين هذه الأعداد.

لإثبات أنّ المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ هندسية، يكفي أن نجد عدداً q بحيث تتحقق المساواة $v_{n+1} = qv_n$ ، عيّن q .

بمعرفة v_0 و q يمكننا استنتاج v_n ، ثمّ لأننا نعرف t_n يمكننا إنجاز المطلوب.

أنجز الحلّ واكتبه بلغة سليمة.

① نبحث عن كثير حدود من الدرجة الثانية P . لنكتبه إذن بالصيغة $P(n) = an^2 + bn + c$. لتعيين الأمثال a و b و c نستفيد من كون المتتالية التي حدها العام $t_n = P(n)$ تحقق العلاقة التدرجية.

بتعويض t_n و t_{n+1} بقيمتيهما في $t_{n+1} = \frac{1}{2}t_n + n^2 + n$ نستنتج صحة العلاقة

$$\left(\frac{a}{2} - 1\right)n^2 + \left(2a + \frac{b}{2} - 1\right)n + \left(a + b + \frac{c}{2}\right) = 0$$

أيًا كان العدد الطبيعي n . باختيار $n = 0$ و $n = 1$ و $n = 2$ نستنتج جملة المعادلات

$$2a + 2b + c = 0$$

$$7a + 3b + c = 4$$

$$14a + 4b + c = 12$$

نستعمل الأولى لحذف c من المعادلتين الثانية والثالثة لنجد الجملة المكافئة

$$2a + 2b + c = 0$$

$$5a + b = 4$$

$$6a + b = 6$$

ثم بطرح الثانية من الثالثة نجد $a = 2$ ، ثم $b = -6$ و $c = 8$. ونتيقن بالعكس، أن هذه الخيار لقيم a

و b و c يجعل المساواة

$$\left(\frac{a}{2} - 1\right)n^2 + \left(2a + \frac{b}{2} - 1\right)n + \left(a + b + \frac{c}{2}\right) = 0$$

محقة أيًا كانت قيمة n ، ومن ثم تحقق المتتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ حيث $t_n = 2n^2 - 6n + 8$ العلاقة التدرجية (*).

② هنا لدينا

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + n^2 + n$$

$$t_{n+1} = \frac{1}{2}t_n + n^2 + n$$

بالطرح نستنتج أن $u_{n+1} - t_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n - t_n)$ التي حدها العام $v_n = u_n - t_n$

متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، وحدها الأول $v_0 = s - 8$ ، إذن $u_n - t_n = \frac{s - 8}{2^n}$ ، ومن ثم

$$u_n = (s - 8)2^{-n} + 2n^2 - 6n + 8$$

وهي النتيجة المرجوة.



قُدماً إلى الأمام

9 نُعْطَى عددين حقيقيين a و b ونفترض أن $a \neq 1$. نتأمل المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ التي تحقق

$$v_{n+1} = av_n + b, \text{ أيأ كان العدد الطبيعي } n.$$

① عيّن تابعاً f يحقق $v_{n+1} = f(v_n)$ أيأ كانت قيمة $n \geq 0$.

② احسب l حلّ المعادلة $f(x) = x$.

③ نعرّف المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ حيث $u_n = v_n - l$. أثبت أن $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية، واستنتج

u_n بدلالة n و a و b و v_0 . ثم استنتج v_n بدلالة هذه المُعاملات.

الحل

هذا التمرين، تمرين مباشرٌ ومحلول بصفته نشاطاً في الصف الثاني الثانوي.

10 نتأمل متتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة بالتدرج وفق:

$$\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 4, \\ u_{n+1} = 5u_n - 6u_{n-1} \quad (n \geq 1) \end{cases}$$

① عيّن عددين حقيقيين a و b يحققان $a + b = 5$ و $ab = 6$.

② لتكن $(v_n)_{n \geq 0}$ المتتالية $v_n = u_{n+1} - au_n$. أثبت أن $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية أساسها b .

③ لتكن $(w_n)_{n \geq 0}$ المتتالية $w_n = u_{n+1} - bu_n$. أثبت أن $(w_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية أساسها a .

④ عبّر عن v_n و w_n بدلالة n . ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

الحل

① عدنان مجموعهما 5 وجداء ضربهما 6 هما 2 و 3 يمكننا إذن أن نأخذ $a = 2$ و $b = 3$.

② لنضع $v_n = u_{n+1} - 2u_n$ عندئذ، في حالة $n \geq 1$ يكون لدينا

$$v_n - 3v_{n-1} = u_{n+1} - 2u_n - 3(u_n - 2u_{n-1}) = u_{n+1} - 5u_n + 6u_{n-1} = 0$$

أو $v_n = 3v_{n-1}$ فالمتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية أساسها 3.

③ ونبرهن بمثل ما سبق أن $(w_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية أساسها 2.

④ نستنتج إذن أن $v_n = 3^n v_0 = 2 \times 3^n$ و $w_n = 2^n w_0 = 2^n$. أو

$$u_{n+1} - 3u_n = 2^n \text{ و } u_{n+1} - 2u_n = 2 \times 3^n$$

وبطرح الأخيرة من الأولى نستنتج أن $u_n = 2 \times 3^n - 2^n$ أيأ كانت n .

11 متراجحة قسرية

- ① أثبت، أيّاً كان العدد الطبيعي n ، $n \geq 2$ ، أن: $3 \times n^2 \geq (n+1)^2$.
- ② نرسم بالرمز $E(n)$ إلى القضية « $3^n \geq 2^n + 5 \times n^2$ ».
- ① ما أصغر عدد طبيعي غير معدوم n ، تكون $E(n)$ صحيحة عنده؟
- ② أثبت أنّ $E(n)$ صحيحة، أيّاً كان العدد الطبيعي n الذي يحقق الشرط $n \geq 5$.

الحل

① لاحظ أنّه في حالة $n \geq 2$ لدينا

$$3n^2 - (n+1)^2 = 2n^2 - 2n - 1 = 2n(n-1) - 1 \geq 2 \times 2 \times 1 - 1 = 3 > 0$$

ومنه الخاصة المطلوبة.

- ① ② لنضع في جدول طرفي المتراجحة الواردة في $E(n)$ عند القيم الصغيرة للعدد n .

n	3^n		$2^n + 5n^2$
1	3	<	7
2	9	<	24
3	27	<	53
4	81	<	96
5	243	>	157

إذن $n = 5$ هو أول عدد طبيعي موجب تماماً تكون عنده $E(n)$ محققة.

- ② ② رأينا أنّ $E(5)$ صحيحة. لنفترض إذن أنّ $E(n)$ صحيحة عند قيمة للعدد $n \geq 5$. عندئذ

$$\begin{aligned} 3^{n+1} &= 3 \times 3^n \geq 3 \times (2^n + 5n^2) && \text{لأن } E(n) \text{ صحيحة} \\ &\geq 3 \times 2^n + 5(3n^2) \\ &\geq 2 \times 2^n + 5(n+1)^2 && \text{استفدنا من ①} \\ &\geq 2^{n+1} + 5(n+1)^2 && \text{هذه هي } E(n+1) \end{aligned}$$

وعليه تكون $E(n+1)$ صحيحة أيضاً. إذن $E(n)$ صحيحة عند أية قيمة للعدد $n \geq 5$.

12 نرسم بالرمز $E(n)$ إلى القضية « $3^n \geq (n+2)^2$ ».

- ① أتكون القضايا $E(0)$ و $E(1)$ و $E(3)$ و $E(4)$ صحيحة؟
- ② أثبت بالتدريج أنّ القضية $E(n)$ صحيحة عند كل عدد طبيعي n يحقق الشرط $n \geq 3$.

الحل

يُحلُّ بأسلوب مشابه للتمرين السابق، بل هو أسهل منه. إذ يعتمد على المتراجحة الواضحة في حالة عدد

$$\text{طبيعي } n: 3(n+2)^2 - (n+3)^2 = 2n^2 + 6n + 3 > 0$$

أثبت بالتدرج، صحة كل من الخواص الآتية أياً كان العدد الطبيعي n .

- ① « $4^n + 5$ مضاعف للعدد 3 » .
 ② « $2^{3n} - 1$ مضاعف للعدد 7 » .
 ③ « $n^3 + 2n$ مضاعف للعدد 3 » .
 ④ « $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ مضاعف للعدد 7 » .

الحل

- ① لتكن $E(n)$ الخاصة الآتية: $4^n + 5$ مضاعف للعدد 3 .
 • الخاصة $E(0)$ صحيحة لأنها تنص على أن العدد $4^0 + 5 = 6$ مضاعف للعدد 3 .
 • لنفترض أن $E(n)$ صحيحة أي يوجد عدد طبيعي k بحيث $4^n + 5 = 3k$ عندئذ

$$4^{n+1} + 5 = 4 \times 4^n + 5 = 4(3k - 5) + 5 = 3(4k - 5)$$
 إذن $4^{n+1} + 5$ مضاعف للعدد 3 والخاصة $E(n+1)$ أيضاً صحيحة. فنكون قد أثبتنا بالتدرج صحة الخاصة $E(n)$ أياً كان العدد الطبيعي n .
 ② لتكن $E(n)$ الخاصة الآتية: $2^{3n} - 1$ مضاعف للعدد 7 .
 • الخاصة $E(0)$ صحيحة لأنها تنص على أن العدد $2^0 - 1 = 0$ مضاعف للعدد 7 .
 • لنفترض أن $E(n)$ صحيحة أي يوجد عدد طبيعي k بحيث $2^{3n} - 1 = 7k$ عندئذ

$$2^{3(n+1)} - 1 = 8 \times 2^{3n} - 1 = 8(7k + 1) - 1 = 7(8k + 1)$$
 إذن $2^{3(n+1)} - 1$ مضاعف للعدد 7 والخاصة $E(n+1)$ أيضاً صحيحة. فنكون قد أثبتنا بالتدرج صحة الخاصة $E(n)$ أياً كان العدد الطبيعي n .
 ③ لتكن $E(n)$ الخاصة الآتية: $n^3 + 2n$ مضاعف للعدد 3 .
 • الخاصة $E(0)$ صحيحة لأنها تنص على أن العدد $0^3 + 2 \times 0 = 0$ مضاعف للعدد 3 .
 • لنفترض أن $E(n)$ صحيحة أي يوجد عدد طبيعي k بحيث $n^3 + 2n = 7k$ عندئذ

$$(n+1)^3 + 2(n+1) = n^3 + 2n + 3(n^2 + n + 1) = 3(k + n^2 + n + 1)$$
 إذن $(n+1)^3 + 2(n+1)$ مضاعف للعدد 3 والخاصة $E(n+1)$ أيضاً صحيحة. فنكون قد أثبتنا بالتدرج صحة الخاصة $E(n)$ أياً كان العدد الطبيعي n .
 ④ لتكن $E(n)$ الخاصة الآتية: $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ مضاعف للعدد 7 .
 • الخاصة $E(0)$ صحيحة لأنها تنص على أن العدد $3^1 + 2^2 = 7$ مضاعف للعدد 7 .
 • لنفترض أن $E(n)$ صحيحة أي يوجد عدد طبيعي k بحيث $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$ عندئذ

$$3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} = 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2}$$

$$= 9(7k - 2^{n+2}) + 2 \times 2^{n+2} = 7(9k - 2^{n+2})$$
 إذن $3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2}$ مضاعف للعدد 7 والخاصة $E(n+1)$ أيضاً صحيحة. فنكون قد أثبتنا بالتدرج صحة الخاصة $E(n)$ أياً كان العدد الطبيعي n .

14

نرمز إلى القضية « يقسم العدد 9 العدد $10^n + 1$ » بالرمز $E(n)$ ، في حالة $n \in \mathbb{N}$.

- ① أثبت أنه إذا كانت $E(n)$ صحيحة عند قيمة العدد n ، كانت عندئذ $E(n+1)$ صحيحة.
 ② أتكون القضية $E(n)$ صحيحة على \mathbb{N} ؟ برّر إجابتك.

الحل

① لنفترض أن $E(n)$ صحيحة أي يوجد عدد طبيعي k بحيث $10^n + 1 = 9k$ عندئذ

$$10^{n+1} + 1 = 10 \times 10^n + 1 = 10(9k - 1) + 1 = 9(10k - 1)$$

إذن $10^{n+1} + 1$ مضاعف للعدد 9 والخاصة $E(n+1)$ أيضاً صحيحة.

- ② القضية $E(n)$ غير صحيحة على \mathbb{N} ؟ لأن $E(0)$ غير صحيحة. في الحقيقة إن كل $E(n)$ خطأ لأن مجموع خانات العدد $10^n + 1 = \underbrace{100 \dots 01}_{n-1}$ يساوي 2 وهو ليس من مضاعفات 9.

15

① متتالية معرفة وفق $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ عند كل $n \geq 1$.

① أثبت أن $0 \leq u_n \leq 2$ ، أيًا كان العدد الطبيعي n .

② أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة تماماً.

الحل

① لتكن $E(n)$ الخاصة الآتية: $0 \leq u_n \leq 2$.

• الخاصة $E(0)$ صحيحة لأنها تنص على أن $0 \leq u_0 = 1 \leq 2$.

• لنفترض أن $E(n)$ صحيحة أي أن $0 \leq u_n \leq 2$ عندئذ

$$0 \leq u_n + 2 \leq 4$$

إذن $0 \leq \sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{4} = 2$ أو $0 \leq u_{n+1} \leq 2$ والخاصة $E(n+1)$ أيضاً صحيحة. فنكون قد

أثبتنا بالتدريج صحة الخاصة $E(n)$ أيًا كان العدد الطبيعي n .

② لتكن $E(n)$ الخاصة الآتية: $u_n < u_{n+1}$.

• الخاصة $E(0)$ صحيحة لأن $u_1 = \sqrt{3}$ و $E(0)$ تنص على أن $u_1 = \sqrt{3} < u_0 = 1$.

• لنفترض أن $E(n)$ صحيحة أي أن $u_n < u_{n+1}$ عندئذ

$$0 \leq u_n + 2 < u_{n+1} + 2$$

ولأنّ تابع الجذر التربيعي متزايد تماماً استنتجنا أنّ $\sqrt{u_n + 2} < \sqrt{u_{n+1} + 2}$ أو $u_{n+1} < u_{n+2}$

والخاصة $E(n+1)$ أيضاً صحيحة. فنكون قد أثبتنا بالتدريج صحة الخاصة $E(n)$ أيًا كان العدد

الطبيعي n . أي أنّ المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة تماماً.

16 متتالية معرفة وفق $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2u_n + 6}$ عند كل $n \geq 0$.

① أثبت أن التابع $x \mapsto \frac{3x+2}{2x+6}$ متزايداً تماماً واستنتج أن $\frac{1}{2} < u_n \leq 1$ ، أيًا كان العدد n .

② أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة تماماً.

الحل

① لنضع $f(x) = \frac{3x+2}{2x+6}$ في حالة $x > 0$. ونلاحظ أن $f'(x) = \frac{14}{(2x+6)^2} > 0$. إذن التابع f

متزايداً تماماً على $]0, +\infty[$.

• لنرمز بالرمز $E(n)$ إلى الخاصة $\frac{1}{2} < u_n \leq 1$.

• إن $E(0)$ محققة لأن $1 \leq u_0 = 1 < \frac{1}{2}$.

• لنفترض أن $E(n)$ محققة أي أن $\frac{1}{2} < u_n \leq 1$. بالاستفادة من تزايد f نستنتج أن

$$f\left(\frac{1}{2}\right) < f(u_n) \leq f(1)$$

أي $\frac{1}{2} < u_{n+1} \leq \frac{5}{8}$ ولكن $\frac{5}{8} \leq 1$ إذن $\frac{1}{2} < u_{n+1} \leq 1$ والخاصة $E(n+1)$ محققة. فنكون قد

أثبتنا صحة المتراجحة $\frac{1}{2} < u_n \leq 1$ أيًا كانت قيمة n .

②

• لنرمز بالرمز $E(n)$ إلى الخاصة $u_{n+1} < u_n$.

• إن $E(0)$ محققة لأن $u_0 = 1 > u_1 = \frac{5}{8}$.

• لنفترض أن $E(n)$ محققة أي أن $u_{n+1} < u_n$. لما كان f متزايداً تماماً على $]0, +\infty[$ ، والحدان

u_n و u_{n+1} ينتميان إلى $]0, +\infty[$ استناداً إلى النقطة السابقة استنتجنا أن $f(u_{n+1}) < f(u_n)$ أي

$u_{n+2} < u_{n+1}$ وهذه هي الخاصة $E(n+1)$. فنكون قد أثبتنا بالتدريج أن $u_{n+1} < u_n$ أيًا كانت

قيمة n ، والمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة تماماً.

17 ليكن θ عدد حقيقي من المجال $]0, \frac{\pi}{2}[$. ثم لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق

$$u_0 = 2 \cos \theta \text{ و } u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \text{ في حالة } n \in \mathbb{N}$$

① احسب u_1 و u_2 .

② أثبت بالتدريج، أن $u_n = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$.

مساعدة: تذكر أن $1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$

$$\textcircled{1} \text{ هنا } u_2 = 2 \cos \frac{\theta}{4} \text{ وبالمثل } u_1 = \sqrt{2(1 + \cos \theta)} = \sqrt{4 \cos^2(\theta/2)} = 2 \cos \frac{\theta}{2}$$

$\textcircled{2}$ الإثبات بالتدريج

$$\bullet \text{ لنرمز بالرمز } E(n) \text{ إلى الخاصة } u_n = 2 \cos \frac{\theta}{2^n}$$

\bullet إن $E(0)$ محققة وضوحاً.

$$\bullet \text{ لنفترض أن } E(n) \text{ محققة أي } u_n = 2 \cos \frac{\theta}{2^n} \text{ عندئذ}$$

$$u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} = \sqrt{2 + 2 \cos(\theta/2^n)} = \sqrt{4 \cos^2 \frac{\theta/2^n}{2}} = 2 \cos \frac{\theta}{2^{n+1}}$$

إذن الخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً. فنكون قد أثبتنا صحة الخاصة المطلوبة أياً كانت n .

ملاحظة. في هذا التمرين θ عدد حقيقي من المجال $]0, \frac{\pi}{2}[$ ، إذن جميع الزوايا $\frac{\theta}{2^n}$ تنتمي أيضاً إلى

هذا المجال، ومن ثم يكون $\cos \frac{\theta}{2^n}$ عدداً موجباً، لذلك لا مشكلة عند حساب الجذر التربيعي لمربعه.

18

في مستوى \mathcal{P} ، محدث بمعلم متجانس، \mathcal{H} هي مجموعة النقاط $M(x, y)$ التي تحقق إحداثياتها

المعادلة $x^2 - 5y^2 = 1$. ليكن f التابع الذي يقرن بكل نقطة $M(x, y)$ من المستوى \mathcal{P} النقطة

$M'(9x + 20y, 4x + 9y)$ ، أي $f(M) = M'$. لتكن S_0 النقطة التي إحداثياتها $(1, 0)$ ، ثم

لنتأمل في المستوى \mathcal{P} متتالية النقاط $(S_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق: $S_{n+1} = f(S_n)$. أثبت أن S_n

نقطة من المجموعة \mathcal{H} وأن إحداثياتها أعداد صحيحة.

أولاً في حالة $M(x, y)$ نرمز (x', y') إلى إحداثيتي $M' = f(M)$ أي

$$x' = 9x + 20y \text{ و } y' = 4x + 9y$$

نلاحظ أن

$$\begin{aligned} x'^2 - 5y'^2 &= (9x + 20y)^2 - 5(4x + 9y)^2 \\ &= 81x^2 + 360xy + 400y^2 - 5(16x^2 + 72xy + 81y^2) \\ &= x^2 - 5y^2 \end{aligned}$$

فإذا كان $x^2 - 5y^2 = 1$ كان $x'^2 - 5y'^2 = 1$. إذن، إذا انتمت M إلى \mathcal{H} انتمت صورتها

$M' = f(M)$ إلى \mathcal{H} .

ومن ناحية أخرى، نلاحظ أنه إذا كان كل من x و y عدداً صحيحاً كان كذلك كل من x' و y' لأن

مجموعة الأعداد الصحيحة مغلقة بالنسبة إلى عمليتي الجمع والضرب!.

لنثبت بالتدرج أنّ جميع النقاط $(S_n)_{n \geq 0}$ تقع على \mathcal{H} ومركبات كل منها أعداد صحيحة.

- لرمز بالرمز $E(n)$ إلى الخاصة "النقطة S_n تنتمي إلى \mathcal{H} ومركبتا S_n أعداد صحيحة".
 - إنّ $E(0)$ محققة لأنّ $S_0 = (1, 0)$ فمركباتها عدنان صحيحان وهما تحققان معادلة \mathcal{H} وضوحاً.
 - لنفترض أنّ $E(n)$ محققة أي أنّ $S_n(x, y)$ تنتمي إلى \mathcal{H} ومركباتها x و y عدنان صحيحان. استناداً إلى المقدّمة، النقطة $S_{n+1}(x', y') = f(S_n)$ تحقق معادلة \mathcal{H} فهي تنتمي إليها، ومركباتها x' و y' عدنان صحيحان. إذن الخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً.
- فنكون قد أثبتنا صحة الخاصة المطلوبة أيّاً كانت n .

19

يرمز x إلى عدد حقيقي ويرمز n إلى عدد طبيعي غير معدوم. نضع

$$S_n = \cos x + \cos(3x) + \cos(5x) + \dots + \cos((2n-1)x)$$

① باستعمال دساتير مثلثاتية تعرفها، أثبت أنّ:

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a \quad \text{و} \quad \sin a \cdot \cos b = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b))$$

② حوّل كلا من العبارتين الآتيتين من جداء نسبتين مثلثيتين إلى مجموع نسبتين مثلثيتين.

$$\sin nx \cdot \cos nx \quad \text{و} \quad \sin x \cdot \cos((2n+1)x)$$

③ أثبت أنّ $S_n = \cos(nx) \times \frac{\sin(nx)}{\sin x}$ ، أيّاً يكن $n \geq 1$ و $x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

الحل

① رأينا في دراستنا السابقة أنّ

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

بحساب نصف المجموع نجد العلاقة الأولى. ثمّ باختيار $b = a$ نجد العلاقة الثانية.

② باختيار $a = x, b = (2n+1)x$ في العلاقة الأولى من ① نجد

$$\sin x \cdot \cos((2n+1)x) = \frac{1}{2} (\sin 2(n+1)x + \sin(-2nx)) = \frac{1}{2} (\sin 2(n+1)x - \sin 2nx)$$

وباختيار $a = nx$ في العلاقة الثانية من ② نجد $\sin 2nx = 2 \sin nx \cdot \cos nx$

③ بالتدرج.

• لرمز، في حالة $n \geq 1$ ، بالرمز $E(n)$ إلى الخاصة

$$S_n = \cos x + \cos(3x) + \cos(5x) + \dots + \cos((2n-1)x) = \cos(nx) \times \frac{\sin(nx)}{\sin x}$$

- إنّ $E(1)$ محققة لأنها تكافئ $S_1 = \cos x = \cos x \times \frac{\sin x}{\sin x}$
- لنفترض أنّ $E(n)$ محققة. يؤول الانتقال من S_n إلى S_{n+1} إلى جمع $\cos(2n+1)x$ إلى S_n .

إنّ

$$\begin{aligned}
 S_{n+1} &= \cos x + \cos(3x) + \cos(5x) + \dots + \cos((2n-1)x) + \cos((2n+1)x) \\
 &= S_n + \cos((2n+1)x) \\
 &= \cos nx \times \frac{\sin nx}{\sin x} + \frac{\sin 2(n+1)x - \sin 2nx}{2 \sin x} \\
 &= \frac{\sin 2nx}{2 \sin x} + \frac{\sin 2(n+1)x - \sin 2nx}{2 \sin x} \\
 &= \frac{\sin 2(n+1)x}{2 \sin x} = \cos(n+1)x \cdot \frac{\sin(n+1)x}{\sin x}
 \end{aligned}$$

إذن الخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً. فنكون قد أثبتنا صحة $E(n)$ أيّاً كانت $n \geq 1$.

2

التوابع : النهايات والاستمرار

- 1 نهاية تابع عند اللانهاية
- 2 نهاية تابع عند عدد حقيقي
- 3 العمليات على النهايات
- 4 مبرهنات المقارنة
- 5 نهاية تابع مركب
- 6 المقارب المائل
- 7 الاستمرار
- 8 التوابع المستمرة وحل المعادلات

نقاط التعلّم الأساسية في هذه الوحدة

- نهاية تابع عند اللانهاية أو عند عدد حقيقي، والنهايات اللانهائية.
- العمليات على النهايات.
- مبرهنات المقارنة والإحاطة.
- نهاية تابع مركّب.
- المقاربات المائلة، الموضع النسبي لمنحن بالنسبة إلى مقاربه.
- الاستمرار، ومبرهنة القيم الوسطى.
- صورة مجال وفق تابع مستمر ومطرّد تماماً.
- تطبيقات في حل المعادلات.
- مفهوم التابع العكسي.

تَدْرِبْ صفحة 34 

1 احسب نهايات التوابع الآتية عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

$$f(x) = -3x^4 + 1 \quad ② \quad f(x) = -x^3 + x^2 - x + 1 \quad ①$$

$$f(x) = 5x^3 - 3x - 1 \quad ④ \quad f(x) = 8x^4 - 12x^3 + 5x^2 - x \quad ③$$

$$f(x) = -2x^4 + 100x^3 \quad ⑥ \quad f(x) = 7x^3 + 2x^2 - 5x - 1 \quad ⑤$$

الحل

يذكر المدرّس بالمبرهنة: نهاية كثير حدود عند $+\infty$ أو $-\infty$ هي نهاية حدّه المسيطر. عندئذٍ بإمكان الطالب حساب النهاية مباشرة:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^4 + 1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x^4 + 1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^3 - 3x - 1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (5x^3 - 3x - 1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + 100x^3) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^4 + 100x^3) = -\infty \end{array} \right\} \begin{array}{l} ② \\ ④ \\ ⑥ \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + x^2 - x + 1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x^2 - x + 1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (8x^4 - 12x^3 + 5x^2 - x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (8x^4 - 12x^3 + 5x^2 - x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (7x^3 + 2x^2 - 5x - 1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (7x^3 + 2x^2 - 5x - 1) = -\infty \end{array} \right\} \begin{array}{l} ① \\ ③ \\ ⑤ \end{array}$$

2 احسب نهاية التابع f المعطى بالعلاقة $f(x) = \frac{5x-1}{x-1}$ عند $+\infty$ ، ثم أعط عدداً A يحقق

الشرط: إذا كان $x > A$ ، كان $f(x)$ في المجال $[4.9, 5.1]$.

الحل

إنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$. وينتمي $f(x)$ ينتمي إلى المجال $[4.9, 5.1]$ إذا وفقط إذا

كان: $|f(x) - 5| < \frac{1}{10}$ ، أي $\frac{4}{|x-1|} < \frac{1}{10}$ أو $|x-1| < 40$ ، فإذا كان $x > 41$ تحقّق المطلوب، فيمكن أن نأخذ إذن $A = 41$ أو أي عدد أكبر منه.

تَدْرِبْ صفحة 38 

1 احسب نهايات التوابع الآتية عند $+\infty$ وعند $-\infty$ وعند النقطة a المعطاة، ويمكن في حالة عدم وجود النهاية حساب النهاية من اليمين والنهاية من اليسار عند a .

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 2}, \quad a = 2 \quad ② \quad f(x) = \frac{x - 3}{x - 1}, \quad a = 1 \quad ①$$

$$f(x) = \frac{5x + 1}{x + 1}, \quad a = -1 \quad ④ \quad f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}, \quad a = -1 \quad ③$$

$$f(x) = 3x - 5 + \frac{2}{x + 2}, \quad a = -2 \quad ⑥ \quad f(x) = \frac{x + 2}{(x - 2)^2}, \quad a = 2 \quad ⑤$$

① هنا $f(x) = \frac{x-3}{x-1}$ معرف على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ولدينا

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty \end{array}$$

وليس للتابع نهاية عند 1.

② هنا $f(x) = \frac{x^2+2}{x-2}$ معرف على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ ولدينا

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \end{array}$$

وليس للتابع نهاية عند 2.

③ هنا $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ معرف على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ولدينا

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty & \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty \end{array}$$

وليس للتابع نهاية عند -1.

④ هنا $f(x) = \frac{5x+1}{x+1}$ معرف على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ولدينا

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5 \\ \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty & \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty \end{array}$$

وليس للتابع نهاية عند -1.

⑤ هنا $f(x) = \frac{x+2}{(x-2)^2}$ معرف على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ ولدينا

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⑥ هنا $f(x) = 3x - 5 + \frac{2}{x+2}$ معرف على $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ ولدينا

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = +\infty \end{array}$$

② جذُ نهاية التابع f المعين بالعلاقة $f(x) = \frac{5x-1}{(x-1)^2}$ عند 1، ثمَّ عَيِّن عدداً α يحقّق الشرط: إذا

كان x عنصراً من المجال $]1-\alpha, 1+\alpha[$ مختلفاً عن 1، كان $f(x) > 10^3$.

تجري مقارنة هذا النوع من التمارين كما يأتي: تقسم السبورة إلى قسمين: قسم يجري تحليل المسألة عليه، وقسم يجري فيه صياغة الحل.

المسودة أو التحليل. من الواضح استناداً إلى دراستنا أنّ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x-1}{(x-1)^2} = +\infty$ ، ونبحث عن قيم x القريبة من الواحد وغير الواحد التي تجعل $\frac{5x-1}{(x-1)^2} > 10^3$ ، كان الأمر أبسط لو كنا نبحث عن قيم x القريبة من الواحد وغير الواحد التي تجعل $\frac{A}{(x-1)^2} > 10^3$ ، حيث A عدد موجب لأننا عندها نعيد كتابة المتراجحة السابقة بالشكل المكافئ $\frac{A}{10^3} > (x-1)^2$ أي $\sqrt{A \times 10^{-3}} > |x-1|$ وعندها قيمة $\alpha = \sqrt{A \times 10^{-3}}$ كانت ستحقق المطلوب.

ولكنّ التابع الذي ندرسه ليس من الشكل $\frac{A}{(x-1)^2}$ ، إذ لدينا في البسط $5x-1$ بدلاً من A . وهنا نتذكّر أنّ $5x-1$ يقترب من العدد 4 عندما تقترب x من العدد واحد، وعليه إذا اخترنا A أي عدد أصغر تماماً من 4 كان $5x-1 > A$ في جوار العدد 1، (وتحديداً عندما $x > \frac{1+A}{5} = 1 - \frac{4-A}{5}$) وفي هذا الجوار يكون $\frac{5x-1}{(x-1)^2} > \frac{A}{(x-1)^2}$ ، يكفي عندئذ أنّ يحقق x الشرط $\sqrt{A \times 10^{-3}} > |x-1|$ ليكون لدينا $f(x) = \frac{5x-1}{(x-1)^2} > \frac{A}{(x-1)^2} > 10^3$.

مثلاً إذا اخترنا $A = 1.6$ كان لدينا في حالة $x > 0.52$ المتراجحة $\frac{5x-1}{(x-1)^2} > \frac{1.6}{(x-1)^2}$ ، ومن ثمّ إذا اخترنا x مختلفاً عن الواحد ليحقق أيضاً الشرط $|x-1| < \sqrt{1.6 \times 10^{-3}} = 0.04$ كان لدينا

$$f(x) = \frac{5x-1}{(x-1)^2} > \frac{1.6}{(x-1)^2} > 10^3$$

وهكذا نلاحظ أنّ الشرط $|x-1| < 0.04$ يقتضي أنّ $x > 1 - 0.04$ فالشرط الأول " $x > 0.52$ " محقق حكماً في هذه الحالة. إذن باختيار $\alpha = 0.04$ تكون المتراجحة $f(x) > 10^3$ محققة على المجال $1 - \alpha, 1 + \alpha[$ باستثناء الواحد. لننتقل إلى صياغة الحل:

التركيب أو الصياغة. من الواضح استناداً إلى دراستنا أنّ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x-1}{(x-1)^2} = +\infty$. لنختار $\alpha = 0.04$

عندئذ في حالة $x \neq 1$ من $1 - \alpha, 1 + \alpha[$ لدينا

$$(x-1)^2 < 16 \times 10^{-4} \quad \text{و} \quad 5x-1 > 5 \times 0.96 - 1 = 3.8 > 1.6$$

$$\cdot f(x) > \frac{1.6}{16 \times 10^{-4}} = 10^3 \quad \text{ومن ثمّ}$$

تَدْرِبْ ص 42

1 احسب نهايات التتابع الآتية عند $+\infty$ وعند $-\infty$ وعند النقاط a المعطاة، ويمكن عند الحاجة حساب النهاية من اليمين ومن اليسار عند a .

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2-4} \quad a = 2, -2 \quad \textcircled{2} \quad f(x) = \frac{2x^2}{(x-1)(2-x)} \quad a = 1, 2 \quad \textcircled{1}$$

$$f(x) = x + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x-2} \quad a = 1, 2 \quad \textcircled{4} \quad f(x) = x^2 - 2 + \frac{1}{(1-x)^2} \quad a = 1 \quad \textcircled{3}$$



1 هنا $f(x) = \frac{2x^2}{(x-1)(2-x)}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ ومنه

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -2 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= -2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= -\infty & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= +\infty & \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= -\infty \end{aligned}$$

2 هنا $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ ومنه

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= 0 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= -\infty & \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) &= -\infty & \lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) &= +\infty \end{aligned}$$

3 هنا $f(x) = x^2 - 2 + \frac{1}{(1-x)^2}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

4 هنا $f(x) = x + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x-2}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ ومنه

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= +\infty & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= +\infty & \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= -\infty \end{aligned}$$

② عيّن فيما يأتي مجموعة تعريف التابع f ، ثمّ ادرس في كل حالة نهاية f عند أطراف مجموعة تعريفه، وادرس، عند اللزوم، النهاية من اليمين والنهاية من اليسار.

$$f(x) = x^2 + \sqrt{x} - 1 \quad \textcircled{2} \quad f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}-1} \quad \textcircled{1}$$

$$f(x) = \frac{x+\sqrt{x}}{x+1} \quad \textcircled{4} \quad f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x} \quad \textcircled{3}$$

$$f(x) = \sqrt{x-1} - \sqrt{x} \quad \textcircled{6} \quad f(x) = \frac{x^2+x-\sqrt{x}}{x^2+1} \quad \textcircled{5}$$

الحل

① هنا $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x} + 1 + \frac{2}{\sqrt{x}-1}$ على مجموعة تعريفه $[0,1[\cup]1,+\infty[$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

② هنا $f(x) = x^2 + \sqrt{x} - 1$ على مجموعة تعريفه $[0,+\infty[$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$$

③ هنا $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x}$ على مجموعة تعريفه $]0,+\infty[$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

④ هنا $f(x) = \frac{x+\sqrt{x}}{x+1}$ على مجموعة تعريفه $[0,+\infty[$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

مثلاً لأنّ $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2+t}{t^2+1} = 1$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

⑤ هنا $f(x) = \frac{x^2+x-\sqrt{x}}{x^2+1}$ على مجموعة تعريفه $[0,+\infty[$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

مثلاً لأنّ $f(x) = \frac{1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x\sqrt{x}}}{1 + \frac{1}{x^2}}$ في حالة $x > 0$.

⑥ هنا $f(x) = \sqrt{x-1} - \sqrt{x} = \frac{-1}{\sqrt{x-1} + \sqrt{x}}$ على مجموعة تعريفه $[1,+\infty[$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$$

- 3 أوجد نهاية التابع f المعين بالعلاقة $f(x) = \frac{-2x+1}{x+3}$ عند $+\infty$ ، ثم أوجد عدداً A يحقق الشرط : إذا كان $x > A$ ، كان $f(x)$ في المجال $]-2.05, -1.95[$.

الحل

إذن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -2$. نختار $A = 137$. فإذا كان $x > A$ كان $x + 3 > 140$ ومن ثم

$$0 < f(x) + 2 = \frac{7}{x+3} < \frac{1}{20} = 0.05$$

أي $-2 < f(x) < -1.95$ أو $f(x) \in]-2.05, -1.95[$

أما كيف وجدنا A فقد ناقشنا كما في المثال المحلول صفحة 33 من الكتاب، أو تدرّب 2 صفحة 34.

- 4 أوجد نهاية التابع f المعين بالعلاقة $f(x) = \frac{x+3}{x-3}$ عند 5، ثم أوجد مجالاً I مركزه 5 يحقق الشرط إذا كان x ينتمي إلى المجال I ، كان $f(x)$ ينتمي إلى المجال $]3.95, 4.05[$.

الحل

هنا $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 4$. نختار مثلاً $5 + \frac{1}{100}, 5 - \frac{1}{100} \in x$ فيكون

$$2 - \frac{1}{100} < x - 3 < 2 + \frac{1}{100} \quad \text{و} \quad 8 - \frac{1}{100} < x + 3 < 8 + \frac{1}{100}$$

ومنه

$$\frac{8 - \frac{1}{100}}{2 + \frac{1}{100}} < f(x) = \frac{x+3}{x-3} < \frac{8 + \frac{1}{100}}{2 - \frac{1}{100}}$$

أو

$$3.95 < 4 - \frac{5}{201} < f(x) < 4 + \frac{5}{199} < 4.05$$

تدرّب صفحة 46

- 1 أجب عن الأسئلة الآتية:

1 f تابع يحقق $\frac{3x+7}{x-1} \leq f(x) \leq \frac{3x+\cos x}{x}$ ، أيّ كان $x > 1$ ما نهاية f عند $+\infty$ ؟

الحل لما كان $\frac{-1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}$ في حالة $x > 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x} = 0$ إذن

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+7}{x} = 3$ ولدينا من جهة أخرى $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+\cos x}{x} = 3$ إذن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$

② أثبت أن $\frac{-1}{x+1} \leq \frac{\cos x}{x+1} \leq \frac{1}{x+1}$ أيًا يكن $x > -1$. استنتج نهاية $f : x \mapsto \frac{\cos x}{x+1}$ عند $+\infty$. ثم ادرس بالمثل نهاية التابع ذاته عند $-\infty$.

البدل لدينا $-1 \leq \cos x \leq +1$ وفي حالة $x > -1$ يكون $x+1 > 0$ ومنه :

$$\frac{-1}{x+1} \leq \frac{\cos x}{x+1} \leq \frac{1}{x+1}$$

ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x+1} = 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$

وفي حالة $x < -1$ يكون $x+1 < 0$ ومنه : $\frac{-1}{x+1} \geq \frac{\cos x}{x+1} \geq \frac{1}{x+1}$ ولكن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x+1} = 0$

و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos x}{x+1} = 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x+1} = 0$

③ f تابع يحقق $|f(x) - 3| \leq \frac{1}{x+1}$ ، أيًا كان $x \geq 0$. ما نهاية f عند $+\infty$.

البدل لدينا $3 - \frac{1}{x+1} \leq f(x) \leq 3 + \frac{1}{x+1}$ أيًا كان $x \geq 0$ ، ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$ فيكون

حسب مبرهنة الإحاطة $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$

④ f تابع يحقق $f(x) \geq \frac{1}{4}x^2$ ، أيًا كان $x < 0$. ما نهاية f عند $-\infty$ ؟

البدل لدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{4}x^2 = +\infty$ فيكون حسب مبرهنة الإحاطة $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

⑤ أثبت أن $x^2 - 5 \sin x \geq x^2 - 5$ ، أيًا كان العدد الحقيقي x . استنتج من المتراجحة السابقة نهاية $x \mapsto x^2 - 5 \sin x$ عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

البدل لدينا $\sin x \leq 1$ إذن $x^2 - 5 \sin x \geq x^2 - 5$ ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 5) = +\infty$ إذن

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5 \sin x) = +\infty$ وبالمثل $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5) = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5 \sin x) = +\infty$

② ليكن f التابع المعرف على المجال $[0, +\infty[$ وفق $f(x) = \sqrt{1+x} - \sqrt{x}$

① تحقق أن $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}$ أيًا يكن $x \geq 0$

② استنتج أن $\frac{1}{2\sqrt{1+x}} \leq f(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}$ في حالة $x > 0$

③ ما نهاية f عند $+\infty$ ؟

البدل

$$f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{x+1-x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \quad ①$$

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} : \text{لما كان } \sqrt{x+1} > \sqrt{x} \text{ أيأ كان } x > 0 \text{ ②}$$

$$\cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \leq f(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{x}} : \text{ومنه}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ استنتجنا أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\sqrt{x}} = 0 \text{ لَمَا كان ③}$$

1 فيما يأتي، نُعطى تابعاً f معرفاً على مجموعة D ويُطلب حساب نهاية f عند a .

$$D =]5, +\infty[, \quad f(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-5}}, \quad a = 5 \quad \textcircled{1}$$

$$D = \left] -\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right], \quad f(x) = \sqrt{-x^3 + x^2 + x}, \quad a = -\infty \quad \textcircled{2}$$

$$D = \left] -\infty, 1 \right[, \quad f(x) = \sqrt{\frac{-x+1}{x^2+1}}, \quad a = -\infty \quad \textcircled{3}$$

$$D = \left] -1, +1 \right[, \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad a = 1 \quad \textcircled{4}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad f(x) = \cos \pi x + \frac{1}{(x-1)^2}, \quad a = 1 \quad \textcircled{5}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}, \quad f(x) = \cos \left(\frac{\pi x + 1}{x + 2} \right), \quad a = +\infty \quad \textcircled{6}$$

$$D = \left] -\infty, 1 \right[, \quad f(x) = \sqrt{\frac{2x^2}{1-x}}, \quad a = 1, -\infty \quad \textcircled{7}$$

$$D = \left] 0, +\infty \right[, \quad f(x) = \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right), \quad a = +\infty \quad \textcircled{8}$$

$$D = \left] 0, +\infty \right[, \quad f(x) = \left(x - \sqrt{x} + \frac{1}{x} \right)^2, \quad a = +\infty \quad \textcircled{9}$$

$$D = \left] -\infty, -1 \right[\cup \left] 1, +\infty \right[, \quad f(x) = \cos^2 \left(\pi \times \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \right), \quad a = +\infty \quad \textcircled{10}$$

الحل

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{\frac{x+3}{x-5}} = +\infty \quad \text{إذن} \quad \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x+3}{x-5} = +\infty \quad \text{هنا} \quad \textcircled{1}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x^3 + x^2 + x} = +\infty \quad \text{إذن} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x^2 + x) = +\infty \quad \text{هنا} \quad \textcircled{2}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{-x+1}{x^2+1}} = 0 \quad \text{إذن} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x+1}{x^2+1} = 0 \quad \text{هنا} \quad \textcircled{3}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = +\infty \quad \text{إذن} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = +\infty \quad \text{هنا} \quad \textcircled{4}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 1} \left(\cos \pi x + \frac{1}{(x-1)^2} \right) = +\infty \quad \textcircled{5}$$

⑥ هنا $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi x + 1}{x + 2} = \pi$ إذن $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{\pi x + 1}{x + 2}\right) = \cos \pi = -1$

⑦ هنا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{1 - x} = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{2x^2}{1 - x}} = +\infty$

وكذلك $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x^2}{1 - x} = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{\frac{2x^2}{1 - x}} = +\infty$

⑧ هنا $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = \sin 0 = 0$

⑨ هنا $x - \sqrt{x} + \frac{1}{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) + \frac{1}{x}$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \sqrt{x} + \frac{1}{x}\right) = +\infty$ ومنه نستنتج أنّ

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \sqrt{x} + \frac{1}{x}\right)^2 = +\infty$

⑩ هنا $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = 1$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos^2\left(\pi \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right) = \cos^2 \pi = 1$

② ليكن f التابع المعرف على المجال $]-5, +\infty[$ وفق $f(x) = \frac{x-3}{x+5}$

① احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، واستنتج $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x))$

② أعدّ حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x))$ بعد كتابة $f(f(x))$ بدلالة x .

الحل

① $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ إذن $f(1) = -\frac{1}{3}$

② نجد بحساب بسيط أنّ

$$f(f(x)) = f\left(\frac{x-3}{x+5}\right) = \frac{\frac{x-3}{x+5} - 3}{\frac{x-3}{x+5} + 5} = -\frac{x+9}{3x+11}$$

ومنه نجد مجدداً أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = \frac{-1}{3}$

1 فيما يأتي بين معللاً إجابتك إذا كان المستقيم Δ مقارباً مائلاً للخط البياني C_f للتابع f ، عند $+\infty$ أو عند $-\infty$. ادرس بعدئذ الوضع النسبي للخط C_f و مقاربه Δ .

$$f(x) = 2x + 3 + \frac{10}{x+1}, \quad \Delta : y = 2x + 3 \quad \textcircled{1}$$

$$f(x) = -x + 1 - \frac{1}{x^2}, \quad \Delta : y = -x + 1 \quad \textcircled{2}$$

$$f(x) = x + \frac{\sin x}{x}, \quad \Delta : y = x \quad \textcircled{3}$$

$$f(x) = 3x + 7 - \frac{5}{\sqrt{|x|}}, \quad \Delta : y = 3x + 7 \quad \textcircled{4}$$

$$f(x) = \frac{2x^2 - 7x - 3}{x - 4}, \quad \Delta : y = 2x + 1 \quad \textcircled{5}$$

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x - 5}{(x+1)^2}, \quad \Delta : y = x - 2 \quad \textcircled{6}$$

$$f(x) = \frac{-x^2 - 4x + \sin x}{x}, \quad \Delta : y = -x - 4 \quad \textcircled{7}$$

$$f(x) = \frac{x^2 + \frac{5}{2}x + \sqrt{x} + 1}{2x + 1}, \quad \Delta : y = \frac{1}{2}x + 1 \quad \textcircled{8}$$

الحل

1 لنضع $g(x) = f(x) - (2x + 3) = \frac{10}{x+1}$. نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.

يتّضح فوراً أنّ Δ مستقيم مقارب للخط البياني C_f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ، وأنّ

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g(x)$	$-$	$ $	$+$
C_f	تحت Δ	$ $	فوق Δ

2 لنضع $g(x) = f(x) - (-x + 1) = -\frac{1}{x^2}$. نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.

يتّضح فوراً أنّ Δ مستقيم مقارب للخط البياني C_f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ، وأنّ $g(x) < 0$ أيّاً كانت $x \neq 0$. فالخط البياني C_f يقع دوماً تحت Δ .

3 لنضع $g(x) = f(x) - x = \frac{\sin x}{x}$. نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$. فيتّضح فوراً

أنّ Δ مستقيم مقارب للخط البياني C_f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

تتفق إشارة التابع g مع إشارة \sin على $]0, +\infty[$ وتعاكس إشارة \sin على $]-\infty, 0[$. وتحديداً:
في حالة عدد طبيعي k لدينا

x	$2\pi k$	$(2k+1)\pi$	$(2k+2)\pi$
$g(x)$	0	+	0
C_f		فوق Δ	تحت Δ

وفي حالة عدد صحيح سالب تماماً k لدينا

x	$2k\pi$	$(2k+1)\pi$	$(2k+2)\pi$
$g(x)$	0	-	0
C_f		تحت Δ	فوق Δ

ويتقاطع C_f عند النقاط $(k\pi, k\pi)$ حيث k عدد صحيح غير معدوم.

④ لنضع $g(x) = f(x) - (3x + 7) = -\frac{5}{\sqrt{|x|}}$. نلاحظ أن $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.
فيتضح فوراً أن Δ مستقيم مقارب للخط البياني C_f عند $+\infty$ وعند $-\infty$. وأن $g(x) < 0$ أيماً كانت $x \neq 0$. فالخط البياني C_f يقع دوماً تحت Δ .

⑤ لنضع $g(x) = f(x) - (2x + 1) = \frac{1}{x - 4}$. نلاحظ أن $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.
يتضح فوراً أن Δ مستقيم مقارب للخط البياني C_f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ، وأن

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$g(x)$		-	+
C_f		تحت Δ	فوق Δ

⑥ لنضع $g(x) = f(x) - (x - 2) = \frac{-3}{(x + 1)^2}$. نلاحظ أن $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.
فيتضح فوراً أن Δ مستقيم مقارب للخط البياني C_f عند $+\infty$ وعند $-\infty$. وأن $g(x) < 0$ أيماً كانت $x \neq -1$. فالخط البياني C_f يقع دوماً تحت Δ .

⑦ مشابه للتمرين ③.

⑧ لنضع $g(x) = f(x) - (\frac{1}{2}x + 1) = \frac{\sqrt{x}}{2x + 1}$. نلاحظ أن $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$. فيتضح فوراً أن Δ مستقيم مقارب للخط البياني C_f عند $+\infty$. وأن $g(x) > 0$ أيماً كانت $x > 0$. فالخط البياني C_f يقع دوماً فوق Δ . ويتقاطع معه عند $(0, 0)$.


تَدْرِبْ صفحة 54 

- 1 نتأمل التابع f المعطى وفق $f(x) = \sqrt{1 - \cos x}$.
 - ① ما مجموعة تعريف f ؟
 - ② أياكون f مستمراً على مجموعة تعريفه؟
 - ③ بيّن أنّ التابع f زوجي ويقبل العدد 2π دوراً له.
 - ④ ليكن g مقصور التابع f على المجال $[0, \pi]$. أثبت أنّ g اشتقاقي وارسم خطه البياني.
 - ⑤ استنتج الخط البياني للتابع f على المجال $[-2\pi, 2\pi]$. ما مجموعة تعريف f' ؟

الحل


- ① لما كان $1 - \cos x \geq 0$ أيّاً كانت قيمة x استنتجنا أنّ f معرّف على $D_f = \mathbb{R}$.
- ② التابع f مستمرٌّ على \mathbb{R} نظراً إلى استمرار كلٍّ من التابع $x \mapsto 1 - \cos x$ و $x \mapsto \sqrt{x}$.
- ③ مجموعة التعريف متناظرة بالنسبة إلى 0 فهي كامل \mathbb{R} وتابع التجيب زوجي إذن

$$f(-x) = \sqrt{1 - \cos(-x)} = \sqrt{1 - \cos x} = f(x)$$
 فالتابع f زوجي. وكذلك فإنّ تابع التجيب دوري ويقبل العدد 2π دوراً إذن $f(x + 2\pi) = f(x)$ ، فالتابع f أيضاً دوري ويقبل العدد 2π دوراً.
- ④ في حالة x من $[0, \pi]$ لدينا $\sin(\frac{x}{2}) \geq 0$ ولأنّ $1 - \cos x = 2 \sin^2(\frac{x}{2})$ استنتجنا أنّ



إذن يتفق g أيضاً مع مقصور التابع الاشتقاقي $x \mapsto \sqrt{2} \sin(\frac{x}{2})$ على المجال $[0, \pi]$. فهو إذن اشتقاقي على هذا المجال، ورسمه بسيط.

- ⑤ التابع f زوجي إذن من رسم g يمكن أن نستنتج رسم C_f على $[-\pi, \pi]$ وهذا مجال طوله دور للتابع f ، ويتكرر هذا الرسم نحصل على رسم C_f على أي مجال من \mathbb{R} :



ونستنتج من الرسم أنّ f' غير معرّف عند 0 ومن ثمّ عند أيّ $x_0 = 2\pi k$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ لأنّ f دوري ويقبل العدد 2π دوراً.

تَدْرِبْ صَفحة 61

- 1 التابع f معرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x^3 - x^2 + x - 2$. علّل لماذا يكون للمعادلة $f(x) = 0$ حلٌ وحيد في المجال $]1,2[$ ؟

الجل

- التابع f مستمرّ على المجال $[1,2]$ ، ولدينا $f(1) = -1$ و $f(2) = 4$ ، فالتابع f يغيّر إشارته على المجال $[1,2]$ فيوجد حلٌّ واحدٌ على الأقلّ للمعادلة $f(x) = 0$ في المجال $]1,2[$.
 - ولإثبات وحدانيّة الحلّ يكفي إثبات أنّ f مطّرد تماماً على هذا المجال. ولكن
- $$f'(x) = 3x^2 - 2x + 1 = 2x^2 + (x - 1)^2 > 0$$
- إذن f متزايدٌ تماماً والحل الذي وجدناه للمعادلة $f(x) = 0$ في المجال $]1,2[$ وحيد.

- 2 التابع f معرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. علّل لماذا يكون للمعادلة $f(x) + 1 = 0$ ثلاثة فقط ثلاثة حلول حقيقية؟

الجل

- لندرس تغيرات التابع الحدودي f . من الواضح أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ، وكذلك فإنّ $f'(x) = 3x(x - 2)$ ، إذن يمكننا وضع جدول التغيرات الآتي للتابع f :


x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 1$	$\searrow -3$	$\nearrow +\infty$

إذن

- f متزايدٌ تماماً على $] -\infty, 0[$ و $] -\infty, 1[$. ولأنّ $-1 < 1$ استنتجنا أنّ للمعادلة $f(x) = -1$ حلاً وحلاً واحداً فقط x_1 ينتمي إلى $] -\infty, 0[$.
 - f متناقصٌ تماماً على $[0, 2]$ و $[-3, 1]$. ولأنّ $-1 \in [-3, 1]$ استنتجنا أنّ للمعادلة $f(x) = -1$ حلاً وحلاً واحداً فقط x_2 ينتمي إلى $[0, 2]$.
 - f متزايدٌ تماماً على $]2, +\infty[$ و $] -3, +\infty[$. ولأنّ $-1 > -3$ استنتجنا أنّ للمعادلة $f(x) = -1$ حلاً وحلاً واحداً فقط x_3 ينتمي إلى $]2, +\infty[$.
- نستنتج أنّ مجموعة حلول المعادلة $f(x) + 1 = 0$ هي $\{x_1, x_2, x_3\}$ ، وهي النتيجة المطلوبة.

- 3 ليكن f التابع المعرف على المجال $I = [-3, 2]$ وفق $f(x) = x^2 + 1$.

- ارسم خطه البياني C_f . واحسب $f(I)$.
- ما عدد حلول المعادلة $f(x) = 4$ في المجال I ؟



الحل


① f مستمرٌ ومتناقصٌ تماماً على المجال $[-3, 0]$ إذن $f([-3, 0]) = [1, 10]$ وكذلك f مستمرٌ ومتزايدٌ تماماً على المجال $[0, 2]$ إذن $f([0, 2]) = [1, 5]$ نستنتج أنّ $f(I) = [1, 10]$ ، كما هو مبين في الرسم المجاور.

② استناداً إلى الرسم نرى أنّ للمعادلة $f(x) = 4$ حلّين في I . أحدهما في المجال $]-3, 0[$ والآخر في المجال $]0, 2[$. يمكننا التوثق من ذلك بحل المعادلة مباشرة، فهي معادلة من الدرجة الثانية.

④ ليكن f التابع المعرف على المجال $I = [2, 3]$ وفق $f(x) = \frac{1}{x-1}$.

① ارسم خطه البياني C_f . واحسب $f(I)$.

② ما عدد حلول المعادلة $f(x) = \frac{3}{4}$ في المجال I ؟



الحل

① التابع المدروس مستمرٌ ومتناقصٌ تماماً على $[2, 3]$ إذن

$$f([2, 3]) = [f(3), f(2)] = \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

② لمّا كان $\frac{3}{4}$ عنصراً من $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ استنتجنا أنّ للمعادلة $f(x) = \frac{3}{4}$ حلّاً وحيداً في المجال $[2, 3]$.

تذكّر: الاستمرار يقتضي وجود الحل، والاطراد التام يقتضي وحدانيته.

⑤ ليكن f التابع المعرف على المجال \mathbb{R} وفق $f(x) = 4x^3 - 3x - \frac{1}{2}$.

① احسب $f(-1)$ و $f(-\frac{1}{2})$ و $f(0)$ و $f(1)$.

② استنتج أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل ثلاثة حلول في المجال $[-1, 1]$.

x	-1	$-\frac{1}{2}$	0	1
$f(x)$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

الحل

① نلاحظ بحساب بسيط أنّ :

② التابع f مستمرٌ، لأنّه كثير حدود من الدرجة الثالثة، فله في \mathbb{R} ثلاثة جذور مختلفة على الأكثر.

ولكن لأنّ $f(-1)f(-\frac{1}{2}) < 0$ استنتجنا وجود حلّ x_1 للمعادلة $f(x) = 0$ ينتمي إلى $]-1, -\frac{1}{2}[$. ولأنّ

$f(-\frac{1}{2})f(0) < 0$ استنتجنا وجود حلّ x_2 للمعادلة $f(x) = 0$ ينتمي إلى $]-\frac{1}{2}, 0[$. وأخيراً لأنّ

$f(0)f(1) < 0$ استنتجنا وجود حلّ x_3 للمعادلة $f(x) = 0$ ينتمي إلى $]0, 1[$.

فلهذه المعادلة إذن ثلاثة حلول في المجال $[-1, 1]$. **ملاحظة.** يكون $\cos \theta$ حلّاً للمعادلة $f(x) = 0$ إذا

و فقط إذا كان $\cos 3\theta = \frac{1}{2}$. ومنه نحسب $x_1 = -\cos(\frac{2\pi}{9})$ و $x_2 = -\sin(\frac{\pi}{18})$ و $x_3 = \cos(\frac{\pi}{9})$.

6 ليكن f التابع المعرف على المجال \mathbb{R} وفق $f(x) = 1 + 3x - x^3$

- ① ادرس نهاية f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
- ② احسب $f'(x)$ وادرس إشارته، ثم نظم جدولاً بتغيرات f .
- ③ أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل ثلاثة جذور فقط، ينتمي كل واحد منها إلى واحد من المجالات: $[-2, -1]$ ، و $[-1, 1]$ و $[1, 2]$.

الحل

- ① $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
- ② لدينا $f'(x) = -3x^2 + 3 = 3(1-x)(1+x)$ ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$	$-$
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	-1	\nearrow
			3	\searrow
				$-\infty$

- ③ f مستمرٌ ومتناقص تماماً على $]-\infty, -1[$ ويحقق $f(]-\infty, -1[) =]-1, +\infty[$ ولأن $0 > -1$ استنتجنا وجود حلٍّ وحيد x_1 للمعادلة $f(x) = 0$ في المجال $]-\infty, -1[$. وأخيراً بملاحظة أن $f(-2) = 3$ و $f(-1) = -1$ نستنتج أن $x_1 \in]-2, -1[$.
- وكذلك f مستمرٌ ومتزايدٌ تماماً على $]-1, 1[$ ويحقق $f(]-1, 1[) =]-1, 3[$ ولأن $-1 < 0 < 3$ استنتجنا وجود حلٍّ وحيد x_2 للمعادلة $f(x) = 0$ في المجال $]-1, 1[$.
- وأخيراً f مستمرٌ ومتناقص تماماً على $]1, +\infty[$ ويحقق $f(]1, +\infty[) =]-\infty, 3[$ ولأن $0 < 3$ استنتجنا وجود حلٍّ وحيد x_3 للمعادلة $f(x) = 0$ في المجال $]1, +\infty[$. وأخيراً بملاحظة أن $f(2) = -1$ و $f(1) = 3$ نستنتج أن $x_3 \in]1, 2[$ وبذا يكتما إثبات المطلوب.

7 نتأمل التابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x - \cos x$

- ① احسب $f(0)$ ، و $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ واستنتج أنه يوجد عدد حقيقي α يحقق $f(\alpha) = 0$.
- ② اشرح لماذا كل حلٍّ للمعادلة $f(x) = 0$ يجب أن ينتمي إلى المجال $]-1, 1[$.
- ③ استنتج أن كل حلٍّ للمعادلة $f(x) = 0$ يجب أن ينتمي إلى المجال $]0, 1[$.
- ④ برهن أن التابع $x \mapsto x - \cos x$ متزايدٌ تماماً على المجال $]0, 1[$ ، واستنتج أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلٌّ حقيقي وحيد α ينتمي إلى $]0, 1[$.

الحل

- ① لدينا $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} > 0$ و $f(0) = -1 < 0$ ، ولأن التابع f مستمر، استنتجنا، استناداً إلى مبرهنة القيمة الوسطى أنه يوجد عدد حقيقي α يحقق $f(\alpha) = 0$ وأن $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.
- ② ليكن x حلاً للمعادلة $f(x) = 0$ عندئذٍ $x - \cos x = 0$ أي $x = \cos x \in [-1, 1]$.

③ إذا كان $x \in [-1, 0]$ كان $\cos x > 0$ ومن ثمّ $f(x) = x - \cos x < 0$ إذن ليس للمعادلة $f(x) = 0$ حل في المجال $[-1, 0]$ إذن يجب أن ينتمي كلّ حل للمعادلة $f(x) = 0$ إلى المجال $]0, 1[$ ، ولما كان $f(1) \neq 0$ استنتجنا أنّ كلّ حل لهذه المعادلة يجب أن ينتمي إلى المجال $]0, 1[$.

④ إنّ التابع f هو مجموع التابعين المتزايدين تماماً على $]0, 1[$ هما $x \mapsto x$ و $x \mapsto -\cos x$ فهو متزايد تماماً على المجال ذاته، وبالتالي فهو يندم مرة واحدة على الأكثر على هذا المجال إذن للمعادلة $f(x) = 0$ حلّ وحيد على الأكثر في المجال $]0, 1[$. ولما كان $f(\alpha) = 0$ استنتجنا أنّ α هو الحل الوحيد لهذه المعادلة.

أنشطة

نشاط 1 البحث عن مقاربات مائلة

1 أمثلة

1. f هو التابع المعرّف على $]0, +\infty[$ وفق $f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{x}$.

① لماذا يمكن تأكيد أنّ المستقيم Δ الذي معادلته $y = x - \frac{1}{2}$ مقارباً للخط C_f في جوار $+\infty$ ؟

② بيّن الوضع النسبي للخطين Δ و C_f .

2. f هو التابع المعرّف على $]0, +\infty[$ وفق $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x + 3}$.

بإعطاء x قيمةً كبيرة، تكون قيم $f(x)$ قريبة من $2x$ من $\frac{2x^2}{x}$. فيمكن إذن أن يكون مستقيماً معادلته

من النمط $y = 2x + b$ مقارباً للخط البياني C_f . سنسعى إذن إلى كتابة $f(x)$ بالصيغة:

$$f(x) = 2x + b + \frac{c}{x + 3}$$

① عين عددين b و c يحققان $f(x) = 2x + b + \frac{c}{x + 3}$ ، أيّاً كان $x \geq 0$.

② استنتج أنّ C_f يقبل مقارباً مائلاً Δ ، وبيّن وضعه بالنسبة إلى C_f .

② الحالة العامة. نتأمل تابعاً f تابعاً يحقق $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

1. Δ مستقيم في معلم معطى، معادلته $y = ax + b$ ($a \neq 0$). نفترض أنّ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

أثبت أنّ $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ و $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$

مساعدة: اكتب $f(x) = ax + b + (f(x) - (ax + b))$

2. وبالعكس، أثبت أنه إذا كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ و $a \neq 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b$ (b عدد حقيقي) كان المستقيم الذي معادلته $y = ax + b$ مقارباً للخط C_f .

3 تطبيق

ليكن f التابع المعرّف على $[0, +\infty[$ وفق $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$. بالاستفادة من 2، أثبت أنّ C_f يقبل مقارباً مائلاً في جوار $+\infty$.

ملاحظة. يُبحث عن المقارب المائل في جوار $-\infty$ بطريقة مماثلة لما هو في جوار $+\infty$.

الحل

1 أمثلة

1. هنا $f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{x}$ على $]0, +\infty[$.

① إن Δ مقارب مائل للخط C_f عند $+\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - \frac{1}{2})) = 0$.

② إشارة الفرق $g(x) = f(x) - (x - \frac{1}{2}) = \frac{1}{x}$ تحدّد الموقع النسبي للخط C_f بالنسبة إلى Δ ، إذ نجده دوماً فوق Δ .

2. هنا $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x + 3}$ على $]0, +\infty[$.

① نفترض وجود b و c بحيث $f(x) = 2x + b + \frac{c}{x + 3}$ أيّاً كانت $x \geq 0$. على الخصوص باختيار $x = 0$ ثم $x = 1$ نجد $\frac{1}{3} = b + \frac{c}{3}$ و $\frac{3}{4} = 2 + b + \frac{c}{4}$. بطرح المساويتين طرفاً من طرف نجد $c = 19$ ثم بالتعويض في الأولى نجد $b = -6$. الآن نتحقّق أنّ $(b, c) = (-6, 19)$ حلٌّ مناسب فنحسب في حالة $x \geq 0$:

$$2x - 6 + \frac{19}{x + 3} = \frac{2x^2 + 1}{x + 3} = f(x)$$

إذن $(b, c) = (-6, 19)$ هو الحل المطلوب.

② لنتأمّل الفرق $g(x) = f(x) - (2x - 6) = \frac{19}{x + 3}$ فنلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ ، إذن يتّضح أنّ

المستقيم Δ الذي معادلته $y = 2x - 6$ مستقيم مقارب مائل للخط C_f في جوار $+\infty$. ولأنّ $g(x) > 0$ عندما $x \geq 0$ فإنّ C_f يقع فوق المقارب Δ .

2 الحالة العامة.

1. في حالة $x > 0$ لدينا

$$\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{f(x) - (ax + b)}{x}$$

ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - (ax + b)}{x} = 0$ وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b}{x} = 0$

إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ ، إذن يمكننا تعيين a بحساب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

وبعدئذ يكون $f(x) - ax = b + (f(x) - (ax + b))$ ، ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ إذن

، $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b$ ، إذن يمكننا تعيين b بحساب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$.

2. لنفترض وجود النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ التي تعين a ، ووجود النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b$ التي تعين b .

عندئذ نستنتج من ذلك أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ وهذا يعني أنّ المستقيم

Δ الذي معادلته $y = ax + b$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f في جوار $+\infty$.

3 تطبيق

3. لما كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ ، و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0$ ، استنتجنا أنّ

المستقيم Δ الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f في جوار $+\infty$.

نشاط 1 نهايات جدية بالاهتمام

1 عموميات


ليكن التابع f المعرّف على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ بالصيغة $f(h) = \frac{\sin h}{h}$. في الجدول الآتي نجد بعض

الأعداد القريبة من العدد 0 وقيم التابع f المقابلة لها.

h	$\pm 2^0$	$\pm 2^{-1}$	$\pm 2^{-2}$	$\pm 2^{-3}$	$\pm 2^{-4}$	$\pm 2^{-5}$	$\pm 2^{-6}$	$\dots \rightarrow 0$
$f(h)$	0.84147	0.95885	0.98962	0.99740	0.99935	0.99948	0.99996	$\dots \rightarrow 1$


نلاحظ من الجدول أنّه عندما تقترب قيمة h من العدد 0 تقترب قيمة $f(h)$ من العدد 1 وذلك مع كون

التابع f غير معرف عند $h = 0$. ويوضّح ذلك الشكل الآتي.



إذن من الطبيعي القول إنّ التابع f يسعى إلى العدد 1 عند الصفر: $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = 1$.

2 حالة h من المجال $]0, \frac{\pi}{2}[$



لتكن C الدائرة المثلثائية التي مركزها O . ولتكن M تلك النقطة من C بحيث يكون h التعيين الأساسي بالراديان للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$. h هو أيضاً قياس الزاوية الهندسية \widehat{AOM} بالراديان. وفق هذه الشروط ومع الأخذ بدلالات الشكل المرافق، نعلم أن $OA = 1$ و $OM' = \cosh h$ و $MM' = \sinh h$ و طول القوس \widehat{AM} يساوي h .

- (*) مساحة المثلث $OAM \geq$ مساحة القطاع الدائري $OAM \geq$ مساحة المثلث OAT
1. لماذا مساحة القطاع الدائري OAM تساوي $\frac{h}{2}$ ؟
 2. لماذا مساحة المثلث OAM تساوي $\frac{1}{2} \sinh h$ ؟
 3. لماذا مساحة المثلث OAT تساوي $\frac{1}{2} \times \frac{\sin h}{\cos h}$ ؟
 4. استنتج من (*) أن $\sin h \leq h \leq \frac{\sin h}{\cos h}$.
 5. استنتج أن $1 \leq \frac{\sin h}{h} \leq \cos h$ أي أن h من $]0, \frac{\pi}{2}[$.

3 حالة h من المجال $]-\frac{\pi}{2}, 0[$

- نضع $h' = -h$ ، فيكون $h' > 0$ و $\frac{\pi}{2} > h' > 0$ واستناداً إلى الدراسة السابقة $\cos h' \leq \frac{\sin h'}{h'} \leq 1$.
1. استنتج أنه أيما كان h و $h \neq 0$ من المجال $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ، كان $\cos h \leq \frac{\sin h}{h} \leq 1$.
 2. نهاية التابع المألوف $x \mapsto \cos x$ عند الصفر تساوي 1. استنتج أن $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$.

4 النهاية الثانية المتعلقة بتابع جيب التمام

يقودنا البحث عن نهاية $\frac{\cos h - 1}{h^2}$ عند الصفر، بحساب نهاية البسط ونهاية المقام، إلى حالة عدم

تعيين، لأن نهاية كل من البسط والمقام تساوي الصفر عند $h = 0$.

1. بملاحظة أن $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$ ، أثبت أن

$$\frac{\cos h - 1}{h^2} = -\frac{2 \sin^2(h/2)}{4 \times (h/2)^2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\sin(h/2)}{(h/2)} \right)^2$$

2. استنتج أن $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h^2} = -\frac{1}{2}$.

5 تطبيق : لتأمل التابع المعرف في $D = [-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ بالصيغة : $f(x) = \frac{\cos(3x) - \cos x}{x \sin x}$

استعمل أسلوب الفقرة 4 ونتائج هذا النشاط لتحسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

2 1. مساحة القطاع الدائري $\frac{1}{2}r^2h$ حيث r هو نصف قطر الدائرة ويساوي 1 في حالتنا.

2. مساحة المثلث OAM تساوي $\frac{1}{2}OA \cdot MM' = \frac{1}{2} \times 1 \times \sin h$

3. مساحة المثلث OAT تساوي $\frac{1}{2}OA \cdot AT = \frac{1}{2} \times 1 \times \tan h$

4. نستنتج $\sin h \leq h \leq \frac{\sin h}{\cos h}$ من (*) دون عناء.

5. نستنتج من $\sin h \leq h$ ومن كون $h > 0$ أنّ $\frac{\sin h}{h} \leq 1$ ومن $h \leq \frac{\sin h}{\cos h}$ بضرب طرفيها

بالمقدار الموجب $\frac{\cos h}{h}$ أنّ $\cos h \leq \frac{\sin h}{h}$ إذن $\cos h \leq \frac{\sin h}{h} \leq 1$

3 1. بتطبيق ما سبق على $h' = -h$ نجد $\cos(-h) \leq \frac{\sin(-h)}{-h} \leq 1$ أو $\cos h \leq \frac{\sin h}{h} \leq 1$. إذن

في الحالتين تبقى المتراجحة نفسها صحيحة، أي $\cos h \leq \frac{\sin h}{h} \leq 1$ في حالة $h \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\setminus\{0\}$

2. وبالاستفادة من مبرهنة الإحاطة ومن كون $\lim_{h \rightarrow 0} \cos h = \cos 0 = 1$ نجد $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$

4 تطبيق مباشر لما سبق: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h^2} = -\frac{1}{2}$

5 هنا نعلم أنّ $\cos 3x = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x$ ومنه

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(\cos 2x - 1) \cos x - \sin 2x}{x \sin x} = \cos x \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{\cos 2x - 1}{x^2} - 2 \frac{\sin 2x}{2x} \\ &= 4 \cos x \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{\cos 2x - 1}{(2x)^2} - 2 \frac{\sin 2x}{2x} \end{aligned}$$

إذن

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4 \times 1 \times 1 \times \left(\frac{-1}{2} \right) - 2 \times 1 = -4$$

مُرسِنات ومساائل

1 ادرس في كل حالة نهاية التابع f عند أطراف مجموعة تعريفه، وعند اللزوم ادرس النهاية من اليمين ومن اليسار.

$$f(x) = 2 - \frac{4}{x^2} \quad ② \quad f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} \quad ①$$

$$f(x) = x + \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x+2} \quad ④ \quad f(x) = x^2 + 3x - \frac{1}{x+3} \quad ③$$

$$f(x) = \cos x + \frac{1}{x} \quad ⑥ \quad f(x) = (2x - 3)(5 - \sqrt{x}) \quad ⑤$$

$$f(x) = x^2 + 2x - \frac{1}{x} \quad ⑧ \quad f(x) = 2x + \sin x \quad ⑦$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x \quad ⑩ \quad f(x) = x - 2\sqrt{x} + 3 \quad ⑨$$

الجل

- ① التابع معرف على \mathbb{R} ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 - ② التابع معرف على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$.
 - ③ التابع معرف على $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ وكذلك فإن

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^-} f(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x) = -\infty$$
 - ④ التابع معرف على $\mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$ ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ وكذلك فإن

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$$
 - ⑤ التابع معرف على $[0, +\infty[$ ولدينا $f(0) = -15$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
 - ⑥ التابع معرف على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. ليس للتابع نهاية عند $+\infty$ لأنه لو افترضنا وجود نهاية l لهذا التابع عند $+\infty$ استنتجنا من كون $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ أنّ للتابع $x \mapsto \cos x$ نهاية l أيضاً عند اللانهاية، وكان من ثمّ للتابع $x \mapsto \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$ نهاية عند اللانهاية، وهذا يناقض ما أثبتناه في الدرس أن ليس للتابع \sin نهاية عند اللانهاية. هذا التناقض يثبت أن ليس للتابع f نهاية عند $+\infty$.
- وبالمثل، لو كان للتابع f نهاية L عند $-\infty$ استنتجنا من المساواة $f(x) = f(-x) + \frac{2}{x}$ أنه عندئذ سيعي f أيضاً إلى L عند $+\infty$ وهذا يناقض ما أثبتناه أعلاه. إذن ليس للتابع f نهاية عند $-\infty$.

وأخيراً

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

⑦ التابع معرف على \mathbb{R} ولدنيا، أيًا كانت x ، ما يأتي $f(x) \geq 2x - 1$ و $f(x) \leq 2x + 1$.

$$\text{ولمّا كان } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty \text{ استنتجنا أنّ } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{وكذلك لأنّ } \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 1) = -\infty \text{ استنتجنا أنّ } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

⑧ التابع معرف على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ولدنيا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ وكذلك فإنّ

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

⑨ التابع معرف على $[0, +\infty[$ ولدنيا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$ ويكتابة $f(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) + 3$ استنتجنا

$$\text{من كون } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \text{ أنّ } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

⑩ التابع معرف على \mathbb{R} ، و $f(x) \geq x$ أيًا كانت x إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$.

$$\text{ومن جهة أخرى في حالة } x < 0 \text{ لدينا } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}-x} \text{ إذن } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

ملاحظة. تنمة للسؤال ⑥ لدينا الخاصة الآتية: إذا كان $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تابعاً دورياً وغير ثابت فعندئذ لا

يكون للتابع g نهاية عند $+\infty$. لنفترض على سبيل الجدال أنّ $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \ell$ ، وليكن $T > 0$ دوراً

للتابع g ، ثم لتأمل عدداً a من \mathbb{R} . عندئذ نستنتج من $\lim_{u \rightarrow \infty} (a + E(u)T) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \ell$

أنّ $\lim_{u \rightarrow \infty} g(a + E(u)T) = \ell$ ولكن $g(a) = g(a + E(u)T)$ أيًا كانت قيمة u إذن $g(a) = \ell$. ولأنّ a

عدد كفي استنتجنا أنّ g ثابت بما يناقض افتراضنا. إذن ليس للتابع g نهاية عند $+\infty$. وبتطبيق ما

سبق على التابع $x \mapsto g(-x)$ نستنتج أن ليس للتابع g نهاية عند $-\infty$ أيضاً.

② أوجد نهاية التابع f المعين بالعلاقة $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ عند 1 وعند $-\infty$ وعند $+\infty$ ، ثمّ أوجد

معادلات المستقيمات المقاربة لخطه البياني وبيّن وضع الخط البياني بالنسبة إلى مقارباته الأفقية.

الحل

▪ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ ، فالمستقيم Δ الذي معادلته $x = 1$ مستقيم مقارب.

▪ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ ، فالمستقيم d الذي معادلته $y = 2$ مستقيم مقارب في جوار

كل من $+\infty$ و $-\infty$. وكذلك فإن $f(x) - 2 = \frac{3}{x-1}$ ، إذن، يقع C_f فوق d على $[1, +\infty[$ وتحتة

على $]-\infty, 1[$.

3 أوجد نهاية التابع f المعين بالعلاقة $f(x) = \frac{-2x}{x+1}$ عند $-\infty$ وعند $+\infty$ وعند -1 . ثم أوجد معادلات المستقيمات المقاربة لخطه البياني وبيّن وضع الخط البياني بالنسبة إلى مقارباته الأفقية.

الحل

■ $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$ ، فالمستقيم Δ الذي معادلته $x = -1$ مقارب.
 ■ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$ ، فالمستقيم d الذي معادلته $y = -2$ مستقيم مقارب في جوار كل من $+\infty$ و $-\infty$. وكذلك فإن $f(x) + 2 = \frac{2}{x+1}$ ، إذن، يقع C_f فوق d على $]-1, +\infty[$ وتحتة على $]-\infty, -1[$.

4 f هو التابع المعرف على المجال $]1, +\infty[$ وفق $f(x) = \frac{2x + \sin x}{x-1}$

① أثبت أن $\frac{2x-1}{x-1} \leq f(x) \leq \frac{2x+1}{x-1}$ أيًا يكن $x > 1$.

② استنتج نهاية f عند $+\infty$.


الحل

① لأن $-1 \leq \sin x \leq 1$ أيًا كانت x وجدنا أن $2x-1 \leq 2x + \sin x \leq 2x+1$ ، وبالقسمة على المقدم الموجب $x-1$ استنتجنا أنه في حالة $x > 1$ لدينا

$$\frac{2x-1}{x-1} \leq f(x) \leq \frac{2x+1}{x-1}$$

② ولأن $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{x-1} = 2$ ، استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ استناداً إلى مبرهنة

الإحاطة.



5 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$ وليكن

C خطه البياني المبين في الشكل المرافق.

① ادرس نهاية f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

② احسب $f'(x)$ وادرس إشارته، ثم نظم جدولاً بتغيرات f .

③ . أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل جذراً واحداً فقط. وإذا رمزنا إلى

هذا الجذر بالرمز α ، أثبت أن α ينتمي إلى المجال $]1.6, 1.7[$.

الحل

① $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\textcircled{2} \quad f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1) \quad \text{إذن}$$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	-1	\searrow	-2	\nearrow	$+\infty$

③ استناداً إلى جدول التغيرات في حالة x من $]-\infty, 1[$ يكون $f(x) \leq -1$ فليس للمعادلة $f(x) = 0$ حلول في $]-\infty, 1[$. أما على المجال $[1, +\infty[$ فالتابع متزايداً تماماً، ومن ثمَّ $f([1, +\infty[) = [-2, +\infty[$ و 0 ينتمي إلى $[-2, +\infty[$ ، إذن للمعادلة $f(x) = 0$ حلٌّ وحيد α في $[1, +\infty[$. وهو الحل الوحيد لهذه المعادلة في \mathbb{R} إذ ليس لهذه المعادلة حلول في $]-\infty, 1[$. وأخيراً بكتابة $f(x) = x^2(2x - 3) - 1$

نحسب

$$f(1.6) = 2.56 \times (0.2) - 1 = 0.512 - 1 < 0$$

$$f(1.7) = 2.89 \times (0.4) - 1 = 1.156 - 1 > 0$$

نستنتج إذن أن $\alpha \in]1.6, 1.7[$.



لنتعلم البحث معاً

6 تغيير للمتحوّل

نأمل التابع f المعرف على \mathbb{R}^* بالعلاقة $f(x) = \frac{\sin(3x)}{x}$. ادرس نهاية f عند الصفر.

نحو الحل

نحن أمام صيغة عدم تعيين، لماذا؟

بحثاً عن طريق

الطريقة الأولى: نُذكرنا عبارة $f(x)$ بالتابع $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ الذي تساوي نهايته 1 عند الصفر. وهذا

يقودنا إلى التفكير بتغيير للمتحوّل. أجرِ التغيير $X = 3x$ ، ثمَّ أنجز الحل.

الطريقة الثانية: تمكن كتابة $f(x)$ بالصيغة $f(x) = \frac{\sin(3x) - \sin 0}{x - 0}$ ، وهذه العبارة هي معدل تغير

التابع $x \mapsto \sin 3x$. استنفد من ذلك لإيجاد نهاية f عند الصفر.

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة.

الحل

لأن البسط والمقام ينعدمان عند الصفر.

نضع $X = 3x$ فيكون $f(x) = 3 \frac{\sin X}{X}$ ولكن $\lim_{x \rightarrow 0} X = 0$ و $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin X}{X} = 1$ ، إذن

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$$

وبطريقة ثانية، نعلم أنّ التابع $g(x) = \sin 3x$ اشتقاقي ومشتقه $g'(x) = 3 \cos 3x$ وعلى الخصوص

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3 \text{ أو } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = g'(0) = 3 \text{ ولكن هذا يعني أنّ } g'(0) = 3$$

7 النابع $x \mapsto \sqrt{ax^2 + bx + c}$

ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \sqrt{2x^2 + x + 1}$. وليكن C خطه البياني. المطلوب هو إثبات أنّ الخط C يقبل مقارباً مائلاً في جوار $+\infty$ ، وكذلك الأمر في جوار $-\infty$.

نحو الحل 

فهم السؤال 

■ الحد المسيطر في كثير الحدود $2x^2 + x + 1$ هو $2x^2$ ، فيمكن أن نخبّن أنّه، عند القيم الكبيرة

$$\text{للمتحول } x, \text{ يكون } f(x) \text{ من مرتبة } \sqrt{2x^2} = \sqrt{2}x.$$

بحثاً عن طريق 

$$\textcircled{1} \text{ أثبت أنّ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{2x^2 + x + 1} - \sqrt{2}x \right) = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\textcircled{2} \text{ استنتج قيمة } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \left(\sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}}{4} \right) \right)$$

$$\textcircled{3} \text{ أعد الدراسة السابقة في جوار } -\infty.$$

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة. 

الحل 

① نلاحظ أنه في حالة لدينا

$$\begin{aligned} f(x) - \sqrt{2}x &= \frac{(\sqrt{2x^2 + x + 1} - \sqrt{2}x)(\sqrt{2x^2 + x + 1} + \sqrt{2}x)}{(\sqrt{2x^2 + x + 1} + \sqrt{2}x)} \\ &= \frac{x + 1}{\sqrt{2x^2 + x + 1} + \sqrt{2}x} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{2 + \frac{x+1}{x^2}} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \text{ إذن نستنتج من كون } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x^2} = 0 \text{ أنّ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - \sqrt{2}x}{1} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

② نستنتج إذن أنّ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(f(x) - \left(\sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}}{4} \right) \right) = 0$$

فالمستقيم Δ الذي معادلته $y = \sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}}{4}$ مستقيم مقارب للخط C في جوار $+\infty$.

③ بالمثل نجد أن المستقيم الذي معادلته $y = -\sqrt{2}x - \frac{\sqrt{2}}{4}$ مستقيم مقارب للخط C في جوار

$-\infty$.

8 كثير الحدود ذي الدرجة الفردية

من المعلوم أن كثير حدود P من الدرجة n يكتب بالصيغة

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \quad \text{حيث } a_n \neq 0$$

نهدف إلى إثبات أنه إذا كان n عدداً فردياً، قيل P جذراً حقيقياً على الأقل.

نحو الحل

فهم السؤال. يتعلق الأمر بإثبات أن للمعادلة $P(x) = 0$ حلاً على الأقل في حالة n فردي. يتبادر

إلى الذهن أن ندرس تغيرات التابع $x \mapsto P(x)$. ولأن التابع P مستمر، يمكن التفكير في إيجاد

عددين a و b يحققان $P(a) \times P(b) < 0$. أيّة مبرهنة تقيد في تحقيق ما خطر لنا.

بحثاً عن طريق. لنفترض أولاً أن $a_n > 0$.

■ احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$ مستفيداً من كون العدد n فردياً.

■ استنتج أنه يوجد عدنان حقيقيان a و b يحققان $P(a) > 0$ و $P(b) < 0$.

■ استنتج وجود عدد حقيقي c يحقق $P(c) = 0$.

■ ادرس بالمثل حالة $a_n < 0$.

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة.

الحل

■ لنفترض أولاً أن $a_n > 0$. إذن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} a_n x^n = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n x^n = +\infty$$

■ نستنتج من $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ أنه يوجد عدد حقيقي a يحقق $P(a) < 0$.

■ ولأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ فيوجد b أكبر تماماً من a يحقق $P(b) > 0$.

ولما كان P مستمراً على $[a, b]$ ويحقق $P(a)P(b) < 0$ فللمعادلة $P(x) = 0$ حل واحد c على الأقل ينتمي إلى المجال $[a, b]$. ويتم إثبات المطلوب في هذه الحالة.

■ لنفترض الآن أن $a_n < 0$. بتطبيق ما سبق على كثير الحدود $Q(x) = -P(x)$ الذي أمثال حده المسيطر موجبة نستنتج وجود عدد حقيقي c يحقق $Q(c) = 0$ وعندئذ يكون $P(c) = 0$ أيضاً فنكون قد أثبتنا صحة النتيجة في هذه الحالة أيضاً.



قُدماً إلى الأمام

9 ادرس في كل حالة نهاية التابع f عند a ، وادرس عند الضرورة النهاية من اليمين ومن اليسار.

$$f(x) = \frac{x-4}{x^2-6x+5} \quad a = -\infty, 1, 5, +\infty \quad ①$$

$$f(x) = \frac{x^2-4x-12}{x^2-4} \quad a = -\infty, -2, 2, +\infty \quad ②$$

$$f(x) = \frac{2x^3-x^2-1}{x^2+x-2} \quad a = -\infty, -2, 1, +\infty \quad ③$$

$$f(x) = \frac{1}{x-3} - \frac{2}{x^2-9} \quad a = -\infty, -3, 3, +\infty \quad ④$$

$$f(x) = 2x + \sin^2 x \quad a = -\infty, +\infty \quad ⑥ \quad f(x) = \frac{x^4-1}{x^3-1} \quad a = -\infty, 1, +\infty \quad ⑤$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} \quad a = 1, +\infty \quad ⑧ \quad f(x) = x^3(2 + \cos x) \quad a = -\infty, +\infty \quad ⑦$$

الحل

① هنا $f(x) = \frac{x-4}{x^2-6x+5} = \frac{x-4}{(x-1)(x-5)}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{1, 5\}$ ومنه

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = +\infty \end{array}$$

② هنا $f(x) = \frac{x^2-4x-12}{x^2-4} = \frac{x-6}{x-2}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ ومنه

$$\begin{array}{lll} \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 2 & \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \\ & \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty & \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty \end{array}$$

③ هنا $f(x) = \frac{(x-1)(2x^2+x+1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{2x^2+x+1}{x+2}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ ومنه

$$\begin{array}{lll} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{4}{3} & \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ & \lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = +\infty \end{array}$$

④ هنا $f(x) = \frac{x+2}{x^2-9}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$ ومنه

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-3)^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x) = +\infty \end{array}$$

⑤ هنا $f(x) = \frac{x^4 - 1}{x^3 - 1} = x + \frac{1}{x^2 + x + 1}$ على مجموعة تعريفه $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{4}{3} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

⑥ لأن $-1 \leq \sin x \leq 1$ استنتجنا أنّ

$$2x - 1 \leq f(x) = 2x + \sin x \leq 2x + 1$$

وبالاستفادة من مبرهنة الإحاطة نجد

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

⑦ هنا لأن $-1 \leq \cos x \leq 1$ استنتجنا أنّ $2 + \cos x \geq 1$ ومنه

- في حالة $x > 0$ لدينا $f(x) \geq x^3$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

- وفي حالة $x < 0$ لدينا $f(x) \leq x^3$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

⑧ هنا $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ على مجموعة تعريفه $]1, +\infty[$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⑩ ليكن g التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $g(x) = \frac{1}{3 + 2 \sin x}$

① أثبت أنّ g محدود.

② استنتج كلاً من النهايتين $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x + \sin x}{3 + 2 \sin x} \right)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{3 + 2 \sin x} \right)$

الحل

① التابع $u(x) = \frac{1}{3 + 2x}$ متناقص تماماً على $]-\frac{3}{2}, +\infty[$ ولأن $-1 \leq \sin x \leq +1$ أيّاً كانت x

استنتجنا أنّ $u(1) \leq u(\sin x) \leq u(-1)$ أيّاً كانت x كان $\frac{1}{5} \leq g(x) \leq 1$ فالتابع g محدود.

② نستنتج من المراجعة السابقة أنّ $x^2 g(x) \geq \frac{x^2}{5}$ أيّاً كانت x ، إذن، لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{5} = +\infty$ ،

استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 g(x) = +\infty$ أو $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{3 + 2 \sin x} = +\infty$

وبالمثل في حالة $x > 1$ لدينا $x + \sin x \geq x - 1 > 0$ ، ومنه $(x + \sin x)g(x) \geq \frac{x-1}{5}$ في هذه

الحالة، ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{5} = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{3 + 2 \sin x} = +\infty$

11 ليكن f التابع المعين بالعلاقة $f(x) = \frac{3x^2 + 6x}{x^2 - x - 2}$

① عيّن D_f مجموعة تعريف f .

② أوجد الأعداد a و b و c التي تحقق $f(x) = a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-2}$ ، أيّاً تكن x من D_f .

③ ادرس نهاية f عند حدود المجالات الثلاثة التي تؤلف D_f .

الحل

① بملاحظة أنّ $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$ نستنتج أنّ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$

② لنفترض وجود أعداد a و b و c تحقق

$$f(x) = \frac{3x^2 + 6x}{(x+1)(x-2)} = a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-2}$$

أيّاً كانت x من D_f . عندئذٍ بحساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ باستعمال كل من العلاقتين نجد $a = 3$. ثمّ بضرب

طرفي المساواة بالمقدار غير المعدوم $x+1$ نجد

$$\frac{3x^2 + 6x}{x-2} = a(x+1) + b + \frac{c(x+1)}{x-2}$$

فإذا حسبنا نهاية كل من الطرفين عند -1 وجدنا $b = 1$. وأخيراً بحساب قيمة $f(0)$ بطريقتين نجد

$$0 = 3 + \frac{1}{0+1} + \frac{c}{0-2}$$

ومنه $c = 8$. وبالعكس، نتحقّق مباشرة أنّ

$$3 + \frac{1}{x+1} + \frac{8}{x-2} = \frac{3x^2 - 3x - 6 + x - 2 + 8x + 8}{x^2 - x - 2} = \frac{3x^2 + 6x}{x^2 - x - 2} = f(x)$$

③

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3 & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3 \\ \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \end{array}$$

12 ليكن f التابع المعين بالعلاقة $f(x) = \frac{x}{(x-1)^2}$

① ادرس نهاية f في جوار 1.

② أوجد مجالاً I مركزه 1 ويحقق $f(x) > 10^6$ ، أيّاً تكن x من $I \setminus \{1\}$.

الحل

$$f(x) = \frac{x}{(x-1)^2}$$

① من الواضح أنّه عندما تسعى x إلى الواحد يسعى البسط إلى الواحد ويسعى المقام إلى الصفر بقيم

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$$

② المطلوب هو تعيين عدد α بحيث تقتضي المتراجحة $1 + \alpha > x > 1 - \alpha$ في حالة $x \neq 1$ المتراجحة $f(x) > 10^6$.

لنختار مثلاً $\alpha = 7 \times 10^{-4}$ لما كان $\alpha < 0.5$ استنتجنا من $1 + \alpha > x > 1 - \alpha$ ، حيث $x \neq 1$ ، أن

$$f(x) = \frac{x}{(x-1)^2} > \frac{1-\alpha}{\alpha^2} > \frac{0.5}{49 \times 10^{-8}} = \frac{50}{49} \times 10^6 > 10^6$$

هنا في المتراجحة الأولى صغرنا البسط وكبرنا المقام، وفي المتراجحة الثانية استفدنا من $\alpha < 0.5$.

13 ادرس في كل حالة نهاية التابع f ، عند a .

$$f(x) = \sqrt{4x^2 + x} + 2x \quad a = -\infty \quad \textcircled{2} \quad f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x \quad a = +\infty \quad \textcircled{1}$$

$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x+1}-1} \quad a = 0 \quad \textcircled{4} \quad f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} \quad a = 3 \quad \textcircled{3}$$

$$f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}} \quad a = -1, +\infty \quad \textcircled{6} \quad f(x) = \frac{-x+\sqrt{x}}{x-1} \quad a = 1, +\infty \quad \textcircled{5}$$

الحل

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1} \quad \textcircled{1} \quad \text{هنا في حالة } x > 0 \text{ لدينا:}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \text{ وعليه}$$

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} - 2x} = \frac{1}{-\sqrt{4 + \frac{1}{x}} - 2} \quad \textcircled{2} \quad \text{هنا في حالة } x < -\frac{1}{4} \text{ لدينا: } \sqrt{x^2} = -x \text{ ومن ثم}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{4} \text{ وعليه}$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} \quad \textcircled{3} \quad \text{هنا في حالة } x > -1 \text{ و } x \neq 3 \text{ لدينا:}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{1}{4} \text{ وعليه}$$

$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x+1}-1} = 2(\sqrt{1+x}+1) \quad \textcircled{4} \quad \text{هنا في حالة } x > -1 \text{ و } x \neq 0 \text{ لدينا}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4 \text{ وعليه}$$

⑤ هنا في حالة $x > 0$ و $x \neq 1$ لدينا

$$f(x) = \frac{-x+\sqrt{x}}{x-1} = -\frac{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})}{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})} = -\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} = -\frac{1}{1+\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\frac{1}{2} \text{ وعليه}$$

⑥ هنا في حالة $x > 1$ لدينا $(1+x) = \sqrt{(1+x)^2}$ ومنه

$$f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}} = \sqrt{\frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)}} = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ وفي حالة $x < -1$ لدينا $1+x = -\sqrt{(1+x)^2}$ ومنه

$$f(x) = -\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

إذن $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = 0$

14 ادرس في كل حالة نهاية التابع f .

$$f(x) = \frac{1 - \cos x}{\sin x} \quad a = 0 \quad \textcircled{2} \quad f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \quad a = 0, +\infty \quad \textcircled{1}$$

$$f(x) = \frac{2 - \sqrt{3x-2}}{\sqrt{2x+5}-3} \quad a = 2 \quad \textcircled{4} \quad f(x) = \frac{x \sin x}{1 - \cos x} \quad a = 0 \quad \textcircled{3}$$

الحل

① في حالة $x > 0$ لدينا $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} \frac{\sin x}{x}$ إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \times 1 = 0$ ومن جهة

أخرى لدينا $-\frac{1}{\sqrt{x}} \leq f(x) \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$ ولأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

② في حالة $x \neq 0$ من المجال $]-\pi, \pi[$ لدينا $f(x) = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

③ في حالة $x \neq 0$ من المجال $]-\pi, \pi[$ لدينا $f(x) = \frac{x \sin x}{1 - \cos x} = \frac{x}{\sin x} (1 + \cos x)$ ومنه نستنتج

أن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$

④ في حالة $x > \frac{2}{3}$ لدينا

$$f(x) = \frac{2 - \sqrt{3x-2}}{\sqrt{2x+5}-3} = \frac{6-3x}{2+\sqrt{3x-2}} \cdot \frac{\sqrt{2x+5}+3}{2x-4} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{2x+5}+3}{2+\sqrt{3x-2}}$$

إذن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\frac{9}{4}$

15 ليكن g التابع المعرف على المجال $]3, +\infty[$ وفق $g(x) = \frac{3x-1}{x-3}$

① احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ واستنتج $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(g(x))$

② أعد حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(g(x))$ بعد كتابة $g(g(x))$ بدلالة x .

① $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3$ وكذلك فإن $g(x) = 3 + \frac{8}{x-3} > 3$ أي كانت x من $]3, +\infty[$ إذن $g(x)$

يسعى إلى 3 بقيم أكبر من 3 عند $+\infty$ ، وعليه فإن $\lim_{u \rightarrow 3^+} g(u) = +\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(g(x)) = \lim_{u \rightarrow 3^+} g(u) = +\infty$

② بحساب مباشر نجد $g(g(x)) = x$ أي كانت $x > 3$. وهكذا نجد مجدداً أنّ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(g(x)) = +\infty$$

16 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف بالعلاقة $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-d}$. جُد الأعداد

الحقيقية a و b و c و d علماً أنّ الخواص الآتية محقّقة:

- المستقيم الشاقولي الذي معادلته $x = 3$ مقارب للخط C .
- المستقيم المائل الذي معادلته $y = 2x - 5$ مقارب للخط C عند $+\infty$ وعند $-\infty$.
- تنتمي النقطة $A(1,2)$ إلى الخط C .

▪ لو كان $d \neq 3$ كان $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3a + b + \frac{c}{3-d}$ وهذا عدداً حقيقي، مما يناقض كون المستقيم

الذي معادلته $x = 3$ مستقيماً مقارباً شاقولياً للخط C . إذن لا بدّ أن يكون $d = 3$.

▪ استناداً إلى النقطة الثانية لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x - 5)) = 0$ أي $\lim_{x \rightarrow +\infty} ((a-2)x + b + 5) = 0$

$$\text{لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c}{x-3} = 0 \text{ . وهذا يقتضي أن يكون } a = 2 \text{ و } b = -5$$

▪ من $f(1) = 2$ نستنتج أنّ $c = -10$.

17 فيما يأتي C هو الخط البياني للتابع f الذي ندرسه على مجموعة تعريفه D_f . بيّن، في كل

حالة، إن كان ثمة مستقيمتين مقاربتين (أفقية أو شاقولية أو مائلة) للخط C .

$$f(x) = -x + 3 + \frac{2}{x^2 + 1} \quad \textcircled{2} \quad f(x) = \frac{x+1}{x-3} \quad \textcircled{1}$$

$$f(x) = 1 - x + \frac{3x}{x^2 + 2} \quad \textcircled{4} \quad f(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{x}{2} \quad \textcircled{3}$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2 + \sin x}{x} \quad \textcircled{6} \quad f(x) = \frac{2x^2 + 5x - 4}{x} \quad \textcircled{5}$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x-1} \quad \textcircled{8} \quad f(x) = \frac{x^2 + 6x + 1}{x^2 - 1} \quad \textcircled{7}$$

$$f(x) = \frac{3x^3 + 2x - 1}{x^2 + 1} \quad \textcircled{10} \quad f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2} \quad \textcircled{9}$$

مساعدة: في ⑧ و ⑨ و ⑩ فكّر باستعمال القسمة الإقليدية لكثيرات الحدود.

① التابع $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ معرف على $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ ولأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ استنتجنا أن للخط البياني C_f مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = 1$. ولأن $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$ استنتجنا أن للخط البياني C_f مستقيم مقارب شاقولي معادلته $x = 3$.

② التابع $f(x) = -x + 3 + \frac{2}{x^2 + 1}$ معرف على \mathbb{R} ، ولأن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x - 3) = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x - 3) = 0$$

استنتجنا أن للخط البياني C_f مستقيم مقارب معادلته $y = -x + 3$ في جوار كل من $+\infty$ و $-\infty$.

③ التابع $f(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{x}{2}$ معرف على \mathbb{R}^* ، ولأن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) - \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \right) = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \right) = 0$$

استنتجنا أن للخط البياني C_f مستقيم مقارب معادلته $y = 1 + \frac{x}{2}$ في جوار كل من $+\infty$ و $-\infty$. وكذلك لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$ استنتجنا أن للخط البياني C_f مستقيم مقارب شاقولي هو محور الترتيب الذي معادلته $x = 0$.

④ مشابه للتمرين ②، ونجد أن المستقيم الذي معادلته $y = 1 - x$ مستقيم مقارب.

⑤ هنا $f(x) = \frac{2x^2 + 5x - 4}{x} = 2x + 5 - \frac{4}{x}$ على \mathbb{R}^* . هذا يشبه التمرين ③. للخط البياني C_f

مستقيم مقارب معادلته $y = 2x + 5$ في جوار كل من $+\infty$ و $-\infty$. ويقبل أيضاً محور الترتيب مقارباً شاقولياً.

⑥ هنا $f(x) = \frac{x^2 + 2 + \sin x}{x} = x + \frac{2 + \sin x}{x}$ على \mathbb{R}^* . للخط البياني C_f مستقيم مقارب

معادلته $y = x$ في جوار كل من $+\infty$ و $-\infty$. ويقبل أيضاً محور الترتيب مقارباً شاقولياً.

⑦ هنا لدينا مقارب أفقي معادلته $y = 1$ ومقاربان شاقوليان معادلتهما $x = 1$ و $x = -1$.

⑧ هنا لدينا مقارب مائل معادلته $y = x - 2$ ومقاربان شاقولي معادلته $x = 1$.

⑨ هنا لدينا مقارب مائل معادلته $y = x$.

⑩ هنا لدينا مقارب مائل معادلته $y = 3x$.

18 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 4}$.

① .a احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1))$.

b استنتج وجود مقارب مائل Δ للخط البياني C للتابع f في جوار $+\infty$.

c ادرس الوضع النسبي للمقارب Δ والخط C .

② .a احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b أثبت وجود عدد حقيقي a يحقق $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ وأن نهاية $f(x) - ax$ عند $x \mapsto f(x) - ax$

$-\infty$ عدد حقيقي b .

c استنتج وجود مقارب مائل Δ' للخط البياني C للتابع f في جوار $-\infty$.

الجل

① في حالة $x > 0$ لدينا $x^2 + 2x + 4 \geq x^2$ ومنه $f(x) \geq x$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ومن

جهة أخرى نجد بحساب بسيط أن

$$f(x) - (x + 1) = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 2x + 4} + x + 1}$$

إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x - 1) = 0$ فالمستقيم Δ الذي معادلته $y = x + 1$ مستقيم مقارب للخط البياني

C للتابع f في جوار $+\infty$.

لنضع $g(x) = f(x) - (x + 1)$. التابع g تابع مستمر على \mathbb{R} . والمساواة $g(x) = 0$ تقضي أن يكون

$x^2 + 2x + 4 = x^2 + 2x + 1$ وهذا أمر مستحيل. إذن التابع g يحافظ على إشارة ثابتة على كامل

\mathbb{R} ، ولأن $g(0) = 1 > 0$ استنتجنا أن $g(x) > 0$ أيًا كان x من \mathbb{R} ، ومن ثم يقع الخط البياني C

فوق Δ .

② لما كان $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2x + 4) = +\infty$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ وفي حالة $x < 0$

لدينا $x = -\sqrt{x^2}$ إذن $\frac{f(x)}{x} = -\sqrt{\frac{x^2 + 2x + 4}{x^2}}$ ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1$ ثم كذلك في حالة

$x < 0$ لدينا

$$f(x) + x = x \left(1 - \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2}} \right) = \frac{-2 - 4/x}{1 + \sqrt{1 + 2/x + 4/x^2}}$$

إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x) = -1$ نستنتج إذن أن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (-x - 1)) = 0$$

فالمستقيم Δ' الذي معادلته $y = -x - 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f في جوار $-\infty$.

19 ليكن C الخط البياني للتابع f المعروف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$.

① احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

② a. اكتب ثلاثي الحدود $x^2 + 4x + 5$ بالصيغة القانونية، (متمماً إلى مربع كامل).

b. استنتج وجود مقارب مائل للخط البياني C للتابع f في جوار $+\infty$. اكتب معادلته.

الجل

① لَمَا كَانَ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 4x + 5) = +\infty$ استنتجنا أَنَّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. ثُمَّ نلاحظ أَنَّ

$$x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1$$

② إذن عندما تكون x كبيرة جداً يكون العدد 1 مهملأً أمام $(x + 2)^2$ ومن ثَمَّ يتصرف $f(x)$ وكأنه

$\sqrt{(x + 2)^2} = x + 2$ (لأنَّ $x + 2 > 0$ في هذه الحالة) لذلك نتوقع أن يكون المستقيم الذي معادلته

$y = x + 2$ مستقيماً مقارباً للخط البياني للتابع f . لنتحقق إذن من ذلك، لما كان

$$f(x) - (x + 2) = \frac{1}{\sqrt{(x + 2)^2 + 1} + x + 2}$$

استنتجنا مباشرة أَنَّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x - 2) = 0$ ، فالمستقيم الذي معادلته $y = x + 2$ مستقيم مقارب

للخط البياني C للتابع f في جوار $+\infty$.

20 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$.

① ادرس نهاية f عند $-\infty$. اشرح التأويل الهندسي لهذه النتيجة.

② أثبت أَنَّ المستقيم Δ الذي معادلته $y = 2x$ مقارب للخط C في جوار $+\infty$.

③ ادرس الوضع النسبي للمقارب Δ والخط C .

الجل

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$$

① في حالة $x < 0$ لدينا $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ، فيكون محور الفواصل الذي

معادلته $y = 0$ مستقيماً مقارباً للخط البياني للتابع f في جوار $-\infty$.

② في حالة $x > 0$ لدينا $f(x) - 2x = \sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$ إذن

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 0$ ، فيكون المستقيم Δ الذي معادلته $y = 2x$ مستقيماً مقارباً للخط C في جوار

$+\infty$.

③ لنضع $g(x) = f(x) - 2x$. التابع g تابع مستمر على \mathbb{R} . والمساواة $g(x) = 0$ تقضي أن يكون

$x^2 + 1 = x^2$ وهذا أمر مستحيل. إذن التابع g لا يعدم فهو يحافظ على إشارة ثابتة على كامل \mathbb{R} ،

ولأنَّ $g(0) = 1 > 0$ استنتجنا أَنَّ $g(x) > 0$ أيأ كان x من \mathbb{R} ، ومن ثَمَّ يقع C فوق Δ .

21 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = x + \sqrt{|4x^2 - 1|}$.

① ادرس نهاية f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

② a . احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x)$

b . احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x)$

③ a . استنتج أنّ الخط C يقبل مستقيمين مقاربين مائلين Δ_1 و Δ_2 يُطلب إيجاد معادلتيهما.

b . ادرس الوضع النسبي للخط C وكلٍ من المقاربين Δ_1 و Δ_2 .

الحل

① في حالة $x > \frac{1}{2}$ لدينا $4x^2 - 1 > 0$ ومن ثمّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. وفي حالة $x < -\frac{1}{2}$ لدينا

أيضاً $4x^2 - 1 > 0$ و $x = -\sqrt{x^2}$ من ثمّ $f(x) = x \left(1 - \sqrt{4 - \frac{1}{x^2}}\right)$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

② في حالة $x > \frac{1}{2}$ لدينا $f(x) - 3x = \sqrt{4x^2 - 1} - 2x = \frac{-1}{\sqrt{4x^2 - 1} + 2x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x) = 0$$

فالمستقيم Δ_1 الذي معادلته $y = 3x$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f في جوار $+\infty$.

في حالة $x < -\frac{1}{2}$ لدينا $f(x) + x = \sqrt{4x^2 - 1} + 2x = \frac{-1}{\sqrt{4x^2 - 1} - 2x}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x) = 0$$

فالمستقيم Δ_2 الذي معادلته $y = -x$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f في جوار $-\infty$.

③ الجزء a . من السؤال أجبنا عنه أعلاه.

■ لنضع $g(x) = f(x) - 3x$. التابع g تابع مستمرّ على \mathbb{R} . والمساواة $g(x) = 0$ تكافئ

$$\sqrt{|4x^2 - 1|} = 2x$$


وهذا يُكافئ أنّ $x > 0$ و $|4x^2 - 1| = 4x^2$ أو $x > 0$ و $8x^2 = 1$. إذن ينعدم g فقط عند قيمة

واحدة هي $x = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ ومنه الجدول الآتي

x	$-\infty$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}$	$+\infty$
$f(x) - 3x$		+	0 -
C		فوق Δ_1	تحت Δ_1

ويقطع C المقارب Δ_1 في النقطة $A\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{3}{2\sqrt{2}}\right)$.

■ لنضع $h(x) = f(x) + x$. التابع h تابع مستمرّ على \mathbb{R} . والمساواة $h(x) = 0$ تكافئ



$$\sqrt{|4x^2 - 1|} = -2x$$

وهذا يكفي أن $x < 0$ و $|4x^2 - 1| = 4x^2$ أو $x < 0$ و $8x^2 = 1$. إذن ينعدم h فقط عند $x = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ومنه

الجدول الآتي:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2\sqrt{2}}$	$+\infty$
$f(x) + x$	-	0	+
C	تحت Δ_2		فوق Δ_2

ويقطع C المقارب Δ_2 في النقطة $B\left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$.

22. ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = \sqrt{4x^2 - 4x + 3}$.

① ادرس نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

② اكتب a . $4x^2 - 4x + 3$ بالشكل القانوني.

b . ادرس نهاية التابع h المعرفة وفق $h(x) = f(x) - \sqrt{(2x-1)^2}$ عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

c . استنتج أن الخط C يقبل مستقيمين مقاربين مائلين يُطلب إيجاد معادلتيهما.

③ أثبت أن الخط C يقع فوق كلٍّ من هذين المقاربين.

الحل

لا أفكار جديدة في هذه المسألة. نترك التفاصيل للقارئ.

23. ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$.

① a . أثبت أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = x + 1$ مقاربٌ للخط C في جوار $+\infty$.

b . ادرس الوضع النسبي للمقارب Δ والخط C .

② أصحح أن المستقيم Δ' الذي معادلته $y = x - 1$ مقاربٌ للخط C في جوار $-\infty$ ؟

الحل

① a . في حالة $x > 0$ لدينا $\sqrt{x^2} = x$ إذن $f(x) - (x + 1) = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + 9}} - 1$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1)) = 1 - 1 = 0$$

فالمستقيم Δ الذي معادلته $y = x + 1$ مستقيم مقارب للخط C في جوار $+\infty$. ولأن $x^2 < x^2 + 9$

استنتجنا أن $f(x) - (x + 1) = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + 9}} - 1 < \sqrt{\frac{x^2 + 9}{x^2 + 9}} - 1 = 0$ إذن C يقع دوماً تحت Δ .

② في حالة $x < 0$ يكون $x = -\sqrt{x^2}$ إذن $f(x) - (x - 1) = -\sqrt{\frac{x^2}{x^2 + 9}} + 1$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$$

فالمستقيم Δ' الذي معادلته $y = x - 1$ مستقيم مقارب للخط C في جوار $-\infty$.

24 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x^3 + x + 1$. احسب $f(-1)$ و $f(0)$ ثم أثبت

وجود عدد حقيقي وحيد c من المجال $]-1, 0[$ يحقق $f(c) = 0$.

الحل

■ التابع f متزايداً تماماً على \mathbb{R} لأن مشتقه موجبٌ تماماً. فإذا كان للمعادلة $f(x) = 0$ حلٌ كان هذا الحل وحيداً.

■ ولكن $f(-1) = -1$ و $f(0) = 1$ إذن التابع المستمر f يغير إشارته على المجال $]-1, 0[$ ، فلا بد أن ينعدم عند نقطة c من هذا المجال. إذن تقبل المعادلة $f(x) = 0$ حلاً وهذا الحل ينتمي إلى $]-1, 0[$.

نستنتج مما سبق أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلاً وحيداً c في \mathbb{R} ، وأن c ينتمي إلى $]-1, 0[$.

25 ليكن f التابع المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ وفق $f(x) = \frac{x^3}{x+1}$.

① أثبت أن f متزايداً تماماً على المجال $]-\frac{3}{2}, -1[$.

② نظم جدولاً بتغيرات f على المجال $]-\frac{3}{2}, -1[$.

③ أوجد $f\left(-\frac{3}{2}\right)$ وأثبت أن للمعادلة $f(x) = 10$ حلاً وحيداً في المجال $]-\frac{3}{2}, -1[$.

الحل

① نلاحظ أن $f'(x) = \frac{x^2(2x+3)}{(x+1)^2}$ ، إذن $f'(x) > 0$ على المجال $]-\frac{3}{2}, -1[$ ، فالتابع f متزايداً تماماً على هذا المجال.

② ولأن $\lim_{x \rightarrow -3/2} f(x) = \frac{27}{4}$ و $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty$ وجدنا جدول التغيرات الآتي

x	$-\frac{3}{2}$	-1
$f'(x)$		+
$f(x)$	$\frac{27}{4}$	$\nearrow +\infty$

③ نستنتج مما سبق أن $f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{4}$ ولأن $10 \in \left[\frac{27}{4}, +\infty\right[$ ينتمي إلى المجال $]-\frac{3}{2}, -1[$.

استنتجنا مما سبق أن للمعادلة $f(x) = 10$ حلاً وحيداً في المجال $]-\frac{3}{2}, -1[$.

26 ليكن f التابع المعرف على $I = [0, 3]$ وفق $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

① ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها.

② استنتج قيم x التي تحقق $f(x) = 0$.

③ عيّن $f([0,3])$.

الجل

لا أفكار جديدة في هذه المسألة البسيطة. التابع متناقص على $[0,1]$ ومتزايد $[1,3]$. للمعادلة جذرٌ وحيدٌ هو $x = 3$ و $f([0,3]) = [-4,0]$.

27 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$. أثبت أنّ f مستمر على \mathbb{R}

وعيّن $f(\mathbb{R})$.

الجل

التابع مستمر على \mathbb{R} لأنه تابع كسري بسطه كثير حدود، ومقامه كثير حدود لا يندم على \mathbb{R} . ودراسة بسيطة للتابع تعطينا جدول التغيرات الآتي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	1	\searrow	\nearrow 1

إذن $f(\mathbb{R}) = [0,1[$

28 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & : x \neq 0 \\ 0 & : x = 0 \end{cases}$$

① احسب نهاية f عند الصفر.

② هل f مستمر عند الصفر؟ هل هو مستمر على \mathbb{R} ؟ علل إجابتك.

الجل

① في حالة $x \neq 0$ لدينا $|f(x)| \leq x^2$ لأن $|\cos(1/x)| \leq 1$. المتراجحة $|f(x)| \leq x^2$ محققة أيضاً

في حالة $x = 0$. ولكن $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

② لما كان $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$. فالتابع f مستمر عند الصفر، وهو مستمر عند كل نقطة

$x_0 \neq 0$ بسبب استمرار $x \mapsto \frac{1}{x}$ عند x_0 ، واستمرار كل من $x \mapsto \cos x$ و $x \mapsto x^2$ على \mathbb{R} . إذن

f مستمر على \mathbb{R} .

29 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{x^2 + 1}}{x} & : x \neq 0 \\ m & : x = 0 \end{cases}$$

ما قيمة m التي تجعل f مستمراً على \mathbb{R} ؟

الحل

التابع مستمر على $]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ ، فلنكون مستمراً على \mathbb{R} يجب أن يكون مستمراً عند الصفر.

ولكن في حالة $x \neq 0$ لدينا $f(x) = \frac{-x}{1 + \sqrt{1 + x^2}}$ ومن ثمَّ فإنَّ شرط استمرار f عند الصفر يكافئ

$$. m = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

30 يرمز $E(x)$ إلى الجزء الصحيح للعدد الحقيقي x . ليكن f التابع المعرف على المجال $[0, 2]$


وفق $f(x) = x - E(x)$.

① ارسم الخط البياني للتابع f على المجال $[0, 2]$.

② هل f مستمر على المجال $[0, 2]$ ؟

الحل

① استناداً إلى تعريف تابع الجزء الصحيح لدينا $E(x) = 0$ في حالة x من $[0, 1[$ ، و $E(x) = 1$ في حالة x من $[1, 2[$ ، ومنه يمكن أن نعبّر عن f بالصيغة المكافئة :



$$f(x) = x - E(x) = \begin{cases} x & : x \in [0, 1[\\ x - 1 & : x \in [1, 2[\\ 0 & : x = 2 \end{cases}$$

② نلاحظ أن $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \neq f(1)$ فالتابع غير مستمر عند $x = 1$ فهو غير مستمر على $[0, 2]$

31 يرمز $E(x)$ إلى الجزء الصحيح للعدد الحقيقي x . ليكن f التابع المعرف على المجال $[0, 2]$

وفق


$$. f(x) = E(x) + (x - E(x))^2$$

① اكتب $f(x)$ بعبارة مستقلة عن $E(x)$ (لا تحوي $E(x)$).

② أثبت أن f مستمر على المجال $[0, 2]$ ؟

الحل

① استناداً إلى تعريف تابع الجزء الصحيح لدينا $E(x) = 0$ في حالة x من $[0, 1[$ ، و $E(x) = 1$ في حالة x من $[1, 2[$ ، ومنه يمكن أن نعبّر عن f بالصيغة المكافئة :



$$f(x) = E(x) + (x - E(x))^2 = \begin{cases} x^2 & : x \in [0, 1[\\ x^2 - 2x + 2 & : x \in [1, 2[\\ 2 & : x = 2 \end{cases}$$

② التابع f تابع كثير الحدود على كل من المجالين $[0, 1[$ و $[1, 2[$ وهذه التتابع مستمرة على مجالات تعريفها. بقي إذن أن نتحقق من استمرار f عند كل من 1 و 2. فنحسب

▪ عند 1 لدينا $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1 = f(1)$ فالتابع مستمر عند 1.

▪ عند 2 لدينا $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 2x + 2) = 2 = f(2)$ فالتابع مستمر أيضاً عند 2.

إذن f مستمر على $[0, 2]$.

32 في معلم متجانس، C هو الخط البياني للتابع f المعرف على $[0, \pi]$ وفق $f(x) = \sin x$ و d

هو المستقيم الذي معادلته $y = \frac{1}{2}x$.

① a . ارسم كلاً من C و d .

b . يبدو أن للمعادلة $\sin x = \frac{1}{2}x$ حلاً وحيداً α في المجال $]0, \pi]$. استند من الرسم لإيجاد

مجال صغير ينتمي إليه α .

② نرمز بالرمز g إلى التابع المعرف على $[0, \pi]$ وفق $g(x) = \sin x - \frac{1}{2}x$.


a . احسب $g'(x)$ وأثبت أن $g'(x)$ ينعدم عند $x = \frac{\pi}{3}$.

b . نظم جدولاً بتغيرات g .

③ استنتج مما سبق أن المعادلة $\sin x = \frac{1}{2}x$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]0, \pi]$.

① a .

الجدل



b . يوحي الرسم أن $\alpha \in [\frac{\pi}{2}, 2]$.

② هنا لدينا $g(x) = \sin x - \frac{1}{2}x$ و $g'(x) = \cos x - \frac{1}{2}$ الذي ينعدم عند $x = \frac{\pi}{3}$ ومنه جدول التغيرات

x	0	$\frac{\pi}{3}$	π
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	0	$\nearrow g(\frac{\pi}{3})$	$\searrow -\frac{\pi}{2}$

هنا من غير المهم أو المفيد حساب $g(\frac{\pi}{3})$ المهم فقط أن هذه القيمة موجبة، وذلك لأن g متزايداً تماماً على $[0, \frac{\pi}{3}]$ ، إذن $0 = g(0) < g(\frac{\pi}{3})$.

③ - بسبب التزايد التام للتابع g على $[0, \frac{\pi}{3}]$ نستنتج أن $g(x) > g(0)$ في حالة x من $]0, \frac{\pi}{3}]$ ، فليس للمعادلة $g(x) = 0$ حلول في المجال $]0, \frac{\pi}{3}]$.

- على المجال $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ التابع g متناقص تماماً. ولأن $g(\frac{\pi}{3}) > 0$ و $g(\pi) < 0$ استنتجنا أن للمعادلة $g(x) = 0$ حلاً وحيداً في هذا المجال وليكن α .

مما سبق نستنتج أن للمعادلة $g(x) = 0$ حلاً وحيداً α في المجال $]0, \pi]$. ونتوثق أن $\alpha \in]\frac{\pi}{2}, 2[$ لأن $g(2) = \sin 2 - 1 < 0$ و $g(\frac{\pi}{2}) = 1 - \frac{\pi}{4} > 0$

33 ليكن f تابعاً مستمراً ومعرفاً على المجال $I = [0, 1]$ ويحقق $f(x) \in I$ ، أيًا يكن x من I . نرسم بالرمز k إلى التابع المعرف على I وفق $k(x) = f(x) - x$. بتطبيق مبرهنة القيمة الوسطى على التابع k ، أثبت وجود عدد حقيقي a من I يحقق $f(a) = a$.

الحل

استناداً إلى الفرض $0 \leq f(0) \leq 1$ إذن

$$k(1) = f(1) - 1 \leq 0 \leq f(0) = k(0)$$

التابع k تابع مستمر على المجال I ، ونعلم في هذه الحالة أن $k(I)$ هي مجال ينتمي إليه العدان $k(0)$ و $k(1)$ فلا بد أن ينتمي إليه العدد 0 الذي يقع بينهما أي $0 \in [k(1), k(0)] \subset k(I)$. إذن يوجد a من I يحقق $k(a) = 0$ أي $f(a) = a$.

34 مجموعة توابع مستمرة

ليكن m عدداً حقيقياً، وليكن C_m الخط البياني للتابع f_m المعرف على \mathbb{R} وفق:

$$f_m(x) = x^3 + mx^2 - 8x - m$$

① a . أثبت أن الخطين البيانيين C_0 و C_1 يتقاطعان في نقطتين A و B . أوجد إحداثيات هاتين النقطتين.

b . استنتج أن جميع الخطوط البيانية C_m تمر بالنقطتين A و B .

- ② أوجد نهاية f_m عند $+\infty$ و عند $-\infty$.
- ③ استنتج مما سبق أنّ للمعادلة $f_m(x) = 0$ ثلاثة حلول متميزة في \mathbb{R} ، أيّ يكن العدد m .

الحل

① إذا كانت (α, β) نقطة مشتركة بين C_1 و C_0 وجب أن يكون $f_0(\alpha) = \beta$ و $f_1(\alpha) = \beta$ أي

$$\alpha^3 - 8\alpha = \beta$$

$$\alpha^3 + \alpha^2 - 8\alpha - 1 = \beta$$

بالطرح نجد $\alpha^2 = 1$ وبالتعويض في جملة المعادلتين نجد $\beta = -7\alpha$. ومنه نستنتج أنّ

$$(\alpha, \beta) = (-1, 7) \text{ أو } (\alpha, \beta) = (1, -7)$$

إذن يتقاطع C_1 و C_0 في النقطتين $A(1, -7)$ و $B(-1, 7)$.

من ناحية أخرى نحسب $f_m(1) = -7$ فنستنتج أنّ $A \in C_m$ وكذلك $f_m(-1) = 7$ فنستنتج أنّ

$B \in C_m$. إذن تمر جميع الخطوط البيانية C_m بالنقطتين A و B .

② نهاية f_m عند كل من $+\infty$ و $-\infty$ هي نهاية حدّ المسيطر إذن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow \infty} f_m(x) = +\infty$$

③ لما كان f_m كثير حدود من الدرجة الثالثة فللمعادلة $f_m(x) = 0$ ثلاثة حلول على الأكثر. ولكن

كل تابع مستمر يغير إشارته على مجال يندم بالضرورة على هذا المجال ومنه:

▪ لما كان $f_m(-1) = 7$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = -\infty$ فللمعادلة $f_m(x) = 0$ حل x_1 ينتمي إلى

$$]-\infty, -1[.$$

▪ لما كان $f_m(-1) = 7$ و $f_m(1) = -7$ فللمعادلة $f_m(x) = 0$ حل x_2 ينتمي إلى $]-1, 1[$.

▪ لما كان $f_m(1) = -7$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} f_m(x) = \infty$ فللمعادلة $f_m(x) = 0$ حل x_3 ينتمي إلى $]1, +\infty[$.

فالمعادلة $f_m(x) = 0$ ثلاثة حلول متميزة في \mathbb{R} .

35 ليكن f تابعاً مستمراً واشتقاقياً على المجال $I = [0, 1]$ وبحقق الشرطين:

▪ أيّ كان x من I كان $f(x)$ من I .

▪ وأيّ كان x من $]0, 1[$ كان $f'(x) < 1$.

أثبت أنّ للمعادلة $f(x) = x$ حلاً وحيداً في I .

الحل

لننمّل التابع $k : I \rightarrow \mathbb{R}, k(x) = x - f(x)$ هذا تابع اشتقاقي ومشتقه $k'(x) = 1 - f'(x)$ موجباً

تماماً على I . إذن k تابع متزايداً تماماً على I ولدينا $k(I) = [-f(0), 1 - f(1)]$. ولكن

$$-f(0) \leq 0 \leq 1 - f(1)$$

إذن $0 \in k(I)$ ، فللمعادلة $k(x) = 0$ حلّ وحلّ واحد فقط في I (بسبب الاطراد التام).

ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ وليكن C خطه البياني في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- ① أثبت أن للخط C محور تناظر.
- ② ادرس نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.
- ③ أثبت أن $f(x) - x = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}}$ ، أيًا يكن x من \mathbb{R} . استنتج أن C يقبل مقارباً مائلاً d في جوار $+\infty$. عيّن الوضع النسبي للخط C ومقاربه d .
- ④ ليكن C' الخط البياني للتابع g المعرف على \mathbb{R} وفق $g(x) = -f(x)$ ، وليكن $\mathcal{H} = C \cup C'$. أثبت أن معادلة \mathcal{H} هي $y^2 - x^2 = 1$.
- ⑤ نعتمد معلماً جديداً $(O; \vec{u}, \vec{v})$ حيث $\vec{u} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{i} + \vec{j})$ و $\vec{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-\vec{i} + \vec{j})$. لتكن M نقطة إحداثياتها (x, y) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وإحداثياتها (X, Y) في المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$. أوجد x و y بدلالة X و Y . ارسم الخط \mathcal{H} في المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

البدل

① f معرف على مجموعة متناظرة بالنسبة إلى المبدأ، وفي حالة عدد حقيقي x لدينا

$$f(-x) = \sqrt{1+(-x)^2} = \sqrt{1+x^2} = f(x)$$

فالتابع f زوجي وخطه البياني متناظر بالنسبة إلى محور الراتب.

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

③ لما كان $f(x) - x = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}}$ ، استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$ ، فالمستقيم d الذي

معادلته $y = x$ مستقيم مقارب للخط C في جوار $+\infty$. وأياً كانت x من \mathbb{R} كان $f(x) = \sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2} = |x| \geq x$ أو $f(x) - x > 0$ ، فالخط C يقع دوماً فوق مقاربه d .

④ النقطة (x, y) تنتمي إلى \mathcal{H} إذا وفقط إذا كان $y = f(x)$ أو $y = g(x) = -f(x)$. وهذا يكافئ قولنا إن $y^2 = (f(x))^2 = 1 + x^2$ أي $y^2 - x^2 = 1$.

⑤ لدينا

$$\begin{aligned} x\vec{i} + y\vec{j} &= \overrightarrow{OM} = X\vec{u} + Y\vec{v} = X\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j}) + Y\frac{1}{\sqrt{2}}(-\vec{i} + \vec{j}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(X - Y)\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y)\vec{j} \end{aligned}$$

$$\text{إذن} \quad x = \frac{1}{\sqrt{2}}(X - Y) \quad \text{و} \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y)$$

$$(x, y) \in \mathcal{H} \quad \text{إذا وفقط إذا كان} \quad y^2 - x^2 = 1 \quad \text{أي} \quad (X + Y)^2 - (X - Y)^2 = 2 \quad \text{أو} \quad XY = \frac{1}{2}$$

فالمنحني \mathcal{H} هو الخط البياني للتابع $X \mapsto \frac{1}{2X}$ في المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، ورسمه معروف للقارئ.

37 تابع القيمة المطلقة: تغيرات. حل معادلة

ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, +1\}$ وفق:

$$f(x) = |x + 1| + \frac{x}{x^2 - 1}$$

① a . اكتب $f(x)$ بصيغة لا تحوي قيمةً مطلقة. $\frac{3\sqrt{3}}{2} + 1$.

b . ادرس نهاية f عند حدود مجالات D_f . ثم أوجد $f'(x)$ وادرس إشارته على مجالات D_f .

② ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

③ a . تحقق من أن المستقيمين اللذين معادلتاهما $y = x + 1$ و $y = -x - 1$ هما، بالترتيب،

مقاربان مائلان للخط البياني C عند $+\infty$ وعند $-\infty$. ادرس وضع C بالنسبة إلى هذين المقاربين.

b . أوجد معادلةً للمماس T للخط البياني C في النقطة A منه علماً أن فاصلة A تساوي الصفر.

c . ارسم T ومقاربي C ثم ارسم C .

④ أثبت أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلاً وحيداً α في المجال $]-1, 1[$ وأوجد مجالاً طوله 10^{-1}

تنتمي إليه α

الحل

① لما كان $|x + 1| = x + 1$ في حالة $x > -1$ و $|x + 1| = -x - 1$ في حالة $x < -1$ استنتجنا أن

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1 + \frac{x}{x^2 - 1} & : x < -1 \\ x + 1 + \frac{x}{x^2 - 1} & : x > -1, x \neq 1 \end{cases}$$

ومنه

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \end{array}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 - \frac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)^2} & : x < -1 \\ \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2} & : x > -1, x \neq 1 \end{cases}$$

إذن $f'(x) < 0$ على $]-\infty, -1[\cup]1, \sqrt{3}[$ و $f'(x) > 0$ على $]\sqrt{3}, +\infty[$.

② ومنه جدول التغيرات:

x	$-\infty$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		-	- 0 -		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	$-\infty$	$+\infty$	\searrow	$1 \searrow -\infty$
					$+\infty \searrow$	$\frac{3\sqrt{3}}{2} + 1 \nearrow +\infty$

③ نتأمل تابع الفرق $g(x) = f(x) - (x + 1)$ في حالة $x \in]-1, 1[\cup]1, +\infty[$ لدينا

$$f(x) - (x + 1) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

ومن ثم $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1)) = 0$. فالمستقيم Δ الذي معادلته $y = x + 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f في جوار $+\infty$.

ويكون C فوق Δ على المجال $]1, +\infty[$ لأن $\frac{x}{x^2 - 1} > 0$ على هذا المجال. ويكون C تحت Δ على المجال $]0, 1[$ وفوقه على المجال $] -1, 0[$ في حين يتقاطع مع C على هذا المجال عند $(0, 0)$. بقي أن ندرس الموقع النسبي للخط C بالنسبة إلى Δ على $]-\infty, -1[$. على هذا المجال كل من التابعين f و $x \mapsto -x - 1$ متناقصاً تماماً، إذن التابع $g : x \mapsto f(x) - (x + 1)$ متناقصاً تماماً على $]-\infty, -1[$ ولدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} g(x) = -\infty$. إذن يوجد قيمة وحيدة γ من المجال $]-\infty, -1[$ ينعدم عندها التابع g . وبملاحظة أن $g(-\frac{8}{5}) = \frac{34}{195} > 0$ و $g(-\frac{3}{2}) = -\frac{1}{5} < 0$ نستنتج أن $-1.6 < \gamma < -1.5$ و $-0.6 < f(\gamma) < -0.5$. إذن

x	$-\infty$	γ	-1	0	1	$+\infty$
$g(x)$		+	-	+	-	+
C		Δ فوق	Δ تحت	Δ فوق	Δ تحت	Δ فوق

■ وبالمثل نتأمل تابع الفرق $h(x) = f(x) + (x + 1)$ في حالة $x \in]-\infty, -1[$ لدينا

$$f(x) + (x + 1) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

ومن ثم $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + (x + 1)) = 0$. فالمستقيم Δ' الذي معادلته $y = -x - 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f في جوار $-\infty$.

ويكون C تحت Δ' على المجال $]-\infty, -1[$ لأن $\frac{x}{x^2 - 1} < 0$ على هذا المجال. ويكون C فوق Δ' على كل من المجالين $]-1, 0[$ و $]1, +\infty[$ لأن $h(x)$ يساوي مجموع مقدارين موجبين هما $f(x)$ و $x+1$ على هذين المجالين. بقي أن ندرس الموقع النسبي للخط C بالنسبة إلى Δ' على $]0, 1[$. بدراسة بسيطة للتابع h على هذا المجال، نجد أنه ينعدم مرة واحدة عند β تحقق $0.8 < \beta < 0.9$ ومن ثم $-1.8 < f(\beta) < -1.9$.

إذن


x	$-\infty$	-1	0	β	1	$+\infty$
$h(x)$		-	+	+	-	+
C		تحت Δ'	فوق Δ'	فوق Δ'	تحت Δ'	فوق Δ'

ملاحظة. تُعدّ دراسة الموقع النسبي للخط C بالنسبة إلى المستقيمين Δ و Δ' مسألة مستقلة بحد ذاتها. لذلك، وما لم نكن نسعى إلى رسم دقيق جداً لهذا المنحني، يمكن الاكتفاء بدراسة الوضع النسبي للخط البياني بالنسبة إلى مقاربيه فقط في جوار $+\infty$ بالنسبة إلى Δ وفي جوار $-\infty$ بالنسبة إلى Δ' . ثم نستنتج الخواص السابقة من الرسم.

b . معادلة المماس في النقطة $A(0,1)$ هي $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1$. فهو يوازي محور


الفواصل.

c . الرسم.



④ f مستمر ومنتاقص تماماً على $]-1, 1[$ ويغير إشارته عليه فللمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد α ينتمي إلى $]-1, 1[$. ونلاحظ أن $f(\frac{3}{4}) = \frac{1}{28} > 0$ و $f(\frac{4}{5}) = -\frac{19}{45} < 0$ ، إذن $\alpha \in]0.75, 0.8[$.

في معلم متجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) ، لدينا النقطتان الثابتتان $A(-3, 4)$ و $B(2, 1)$ والنقطة المتحركة $M(x, 0)$. نقرن بالنقطة M النقطة M' التي نعرفها كما يلي:



- يقطع المستقيم (AM) المحور $(O; \vec{j})$ في m .
- يقطع المستقيم (Bm) المحور $(O; \vec{i})$ في M' .
- نرمزُ إلى فاصلة M' بالرمز $f(x)$.

① بدون حساب، خمن نهاية f عند $+\infty$.

② أثبت أن $f(x) = \frac{8x}{3x-3}$ عندما تختلف x عن 1 وعن -3 ، ثم استنتج نهاية f عند $+\infty$.

③ ادرس نهاية f عند $-\infty$. ما التأويل الهندسي لهذه النتيجة؟

b ادرس نهاية f عند $x = 1$. ما التأويل الهندسي لهذه النتيجة؟

④ عندما $x = -3$ ، يكون المستقيم (AM) موازياً (O, \vec{j}) وتكون m «في اللانهاية». يمكن أن نقول في هذه الحالة أن (Bm) يوازي (O, \vec{j}) وأن M' تقع في $(2, 0)$. نعرّف عندئذ التابع g وفق $g(x) = f(x)$ عندما تختلف x عن 1 وعن -3 ، و $g(-3) = 2$. لماذا يكون g مستمراً عند -3 ؟

ملاحظة: نقول في هكذا حالة إننا مددنا استمرار g ليشمل $x = -3$.

الحل

① عندما تسعى x إلى $+\infty$ يصبح المستقيم (AM) موازياً لمحور الفواصل فتتطبق m على $C(0, 4)$ ، والمستقيم (CB) الذي معادلته $y = -\frac{3}{2}x + 4$ يقطع محور الفواصل في النقطة $M'_\infty(\frac{8}{3}, 0)$. إذن نضمن أن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{8}{3}$.

② بافتراض أن إحداثيتنا m هما $(0, b)$ يكون الشعاعان $\overrightarrow{AM} = \begin{bmatrix} x+3 \\ 0-4 \end{bmatrix}$ و $\overrightarrow{Am} = \begin{bmatrix} 3 \\ b-4 \end{bmatrix}$ مرتبطان خطياً ومنه نحسب $b = 4 + \frac{-12}{x+3} = \frac{4x}{x+3}$ وبالمثل إحداثيتنا M' هما $(f(x), 0)$ والشعاعان

$$\overrightarrow{BM'} = \begin{bmatrix} f(x)-2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad \overrightarrow{Bm} = \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{3x-3}{x+3} \end{bmatrix}$$

مرتبطان خطياً ومنه $f(x) = \frac{8x}{3x-3}$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{8}{3}$.

③ *a* $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{8}{3}$ ، عندما تسعى x إلى $-\infty$ يصبح المستقيم (AM) موازياً لمحور الفواصل،

ومن الطبيعي أن تنطبق عندئذ M' على النقطة $M'_\infty(\frac{8}{3}, 0)$ التي عيَّناها سابقاً.

b $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$. عندما تسعى x إلى 1 يصبح المستقيم (mB) موازياً

لمحور الفواصل ولا يتقاطع معه، وكأن M' في اللانهاية.

④ إذن $g(x) = \frac{8x}{3(x-1)}$ في حالة $x \neq 1$. وهو مستمر عند -3 .

3

التوابع : الاشتقاق

1 تعاريف (تذكرة)

2 مشتقات بعض التوابع المألوفة (تذكرة)

3 تطبيقات الاشتقاق

4 اشتقاق تابع مركب

5 المشتقات من مراتب عليا

نقاط التعلّم الأساسية في هذه الوحدة

- التذكرة بتعريف الاشتقاق، ومشتقات التوابع المألوفة.
- اشتقاق التوابع المركبة.
- تطبيقات الاشتقاق في دراسة التوابع وحلّ المعادلات.
- أمثلة على مشتقات من مراتب عليا.

تَدْرِبْ صَفِيحَة 84


① فيما يأتي C_f هو الخط البياني لتابع f . اكتب معادلةً لمماس C_f في النقطة A من C_f التي فاصلتها 4.

$$\begin{array}{ll} f(x) = x^2 & \text{2} \\ f(x) = \frac{1}{x} & \text{1} \\ f(x) = \frac{1}{x+1} & \text{4} \\ f(x) = \sqrt{2x+1} & \text{3} \end{array}$$

الحل

معادلة المماس في النقطة التي فاصلتها 4 هي $y = f(4) + f'(4)(x - 4)$ ومنه

$$\begin{array}{ll} y = -16 + 8x & \text{2} \\ y = \frac{1}{2} - \frac{1}{16}x & \text{1} \\ y = \frac{9}{25} - \frac{x}{25} & \text{4} \\ y = \frac{5}{3} + \frac{1}{3}x & \text{3} \end{array}$$



② في الشكل المرافق، C_f هو الخط البياني لتابع f . تأمل الشكل وأجب عن الأسئلة الآتية :

- ① عيّن ما كلاً من $f(0)$ و $f(2)$ و $f(-1)$ و $f'(0)$ و $f'(2)$ و $f'(-1)$.
- ② ما عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ؟ أعطِ عددين صحيحين متتاليين يحصران كلاً من حلول المعادلة $f(x) = 0$.

الحل

a	-1	0	2	
$f'(a)$	2	0	$-\frac{1}{2}$	①
$f(a)$	1	2	-1	

- ② للمعادلة $f(x) = 0$ حلّان، أحدهما في المجال $[-2, -1]$ والآخر في المجال $[1, 2]$.
- ③ فيما يأتي، احسب التابع المشتق للتابع f مبيّناً المجموعة التي تحسب المشتق عليها.

$$\begin{array}{llll} f(x) = x^4 - 2x\sqrt{x} & \text{3} & f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{4} & \text{2} & f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{\sqrt{2}}{3} & \text{1} \\ f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}} & \text{6} & f(x) = \frac{x-1}{x^2-4} & \text{5} & f(x) = \frac{2}{x+1} - x & \text{4} \\ f(x) = \frac{\sin x}{\cos x} & \text{9} & f(x) = \frac{\sin x}{x} & \text{8} & f(x) = x \cos x & \text{7} \\ f(x) = \frac{1 + \sin x}{2 + \cos x} & \text{12} & f(x) = \frac{\cos x}{\sin x - 1} & \text{11} & f(x) = \sin x \cos x & \text{10} \end{array}$$

الحل

1. على \mathbb{R} لدينا $f'(x) = 2x^2 - x + 1$.
2. على \mathbb{R} لدينا $f'(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$.

3. على $]0, +\infty[$ لدينا $f'(x) = 4x^3 - 3\sqrt{x}$. وإذا كتب الطالب $]0, +\infty[$ بدلاً من $]0, +\infty[$ فهذا صحيح أيضاً ولا يطلب تعليقه، فقد جرت دراسته في مثال سابق.

4. على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ لدينا $f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2} - 1$

5. على $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ لدينا $f'(x) = \frac{-x^2 + 2x - 4}{(x^2 - 4)^2}$

6. على $]0, +\infty[$ لدينا $f'(x) = \frac{x-1}{2x\sqrt{x}}$

7. على \mathbb{R} لدينا $f'(x) = \cos x - x \sin x$

8. على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ لدينا $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$


9. على أي مجال لا يحوي مضاعفاً فردياً للعدد $\frac{\pi}{2}$ لدينا $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$

10. على \mathbb{R} لدينا $f'(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$

11. على أي مجال لا يحوي عدداً من الصيغة $\frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) لدينا $f'(x) = \frac{1}{\sin x - 1}$

12. على \mathbb{R} لدينا $f'(x) = \frac{\sin x + 2 \cos x + 1}{(\cos x + 2)^2}$

تَدْرِبْ صَفِيحَة 87



① ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على $[-2, 4]$ وفق $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1}$. عيّن a و b علماً أنّ المستقيم Δ المرسوم في الشكل المجاور مماسٌ للخط C في النقطة A . تحقق أنّ التابع الذي وجدته ينسجم مع مضمون النص.

الحل

C يمرّ بالنقطة $A(2,1)$ إذن $f(2) = 1$. وميل المماس في A هو $f'(2)$ وهو يساوي ميل المستقيم Δ


أي $f'(2) = 1$. ولكن $f'(x) = \frac{-ax^2 + a - 2bx}{(x^2 + 1)^2}$ إذن من $f(2) = 1$ و $f'(2) = 1$ نستنتج أنّ

$$\frac{1}{5}(2a + b) = 1$$




$$\frac{1}{25}(-3a - 4b) = 1$$

وبالحل المشترك نجد $a = 9$ و $b = -13$. ونتحقق بسهولة أنّ A تقع على الخط البياني C للتابع

$$x \mapsto \frac{9x - 13}{x^2 + 1} \quad \text{وأن } \Delta \text{ الذي معادلته } y = x - 1 \text{ مماس للخط } C.$$



② في الشكل المجاور، C هو الخط البياني لتابع f معرفٍ على \mathbb{R} واشتقاقي على $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
أيّ الخطوط البيانية المرسومة في الأشكال الآتية يمكن أن يمثل الخط البياني للتابع المشتق f' ؟



الحل

في الشكل ① الخط البياني للتابع المرسوم يمر بالمبدأ. فلو كان مساوياً لمشتق f لوجب أن يكون المماس للخط C في النقطة $(0, 1)$ أفقياً وهذا خُلف. إذن لا يمكن أن يمثل ① الخط البياني للتابع f' .
في الشكل ③ الخط البياني للتابع المرسوم يقترب من -1 عندما تسعى x إلى $(-1)^-$. فلو كان مساوياً لمشتق f لوجب أن يكون ميل المماس من اليسار للخط C في النقطة $(-1, -1)$ مساوياً -1 وهذا خُلف أيضاً لأن C له مماس شاقولي في هذه النقطة. وكذلك نلاحظ أنّ المماس للخط C عندما تسعى x إلى اللانهاية يصبح موازياً للمقارب الذي ميله 2 ، وهذا يوحي بأنّ للخط البياني للمشتق f' مقارب أفقي معادلته $y = 2$. إذن في جميع الأحوال لا يمكن أن يمثل ③ الخط البياني للتابع f' .

إذن الشكل ② هو الخط البياني للتابع f' .

③ ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x^3 - x^2 + ax$. عيّن العدد الحقيقي a ليكون للتابع f قيمة حدية محلياً عند $x = 1$.

الحل

يجب أن يكون $f'(1) = 0$ ومنه $a = -1$.

④ ليكن f التابع المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ وفق $f(x) = \frac{ax^2 + bx + 1}{x - 1}$ حيث a و b عدنان حقيقيّان. نهدف إلى البحث عن قيم a و b بحيث يتحقّق الشرطان الآتيان:

• $f(-1)$ قيمة حدية محلياً للتابع.

• هذه القيمة الحدية محلياً معدومة.

① لماذا $f'(-1) = 0$ و $f(-1) = 0$ ؟

② عيّن a و b ، ثمّ تحقق أنّ التابع الذي حصلت عليه موافق لشروط المسألة.

الحل

1 • $f(-1) = 0$ قيمة حديّة محلياً للتابع، إذن $f'(-1) = 0$.

• هذه القيمة الحدية محلياً معدومة، إذن $f(-1) = 0$.

2 • ولكن $f'(x) = a - \frac{a+b+1}{(x-1)^2}$ إذن من $f(-1) = 0$ و $f'(-1) = 0$ نستنتج أنّ

$$\frac{1}{2}(-a + b - 1) = 0$$

$$\frac{1}{4}(3a - b - 1) = 0$$

وبالحل المشترك نجد $a = 1$ و $b = 2$. وفي هذه الحالة يكون $f(x) = \frac{(x+1)^2}{x-1}$ وهو ينعدم هو

ومشتقه عند $x = -1$.

5 • ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x^3 - 3x + 5$

1 • ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

2 • تحقق أنّ للمعادلة $f(x) = 0$ جذراً وحيداً يقع بين -3 و -2 . احصر هذا الجذر في مجال

لا يزيد طوله على 10^{-1} .

الحل

1 • هنا $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. ولدينا $f'(x) = 3(x^2 - 1)$ ومنه جدول التغيرات

الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	7	\searrow	3	\nearrow	$+\infty$

2 • على المجال $[-1, +\infty[$ الحد الأدنى للتابع f يساوي 3 ، فليس للمعادلة $f(x) = 0$ حل على

المجال $[-1, +\infty[$.

والتابع f مستمرّ ومتزايدٌ تماماً على $]-\infty, -1[$ ويحقق $]-\infty, 7[$ ولأنّ $0 < 7$

استنتجنا أنّه يوجد حلّ وحلّ واحد فقط α للمعادلة $f(x) = 0$ ينتمي إلى المجال $]-\infty, -1[$. فإذا

استفدنا من النقطة السابقة استنتجنا أنّ α هو الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = 0$ في \mathbb{R} .

وعلاوة على ذلك، نرى أنّ $f(-2) = 3$ و $f(-3) = -13$ ، إذن $\alpha \in [-3, -2]$. وأخيراً بملاحظة

أنّ $f(-2.2) = 0.952 > 0$ و $f(-2.3) = -0.267 < 0$ نرى أنّ $-2.3 < \alpha < -2.2$.

① في التمرينات الآتية، احسب مشتق f على المجموعة D المشار إليها في كل حالة.

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}, \quad f(x) = \left(\frac{x+1}{x+2} \right)^3 \quad ②$$

$$D = \mathbb{R}, \quad f(x) = (2x^3 - 1)^5 \quad ①$$

$$D = \mathbb{R}, \quad f(x) = x\sqrt{x^2 + 1} \quad ④$$

$$D = \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) \quad ③$$

$$D = \mathbb{R} \setminus [-1, 2], \quad f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-2}} \quad ⑥$$

$$D = \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \quad ⑤$$

$$D = [0, \frac{\pi}{2}], \quad f(x) = \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} \quad ⑧$$

$$D = [0, \frac{\pi}{2}], \quad f(x) = \sqrt{\cos x} \quad ⑦$$

$$D = [0, \frac{\pi}{2}], \quad f(x) = \tan^2 x \quad ⑩$$

$$D = [0, \frac{\pi}{6}], \quad f(x) = \tan(3x) \quad ⑨$$

الحل

$$f'(x) = \frac{3(x+1)^2}{(x+2)^4} \quad ②$$

$$f'(x) = 30x^2(1 - 2x^3)^4 \quad ①$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 1}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad ④$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{1}{6}(3x + \pi)\right) \quad ③$$

$$f'(x) = -\frac{3}{2\sqrt{(x-2)^3(x+1)}} \quad ⑥$$


$$f'(x) = \frac{1-x}{2(x^2 + x + 1)^{3/2}} \quad ⑤$$

$$f'(x) = \frac{(\sin x)(3 - \cos^2 x)}{\cos^4 x} \quad ⑧$$

$$f'(x) = -\frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}} \quad ⑦$$

$$f'(x) = 2(\tan x + \tan^3 x) \quad ⑩$$

$$f'(x) = 3(1 + \tan^2(3x)) \quad ⑨$$



② في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، هي معادلة للدائرة C

التي مركزها O ونصف قطرها 1. وعليه فإن ربع الدائرة C

المرسوم في الشكل المرافق، هو الخط البياني للتابع f المعرف على

$$\text{المجال } [0, 1] \text{ وفق } f(x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

① احسب $f'(x)$ على المجال $[0, 1]$.

② استنتج معادلة للمماس T للدائرة C في النقطة A التي تساوي

$$\frac{1}{2} \text{ فاصلتها.}$$

③ تحقق أن المستقيم (OA) والمماس T متعامدان.

الحل

$$1 \quad f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$2 \quad f'(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{إذن معادلة المماس } T \text{ في } A(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}) \text{ هي } y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \text{ وميله}$$

$$m = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$2 \quad \text{معادلة } (OA) \text{ } y = \sqrt{3}x \text{ وميله } m' = \sqrt{3} \text{ ونرى أن } mm' = -1 \text{ إذن } T \perp (OA)$$

3 في الشكل المرافق نجد الخط البياني C للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

1 تحقق أن f تابع زوجي.


2 احسب نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

3 علّل كون المستقيم الذي معادلته $y = x$ مقارباً مائلاً للخط

البياني C في جوار $+\infty$ ؟

4 ادرس تغيرات f . هل من توافق بين نتائج الدراسة والنتائج

التي تستخلصها من الخط البياني؟



الحل

1 التابع معرف على \mathbb{R} فالشرط الأول محقق حكماً. وكذلك فإنّ

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 1} = \sqrt{x^2 + 1} = f(x)$$

إذن f تابع زوجي.

2 لأنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1) = +\infty$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

3 لنضع $g(x) = f(x) - x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x}$ نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ وأنّ $g(x) > 0$ أيّاً كانت

قيمة x . إذن المستقيم Δ الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب للخط البياني C . والخط C يقع دوماً فوق Δ .

4 لما كان $x \mapsto x^2$ متناقصاً تماماً على \mathbb{R}_- و متزايداً تماماً على \mathbb{R}_+ ، والتابع $x \mapsto \sqrt{x+1}$

متزايد تماماً استنتجنا أنّ تركيب هذين التابعين f متناقص تماماً على \mathbb{R}_- و متزايداً تماماً على \mathbb{R}_+ ،

ومنه جدول تغيرات f الآتي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	1	$+\infty$

ونلاحظ انسجام هذه النتائج مع الخط البياني المرسوم للتابع f .


أنشطة

نشاط 1 دراسة تابع، التوابع المساعدة

1 دراسة تابع

في الحالة العامة، المقصود بدراسة تابع f هو تعيين مجموعة تعريفه D_f ، وحساب نهاياته عند أطراف المجالات المكوّنة لمجموعة تعريفه والبحث عن مقاربات خطه البياني C_f ، ودراسة تغيراته، وأخيراً رسم خطه البياني. وأحياناً، نكتشف بسهولة أنّ f زوجي، أو فردي، أو دوري، مما يفيد في جعل دراسة التابع تقتصر على مجموعة جزئية من D_f ثم تُمدد الدراسة إلى كامل D_f مستفيدين من طبيعة الخاصة التي يتمتع بها التابع.


2 دراسة تابع كسري



لنتأمّل التابع الكسري f المعرف على $]-1, +\infty[$ وفق الصيغة $f(x) = \frac{1-x}{x^3+1}$. لقد رسمنا باستعمال برنامج متخصص الخط البياني C للتابع f في معلم متجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) .

ستسمح الدراسة الآتية بتعرّف صفات f ومن ثمّ توضيح كيفية الوصول إلى رسم خطه البياني C دون استعمال أي برنامج وخصوصاً سير الخط البياني على المجال $[0, 1]$. في الحقيقة، لا يعطي الخط المرسوم باستعمال الحاسوب دائماً، جميع المعلومات المتعلقة بالتابع، لكنّه يزودنا بتصوّر مفيد جداً عن تلك المعلومات.

① احسب $f'(x)$ على المجال $]-1, +\infty[$ وتحقّق أنّ إشارة $f'(x)$ تماثل إشارة $2x^3 - 3x^2 - 1$.

في حالة تعذر تعيين إشارة $f'(x)$ جبرياً، ندرس تغيرات تابع مساعد g نستنتج منه الإشارة المطلوبة. 

② نرمز بالرمز g إلى التابع المعرف على $]-1, +\infty[$ وفق $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$.

a. ادرس تغيرات g .

b. أثبت أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α على $]-1, +\infty[$ ، وأنّ α ينتمي إلى المجال $[1.6, 1.7]$.

c. استنتج إشارة $g(x)$.

- ③ بالاستفادة من النتائج السابقة، نظم جدولاً بتغيرات f .
- ④ اكتب معادلةً للمماس Δ للخط البياني C في النقطة A منه التي تساوي فاصلتها 0 . وادرس الوضع النسبي للخط C ومماسه Δ على المجال $]-1,1[$.
- ⑤ أثبت أن الخط C يقع فوق المستقيم d مماسه في النقطة التي تساوي فاصلتها 1 .
- ⑥ ارسم Δ و d ثم ارسم C .

الحل

① لدينا $f'(x) = \frac{2x^3 - 3x^2 - 1}{(x^3 + 1)^2}$ ، إذن إشارة $f'(x)$ تماثل إشارة $2x^3 - 3x^2 - 1$.

② لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $g(-1) = -6$. وكذلك فإن $g'(x) = 6x(x-1)$ إذن للتابع g

جدول التغيرات الآتي:

x	-1	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	0	-
$g(x)$	-6	↗	-1	↘
			-2	↗
				$+\infty$

b . نستنتج من الجدول أن $g(]-1,1[) =]-6,-1[$ فالتابع g لا يندعم على $]-1,1[$. أما على $[1,+\infty[$ فالتابع g تابع مستمر ومطرّد تماماً ويحقق $g([1,+\infty[) = [-2,+\infty[$. إذن للمعادلة $g(x) = 0$ حل واحد α في المجال $[1,+\infty[$. ولما كان g لا يندعم على $]-1,1[$ ، استنتجنا أن α هو الحل الوحيد للمعادلة $g(x) = 0$ في المجال $]-1,+\infty[$. وعلاوة على ذلك، انطلاقاً من الصيغة

$$g(x) = (2x - 3)x^2 - 1$$

$$g(1.6) = 0.2 \times 2.56 - 1 = 0.512 - 1 < 0$$

$$g(1.7) = 0.4 \times 2.89 - 1 = 1.156 - 1 > 0$$

إذن $1.6 < \alpha < 1.7$.

c . نستنتج من الدراسة السابقة أن $g < 0$ على $]-1,\alpha[$ و $g > 0$ على $]\alpha,+\infty[$.

③ لما كان $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$ استنتجنا أن المستقيم الذي معادلته $x = -1$ مقارب شاقولي للخط

البياني C . وكذلك فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، إذن محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مقارب أفقي للخط

البياني C في جوار $+\infty$. واستناداً إلى دراسة إشارة المشتق التي أنجزناها سابقاً يمكن أن نكتب جدول

التغيرات الآتي للتابع f :

x	-1	α	$+\infty$
$f'(x)$		-	0
$f(x)$		$+\infty$	↘
			$f(\alpha)$
			↗
			0

حيث $f(\alpha) \approx -0.12$ استناداً إلى القيمة التقريبية التي حسبناها للعدد α .

④ لما كان $f(0) = 1$ و $f'(0) = -1$ استنتجنا أن $y = 1 - x$ هي معادلة للمماس Δ للخط البياني C في النقطة A منه التي تساوي فاصلتها 0 . وفوق ذلك نرى أن

$$f(x) - (1 - x) = -\frac{x^3(1-x)}{x^3+1} = \frac{x^2}{x^3+1} \cdot x(x-1)$$


إذن تتفق إشارة $f(x) - (1 - x)$ مع إشارة $x(x-1)$ على $]-1, 1[$ ، إذن يقع C فوق Δ على $]-1, 0[$ ، وتحتة على $]0, 1[$ ، وهو يتقاطع معه مجدداً في النقطة $(1, 0)$.

⑤ لدينا $f(1) = 0$ و $f'(1) = -\frac{1}{2}$ إذن $y = \frac{1}{2}(1 - x)$ هي معادلة للمماس d للخط البياني C في النقطة التي فاصلتها 1 .

وعلاوة على ذلك نرى أن

$$f(x) - \frac{1}{2}(1 - x) = \frac{(1-x)^2(1+x+x^2)}{2(x^3+1)}$$

إذن إشارة $f(x) - \frac{1}{2}(1 - x)$ موجبة على $]-1, +\infty[$ ، والخط C يقع فوق d على $]-1, +\infty[$.



نشاط 2 مماس شاقولي

1 الحالة العامة


لنتأمل تابعاً f مستمراً عند نقطة a تنتمي إلى أحد مجالات D_f . إذا كان

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty \quad \text{أو} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$$

فإن الخط البياني C_f للتابع f ، في معلم متجانس مماساً شاقولياً في النقطة $A(a, f(a))$. هندسياً، يفسر

الشرطان « f مستمر عند a و $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ » بأن ميل القاطع للخط C_f في النقطة

$A(a, f(a))$ يسعى إلى $+\infty$ (أو $-\infty$)، أي إن القاطع يسعى إلى المستقيم الذي معادلته $x = a$.



2 حالة التابع $f : x \mapsto \sqrt{x}$

تعلم أن f مستمر عند الصفر، لكنه غير اشتقاقي عند الصفر. أثبت أن محور الترتيب مماس لخطه البياني في مبدأ المعلم.

3 دراسة التابع $f : x \mapsto x\sqrt{x(2-x)}$

① a . تحقق أن f معرف على المجال $]0, 2[$.

b . أثبت أن f اشتقاقي على $]0, 2[$ واحسب $f'(x)$ على هذا المجال.

② ما نهاية $\frac{f(x)}{x}$ عندما تسعى x إلى الصفر؟ استنتج أن f اشتقاقي عند الصفر.

③ ما نهاية $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ عندما تسعى x إلى 2؟ هل f اشتقاقي عند $x = 2$ ؟

④ نرمز إلى الخط البياني للتابع f ، في معلم متجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) ، بالرمز C .

a. ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

b. عيّن مماسي C في النقطتين $A(0,0)$ و $B(2,0)$.

c. ارسم مماسي C في A و B ثمّ ارسم C .

الحل

② هذا صحيح لأن $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ومن ثمّ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = +\infty$

③ a. f معرف على المجال $[0,2]$ لأن $x(2-x)$ موجب على هذا المجال.

b. على $]0,2[$ التابع $u : x \mapsto x(2-x)$ تابع اشتقاقي وموجب تماماً إذن $x \mapsto \sqrt{u(x)}$ أيضاً اشتقاقي على $]0,2[$ ، وكذلك يكون $x \mapsto x\sqrt{u(x)}$ ، وفي حالة x من $]0,2[$:

$$f'(x) = \sqrt{u(x)} + x \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{3x - 2x^2}{\sqrt{x(2-x)}}$$

② في حالة x من $]0,2[$ لدينا $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \sqrt{x(2-x)}$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. فالتابع f


اشتقاقي عند 0 و $f'(0) = 0$

③ في حالة x من $]0,2[$ لدينا $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = -x\sqrt{\frac{x}{2-x}}$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = -\infty$

فالتابع f ليس اشتقاقياً عند 2 ولكن يقبل خطّه البياني مماساً شاقولياً عند 2.

④ a. جدول تغيرات f هو

x	0		$\frac{3}{2}$	2
$f'(x)$	0	+	0	-
$f(x)$	0	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘ 0



④ b. مماس C في $A(0,0)$ هو محور الفواصل، ومماس C في

$B(0,2)$ هو المستقيم الذي معادلته $x = 2$.

④ c. الرسم مبيّن في الشكل المجاور.

نشاط 3 دراسة تابع مثلثاتي

1 كيف ندرس تابعاً مثلثاتياً؟

تذكّر

• التابعان \sin و \cos دوريان ويساوي الدورُ الأصغر لكل منهما 2π . لأن:

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x \quad \text{و} \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x$$

• التابع \tan دوري ويساوي دوره الأصغر π . لأن:

$$\tan(x + \pi) = \tan x \quad \text{حيث} \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \text{و} \quad k \in \mathbb{Z}$$

• التابعان $x \mapsto \sin(ax + b)$ و $x \mapsto \cos(ax + b)$ والدورُ الأصغر لكل منهما هو $\frac{2\pi}{|a|}$.

غالباً، ما تفيد الصفات الخاصة بالتوابع المثلثاتية في استنتاج مجال دراسة تابع f معرّف على D_f :

■ إذا كان T دوراً للتابع f ، كان T موجباً تماماً، وأياً كان العدد الحقيقي x ،

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{و} \quad x + T \in D_f \quad \text{كان} \quad x \in D_f$$

في هذه الحالة يمكن أن ندرس التابع على مجال طوله T .

■ إذا كان f زوجياً أو فردياً، يكفي أن ندرسه على $[0, \frac{T}{2}] \cap D_f$ ، ثم:

□ إذا كان f زوجياً، أعطى التناظر المحوري بالنسبة إلى محور الترتيب الخط البياني على

$$[-\frac{T}{2}, 0] \cap D_f$$

□ وإذا كان f فردياً، أعطى التناظر بالنسبة إلى المبدأ O الخط البياني على $[-\frac{T}{2}, 0] \cap D_f$.

■ بعدئذ، يسمح الانسحابان للذان شعاعاهما $T\vec{i}$ و $-T\vec{i}$ بالحصول على الخط البياني على

مجالات أخرى.

وخلاف ذلك، تجري دراسة التوابع المثلثاتية بمثل دراسة التوابع الأخرى.

2 دراسة التابع $x \mapsto 2\sin x + \sin 2x$

لنتأمل التابع f المعرّف على \mathbb{R} وفق $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$.

① تحقّق أنّ f دوريٌّ وأنّ دورّه 2π له. ادرس الصفة الزوجية أو الفردية للتابع f . استنتج إمكانية

دراسة f على المجال $[0, \pi]$.

② أثبت أنّه، في حالة عدد حقيقي x لدينا $f'(x) = 2(2\cos x - 1)(\cos x + 1)$.

③ ادرس تغيرات f على المجال $[0, \pi]$.

مساعدة: ستحتاج إلى حل المتراجحة $\cos x > \frac{1}{2}$. لهذا، يمكن استعمال الدائرة المثلثاتية، أو

الخط البياني للتابع $x \mapsto \cos x$ على المجال $[0, \pi]$. وكذا الأمر عند دراسة إشارة $\cos x + 1$.

④ ارسم الخط البياني للتابع f على المجال $[0, \pi]$ ، ثمّ على المجال $[-2\pi, 2\pi]$.

الحل

نتأمل التابع f المعرّف على \mathbb{R} وفق $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$.

① التابع معرّف على كامل \mathbb{R} ، ونلاحظ أنّه مهما كانت x كان

$$f(x + 2\pi) = 2 \sin(x + 2\pi) + \sin(2x + 4\pi) = 2 \sin x + \sin 2x = f(x)$$

فالتابع f تابع دوري ويقبل العدد 2π دوراً. فتكفي مثلاً دراسته على المجال $[-\pi, \pi]$. ولدينا أيضاً

$$f(-x) = 2 \sin(-x) + \sin(-2x) = -2 \sin x - \sin 2x = -f(x)$$

وذلك مهما كانت قيمة x ، إذن f تابعٌ فردي. فتكفي دراسته على المجال $[0, \pi]$.

② من ناحية أخرى لدينا

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \cos x + 2 \cos 2x = 2(2 \cos^2 x + \cos x - 1) \\ &= 2(2 \cos x - 1)(\cos x + 1) \end{aligned}$$


إنّ $1 + \cos x \geq 0$ دوماً إذن إشارة $f'(x)$ تتفق مع إشارة $(2 \cos x - 1)$ ، وعلى المجال $[0, \pi]$ ،

للمعادلة $\cos x = \frac{1}{2}$ حلٌ وحيد هو $x = \frac{\pi}{3}$.

③ إذن للتابع جدول التغيرات الآتي على المجال $[0, \pi]$:

x	0		$\frac{\pi}{3}$		π
$f'(x)$	4	+	0	-	0
$f(x)$	0	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↘	0

④ الرسم.



نشاط 4 نهايات ومشتقات

① المبدأ

ليكن g تابعاً ما، وليكن f تابعاً يحقق عند كل x من مجال مفتوح يحوي a و $x \neq a$ العلاقة

$$f(x) = \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

ثمّ لنفترض إضافةً إلى ذلك أنّ التابع g اشتقاقي عند a ، عندئذٍ يقبلُ f نهايةً عند a ويكون

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = g'(a)$$

إذن، لإزالة حالة عدم التعيين من الصيغة « $\frac{0}{0}$ » لتابع f عند نقطة a ، يمكن أن نحاول كتابة f

بالشكل $f(x) = \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$ حيث g اشتقاقي عند a . عندئذ يكون $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = g'(a)$.

2 تطبيقات

① ليكن f التابع المعرف بالعلاقة $f(x) = \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$. يقودنا البحث عن نهاية f عند الصفر

إلى إحدى صيغ عدم التعيين. ضع $g(x) = \sqrt{x+4}$ لكي تتمكن من حساب نهاية f عند الصفر. ثم احسب هذه النهاية.

② ننوي دراسة نهاية التابع $f : x \mapsto \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$ عند $\frac{\pi}{2}$.

a . تحقق أن الحساب المباشر يقود إلى صيغة عدم تعيين.

b . لاحظ أن $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ ، واستنتج أن نهاية f عند $\frac{\pi}{2}$ تساوي العدد المشتق للتابع $x \mapsto \cos x$

عند $\frac{\pi}{2}$ ، ماذا تساوي هذه النهاية؟

③ ادرس، في كل من الحالتين الآتيتين، نهاية التابع f في النقطة التي يشار إليها.

a . عند $x = \frac{\pi}{4}$ $f(x) = \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}}$

b . عند $x = 1$ $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2}}{x - 1}$

الحل

① ② بوضع $g(x) = \sqrt{x+4}$ نلاحظ أن $f(x) = \frac{g(x) - g(0)}{x}$ ولكن التابع g اشتقاقي على

$]-4, +\infty[$ ومشتقه $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+4}}$ ، وبوجه خاص $g'(0) = \frac{1}{4}$ إذن نستنتج من كون

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = g'(0) = \frac{1}{4}$$

أن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{4}$

② ② هنا أيضاً $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x) - \cos(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = \cos'(\frac{\pi}{2}) = -\sin(\frac{\pi}{2}) = -1$ إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$


② ③ هنا نجد بسهولة أن $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}} = \tan'(\frac{\pi}{4}) = 1 + \tan^2(\frac{\pi}{4}) = 2$

وبوضع $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ نجد $g'(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2}}{x - 1} = g'(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

نشاط 5 الاشتقاق من اليمين ومن اليسار

1 حالة عامة: تعريف نصف المماس

عندما يكون التابع f مستمراً على مجالٍ يحوي a ، ويقبلُ التابع $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ نهايةً ℓ من اليمين عند a ، نقول عندئذٍ إنَّ التابع f **اشتقائيٌّ من اليمين** عند a ، ونسمي العدد المشتق من اليمين للتابع f في a ، ونرمز إليه بالرمز $f'(a^+)$. نعرّف بأسلوب مماثل **الاشتقاق من اليسار** عند a ونرمز إلى العدد المشتق من اليسار بالرمز $f'(a^-)$ في حال وجوده.



في حال وجود $f'(a^+)$ و $f'(a^-)$ نقول إنَّ الخط البياني C_f للتابع f يقبل في النقطة $A(a, f(a))$ نصف مماس من اليمين ونصف مماس من اليسار. ويكون $f'(a^+)$ ميلَ نصف المماس من اليمين، و $f'(a^-)$ ميلَ نصف المماس من اليسار.

2 دراسة مثال

ليكن f التابع المعرّف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \frac{x+2}{|x|+1}$.

① ادرس قابلية اشتقاق f عند الصفر من اليمين، ثمّ اكتب معادلةً لنصف المماس من اليمين لخطه البياني C_f في النقطة $A(0, 2)$.

② ادرس قابلية اشتقاق f عند الصفر من اليسار، ثمّ اكتب معادلةً لنصف المماس من اليسار لخطه البياني في النقطة $A(0, 2)$.

③ ارسم نصفي المماسين السابقين وارسم C_f على المجال $[-2, 2]$.

الحل

① ② في حالة $x > 0$ لدينا $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{x} \left(\frac{x+2}{x+1} - 2 \right) = \frac{-1}{x+1}$ ، إذن

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -1$$

ومعادلة نصف المماس من اليمين للخط البياني هي $y = 2 - x$.

② ② في حالة $x < 0$ لدينا $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{x} \left(\frac{x+2}{-x+1} - 2 \right) = \frac{3}{1-x}$ ، إذن

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 3$$

ومعادلة نصف المماس من اليسار للخط البياني هي $y = 2 + 3x$.

② ③ بملاحظة أنّ


$$f(x) = \begin{cases} \frac{2+x}{1+x} & : x \geq 0 \\ \frac{2+x}{1-x} & : x \leq 0 \end{cases}$$

نستنتج أنّ

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-1}{(1+x)^2} & : x > 0 \\ \frac{3}{(1-x)^2} & : x < 0 \end{cases}$$

ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f على $[-2, 2]$:

x	-2	0	2
$f'(x)$	+	3	-
$f(x)$	0	↗ 2	↘ $\frac{4}{3}$



نشاط 6 تأطير (حصر) توابع مثلثاتية

① تمهيد

لنتأمل تابعين f و g معرفين واشتقاقيين على المجال $D = [0, +\infty[$. ولنفترض أنّ

$$f'(x) \leq g'(x) \text{ أيّاً يكن } x \text{ من } D.$$

بدراسة التابع h المعرف على D وفق $h(x) = f(x) - f(0) - g(x) + g(0)$ أثبت أنّ:

$$(*) \quad f(x) - f(0) \leq g(x) - g(0)$$

② حصر $\sin x$ و $\cos x$.

① a . أثبت أنّ $\sin x \leq x$ ، أيّاً يكن $x \geq 0$.

b . باختيار $f(x) = -\cos x$ ، و $g(x) = \frac{x^2}{2}$ برهن مستفيداً من التمهيد أنّه في حالة $x \in \mathbb{R}$

$$(\Delta) \quad 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1$$

② a . أثبت أنّ $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$ ، أيّاً يكن $x \geq 0$.

b . وأنّ $1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ ، أيّاً يكن $x \in \mathbb{R}$.

c . وأخيراً بين أنّ $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$ ، أيّاً يكن $x \geq 0$.

③ تطبيقات

① استنتج مما سبق أنّ العدد $1 - \frac{x^2}{2}$ تقريباً للعدد $\cos x$ بخطأ لا يتجاوز $\frac{x^4}{24}$. ما الخطأ الذي

نرتكبه عندما نكتب $\cos(0.1) = 0.995$ ؟

② احسب نهاية $\frac{\cos x - 1}{x^2}$ عندما يسعى المتحول x إلى الصفر.

③ احسب نهاية $\frac{x - \sin x}{x^3}$ عندما يسعى المتحول x إلى الصفر.

الحل

① نلاحظ أنّ $h'(x) = f'(x) - g'(x) \leq 0$ على $D = [0, +\infty[$ ، فالتابع h متناقص على D . ولكن $h(0) = 0$ ، إذن $h(x) \leq h(0) = 0$ أيّاً كانت x من D . وهذا يبرهن المتراجحة المطلوبة.

② حصر $\sin x$ و $\cos x$.

① a . بتطبيق التمهيد على $f(x) = \sin x$ و $g(x) = x$ نستنتج من كون $\cos x \leq 1$ أنّ $\sin x \leq x$ في حالة $x \geq 0$.

① b . بتطبيق التمهيد على $f(x) = -\cos x$ و $g(x) = \frac{x^2}{2}$ نستنتج من كون $\sin x \leq x$ على D أنّ

$1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2}$ في حالة $x \geq 0$. ولكنّ طرفي هذه المتراجحة زوجيان، إذن تتحقّق المتراجحة (Δ) على \mathbb{R} .

② a . بتطبيق التمهيد على $f(x) = x - \frac{x^3}{6}$ و $g(x) = \sin x$ نستنتج من كون $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2}$ على

D أنّ $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x$ في حالة $x \geq 0$ ، ولقد أثبتنا في ① a . أنّ $\sin x \leq x$ في هذه الحالة أيضاً وهذا يبرهن المتراجحة المطلوبة.

② b . نستنتج من ② a . أنّ $-\sin x \leq -x + \frac{x^3}{6}$ على D . إذن بتطبيق التمهيد على $f(x) = \cos x$

و $g(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ نستنتج أنّ $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ على D . أمّا المتراجحة الأخرى فنتج من

(Δ). وبسبب كون طرفي المتراجحة زوجيان، نستنتج أنها تبقى صحيحة على \mathbb{R} .

② c . أصبح الأمر سهلاً. نطبّق التمهيد على $f(x) = \sin x$ و $g(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$ مستقيدين من

نتيجة ② b .

③ تطبيقات

① هذا لأنّ $0 \leq \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \leq \frac{x^4}{24}$

ففي حالة $x = 0.1$ يكون لدينا $0 \leq \cos(0.1) - 0.995 \leq 4.167 \times 10^{-6}$. في حين تعطي الآلة

الحاسبة: $\cos(0.1) - 0.995 \approx 4.165 \times 10^{-6}$.

② بالاستفادة من ②.b لدينا في حالة $x \neq 0$ المتراجحة $-\frac{1}{2} \leq \frac{\cos x - 1}{x^2} \leq -\frac{1}{2} + \frac{x^2}{24}$ ،

وبالاستفادة من مبرهنة الإحاطة، نستنتج عند جعل x تسعى إلى 0 أن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

③ في حالة $x > 0$ نستنتج من ②.c أن

$$\frac{1}{6} - \frac{x^2}{120} \leq \frac{x - \sin x}{x^3} \leq \frac{1}{6}$$

وبتطبيق هذه المتراجحة على $-x$ في حالة $x > 0$ نستنتج أنها تبقى صحيحة في حالة $x < 0$ أيضاً.

إذن مهما تكن $x \neq 0$ فلدينا $\frac{1}{6} - \frac{x^2}{120} \leq \frac{x - \sin x}{x^3} \leq \frac{1}{6}$. وبالاستفادة من مبرهنة الإحاطة، نستنتج

عند جعل x تسعى إلى 0 أن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$.

مُرينات ومساائل

1 اكتب معادلة للمماس للخط البياني للتابع المعطى f في النقطة التي فاصلتها a .

① $f(x) = x^3 + x^2 - 3x$, $a = 0$ ② $f(x) = x\sqrt{x}$, $a = 1$

③ $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, $a = 0$ ④ $f(x) = \frac{x}{x-1}$, $a = 0$

⑤ $f(x) = \cos x$, $a = 0$ ⑥ $f(x) = x \cos x$, $a = \frac{\pi}{4}$

الحل

① $y = -3x$ ② $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$

③ $y = x$ ④ $y = -x$

⑤ $y = 1$ ⑥ $y = \frac{\pi^2 - 4(\pi - 4)x}{16\sqrt{2}}$

2 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ وفق $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 1}$.

① اكتب معادلة لمماس C في النقطة التي تساوي فاصلتها 1.

② هل يقبل C مماساً موازياً للمستقيم الذي معادلته $y = -4x$ ؟

③ هل يقبل C مماساً موازياً للمستقيم الذي معادلته $3x - 2y = 0$ ؟

الحل

نلاحظ أولاً أنّ $f(x) = x - 4 + \frac{5}{x+1}$ ومن ثمّ $f'(x) = 1 - \frac{5}{(1+x)^2}$.

① لما كان $f(1) = -\frac{1}{2}$ و $f'(1) = -\frac{1}{4}$ استنتجنا أنّ معادلة المماس C في النقطة التي تساوي فاصلتها 1 هي $y = -\frac{1}{4}(x+1)$.

② يقبل C مماساً موازياً للمستقيم الذي معادلته $y = -4x$ أي ميله -4 إذا فقط إذا كان للمعادلة $f'(x) = -4$ حلول، وهذه المعادلة تكافئ $1 - \frac{5}{(1+x)^2} = -4$ أو $x^2 + 2x = 0$. لهذه المعادلة

حلان. إذن الجواب في هذه الحالة هو: نعم.

③ بالمثل، يقبل C مماساً موازياً للمستقيم الذي معادلته $3x - 2y = 0$ أي ميله $\frac{3}{2}$ إذا فقط إذا كان للمعادلة $f'(x) = \frac{3}{2}$ حلول، وهذه المعادلة تكافئ $(1+x)^2 + 10 = 0$ وهي مستحيلة الحل لأنّ مجموع حدود موجبة لا ينعدم إلا إذا انعدمت جميعها. إذن الجواب في هذه الحالة هو: لا.

ملاحظة. بوجه عام، يقبل C مماساً ميله m إذا فقط إذا كان $m < 1$.

③ ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \frac{x}{x^2+2}$

① أعط معادلةً لمماس C في النقطة التي تساوي فاصلتها 1.

② هل يقبل C مماساً موازياً للمستقيم الذي معادلته $y = -\frac{1}{4}x$ ؟

③ هل يقبل C مماساً موازياً للمستقيم الذي معادلته $4x - y = 0$ ؟

الحل

نلاحظ أولاً أنّ $f'(x) = \frac{2-x^2}{(2+x^2)^2}$.

① لما كان $f(1) = \frac{1}{3}$ و $f'(1) = \frac{1}{9}$ استنتجنا أنّ معادلة المماس C في النقطة التي تساوي فاصلتها 1 هي $y = \frac{1}{9}(x+2)$.

② يقبل C مماساً موازياً للمستقيم الذي معادلته $y = -\frac{1}{4}x$ أي ميله $-\frac{1}{4}$ إذا فقط إذا كان للمعادلة $f'(x) = -\frac{1}{4}$ حلول، وهذه المعادلة تكافئ بعد الإصلاح $x^4 + 12 = 0$ وهي معادلة مستحيلة الحل. إذن الجواب في هذه الحالة هو: لا.

③ يقبل C مماساً موازياً للمستقيم الذي معادلته $y = 4x$ أي ميله 4 إذا فقط إذا كان للمعادلة $f'(x) = 4$ حلول، وهذه المعادلة تكافئ بعد الإصلاح $4x^4 + 17x^2 + 14 = 0$ وهي معادلة مستحيلة الحل (مجموع حدود موجبة لا ينعدم إلا إذا انعدمت جميعها). إذن الجواب في هذه الحالة أيضاً هو: لا.


ملاحظة. بوجه عام، يقبل C مماساً ميله m إذا فقط إذا كان $-\frac{1}{16} \leq m \leq \frac{1}{2}$.

4 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

① ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

② تحقّق أنّ للمعادلة $f(x) = 0$ ثلاثة جذور. واحصر كلّاً منها في مجال لا يزيد طوله على

10^{-1} .

هنا نجد رمزاً جديداً:  يعني هذا الرمز أنّ استعمال الآلة الحاسبة أو الحاسوب **مسموح**،

ولكن **ليس ضرورياً**.



الجل

① جدول تغيرات f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	3	\searrow	-1	\nearrow	$+\infty$

استناداً إلى جدول التغيرات f مطّرد تماماً على كل من المجالات $]-\infty, -1[$ و $]-1, 1[$ و $]1, +\infty[$ ، وعلاوة على ذلك

$$f(]1, +\infty[) =]-1, +\infty[\quad \text{و} \quad f(]-1, 1[) =]-1, 3[\quad \text{و} \quad f(]-\infty, -1[) =]-\infty, 3[$$

- لأنّ 0 ينتمي إلى $]-\infty, 3[$ فيوجد حلّ وحيد x_1 في المجال $]-\infty, -1[$ للمعادلة $f(x) = 0$.
- ولأنّ 0 ينتمي إلى $]-1, 3[$ فيوجد حلّ وحيد x_2 في المجال $]-1, 1[$ للمعادلة $f(x) = 0$.
- ولأنّ 0 ينتمي إلى $]-1, +\infty[$ فيوجد حلّ وحيد x_3 في المجال $]1, +\infty[$ للمعادلة $f(x) = 0$.

هذا يبرهن أنّ للمعادلة $f(x)$ ثلاثة جذور حقيقية هي $\{x_1, x_2, x_3\}$.

علينا إذن حصر هذه الجذور بمجالات طولها 10^{-1} .

x	$f(x)$
-2	-1
-1.9	-0.159
-1.8	0.568

نلاحظ أنّ $f(-2) = -1$ و $f(-1) = 3$ إذن $-2 < x_1 < -1$. ثمّ نحسب كما في الشكل المجاور، حيث بدأنا من العدد -2 الذي قيمة التابع f عنده أقرب إلى الصفر ورحنا نحسب قيمة f عند الأعداد -1.9 و -1.8 ، ولكن سرعان ما نجد f يغير إشارته، فنستنتج أنّ $-1.9 < x_1 < -1.8$.

x	$f(x)$
0	1
0.1	0.701
0.2	0.408
0.3	0.127
0.4	-0.136

وبالمثل، نلاحظ أنّ $f(0) = 1$ و $f(1) = -1$ إذن $0 < x_2 < 1$. ثمّ نحسب كما في الشكل المجاور، لنجد أنّ $0.3 < x_2 < 0.4$.

وأخيراً، نلاحظ أنّ $f(2) = 3$ و $f(1) = -1$ إذن $1 < x_3 < 2$. ثمّ نحسب كما في السابق، لنجد أنّ $1.5 < x_3 < 1.6$.

ملاحظة. يمكن لمن يرغب أن يتحقّق أنّ $x_1 = 2 \cos \frac{8\pi}{9}$ و $x_2 = 2 \cos \frac{4\pi}{9}$ وأخيراً

$$x_3 = 2 \cos \frac{2\pi}{9}$$

5 ليكن f هو التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x^3 - x^2 - x + \frac{1}{2}$.

① ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

② ما عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ؟

③ احصر كلاً منها في مجال لا يزيد طوله على 10^{-1} .

الحل

هذه المسألة تشبه السابقة. جدول تغيرات f :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	$\frac{37}{54}$	\searrow
			$-\frac{1}{2}$	\nearrow
				$+\infty$

وللمعادلة $f(x) = 0$ ثلاثة جذور حقيقية $\{x_1, x_2, x_3\}$ تحقق

$$-0.9 < x_1 < -0.8 \quad \text{و} \quad 0.4 < x_2 < 0.5 \quad \text{و} \quad 1.4 < x_3 < 1.5$$

6 ليكن f هو التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 4$.

① ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

② ما عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ؟

③ احصر كلاً منها في مجال لا يزيد طوله على 10^{-1} .

الحل

هذه المسألة تشبه السابقة. جدول تغيرات f :

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	-28	\nearrow	4
				\searrow	-1
					\nearrow
					$+\infty$

وللمعادلة $f(x) = 0$ أربعة جذور حقيقية $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ تحقق

$$-2.8 < x_1 < -2.7 \quad \text{و} \quad -0.6 < x_2 < -0.5 \quad \text{و} \quad 0.7 < x_3 < 0.8 \quad \text{و} \quad 1.2 < x_4 < 1.3$$

7 في كل حالة من الحالات الآتية، احسب المشتقات من المراتب 1 و 2 و 3 للتابع f المعرف

بالعلاقة المشار إليها. وحدد في كل حالة المجموعة التي تحسب عليها المشتق.

$$f(x) = x\sqrt{x} \quad \text{②} \quad f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 1 \quad \text{①}$$

$$f(x) = \cos(2x) + \sin(2x) \quad \text{④} \quad f(x) = \frac{1}{x-1} \quad \text{③}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sin x} \quad \text{⑥} \quad f(x) = \frac{1}{\cos x} \quad \text{⑤}$$

$$\begin{array}{ll}
D =]0, +\infty[, & \textcircled{2} \quad D = \mathbb{R}, \quad \textcircled{1} \\
f(x) = x\sqrt{x} & f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 1 \\
f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} & f'(x) = 3x^2 - x + 1 \\
f''(x) = \frac{3}{4\sqrt{x}} & f''(x) = 6x - 1 \\
f'''(x) = -\frac{3}{8x\sqrt{x}} & f'''(x) = 6 \\
D = \mathbb{R}, & \textcircled{4} \quad D = \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad \textcircled{3} \\
f(x) = \cos(2x) + \sin(2x) & f(x) = \frac{1}{x-1} \\
f'(x) = 2\cos(2x) - 2\sin(2x) & f'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} \\
f''(x) = -4\cos(2x) - 4\sin(2x) & f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3} \\
f'''(x) = -8\cos(2x) + 8\sin(2x) & f'''(x) = -\frac{6}{(x-1)^4} \\
D =]0, \pi[& \textcircled{6} \quad D =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\quad \textcircled{5} \\
f(x) = \frac{1}{\sin x} & f(x) = \frac{1}{\cos x} \\
f'(x) = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} & f'(x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x} \\
f''(x) = \frac{2}{\sin^3 x} - \frac{1}{\sin x} & f''(x) = \frac{2}{\cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} \\
f'''(x) = -\frac{6\cos x}{\sin^4 x} + \frac{\cos x}{\sin^2 x} & f'''(x) = \frac{6\sin x}{\cos^4 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x}
\end{array}$$

ملاحظة. لم يطلب السؤال تحديد أكبر مجموعة تكون هذه الحسابات صحيحة عليها، بل طلب من الطالب أن يحدد هو مجموعة تكون حساباته عليها صحيحة. فمثلاً في $\textcircled{2}$ يمكن أن يضيف الطالب أن f اشتقاقي أيضاً عند الصفر، ولكن f' ليس كذلك، ولكن هذا غير مطلوب في صيغة السؤال. وكذلك يمكنه في $\textcircled{5}$ أن يختار D لتكون أي مجال أو اجتماع مجالات لا يضم أي عدد من الشكل $\frac{\pi}{2} + \pi k$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ ، أو أن يختار D في $\textcircled{6}$ لتكون أي مجال أو اجتماع مجالات لا يضم أي عدد من الشكل πk حيث $k \in \mathbb{Z}$. الهدف من التمرين هو التدرب على إجراء العمليات على الاشتقاق، وليس على تعيين مجموعات التعريف.

8 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x + \sqrt{1+x^2}$.

- $\textcircled{1}$ تحقق أن $f'(x) \cdot \sqrt{1+x^2} = f(x)$ ، أيًا يكن x من \mathbb{R} .
- $\textcircled{2}$ استنتج أن $(1+x^2)f''(x) + xf'(x) - f(x) = 0$ ، أيًا يكن x من \mathbb{R} .

$$\textcircled{1} \quad \text{هذا تحقق مباشر إذ إن } f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \text{ ومن ثم } f'(x) \cdot \sqrt{1+x^2} = f(x)$$

$$\textcircled{2} \quad \text{باشتقاق طرفي المساواة السابقة } \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} f(x) = f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot f'(x) + \sqrt{1+x^2} f''(x)$$

وهذا يعطي المساواة المطلوبة بضرب الطرفين بالمقدار $\sqrt{1+x^2}$.

9

في كلِّ من الحالات الآتية، ادرس قابلية التابع f للاشتقاق عند الصفر.

$$f(x) = \frac{x^2 + |x|}{x^2 + 1} \quad \textcircled{3} \quad f(x) = x|x| \quad \textcircled{2} \quad f(x) = x^2\sqrt{x} \quad \textcircled{1}$$

الحل

① هنا f معرّف على $[0, +\infty[$ ، وفي حالة $x > 0$ لدينا $t(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x\sqrt{x}$ إذن

$\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = 0$ ، والتابع f اشتقائي عند الصفر ومشتقه $f'(0)$ يساوي 0.

② هنا f معرّف على \mathbb{R} ، وعندما $x \neq 0$ لدينا $t(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = |x|$ إذن $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = 0$ ،

فالتابع f اشتقائي عند الصفر ومشتقه $f'(0)$ يساوي 0.

③ هنا f معرّف على \mathbb{R} ، وفي حالة $x \neq 0$ لدينا

$$t(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \begin{cases} \frac{x + 1}{x^2 + 1} & : x > 0 \\ \frac{x - 1}{x^2 + 1} & : x < 0 \end{cases}$$

إذن $\lim_{x \rightarrow 0^+} t(x) = 1$ ، و $\lim_{x \rightarrow 0^-} t(x) = -1$. فالتابع f ليس اشتقائياً عند الصفر. ولكن له مشتق من

اليمين ومشتق من اليسار عند الصفر. ولدينا $f'(0^+) = 1$ و $f'(0^-) = -1$.

10

التابع f معرّف على \mathbb{R} وفق $f(0) = 0$ و $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ في حالة $x \neq 0$.

① هل f اشتقائي عند الصفر؟ علّل إجابتك.

② احسب $f'(x)$ على \mathbb{R}^* .

الحل

① عندما $x \neq 0$ لدينا $t(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \cos x$ إذن $|t(x)| \leq |x|$ لأن $|\cos x| \leq 1$. ومنه

نستج أن $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = 0$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ ، فالتابع f اشتقائي عند الصفر ومشتقه $f'(0)$ يساوي 0.

② في حالة $x \neq 0$ يمكن تطبيق قواعد الاشتقاق:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - x^2 \left(-\frac{1}{x^2}\right) \sin\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \sin\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$



لنتعلم البحث معاً

11 محل هندسي

في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، M هي النقطة التي إحداثياتها $(m, 0)$ حيث $0 \leq m \leq 3$ ، و N هي النقطة التي إحداثياتها $(0, n)$ حيث $n \geq 0$ ، النقطتان M و N تحققان $MN = 3$. وأخيراً J هي نقطة من القطعة المستقيمة $[MN]$ نُحقق $MJ = 2$. نهدف إلى تعيين المحل الهندسي \mathcal{L} للنقطة J عندما تتحول m في المجال $[0, 3]$ ، ورسمه.

نحو الحل

هذه مسألة في دراسة المحل الهندسي تحليلياً. سنسعى بدايةً إلى حساب إحداثيتي النقطة J بدلالة m . يمكن التفكير بمبرهنة تالس، لكن يبدو الأمر أيسر باستعمال الأشعة.

$$\textcircled{1} \text{ أثبت أن } 3\vec{OJ} = \vec{OM} + 2\vec{ON}$$

$$\textcircled{2} \text{ أثبت أن } n = \sqrt{9 - m^2} \text{ واستنتج } (x, y) \text{ إحداثيتي للنقطة } J \text{ بدلالة } m.$$

للحصول على معادلة للمحل الهندسي \mathcal{L} للنقطة J ، نبحث عن علاقة بين الإحداثيتين x و y للنقطة J مستقلة عن الوسيط m . أثبت أن $y = 2\sqrt{1 - x^2}$ ، عندها تنتمي J إلى الخط البياني \mathcal{C} للتابع f المعرف على المجال $[0, 1]$ وفق $f(x) = 2\sqrt{1 - x^2}$.

يبقى أن نجيب عن السؤال: أترسم J الخط البياني \mathcal{C} كاملاً عندما تتحول m على المجال $[0, 3]$ ؟

$$\textcircled{1} \text{ لماذا تنتمي } x \text{ إلى المجال } [0, 1] \text{؟}$$

$$\textcircled{2} \text{ ما هو إذن المحل الهندسي للنقطة } J \text{؟}$$

$$\textcircled{3} \text{ ادرس تغيرات } f \text{ وادرس قابلية اشتقاقه عند } 1. \text{ وأخيراً ارسم } \mathcal{L}.$$

أنجز الحل وكتبه بلغة سليمة.

الحل

$\textcircled{1}$ من تعريف J نرى أن $\vec{MJ} = \frac{2}{3}\vec{MN}$ ومنه $\vec{OJ} - \vec{OM} = \frac{2}{3}(\vec{ON} - \vec{OM})$ وهي تكافئ المساواة $3\vec{OJ} = \vec{OM} + 2\vec{ON}$.


$\textcircled{2}$ من $MN = 3$ لدينا $m^2 + n^2 = 9$ ولأن $n \geq 0$ يمكننا حساب $n = \sqrt{9 - m^2}$. ونستنتج من

$$\text{المساواة الشعاعية السابقة السابقة أن } 3 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ n \end{bmatrix} \text{، إذن } x = \frac{m}{3} \text{ و } y = \frac{2}{3}\sqrt{9 - m^2}$$

نكتب العلاقاتان السابقتان بالشكل $x = \frac{m}{3}$ و $y = 2\sqrt{1 - \left(\frac{m}{3}\right)^2}$ إذن $y = 2\sqrt{1 - x^2}$.

- 👉 ① استناداً إلى الفرض تتحوّل m في المجال $[0, 3]$ ، إذن تتحوّل $x = \frac{m}{3}$ في المجال $[0, 1]$.
- ② رأينا أنّ المحل الهندسي \mathcal{L} محتوي في C الخط البياني للتابع $f : x \mapsto 2\sqrt{1-x^2}$ على $[0, 1]$ ، وبالعكس إذا كانت (x, y) نقطة من C ، كانت $m = 3x \in [0, 3]$ ، وانطبقت النقطة الموافقة J من \mathcal{L} على (x, y) . إذن جميع نقاط C هي نقاط من المحل الهندسي \mathcal{L} .
- ③ التابع f متناقصٌ تماماً على المجال $[0, 1]$ ، وله جدول التغيرات الآتي

x	0	1
$f'(x)$	0	-
$f(x)$	2	0



وفي حالة $0 < x < 1$ لدينا $t(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -2\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ إذن $\lim_{x \rightarrow 1} t(x) = -\infty$ يقبل مماساً شاقولياً عند 1.

12 توابع ومجموعات نقطية

في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، نرمز بالرمز \mathcal{E} إلى مجموعة النقاط $M(x, y)$ التي تحقق:

$$(*) \quad x^2 - 2x + 4y^2 = 3$$

نهدف إلى إثبات أنّ المجموعة \mathcal{E} هي اجتماع خطين بيانيين C_1 و C_2 لتابعين f_1 و f_2 ومن ثمّ رسم \mathcal{E} .

نحو الحل

👉 بحثاً عن طريق. يتعلق الأمر بإثبات أنّ المجموعة \mathcal{E} من النقاط $M(x, y)$ تساوي $C_1 \cup C_2$. يجب إذن إثبات أنّ القول « تنتمي M إلى \mathcal{E} » كافي « تنتمي M إلى $C_1 \cup C_2$ » أو « تنتمي M إلى C_1 أو إلى C_2 »، حيث C_1 و C_2 هما خطّان بيانيان لتابعين f_1 و f_2 فتكون معادلتاهما

$$y = f_2(x) \quad \text{و} \quad y = f_1(x)$$

يتعلق الأمر إذن بإيجاد تابعين f_1 و f_2 تكون معهما المقولتان الآتيتان متكافئتين:

$$\square \quad \text{« إحدائيتنا } M \text{ تحققان } x^2 - 2x + 4y^2 = 3$$

$$\square \quad \text{« إحدائيتنا } M \text{ تحققان } y = f_1(x) \text{ أو } y = f_2(x) \text{.»}$$

$$\textcircled{1} \quad \text{تحقق أنّ العلاقة } (*) \text{ تكافئ } y^2 = \frac{-x^2 + 2x + 3}{4}.$$

② تعلم أنّ « $y^2 = a$ » تكافئ « $y = \sqrt{a}$ أو $y = -\sqrt{a}$ » فقط عندما يكون $a \geq 0$. ما قيم

$$x \text{ التي تحقق } -x^2 + 2x + 3 \geq 0 ?$$

✂ تبقى دراسة تغيرات f_1 و f_2 ، ثم رسم خطيهما البيانيين C_1 و C_2 . نرسم بالرمز f_1 إلى التابع

$$f_1(x) = \frac{\sqrt{-x^2 + 2x + 3}}{2} \text{ وفق } [-1, 3]$$

① أثبت أن f_1 اشتقائي على $]-1, 3[$. احسب $f_1'(x)$ على $]-1, 3[$.

② ادرس قابلية f_1 للاشتقاق عند -1 وعند 3 . ثم نظم جدولاً بتغيرات f_1 . وارسم C_1 .

✂ يمكن، لكي نرسم C_2 ، أن ندرس تغيرات f_2 . ولكن هنا، لدينا: $f_2(x) = -f_1(x)$ ، أيًا تكن x من

$]-1, 3[$. وفق أي تحويل هندسي يكون C_2 صورة C_1 ؟ ارسم C_2 .

أنجز الحل وكتبه بلغة سليمة.



الحل

✂ العلاقة (*) تكافئ $y^2 = \frac{1}{4}(3 + 2x - x^2)$ وضوحاً. ولأن $y^2 = \frac{1}{4}(3 + 2x - x^2)$ فقيم

x التي تجعل $3 + 2x - x^2 \geq 0$ هي $]-1, 3[$. وعليه تنتمي $M(x, y)$ إلى \mathcal{E} إذا فقط إذا كانت M

تنتمي إلى C_1 أو إلى C_2 حيث C_2 و C_1 هما بالترتيب الخطان البيانيين للتابعين:

$$f_2 : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = -\frac{1}{2}\sqrt{3 + 2x - x^2} \quad \text{و} \quad f_1 : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = \frac{1}{2}\sqrt{3 + 2x - x^2}$$

✂ التابع $u : x \mapsto 3 + 2x - x^2$ تابع كثير الحدود فهو اشتقائي على \mathbb{R} ، وهو موجب تماماً على

$]-1, 3[$ ، إذن f_1 اشتقائي على $]-1, 3[$ ، ولدينا

$$f_1'(x) = \frac{1 - x}{2\sqrt{3 + 2x - x^2}}$$

قابلية الاشتقاق عند -1 . هنا في حالة $-1 < x < 3$ يكون $1 + x > 0$ ومنه $\sqrt{(1 + x)^2} = 1 + x$

إذن:

$$t(x) = \frac{f_1(x) - f_1(-1)}{x + 1} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3 - x}{x + 1}}$$

وعليه $\lim_{x \rightarrow -1} t(x) = +\infty$ ، فالتابع f_1 غير اشتقائي عند -1 ولكن لخطه البياني C_1 مماس شاقولي


عند $(-1, 0)$.

قابلية الاشتقاق عند 3 . هنا في حالة $-1 < x < 3$ يكون لدينا بمثل ما سبق:


$$t(x) = \frac{f_1(x) - f_1(3)}{x - 3} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{x + 1}{3 - x}}$$

وعليه $\lim_{x \rightarrow 3} t(x) = -\infty$ ، فالتابع f_1 غير اشتقائي عند 3 ولكن لخطه البياني C_1 مماس شاقولي عند

$(3, 0)$. يمكننا إذن وضع جدول التغيرات الآتي للتابع f_1 .



x	-1	1	3
$f_1'(x)$		$+$	$-$
$f_1(x)$	0	\nearrow	1
			\searrow
			0



الخط البياني C_2 هو صورة C_1 وفق التناظر المحوري بالنسبة إلى محور الفواصل ومنه، نجد الرسم البياني للمجموعة \mathcal{E} التي نسميها قطعاً ناقصاً.

13 متراجحة هويغنز Huygens

نهدف إلى إثبات صحة المتراجحة $2 \sin x + \tan x \geq 3x$ أيأً يكن x من المجال $I = [0, \frac{\pi}{2}[$.

نحو الحل

يبدو حل هذه المتراجحة مثلثاتياً شبه مستحيل. لذا نلجأ إلى دراسة التابع f المعروف على I وفق $f(x) = 2 \sin x + \tan x - 3x$. تحقق أن إشارة $f'(x)$ على المجال I تماثل إشارة $2 \cos^3 x - 3 \cos^2 x + 1$.

يمكنك أن تضع $\cos x = t$ ، ثم تدرس إشارة كثير الحدود $P(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1$ مع t من $]0, 1[$. ادرس تغيرات P على المجال $]0, 1[$ ، وتحقق أن P موجب على هذا المجال.

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة.

الحل

نلاحظ أنه في حالة x من I لدينا $f'(x) = 2 \cos x + \frac{1}{\cos^2 x} - 3 = \frac{2 \cos^3 x - 3 \cos^2 x + 1}{\cos^2 x}$ ولأن المقام موجب في هذه العبارة، تتفق إشارة $f'(x)$ مع إشارة $2 \cos^3 x - 3 \cos^2 x + 1$. بوضع $t = \cos x \in]0, 1[$ نلاحظ أن $t = \cos x \in]0, 1[$ حيث $P(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1$.

ولدينا $P'(t) = 6t(t - 1)$ إذن $P'(t) \leq 0$ على المجال $]0, 1[$ فالتابع $t \mapsto P(t)$ متناقص تماماً على المجال $]0, 1[$ ، ولكن $P(1) = 0$ ، نستنتج أن $P(t) \geq 0$ على $]0, 1[$ ، ومن ثم نستنتج أن $f'(x) \geq 0$ على المجال I ، فالتابع f تابع متزايد على I . ولكن $f(0) = 0$ ، إذن $f(x) \geq 0$ في حالة x من المجال $I = [0, \frac{\pi}{2}[$. وهذا يثبت صحة المتراجحة المطلوبة.

ملاحظة. كان بالإمكان الاستفادة من المساواة $P(t) = (t - 1)^2(2t + 1)$ في إثبات أن $P(t) \geq 0$ على $]0, 1[$.



قُدماً إلى الأمام

14 التابع f معرف على المجال $]0, 1[$ وفق $f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{1-x}}$

① هل f اشتقائي عند الصفر؟

② احسب $f'(x)$ على $]0, 1[$.

① في حالة $0 < x < 1$ لدينا $\sqrt{x^2} = x$ ومنه $t(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$ ومنه نرى أن $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = 0$ إذن f اشتقائي عند $x = 0$ و $f'(0) = 0$

② على $]0,1[$ يمكننا تطبيق قواعد الاشتقاق إذ نلاحظ أن $f(x) = \sqrt{u(x)}$ حيث $u(x) = \frac{x^3}{1-x}$ ولكن $u'(x) = \frac{3x^2 - 2x^3}{(1-x)^2}$ إذن :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{3-2x}{2(1-x)} \cdot \sqrt{\frac{x}{1-x}}$$

⑤ نأمل التابع f المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ وفق $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$

① احسب التابع المشتق للتابع f .

② استنتج مشتق كل من التوابع الآتية:

$$\begin{aligned} h : x &\mapsto \frac{x^4 + 1}{x^2 - 1} & \text{②} & \quad g : x &\mapsto \frac{x + 1}{\sqrt{x - 1}} & \text{①} \\ k : x &\mapsto \frac{\sin^2 x + 1}{\sin x - 1} & \text{④} & \quad \ell : x &\mapsto \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x - 1}} & \text{③} \end{aligned}$$

① بملاحظة أن $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$ نجد مباشرة أن $f'(x) = 1 - \frac{2}{(x - 1)^2}$

② هنا $g(x) = f(\sqrt{x})$ إذن $g'(x) = \left(1 - \frac{2}{(\sqrt{x} - 1)^2}\right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$

② هنا $h(x) = f(x^2)$ إذن $h'(x) = \left(1 - \frac{2}{(x^2 - 1)^2}\right) \cdot 2x$

③ هنا $\ell(x) = \sqrt{f(x)}$ إذن $\ell'(x) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(1-x)^2}\right) \sqrt{\frac{x-1}{x^2+1}}$

④ هنا $k(x) = f(\sin x)$ إذن $k'(x) = \left(1 - \frac{2}{(\sin x - 1)^2}\right) \cdot \cos x$

ملاحظة. هنا لا يطلب تحديد المجموعات التي تكون التوابع اشتقاقية عليها.

⑥ فيما يأتي، أوجد التابع المشتق للتابع f محدداً المجموعة التي تنجز عليها الاشتقاق.

$$f(x) = \sin^3 2x \quad \text{②} \quad f(x) = \cos^2 3x \quad \text{①}$$

$$f(x) = \frac{1}{\cos^3 2x} \quad \text{④} \quad f(x) = \frac{1}{\sin^2 3x} \quad \text{③}$$

الحل

① على \mathbb{R} لدينا $f(x) = \cos^2 3x$ من ثم $f'(x) = -6 \cos 3x \cdot \sin 3x$

② على \mathbb{R} لدينا $f(x) = \sin^3 2x$ ومن ثم $f'(x) = 6 \sin^2 2x \cdot \cos 2x$

③ على $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{3}k : k \in \mathbb{Z}\}$ لدينا $f(x) = \frac{1}{\sin^2 3x}$ ومن ثم $f'(x) = -6 \frac{\cos 3x}{\sin^3 3x}$

④ على $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{4}(1+2k) : k \in \mathbb{Z}\}$ لدينا $f(x) = \frac{1}{\cos^3 2x}$ ومن ثم $f'(x) = -6 \frac{\sin 2x}{\cos^4 2x}$

ملاحظة. يمكن أن يذكر الطالب أي مجال مناسب في ③ أو ④.

17 ليكن التابع f المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ وفق $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$

① عيّن التابع المشتق f' للتابع f .

② نرمز بالرمز g إلى التابع المعرف على $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ وفق $g(x) = f(\sin x)$. أثبت أن g

اشتقاقي على I ثم احسب $g'(x)$ على I .

③ نرمز بالرمز h إلى التابع المعرف على $J =]1, +\infty[$ وفق $h(x) = f(\sqrt{x})$. أثبت أن h

اشتقاقي على J ثم احسب $h'(x)$ على J .

الحل

① $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ على $f'(x) = \frac{2x+3}{x-1} = \frac{-5}{(x-1)^2}$

② هنا $x \mapsto \sin x$ اشتقاقي على $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ولا يأخذ القيمة 1، و f اشتقاقي على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ، إذن

$g(x) = f(\sin x)$ اشتقاقي على I و $g'(x) = f'(\sin x) \cos x = \frac{-5 \cos x}{(\sin x - 1)^2}$

③ هنا $x \mapsto \sqrt{x}$ اشتقاقي على $J =]1, +\infty[$ ولا يأخذ القيمة 1، و f اشتقاقي على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ، إذن

$h(x) = f(\sqrt{x})$ اشتقاقي على J و $h'(x) = f'(\sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{-5}{2(\sqrt{x}-1)^2 \sqrt{x}}$

18 a و b عدنان حقيقيان، و C هو الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + 1$$

هل يمكن تعيين a و b لكي يقبل C مماساً أفقياً في النقطة $A(1,2)$ منه؟

الحل

الشرطان المعطيان يُكافئان $f(1) = 2$ و $f'(1) = 0$. أي

$$3a + 2b = 0 \quad \text{و} \quad a + b = 1$$

ومنه $(a, b) = (-2, 3)$.

19 a و b عدنان حقيقيان، C هو الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق:

$$f(x) = \frac{3x^3 + ax + b}{x^2 + 1}$$

عين a و b لتكون $y = 4x + 3$ معادلةً للمماس للخط C في النقطة التي فاصلتها 0 منه؟

الحل

الشرط المعطى يكافئ $f(0) = 3$ و $f'(0) = 4$ أي $b = 3$ و $a = 4$.

ملاحظة. عند حساب $f'(0)$ نجرى الحساب مباشرة عند الصفر، فإذا كان البسط g والمقام h كتبنا

$$f'(0) = \frac{g'(0)h(0) - h'(0)g(0)}{(h(0))^2} = \frac{a \times 1 - 0 \times b}{1^2} = a$$

20 a عددٌ حقيقيٌّ، و f هو التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = ax^3 + 3x^2 + 3x$. هل يمكن

تعيين a ليكون للتابع f قيمة حديّة محلية عند $x = 1$ ؟

الحل

شرط لازم. إذا بلغ التابع قيمة حديّة عند $x = 1$ وجب أن يكون $f'(1) = 0$ وهذا يقتضي أن يكون

$$a = -3$$

الشرط كاف. لنفترض أن $a = -3$ عندئذ

$$f'(x) = -9x^2 + 6x + 3 = -3(3x^2 - 2x - 1) = -3(x - 1)(3x + 1)$$

إذن للتابع f' جدول الاطراد الآتي على المجال $[0, +\infty[$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	0	↗ 3	↘ $-\infty$

فالتابع f يبلغ قيمة كبرى محلية عند $x = 1$. الجواب إذن : نعم.

21 f هو تابع معرف على \mathbb{R} واشتقائي عليها. إضافةً إلى ذلك نفترض أن:

$$f(0) = 0 \text{ و } f'(0) = 1 \quad \square$$

$$f' \text{ متزايد على المجال } [0, +\infty[\text{ ومنتاقص على المجال }]-\infty, 0]. \quad \square$$

ارسم خطأً بيانياً C **يمكن** أن يمثل التابع f .

الحل

هناك الكثير من التوابع المرشحة لتؤدي دور f' ، نبحث عن تابع متزايد على $[0, +\infty[$ ومنتاقص على

$] -\infty, 0]$ ، ويأخذ القيمة 1 عند الصفر. أي تابع من الشكل $x \mapsto ax^2 + 1$ (حيث a عدد كفي موجب)

يفي بالغرض. إذن نريد تابعاً f يكون لمشتقه هذه الصيغة وينعدم عند الصفر. أي تابع

$$f : x \mapsto bx^3 + x \quad (\text{حيث } b \text{ عدد كفي موجب}) \text{ يحقق الشرطين المطلوبين. مثلاً } x \mapsto x$$

22

في كلٍّ من الحالات الآتية، احسب في حال وجودها نهاية التابع f عند a المشار إليها.

$$f(x) = \frac{\tan x}{x} \quad a = 0 \quad \textcircled{2} \quad f(x) = \frac{\cos x - 1}{x} \quad a = 0 \quad \textcircled{1}$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + x + 2} - 2}{x - 1} \quad a = 1 \quad \textcircled{4} \quad f(x) = \frac{\sqrt{x + 1} - \sqrt{2}}{x - 1} \quad a = 1 \quad \textcircled{3}$$

الحل

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \cos'(0) = -\sin 0 = 0 \quad \text{إذن } x \mapsto -\sin x \text{ ومشتقه } x \mapsto \cos x \quad \textcircled{1}$$

$$x \mapsto \tan x \text{ اشتقاقي على }]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\text{ ومشتقه } x \mapsto \frac{1}{\cos^2 x} \text{ إذن } \quad \textcircled{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \tan'(0) = \frac{1}{\cos^2 0} = 1$$

$$g : x \mapsto \sqrt{x + 1} \text{ اشتقاقي على }]-1, +\infty[\text{ ومشتقه } x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x + 1}} \text{ إذن } \quad \textcircled{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x + 1} - \sqrt{2}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$g : x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 2} \text{ اشتقاقي ومشتقه } x \mapsto \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 2}} \text{ إذن } \quad \textcircled{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + x + 2} - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1) = \frac{3}{4}$$

23

في كلٍّ من الحالات الآتية، أوجد عدد حلول المعادلة، ثم احسب قيمة تقريبية لكل جذر بحيث لا



يتعدى الخطأ في الحساب 10^{-1} .

$$x(2x + 1)^2 = 5 \quad \textcircled{2} \quad x^5 - x^3 + x - 5 = 0 \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{3}x^3 + 1 = 0 \quad \textcircled{4} \quad x^4 - \frac{1}{2}x + 1 = 0 \quad \textcircled{3}$$

الحل

x	$f(x)$
1	-4
1.1	-3.62049
1.2	-3.03968
1.3	-2.18407
1.4	-0.96576
1.5	0.71875

التابع $f(x) = x^5 - x^3 + x - 5$ ، تابع مستمر ومتزايد تماماً على \mathbb{R} ، لأن مشتقه موجب تماماً عليها. وهو يحقق $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ،

لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ أي $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. فللمعادلة $f(x) = 0$ حلٌ وحيد α في \mathbb{R} .

وعلاوة على ذلك نلاحظ أن $f(1) = -4$ و $f(2) = 21$. إذن $1 < \alpha < 2$.

ثم نحسب بعض القيم المتتالية لنجد أن $1.4 < \alpha < 1.5$.

② التابع $x \mapsto f(x) = x(2x+1)^2 - 5$ جدول التغيرات الآتي :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	-5	\searrow	$-\frac{137}{27}$	\nearrow	$+\infty$

استناداً إلى جدول التغيرات، للمعادلة $f(x) = 0$ حلٌ وحيدٌ α في \mathbb{R} وهذا ينتمي إلى المجال $]-\frac{1}{6}, +\infty[$ ، وعلاوة على ذلك $f(\frac{3}{4}) = -\frac{5}{16} < 0$ و $f(\frac{4}{5}) = \frac{51}{125} > 0$ ، إذن $0.75 < \alpha < 0.8$.

③ التابع $x \mapsto f(x) = x^4 - \frac{1}{2}x + 1$ له جدول التغيرات الآتي :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	$\frac{13}{16}$	\nearrow	$+\infty$

استناداً إلى جدول التغيرات، ليس للمعادلة $f(x) = 0$ حلولٌ في \mathbb{R} .

④ التابع $x \mapsto f(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{3}x^3 + 1$ له جدول التغيرات الآتي :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	$\frac{17}{15}$	\searrow	$\frac{13}{15}$	\nearrow	$+\infty$

x	$f(x)$
-2	-2.73333
-1.9	-1.66586
-1.8	-0.83517
-1.7	-0.20205
-1.6	0.26818

استناداً إلى جدول التغيرات، للمعادلة $f(x) = 0$ حلٌ وحيدٌ α في \mathbb{R} وهذا ينتمي إلى المجال $]-\infty, -1[$ ، وعلاوة على ذلك $f(-2) = -\frac{41}{15}$ ، إذن $-2 < \alpha < -1$. ثم بحساب بعض القيم كما في الجدول المجاور نجد أن $-1.7 < \alpha < -1.6$.

24 ليكن f التابع المعرف على المجال $[1, +\infty[$ وفق $f(x) = x + \sqrt{x-1} - 4$.

① ادرس تغيرات التابع f . أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً يطلب حساب قيمة



تقريبية لهذا الحل على ألا يتعدى الخطأ في الحساب 10^{-1} .

② احسب جبرياً القيمة الحقيقية لذلك الجذر.

الحل

x	$f(x)$
3	0.41421
2.9	0.27840
2.8	0.14164
2.7	0.00384
2.6	-0.13589

① التابع f ، تابعٌ مستمرٌ ومنتزاعٌ تماماً على $I = [1, +\infty[$ ، لأن مشتقه موجبٌ

تماماً. وهو يحقق $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $f(1) = -3$ أي $f(I) = [-3, +\infty[$.

فلمعادلة $f(x) = 0$ حلٌ وحيدٌ α في I . ونلاحظ أن $f(3) = \sqrt{2} - 1 > 0$

و $f(2) = -1$ إذن $2 < \alpha < 3$. وأخيراً نجد $2.6 < \alpha < 2.7$ بحساب بعض

القيم كما في الجدول المجاور.

② تُكتب المعادلة $f(x) = 0$ بالصيغة المُكافئة $\sqrt{x-1} = 4-x$ فهي إذن تُكافئ

$$x-1 = x^2 - 8x + 16 \quad \text{و} \quad 4-x \geq 0$$

إذن $x \leq 4$ و $x^2 - 9x + 17 = 0$ ومنه نستنتج أن $\alpha = \frac{9 - \sqrt{13}}{2} \approx 2.697224$

②5 ليكن f التابع المعرّف على المجال $I =]1, +\infty[$ وفق $f(x) = \frac{1}{x-1} - \sqrt{x}$.

① ادرس تغيرات f على I .

② استنتج أنّ للمعادلة $f(x) = 0$ جذراً وحيداً α يقع في المجال $]1, 2[$.

③ احسب قيمة تقريبية لهذا الجذر على ألا يتعدى الخطأ في الحساب 10^{-1} .

الحل

① التابع f ، تابعٌ مستمرٌّ ومتناقصٌ تماماً على I ، لأنّ مشتقه سالبٌ تماماً، أو لأنه يساوي مجموع تابعين متناقصين تماماً. وهو يحقّق $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ أي $f(I) = \mathbb{R}$.

x	$f(x)$
2	-0.41421
1.9	-0.26729
1.8	-0.09164
1.7	0.12473

② للمعادلة $f(x) = 0$ حلٌّ وحيد α في I . وكذلك فإنّ

$$f(2) = 1 - \sqrt{2} < 0 \quad \text{إذن} \quad f(]1, 2[) =]1 - \sqrt{2}, +\infty[\quad \text{ومنه} \quad 1 < \alpha < 2$$

③ وأخيراً نجد $1.7 < \alpha < 1.8$ بحساب بعض القيم كما في الجدول المجاور.

②6 في معلمٍ متجانسٍ $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، ليكن C هو الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق:

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{x^2 + x + 3}$$

① ادرس تغيرات f وارسم خطه البياني C .

② نريد تعيين المماسات للخط البياني C المارة بالمبدأ، (غير المماس في المبدأ).

a . ليكن a عدداً حقيقياً. اكتب معادلةً للمماس T_a الذي يمس C في النقطة $A(a, f(a))$.

b . فكّر في أنّ T_a يكون أحد المماسات المطلوبة عندما يمر بالمبدأ. ثمّ جد معادلة لكل مماس

للخط البياني C يمر بالمبدأ.


الحل

① نلاحظ أولاً أنّ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ، فالمستقيم الأفقي الذي معادلته $y = 1$ مستقيم

مُقاربٌ في جوار كلٍّ من $+\infty$ و $-\infty$.

$$\text{ولأنّ} \quad f(x) = 1 - \frac{3}{x^2 + x + 3} \quad \text{سهّل حساب} \quad f'(x) \quad \text{لنجد} \quad f'(x) = \frac{3(2x+1)}{(x^2+x+3)^2} \quad \text{، فإشارة} \quad f'(x)$$

تتفق مع إشارة $(2x+1)$.



ومنه جدول التغيرات والرسم البياني المطلوبين:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	
$f(x)$	1	\searrow	\nearrow	1

② a . معادلة T_a هي $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ أي

$$y = \frac{a^2 + a}{a^2 + a + 3} + \frac{3(2a + 1)}{(a^2 + a + 3)^2}(x - a)$$

أو

$$y = \frac{a^2(a^2 + 2a - 2)}{(a^2 + a + 3)^2} + \frac{3(2a + 1)}{(a^2 + a + 3)^2}x$$


② b . يمر T_a بالمبدأ إذا حققت النقطة $(0, 0)$ معادلته وهذا يكافئ $a^2(a^2 + 2a - 2) = 0$. إذن إما أن

يكون $a = 0$ عندها T_0 هو المماس في المبدأ وهو من ثم غير مطلوب. أو أن يكون $a = -1 - \sqrt{3}$

أو $a = -1 + \sqrt{3}$. ولكن في حالة $a \in \{-1 + \sqrt{3}, -1 - \sqrt{3}\}$ لدينا $a^2 = 2 - 2a$. إذن

$$(a^2 + a + 3)^2 = (5 - a)^2 = 27 - 12a$$

وعليه إذا كان $a = -1 + s\sqrt{3}$ حيث $s \in \{-1, 1\}$ كان



$$\begin{aligned} \frac{3(2a + 1)}{(a^2 + a + 3)^2} &= \frac{2a + 1}{9 - 4a} = \frac{-1 + s2\sqrt{3}}{13 - s4\sqrt{3}} \\ &= \frac{(-1 + s2\sqrt{3})(13 + s4\sqrt{3})}{169 - 48} = \frac{1 + s2\sqrt{3}}{11} \end{aligned}$$

ومعادلتا المماسين المطلوبين هما

$$T_{-1-\sqrt{3}} : y = \frac{1-2\sqrt{3}}{11}x \quad \text{و} \quad T_{-1+\sqrt{3}} : y = \frac{1+2\sqrt{3}}{11}x$$

ملاحظة. في الشكل، الواحدة على محور الفواصل لاتساوي الواحدة على محور الترتيب.

27 في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ وفق:

$$f(x) = \frac{2x^2 + x + 7}{x + 1}$$

① أوجد نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

② أثبت أن المستقيم d الذي معادلته $y = 2x - 1$ مقارب مائل للخط C .

③ ادرس نهاية f عند -1 . ماذا تستنتج فيما يتعلق بالخط C ؟

④ ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

⑤ أثبت أن النقطة $I(-1; -3)$ هي مركز تناظر للخط C .

⑥ ارسم مقاربات C ثم ارسم C .

① نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

② نضع $g(x) = f(x) - (2x - 1)$ فنلاحظ أنّ $g(x) = \frac{8}{x+1}$. إذن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$$

والمستقيم d الذي معادلته $y = 2x - 1$ مستقيم مقارب للخط C ، في جوار كل من $+\infty$ و $-\infty$.

③ نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$. نستنتج أنّ المستقيم الشاقولي الذي

معادلته $x = -1$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f .

④ من الصيغة $f(x) = 2x - 1 + \frac{8}{x+1}$ نستنتج أنّ

$$f'(x) = 2 - \frac{8}{(x+1)^2} = \frac{2(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$$

مما يفيدنا في إنشاء جدول تغيرات f كما يأتي:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$					
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$-$	0	$+$			
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	-11	\searrow	$-\infty$	$+\infty$	\searrow	5	\nearrow	$+\infty$

⑤ نلاحظ أولاً أنّ المجموعة $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ متناظرة بالنسبة إلى -1


فإذا كان $-1 + h$ في $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ كان أيضاً $-1 - h$ عنصراً من

$\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. وعلاوة على ذلك:

$$\frac{f(-1+h) + f(-1-h)}{2} = -3$$

إذن $I(-1, -3)$ هي مركز تناظر للخط البياني للتابع f .

⑥ الرسم مبين في الشكل المجاور.



28 في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ وفق:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 10x - 11}{(x-1)^2}$$

① أوجد نهايات f عند حدود مجموعة تعريفه، ثم ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

② أثبت أنّ المستقيم d الذي معادلته $y = x - 1$ مقارب مائل للخط C .

③ ادرس الوضع النسبي للخطين d و C ، ثم ارسم كلاً من C و d .

④ حدّد هندسياً عدد حلول المعادلة $x^3 - (m+3)x^2 + (2m+10)x - 11 - m = 0$.

① نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ وكذلك نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$.

فنستنتج أنّ المستقيم الشاقولي الذي معادلته $x = 1$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f . وبالاستفادة

من الصيغة $f(x) = x - 1 + \frac{7x - 10}{(x - 1)^2}$ أو بحساب مباشر نجد

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + \frac{-7x + 13}{(x - 1)^3} = \frac{x^3 - 3x^2 - 4x + 12}{(x - 1)^3} \\ &= \frac{(x + 2)(x - 2)(x - 3)}{(x - 1)^3} \end{aligned}$$


ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	-2	1	2	3	$+\infty$						
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$	0	$-$	0	$+$			
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	$-\frac{17}{3}$	\searrow	$-\infty$	$-\infty$	\nearrow	5	\searrow	$\frac{19}{4}$	\nearrow	$+\infty$

② نضع $g(x) = f(x) - (x - 1)$ فنلاحظ أنّ $g(x) = \frac{7x - 10}{(x - 1)^2}$. إذن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$$

نستنتج أنّ المستقيم d الذي معادلته $y = x - 1$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f .



③ ونستنتج مما سبق أنّ d و C يتقاطعان في النقطة $(\frac{10}{7}, \frac{3}{7})$ ويكون C تحت d على المجال $]-\infty, \frac{10}{7}[$ ، وفوق d على المجال $]\frac{10}{7}, +\infty[$. يبين الرسم المجاور الخط C ومقارباته.

④ تكافئ المعادلة المعطاة ما يأتي:

$$x^3 - 3x^2 + 10x - 11 - m(x^2 - 2x + 1) = 0$$

ولأنّ $x = 1$ ليس حلاً لهذه المعادلة يمكننا قسمة طرفي المعادلة

على $(x - 1)^2$ لنجدها تكافئ $f(x) = m$. وهذه يسهل حلها

هندسياً من الرسم البياني لنجد:

- في حالة $m \in \{-\frac{17}{3}, \frac{19}{4}, 5\}$ للمعادلة $f(x) = m$ حلان.
- في حالة $-\frac{17}{3} < m < \frac{19}{4}$ أو $m > 5$ للمعادلة $f(x) = m$ حل واحد.
- في حالة $\frac{19}{4} < m < 5$ أو $m < -\frac{17}{3}$ للمعادلة $f(x) = m$ ثلاثة حلول.

29

في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق:

$$f(x) = x - \sqrt{x^2 + 8}$$

- ① احسب نهاية f عند $-\infty$ وعند $+\infty$. هل يقبل C مقارباً أفقياً؟
- ② تحقق أن المستقيم d الذي معادلته $y = 2x$ مقارب للخط C .
- ③ نظم جدولاً بتغيرات f .
- ④ ارسم مقاربات C ثم ارسم C .

الحل

① من الواضح أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$


ولما كان $f(x) = \frac{-8}{x + \sqrt{x^2 + 8}}$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، فمحور الفواصل الذي معادلته

$y = 0$ مستقيم مقارب أفقي للخط البياني C في جوار $+\infty$. ومن جهة

② لنضع $g(x) = f(x) - 2x = \frac{-8}{\sqrt{x^2 + 8} - x}$. نلاحظ إذن أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = g(x) = 0$ ،

فالمستقيم d الذي معادلته $y = 2x$ مستقيم مقارب للخط C في جوار $-\infty$. ولما كان g سالباً، أيّاً كانت قيمة x ، استنتجنا أن الخط البياني C للتابع f يقع دوماً تحت d .

③ لدينا $f'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 8}}$ وهو مقدار موجب دوماً لأن $|x| \geq \sqrt{x^2} > \sqrt{x^2 + 8}$ إذن



x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	0

④ الرسم موضح جانباً.

30 دراسة تابع مثلثاتي

ليكن f التابع المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = 3 \sin^2 x + 4 \cos^3 x$

- ① قارن كلاً من $f(-x)$ و $f(x + 2\pi)$ مع $f(x)$. استنتج أنه تكفي دراسة f على $[0, \pi]$.
- ② أثبت أن $f'(x) = 6 \cos x \times \sin x (1 - 2 \cos x)$ ، عند كل عدد حقيقي x .
- ③ ادرس تغيرات f على $[0, \pi]$.
- ④ ارسم الخط البياني للتابع f على $[-2\pi, 2\pi]$.

① نلاحظ أنّ

$$f(x) = 3 \sin^2 x + 4 \cos^3 x$$

$$f(-x) = 3 \sin^2(-x) + 4 \cos^3(-x) = 3 \sin^2 x + 4 \cos^3 x = f(x)$$

$$f(x + 2\pi) = 3 \sin^2(2\pi + x) + 4 \cos^3(2\pi + x) = 3 \sin^2 x + 4 \cos^3 x = f(x)$$

فالتابع f دوري ويقبل العدد 2π دوراً. إذن تكفي دراسة f على مجال طوله دور واحد وليكن $[-\pi, \pi]$. ولأنّ التابع زوجي فلدراسته على $[-\pi, \pi]$ ، تكفي دراسته على $[0, \pi]$.

② واضح أنّ


$$\begin{aligned} f'(x) &= 6 \sin x \cos x - 12 \cos^2 x \sin x \\ &= 6 \sin x \cdot \cos x \cdot (1 - 2 \cos x) \end{aligned}$$

③ على $]0, \pi[$ ، ينعدم $f'(x)$ فقط عند $x = \frac{\pi}{3}$ (الموافقة لـ $\cos x = \frac{1}{2}$)، وعند $x = \frac{\pi}{2}$ (الموافقة لـ

$\cos x = 0$)، ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f على $[0, \pi]$.

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π			
$f'(x)$	0	-	+	0	-	0	
$f(x)$	4	\searrow	$\frac{11}{4}$	\nearrow	3	\searrow	-4

④ الرسم مبيّن أدناه.



31 دراسة تابع مثلثاتي

ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = 4 \sin^3 x + 3 \cos x$.

① أثبت أنّ $f(x + 2\pi) = f(x)$ ، أيّاً يكن العدد الحقيقي x .

② تحقق أنّ $f'(x) = 3 \sin x (2 \sin 2x - 1)$ ، أيّاً يكن العدد الحقيقي x .

③ ادرس f على مجال طوله 2π ، وارسم خطه البياني على المجال $[-2\pi, 2\pi]$.

① هذه الخاصة واضحة لأن كل من \sin و \cos تابع دوري ودوره 2π .

② واضح أن


$$\begin{aligned} f'(x) &= 12 \sin^2 x \cdot \cos x - 3 \sin x \\ &= 3 \sin x \cdot (4 \sin x \cos x - 1) \\ &= 3 \sin x (2 \sin 2x - 1) \end{aligned}$$

③ على $]0, 2\pi[$ ، ينعدم $f'(x)$ فقط عند $x \in \{\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}\}$ (الموافقة لـ $\sin 2x = \frac{1}{2}$)، وعند

$x = \pi$ (الموافقة لـ $\sin x = 0$)، ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f على $[0, 2\pi]$.

x	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{12}$	π	$\frac{13\pi}{12}$	$\frac{17\pi}{12}$	2π
$f'(x)$	0	-	0	+	0	-	0
$f(x)$	3	$\searrow \frac{3\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$	$\nearrow \frac{3\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$	$\searrow -3$	$\nearrow \frac{1-3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$	$\searrow -\frac{3\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$	$\nearrow 3$

ومنه الرسم البياني للتابع f .



32 ليكن f التابع المعرف على المجال $I = [0, \frac{\pi}{2}[$ وفق $f(x) = 4x - \tan^2 x$.

① احسب التابع المشتق $f'(x)$. ضع $\tan x = t$ وتحقق أن

$$f'(x) = 2(1-t)(t^2 + t + 2)$$

② استنتج جدولاً بتغيرات f على المجال I .

③ أثبت أن للمعادلة $f(x) = -1$ ، في المجال I جذراً وحيداً α .

① هنا نتذكر أن $\tan' = 1 + \tan^2$ فنجد

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4 - 2 \tan x \cdot (\tan^2 x + 1) \\ &= -2t^3 - 2t + 4 = 2(1-t)(t^2 + t + 2) \end{aligned}$$

حيث وضعنا $t = \tan x$

② لما كان المقدار $t^2 + t + 2$ موجباً في حالة $t \geq 0$ استنتجنا أن إشارة $f'(x)$ تتفق مع إشارة

$$.x = \frac{\pi}{4} \text{ فقط في حالة } I = [0, \frac{\pi}{2}[\text{ الذي ينعدم على } 1 - t = 1 - \tan x$$

ومن جهة أخرى، نلاحظ أن $\lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x) = -\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x = +\infty$ ، فالمستقيم الشاقولي

الذي معادلته $x = \frac{\pi}{2}$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f . وهكذا يمكننا إنشاء جدول التغيرات الآتي للتابع f على I .

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	4 +	0 -	
$f(x)$	0 ↗	$\pi - 1$ ↘	$-\infty$

③ نرى من جدول التغيرات أن $f([0, \frac{\pi}{4}]) = [0, \pi - 1]$ والعدد -1 لا ينتمي إلى $[0, \pi - 1]$ فليس

للمعادلة $f(x) = -1$ حلول على المجال $[0, \frac{\pi}{4}]$. أما على المجال $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$ فالتابع f مستمر ومتردد

تماماً ويحقق $f([\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[) =]-\infty, \pi - 1[$. ولأن $-1 < \pi - 1$ استنتجنا أن للمعادلة $f(x) = -1$ حلٌ

وحيد على المجال $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$. بالنتيجة للمعادلة $f(x) = -1$ حلٌ وحيد α في المجال I . وهذا الحلٌ

ينتمي إلى المجال $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$.

ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x \cos x$.

① احسب عند كل x من \mathbb{R} ، $f'(x)$ و $f''(x)$ و $f'''(x)$.

② أثبت، مستخدماً البرهان بالتدرّج، أن مهما تكن $n \geq 1$ فلدينا:

$$f^{(n)}(x) = x \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + n \cos\left(x + (n-1) \times \frac{\pi}{2}\right)$$

① هنا لدينا

$$\begin{aligned} f(x) &= x \cos x \\ f'(x) &= -x \sin x + \cos x \\ f''(x) &= -x \cos x - 2 \sin x \\ f'''(x) &= x \sin x - 3 \cos x \end{aligned}$$

② في الحقيقة، لنتذكّر أنّ $\cos'(x+a) = -\sin(x+a) = \cos\left(x+a+\frac{\pi}{2}\right)$

• لتكن $E(n)$ الخاصة الآتية:

« مهما تكن x من \mathbb{R} يكن $f^{(n)}(x) = x \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + n \cos\left(x + (n-1) \times \frac{\pi}{2}\right)$ »

• لما كان $f'(x) = -x \sin x + \cos x = x \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1 \times \cos\left(x + 0 \times \frac{\pi}{2}\right)$ استنتجنا أنّ $E(1)$ محققة.

• لنفترض أنّ $E(n)$ صحيحة. باشتقاق العلاقة

$$f^{(n)}(x) = x \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + n \cos\left(x + (n-1) \times \frac{\pi}{2}\right)$$

نجد

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= x \cos'\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + n \cos'\left(x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right) \\ &= x \cos\left(x + \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + n \cos\left(x + \frac{(n-1)\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= x \cos\left(x + \frac{(n+1)\pi}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + n \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \\ &= x \cos\left(x + \frac{(n+1)\pi}{2}\right) + (n+1) \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

أي إنّ $E(n+1)$ صحيحة. فنكون قد أثبتنا صحة الخاصة $E(n)$ مهما كانت قيمة n .

34 ليكن f التابع المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ وفق $f(x) = \frac{2x}{x^2-1}$

① أوجد عددين حقيقيين a و b يحققان $f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$ على $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

② بالاستفادة مما سبق، أوجد عبارة $f^{(n)}(x)$ في حالة $n \geq 1$ و x من $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

الحل

① هذا سهل إذ نتيقن بسهولة أنّ $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{2x}{x^2-1}$

② وجدنا في دراستنا أنّ

$$\left(\frac{1}{x+1}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}} \quad \text{و} \quad \left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}$$

إذن

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)} + \left(\frac{1}{x+1}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}$$

نفترض وجود تابع f معرف على \mathbb{R} واشتقاقي عليها، ويحقق

$$f(0) = 0 \text{ و } f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \text{ عند كل } x \text{ من } \mathbb{R}.$$

وليكن C خطه البياني في معلم متجانس (لن نبحث عن عبارة $f(x)$).

① ليكن g التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $g(x) = f(x) + f(-x)$.

- a.* تحقق أن g اشتقاقي على \mathbb{R} . واحسب $g'(x)$.
b. احسب $g(0)$ واستنتج أن التابع f فردي.

② ليكن h التابع المعرف على $I =]0, +\infty[$ وفق $h(x) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

a. تحقق أن h اشتقاقي على I ، واحسب $h'(x)$ على I .

b. أثبت أن $h(x) = 2f(1)$ ، أيًا يكن x من I .

c. استنتج أن نهاية التابع f عند $+\infty$ تساوي $2f(1)$.

d. ماذا تستنتج بشأن الخط البياني C ؟

③ ليكن k التابع المعرف على $J = \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ وفق $k(x) = f(\tan x) - x$.

a. احسب $k'(x)$. ماذا تستنتج بشأن التابع k ؟

b. احسب $f(1)$.

c. نظم جدولاً بتغيرات f على \mathbb{R} .

d. ارسم المستقيمات المقاربة للخط البياني C وارسم مماساته في النقاط التي فواصلها -1

و 0 ، ثم ارسم C .

الجدل

① *a.* لما كان f اشتقاقياً على \mathbb{R} استنتجنا أن $g : x \mapsto f(x) + f(-x)$ اشتقاقي على \mathbb{R} ولدينا

$$g'(x) = f'(x) - f'(-x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+(-x)^2} = 0$$

① *b.* إذن التابع g تابع ثابت، ولدينا $g(0) = 2f(0) = 0$ إذن $g = 0$ على \mathbb{R} . هذا يبرهن أن التابع f تابع فردي.

② *a.* لما كان f اشتقاقياً على \mathbb{R} ، وكان التابع $x \mapsto \frac{1}{x}$ اشتقاقياً على $I =]0, +\infty[$ ، استنتجنا أن

$h : x \mapsto f(x) + f(1/x)$ اشتقاقي على I ولدينا

$$h'(x) = f'(x) - \frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{1+x^{-2}} = 0$$

② b. نستنتج إذن أن h تابع ثابت على I ، ولأن $h(1) = 2f(1)$ استنتجنا أن $h(x) = 2f(1)$ أيًا كانت قيمة x من I .

② c. لما كان $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = f(0) = 0$ ، فإذا لاحظنا أنه في حالة $x > 0$

لدينا $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2f(1) - 0 = 2f(1)$ استنتجنا أن $f(x) = 2f(1) - f\left(\frac{1}{x}\right)$

② d. إذن يقبل الخط البياني للتابع f مستقيماً مقارباً أفقياً معادلته $y = 2f(1)$.

③ a. في حالة x من J لدينا

$$k'(x) = f'(\tan x)(1 + \tan^2 x) - 1 = \frac{1}{1 + \tan^2 x}(1 + \tan^2 x) - 1 = 0$$


إذن التابع k تابع ثابت على J ، ولكن $k(0) = f(0) - 0 = 0$ ، إذن $f(\tan x) = x$ في حالة x من J .

③ b. باختيار $x = \frac{\pi}{4}$ نجد $f(1) = \frac{\pi}{4}$.

③ c. وبلاستفادة من كون f فردياً يمكننا أن ننشئ جدول تغيرات f الآتي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	$\nearrow 0 \nearrow$	$\frac{\pi}{2}$

③ d. معادلة المماس في $(1, \frac{\pi}{4})$ هي $y = \frac{\pi-2}{4} + \frac{1}{2}x$. ومنه الرسم الآتي:



4

نهاية متتالية

1 نهاية متتالية : تذكرة

2 مبرهنات تخصّ النهايات

3 تقارب المتتاليات المطّردة

4 متتاليات متجاورة

نقاط التعلّم الأساسية في هذه الوحدة

- نهاية متتالية وقواعد حسابها.
- المتتاليات المطردة، وتقارب المحدودة منها، مبرهنة فايرشتراس.
- المتتاليات المتجاورة: إثبات التجاور واستخلاص النتائج.
- تطبيقات على دراسة بعض المتتاليات المعرفة تدريجياً.



① المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة وفق $u_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$. نعلم أنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. جد عدداً طبيعياً n_0 يحقق

$$u_n \in]-10^{-3}, 10^{-3}[\text{ عند كل } n > n_0.$$

الحل حدود المتتالية موجبة فالشرط $u_n \in]-10^{-3}, 10^{-3}[$ يُكافئ $\frac{1}{n\sqrt{n}} < \frac{1}{10^3}$ أو $n^3 < 10^6$ وأخيراً $n > 100$. إذن باختيار $n_0 = 100$ نضمن أنّ جميع الحدود u_n حيث $n > n_0$ تقع في المجال المطلوب.

② المتتالية $(u_n)_{n \geq 2}$ معرفة وفق $u_n = \frac{3n+1}{n-1}$ وتساوي نهايتها 3. جد عدداً طبيعياً n_0 يجعل

$$u_n \in]2.98, 3.02[\text{ عند كل } n \text{ أكبر تماماً من } n_0.$$

الحل هنا الشرط $u_n \in]2.98, 3.02[$ يعني $2.98 < u_n < 3.02$ أو $-0.02 < u_n - 3 < 0.02$. ولكن

$$u_n - 3 = \frac{4}{n-1}$$

إذن $u_n - 3$ مقدار موجب، و تتحقق المتراجحة $-0.02 < u_n - 3 < 0.02$ إذا وفقط إذا كان

$$\frac{4}{n-1} < \frac{2}{100}$$

وهذا يكافئ $200 < n - 1$ أو $201 < n$. فإذا اخترنا $n_0 \geq 201$ تحقق المطلوب.

③ المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة وفق $u_n = n\sqrt{n}$. نعلم أنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$. جد عدداً طبيعياً n_0

يجعل $u_n > 10^6$ عند كل n أكبر تماماً من n_0 .

الحل الشرط $u_n > 10^6$ يكافئ $n\sqrt{n} > 10^6$ أي $n^3 > 10^{12}$ أو $n > 10^4$. فإذا اخترنا $n_0 \geq 10000$ تحقق المطلوب.

④ احسب نهاية كل من المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ حيث $x_n = \frac{3^n}{2^n}$ و $y_n = \frac{10^n}{(10.1)^n}$.

الحل المتتالية $u_n = \frac{3^n}{2^n}$ متتالية هندسية من الشكل $u_n = q^n$ حيث $q = 1.5 > 1$ فهي تسعى إلى

$+\infty$ لأن أساسها أكبر تماماً من الواحد.

بالمثل المتتالية $u_n = \frac{10^n}{(10.1)^n}$ متتالية هندسية من الشكل $u_n = q^n$ حيث $q = \frac{1}{1.01}$ فهي تسعى إلى

0 لأن أساسها يحقق $-1 < q < 1$.

⑤ ليكن $-1 < q < 1$ ، ولنعرّف المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ بالعلاقة $u_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$. أعط

صيغة أخرى تفيد في حساب u_n واستنتج قيمة $S = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

الحل هذا مجموع متتالية هندسية أساسها q وحدها الأول 1. إذن

$$u_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} - \frac{q}{1 - q} \times q^n$$

ولكن $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ لأن $-1 < q < 1$ ، ومن ثم $S = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1}{1 - q}$

⑥ نتأمل المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ المعرفتين وفق:

$$y_n = x_n + 3 \quad \text{و} \quad x_{n+1} = \frac{1}{3}x_n - 2, \quad x_0 = 3$$

1. أثبت أن المتتالية $(y_n)_{n \geq 0}$ هندسية.

b. احسب y_n ثم x_n بدلالة n .

2. نضع $S'_n = x_0 + \dots + x_n$ و $S_n = y_0 + \dots + y_n$

a. احسب كلياً من S'_n و S_n بدلالة n .

b. استنتج نهاية كلٍّ من المتتاليتين $(S'_n)_{n \geq 0}$ و $(S_n)_{n \geq 0}$.

الحل 1. نحسب

$$y_{n+1} = x_{n+1} + 3 = \frac{1}{3}x_n - 2 + 3 = \frac{1}{3}(x_n + 3) = \frac{1}{3}y_n$$

فالمتتالية $(y_n)_{n \geq 0}$ هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدها الأول $y_0 = x_0 + 3 = 6$. إذن $y_n = \frac{6}{3^n}$ ، ومن ثم

$$x_n = \frac{6}{3^n} - 3$$

2. نضع $S'_n = x_0 + \dots + x_n$ و $S_n = y_0 + \dots + y_n$ ، فيكون

$$S_n = \frac{6}{3^0} + \frac{6}{3^1} + \dots + \frac{6}{3^n} = 6 \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 9 \left(1 - \frac{1}{3^{n+1}}\right) = 9 - \frac{3}{3^n}$$

و

$$\begin{aligned} S'_n &= x_0 + \dots + x_n = (y_0 - 3) + (y_1 - 3) + \dots + (y_n - 3) \\ &= y_0 + \dots + y_n - 3(n+1) = S_n - 3n - 3 = -3n + 6 - \frac{3}{3^n} \end{aligned}$$

إذن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-3n + 6 - \frac{3}{3^n}\right) = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(9 - \frac{3}{3^n}\right) = 9$$

⑦ نتأمل متتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ ، معرفة وفق العلاقة التدرجية $u_{n+1} = au_n + b$ و $u_0 = s$.

① نفترض أن $a = 1$ ، تبيّن أن $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية حسابية في هذه الحالة، واحسب u_n بدلالة n و b و s في هذه الحالة.

② هنا نفترض أن $a \neq 1$. ونضع l الحل الوحيد للمعادلة $x = ax + b$.

a نعرّف $(t_n)_{n \geq 0}$ بالعلاقة $v_n = t_n - l$. برهن أن $(t_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية.

b استنتج صيغة t_n بدلالة n و b و a و s في هذه الحالة.

c برهن أنه في حالة $-1 < a < 1$ تتقارب المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ ، واحسب نهايتها بدلالة a و b .

و s .

الحل

① واضح هنا أن المتتالية حسابية في هذه الحالة لأن $u_{n+1} - u_n = b$ أي كانت قيمة n . فحدها الأول $u_0 = s$ وأساسها b إذن $u_n = s + bn$ أي كان n .

② لأن $a \neq 1$ للمعادلة $x = ax + b$ حلٌ وحيد هو $l = \frac{b}{1-a}$. تعريفاً لدينا $l = al + b$ ومن

جهة أخرى $u_{n+1} = au_n + b$ فإذا طرحنا الأولى من الثانية وجدنا

$$u_{n+1} - l = au_n - al = a(u_n - l)$$

أو $t_{n+1} = at_n$ فالمتتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالصيغة $t_n = u_n - l$ متتالية هندسية أساسها a وحدها

الأول $t_0 = u_0 - l = s - l$. إذن، مهما كان العدد الطبيعي n كان

$$t_n = (s - l)a^n = \left(s - \frac{b}{1-a}\right)a^n$$

في حالة $-1 < a < 1$ لدينا $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ ومن ثم $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 0$. ولكن $u_n = l + t_n$ إذن

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{b}{1-a}$$

تَدْرِبْ صفحة 123

① المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة وفق $u_n = \frac{\cos(2n)}{\sqrt{n}}$. تحقّق أن $-\frac{1}{\sqrt{n}} < u_n < \frac{1}{\sqrt{n}}$ ، وذلك أيّاً يكن

$n \geq 1$ ، ثم استنتج نهاية $(u_n)_{n \geq 1}$.

الحل تطبيق مباشر على مبرهنة الإحاطة. سهل ومتروك للقارئ.

② المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة بالصيغة $u_n = n + 1 - \cos n$. تحقّق أن $n \leq u_n \leq n + 2$ ، وذلك أيّاً

يكن $n \geq 1$ ، ثم استنتج نهاية $(u_n)_{n \geq 1}$.

الحل تطبيق مباشر على مبرهنة الإحاطة. سهل ومتروك للقارئ.

③ فيما يأتي احسب نهاية المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ في حال وجودها:

- | | | | | | |
|--|-----|---|-----|--|-----|
| $u_n = n - \frac{1}{n+1}$ | •3 | $u_n = \frac{5n-3}{3n-5}$ | •2 | $u_n = \frac{2n+3}{3n-1}$ | •1 |
| $u_n = \frac{n}{4} + \frac{2n}{n^2+1}$ | •6 | $u_n = \frac{-3n^2+2n+4}{2(n+1)^2}$ | •5 | $u_n = \frac{5n^2-3n+7}{n^2+n+1}$ | •4 |
| $u_n = \sqrt{\frac{4n-3}{n+1}}$ | •9 | $u_n = \frac{2n^2-1}{3n+5}$ | •8 | $u_n = \frac{10n-3}{n^2+1}$ | •7 |
| $u_n = \sin\left(\frac{n\pi+1}{2n+1}\right)$ | •12 | $u_n = \cos\left(\frac{2n\pi}{3n+1}\right)$ | •11 | $u_n = \sqrt{\frac{2n^2-1}{3n+1}}$ | •10 |
| $u_n = \frac{n!-2}{n!}$ | •15 | $u_n = \sqrt{n^2+n} - n - \frac{1}{2}$ | •14 | $u_n = \frac{2n+(-1)^n}{3n}$ | •13 |
| $u_n = \frac{n\sqrt{n}+n}{n+2}$ | •18 | $u_n = \frac{n}{\sqrt{n+1}} - \frac{n}{\sqrt{n+2}}$ | •17 | $u_n = \sqrt{2n^2-5} - n\sqrt{2}$ | •16 |
| $u_n = \frac{\sqrt{n+1}}{n+1}$ | •21 | $u_n = \frac{3n - \sqrt{9n^2+1}}{\sqrt{n^2+5}}$ | •20 | $u_n = n^2 \left(\sqrt{2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{2} \right)$ | •19 |

الحل الإجابات:

- | | | | | | |
|-----------|-----|----------------|-----|---------------|-----|
| $+\infty$ | •3 | $\frac{5}{3}$ | •2 | $\frac{2}{3}$ | •1 |
| $+\infty$ | •6 | $-\frac{3}{2}$ | •5 | 5 | •4 |
| 2 | •9 | $+\infty$ | •8 | 0 | •7 |
| 1 | •12 | $-\frac{1}{2}$ | •11 | $+\infty$ | •10 |
| 1 | •15 | 0 | •14 | $\frac{2}{3}$ | •13 |
| $+\infty$ | •18 | 0 | •17 | 0 | •16 |
| 0 | •21 | 0 | •20 | $+\infty$ | •19 |

في حالة المتتالية •14 $u_n = \sqrt{n^2+n} - n - \frac{1}{2}$ نكتب

$$u_n = \frac{n^2+n - (n + \frac{1}{2})^2}{\sqrt{n^2+n} + n + \frac{1}{2}} = \frac{-1}{4\sqrt{n^2+n} + 4n + 2}$$

المقام يسعى إلى $+\infty$ والبسط ثابت. إذن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

وفي حالة •15 $u_n = \frac{n!-2}{n!}$ نلاحظ أنّ $1 - u_n = \frac{2}{n!}$ إذن $0 \leq 1 - u_n = \frac{2}{n!} < \frac{2}{n}$ ولأنّ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0 \text{ استنتجنا أنّ } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - u_n) = 0 \text{ أو } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$$

وفي حالة 19. $u_n = n^2 \left(\sqrt{2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{2} \right)$ نلاحظ أنّ

$$\sqrt{2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{2} = \frac{1}{n(\sqrt{2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{2})} \geq \frac{1}{n(\sqrt{3} + \sqrt{2})} \geq \frac{1}{4n}$$

إذن $u_n \geq \frac{n}{4}$ ، ولأنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4} = +\infty$ استنتجنا أنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$.

تدرّب صفحة 128

① في كلّ من الحالات الآتية، مثلّ هندسياً الحدود الأولى من المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ ، ثمّ خمنّ جهة اطردھا إذا كانت مطّردة ونهايتها المحتملة.

1 $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 3$

2 $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n$

3 $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = u_n + 2$

الحل تمرين بسيط ومتروك للقارئ.

② تأمل المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة وفق $u_n = 5 - \frac{10}{n^2}$. بيّن أيّ الأعداد الآتية راجحّ عليها: 0، 6، 4.99999، 5 ؟

الحل يكون عددّ راجحاً على متتالية إذا كان أكبر من جميع حدودها. هنا العددين 6 و 5 راجحان على $(u_n)_{n \geq 1}$ في حين لا يكون العددين 0 و 4.99999 راجحين عليها لأنّه إذا اخترنا $n = 10000$ مثلاً كان $u_{10000} = 4.9999999$ وهو أكبر من كلا العددين 0 و 4.99999.

③ تأمل المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق $u_n = \frac{n^2 + n + 1}{n^2 - n + 1}$. أثبت أنّ $1 \leq u_n \leq 3$ ، أيّاً يكن العدد

الطبيعي n .

الحل

في الحقيقة

$$u_n - 1 = \frac{n^2 + n + 1}{n^2 - n + 1} - 1 = \frac{2n}{1 + n(n-1)} \geq 0$$

$$3 - u_n = 3 - \frac{n^2 + n + 1}{n^2 - n + 1} = \frac{2(n-1)^2}{1 + n(n-1)} \geq 0$$

ومنه يكون $1 \leq u_n \leq 3$ ، أيّاً كانت n .

④ فيما يأتي أعطِ متتاليتين $(t_n)_{n \geq 2}$ و $(s_n)_{n \geq 2}$ ، تختلفان عن $(u_n)_{n \geq 2}$ وتحققان $t_n \leq u_n \leq s_n$ أيًا يكن $n \geq 2$.

$$\begin{array}{ll} u_n = \frac{5n+1}{n+1} & \text{②} \quad u_n = \frac{n+2}{n+1} & \text{①} \\ u_n = \frac{n^2-4n+7}{n-1} & \text{④} \quad u_n = \frac{2n-3}{(n-1)(n+2)} & \text{③} \\ u_n = \frac{1}{\sqrt{n+2}} & \text{⑥} \quad u_n = \sqrt{2+n} & \text{⑤} \end{array}$$

الـحل هنا المطلوب أمثلة، ولا يوجد حلول وحيدة

t_n	\leq	u_n	\leq	s_n	
$\frac{n}{n+1}$	\leq	$\frac{n+2}{n+1}$	\leq	$\frac{n+2}{n}$	①
$\frac{5n}{n+1}$	\leq	$\frac{5n+1}{n+1}$	\leq	6	②
$\frac{2n-3}{n(n+2)}$	\leq	$\frac{2n-3}{(n-1)(n+2)}$	\leq	$\frac{2}{n-1}$	③
$\frac{n^2-4n}{\sqrt{n}}$	\leq	$\frac{n^2-4n+7}{\sqrt{2+n}}$	\leq	$\frac{n^2+7}{n}$	④
$\frac{n-1}{\sqrt{n}}$	\leq	$\frac{n-1}{\sqrt{2+n}}$	\leq	n	⑤
$\frac{1}{n}$	\leq	$\frac{1}{\sqrt{n+2}}$	\leq	1	⑥

⑤ فيما يأتي، بين إذا كانت المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ محدودة، أو محدودة من الأعلى، أو من الأدنى.

$u_n = \frac{1}{n+2}$ ③	$u_n = 1 + \frac{1}{n^2}$ ②	$u_n = \sin n$ ①
$u_n = \sqrt{\frac{n^2-1}{n^2+1}}$ ⑥	$u_n = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ ⑤	$u_n = \frac{1}{1+n^2}$ ④
$u_n = n^2 + n - 1$ ⑨	$u_n = n\sqrt{3} - 2$ ⑧	$u_n = \frac{-2}{\sqrt{2n+3}}$ ⑦
$u_n = (-1)^n \times n^2$ ⑫	$u_n = n + \cos n$ ⑪	$u_n = \frac{1}{n+1} + n^2$ ⑩

الـحل

1. محدودة لأن $-1 \leq \sin n \leq 1$ أيًا كانت $n \geq 1$.
2. محدودة لأن $1 \leq 1 + \frac{1}{n^2} \leq 2$ أيًا كانت $n \geq 1$.
3. محدودة لأن $0 \leq \frac{1}{n+2} \leq 1$ أيًا كانت $n \geq 1$.
4. محدودة لأن $0 \leq \frac{1}{1+n^2} \leq \frac{1}{2}$ أيًا كانت $n \geq 1$.

5. محدودة لأن $0 \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} \leq 1$ أيًا كانت $n \geq 1$.

6. محدودة لأن $0 \leq \frac{\sqrt{n^2-1}}{\sqrt{n^2+1}} \leq 1$ أيًا كانت $n \geq 1$.

7. محدودة لأن $-1 \leq \frac{-2}{\sqrt{2n+3}} \leq 0$ أيًا كانت $n \geq 1$.

8. محدودة من الأدنى فقط لأن $-2 \geq n\sqrt{3} - 2$ أيًا كانت $n \geq 1$ ، ولكنها غير محدودة من الأعلى لأن $\lim_{n \rightarrow \infty} (n\sqrt{3} - 2) = +\infty$.

9. محدودة من الأدنى بالعدد -1 وغير محدودة من الأعلى.

10. محدودة من الأدنى بالعدد 0 وغير محدودة من الأعلى.

11. محدودة من الأدنى بالعدد 0 وغير محدودة من الأعلى.

12. غير محدودة من الأدنى وغير محدودة من الأعلى.

⑥ لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بالصيغة :

$$u_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \frac{4}{3^4} + \dots + \frac{n}{3^n}$$

1 أثبت بالتدرج على العدد n ، أن $n \leq 2^n$ مهما كان العدد الطبيعي n .

2 استنتج مما سبق عنصراً راجحاً على المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$.

الحل

1

• لتكن $E(n)$ الخاصة $2^n \geq n$.

• الخاصتان $E(0)$ و $E(1)$ محققتان وضوحاً لأن $2^0 \geq 0$ و $2^1 \geq 1$.

• لنفترض صحة $E(n)$ في حالة عدد $n \geq 1$. عندئذ $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2n \geq n+1$.

فالخاصة $E(n+1)$ محققة أيضاً، فنكون قد أثبتنا بالتدرج أن $2^n \geq n$ أيًا كانت n .

2 بالاستفادة مما سبق نستبدل كل عدد k في بسط كل كسر بالقوة 2^k لنجد

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \frac{4}{3^4} + \dots + \frac{n}{3^n} \\ &\leq \frac{2^1}{3^1} + \frac{2^2}{3^2} + \frac{2^3}{3^3} + \frac{2^4}{3^4} + \dots + \frac{2^n}{3^n} \\ &= q + q^2 + q^3 + q^4 + \dots + q^n : \quad q = \frac{2}{3} \\ &= q \frac{1-q^n}{1-q} = 2 \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right) \leq 2 \end{aligned}$$

فالممتتالية محدودة من الأعلى بالعدد 2 .

① لتكن $(s_n)_{n \geq 0}$ و $(t_n)_{n \geq 0}$ المتتاليتان المعرفتان وفق $s_n = \frac{1}{n+1}$ و $t_n = -\frac{1}{2n+4}$. أثبت أنهما

متجاورتان ثم عيّن نهايتهما المشتركة.

الحل

هذا تطبيق مباشر على التعريف. يمكن مثلاً حساب إشارة الفرقين $s_{n+1} - s_n$ و $t_{n+1} - t_n$ ثم تعيين

$$\text{نهاية } (s_n - t_n)_n \text{ . نجد } \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 0$$

② لتكن $(s_n)_{n \geq 0}$ و $(t_n)_{n \geq 0}$ المتتاليتان المعرفتان وفق $s_n = 1 + \frac{1}{n^2}$ و $t_n = \frac{n-1}{n}$. أثبت أنهما

متجاورتان ثم عيّن نهايتهما المشتركة.

الحل

هذا تطبيق مباشر على التعريف. يمكن مثلاً حساب إشارة الفرقين $s_{n+1} - s_n$ و $t_{n+1} - t_n$ ثم تعيين

$$\text{نهاية } (s_n - t_n)_n \text{ . نجد } \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$$

③ في كلٍّ من الحالات الآتية، تبيّن إن كانت المتتاليتان $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ متجاورتين أم لا.

$$y_n = x_n + \frac{1}{4n}, \quad x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \quad ①$$

$$y_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}, \quad x_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1} \quad ②$$

$$y_n = x_n + \frac{1}{n}, \quad x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \quad ③$$

$$y_n = 2 + \frac{1}{n^2}, \quad x_n = 2 - \frac{1}{n} \quad ④$$

الحل

① هنا

$$x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$$

إذن

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0$$

فالمتتالية $(x_n)_{n \geq 1}$ متزايدة.

ونجد

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= x_{n+1} - x_n + \frac{1}{4(n+1)} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} - \frac{1}{2n(2n+2)} \\ &= \frac{1}{2n+2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n} \right) = -\frac{1}{4n(n+1)(2n+1)} < 0 \end{aligned}$$

فالممتالية $(y_n)_{n \geq 1}$ متناقصة.وأخيراً $y_n - x_n = \frac{1}{4n}$ ، إذن $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$. فالممتاليتان $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ متجاورتان.

هنا 2

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1} \\ x_{n+1} &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} \end{aligned}$$

إذن

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{n} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n} = -\frac{1}{2n(2n+1)} < 0$$

فالممتالية $(x_n)_{n \geq 1}$ متناقصة.

وكذلك

$$\begin{aligned} y_n &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \\ y_{n+1} &= \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \end{aligned}$$

إذن

$$y_{n+1} - y_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{(2n+2)(2n+1)} > 0$$

فالممتالية $(y_n)_{n \geq 1}$ متزايدة.وأخيراً $x_n - y_n = \frac{1}{2n}$ ، إذن $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$. فالممتاليتان $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ متجاورتان.هنا 3 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{(n+1)^2}$ والمتالية $(x_n)_{n \geq 1}$ متزايدة. ونجد أيضاً

$$y_{n+1} - y_n = x_{n+1} - x_n + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)} = -\frac{1}{n(n+1)^2} < 0$$


فالممتالية $(y_n)_{n \geq 1}$ متناقصة. وأخيراً $y_n - x_n = \frac{1}{n}$ ، إذن $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$. فالممتاليتان $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ متجاورتان.

4 بسيط ومتروك للقارئ.

أنشطة

نشاط 1 تمثيلٌ هندسي لمتتالية من النمط $u_{n+1} = f(u_n)$

1 المبدأ



في الشكل المجاور، C هو الخط البياني لتابع f في معلم متجانس. نوضّع العدد الحقيقي u_0 على محور الفواصل، ثمّ النقطة A_0 ذات الفاصلة u_0 على الخط البياني C ، نرمز إلى ترتيب A_0 بالرمز u_1 فيكون $u_1 = f(u_0)$.

نوضّع u_1 على محور الفواصل بالاستفادة من المستقيم Δ الذي معادلته $y = x$ ، u_1 هي فاصلة نقطة تقاطع Δ والمستقيم الذي معادلته $y = u_1$.

نرمز إلى ترتيب النقطة A_1 من الخط C ، التي فاصلتها u_1 ، بالرمز u_2 فيكون $u_2 = f(u_1)$. نوضّع u_2 على محور الفواصل بالاستفادة من المستقيم Δ كما في السابق. ونتابع بهذا لتعيين القيم المتتالية للمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة التدرجية $u_{n+1} = f(u_n)$.

2 تمرين


في كلّ من الحالات الآتية، مثلّ الحدود الأولى للمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المشار إليها، ثمّ خمنْ جهة تغييرها ونهايتها المحتملة.

$$\begin{array}{ll} u_{n+1} = u_n^2 - 1, & u_0 = 1 \quad \textcircled{2} \\ u_{n+1} = 2u_n - 1, & u_0 = 1 \quad \textcircled{1} \\ u_{n+1} = \frac{1}{u_n + 2}, & u_0 = 1 \quad \textcircled{4} \\ u_{n+1} = u_n^2 - 1, & u_0 = 0 \quad \textcircled{3} \\ u_{n+1} = u_n^2, & u_0 = 1 \quad \textcircled{6} \\ u_{n+1} = \frac{1}{u_n} + u_n, & u_0 = 1 \quad \textcircled{5} \end{array}$$

الدليل

- ① متتالية ثابتة. وهي تسعى إلى 1
- ② الحدود ذات الدليل الفردي تساوي الصفر والحدود ذات الدليل الزوجي تساوي -1 بدءاً من الدليل 2 أي $u_1 = u_3 = \dots = u_{2m+1} = 0$ و $u_2 = u_4 = \dots = u_{2m} = -1$ وهي إذن غير متقاربة.
- ③ الحدود ذات الدليل الزوجي تساوي الصفر والحدود ذات الدليل الفردي تساوي -1 أي $u_0 = u_2 = \dots = u_{2m} = 0$ و $u_1 = u_3 = \dots = u_{2m+1} = -1$ وهي إذن غير متقاربة.


④ نلاحظ من الشكل أنّ متتالية الحدود ذات الدليل الزوجي تتناقص، ومتتالية الحدود ذات الدليل الفردي تتزايد، وأنّ المتتالية تتقارب من l الذي هو الحل الموجب (لأن جميع حدود المتتالية موجبة) للمعادلة $f(x) = x^2 + 2x - 1 = 0$ ومنه $l = \sqrt{2} - 1$.



الخلاصة: إذا وضعنا $l = \sqrt{2} - 1$ ، فإننا نلاحظ أنّ $l \leq u_{2n+2} \leq u_{2n}$ و $u_{2n-1} \leq u_{2n+1} \leq l$ أيّ كانت قيمة n وأنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sqrt{2} - 1$.

ملاحظة: هنا لا يُطلب من الطالب إثبات أي شيء، بل ملاحظة الرسم، للتنبؤ بالخواص.

⑤ نلاحظ من الشكل أنّ المتتالية متزايدة تماماً وتوسعى إلى $+\infty$. في الحقيقة، لو تقاربت من عدد موجب تماماً l لوجب أن يحقق المعادلة $l = l + \frac{1}{l}$ وهذا تناقض.



ملاحظة: نؤكد هنا لا يُطلب من الطالب إثبات أي شيء، بل ملاحظة الرسم، للتنبؤ بالخواص.

⑥ هنا نلاحظ أنّ المتتالية ثابتة وتوسعى من 1 إلى 1.


3 تطبيق

نتأمل المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً بالشرطين $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n}$. استعمل الطريقة

السابقة لتجيب عن الأسئلة الآتية :

- ① أتكون المتتالية مطردة؟ أتكون محدودة من الأدنى؟ أتكون متقاربة؟
- ② برهن صحة النتائج التي توصلت إليها إن أمكن.

الحل



① نلاحظ من الشكل أنّ المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة تماماً ومحدودة من الأدنى بالعدد $\sqrt{2}$ ، وأنها تسعى إلى العدد $\sqrt{2}$.

② لنعرّف $E(n)$ الخاصة $\sqrt{2} < u_{n+1} < u_n$.

• نلاحظ أنّ $u_1 = 1.5$ إذن $E(0)$ محققة لأنّ $\sqrt{2} < 1.5 < 2$.

• لنفترض أنّ $E(n)$ محققة. ولنلاحظ أنّ مشتق التابع

المعرّف على $[\sqrt{2}, +\infty[$ بالصيغة $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$

موجب تماماً على المجال المفتوح $[\sqrt{2}, +\infty[$ ، فهو

متزايداً تماماً على المجال $[\sqrt{2}, +\infty[$ ، ومن ثمّ نستنتج

من المتراجحة $\sqrt{2} < u_{n+1} < u_n$ أنّ $f(\sqrt{2}) < f(u_{n+1}) < f(u_n)$ ، وهذه تكافئ المتراجحة

$\sqrt{2} < u_{n+2} < u_{n+1}$ ، فالخاصة $E(n+1)$ محققة. وهكذا نكون قد أثبتنا أنّ المتتالية متناقصة

ومحدودة من الأدنى بالعدد $\sqrt{2}$. فهي إذن متقاربة من عدد l أكبر أو يساوي $\sqrt{2}$ ويحقق المساواة

$l = f(l)$. وهذان الشرطان يقتضيان أن يكون $l = \sqrt{2}$. أي إنّ المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة تماماً

ومتقاربة من العدد $\sqrt{2}$.

ملاحظة: تسمى هذه الطريقة في حساب العدد $\sqrt{2}$ الطريقة البابلية، وقد كانت معروفة للبابليين.



نشاط 2 حجم مجسم قطع مكافئ دوراني

في الشكل نجد الخط البياني للتابع $f: x \mapsto x^2$ ، الذي يسمى قطعاً مكافئاً معادلته $y = x^2$ ، وهو


متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب كما تعلم. نهتم بالجزء C الموافق لقيم x من المجال $[-2, 2]$.

عندما يدور C في الفراغ دورة كاملة حول محور الترتيب، نحصل على مجسم نسميه **مجسم القطع**

المكافئ الدوراني.



نهدف إلى حساب V حجم هذا الجسم، في مثل هذه الحالات وفي غياب أية طرائق أخرى نسعى إلى حصر المقدار المجهول، وهو هنا V بمقادير معلومة ويمكننا حسابها، وفي الوقت نفسه نحصر المقدار المجهول بالدقة التي نريد. لنوضح المقصود: نحن نعرف كيف نحسب حجم أسطوانة، لنرجع الأمر إلى حساب مجموع أحجام أسطوانات.



ليكن n عدداً طبيعياً أكبر تماماً من 2. ولنفترض أننا حاولنا ملء الجسم بـ $n-1$ أسطوانة ارتفاع كل منها $\frac{4}{n}$ ، (بالطبع ستبقى بعض الفراغات)، وأنها استطعنا وضع الجسم داخل n أسطوانة ارتفاع كل منها $\frac{4}{n}$ أيضاً، كما في الشكل المجاور. لنرمز بالرمز V_n إلى مجموع أحجام الأسطوانات الخارجية، وبالرمز v_n إلى مجموع أحجام الأسطوانات الداخلية.

① برهن أن

$$v_n = \frac{16\pi}{n^2}(1 + 2 + \dots + (n-1)) \quad \text{و} \quad V_n = \frac{16\pi}{n^2}(1 + 2 + \dots + (n-1) + n)$$

② برهن أن المتتاليتين $(V_n)_{n \geq 0}$ و $(v_n)_{n \geq 0}$ متقاربتان، واستنتج قيمة V أي حجم الجسم المطلوب.

الجدل

من النص نجد أنه تم وضع الجسم داخل n أسطوانة ارتفاع كل منها $h = \frac{4}{n}$ ، تم تقسيم ارتفاع

الجسم $[0, 4]$ إلى n جزءاً متساوياً إلى n بواسطة النقاط

$$x_0 = 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_k < \dots < x_n = 4$$

حيث $x_1 = h$ ، $x_2 = 2h$ ، وهكذا $x_k = kh$ وأخيراً $x_n = nh = 4$.

هناك n أسطوانة خارجية:

- ارتفاع الأسطوانة الخارجية ذات الدليل 1 يساوي h ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{x_1}$ فحجمها $\pi x_1 h$.

- ارتفاع الأسطوانة الخارجية ذات الدليل 2 يساوي h ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{x_2}$ فحجمها $\pi x_2 h$.
 - وهكذا...
 - ارتفاع الأسطوانة الخارجية ذات الدليل k يساوي h ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{x_k}$ فحجمها $\pi x_k h$.
 - وارتفاع الأسطوانة الخارجية ذات الدليل n يساوي h ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{x_n}$ فحجمها $\pi x_n h$.
- وهكذا نجد أنّ مجموع حجوم الاسطوانات الخارجية يساوي

$$V_n = \pi h(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \pi h^2(1 + 2 + \dots + n)$$

وهي الصيغة المطلوبة لأنّ $h = 4/n$. وكذلك

هناك $n - 1$ اسطوانة داخلية:

- ارتفاع الأسطوانة الداخلية ذات الدليل 1 يساوي h ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{x_1}$ فحجمها $\pi x_1 h$.
- ارتفاع الأسطوانة الداخلية ذات الدليل 2 يساوي h ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{x_2}$ فحجمها $\pi x_2 h$.
- وهكذا...
- ارتفاع الأسطوانة الداخلية ذات الدليل k يساوي h ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{x_k}$ فحجمها $\pi x_k h$.
- وارتفاع الأسطوانة الداخلية ذات الدليل $n - 1$ يساوي h ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{x_{n-1}}$ فحجمها $\pi x_{n-1} h$.

وهكذا نجد أنّ مجموع حجوم الاسطوانات الداخلية يساوي

$$v_n = \pi h(x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1}) = \pi h^2(1 + 2 + \dots + (n - 1))$$

وهي الصيغة المطلوبة لأنّ $h = 4/n$.

② نعرف مجموع متتالية حسابية. إذن

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{و} \quad 1 + 2 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

ومنه $V_n = 8\pi \left(\frac{n+1}{n}\right)$ و $v_n = 8\pi \left(\frac{n-1}{n}\right)$ ولأنّ $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 8\pi$ ولدينا

$v_n \leq \mathcal{V} \leq V_n$ أيّاً كانت n استنتجنا بجعل n تسعى إلى اللانهاية أنّ $\mathcal{V} = 8\pi$.

تمرنات ومسائل

1 المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة وفق $u_n = \frac{1}{n!}$. $(n \geq 1)$ عندما $n! = n(n-1) \times \dots \times 2 \times 1$.

① احسب الحدود الستة الأولى منها.

② تيقن أن $0 < u_n \leq \frac{1}{n}$ ثم استنتج نهاية $(u_n)_{n \geq 1}$.

الجل

①

n	1	2	3	4	5	6
u_n	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{120}$	$\frac{1}{720}$

② من الواضح أن جداء ضرب أعداد طبيعية جميعها أكبر من الواحد هو عدد أكبر من الواحد، إذن من الطبيعي أن يكون $n! \geq n(n-1) \dots 2 \cdot 1 \geq n$ في حالة $n \geq 2$. وهذا المتراجحة تبقى صحيحة أيضاً في حالة $n = 1$. إذن $n! \geq n(n-1) \dots 2 \cdot 1 \geq n$ مهما كانت $n \geq 1$ ، وهذا يقتضي أن يكون $0 < u_n = \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{n}$ في حالة $n \geq 1$. ولأن $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ استنتجنا أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ استناداً إلى مبرهنة الإحاطة مثلاً.

2 المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة وفق $u_n = \left(\frac{n}{10} - 1\right)^n$.

① أعط قيمة تقريبية لحدودها الأولى من u_1 حتى u_{11} .

② أثبت أن جميع حدودها، بدءاً من الحد u_{31} ، تحقق $u_n \geq 2^n$. استنتج نهاية $(u_n)_{n \geq 1}$.

الجل

الهدف من هذا التمرين هو تنبيه الطالب إلى أن قيم حدود المتتالية الأولى يمكن أن تقودنا إلى استنتاجات خاطئة.

①

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
u_n	-0.9	0.64	-0.34	0.13	$-\frac{3.1}{10^2}$	$\frac{4.1}{10^3}$	$-\frac{2.2}{10^4}$	$\frac{2.6}{10^6}$	$-\frac{1.0}{10^9}$	0.	$\frac{1.0}{10^{11}}$

توحي لنا هذه القيم وكان المتتالية تسعى إلى الصفر، ولكن مهلاً.

② في حالة $n \geq 31$ يكون $\frac{n}{10} - 1 \geq \frac{31}{10} - 1 = 2.1 > 2$ ، ومن ثم $u_n > 2^n$. إذن

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = +\infty \quad \text{لأن} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$$

3 المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة وفق $u_n = \frac{n^3}{n!}$.

① احسب حدودها الستة الأولى.

② a. أثبت أن $n! \geq n(n-1)(n-2)(n-3)$ ، أيًا يكن $n \geq 4$.

b. استنتج نهاية $(u_n)_{n \geq 1}$.

الحل

①

n	1	2	3	4	5	6
$u_n = \frac{n^3}{n!}$	1	4	$\frac{9}{2}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{25}{24}$	$\frac{3}{10}$

② a.

• لنضع $E(n)$ الخاصة : $n! \geq n(n-1)(n-2)(n-3)$.

• إن $E(4)$ محققة لأنها تكافئ $4! \geq 4 \times 3 \times 2 \times 1$ وهذه صحيحة.

• لنفترض صحة $E(n)$ في حالة $n \geq 4$ عندئذ

$$\begin{aligned} (n+1)! &= (n+1) \times n! \geq (n+1)n(n-1)(n-2) \underbrace{(n-3)}_{\geq 1} \\ &\geq (n+1)n(n-1)(n-2) \\ &= (n+1)(n+1-1)(n+1-2)(n+1-3) \end{aligned}$$

فبالخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً. فنكون قد أثبتنا صحة المتراجحة المطلوبة في حالة $n \geq 4$.

② b. نستنتج إذن أنه في حالة $n \geq 4$ يكون لدينا

$$0 \leq u_n = \frac{n^3}{n!} \leq \frac{n^3}{n(n-1)(n-2)(n-3)} = \frac{n}{n-1} \times \frac{n}{n-2} \times \frac{1}{n-3}$$

ولكن $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n-3} = 0$ و $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-2} = 1$ و $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1$ ، إذن بجعل n تسعى إلى اللانهاية في

المتراجحة السابقة نستنتج استناداً إلى مبرهنة الإحاطة أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

4 أوجد نهاية كل من المتتاليات $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$ و $(t_n)_{n \geq 1}$ المعرفة وفق:

$$x_n = \frac{n^2 + 1}{n + 1}, \quad y_n = \frac{x_n}{n}, \quad w_n = x_n - n, \quad t_n = \frac{y_n - 1}{w_n - 1}$$

الحل

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \frac{0 - 1}{-1 - 1} = \frac{1}{2} \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = -1 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

5 أوجد نهاية كلٍّ من المتتاليات $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ و $(w_n)_{n \geq 1}$ و $(t_n)_{n \geq 1}$ المعرفة وفق:

$$x_n = \frac{\sqrt{n}}{n+1}, \quad y_n = x_n \sqrt{n}, \quad w_n = x_n - \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad t_n = \frac{y_n}{w_n}$$

الحل

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = 0 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{w_n} = -\infty \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = -\infty$$

6 أوجد نهاية كلٍّ من المتتاليات $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ و $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة وفق:

$$x_n = \frac{3n^2 - 4}{n+1}, \quad y_n = \frac{x_n}{n}, \quad u_n = x_n - 3n$$

الحل

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -3 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 3 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

7 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة بالصيغة $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

① أثبت أن $0 < u_n \leq 1$ ، أيًا يكن n .

② a . أثبت أنه إذا كان $n > 10^4$ ، كان $0 < u_n < 10^{-2}$.

b . أثبت أنه إذا كان $n > 10^8$ ، كان $0 < u_n < 10^{-4}$.

c . كيف نختار n كي نحصل على $u_n < 10^{-8}$ ؟

③ ما نهاية $(u_n)_{n \geq 0}$ ؟

الحل

① تابع الجذر التربيعي متزايد إذن $\sqrt{0+1} + \sqrt{0} = 1 \leq \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ ومن ثمّ

$$u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \in]0, 1[$$

وهي المتراجحة المطلوبة.

② a . إذا كان $n > 10^4$ كان $\sqrt{n} > \sqrt{10^4} = 10^2$ ومن ثمّ

$$0 < u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} < \frac{1}{100}$$

② b . إذا كان $n > 10^8$ كان $\sqrt{n} > \sqrt{10^8} = 10^4$ ومن ثمّ

$$0 < u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} < 10^{-4}$$

② c . يكفي أن نختار $n > 10^{16}$ كي نحصل على $u_n < 10^{-8}$.

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ، لأنه مهما صَغُر العدد ε الموجب تماماً يكفي أن نختار n_0 بحيث $n_0 > \varepsilon^2$

لتتحقق المتراجحة $u_n \in]-\varepsilon, \varepsilon[$ في حالة $n > n_0$.

8 المتتاليات $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ معرفتان وفق: $x_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$ و $y_n = \frac{1}{n}$.

① أثبت أن العدد 1 راجح على $(x_n)_{n \geq 1}$.

② أثبت أن $x_n \leq y_n$ ، أيًا يكن $n \geq 1$.

③ أيّ النتيجة السابقتين أكثر إثارة للاهتمام؟

الحل

① و ② هذا واضح لأنه في حالة $n \geq 1$ لدينا $1 \leq n = \sqrt{n^2} < \sqrt{n^2 + 1}$ ومن ثم

$$\frac{1}{\sqrt{1 + n^2}} < \frac{1}{n} \leq 1$$

أي $x_n < y_n \leq 1$ أيًا كانت $n \geq 1$.

③ إن الخاصة ② أكثر إثارة للاهتمام لأنها تفيد في إثبات أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

9 المتتاليات $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ معرفتان وفق: $x_n = \frac{2n^2 + 5n + 3}{2n + 1}$ و $y_n = 5n$.

① أثبت أن $x_n \leq y_n$ ، أيًا يكن $n \geq 1$.

② أثبت أن $x_n \geq \frac{1}{5}y_n$ ، أيًا يكن $n \geq 1$.

الحل

① نحسب، في حالة $n \geq 1$:

$$y_n - x_n = \frac{10n^2 + 5n - 2n^2 - 5n - 3}{2n + 1} = \frac{8n^2 - 3}{2n + 1} \geq \frac{8 - 3}{2n + 1} = \frac{5}{2n + 1} > 0$$

إذن $x_n \leq y_n$ ، أيًا يكن $n \geq 1$.

② نحسب، في حالة $n \geq 1$:

$$x_n - \frac{1}{5}y_n = \frac{2n^2 + 5n + 3 - 2n^2 - n}{2n + 1} = \frac{4n + 3}{2n + 1} > \frac{4n + 2}{2n + 1} = 2 > 0$$

إذن $x_n \geq \frac{1}{5}y_n$ ، أيًا يكن $n \geq 1$.

10 المتتالية $(u_n)_{n \geq 4}$ معرفة وفق $u_n = \frac{1}{n^2 - 5n + 6}$. أثبت أنها محدودة من الأعلى بالعدد $\frac{1}{2}$.

الحل

نلاحظ أنه في حالة $n \geq 4$ لدينا $n^2 - 5n + 6 = (n - 2)(n - 3) \geq (4 - 2)(4 - 3) = 2$

$$u_n = \frac{1}{n^2 - 5n + 6} \leq \frac{1}{2}$$



لنتعلم البحث معاً

11 عندما تفرض المناقشة نفسها

ليكن a و b عددين يحققان $a > b > 0$ ولتكن $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية معرفة وفق $u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}$. ادرس تقارب هذه المتتالية.

نحو الحل

في عبارة u_n ، نجد فقط حدوداً من النمط q^n ، وإذ لدينا معرفة بنهاية المتتالية $(q^n)_{n \geq 0}$ ، نفكر بالاستفادة من مبرهنات العمليات على النهايات. ولكن a و b غير معروفين، فعلينا أن نتوقع التعرض لصيغة عدم تعيين.

1. تحقق من التعرض لصيغة عدم تعيين في كل من الحالتين الآتيتين:

$$1 \quad a > 1 \text{ و } b > 1 \quad 2 \quad a > 1 \text{ و } b < 1$$

2. في حالة $a = 1$ و $b < 1$ ، لماذا تفيد مبرهنات النهايات في تعيين نهاية $(u_n)_{n \geq 0}$ ؟

قد تفيد دراسة حالة خاصة في تعرف الحالة العامة. لنختر، مثلاً، في حالة $a = 3$ و $b = 2$ ، لدينا $u_n = \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n}$. وعندما تكون قيم n كبيرة، تكون قيم 3^n و 2^n غاية في الكبر. لمقارنة

مرتبتي كبرهما عندما تسعى n إلى $+\infty$. ندرس نهاية المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ حيث $v_n = \frac{2^n}{3^n}$.

1. لماذا لدينا $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ ؟

2. تحقق أن $u_n = \frac{1 - v_n}{1 + v_n}$. إذن ما نهاية $(u_n)_{n \geq 0}$ ؟

نستشف من المثال السابق أهمية المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق $v_n = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ ودورها في الوصول

إلى النتيجة المرجوة.

1. أوجد نهاية $(v_n)_{n \geq 0}$ تبعاً لقيم a و b .

2. تحقق أن $u_n = \frac{1 - v_n}{1 + v_n}$ واستفد من حصيلة الأسئلة السابقة للوصول إلى الهدف المنشود.

أنجز الحل وكتبه بلغة سليمة.

الحل

1. في حالة $a > 1$ و $b > 1$ لدينا $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = +\infty$ و $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n = +\infty$ ، إذن يظهر في بسط

المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ صيغة عدم تعيين من النمط $(+\infty) - (+\infty)$. وفي حالة $a > 1$ و $b < 1$ لدينا

$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = +\infty$ و $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n = 0$ ، إذن يظهر عند حساب نهاية $(u_n)_{n \geq 0}$ عدم تعيين من النمط $\frac{+\infty}{+\infty}$.

2. في حالة $a = 1$ و $b < 1$ ، لدينا $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n = 0$ ، إذن نستنتج من المساواة

$$u_n = \frac{1 - b^n}{1 - b^n}$$

أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$.

1. المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ حيث $v_n = \frac{2^n}{3^n}$ هي متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{3} < 1$ ، إذن

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$$

2. نحسب

$$\frac{1 - v_n}{1 + v_n} = \frac{1 - \frac{2^n}{3^n}}{1 + \frac{2^n}{3^n}} = \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n} = u_n$$

ولما كان $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$ استنتجنا مجدداً أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$.

1. في حالة العامة المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ حيث $v_n = \frac{b^n}{a^n}$ هي متتالية هندسية أساسها $q = \frac{b}{a} < 1$ ،


لأنه لدينا فرضاً $a > b > 0$ ، إذن $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$.

2. نحسب

$$\frac{1 - v_n}{1 + v_n} = \frac{1 - \frac{b^n}{a^n}}{1 + \frac{b^n}{a^n}} = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} = u_n$$

ولما كان $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$ استنتجنا مجدداً أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$.


12 دراسة متتالية من النمط $u_{n+1} = f(u_n)$



نرمز إلى المربع $A_0B_0C_0D_0$ الذي طول ضلعه 10 بالرمز S_0 ، وإلى المربع $A_1B_1C_1D_1$ الذي تقع رؤوسه على أضلاع S_0 (كما يشير الشكل المرافق) بالرمز S_1 حيث $A_0A_1 = 1$. بالطريقة التي رسمنا فيها S_1 انطلاقاً من S_0 ، نرسم S_2 انطلاقاً من S_1 ونقبل إمكانية الاستمرار بهذا الرسم عدداً غير منتهٍ من المرات. نرمز إلى طول ضلع المربع S_n بالرمز l_n . نهدف إلى دراسة المتتالية $(l_n)_{n \geq 0}$ وتعيين نهايتها.

نحو الحل

لنتفحص كيف يجري الإنشاء: يُرسم كلُّ مربعٍ انطلاقاً من سابقه. فالمتتالية $(\ell_n)_{n \geq 0}$ هي إذن متتالية تدرجية.



علّل صحة المتراجحة $1 < \ell_{n+1} < \ell_n$ أيّاً كان العدد الطبيعي n ؟

لماذا يمكن استنتاج أنّ المتتالية $(\ell_n)_{n \geq 0}$ متقاربة؟

$$\text{أثبت أنّ } \ell_{n+1} = \sqrt{1 + (\ell_n - 1)^2}.$$

يبقى تحديد العدد ℓ ، نهاية المتتالية $(\ell_n)_{n \geq 0}$. إحدى الطرق العامة لذلك هي الاستعانة بالتابع f

$$\text{المعرف بالعلاقة } \ell_{n+1} = f(\ell_n).$$

عيّن التابع f المستعان به.

$$\text{أثبت أنّ } \ell \text{ حلٌّ للمعادلة } x = \sqrt{1 + (x - 1)^2}$$

استنتج من ذلك قيمة النهاية ℓ .

أنجز الحلّ واكتبه بلغة سليمة.



في المثلث القائم $A_{n+1}B_{n+1}B_n$ طول الوتر أكبر من طول أيّ من الضلعين القائمتين وبوجه خاص

يكون $A_{n+1}B_{n+1} > B_nB_{n+1}$ أي $\ell_{n+1} > 1$. ومن جهة أخرى طول أي ضلع أصغر تماماً من

مجموع طولي الضلعين الآخرين إذن $A_{n+1}B_{n+1} < A_{n+1}B_n + B_nB_{n+1}$ أي

$$\ell_{n+1} < \ell_n - 1 + 1 = \ell_n$$

فنكون بذلك قد أثبتنا أنّ $1 < \ell_{n+1} < \ell_n$ ، أيّاً كانت قيمة n .

المتتالية $(\ell_n)_n$ هي إذن متتالية متناقصة ومحدودة من الأدنى بالعدد 1 فلا بدّ أن تكون متقاربة. لنرمز

إلى نهايتها بالرمز ℓ .

وأخيراً، بتطبيق مبرهنة فيثاغورث في المثلث القائم $A_{n+1}B_{n+1}B_n$ نستنتج أنّ

$$\ell_{n+1} = \sqrt{1 + (\ell_n - 1)^2}$$

إذا عرفنا $f(x) = \sqrt{(x-1)^2 + 1}$ كانت المتتالية $(\ell_n)_{n \geq 0}$ معرفة تدرجياً بالشرط $\ell_0 = 10$

والعلاقة $\ell_{n+1} = f(\ell_n)$. ولأنّ $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \ell_n$ استنتجنا أنّ ℓ هي حلٌّ للمعادلة $x = f(x)$. وحل هذه

المعادلة بسيط ويعطي $\ell = 1$. إذن $\lim_{n \rightarrow \infty} \ell_n = 1$.

13 مجموع عدداً غير منته من الحدود

ليكن $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$ في حالة عدد طبيعي غير معدوم n . وليكن

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

ادرس المتتالية $(S_n)_{n \geq 1}$.

نحو الحل

يبدو من غير الممكن الاستفادة من تطبيقات مباشرة لمبرهنات مألوفة. ولكن معرفة قيم بضعة حدود أولى من متتالية قد تتيح تصور خواص لها من قبيل: جهة الاطراد، العناصر الراجحة عليها أو القاصرة عنها، أو إيجاد علاقة بين حدها ذي الدليل n والدليل ذاته n ، أو بين هذا الحد والحد الذي يليه. احسب S_1 و S_2 و S_3 و S_4 بصيغة كسور مختزلة.

نُظهِر النتائج أن دليل S_n ، أي n ، يظهر في عبارة S_n . وتحديدًا يبدو أن $S_n = \frac{n}{n+1}$.

تحقق أنك ستحصل على النتيجة ذاتها عند $n = 5$ وعند $n = 6$.

أثبت صحة $S_n = \frac{n}{n+1}$ بالبرهان بالتدرج.

ثمة حل آخر، يتمثل في تعيين عددين a و b يحققان $u_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1}$. جد هذين العددين ثم

استنتج عبارة S_n .

ملاحظة: عند دراسة متتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ ، من المهم، في أكثر الحالات، تعرّف الحدود الأولى

منها، ومعرفة ما إن كانت هذه الحدود تتيح رؤية علاقة بين u_n و n .

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة.

الحل

n	1	2	3	4	5	6
S_n	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{7}$

لنثبت بالتدرج أن $S_n = \frac{n}{n+1}$ أيًا كانت $n \geq 1$

• نعرّف الخاصة $E(n)$ بأنها $E(n) = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{n}{n+1}$.

• الخاصة $E(1)$ محققة وضوحاً إذ تنص على أن $S_1 = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{1+1}$.

• لنفترض صحة الخاصة $E(n)$ ولنلاحظ أنّ S_{n+1} تنتج من S_n بإضافة u_{n+1} إليها إذن

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + u_{n+1} \\ &= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^2 + 2n + 1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2} \\ &= \frac{n+1}{n+1+1} \end{aligned}$$

إذن $E(n+1)$ محققة. فنكون بذلك قد أثبتنا صحة المساواة $S_n = \frac{n}{n+1}$ أيّاً كانت $n \geq 1$.

👉 لنبحث عن عددين a و b بحيث تتحقق المساواة $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1}$ أيّاً كانت n . نلاحظ

أنّ هذا يُكافئ $(a+b)n + a = 1$ مهما كانت n . إذن $a = 1$ و $b = -1$. ومنه

$$u_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

إذن

$$\begin{array}{r} u_1 = 1 - \frac{1}{2} \\ u_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \\ u_3 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \\ \vdots \\ u_{n-1} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \\ + \quad u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ \hline S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \end{array}$$

لاحظ وجود العديد من الاختصارات، إذ تُختصر جميع الحدود باستثناء 1 و $-\frac{1}{n+1}$. ونحصل مجدداً

على الصيغة المطلوبة.

14 دراسة متتاليتين في آن معاً

ليكن a و b عددين يُحَقَّقان $0 < a < b$. ولنتأمل المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ المعرفتين وفق

$x_0 = a$ و $y_0 = b$ وعند كل عدد طبيعي n :

$$y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \quad \text{و} \quad x_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n}$$

نهدف إلى دراسة المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ في آن معاً.

نحو الحل

لنتفحص الفرض كي نرى إن كانت ثمة نتائج مباشرة تفيد في الحل. يمكن ملاحظة أن مقام x_{n+1} يساوي بسط y_{n+1} ، فنستنتج أن:

$$(*) \quad x_{n+1} \times y_{n+1} = x_n \times y_n = ab$$

ونلاحظ أيضاً أن x_n و y_n موجبان. تحقق من المساواة (*).

أثبت، بالتدرج، صحة الخاصة « $x_n > 0$ و $y_n > 0$ »: $E(n)$ ، أيًا يكن العدد الطبيعي n .

لتحقيق فهم أفضل، قد يكون مفيداً تعرّف بضع حدود أولى من المتتالية. ولما كان a و b غير معلومين، نتأمل مثلاً الحالة الخاصة $a = 1$ و $b = 3$.

احسب حدوداً أولى من كلٍّ من $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$.

وضّع هذه الحدود على محور الأعداد الحقيقية، ماذا تلاحظ؟

ربما علينا إذن إثبات أن المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ متجاورتان. ولتحقيق ذلك علينا بدايةً

دراسة اطّراد هاتين المتتاليتين. علينا إذن دراسة إشارة كلٍّ من $x_{n+1} - x_n$ و $y_{n+1} - y_n$.
أثبت أن:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n - y_n}{x_n + y_n} \quad \text{و} \quad y_{n+1} - y_n = \frac{x_n - y_n}{2}$$


لاحظ أن إشارتي $x_n + y_n$ و $x_n - y_n$ معلومتان، فإشارتا $x_{n+1} - x_n$ و $y_{n+1} - y_n$ تتعلقان بإشارة $x_n - y_n$. يتوقع استناداً إلى أن يكون $y_n - x_n$ موجباً. احسب $y_{n+1} - x_{n+1}$ واستنتج أن $y_{n+1} - x_{n+1}$ موجب.

استنتج اطّراد كلٍّ من المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$.

يبقى علينا إثبات أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n - x_n) = 0$. ولذلك سنسعى إلى تعريف متتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ تحقق

عند كل عدد طبيعي n المتراحة $0 < y_n - x_n < t_n$ ، وبحيث يكون $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 0$. يبدو إنجاز

ذلك صعباً انطلاقاً من العبارة $y_{n+1} - x_{n+1}$ التي أثبتناها سابقاً فلنرسم مخططاً يساعدنا:



أثبت إذن أن $y_{n+1} - x_{n+1} \leq y_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(y_n - x_n)$

أثبت، مستخدماً البرهان بالتدرج، أن $y_n - x_n \leq \frac{1}{2^n}(y_0 - x_0)$

أثبت أن المتتاليتين تتقاربان إلى النهاية ℓ ذاتها.

استفد من العلاقة (*) لإثبات أن $\ell^2 = ab$ ثم $\ell = \sqrt{ab}$.

نتحقق أولاً أنّ

$$x_{n+1} \cdot y_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n} \cdot \frac{x_n + y_n}{2} = x_n \cdot y_n$$

إذن المتتالية $(x_n y_n)_{n \geq 0}$ ثابتة وحدها الأول يساوي ab فجميع حدودها تساوي ab .

لنبين بالتدرج صحة الخاصة « $x_n > 0$ و $y_n > 0$ » : $E(n)$.

• إنّ $E(0)$ صحيحة فرضاً، لأنّ $x_0 = a > 0$ و $y_0 = b > 0$.

• لنفترض أنّ $E(n)$ صحيحة. عندئذ يكون كل من $x_n + y_n$ و $x_n y_n$ موجِباً تماماً، وعندئذ يكون

كذلك كل من $\frac{x_n + y_n}{2} = x_{n+1}$ و $\frac{2x_n y_n}{x_n + y_n} = y_{n+1}$. فالخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً.

وهكذا يكون $x_n > 0$ و $y_n > 0$ أيّاً كانت n .

✎ نختار $a = 1$ و $b = 3$. ونحسب

n	0	1	2	3	4
x_n	1	1.5	1.7143	1.73196	1.732050805
y_n	3	2.0	1.7500	1.73214	1.732050810

نلاحظ وكأنّ المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ متجاورتان. الأولى متزايدة والثانية متناقصة والمسافة بينهما تسعى إلى الصفر.

✎ لنثبت إذن أنّ المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ متجاورتان.

نلاحظ أولاً أنّ

$$(1) \quad y_{n+1} - y_n = \frac{x_n + y_n}{2} - y_n = \frac{x_n - y_n}{2}$$

وأنّ

$$(2) \quad x_{n+1} - x_n = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n} - x_n = \frac{x_n y_n - x_n^2}{x_n + y_n} = \frac{x_n}{x_n + y_n} (y_n - x_n)$$

في الحالتين إشارة الفرق $y_n - x_n$ هي التي تعطي للفرقين السابقين إشارتهما، لنحسب إذن

$$\begin{aligned} y_{n+1} - x_{n+1} &= \frac{x_n + y_n}{2} - \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n} = \frac{(x_n + y_n)^2 - 4x_n y_n}{2(x_n + y_n)} \\ &= \frac{(x_n - y_n)^2}{2(x_n + y_n)} \geq 0 \end{aligned}$$

إذن لقد أثبتنا أنّ المقادير $(y_n - x_n)$ موجبة في حالة $n \geq 1$ ، وهذا محقق أيضاً في حالة $n = 0$ لأننا افترضنا بداية أنّ $b - a > 0$. إذن مهما كانت n كان $y_n - x_n \geq 0$. وبالعودة إلى (1) و (2) نستنتج أنّ المتتالية $(x_n)_{n \geq 0}$ متزايدة، والمتتالية $(y_n)_{n \geq 0}$ متناقصة.

لقد رأينا أنه مهما تكن n يكن

$$x_n \leq x_{n+1} \leq y_{n+1} \leq y_n$$

عندئذ من الواضح أنّ

$$y_{n+1} - x_{n+1} \leq y_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(y_n - x_n)$$

• لنضع إذن $E(n)$ دلالة على الخاصة $y_n - x_n \leq \frac{y_0 - x_0}{2^n}$

• الخاصة $E(0)$ صحيحة وضوحاً لأنّ $2^0 = 1$.

• لنفترض أنّ $E(n)$ صحيحة. عندئذ

$$y_{n+1} - x_{n+1} \leq \frac{1}{2}(y_n - x_n) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{y_0 - x_0}{2^n} \right) = \frac{y_0 - x_0}{2^{n+1}}$$

فالخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً. ونكون قد أثبتنا، مهما كان العدد الطبيعي n

$$0 \leq y_n - x_n \leq \frac{b-a}{2^n}$$

ولكن $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$ إذن نستنتج مما سبق أنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$. فالمتاليان $(x_n)_{n \geq 0}$

و $(y_n)_{n \geq 0}$ متجاورتان. وهما من ثمّ تتقاربان من النهاية ℓ نفسها.

ولكن رأينا أنّ $x_n y_n = ab$ مهما كانت قيمة n ، فإذا جعلنا n تسعى إلى اللانهاية استنتجنا أنّ

$\ell^2 = ab$ ، ولكن العدد ℓ موجب لأنه يحقق $a = x_0 \leq \ell \leq y_0 = b$. إذن $\ell = \sqrt{ab}$.



قُدماً إلى الأمام

15 ادرس تقارب كل من المتاليين:

$$x_n = \frac{3^n - 2^n}{3^n - 1} \quad \text{①} \quad y_n = \frac{10^n - 1}{10^n + 1} \quad \text{②}$$

الحل

نكتب

$$y_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{10}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{10}\right)^n} \quad \text{و} \quad x_n = \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

ونتذكر أنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ في حالة $|q| < 1$ ، لنستنتج أنّ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

16 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق: $u_0 = \frac{3}{2}$ وعند كل $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2$.

① أثبت، مستعملاً البرهان بالتدرج، أن $1 \leq u_n \leq 2$ أيًا يكن $n \in \mathbb{N}$.

② أثبت أن $u_{n+1} - u_n = (u_n - 2)(u_n - 1)$ أيًا يكن $n \in \mathbb{N}$.

b استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة.

③ أهي متقاربة؟

الحل

① لنضع $E(n)$ الخاصة $1 \leq u_n \leq 2$.

• الخاصة $E(0)$ صحيحة لأن $u_0 = 1.5 \in [1, 2]$.

• لنفترض صحة الخاصة $E(n)$ عندئذ $1 \leq u_n \leq 2$ ومن ثم $0 \leq u_n - 1 \leq 1$ إذن

$$1 \leq (u_n - 1)^2 + 1 \leq 2$$

ولكن هذه هي تحديداً الخاصة $1 \leq u_{n+1} \leq 2$ أي $E(n+1)$. فنكون قد أثبتنا أن $1 \leq u_n \leq 2$

مهما كانت قيمة n .

ملاحظة: يمكن أيضاً ملاحظة أن التابع $f(x) = x^2 - 2x + 2$ متزايد على المجال $[1, +\infty[$ ومن ثم

إذا كان $1 \leq u_n \leq 2$ كان $f(1) \leq f(u_n) \leq f(2)$ أي $1 \leq u_{n+1} \leq 2$.

② نلاحظ أن

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= u_n^2 - 2u_n + 2 - u_n = u_n^2 - 3u_n + 2 \\ &= (u_n - 1)(u_n - 2) \end{aligned}$$

واستناداً إلى نتيجة ① إشارة المقدار $u_{n+1} - u_n$ سالبة أيًا كانت n فالمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة. وهي

محدودة من الأدنى بالعدد 1. إذن هي متقاربة من عدد l .

ملاحظة: هنا تنتهي الإجابة عن السؤال المطروح. ولكن يمكننا في الحقيقة تعيين l . إذ نعلم أن

$1 \leq u_n \leq u_0$ مهما كانت n لأن المتتالية متناقصة. ومن ثم $l \in [1, 1.5]$ ، ونستنتج من المساواة

$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2$ بجعل n تسعي إلى اللانهاية أن $l = l^2 - 2l + 2$ ، إذن إما أن يكون

$l = 1$ أو أن يكون $l = 2$ ولكن هذه الأخيرة مستحيلة لأن $l \in [1, 1.5]$. إذن $l = 1$ ، والمتتالية تسعي

إلى الواحد.

17 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة عند كل $n \geq 1$ وفق $u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$.

① أثبت، مستعملاً البرهان بالتدرج، أن $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

② استنتج أن العدد 3 راجح على المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$.

③ أثبت أن $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة.

① لنضع $E(n)$ الخاصة $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ في حالة $n \geq 1$.

• الخاصة $E(1)$ صحيحة لأن $\frac{1}{1!} = 1 = \frac{1}{2^0}$.

• لنفترض صحة الخاصة $E(n)$ ، عند قيمة $n \geq 1$. ننقل من $\frac{1}{n!}$ إلى $\frac{1}{(n+1)!}$ بقسمة الأول

على $n+1$ إذن

$$\frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n!} \stackrel{(1)}{\leq} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \stackrel{(2)}{\leq} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^n}$$

حيث استعملنا صحة $E(n)$ في (1)، واستعملنا أن $n \geq 1$ في (2). إذن $E(n+1)$ صحيحة.

فكون قد أثبتنا أن $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ مهما كانت قيمة $n \geq 1$.

② نكتب استناداً إلى ما أثبتناه

$$\begin{aligned} u_n &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 1 + \frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \\ &\leq 1 + \left(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}\right) \quad \text{☞} \quad q = \frac{1}{2} \\ &\leq 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3 \end{aligned}$$

فالعدد 3 راجح على المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$.

③ يكفي أن نلاحظ أن المتتالية متزايدة، إذ رأينا سابقاً أنها محدودة من الأعلى. ولكن ننقل من u_n إلى

u_{n+1} بإضافة الحد $\frac{1}{(n+1)!}$ إلى الأول. إذن $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$ والمتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$

متزايدة تماماً، فهي متقاربة لأنها محدودة من الأعلى بالعدد 3.

18 نتأمل متتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ تحقق الشرط التي: يوجد عدد حقيقي $\ell > 0$ يحقق عند كل n العلاقة

$$0 \leq u_{n+1} - \ell \leq \frac{2}{3}(u_n - \ell)$$

أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة إلى ℓ . بافتراض أن $u_0 = 1$ عين عدداً طبيعياً N يحقق

$$n \geq N \quad u_n \in]\ell - 10^{-3}, \ell + 10^{-3}[$$

- لتكن $E(n)$ الخاصة $0 \leq u_n - \ell \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n (u_0 - \ell)$.
- باختيار $n = 0$ في الفرض $0 \leq u_{n+1} - \ell \leq \frac{2}{3}(u_n - \ell)$ نستنتج مباشرة أنّ $0 \leq u_0 - \ell$ ، ومن ثم تكون المتراجحة $0 \leq u_0 - \ell \leq \left(\frac{2}{3}\right)^0 (u_0 - \ell)$ محققة وضوحاً، إذن $E(0)$ محققة.
- نفترض أنّ $E(n)$ صحيحة. عندئذ

$$0 \leq u_{n+1} - \ell \leq \frac{2}{3}(u_n - \ell) \leq \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n (u_0 - \ell) = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} (u_0 - \ell)$$

فالخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً. إذن مهما كان العدد الطبيعي n كان

$$0 \leq u_n - \ell \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n (u_0 - \ell)$$

لما كان $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ لأنّ $0 \leq \frac{2}{3} < 1$ استنتجنا بجعل n تسعى إلى اللانهاية في المتراجحة

$$\text{السابقة ومستفيدين من مبرهنة الإحاطة أنّ } \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - \ell) = 0 \text{ أو } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell.$$

في حالة $u_0 = 1$ نستنتج من كون $u_0 - \ell \geq 0$ أنّ $\ell \leq 1$ ، ولدنياً فرضاً $0 < \ell$. إذن $u_0 - \ell \leq 1$ من ناحية أخرى

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{20} = \left(\frac{4}{9}\right)^{10} < \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{1024} < \frac{1}{1000}$$

(الفكرة هنا هي السعي لإظهار القوة العاشرة للعدد 2 وهي قريبة من 1000). إذن في حالة $n \geq 20$ يكون لدينا

$$\left(\frac{2}{3}\right)^n (u_0 - \ell) \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{20} \times 1 < 10^{-3}$$

ومن ثمّ $0 \leq u_n - \ell < 10^{-3}$ أي $u_n \in]\ell - 10^{-3}, \ell + 10^{-3}[$ يمكن إذن أن نأخذ $N = 20$ ، أو أي عدد طبيعي أكبر منه.

19 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

① أثبت أنّ $u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ ثمّ استنتج أنّ $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة نحو الصفر.

② المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$ معرفة عند كل $n \geq 1$ وفق:

$$v_n = 1 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n}}$$

a استقدّف من عبارة u_n بصيغتيها الواردتين لاستنتاج عبارة بسيطة للحد v_n بدلالة n .

b استنتج نهاية المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$.

① بملاحظة أنّ $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 1$ نستنتج مباشرة أنّ

$$u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

ولأنّ المقام يسعى إلى اللانهاية عند $+\infty$ استنتجنا أنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

②

$$\begin{array}{rcl} u_0 & = & \sqrt{1} - 0 \\ u_1 & = & \sqrt{2} - \sqrt{1} \\ u_2 & = & \sqrt{3} - \sqrt{2} \\ u_3 & = & \sqrt{4} - \sqrt{3} \\ & \vdots & \\ u_{n-2} & = & \sqrt{n-1} - \sqrt{n-2} \\ + \quad u_{n-1} & = & \sqrt{n} - \sqrt{n-1} \\ \hline v_n & = & \sqrt{n} \end{array}$$

بالطبع يسمح ما سبق بإثبات صحة الصيغة $v_n = \sqrt{n}$ ، ويمكن أيضاً إثبات صحتها بالتدريج على

العدد n . انطلاقاً من هذه الصيغة للحد v_n نرى مباشرة أنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = +\infty$

20

ما العبارات الصحيحة وما العبارات غير الصحيحة فيما يأتي؟ تحقّق من إجابتك في كل حالة.

① إذا كانت $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية متقاربة من عدد حقيقي l وكانت $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية ليس لها نهاية

حقيقية، عندئذ ليس للمتتالية $(u_n + v_n)_{n \geq 0}$ نهاية حقيقية.

② إذا كانت $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية متقاربة من عدد حقيقي l وكانت $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية ليس لها نهاية

حقيقية، عندئذ ليس للمتتالية $(u_n v_n)_{n \geq 0}$ نهاية حقيقية.

③ إذا كان $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \cdot v_n = l$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ ، كان $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$

④ إذا كان لمتتالية عنصر قاصر عنها، كان لها عنصر راجح عليها.

① صحيح. لأنّ $v_n = (v_n + u_n) - u_n$ ، فإذا افترضنا أنّه كان لدينا $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = l' \in \mathbb{R}$

و $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l \in \mathbb{R}$ استنتجنا أنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = l' - l \in \mathbb{R}$ وهذا خُلف.

② خطأ. خذ مثلاً $(u_n)_{n \geq 0}$ حيث $u_n = \frac{1}{n+1}$ التي تحقق $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 = l \in \mathbb{R}$ ، وخذ $(v_n)_{n \geq 0}$

حيث $v_n = (-1)^n$. ليس للمتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ نهاية ومع ذلك $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n v_n) = 0$.

③ صح، لأنّ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = 0$ ومن ثمّ $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left((v_n u_n) \times \frac{1}{u_n} \right) = l \times 0 = 0$

22

ليكن عند كل عدد طبيعي n ، $u_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

① أوجد عددين حقيقيين a و b يحققان عند كل عدد طبيعي n ، $u_n = \frac{a}{2n-1} + \frac{b}{2n+1}$

② ليكن، في حالة عدد طبيعي n ، $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ ، عبّر عن S_n بدلالة n واستنتج نهاية المتتالية $(S_n)_{n \geq 0}$.

الحل

$$u_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{\frac{1}{2}}{2n-1} - \frac{\frac{1}{2}}{2n+1} \quad ①$$

②

$$\begin{array}{r} u_0 = \frac{\frac{1}{2}}{-1} - \frac{\frac{1}{2}}{1} \\ u_1 = \frac{\frac{1}{2}}{1} - \frac{\frac{1}{2}}{3} \\ u_2 = \frac{\frac{1}{2}}{3} - \frac{\frac{1}{2}}{5} \\ \vdots \\ u_{n-1} = \frac{\frac{1}{2}}{2n-3} - \frac{\frac{1}{2}}{2n-1} \\ + \quad u_n = \frac{\frac{1}{2}}{2n-1} - \frac{\frac{1}{2}}{2n+1} \\ \hline S_n = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4n+2} \end{array}$$

بالطبع يسمح ما سبق بإثبات صحة الصيغة

$$S_n = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4n+2} = -\frac{2n+3}{4n+2}$$

ويمكن أيضاً إثبات صحتها بالتدرج على العدد n . انطلاقاً من هذه الصيغة للحد S_n نرى مباشرة أنّ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\frac{1}{2}$$

② لنضع في حالة عدد طبيعي موجب تماماً n ، $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

23

① أثبت أنّ المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة.

② اكتب $u_{2n} - u_n$ واستنتج أنّ $u_{2n} - u_n \geq \frac{1}{2}$

③ أثبت، مستعملاً البرهان بالتدرج، أنّ $u_{2n} \geq \frac{n}{2}$ ، أيّاً يكن العدد الطبيعي n غير المعدوم.

④ هل للمتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ نهاية حقيقية؟

① ننتقل من الحد u_n إلى الحد u_{n+1} الذي يليه بإضافة $\frac{1}{n+1}$ إلى u_n أي

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n+1}$$

هذا يبرهن على أنّ المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة.

② u_{2n} يساوي مجموع مقاليب الأعداد الطبيعية من 1 إلى $2n$ و u_n يساوي مجموع مقاليب الأعداد الطبيعية من 1 إلى n إذن $u_{2n} - u_n$ يساوي مجموع مقاليب الأعداد الطبيعية من $n+1$ إلى $2n$ أي

$$u_{2n} - u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

هناك n حداً وأصغر هذه الحدود هو $\frac{1}{2n}$. إذن

$$u_{2n} - u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

③ لتكن $E(n)$ الخاصة $u_{2^n} \geq \frac{n}{2}$ في حالة $n \geq 1$.

• الخاصة $E(1)$ صحيحة وضوحاً لأنها تنص على أنّ $u_{2^1} = 1 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$.

• لنفترض صحة الخاصة $E(n)$. عندئذ: $u_{2^{n+1}} = u_{2^n} + u_{2 \times 2^n} - u_{2^n} \geq \frac{n}{2} + \frac{1}{2} = \frac{n+1}{2}$.

فالخاصة $E(n+1)$ صحيحة. إذن لقد أثبتنا بالتدريج أنّ $u_{2^n} \geq \frac{n}{2}$ أيّاً كانت $n \geq 1$.

④ لو افترضنا أنّ لهذه المتتالية نهاية حقيقية l لكانت محدودة بهذه النهاية لأنها متزايدة. ولكن النتيجة السابقة تقول إنّ هذه المتتالية غير محدودة. فليس للمتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ نهاية حقيقية.

24 المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة عند كل عدد طبيعي $n \geq 1$ وفق:

$$u_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \frac{n}{n^2+3} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$$

① أثبت أنّ $\frac{n^2}{n^2+n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}$ ، أيّاً يكن $n \geq 1$.

② استنتج تقارب المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$. ما نهايتها؟

① يساوي u_n مجموع n حداً أصغرها $\frac{n}{n^2+n}$ وأكبرها $\frac{n}{n^2+1}$ إذن

$$n \times \frac{n}{n^2+n} \leq u_n \leq n \times \frac{n}{n^2+1}$$

② اعتماداً على مبرهنة الإحاطة، نستنتج أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$ لأن

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = 1 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n} = 1$$

المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة عند كل عدد طبيعي $n \geq 1$ وفق: **25**

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$$

① أثبت أن $\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq u_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$ ، أيًا يكن $n \geq 1$.

② استنتج تقارب المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$. ما نهايتها؟

الحل

① يساوي u_n مجموع n حداً أصغرها $\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$ وأكبرها $\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$ إذن

$$n \times \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq u_n \leq n \times \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

② لما كان

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} = 1 \text{ و } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = 1$$

استنتجنا من مبرهنة الإحاطة أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$.

26 بين أن المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 1}$ و $(y_n)_{n \geq 1}$ الآتيتين متجاورتان

$$y_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n} \text{ و } x_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n+1}$$

الحل

نحسب

$$\begin{aligned} y_n - x_n &= 2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ y_{n+1} - y_n &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\sqrt{n+1} + 2\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \leq 0 \\ x_n - x_{n-1} &= \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n+1} + 2\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)} + n} \geq 0 \end{aligned}$$

فنستنتج أن $(y_n)_{n \geq 1}$ متناقصة، و $(x_n)_{n \geq 1}$ متزايدة و $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$ ، فالمتتاليتان متجاورتان.

27 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_0 = 3$ وعند كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{2}{u_n + 1}$.

① أثبت أن $u_n > 0$ ، أيًا يكن n .

② المتتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ معرفة عند كل عدد طبيعي n وفق $t_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$. أثبت أن المتتالية

$(t_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية واحسب نهايتها.

③ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة واحسب نهايتها.

الحل

① لتكن $E(n)$ الخاصة $u_n > 0$ في حالة $n \geq 0$.

• الخاصة $E(0)$ صحيحة وضوحاً لأن $u_0 = 3 > 0$ فرضاً.

• نفترض صحة الخاصة $E(n)$. عندئذ $u_n + 1 > 0$ ومن ثم $u_{n+1} = \frac{2}{u_n + 1} > 0$ ، فالخاصة

$E(n+1)$ صحيحة. إذن لقد أثبتنا بالتدريج أن $u_n > 0$ أيًا كانت $n \geq 0$.

② نحسب

$$t_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{\frac{2}{u_n + 1} - 1}{\frac{2}{u_n + 1} + 2} = \frac{2 - u_n - 1}{2 + 2u_n + 2} = \frac{1 - u_n}{2(u_n + 1)} = -\frac{1}{2}t_n$$

فنستنتج أن $(t_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية أساسها $q = -\frac{1}{2}$ وحدها الأول $t_0 = \frac{3-1}{3+2} = \frac{2}{5}$. وبوجه خاص

لدينا $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 0$ لأن $|q| < 1$.

③ من المساواة $t_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$ نستنتج أن $u_n = \frac{1 + 2t_n}{1 - t_n}$ ، ولأن $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 0$ استنتجنا أن

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$$

28 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_0 = 2$ وعند كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n}$.

① أثبت أن $u_n > 0$ ، أيًا يكن n .

② المتتالية معرفة بصيغة من النمط $u_{n+1} = f(u_n)$ ، عيّن التابع f المعرف على $]0, +\infty[$.

a. ادرس تغيرات التابع f وارسم خطه البياني C_f ومقارباته، وارسم على الشكل نفسه المستقيم

d الذي معادلته $y = x$ ، بعد أن تحسب إحداثيتا نقطة تقاطع d مع C_f .

b. بيّن أن ما سبق يفيد في إثبات أن f متزايد على المجال $[\sqrt{2}, +\infty[$ وأن $f(x) \leq x$ على

هذا المجال.

- ③ استند من الرسم لثنسي الحدود الأولى من المتتالية المدروسة. أوجدتها مطردة؟ ما جهة اطرادها؟ أهي محدودة؟ ثم برهن صحة توقعاتك عن طريق الاستفادة من ② b. لتبرهن بالتدريج أن: $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_n$ مهما كان العدد n .
- ④ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة واحسب نهايتها.

الحل


- ① تدريج بسيط: مقلوب عدد موجب موجب، وكذلك يكون نصفه وكذلك يكون مجموعهما.
- ② التابع موضوع الدراسة هو $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x} :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.
- هذا تابع مستمر واشتقائي على مجموعة تعريفه.
 - وهو يحقق $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ فهو يقبل محور الترتيب مقارياً شاقولياً.
 - وكذلك فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، ونلاحظ أن $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{1}{x}$ ، إذن المستقيم Δ الذي معادلته $y = \frac{x}{2}$ مستقيم مقارب للخط البياني C_f للتابع f كما إن C_f يقع فوق Δ ولا يتقاطع معه.
- نلاحظ أن

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 2}{2x^2} = \frac{x + \sqrt{2}}{2x^2} (x - \sqrt{2})$$

إذن إشارة $f'(x)$ ثمائل إشارة $x - \sqrt{2}$ ، ومنه جدول تغيرات f الآتي

x	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow \sqrt{2} \nearrow$	$+\infty$


- وأخيراً نلاحظ أن



$$f(x) - x = \frac{2 - x^2}{2x} = \frac{\sqrt{2} + x}{2x} (\sqrt{2} - x)$$

إذن يتقاطع C_f مع منتصف الربع الأول d في النقطة $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ، ويقع C_f تحت d على $] \sqrt{2}, +\infty[$ وفوقه على $]0, \sqrt{2}[$.

- نستنتج من الدراسة السابقة أن f متزايداً على المجال $] \sqrt{2}, +\infty[$ ، وأن $f(x) \leq x$ على هذا المجال.



③ يوحي الرسم المجاور أنّ $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية متناقصة ومحدودة من الأدنى بالعدد $\sqrt{2}$.

• لنضع $E(n)$ الخاصة $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_n$.

• لما كان $u_0 = 2 \geq \sqrt{2}$ استنتجنا أنّ

$$\sqrt{2} = f(\sqrt{2}) \leq u_1 = f(u_0) \leq u_0$$

إذن الخاصة $E(0)$ صحيحة.

• وإذا افترضنا أنّ $E(n)$ صحيحة: $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_n$ ،

استنتجنا من كون f متزايداً أنّ

$$f(\sqrt{2}) \leq f(u_{n+1}) \leq f(u_n)$$

أي

$$\sqrt{2} \leq u_{n+2} \leq u_{n+1}$$

فالخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً.

④ نستنتج إذن أنّ $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_n$ مهما كانت قيمة n . فالمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة ومحدودة من الأدنى فهي متقاربة من نهاية $l \geq \sqrt{2}$.

من المساواة $u_{n+1} = f(u_n)$ نستنتج بجعل n تسعى إلى اللانهاية أنّ $l = f(l)$ ، إذن l هي فاصلة نقطة تقاطع d و C_f أي $l = \sqrt{2}$. فالمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة من العدد $\sqrt{2}$.

29 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_0 = \frac{1}{2}$ وعند كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = -\frac{1}{3}u_n^2 + 2u_n$.

① احسب u_1 و u_2 و u_3 و u_4 و u_5 .

② نرسم بالرمز f إلى التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 2x$.

a. ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

b. أثبت أنّه إذا انتمى x إلى المجال $[0, 3]$ ، انتمى $f(x)$ إلى المجال $[0, 3]$.

③ استنتج من السؤال السابق أنّ:

a. العدد 3 عنصرٌ راجعٌ على المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$.

b. المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة.

④ استنتج أنّ المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة واحسب نهايتها مع ملاحظة أنّ $u_{n+1} = f(u_n)$.

① نلاحظ من الجدول وكأن المتتالية تتزايد متقاربة من 3.

n	0	1	2	3	4	5
u_n	0.5	0.9167	1.5532	2.3023	2.8377	2.9912

② دراسة f بسيطة، ونجد له جدول التغيرات الآتي

x	$-\infty$	0	3	6	$+\infty$				
$f'(x)$		+	+	0	-				
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	0	\nearrow	3	\searrow	0	\searrow	$-\infty$

نستنتج أنّ f متزايد تماماً على المجال $[0, 3]$ ، فإذا كان $0 \leq x \leq 3$ كان

$$0 = f(0) \leq f(x) \leq f(3) = 3$$

أي $f([0, 3]) \subset [0, 3]$.

③ لنضع $E(n)$ دلالة على الخاصة $0 \leq u_n \leq 3$.

• الخاصة $E(0)$ محققة لأنّ $u_0 = 0.5$ فرضاً.

• إذا كانت $E(n)$ محققة أي $u_n \in [0, 3]$ استنتجنا مما سبق أنّ $u_{n+1} = f(u_n) \in [0, 3]$ أي إنّ

$E(n+1)$ محققة. فنكون قد أثبتنا أنّ $0 \leq u_n \leq 3$ مهما كانت n .

فالعدد 3 راجح على المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ ، والعدد 0 قاصر عنها.

من جهة أخرى لدينا

$$u_{n+1} - u_n = \frac{6u_n - u_n^2 - 3u_n}{3} = \frac{u_n(3 - u_n)}{3} \geq 0$$

إذن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة.

④ المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة. وإذا رمزنا l إلى نهايتها استنتجنا من

المساواة $u_{n+1} = f(u_n)$ ومن استمرار التابع f أنّ $l = f(l)$. أي إما أن يكون $l = 0$ أو $l = 3$.

ولكنّ الحالة الأولى مستحيلة، لأنّ كون المتتالية $(u_n)_n$ متزايدة يجعل جميع حدودها أكبر من الحد الأول


$u_0 = 0.5$ ، فلا بُدّ أن تكون النهاية كذلك أكبر من 0.5 وهي من ثم لا يمكن أن تساوي 0. نستنتج إذن

أنّ $l = 3$. أي $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 3$.

③٠ المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_0 > -\frac{4}{3}$ و $u_{n+1} = \sqrt{4 + 3u_n}$ عند كل عدد طبيعي n . نجد

في الشكل أدناه، الخط البياني C للتابع f المعرف على المجال $[-\frac{4}{3}, +\infty[$ وفق

$$f(x) = \sqrt{4 + 3x} \text{ والمستقيم } d \text{ الذي المعادلة } y = x$$



- ① ما إحداثيتا نقطة تقاطع الخط C والمستقيم d ؟
 ② نفترض في هذا السؤال أن $u_0 = 6$.
 a. أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ محدودة من الأدنى.
 b. ادرس اطراد المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$.
 c. استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة وأوجد نهايتها.
 ③ a. أثبت أن هذه النتيجة صحيحة أيًا يكن $u_0 > 4$.
 b. هل هذه النتيجة صحيحة أيضاً عندما $-\frac{4}{3} < u_0 < 4$ ؟

الحل

- ① (4, 4).
 ② لنضع $E(n)$ دلالة على الخاصة $4 \leq u_{n+1} \leq u_n$.
 • من الفرض $u_0 = 6$ و $u_1 = f(6) = \sqrt{22} \in [4, 6]$ لأن $16 \leq 22 \leq 36$. فالخاصة $E(0)$ صحيحة.
 • لنفترض صحة الخاصة $E(n)$ أي $4 \leq u_{n+1} \leq u_n$. نستنتج من كون التابع f متزايداً أن
 $4 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1}$ أو $f(4) \leq f(u_{n+1}) \leq f(u_n)$
 فالخاصة $E(n+1)$ صحيحة.
 نستنتج أن المتتالية متناقصة ومحدودة من الأدنى بالعدد 4. فهي متقاربة. ولكن لأن التابع f مستمر
 نستنتج من المساواة $u_{n+1} = f(u_n)$ أن $l = f(l)$ ، فالعدد l هو فاصلة نقطة تقاطع C_f مع منصف
 الربع الأول d . إذن $l = 4$. ومنه $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 4$.
 ③ a. المكان الوحيد في البرهان السابق الذي استعملنا فيه قيمة u_0 هو لإثبات صحة $E(0)$ أي أن
 $4 \leq u_1 \leq u_0$. ولكن من الشكل لدينا $f(x) \leq x$ على المجال $[4, +\infty[$ ، والتابع f متزايداً على هذا
 المجال، فإذا بدأنا من $u_0 > 4$ كان $4 = f(4) \leq f(u_0) \leq u_0$. أي كانت الخاصة $E(0)$ محققة.
 وعندئذ تسري بقية خطوات الحل السابق دون تعديل ونستنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة ومحدودة
 من الأدنى في هذه الحالة وتحقق $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 4$.

③ b. في هذه الحالة لدينا $f(x) \geq x$ على المجال $[-\frac{4}{3}, 4]$ ، والتابع متزايداً أيضاً. نبرهن إذن أنه في حالة $-\frac{4}{3} \leq u_0 < 4$ تكون المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 4 وتحقق مجدداً

$$\cdot \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 4$$

5

التابع اللوغاريتمي النيبيري

- 1 التابع اللوغاريتمي النيبيري
- 2 لوغاريتم جداء ضرب
- 3 دراسة التابع اللوغاريتمي \ln
- 4 اشتقاق تابع مركب من النمط $\ln \circ u$
- 5 نهايات مهمة تتعلق بالتابع اللوغاريتمي

نقاط التعلّم الأساسية في هذه الوحدة

- تعريف وخواص التابع اللوغاريتمي
- النهايات الأساسية المتعلقة بالتابع اللوغاريتمي
- اطراد التابع اللوغاريتمي واشتقاقته
- اشتقاقية لوغاريتم تابع
- حل معادلات ومترجمات تحوي لوغاريتم
- دراسة توابع تضم التابع اللوغاريتمي في علاقة ربطها.

تَدْرِبْ الصَّفحة 154

① في الحالات الآتية عَيِّن قيم x التي تجعل المقدار المعطى معرفاً:

$\ln(x-3)$	③	$\ln(1-x)$	②	$\ln(x^2)$	①
$\ln(x^2+4x)$	⑥	$\frac{1}{\ln x}$	⑤	$\frac{1}{x}\ln(1+x)$	④
$\ln\left(\frac{x-3}{2-x}\right)$	⑨	$\ln x+1 - \ln x-1 $	⑧	$\ln(x^2-3x+2)$	⑦

الحل

① معرف $\ln(x^2)$ عندما $x^2 > 0$ ، أي $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

② معرف $\ln(1-x)$ عندما $1-x > 0$ ، أي $x < 1$ ، إذن $x \in]-\infty, 1[$.

③ معرف $\ln(x-3)$ عندما $x-3 > 0$ ، أي $x > 3$ ، إذن $x \in]3, +\infty[$.

④ معرف $\frac{1}{x}\ln(1+x)$ في حالة $(1+x > 0$ و $x \neq 0$) أي $(x > -1$ و $x \neq 0)$ ، إذن

$$x \in]-1, +\infty[\setminus \{0\} =]-1, 0[\cup]0, +\infty[$$

⑤ معرف $\frac{1}{\ln x}$ في حالة $(x > 0$ و $\ln x \neq 0$) أي $(x > 0$ و $x \neq 1)$ ، إذن

$$x \in]0, +\infty[\setminus \{1\} =]0, 1[\cup]1, +\infty[$$

⑥ معرف $\ln(x^2+4x)$ عندما $x^2+4x > 0$. $x^2+4x > 0$ ثلاثي حدود من الدرجة الثانية، جذراه 0 و -4، فنتحقق المتراجحة $x^2+4x > 0$ خارج هذين الجذرين، بمعنى أن $x \mapsto \ln(x^2+4x)$ معرف على $] -\infty, -4[\cup]0, +\infty[$.

⑦ معرف $\ln(x^2-3x+2)$ عندما $x^2-3x+2 > 0$. أي على $] -\infty, 1[\cup]2, +\infty[$.

⑧ معرف $\ln|x+1| - \ln|x-1|$ في حالة $x+1 \neq 0$ و $x-1 \neq 0$ أي على $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

⑨ معرف $\ln\left(\frac{x-3}{2-x}\right)$ عندما $\frac{x-3}{2-x} > 0$. أي على المجال $]2, 3[$.

② f هو التابع المعرف على المجال $I = \mathbb{R}_+^*$ وفق $f(x) = 2 + \ln x$. بيِّن أن f اشتقاقي على I ، واحسب $f'(x)$ ، واكتب معادلةً لمماس الخط البياني للتابع f في النقطة التي فاصلتها 1.

الحل

• التابع $x \mapsto \ln x$ اشتقاقي على $]0, +\infty[$ والتابع الثابت $x \mapsto 2$ اشتقاقي على \mathbb{R} ، فالتابع f اشتقاقي على $]0, +\infty[$ بصفته مجموع هذين التابعين.

- التابع المشتق للتابع f هو $f'(x) = 0 + \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$. لإيجاد معادلة المماس، نبحث عن نقطة التماس وميل المماس. إن m ميل المماس في النقطة التي فاصلتها 1 يساوي $m = f'(1) = \frac{1}{1} = 1$. ولأن فاصلة نقطة التماس $x_0 = 1$ ، فنرتبها $y_0 = f(1) = 2$. فمعادلة المماس في النقطة التي فاصلتها 1 هي $y = 2 + 1(x - 1)$ أو $y = x + 1$.

③ f هو التابع المعرف على المجال $I = \mathbb{R}_+^*$ وفق $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$

① أثبت أن f اشتقاقي على I واحسب تابعه المشتق $f'(x)$.

② نظم جدولاً باطراد f .

③ استنتج من جدول الاطراد أن $f(x) \geq 1$ أيًا يكن $x \in I$.

الحل

- ① f هو مجموع التابعين $x \mapsto \ln x$ و $x \mapsto \frac{1}{x}$ وكل منهما اشتقاقي على I ، فالتابع f اشتقاقي على I . التابع المشتق للتابع f هو:

$$f'(x) = \frac{-1}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-1+x}{x^2}$$

② إشارة $f'(x)$ فتماثل إشارة $-1+x$ لأن $x^2 > 0$ على I . وبهذا ننظم الجدول الآتي باطراد f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		\searrow	\nearrow

نجد من الجدول أن f متناقص تماماً على المجال $[0,1]$ ومتزايد تماماً على المجال $[1,+\infty[$.

③ نقرأ في الجدول أن جميع قيم f أكبر من 1، أي $f(x) \geq 1$ أيًا يكن $x \in I$.

④ حلّ المعادلات الآتية:

$\ln(-3x) = \ln(x^2 - 4)$ ② $\ln(2x) = \ln(x^2 - 1)$ ①

$\ln(x - 2) = \ln(x^2 - 2)$ ④ $\ln(x - 2) = \ln 2$ ③

الحل

① $\ln(2x) = \ln(x^2 - 1)$

يُشترط للحل أن يكون $2x > 0$ و $2x = x^2 - 1$. أي $x > 0$ و $x^2 - 2x - 1 = 0$. وللمعادلة الأخيرة جذران أحدهما فقط موجب تماماً هو $x_0 = 1 + \sqrt{2}$. (والآخر سالب هو $1 - \sqrt{2}$ ولا يحقق الشرط الأول).

$$\cdot \ln(-3x) = \ln(x^2 - 4) \quad \textcircled{2}$$

يُشترط للحل أن يكون $-3x > 0$ و $x^2 - 4 = -3x$ أي $x < 0$ و $x^2 + 3x - 4 = 0$. وللمعادلة الأخيرة جذران أحدهما فقط سالب تماماً هو $x_0 = -4$. (والآخر موجب هو 1 ولا يحقق الشرط الأول).

$$\cdot \ln(x - 2) = \ln 2 \quad \textcircled{3}$$

هذه المعادلة تكافئ $x - 2 = 2$ أي $x = 4$

$$\cdot \ln(x - 2) = \ln(x^2 - 2) \quad \textcircled{4}$$

يُشترط للحل أن يكون $x - 2 > 0$ و $x^2 - 2 = x - 2$ أي $x > 2$ و $x(x - 1) = 0$. وللمعادلة الأخيرة جذران 0 و 1 وكلاهما لا يحقق الشرط الأول. فمجموعة حلول هذه المعادلة خالية.

٥ حلّ المتراجحات الآتية:

$$\ln(2x) \geq \ln(x^2 - 1) \quad \textcircled{2} \quad \ln(x - 2) \leq \ln(2x - 1) \quad \textcircled{1}$$

$$\ln x \leq \ln(x^2 - 2x) \quad \textcircled{4} \quad \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) \geq \ln x \quad \textcircled{3}$$

الحل

$$\cdot \ln(x - 2) \leq \ln(2x - 1) \quad \textcircled{1}$$

مجموعة الحلول S هي مجموعة قيم x التي تحقق الشرطين : $x - 2 > 0$ و $2x - 1 \geq x - 2$ معاً.

أي $x > 2$ و $x > -1$. إذن $S =]2, +\infty[$

$$\cdot \ln(2x) \geq \ln(x^2 - 1) \quad \textcircled{2}$$

مجموعة الحلول S هي مجموعة قيم x التي تحقق الشرطين : $x^2 - 1 > 0$ و $2x \geq x^2 - 1$ معاً. أي

$x^2 - 1 > 0$ و $x^2 - 2x - 1 \leq 0$. المتراجحة الأولى محققة فقط خارج المجال $[-1, 1]$ والثانية محققة

فقط في المجال $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$. إذن $S =]1, 1 + \sqrt{2}[$

$$\cdot \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) \geq \ln x \quad \textcircled{3}$$

مجموعة الحلول S هي مجموعة قيم x التي تحقق الشرطين : $x > 0$ و $1 + \frac{2}{x} \geq x$ معاً. أي $x > 0$

و $x^2 - x - 2 \leq 0$. وأخيراً $x > 0$ و $(x + 1)(x - 2) \leq 0$. المتراجحة الأولى محققة فقط في المجال

$]0, +\infty[$ والثانية محققة فقط في المجال $[-1, 2]$. إذن $S =]0, 2]$

$$\cdot \ln x \leq \ln(x^2 - 2x) \quad \textcircled{4}$$

مجموعة الحلول S هي مجموعة قيم x التي تحقق الشرطين : $x > 0$ و $x^2 - 2x \geq x$ معاً. أي

$x > 0$ و $x(x - 3) \geq 0$. وأخيراً $x > 0$ و $x - 3 \geq 0$. إذن $S = [3, +\infty[$

تَدْرِبُ الصَّفْحَتَانِ 157 و 158

① بسِّط كتابة الأعداد الآتية:

$$c = \frac{1}{2} \ln \sqrt{2} \quad ③ \quad b = \ln \frac{1}{16} \quad ② \quad a = \ln 3 + \ln \frac{1}{3} \quad ①$$

الحل

$$a = \ln 3 - \ln 3 = 0 \quad ①$$

$$b = -\ln 16 = -\ln 2^4 = -4 \ln 2 \quad ②$$

$$c = \frac{1}{2} \times \ln 2^{1/2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \ln 2 = \frac{1}{4} \ln 2 \quad ③$$

② اكتب كلاً من الأعداد الآتية بدلالة $\ln 2$ و $\ln 5$:

$$c = \ln 250 \quad ③ \quad b = \ln \frac{16}{25} \quad ② \quad a = \ln 50 \quad ①$$

الحل

$$a = \ln(2 \times 5^2) = \ln 2 + \ln 5^2 = \ln 2 + 2 \ln 5 \quad ①$$

$$b = \ln \left(\frac{4}{5} \right)^2 = 2 \ln \left(\frac{4}{5} \right) = 2(\ln 4 - \ln 5) = 4 \ln 2 - 2 \ln 5 \quad ②$$

$$c = \ln(2 \times 5^3) = \ln 2 + \ln 5^3 = \ln 2 + 3 \ln 5 \quad ③$$

③ أثبت أن $\ln(2 + \sqrt{3}) + \ln(2 - \sqrt{3}) = 0$

الحل

$$\begin{aligned} \ln(2 + \sqrt{3}) + \ln(2 - \sqrt{3}) &= \ln((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})) \\ &= \ln(4 - 3) = \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

④ في كلٍّ من الحالتين الآتيتين، قارن بين العددين x و y دون استعمال آلة حاسبة.

$$x = \ln 5, \quad y = \ln 2 + \ln 3 \quad ①$$

$$x = 2 \ln 3, \quad y = 3 \ln 2 \quad ②$$

الحل

$$. y > x \text{ إذن } . y = \ln(2 \times 3) = \ln 6 > \ln 5 = x \quad ①$$

$$. x > y \text{ إذن } . y = \ln 2^3 = \ln 8 \text{ و } x = \ln 3^2 = \ln 9 \quad ②$$

⑤ فيما يأتي بسِّط كتابة كلٍّ من a و b .

$$a = \ln 567 - \ln 72 - \ln \frac{7}{8} + \ln \frac{1}{27} \quad ①$$

$$b = \ln \sqrt{216} + \ln \sqrt{75} - \ln 15 - \ln \sqrt{27} \quad ②$$

الحل

①

$$a = \ln\left(\frac{567 \times 8}{72 \times 7 \times 27}\right) = \ln\left(\frac{\cancel{7} \times 81 \times \cancel{8}}{\cancel{8} \times 9 \times \cancel{7} \times 27}\right) = \ln\frac{1}{3} = -\ln 3$$

②

$$b = \frac{1}{2}(\ln 216 + \ln 75 - \ln 225 - \ln 27) = \frac{1}{2} \ln \frac{8 \times \cancel{27} \times \cancel{75}}{\cancel{225} \times \cancel{27}} = \frac{1}{2} \ln \frac{8}{3}$$

$$= \frac{1}{2}(3 \ln 2 - \ln 3) = \frac{3}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 3$$

⑥ أثبت صحة كلٍ من المساواتين الآتيتين مهما يكن $x > 0$.

$$\ln(1+x) = \ln x + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \quad ①$$

$$\ln(1+x^2) = 2 \ln x + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \quad ②$$

الحل

① نرسم إلى الطرف الأيمن من العلاقة بالرمز A ، فتكون المساواة صحيحة لأن:

$$A = \ln x + \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \cancel{\ln x} + \ln(1+x) - \cancel{\ln x} = \ln(1+x)$$

② نرسم إلى الطرف الأيمن من العلاقة بالرمز B ، فتكون المساواة صحيحة لأن:

$$B = \ln(x^2) + \ln\left(\frac{x^2+1}{x^2}\right) = \cancel{\ln x^2} + \ln(1+x^2) - \cancel{\ln x^2} = \ln(1+x^2)$$

⑦ في كلٍ من الحالتين الآتيتين، جد مجموعة قيم x التي تُحقّق المساواة.

$$\ln(x^2 - x) = \ln x + \ln(x-1) \quad ①$$

$$\ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = \ln(x-1) - \ln(x+2) \quad ②$$

الحل

① الطرف الأيمن من المساواة معرف عندما $x > 0$ و $x-1 > 0$ أي في حالة $x \in]1, +\infty[$.وعندئذٍ تتحقّق المساواة المعطاة بحسب خواص اللوغاريتم إذن تتحقّق المساواة فقط على $]1, +\infty[$.② الطرف الأيمن من المساواة معرف عندما $x-1 > 0$ و $x+2 > 0$ أي في حالة $x \in]1, +\infty[$.وعندئذٍ تتحقّق المساواة المعطاة بحسب خواص اللوغاريتم إذن تتحقّق المساواة فقط على $]1, +\infty[$.⑧ جد مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقّق كلاً من المتراجحات الآتية:

$$\left(1 + \frac{3}{100}\right)^n \geq 2 \quad ④ \quad 0.2 \geq \left(\frac{2}{5}\right)^n \quad ③ \quad \left(\frac{1}{3}\right)^n \leq 10^{-2} \quad ② \quad 2^n \leq 100 \quad ①$$

الحل

① $2^6 = 64 < 100$ و $2^7 = 128 > 100$ ، فمجموعة قيم n التي تحقق هذه المتراجحة هي $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

② المتراجحة $\left(\frac{1}{3}\right)^n \leq 10^{-2}$ تكافئ $\frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{100}$ ، إذن $3^n \geq 100$ ولكن $3^4 = 81 < 100$ و $3^5 = 242 > 100$ ، فمجموعة قيم n التي تحقق هذه المتراجحة هي $n > 4$.

③ المتراجحة $0.2 \geq \left(\frac{2}{5}\right)^n$ تكافئ $\ln(0.2) \geq n \ln(0.4)$ ولأن $\ln(0.4) < 0$ هذه الأخيرة تكافئ $n \geq \frac{\ln(0.2)}{\ln(0.4)} = \frac{\ln 5}{\ln 5 - \ln 2} \approx 1.76$ ، إذن مجموعة قيم n التي تحقق هذه المتراجحة هي $n \geq 2$.

يمكن أن نتحقق دون آلة حاسبة أن $1 < \frac{\ln 5}{\ln 5 - \ln 2} < 2$ لأن هذه المتراجحة تكافئ $1 < 2$ و $4 < 5$.

④ المتراجحة $\left(1 + \frac{3}{100}\right)^n \geq 2$ تكافئ $n \times \ln\left(1 + \frac{3}{100}\right) \geq \ln 2$ لأن التابع \ln متزايد تماماً. وهذه تكافئ $n \geq \frac{\ln 2}{\ln(1.03)} \approx 23.45$ ، فمجموعة قيم n التي تحقق المتراجحة هي $n \geq 24$.

⑧ حل كل متراجحة أو معادلة فيما يأتي:

$2 \ln x = \ln(2x^2 + 8x)$ ②	$2 \ln x = \ln(x + 4) + \ln(2x)$ ①
$\ln(x + 11) = \ln[(x + 3)(x + 2)]$ ④	$\ln(x + 11) = \ln(x + 3) + \ln(x + 2)$ ③
$\frac{1}{2} \ln(2x) = \ln(3 - x) - \ln \sqrt{x + 1}$ ⑥	$\ln 4 + \ln 2 = \ln(x - 6) + \ln(x + 1)$ ⑤
$\ln(3x^2 - x) \leq \ln x + \ln 2$ ⑧	$\ln 3 \leq \ln(5 - x) + \ln(x - 1)$ ⑦
$3 \ln x > \ln(3x - 2)$ ⑩	$\ln(6x + 4) \leq \ln(3x^2 - x - 2)$ ⑨

الحل

① المعادلة $2 \ln x = \ln(x + 4) + \ln(2x)$

الطرف الأيسر معرف فقط في حالة $x > 0$ ، وعندها يكون الطرف الأيمن معرفاً لأن $2x > 0$ و $x + 4 > 0$. ولأن $\ln(2x) = \ln 2 + \ln x$ نجد المعادلة المعطاة تكافئ $\ln\left(\frac{x}{2}\right) = \ln(x + 4)$ نحل في \mathbb{R} المعادلة $\frac{x}{2} = (x + 4)$ فنجد حلها $x = -8$ ومن ثم مجموعة حلول المعادلة المعطاة خالية.

② المعادلة $2 \ln x = \ln(2x^2 + 8x)$

مجموعة تعريف المعادلة هي مجموعة قيم x التي تحقق في آن معاً المتراجحتين $x > 0$ و $2x^2 + x > 0$ فهي إذن $D =]0, +\infty[$. وعلى المجموعة D ، نُكتب المعادلة (E) بالشكل $\ln x^2 = \ln(2x^2 + 8x)$ نحل في \mathbb{R} المعادلة $x^2 = 2x^2 + 8x$ التي تعطي بعد الإصلاح $x(x + 8) = 0$ وهذا مستحيل في حالة $x > 0$. فمجموعة حلول المعادلة خالية.

$$\textcircled{3} \text{ المعادلة } \ln(x+11) = \ln(x+3) + \ln(x+2)$$

مجموعة تعريف المعادلة المعطاة (E) هي مجموعة قيم x التي تحقق في آنٍ معاً المتراجحات $x+11 > 0$ و $x+3 > 0$ و $x+2 > 0$ ، فهي إذن $I =]-2, +\infty[$ ، وعلى I ، لدينا:

$$\ln(x+3) + \ln(x+2) = \ln[(x+3)(x+2)] = \ln(x^2 + 5x + 6) = \ln(x+11)$$

نحل إذن المعادلة $x^2 + 5x + 6 = x + 11$ أو $x^2 + 4x - 5 = 0$ أو $(x-1)(x+5) = 0$. لهذه المعادلة جذران حقيقيان: $x_1 = -5 \notin I$ و $x_2 = 1 \in I$. فللمعادلة (E) حلٌ وحيد $x = 1$.

$$\textcircled{4} \text{ المعادلة } \ln(x+11) = \ln[(x+3)(x+2)]$$

مجموعة تعريف المعادلة المعطاة (E) هي مجموعة قيم x التي تحقق في آنٍ معاً المتراجحتين $x+11 > 0$ و $(x+3)(x+2) > 0$ فهي إذن $I =]-11, -3[\cup]-2, +\infty[$ ، وعلى I ، تكتب (E) بالصيغة:

$$\ln((x+3)(x+2)) = \ln(x^2 + 5x + 6) = \ln(x+11)$$

نحل إذن المعادلة $x^2 + 5x + 6 = x + 11$ فنجد لها جذرين حقيقيين: $x_1 = -5 \in I$ و $x_2 = 1 \in I$. فمجموعة حلول المعادلة (E) هي $\{-5, 1\}$.

$$\textcircled{5} \text{ المعادلة } \ln 4 + \ln 2 = \ln(x-6) + \ln(x+1)$$

مجموعة تعريف المعادلة المعطاة (E) هي مجموعة قيم x التي تحقق في آنٍ معاً المتراجحتين $x > 6$ و $x > -1$ ، فهي $I =]6, +\infty[$ ، وعلى I ، تكتب المعادلة $\ln(4 \times 2) = \ln[(x-6)(x+1)]$ أو $\ln(x^2 - 5x - 6) = \ln 8$. نحلّ إذن المعادلة $x^2 - 5x - 6 = 8$ فنجد لها جذرين $x_1 = 7 \in I$ و $x_2 = -2 \notin I$. فللمعادلة (E) حلٌّ وحيدٌ هو $x = 7$.

$$\textcircled{6} \text{ المعادلة } \frac{1}{2} \ln(2x) = \ln(3-x) - \ln \sqrt{x+1}$$

مجموعة تعريف المعادلة المعطاة (E) هي مجموعة قيم x التي تحقق في آنٍ معاً $x > 0$ و $x < 3$ و $x > -1$ ، فمجموعة تعريفها $I =]0, 3[$ ، وعلى المجال I ، تكتب المعادلة (E) بالصيغة $\frac{1}{2} \ln(2x) = \ln(3-x) - \frac{1}{2} \ln(x+1)$ أو بعد الإصلاح $\ln(2x^2 + 2x) = \ln(x^2 - 6x + 9)$. نحلّ إذن المعادلة $2x^2 + 2x = x^2 - 6x + 9$ التي تكافئ $(x+9)(x-1) = 0$. فنجد لها، حلّين $x_1 = -9 \notin I$ و $x_2 = 1 \in I$. إذن للمعادلة (E) حلٌّ وحيدٌ هو $x = 1$.

$$\textcircled{7} \text{ المتراجحة } \ln 3 \leq \ln(5-x) + \ln(x-1)$$

هذه المتراجحة معرفة في حالة $x < 5$ و $x > 1$ ، فمجموعة تعريفها $I =]1, 5[$ ، وعلى I ، تكتب المتراجحة $\ln 3 \leq \ln(5-x) + \ln(x-1)$ أو $\ln 3 \leq \ln(-x^2 + 6x - 5)$ فهي تكافئ

$$(x-2)(x-4) \leq 0$$

فمجموعة حلول المتراجحة الأصلية هي المجال $[2, 4]$ المحتوى في I .

$$\textcircled{8} \text{ المتراجحة } \ln(3x^2 - x) \leq \ln x + \ln 2$$

هذه المتراجحة معرفة في حالة $x > 0$ و $3x^2 - x > 0$ أي $x > 0$ و $x(3x - 1) > 0$ ، أو $x > 0$ و $3x - 1 > 0$. فمجموعة تعريف المتراجحة المدروسة هي $I =]\frac{1}{3}, +\infty[$ وعلى I ، تكتب المتراجحة $\ln x + \ln(3x - 1) \leq \ln x + \ln 2$ أو $\ln(3x - 1) \leq \ln 2$. وهذه تكافئ $0 < 3x - 1 \leq 2$ أو $\frac{1}{3} < x \leq 1$. نستنتج أن مجموعة حلول المتراجحة المدروسة هي $]\frac{1}{3}, 1]$.

$$\textcircled{9} \text{ المتراجحة } \ln(6x + 4) \leq \ln(3x^2 - x - 2)$$

مجموعة حلول هذه المتراجحة هي قيم x التي تحقق $0 < 6x + 4 \leq 3x^2 - x - 2$ فهي إذن مجموعة قيم x التي تحقق في آن معاً

$$0 < 3x + 2 \text{ و } 0 \leq 3x^2 - 7x - 6 = (3x + 2)(x - 3)$$

أو $x > -\frac{2}{3}$ و $x \geq 3$ ، أي $x \geq 3$. نستنتج أن مجموعة حلول المتراجحة المدروسة هي $[3, +\infty[$.

$$\textcircled{10} \text{ المتراجحة } 3 \ln x > \ln(3x - 2)$$

هذه المتراجحة معرفة في حالة $x > 0$ و $3x - 2 > 0$ أي $x > \frac{2}{3}$. وفي هذه الحالة هي تكافئ


$$0 < 3x - 2 < x^3$$

ولكن $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$. إذن عندما $x > \frac{2}{3}$ يكون $x^3 - 3x + 2 \geq 0$ ولا تتحقق المساواة إلا في حالة $x = 1$. فمجموعة حلول المتراجحة المعطاة هي $]\frac{2}{3}, 1[\cup]1, +\infty[$.


$\textcircled{9}$ في كل حالة آتية، ارسم في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ مجموعة النقاط $M(x, y)$ المحققة للشرط المشار إليه.

$$\textcircled{1} \ln x = \ln(y + 1) \quad \textcircled{2} \ln y = 2 \ln x \quad \textcircled{3} \ln x + \ln y = 0$$


الحل



$\textcircled{1}$ العلاقة $\ln x = \ln(y + 1)$ معرفة في حالة $x > 0$ و $y > -1$. مع هذين الشرطين العلاقة $\ln x = \ln(y + 1)$ تكافئ $x = y + 1$ أو $y = x - 1$. فمجموعة النقاط $M(x, y)$ المحققة للشرط هي نصف المستقيم $[AX)$ المحمول على الخط البياني للتابع $x \mapsto x - 1$ دون طرفه $A(0, -1)$.



② العلاقة $\ln y = 2 \ln x$ معرفة في حالة $x > 0$ و $x > 0$. مع هذين الشرطين العلاقة $\ln y = 2 \ln x$ تكافئ $\ln y = \ln(x^2)$ أو $y = x^2$. فمجموعة النقاط $M(x, y)$ المحققة للشرط هي نصف القطع المكافئ (P) المرسوم في الربع الأول عدا ذروته $O(0, 0)$.




③ العلاقة $\ln y + \ln x = 0$ معرفة في حالة $x > 0$ و $x > 0$. مع هذين الشرطين العلاقة $\ln y + \ln x = 0$ أو العلاقة $\ln y = -\ln x$ تكافئ $\ln y = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ وتكافئ $y = \frac{1}{x}$. فمجموعة النقاط $M(x, y)$ المحققة للشرط هي فرع القطع الزائد (H) الذي معادلته $xy = 1$ والمرسوم في الربع الأول.

تَدْرِبْ الصَّفحة 162


① انطلاقاً من الخط البياني للتابع $x \mapsto \ln x$ ، ارسم الخط البياني لكل من التتابع الآتية :
 $x \mapsto \ln(-x)$ و $x \mapsto -\ln x$ و $x \mapsto -\ln(-x)$ و $x \mapsto 1 + \ln x$.

الحل




نرمز إلى الخط البياني للتابع \ln بالرمز C_{\ln} .


- التابع $f: f(x) = \ln(-x)$ خطه البياني C_f ناتج عن C_{\ln} بالتحويل $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ فهو نظير C_{\ln} بالنسبة إلى محور الترتيب.



- التابع $g: g(x) = -\ln(x)$ خطه البياني C_g ناتج عن C_{\ln} بالتحويل $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ فهو نظير C_{\ln} بالنسبة إلى محور الفواصل.



- التابع $h: h(x) = -\ln(-x)$ خطه البياني C_h ناتج عن C_{\ln} بالتحويل $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ فهو نظير C_{\ln} بالنسبة إلى مبدأ الإحداثيات.



- التابع $k : k(x) = 1 + \ln(x)$ خطه البياني C_k ناتج عن C_{\ln} بالتحويل $(x, y) \rightarrow (x, 1 + y)$ فهو ناتج من C_{\ln} بالانسحاب الذي شعاعه \vec{j} .

② أثبت أن $\ln x \leq 2(\sqrt{x} - 1)$ ، أيًا يكن $x > 0$. واستنتج أن $2 < e < 4$ باختيار قيم مناسبة للعدد

$\cdot x$

الحل

ندرس اطراد التابع $f : x \mapsto \ln x - 2\sqrt{x} + 2$ المعرف على المجال $I =]0, +\infty[$. نلاحظ أن

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1 - \sqrt{x}}{x} = \frac{1 - x}{x(1 + \sqrt{x})}$$

إذن إشارة $f'(x)$ تتفق مع إشارة $1 - x$ ومنه جدول الاطراد الآتي:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$		\nearrow	0 \searrow

- نقرأ في الجدول أن $f(x) \leq 0$ أيًا يكن $x > 0$. أي $\ln x \leq 2(\sqrt{x} - 1)$ ، أيًا يكن $x > 0$. وأن المساواة تقع فقط عندما $x = 1$.

• باختيار $x = e$ نستنتج أن $1 \leq 2(\sqrt{e} - 1)$ أو $\frac{3}{2} \leq \sqrt{e}$ وأخيراً $2 < \left(\frac{3}{2}\right)^2 \leq e$.

• وباختيار $x = \frac{1}{e}$ نستنتج أن $-1 \leq 2\left(\frac{1}{\sqrt{e}} - 1\right)$ أو $\sqrt{e} \leq 2$ وأخيراً $e \leq 4$.

• وباختيار $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ نستنتج أن $3 + \frac{13}{81} < \frac{256}{81} = \frac{2^8}{3^4} < e$.

③ في كلٍ من الحالتين الآتيتين، قارن بين العددين x و y دون استعمال آلة حاسبة.

$$x = \ln\left(\frac{1}{e}\right)^3, y = \left(\ln\frac{1}{e}\right)^2 \quad \text{②} \quad x = \ln e^3 - 2, y = \ln(e\sqrt{e}) \quad \text{①}$$

الحل

① $x = \ln e^3 - 2 = 1$ و $y = \ln(e \times e^2) = \ln(e^3) = \frac{3}{2}$ إذن $x < y$.

② $x = \ln\frac{1}{e^3} = -\ln e^3 = -3$ و $y = (-\ln e)^2 = (-1)^2 = 1$ إذن $x < y$.

④ حلّ كل متراجحة أو معادلة مما يأتي :

$$\ln(x-2) - \ln(x+1) = 2 \quad \textcircled{2} \quad \ln(1-x) = -2 \quad \textcircled{1}$$

$$(\ln x - 1)(\ln x + 2) = 0 \quad \textcircled{4} \quad (\ln x)^2 = 16 \quad \textcircled{3}$$

$$\ln \frac{1}{x} > 2 \quad \textcircled{6} \quad \ln(2-x) \geq 1 \quad \textcircled{5}$$

الحل

$$\ln(1-x) = -2 \quad \textcircled{1}$$

المعادلة المدروسة تكافئ $1-x = e^{-2}$ إذن $x = 1 - e^{-2}$.

$$\ln(x-2) - \ln(x+1) = 2 \quad \textcircled{2}$$

كلّ حل x لهذه المعادلة يحقق الشروط $x-2 > 0$ و $x+1 > 0$ و $\ln \frac{x-2}{x+1} = 2$ أي

$$x = \frac{e^2 + 2}{1 - e^2} \quad \text{و} \quad x > 2$$

وهذا مستحيل لأنّ $\frac{e^2 + 2}{1 - e^2} < 0$ فليس لهذه المعادلة حلول.

$$(\ln x)^2 = 16 \quad \textcircled{3}$$

تكتب هذه المعادلة بالشكل $(\ln x - 4)(\ln x + 4) = 0$. فإما $\ln x - 4 = 0$ ، ومنه $x = e^4$. وإما

$\ln x + 4 = 0$ ، إذن $\ln x = -4$ ، ومنه $x = e^{-4}$. فمجموعة حلول المعادلة هي $\{e^4, e^{-4}\}$.

$$(\ln x - 1)(\ln x + 2) = 0 \quad \textcircled{4}$$

إما $\ln x - 1 = 0$ ، إذن $\ln x = 1$ ، ومنه $x = e$. وإما $\ln x + 2 = 0$ ، إذن $\ln x = -2$ ، ومنه

$x = e^{-2}$. فللمعادلة المدروسة جذران $x_1 = e$ و $x_2 = e^{-2}$.

$$\ln(2-x) \geq 1 \quad \textcircled{5}$$

هذه المتراجحة تكافئ $2-x \geq e$ ، إذن $x \leq 2-e$. فمجموعة حلول المتراجحة هي $]-\infty, 2-e]$.

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) > 2 \quad \textcircled{6}$$

هذه المتراجحة تكافئ $\frac{1}{x} > e^2$ ، إذن $0 < x < \frac{1}{e^2}$. فمجموعة حلول المتراجحة هي المجال $]0, \frac{1}{e^2}[$.

① جد كلاً من النهايات الآتية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln x} \quad \text{③} \quad \lim_{x \rightarrow 0} ((x^2 - x) \ln x) \quad \text{②} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \quad \text{①}$$

الحل

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \quad \text{①}$$

في حالة $x > 0$ لدينا: $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \cdot \frac{1}{x}$ ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0 \times 0 = 0 \quad \text{إذن}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} ((x^2 - x) \ln x) \quad \text{②}$$

لاحظ أنه في حالة $x > 0$ لدينا: $(x^2 - x) \ln x = (x - 1)(x \ln x)$ ولكن

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x - 1) = -1 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0} ((x^2 - x) \ln x) = -1 \times 0 = 0 \quad \text{إذن}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln x} \quad \text{③}$$

في حالة $x > 0$ لدينا: $\frac{\sqrt{x}}{\ln x} = \frac{\sqrt{x}}{2 \ln \sqrt{x}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u}{\ln u}$ وقد وضعنا $u = u(x) = \sqrt{x}$ ولكن

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u}{\ln u} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln x} = +\infty \quad \text{إذن}$$

② فيما يأتي، جد نهاية التابع f عند أطراف مجالات تعريفه.

$$f(x) = \frac{x - \ln x}{x} \quad \text{■2} \quad f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad \text{■1}$$

$$f(x) = x + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \quad \text{■4} \quad f(x) = x - \ln x \quad \text{■3}$$

$$f(x) = \frac{x \ln x}{x + 1} \quad \text{■6} \quad f(x) = \frac{1}{x} - \ln x \quad \text{■5}$$

$$f(x) = x(1 - \ln x) \quad \text{■8} \quad f(x) = \frac{1}{\ln x} \quad \text{■7}$$

$$f(x) = \frac{1}{x} (\ln x - 1) \quad \text{■10} \quad f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-4} \right) \quad \text{■9}$$

$$f(x) = x + \ln(x+1) - \ln x \quad \text{■12} \quad f(x) = \frac{x+1}{\ln x} \quad \text{■11}$$

1. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. مجموعة تعريف هذا التابع هي $I =]0, +\infty[$

• نعلم أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ وهي نهاية f عند $+\infty$.

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$.

2. $f(x) = \frac{x - \ln x}{x}$. مجموعة تعريف هذا التابع هي $I =]0, +\infty[$

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$.

• في جوار $+\infty$ ، نكتب $f(x) = \frac{x}{x} - \frac{\ln x}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x}$. ونعلم أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ، إذن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 - 0 = 1$$

3. $f(x) = x - \ln x$

مجموعة تعريف هذا التابع هي $I =]0, +\infty[$

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$.

• في جوار $+\infty$ ، نكتب $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$. ونعلم أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ، إذن

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ ، ولما كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1$

4. $f(x) = x + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$. مجموعة تعريف f هي $I =]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$

• لحساب نهاية التابع f في جوار $-\infty$ وفي جوار $+\infty$ وعند -1 ، نكتب

$$u(x) = \frac{1}{x} \text{ و } f(x) = x + \frac{\ln(1+u)}{u}$$

• نظراً إلى أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = 0$ ، و $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$ نجد $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty + 1 = -\infty$

وبالمثل $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0$ ، و $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty + 1 = +\infty$

وأخيراً لأنّ $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} (1 + u(x)) = 0^+$ ، وجدنا $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{\ln(1+u)}{u} = +\infty$ ، إذن

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -1 + \infty = +\infty$$

• لحساب نهاية التابع f عند 0 نكتب في حالة $x > 0$ ما يأتي:

$$f(x) = x + x \ln(1+x) - x \ln x$$

• ونظراً إلى أنّ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ ، و $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1+x) = 0 \times 0$ نجد $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

$$. f(x) = \frac{1}{x} - \ln x \quad .5$$

. $I =]0, +\infty[$ هي المجال تعريف f

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \text{ ، } \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\ln x) = +\infty \text{ أو } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ ، } \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\ln x) = -\infty \text{ أو } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$$

$$. f(x) = \frac{x \ln x}{x+1} \quad .6$$

. $I =]0, +\infty[$ هي المجال تعريف f

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{0}{1} = 0 \text{ ، } \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) = 1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) = 0$$

$$\bullet \text{ لحساب نهاية } f \text{ في جوار } +\infty \text{ ، نكتب } f(x) = \frac{\ln x}{1 + \frac{1}{x}}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ ، } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x) = +\infty$$

$$. f(x) = \frac{1}{\ln x} \quad .7$$

. $I =]0, +\infty[\setminus \{1\}$ هي المجال تعريف f

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0^- \text{ ، } \lim_{x \rightarrow 0} (\ln x) = -\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \text{ ، } \lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^+ \text{ ، } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x) = +\infty$$

$$. f(x) = x(1 - \ln x) \quad .8$$

. $I =]0, +\infty[$ هي المجال تعريف f

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} (x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \ln x) = -\infty \text{ ، } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ نستنتج أن}$$

$$\bullet \text{ لحساب نهاية } f \text{ عند الصفر ، نكتب } f(x) = x - x \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 - 0 = 0 \text{ ، } \lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0} (x) = 0$$

$$. f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-4} \right) \quad .9$$

$$. I =]-\infty, -1[\cup]4, +\infty[\text{ أي } \frac{x+1}{x-4} > 0 \text{ التي تحقق } x \text{ مجموعة قيم } f \text{ معرف على}$$

$$\text{لنضع } u(x) = \frac{x+1}{x-4}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{u \rightarrow 1} \ln(u) = 0 \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = 1$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{u \rightarrow 0} \ln(u) = -\infty \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow (-1)^-} u(x) = 0$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \ln(u) = +\infty \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow 4^+} u(x) = +\infty$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{u \rightarrow 1} \ln(u) = 0 \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 1$$

$$\cdot f(x) = \frac{1}{x}(\ln x - 1) \quad \mathbf{10}$$

مجموعة تعريف f هي المجال $I =]0, +\infty[$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right) = +\infty \quad \text{و} \quad \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - 1) = -\infty \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

لحساب نهاية f في جوار $+\infty$ ، نكتب $f(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$ ونعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right) = 0$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 - 0 = 0 \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right) = 0 \quad \text{و}$$

$$\cdot f(x) = \frac{x+1}{\ln x} \quad \mathbf{11}$$

مجموعة تعريف f هي المجال $I =]0, +\infty[\setminus \{1\}$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) = 1$$

في جوار $+\infty$ لدينا $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \times \frac{x}{\ln x}$ ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{\ln x}\right) = +\infty$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad \text{وأخيراً } \cdot \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

$$\cdot f(x) = x + \ln(x+1) - \ln x \quad \mathbf{12}$$

مجموعة تعريف f هي $I =]0, +\infty[$ نكتب $f(x) = x + \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$ ونضع $u = \frac{x+1}{x}$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0} (x) = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \ln(u) = +\infty \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = +\infty$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} (x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \lim_{u \rightarrow 1} \ln(u) = 0 \quad \text{إذن } \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 1$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

③ ليكن C الخط البياني للتابع f المعروف على المجال $I =]0, +\infty[$ وفق $f(x) = x + 1 - \frac{\ln x}{x}$.

1. لماذا المستقيم d الذي معادلته $y = x + 1$ مقارب للخط C ؟

2. ادرس الوضع النسبي للخطين d و C .

الحل

1. ليكن g التابع المعروف على $I =]0, +\infty[$ وفق $g(x) = f(x) - (x + 1)$ ، أي

$$g(x) = x + 1 - \frac{\ln x}{x} - (x + 1) = -\frac{\ln x}{x}$$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. فالمستقيم d الذي معادلته $y = x + 1$ مقارب للخط C .

2. لدراسة الوضع النسبي للخطين d و C ، ندرس إشارة $g(x)$ ، التي تماثل إشارة $-\ln x$ فنجد

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

نستخلص من الجدول:

- في النقطة $(1, 2)$: يتقاطع الخطان d و C .
- على المجال $]0, 1[$ لدينا $g(x) > 0$ ، إذن الخط C يقع فوق المستقيم d .
- على المجال $]1, +\infty[$ لدينا $g(x) < 0$ ، إذن الخط C يقع تحت المستقيم d .

④ في كلٍ مما يأتي، أثبت أن التابع f اشتقاقي على المجال I ثم احسب f' .

1 $I =]2, +\infty[$, $f(x) = \ln(x - 2) - \ln(x + 2)$ 2 $I =]1, +\infty[$, $f(x) = \ln\left(\frac{x - 1}{x + 1}\right)$

3 $I = \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1 + x^2)$ 4 $I =]0, +\infty[$, $f(x) = \frac{1}{x} - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$

الحل

1 التابع $x \mapsto \ln(x - 2)$ اشتقاقي على $I_1 =]2, +\infty[$ والتابع $x \mapsto \ln(x + 2)$ اشتقاقي على

$I_2 =]-2, +\infty[$ ، و f هو مجموع هذين التابعين، فهو اشتقاقي على $I_1 \cap I_2 =]2, +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{1}{x - 2} - \frac{1}{x + 2} = \frac{4}{x^2 - 4}$$

2 على $]1, +\infty[$ التابع $x \mapsto u(x) = \frac{x - 1}{x + 1}$ موجب تماماً واشتقاقي، فالتابع f اشتقاقي على I .

ويكون

$$f'(x) = \frac{1}{\frac{x-1}{x+1}} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)' = \frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{2}{(x+1)^2} = \frac{2}{x^2 - 1}$$

3 التابع $x \mapsto \frac{1}{x}$ اشتقاقي على $I =]0, +\infty[$ ، وكذلك فإنّ التابع $x \mapsto u(x) = 1 + \frac{1}{x}$ موجب

تماماً واشتقاقي على I . نستنتج إذن أنّ $x \mapsto f(x) = \frac{1}{x} - \ln u(x)$ اشتقاقي على I وأنّ

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{x^2} - \frac{u'(x)}{u(x)} = -\frac{1}{x^2} - \frac{-1/x^2}{1+1/x} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x(1+x)} \\ &= \frac{-1}{x^2(1+x)} \end{aligned}$$

4 التابع $x \mapsto u(x) = 1 + x^2$ موجب تماماً واشتقاقي على \mathbb{R} ، فالتابع f اشتقاقي على \mathbb{R} . ونجد

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{1+x^2}$$

أنشطة

نشاط 1 تمتات عن التابع اللوغاريتمي \ln


فيما يأتي C هو الخط البياني للتابع \ln في معلم متجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) .

1 وضع الخط C بالنسبة إلى مماساته

A نقطة من الخط C فاصلتها $a > 0$ ، و T_a هو المماس للخط C في النقطة A .

a. أثبت أنّ $y = \frac{1}{a}x - 1 + \ln a$ معادلة للمماس T_a .

b. تحقّق أنّ المماس T_e للخط C في النقطة $B(e, 1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .



2 ليكن g التابع المعرف على المجال \mathbb{R}_+^* وفق $g(x) = \frac{1}{a}x - 1 + \ln a - \ln x$

a. أثبت أنّ g اشتقاقي على \mathbb{R}_+^* وادرس إشارة $g'(x)$.

b. استنتج جدولاً باطراد g ومن ثمّ إشارة g .

3 استنتج مما سبق أنّ الخط C يقع تحت أي مماس له.

2 تطبيق

① استنتج من الفقرة السابقة أنه مهما كان $a > 0$ و $x > 0$ كان $\ln x \leq \ln a + \frac{x-a}{a}$ (1)

② استنتج من (1) أنه مهما كان $a > 0$ كان $\ln(a+1) - \ln a \leq \frac{1}{a}$ (2)

③ a . يبدو الخط C على المجال $[10,11]$ وكأنه قطعة مستقيمة أفقية، لماذا؟
b. ما فاصلتا النقطتين I و J من الخط C اللتين ترتبهما على التوالي 10 و 15؟ أمّن الممكن وضع هاتين النقطتين على الخط C ؟ لماذا؟

تفسّر المعلومات السابقة أن التابع \ln «يسعى ببطء إلى $+\infty$ ».



الحل


1 وضع الخط C بالنسبة إلى مماساته

① a . بوجه عام معادلة المماس T_a للخط البياني C_f لتابع اشتقاقي f في النقطة التي فاصلتها a هي

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

في حالتنا $f(a) = \ln a$ و $f'(a) = \frac{1}{a}$. إذن معادلة T_a هي $y = \ln a + \frac{1}{a}(x - a)$ أو

$$y = \frac{1}{a}x - 1 + \ln a$$



b. في حالة $a = e$ لدينا $\ln e = 1$ فتصبح معادلة المماس T_e في النقطة $B(e, 1)$ ، كما يأتي: $y = \frac{1}{e}x$. وهي معادلة مستقيم مار بالمبدأ $O(0, 0)$.

② بهدف تعيين الوضع النسبي للخط البياني للتابع اللوغاريتمي ومماسه في النقطة التي فاصلتها a منه، نصنع التابع g الذي يمثل الفرق بين ترتيب نقطة فاصلتها x من T_a وترتيب النقطة التي فاصلتها x من C ، وليكن التابع $x \mapsto g(x) = \frac{1}{a}x - 1 + \ln a - \ln x$ المعطى في النص.

التابع g معرف على المجال $]0, +\infty[$ وهو اشتقاقي على هذا المجال وضوحاً. ولدينا

$$g'(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{x} = \frac{x-a}{ax}$$

إذن إشارة $g(x)$ تتفق مع إشارة $x - a$ ومنه جدول الاطراد الآتي:

x	0	a	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	\searrow	0	\nearrow

نستنتج من جدول اطراد g أنه موجب على $]0, +\infty[$ ولا ينعدم إلا عند $x = a$. إذن يقع الخط البياني C تحت T_a ولا يشترك معه إلا عند نقطة التماس التي فاصلتها $x = a$.
 ③ نستنتج مما سبق أن الخط C يقع تحت أي مماس له.

2 تطبيق

- ① المتراجحة (1) تعبر عن المتراجحة $g(x) \geq 0$ ، التي أثبتنا صحتها.
- ② باختيار $x = a + 1$ في المتراجحة (1) والإصلاح نحصل على (2).
- ③ a . استناداً إلى (2)، لدينا $0 < \ln(11) - \ln(10) \leq \frac{1}{10}$ أي إن تغيير ترتيب التابع اللوغاريتمي يكون صغيراً على المجال $[10, 11]$ وهذا ما يجعل خطه البياني يبدو وكأنه قطعة مستقيمة أفقية.

b من $\ln x_I = 10$ ، و $\ln x_J = 15$. نستنتج أن

$$x_J = e^{15} \approx 3\,269\,017 \quad \text{و} \quad x_I = e^{10} \approx 22\,026$$

وعليه، مهما اخترنا واحدة للقياس على محور الفواصل، فستكون x_J أبعد من x_I عن O بحوالي 148 مرة. وهذا يجعل الرسم غير ممكن على ورقة كتاب عادية الأبعاد.

نشاط 2 تابع اللوغاريتم العشري \log

- ① احسب $\log(1)$ و $\log(10)$ ، ثم $\log(100)$ و $\log(1000)$ و $\log(10000)$.
- ② نضع $k = \frac{1}{\ln(10)}$. أثبت أن $0 < k < 1$.
- ③ باستعمال المساواة $\log x = k \ln x$ ، تحقق من أن التابع \log يتمتع بجميع خواص التابع \ln .
- ④ ارسم في معلم متجانس واحد الخططين البيانيين للتابعين \log و \ln .


الحل

- ① نعلم أن $\log(x) = \frac{\ln x}{\ln 10}$ ، إذن، $\log(10^n) = \frac{\ln 10^n}{\ln 10} = \frac{n \ln 10}{\ln 10} = n$ ، ومنه $\log(10^0) = 0$ و $\log(10^1) = 1$ و $\log(10^2) = 2$ و $\log(10^3) = 3$ و $\log(10^4) = 4$.
- ② لما كان $e < 3$ استنتجنا أن $e < 10$ ومنه $1 < \ln 10$ أي $0 < k = \frac{1}{\ln 10} < 1$.
- ③ لما كان k ثابتاً عددياً، فمجموعة تعريف \log هي نفسها مجموعة تعريف \ln أي $]0, +\infty[$.

ولأن $k > 0$ استنتجنا من خواص التابع اللوغاريتمي \ln أن \log متزايد تماماً على $]0, +\infty[$ وأن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \log(x) = -\infty$$

④ نرمز إلى الخط البياني للتابع \log بالرمز C_{\log} وإلى الخط البياني للتابع \ln بالرمز C_{\ln} .



نشاط 3 حصر المقدار $\ln(1+x)$

① متراجعة تضم $\ln(1+x)$

① ادرس على \mathbb{R}_+^* التابع $f: x \mapsto \ln x + 1 - x$ ، واستنتج في حالة $x > 0$ صحة المتراجحة

$$(1) \dots \ln x \leq x - 1$$

② a . بالاستفادة من (1) برهن أنه في حالة $t > -1$ ، يكون $\ln(1+t) \leq t$

b . وكذلك باختيار $x = \frac{1}{1+t}$ ، أثبت أنه في حالة $t \geq -1$ ، يكون $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$

نستنتج إذن صحة المتراجحة:

$$(2) \dots \frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t \quad \text{في حالة } t > -1 \text{ لدينا}$$

② إحاطة المقدار $\ln(2)$

ليكن p عدداً طبيعياً موجباً تماماً. ولنضع $x = \frac{1}{p}$

$$\textcircled{1} \text{ أثبت انطلاقاً من (2) أن } \frac{1}{p+1} \leq \ln\left(\frac{p+1}{p}\right) \leq \frac{1}{p}$$

② نعرّف المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ بالعلاقة $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$

$$a. \text{ أثبت أن } u_n \leq \ln 2 \leq u_n + \frac{1}{2n}$$

b . استنتج أن $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة من العدد $\ln 2$

c . احصر العدد $\ln 2$ باختيار $n = 10$

① متراجحة تضم $\ln(1+x)$

①

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \text{ ، إذن } \lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x) = 1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -\infty$$

أما في جوار $+\infty$ ، فلدينا

$$\cdot f(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} - 1 \right)$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \times (-1) = -\infty \text{ ، استنتجنا أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\cdot \text{يحسب مشتق } f \text{ بسهولة بالعلاقة } f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x} \text{ ، فإشارته تتفق مع إشارة } (1-x)$$

على \mathbb{R}_+^* ، ومنه جدول التغيرات الآتي:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow 0	$\searrow -\infty$

نجد من جدول تغيرات f أن $f(x) \leq 0$ أيًا كان x من \mathbb{R}_+^* ، أي $\ln x + 1 - x \leq 0$. ومنه المتراجحة (1).

ملاحظة. كان بالإمكان إثبات هذه المتراجحة مباشرة اعتماداً على خاصية كون الخط البياني للتابع اللوغاريتمي يقع تحت مماسه في النقطة التي فاصلتها تساوي 1.

$$\textcircled{2} \text{ a. في حالة } t > -1 \text{ يكون } x = t + 1 > 0 \text{ وبالتعويض في (1) ، فنحصل على } \ln(1+t) \leq t$$

$$\text{b. وكذلك يكون } x = \frac{1}{1+t} > 0 \text{ ، وبالتعويض في (1) ، نحصل على } \ln\left(\frac{1}{1+t}\right) \leq \frac{1}{1+t} - 1$$

$$\text{أي } -\ln(1+t) \leq -\frac{t}{1+t} \text{ أو } \frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \text{ ، وتنتج (2) من المتراجحتين السابقتين.}$$

② إحاطة المقدار $\ln(2)$

$$\textcircled{1} \text{ نختار } t = \frac{1}{p} \text{ في المتراجحة (2) ، فنحصل على}$$

$$\frac{1}{p+1} \leq \ln\left(\frac{p+1}{p}\right) \leq \frac{1}{p}$$

$$\textcircled{2} \text{ a. نلاحظ أولاً أن } u_n \text{ هي مجموع } n \text{ كسراً هي مقاليب الأعداد الواقعة بين } n \text{ و } 2n.$$

ينتج من ذلك وباستعمال الطرف الأيسر أي $\frac{1}{p+1} \leq \ln\left(\frac{p+1}{p}\right)$ من المتراجحة السابقة أنّ

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} \\ &\leq \ln \frac{n+1}{n} + \ln \frac{n+2}{n+1} + \dots + \ln \frac{2n-1}{2n-2} + \ln \frac{2n}{2n-1} \\ &= \ln \left(\frac{n+1}{n} \times \frac{n+2}{n+1} \times \dots \times \frac{2n-1}{2n-2} \times \frac{2n}{2n-1} \right) \\ &= \ln \frac{2n}{n} = \ln 2 \end{aligned}$$

وبالمثل، بالاستفادة من الطرف الأيمن أي $\ln\left(\frac{p+1}{p}\right) \leq \frac{1}{p}$ من المتراجحة السابقة، وملاحظة أنّ

$\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}$ ، ومن ثمّ فإنّ $u_n + \frac{1}{2n}$ هي مجموع n كسراً هي مقلّيب الأعداد الواقعة بين n و $2n-1$. نجد

$$\begin{aligned} u_n + \frac{1}{2n} &= \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-2} + \frac{1}{2n-1} \\ &\geq \ln \frac{n+1}{n} + \ln \frac{n+2}{n+1} + \dots + \ln \frac{2n-1}{2n-2} + \ln \frac{2n}{2n-1} \\ &= \ln \left(\frac{n+1}{n} \times \frac{n+2}{n+1} \times \dots \times \frac{2n-1}{2n-2} \times \frac{2n}{2n-1} \right) \\ &= \ln \frac{2n}{n} = \ln 2 \end{aligned}$$

وهكذا نكون قد أثبتنا صحة المتراجحة $u_n + \frac{1}{2n} \leq \ln 2 \leq u_n$ في حالة $n \geq 1$.

b. يمكن كتابة المتراجحة السابقة بالصيغة $\ln 2 - \frac{1}{2n} \leq u_n \leq \ln 2$ ، وباستعمال مبرهنة الإحاطة

نستنتج أنّ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln 2$ لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n} = 0$.

c. نستعمل المتراجحة السابقة بوضع $n = 10$ ، فنحصل على $u_{10} \leq \ln 2 \leq u_{10} + \frac{1}{20}$ ، نستعمل

آلة حاسبة لحساب $u_{10} = \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{20}$ ، فنجد $0.668 \leq u_{10} \leq 0.669$ إذن

$0.668 \leq \ln 2 \leq 0.669 + 0.05$ ، ومن ثمّ $0.669 \leq \ln 2 \leq 0.719$.

نشاط 4 دراسة تابع

ليكن g التابع المعرف على $[0, +\infty[$ وفق $g(0) = 0$ و $g(x) = \frac{x}{x - \ln x}$ في حالة $x > 0$.

وليكن C الخط البياني الممثل للتابع g .

① تيقن أن $g(x)$ معرف في حالة $x > 0$.

② a . أثبت أن g مستمر عند الصفر.

b . ادرس قابلية اشتقاق g عند الصفر. وعين إن أمكن المماس للخط C عند مبدأ الإحداثيات.

③ a . ما نهاية g عند $+\infty$ ؟

b . احسب $g'(x)$ في حالة $x > 0$ ، ثم ادرس تغيرات g .

c . أعط معادلة للمماس T للخط C في النقطة التي فاصلتها 1.

الحل

① نعلم أن الخط البياني للتابع اللوغاريتمي \ln يقع تحت مماسه في النقطة التي فاصلتها $x = 1$ أي المستقيم الذي معادلته $y = x - 1$ ، ومنه $\ln x \leq x - 1$ في حالة $x > 0$ وهذا يكافئ قولنا $x - \ln x \geq 1$ في حالة $x > 0$. إذن مقام g لا يندم في حالة $x > 0$ والتابع g معرف إذن في هذه الحالة.

② a . $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x) = +\infty$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$. ومن جهة أخرى $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ ولدينا $g(0) = 0$ ، فالتابع g مستمر عند الصفر.

b . ليكن t تابع معدل تغير g عند الصفر، أي التابع المعرف في حالة $x > 0$ بالصيغة

$$t(x) = \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{\frac{x}{x - \ln x} - 0}{x} = \frac{1}{x - \ln x}$$

نلاحظ مباشرة أن $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = 0$ فالتابع g اشتقائي عند الصفر و $g'(0) = 0$. ولأن $g(0)$ استنتجنا

أن محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ هو مماس للخط البياني للتابع g في المبدأ.

③ a . في حالة $x > 0$ لدينا $g(x) = \frac{1}{1 - \frac{\ln x}{x}}$. ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$.


b . $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2}$ ، وهو يندم عند $x = e$. وبهذا نجد الجدول الآتي بتغيرات g :

x	0	e	$+\infty$
$g'(x)$	0	+	0
$g(x)$	0	\nearrow	$\frac{e}{e-1}$
			\searrow
			1


c. لتكن A النقطة من الخط C التي فاصلتها 1، فيكون ترتيبها $g(1) = \frac{1}{1-0} = 1$ ، إذن

إحداثيات A هما $(1,1)$. أمّا معادلة المماس في A فهي $y = g(1) + g'(1)(x - 1) = x$

ونجد في الشكل الآتي الخط البياني للتابع g والمماس T :



مُربّيات ومسابائل



1 نتأمل تابعاً f معرفاً على المجال $I = [1, 4]$ وفق

حيث $f(x) = ax + b + c \ln x$ و a و b و c أعداد

حقيقية نهدف إلى تعيينها. نجد في الشكل المجاور الخط البياني لهذا التابع.

① أثبت أنّ f اشتقاقي على I واحسب تابعه المشتق $f'(x)$.

② استند من المعلومات المدونة على الشكل لإثبات أنّ:

$$2a + b + c \ln 2 = 3 - 4 \ln 2 \quad \text{و} \quad 2a + c = 0 \quad \text{و} \quad a + b = 1$$

③ جد قيم a و b و c ثم اكتب عبارة $f(x)$.

الحل

① هو مجموع تابعين، أحدهما $x \mapsto ax + b$ وهو تابع اشتقاقي على $[1, 4]$ ، والآخر

$x \mapsto \ln x$ وهو اشتقاقي على $[1, 4]$ أيضاً. نستنتج أنّ f اشتقاقي على $[1, 4]$. ولدينا

$$f'(x) = a + c \times \frac{1}{x} = a + \frac{c}{x}$$

② لدينا من الشكل:

$$\bullet \quad f(1) = 1 \quad \text{إذن} \quad 1 = a + b + c \ln(1), \quad \text{أي} \quad a + b = 1 \quad \dots (1)$$

$$\bullet \quad f(2) = 3 - 4 \ln 2 \quad \text{إذن} \quad 3 - 4 \ln 2 = 2a + b + c \ln 2 \quad \dots (2)$$

• $f'(x) = a + \frac{c}{x}$ والمماس في النقطة $(2, 1)$ أفقي، أي $f'(2) = 0$ ، ومنه $a + \frac{c}{2} = 0$ إذن

$$\bullet \quad 2a + c = 0 \quad \dots (3)$$

③ بحل جملة المعادلات الثلاث نجد $(a, b, c) = (2, -1, -4)$ ومنه عبارة f :

$$f(x) = 2x - 1 - 4 \ln x$$

2 ليكن a و b عددين حقيقيين. في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، C هو الخط البياني للتابع f

المعرف على \mathbb{R}_+^* وفق $f(x) = ax + b + \frac{1}{x} \ln x$. النقطة $A(1, 0)$ هي نقطة من C ، والمماس

للخط البياني C في A يوازي المستقيم الذي معادلته $y = 3x + 2$. استند من هذه المعطيات

لتعيين a و b .


نقطة من C ، إذن $f(1) = 0$ إذن $a + b = 0$. أما مشتق f فيعطى بالصيغة

$$f'(x) = a + \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

ميل المماس في النقطة $A(1, 0)$ يساوي ميل المستقيم الذي معادلته $y = 3x + 2$ ، أي $f'(1) = 3$ ، إذن $a + 1 = 3$ ومنها $a = 2$. ومن العلاقة $a + b = 0$ نحصل على $b = -2$.

3 في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، رسمنا C الخط البياني للتابع \ln . لتكن M نقطة من C

فاصلتها m .



- ① جد، بدلالة m ، معادلةً للمماس T للخط C في النقطة M .
- ② لتكن H مسقط M على محور الترتيب ولتكن K نقطة تقاطع المماس T مع هذا المحور.
 - a . أثبت أن ترتيب النقطة K يساوي $\ln m - 1$ ، أيًا يكن $m > 0$.
 - b . استنتج أن $\vec{KH} = \vec{j}$.
 - c . استند مما سبق لإعطاء طريقة عملية وبسيطة لرسم مماس للخط C من نقطة كيفية منه.

① إن T يقبل $y = \frac{\ln m}{f(m)} + \frac{1}{f'(m)}(x - m)$ أو $y = \frac{x}{m} + \ln m - 1$ معادلة له.

- ② a . يقطع T محور الترتيب في النقطة التي فاصلتها 0 أي $K(0, \ln m - 1)$.
- b . لما كانت إحداثيتا M هما $(m, \ln m)$ استنتجنا أن $H(0, \ln m)$. ومن ثم

$$\vec{KH} = \begin{bmatrix} 0 \\ \ln m \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ \ln m - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{j}$$

c . لتكن M نقطة كيفية من الخط C . ننشئ H المسقط القائم للنقطة M على محور الترتيب، ثم نرسم K صورة H وفق الانسحاب الذي شعاعه $-\vec{j}$. فيكون (KM) مماس الخط C في النقطة M .

4 كيف نختار العدد الحقيقي m ليكون للمعادلة $x^2 - 2x + \ln(m+1) = 0$ جذران مختلفان؟

الحل

المعادلة معرفة بشرط $m+1 > 0$. وهي في هذه الحالة تكافئ $(x-1)^2 = 1 - \ln(m+1)$. فلها جذران حقيقيان مختلفان إذا وفقط إذا كان $1 - \ln(m+1) > 0$ أو $e-1 > m$. ومنه علينا أن نختار m من المجال $]-1, e-1[$ ليكون للمعادلة المعطاة جذران حقيقيان مختلفان.

5 لتكن $(u_n)_{n \geq 1}$ متتالية معرفة على \mathbb{N}^* وفق $u_n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$

① جد نهاية هذه المتتالية.

② نضع $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

a . أثبت أن $S_n = \ln(n+1)$.

b . ما نهاية $(S_n)_{n \geq 1}$ ؟

الحل

① $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln 1 = 0$ ، إذن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right) = 1$

② a . لتكن $E(n)$ الخاصة $S_n = \ln(n+1)$.

الخاصة $E(1)$ محققة لأن $S_1 = u_1 = \ln 2 = \ln(1+1)$. لنفترض أن $E(n)$ محققة عندئذ

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + u_{n+1} = \ln(n+1) + \ln\left(\frac{n+2}{n+1}\right) \\ &= \ln\left((n+1) \times \frac{n+2}{n+1}\right) = \ln(n+2) \end{aligned}$$

فالخاصة $E(n+1)$ محققة، ونكون قد أثبتنا بالتدريج أن $S_n = \ln(n+1)$ أيًا كان $n \geq 1$.

② b . لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty$ استنتجنا أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

6 أثبت أن المستقيم الذي معادلته $y = x - 1$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع

$$f : x \mapsto x - x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

في جوار $+\infty$. (ضع $X = \frac{1}{x}$).

الحل

نلاحظ أن

$$f(x) - (x - 1) = 1 - x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1 - \frac{\ln(1 + X)}{X}$$

إذ وضعنا $X = \frac{1}{x}$. ولكن $\lim_{x \rightarrow \infty} X(x) = 0$ و $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + X)}{X} = 1$ إذن

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (x - 1)) = \lim_{X \rightarrow 0} \left(1 - \frac{\ln(1 + X)}{X} \right) = 1 - 1 = 0$$

إذن المستقيم الذي معادلته $y = x - 1$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f في جوار $+\infty$.

7 نتأمل التابع f المعرف على $I = \mathbb{R}_+^*$ وفق:

$$f(x) = \begin{cases} x^2(1 - \ln x), & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x}$. واستنتج أن f اشتقاقي عند الصفر .

الحل

نلاحظ أنه في حالة $x > 0$ لدينا

$$t(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{x^2(1 - \ln x) - 0}{x} = x(1 - \ln x) = x - x \ln x$$

ولأن $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ ، استنتجنا $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = 0$ ، فالتابع f اشتقاقي عند الصفر و $f'(0) = 0$.

8 التوابع الآتية معرفة على $I = \mathbb{R}_+^*$. ادرس تغيرات كل منها وارسم خطه البياني \mathcal{C} .


$$f : x \mapsto x - x \ln x \quad \textcircled{2} \quad f : x \mapsto \frac{\ln x}{x} \quad \textcircled{1}$$

$$f : x \mapsto \frac{1 - \ln x}{x} \quad \textcircled{4} \quad f : x \mapsto x \ln x \quad \textcircled{3}$$

$$f : x \mapsto x^2 - 8x + 8 + 6 \ln x \quad \textcircled{6} \quad f : x \mapsto x - \ln x \quad \textcircled{5}$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad \textcircled{1}$$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$. نستنتج أنّ المحورين الإحداثيين خطان مقاربان للخط C .
- $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ ينعدم f' فقط عند $x = e$.
- جدول تغيرات f :




x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow e^{-1}$	$\searrow 0$

- نقاط مساعدة على الرسم: التقاطع مع محور الفواصل $(1, 0)$.
- الخط البياني في الشكل المجاور.

$$f(x) = x - x \ln x \quad \textcircled{2}$$

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ لأنّ $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ $f(x) = x(1 - \ln x)$.
- و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \ln x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$.
- $f'(x) = -\ln x$ ينعدم f' فقط عند $x = 1$.
- جدول تغيرات f :



x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$	0	$\nearrow 1$	$\searrow -\infty$


- نقاط مساعدة على الرسم: التقاطع مع محور الفواصل $(e, 0)$ ، المماس في المبدأ شاقولي.
- الخط البياني في الشكل المجاور.

ملاحظة. دراسة المماس في المبدأ غير مطلوبة في السؤال. ولكنها نقطة مساعدة على الرسم، إذ يمكن

تمديد التابع بالاستمرار عند الصفر بوضع $f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، وعندها نلاحظ أنّ نسبة التغير

عند الصفر $t(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1 - \ln x$ وهي تحقق $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = +\infty$ فالتابع غير اشتقائي

عند الصفر ولكن محور الترتيب مماس شاقولي لخطه البياني.



$$f(x) = x \ln x \quad \textcircled{3}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\bullet f'(x) = \ln x + 1 \text{ ينعدم فقط عند } x = 1/e$$

• جدول تغيرات f :

x	0	$1/e$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	0	$\searrow -1/e \nearrow$	$+\infty$

• نقاط مساعدة على الرسم: التقاطع مع محور الفواصل

• المماس في المبدأ شاقولي. $(1,0)$

• الخط البياني في الشكل المجاور.

ملاحظة. دراسة المماس في المبدأ غير مطلوبة في السؤال. ولكنها نقطة مساعدة على الرسم، إذ يمكن

تمديد التابع بالاستمرار عند الصفر بوضع $f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، وعندها نلاحظ أنّ نسبة التغير

عند الصفر $t(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x} = \ln x$ وهي تحقق $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = -\infty$ فالتابع غير اشتقائي عند

الصفر ولكن محور الترتيب مماس شاقولي لخطه البياني.

$$f(x) = \frac{1 - \ln x}{x} \quad \textcircled{4}$$

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \ln x) = +\infty$ ، لأن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ ، إذن محور الترتيب مستقيم

مقارب للخط البياني C . وكذلك $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ لأن $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ، إذن محور


الفواصل مستقيم مقارب للخط البياني C .

• $f'(x) = \frac{\ln x - 2}{x^2}$ وينعدم f' فقط عند $x = e^2$

• جدول تغيرات f :

x	0	e^2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow -1/e^2 \nearrow$	0

• نقاط مساعدة على الرسم: التقاطع مع محور الفواصل $(e,0)$.



$$f(x) = x - \ln x \quad \textcircled{5}$$


• $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$. إذن محور الترتيب مستقيم مقارب للخط البياني \mathcal{C} .

وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ لأن $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) = 1$

• $f'(x) = \frac{x-1}{x}$ ، وينعدم f' فقط عند $x = 1$.

• جدول تغيرات f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	\searrow 1 \nearrow	$+\infty$



• الخط البياني في الشكل المجاور.

$$f(x) = x^2 - 8x + 8 + 6 \ln x \quad \textcircled{6}$$

• $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$. إذن محور الترتيب مستقيم مقارب للخط البياني \mathcal{C} .

وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 8x + 8) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

• حساب المشتق:


$$f'(x) = 2x - 8 + \frac{6}{x} = \frac{2(x^2 - 4x + 3)}{x} = \frac{2(x-1)(x-3)}{x}$$

• ينعدم f' فقط عند $x = 1$ و $x = 3$.

• جدول تغيرات f :

x	0	1	3	$+\infty$
$f'(x)$		+ 0 -	0 +	
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow 1 \searrow	\searrow $\frac{6 \ln 3 - 7}{\approx -0.4}$ \nearrow	$+\infty$

• الخط البياني في الشكل الآتي:



ماذا نستنتج بشأن تقاطع هذا الخط مع محور الفواصل؟

9 في كلٍ مما يأتي، أثبت أن التابع f اشتقاقي على المجال I ثم احسب f' .

① $f(x) = \ln(\ln(\ln x))$ و $I =]e, +\infty[$

② $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{\ln x}\right)$ و $I =]1, +\infty[$

الحل

① $f(x) = \ln(\ln(\ln x))$ و $I =]e, +\infty[$

التابع للوغاريتمي $x \mapsto \ln x$ اشتقاقي وموجبٌ تماماً على $I =]e, +\infty[$ المعطى، إذن يكون التابع $u : x \mapsto \ln(\ln x)$ اشتقاقياً على I ومشتقه $u'(x) = \frac{\ln' x}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x}$ وهو أيضاً موجبٌ تماماً على

I (لأنّ $x > e$ يقتضي $\ln x > \ln e = 1$ ومنه $u(x) = \ln(\ln x) > \ln 1 = 0$)، إذن يكون التابع

$f(x) = \ln(u(x))$ اشتقاقياً على I ومشتقه $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1}{x \cdot \ln x \cdot \ln \ln x}$

② $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{\ln x}\right)$ و $I =]1, +\infty[$

التابع $u : x \mapsto \frac{x+1}{\ln x}$ موجب تماماً على I واشتقاقي عليه ومشتقه

$$u'(x) = \frac{x \ln x - x - 1}{x \ln^2 x}$$

فالتابع $f(x) = \ln(u(x))$ اشتقاقي على $I =]1, +\infty[$ ومشتقه

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{x \ln x - x - 1}{x \ln^2 x} \times \frac{\ln x}{x+1} \\ &= \frac{x \ln x - x - 1}{x(x+1) \ln x} \end{aligned}$$

ملاحظة. يمكن أيضاً أن نكتب f بالصيغة $f(x) = \ln(x+1) - \ln(\ln x)$. ثم نتابع الحل.



لنتعلم البحث معاً

10 حساب لوغاريتمي

نفترض وجود عددين حقيقيين موجبين تماماً a و b يحقّان

$$(1) \quad \ln\left(\frac{a+b}{3}\right) = \frac{\ln a + \ln b}{2}$$

احسب $\frac{a}{b}$.

نحو الحل

يؤكد النص على وجود عددين a و b يحققان العلاقة (1) (وليس مطلوباً حسابهما). بل حساب قيمة $\frac{a}{b}$. علينا إذن استبعاد اللوغاريتمات من العلاقة، ولهذا سنسعى للوصول إلى علاقة من

النمط $\ln A = \ln B$ ، ومن ثم نستنتج أن $A = B$.

$$1. \text{ أثبت أن } \frac{1}{2}(\ln a + \ln b) = \ln \sqrt{ab}$$

$$2. \text{ استنتج أن } a + b = 3\sqrt{ab}، \text{ ومن ثم } a^2 + b^2 - 7ab = 0 \text{ (2).}$$

لاستنتاج قيمة $\frac{a}{b}$ ، يمكننا التفكير بالآتي:

■ القول إن a حل للمعادلة $x^2 - 7bx + b^2 = 0$ مما يسمح بحساب a بدلالة b . ثم استنتاج $\frac{a}{b}$ بالتقسيم على b .

■ تسمية النسبة المجهولة $k = \frac{a}{b}$ ، فيكون $a = bk$ والسعي للحصول على مساواة لا تحوي إلا k .

أثبت أن $k^2 - 7k + 1 = 0$ ثم أكمل (لا تتس أن $k > 0$).

أنجز الحل وكتبه بلغة سليمة.

الحل

$$1. \text{ لَمَا كان } a > 0 \text{ و } b > 0، \text{ كان } \frac{1}{2}(\ln a + \ln b) = \frac{1}{2}\ln(ab) = \ln \sqrt{ab}$$

$$2. \text{ العلاقة (1) تكافئ إذن } \ln \left(\frac{a+b}{3} \right) = \ln \sqrt{ab} \text{ أو } \frac{a+b}{3} = \sqrt{ab} \text{ وهي تكافئ بعد الإصلاح}$$

$$\text{والتربيع } (a+b)^2 = 9ab \text{ أو } a^2 - 7ab + b^2 = 0 \text{، وهي العلاقة (2).}$$

لكن $k = \frac{a}{b}$ النسبة المطلوبة. نستنتج من (2) بعد تعويض $a = kb$ أن $(k^2 - 7k + 1)b^2 = 0$

ولكن b لا يساوي الصفر إذن $k^2 - 7k + 1 = 0$. لهذه المعادلة جذران موجبان هما $\frac{7 - 3\sqrt{5}}{2}$

و $\frac{7 + 3\sqrt{5}}{2}$ ، وهما القيمتان الممكنتان للنسبة $k = a/b$.

11 حل جملة معادلتين

a عدد حقيقي موجب تماماً. حل في \mathbb{R}^2 جملة المعادلتين:

$$\begin{cases} xy = a^2 & (1) \\ (\ln x)^2 + (\ln y)^2 = \frac{5}{2}(\ln a)^2 & (2) \end{cases}$$

إذا كان (x, y) حلاً للجملة، كان $x > 0$ و $y > 0$. (لماذا؟). يمكننا التفكير كما في السابق بالسعي لاستبعاد اللوغاريتمات من المعادلة (2) وكتابها بالصيغة $\ln A = \ln B$ التي تقتضي $A = B$. عندها سنكون في مواجهة جملة معادلتين بالمجهولين x و y فقط. ولكن ليست هناك أية قاعدة تفيد في تبسيط $(\ln x)^2 + (\ln y)^2$ فهذه المحاولة عقيمة. يمكننا أيضاً التفكير بتعويض $y = \frac{a^2}{x}$ في المعادلة (2)، ولكن النتيجة ليست مشجعة.

لنفكر إذن بتحويل العلاقة (1) إلى العلاقة اللوغاريتمية $\ln xy = \ln a^2$ ، عندها سنحصل على جملة معادلتين بالمجهولين $\ln x$ و $\ln y$.

افترض أن (x, y) حل للجملة، ثم تحقق أن $\ln x + \ln y = 2 \ln a$.

نضع إذن $X = \ln x$ و $Y = \ln y$ ، ثم نحسب منهما x و y . كما نضع تبسيطاً للكتابة $\ln a = A$. (نذكر أن حل المعادلة $\ln t = T$ هو $t = e^T$).

1. أثبت، وفق تلك الإجراءات، أن $Y = 2A - X$ وأن $4X^2 - 8AX + 3A^2 = 0$.

2. استنتج أن X تقبل قيمتين $X_1 = \frac{A}{2}$ و $X_2 = \frac{3A}{2}$ ، ثم استنتج قيم Y الموافقة.

3. تحقق أن $(x = \sqrt{a}$ و $y = a\sqrt{a})$ أو $(x = a\sqrt{a}$ و $y = \sqrt{a})$.

وبالعكس تحقق أن كلا من $(x, y) = (a, a\sqrt{a})$ و $(x, y) = (a\sqrt{a}, a)$ هو حل للجملة المعطاة.

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة. 

الحل

لدينا $x > 0$ و $y > 0$. نظراً إلى وجود المقدارين $\ln x$ و $\ln y$ في المعادلة (2). بأخذ لوغاريتم طرفي المعادلة (1) نجد لها الصيغة المكافئة $\ln x + \ln y = 2 \ln a$.

نضع $X = \ln x$ و $Y = \ln y$ و $\ln a = A$ فنكون بهذا الترميز أمام الجملة:

$$\begin{cases} X + Y = 2A & \textcircled{1} \\ X^2 + Y^2 = \frac{5}{2}A^2 & \textcircled{2} \end{cases}$$

من المعادلة $\textcircled{1}$ نجد $Y = 2A - X$. نعوض في المعادلة $\textcircled{2}$ فنحصل على

$$X^2 + (2A - X)^2 = \frac{5}{2}A^2$$

$$\text{أو } 4X^2 - 8AX + 3A^2 = 0$$

نلاحظ أنّ $4X^2 - 8AX + 3A^2 = (2X - A)(2X - 3A)$ إذن تقبل الجملة المدروسة حلين هما

$$(X, Y) = \left(\frac{3A}{2}, \frac{A}{2} \right) \text{ و } (X, Y) = \left(\frac{A}{2}, \frac{3A}{2} \right)$$

وبالعودة إلى x و y نجد الحلين

$$(x, y) = (a\sqrt{a}, \sqrt{a}) \text{ و } (x, y) = (\sqrt{a}, a\sqrt{a})$$

12 مسألة وجود

أوجد عدنان موجبان تماماً ومختلفان يحققان (1) ؟ $\frac{\ln a}{\ln b} = \frac{a}{b}$

نحو الحل

الفكرة المفيدة في البحث عن عددين a و b ، تعتمد على تجميع كل ما يتعلّق بالعدد a من جهة وكل ما يتعلّق بالعدد b من جهة أخرى. نبحت إذن عن a و b ، بحيث $\frac{\ln a}{a} = \frac{\ln b}{b}$. هذا يوحي

إلينا أن ندرس التابع f المعرّف على المجال \mathbb{R}_+^* بالعلاقة $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. وتعود المسألة إلى

البحث عن عددين مختلفين a و b يحققان $f(a) = f(b)$.

1. ادرس تغيرات التابع f ونظّم جدولاً بها (النهايات عند طرفي مجموعة التعريف وجهة التغير).

2. ارسم الخط البياني للتابع f .

لندرس استناداً إلى جدول التغيرات أو بيانياً عدد حلول المعادلة $f(x) = m$. وذلك تبعاً لقيم m .

1. ناقش عدد حلول المعادلة $f(x) = m$ في حالة $m > 1/e$ ، $m = 1/e$ ، $0 < m < 1/e$ وأخيراً $m < 0$.

2. استنتج الشرط اللازم والكافي ليكون للمعادلة $f(x) = m$ حلان مختلفان.

3. استنتج أنّه أيّ كان m من $]0, 1/e[$ ، يوجد عدنان مختلفان a و b يحققان

$$f(a) = f(b) = m$$

أنجز الحلّ واكتبه بلغة سليمة.

الحل

المساواة (1) تكافئ $\frac{\ln a}{a} = \frac{\ln b}{b}$ ، يوحي لنا هذا بدراسة تغيرات التابع $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

• النهايات. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$. وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.


نستنتج أنّ المحورين الإحداثيين مستقيمان مقاربان للخط البياني للتابع.

• المشتق. $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. وينعدم f' عند $x = e$.

● جدول التغيرات.

x	0	1	e	$+\infty$			
$f'(x)$		+	+	0	-		
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	0	\nearrow	e^{-1}	\searrow	0

● الخط البياني.



✂ لنرمز بالرمز $S(m)$ إلى مجموعة حلول المعادلة $f(x) = m$. نستنتج من الرسم البياني للتابع f ما يأتي:

① في حالة $m > \frac{1}{e}$ لدينا $S(m) = \emptyset$ ، فعدد الحلول في هذه الحالة يساوي الصفر.

② في حالة $m = \frac{1}{e}$ لدينا $S(m) = \{e\}$ فعدد الحلول في هذه الحالة يساوي الواحد.

③ في حالة $0 < m < \frac{1}{e}$ $S(m) = \{a, b\}$ حيث رمزنا بالرمز a إلى الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = m$ الذي ينتمي إلى المجال $]0, e[$ وبالرمز b إلى الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = m$ الذي ينتمي إلى المجال $]e, +\infty[$. فعدد الحلول في هذه الحالة يساوي اثنين.

④ في حالة $m \leq 0$ ، $S(m) = \{a\}$ حيث رمزنا بالرمز a إلى الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = m$ الذي ينتمي إلى المجال $]0, e[$. فعدد الحلول في هذه الحالة يساوي الواحد.

نستنتج أن الشرط اللازم والكافي ليكون للمعادلة $f(x) = m$ حلان مختلفان هو $0 < m < \frac{1}{e}$.

نستنتج أنه أياً كان m من $]0, 1/e[$ ، فيوجد عدنان مختلفان a و b يحققان $f(a) = f(b) = m$.

13 إثبات متراجحة

أثبت أن المتراجحة $\ln(x) \cdot \ln(1-x) \leq (\ln 2)^2$ محققة، أيّاً يكن x من $]0, 1[$.

نحو الحل

توحي إلينا المتراجحة $\ln x \ln(1-x) \leq (\ln 2)^2$ أن ندرس التابع f المعرّف على $]0, 1[$ بالعلاقة $f(x) = \ln(x) \cdot \ln(1-x)$. أثبت أن إشارة $f'(x)$ تماثل إشارة $(1-x) \ln(1-x) - x \ln x$ على المجال $]0, 1[$.

✎ لندرس إذن التابع $g(x) = (1-x)\ln(1-x) - x\ln x$ على $]0,1[$.

1. احسب $g'(x)$ واستنتج إشارة g على كل من $]0, \frac{1}{2}[$ و $]\frac{1}{2}, 1[$.

2. استنتج دراسة تغيرات التابع f ، وأثبت المتراجحة المطلوبة.

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة.



✎ في أغلب الحالات يؤول إثبات متراجحة إلى دراسة تغيرات تابع. لندرس التابع f المعرف على

المجال $]0,1[$ وفق $f(x) = \ln x \ln(1-x)$.

■ نلاحظ أولاً أنّ الخط البياني للتابع f متناظر بالنسبة إلى المستقيم Δ الذي معادلته $x = \frac{1}{2}$ ، والنقطة

$\frac{1}{2}$ هي منتصف المجال $]0,1[$ ، ومهما تكن x من $]0,1[$ يكن

$$f(1-x) = \ln(1-x)\ln x = \ln x \ln(1-x) = f(x)$$

إذن يكفي أن ندرس اطراد التابع f عندما تتحول قيم x في المجال $]0, \frac{1}{2}[$.

■ لدراسة اطراد التابع f على المجال $]0, \frac{1}{2}[$ نحسب المشتق فنجد:

$$f'(x) = \frac{1}{x}\ln(1-x) + \ln x \times \frac{-1}{1-x} = \frac{(1-x)\ln(1-x) - x\ln x}{x(1-x)}$$

المقام موجب تماماً على مجال الدراسة، إذن إشارة $f'(x)$ تتفق مع إشارة $g(x)$ حيث g هو التابع

المعرف على $]0, \frac{1}{2}[$ بالعلاقة $g(x) = (1-x)\ln(1-x) - x\ln x$.

✎ دراسة إشارة $g(x)$.

1. نلاحظ أنّ إشارة g على $]0, \frac{1}{2}[$ ليست واضحة، فعلياً إذن دراسة التابع g لتعيينها. ولكن نلاحظ أنّ

g اشتقاقي على $]0, \frac{1}{2}[$ وأن:

$$g'(x) = -2 - \ln(1-x) - \ln x = -\ln(e^2x(1-x))$$

التابع g' يندم مرة واحدة في المجال $]0, \frac{1}{2}[$ عند ما $e^2x(x-1) = 1$ أي عند

$$x = \alpha = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{1 - e^{-2}}\right)$$

وعليه يمكننا أن ننشئ جدول تغيرات g كما يأتي

x	0	α	$\frac{1}{2}$
$g'(x)$		+	-
$g(x)$	0	↗ $g(\alpha)$	↘ 0

إذ استفدنا من كون $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ لنستنتج أنّ $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$. النتيجة المهمة هي أنّ g موجب

تماماً على المجال $]0, \frac{1}{2}[$ ، أي إنّ $f'(x) = \frac{1}{x(1-x)}g(x)$ موجب تماماً على $]0, \frac{1}{2}[$ ، فالتابع f متزايداً

على المجال $]0, \frac{1}{2}]$. وبسبب تناظر الخط البياني للتابع f بالنسبة إلى المستقيم $x = \frac{1}{2}$ نستنتج أنّ f متناقص تماماً على $] \frac{1}{2}, 1[$ ، وأخيراً نلاحظ أنّ في حالة $x \in]0, 1[$ لدينا

$$f(x) = -\frac{\ln(1-x)}{-x} \times x \ln x$$

ولكن

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{-x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$$

إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ، وبسبب التناظر لدينا أيضاً $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ ، ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f

x	0	$\frac{1}{2}$	1
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	0	$\nearrow \ln^2 2$	$\searrow 0$

ومنه

$$\forall x \in]0, 1[, \ln x \cdot \ln(1-x) \leq (\ln 2)^2$$

وهي المتراحة المطلوبة.



قُدماً إلى الأمام

14 حل كلاً من المعادلتين الآتيتين:

$$\ln|x+2| + \ln|x-2| = 0 \quad \textcircled{1}$$

$$\ln|x-2| + \ln(x+4) = 3 \ln 2 \quad \textcircled{2}$$

$$\ln|2x+3| + \ln|x-1| = 2 \ln|x| \quad \textcircled{3}$$

الحل

$$\ln|x+2| + \ln|x-2| = 0 \quad \textcircled{1}$$

المعادلة معرّفة على $I = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. وهي تكافئ $|x-2||x+2| = 1$ أو $|x^2 - 4| = 1$. فإمّا

أن يكون $x^2 = 5$ أو يكون $x^2 = 3$. فمجموعة حلول المعادلة المعطاة هي

$$S = \{-\sqrt{5}, -\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{5}\}$$

$$\ln|x-2| + \ln(x+4) = 3 \ln 2 \quad \textcircled{2}$$

المعادلة معرّفة على $I =]-4, 2[\cup]2, +\infty[$. وهي تكافئ على هذه المجموعة

$$|x-2|(x+4) = 8$$

- فإما أن يكون $x > 2$ و $x^2 + 2x - 16 = 0$ ، ومنه $x = \sqrt{17} - 1$ (الجزر الآخر مرفوض لأنه سالب ولا يحقق $x > 2$).
 - أو يكون $x < 2$ و $x^2 + 2x = 0$ ، ومنه $x = 0$ و $x = -2$.
- نستنتج أن مجموعة حلول ② هي $\{-2, 0, \sqrt{17} - 1\}$.

$$\ln|2x + 3| + \ln|x - 1| = 2\ln|x| \quad ③$$

مجموعة المعادلة ③ هي $I = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{2}, 0, 1\}$. وهي تكافئ عندئذ $|2x^2 + x - 3| = x^2$

- فإما أن يكون $x^2 + x - 3 = 0$ ، ومنه $x \in \left\{ \frac{-1 + \sqrt{13}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \right\}$

- أو يكون $3x^2 + x - 3 = 0$ ، ومنه $x \in \left\{ \frac{-1 + \sqrt{37}}{6}, \frac{-1 - \sqrt{37}}{6} \right\}$

نستنتج أن مجموعة حلول ③ هي

$$\left\{ \frac{-1 + \sqrt{37}}{6}, \frac{-1 - \sqrt{37}}{6}, \frac{-1 + \sqrt{13}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \right\}$$

15 في كل حالة آتية، جد الحل المشترك لجملة المعادلتين.

$$\begin{cases} (\ln x)(\ln y) = -12 \\ \ln(xy) = 1 \end{cases} \quad ③ \quad \begin{cases} 2\ln x + \ln y = 7 \\ 3\ln x - 5\ln y = 4 \end{cases} \quad ② \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ \ln x + \ln y = \ln 3 \end{cases} \quad ①$$

الحل

① هنا الجملة تكافئ $x > 0$ و $x^2 + y^2 = 10$ و $xy = 3$. إذن العدان x و y موجبان ومربع مجموعهما يساوي $(x + y)^2 = 10 + 2xy = 10 + 6 = 16$. إذن $x + y = 4$ و $xy = 3$. فالعدان x و y هما جذرا المعادلة $T^2 - 4T + 3 = 0$. فمجموعة حلول ① هي $\{(1, 3), (3, 1)\}$.

② نضع $\ln x = a$ و $\ln y = b$ فنحصل على الجملة $\begin{cases} 2a + b = 7 \\ 3a - 5b = 4 \end{cases}$ وبحل جملة هاتين المعادلتين

نجد $(a, b) = (3, 1)$ ومنه $(x, y) = (e^3, e)$ ، وهو الحل المطلوب.

③ نضع مجدداً $\ln x = a$ و $\ln y = b$ فنحصل على الجملة $\begin{cases} ab = -12 \\ a + b = 1 \end{cases}$ إذن a و b هما جذرا

المعادلة $T^2 - T - 12 = 0$ أو $(T - 4)(T + 3) = 0$. إذن $(a, b) \in \{(4, -3), (-3, 4)\}$ ومنه $(x, y) \in \{(e^4, e^{-3}), (e^{-3}, e^4)\}$ وهو الحل المطلوب.

16 حلّ كلاً من المعادلة $(\ln x)^2 - 2\ln x - 3 = 0$ ، والمتراجحة $(\ln x)^2 - 2\ln x - 3 \geq 0$.

مساعدة: ضع $X = \ln x$.

الحل

نضع $X = \ln x$ فتصبح

- المعادلة $X^2 - 2X - 3 = 0$ أو $(X - 3)(X + 1) = 0$. إذن $X \in \{-1, 3\}$ ومنه $x \in \{e^{-1}, e^3\}$.
- تصبح المتراجحة $X^2 - 2X - 3 \geq 0$ أي $X \in]-\infty, -1] \cup [3, +\infty[$ ، ومنه $x \in]0, \frac{1}{e}] \cup [e^3, +\infty[$.

ليكن $P(x) = 2x^3 + 5x^2 + x - 2$ **17**

① a . تحقق أن $P(-1) = 0$.

b . استنتج أن $P(x)$ يكتب بالصيغة $P(x) = (x + 1)Q(x)$ حيث $Q(x)$ كثير حدود من الدرجة الثانية.

c . حل المتراجحة $P(x) \leq 0$.

② استعمل المعلومات السابقة لحل المتراجحة $2 \ln x + \ln(2x + 5) \leq \ln(2 - x)$

الحل

① a . هذا تعويض مباشر.

b . لما كان $P(-1) = 0$ استنتجنا أن $P(x)$ يقبل القسمة الإقليدية على $x + 1$ ويكون $Q(x)$ خارج هذه القسمة. وبإجراء القسمة نجد $Q(x) = 2x^2 + 3x - 2$ ، أي $P(x) = (x + 1)(2x^2 + 3x - 2)$.
 c . بملاحظة أن $Q(x) = (x + 2)(2x - 1)$ ، نستنتج أن $P(x) = (x + 1)(x + 2)(2x - 1)$. وهذا يتيح لنا وضع جدول إشارة $P(x)$ كما يأتي :

x	$-\infty$	-2	-1	$1/2$	$+\infty$			
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

ومن ثم نستنتج أن مجموعة حلول المتراجحة $P(x) \leq 0$ هي $]-\infty, -2] \cup [-1, \frac{1}{2}]$.

② المتراجحة $2 \ln x + \ln(2x + 5) \leq \ln(2 - x)$

تُكافئ المتراجحة المعطاة تحقق الشروط

كافئ المتراجحة المعطاة تحقق الشروط

$$\ln(x^2(2x + 5)) \leq \ln(2 - x) \text{ و } 2x + 5 > 0 \text{ و } x > 0$$

أو

$$x^2(2x + 5) \leq 2 - x \text{ و } x > 0$$

وأخيراً

$$P(x) \leq 0 \text{ و } x > 0$$

واستناداً إلى دراستنا السابقة مجموعة الحلول المشتركة لهاتين المتراجحتين هي $]0, \frac{1}{2}]$.

ليكن f التابع المعرف على المجال $I =]-1,1[$ وفق $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{1-x}\right)$.

- ① أثبت أن f تابع فردي.
- ② a . أثبت أن f اشتقاقي على I .
- b . ادرس تغيرات f على المجال $]0,1[$.
- ③ ارسم الخط البياني للتابع f .

الحل

① مجال التعريف $I =]-1,1[$ متناظر بالنسبة إلى الصفر. وفي حالة x من I لدينا

$$f(-x) = \ln\left(\frac{-x+1}{1+x}\right) = -\ln\left(\frac{x+1}{1-x}\right) = -f(x)$$

فالتابع f فردي.

② a . التابع $u : x \mapsto \frac{x+1}{1-x}$ موجب تماماً واشتقاقي على I ، إذن $x \mapsto f(x) = \ln(u(x))$

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{1-x^2}$$

ولدينا $f'(x) > 0$ على I .

b . من الواضح أن $f(0) = 0$ و $f(x)$ يكتب على I بالصيغة المكافئة

$$f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$$

ولكن $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1-x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln t = -\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$. فالمستقيم d_1 الذي معادلته


$x = 1$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f . وكذلك، من صيغة $f'(x)$ ، نرى أن f متزايد تماماً

على المجال $]0,1[$ ، فللتابع f جدول التغيرات الآتي على $]0,1[$:

جدول بتغيرات f :

x	0	1
$f'(x)$	2	+
$f(x)$	0	$\nearrow +\infty$

③ الخط البياني للتابع f .



المطلوب هو رسم الخط البياني للتابع f على مجموعة تعريفه I ،

وليكن هذا الخط C . لكننا درسنا التابع على المجال $I_1 =]0,1[$ ،

فلنرسم الخط البياني C_1 للتابع f على المجال I_1 منطلقاً من المبدأ

O ومتفقاً مع تزايد التابع ليقارب المستقيم d_1 . ولما كان التابع f

فردياً، كان خطه البياني C متناظراً بالنسبة إلى مبدأ الإحداثيات.

فلنرسم C يكفي أن نرسم C_2 ، نظير C_1 بالنسبة إلى المبدأ O ، فيكون $C = C_1 \cup C_2$.

ادرس في كل حالة مما يأتي تغيرات التابع f على المجال I ، وارسم خطه البياني C .

$$I =]1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x} \quad \textcircled{1}$$


$$I = \mathbb{R}, \quad f(x) = \ln(1 + x^2) \quad \textcircled{2}$$

$$I =]0, +\infty[, \quad f(x) = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \quad \textcircled{3}$$

الحل

$$\textcircled{1} \text{ التابع } x \mapsto f(x) = \frac{1}{x \ln x} \text{ على } I =]1, +\infty[.$$

- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ ، إذن المستقيم d الذي معادلته $x = 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C .
- و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، إذن محور الفواصل مستقيم مقارب للخط C .



- التابعان $x \mapsto x$ و $x \mapsto \ln x$ موجبان ومتزايدان تماماً على I ، إذن كذلك يكون جداء ضربهما $x \mapsto x \ln x$ و هذا يقتضي أنّ f تابع متناقص تماماً على I . ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f :


x	1	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	0

الخط البياني للتابع f مبين جانباً.

$$\textcircled{2} \text{ التابع } x \mapsto f(x) = \ln(1 + x^2) \text{ على } I = \mathbb{R}.$$

- التابع f تابع زوجي، لأنه معرف على كامل \mathbb{R} ويحقق $f(-x) = f(x)$ أيًا كانت x .
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $f(0) = 0$.

- التابع $x \mapsto 1 + x^2$ متزايد تماماً على $[0, +\infty[$ ويأخذ قيمه في $[1, +\infty[$ ، والتابع $x \mapsto \ln x$ متزايد تماماً على $[1, +\infty[$ ، إذن f تابع متزايد تماماً على $[0, +\infty[$. ولأنّ f زوجي استنتجنا جدول التغيرات الآتي للتابع f :



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$


الخط البياني للتابع f مبين جانباً.

- لم نحسب المشتق لدراسة التغيرات، ولكن من المفيد ملاحظة أن كون f اشتقاقياً في المبدأ، وكون التابع زوجياً يجعلان المماس للخط البياني في المبدأ أفقياً. هذه الملاحظة تفيد في جعل الرسم أكثر دقة.

③ التابع $f(x) = \ln\left(\frac{x}{1+x}\right)$ على $I =]0, +\infty[$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 1 = 0$ ، إذن نستنتج أنّ المستقيم الذي معادلته $y = 1$ مستقيم مقارب للخط C .

وكذلك فإن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ ، فمحور الترتيب مستقيم مقارب للخط C .



• التابع $x \mapsto \frac{x}{1+x}$ متزايد تماماً على I وبأخذ قيمه في

$]0, 1[$ ، والتابع $x \mapsto \ln x$ متزايد تماماً على $]0, 1[$ إذن تابع f متزايد تماماً على I . ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	0

الخط البياني للتابع f مبين جانباً.

20 في معلم متجانس، C_f و C_g هما على التوالي الخطان البيانيان للتابعين f و g المعرفين على

المجال $I =]-1, +\infty[$ وفق $f(x) = \ln(x+1)$ و $g(x) = \frac{x}{x+1}$

① أثبت أنّ $g(x) \leq f(x)$ أيّاً يكن x من I .

② أثبت أنّ C_f و C_g يقبلان مماساً مشتركاً في النقطة التي فاصلتها $x = 0$.

③ ادرس تغيرات كل من f و g وارسم الخطين C_f و C_g مستقيماً من رسم المماس المشترك.

الحل

① نتأمل التابع h المعرف على I بالصيغة $h(x) = f(x) - g(x)$. نلاحظ أنّ اشتقائي على I

وأنّ $h'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}$. إذن للتابع h جدول الاطراد الآتي

x	-1	0	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$		0	


ومنه نستنتج أنّ $h(x) \geq h(0) = 0$ أيّاً كانت x من I . إذن $f(x) \geq g(x)$ أيّاً يكن x من I .

② باستعمال ترميز السؤال السابق نلاحظ أنّ $h(0) = h'(0) = 0$ هذا يبرهن أنّ $f(0) = g(0) = b$

و $f'(0) = g'(0) = a$ ، ومن ثمّ فالمستقيم الذي معادلته $y = ax + b = x$ هو مماس مشترك للخطين

البيانيين C_f و C_g في المبدأ.

③ تغيرات f . التابع f تابع متزايد تماماً على I ويسعى إلى اللانهاية عند $+\infty$ وإلى $-\infty$ عند -1 فالمستقيم الذي معادلته $x = -1$ مستقيم مقارب للخط C_f . ومنه جدول التغيرات الآتي:



x	-1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

تغيرات g . التابع g تابع متزايد تماماً (مشتقه موجب) على I ويسعى إلى 1 عند $+\infty$ ، فالمستقيم $y = 1$ مستقيم مقارب للخط C_g ، وإلى $-\infty$ عند -1 فالمستقيم الذي معادلته $x = -1$ مستقيم مقارب للخط C_g . ومنه جدول التغيرات الآتي

x	-1	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	1

الرسم مبين في الشكل المجاور.

21 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على المجال $I =]1, +\infty[$ وفق

$$f(x) = x + 1 + 2 \ln \left(\frac{x}{x-1} \right)$$

- ① ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.
- ② أثبت أن المستقيم d الذي معادلته $y = x + 1$ مقارب للخط C في جوار $+\infty$.
- ③ ادرس الوضع النسبي للخط البياني C ومقاربه d .
- ④ ارسم في معلم واحد المستقيم d ثم الخط البياني C .

الحل

① لما كان $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln \left(\frac{x}{x-1} \right) = +\infty$ ، كان $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ فالمستقيم Δ

الذي معادلته $x = 1$ مقارب شاقولي للخط C باتجاه الترتيب الموجبة. وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty$

$$\text{و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x}{x-1} \right) = 0 \text{، إذن } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

يُكتب f على مجموعة تعريفه بالصيغة المكافئة: $f(x) = x + 1 + 2 \ln x - 2 \ln(x-1)$ مما يسهل عملية اشتقاقه لنجد

$$f'(x) = 1 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x-1} = \frac{x^2 - x - 2}{x(x-1)} = \frac{x+1}{\underbrace{x(x-1)}_{>0}} (x-2)$$

إشارة $f'(x)$ تماثل إشارة $(x-2)$ ، لأن الكسر موجب تماماً على المجال I .


ومنه جدول التغيرات الآتي.

x	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	\searrow $3+2\ln 2$ ≈ 4.4	\nearrow $+\infty$

② لننأمل

$$h(x) = f(x) - (x + 1) = 2 \ln \left(\frac{x}{x-1} \right)$$

لما كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x}{x-1} \right) = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ ، فالمستقيم d الذي معادلته



$y = x + 1$ مقارب للخط C في جوار $+\infty$.

③ وكذلك، لأن $\frac{x}{x-1} > 1$ في حالة x من I

استنتجنا أن $h(x) > \ln 1 = 0$ على I والخط البياني C يقع دوماً فوق المقارب d .

④ نرسم C مقارباً Δ باتجاه الترتيب الموجبة منقفاً مع تناقص التابع حتى النقطة $M(2, f(2))$ ، ومن ثم نرسمه مقارباً d في

جوار $+\infty$ ومنقفاً مع تزايد التابع.

②② ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على المجال $I =]0, +\infty[$ وفق

$$f(x) = x - 4 + \ln \left(\frac{x}{x+1} \right)$$

① أثبت أن f متزايد تماماً على I .

② أثبت أن المستقيم d الذي معادلته $y = x - 4$ مقارب للخط C في جوار $+\infty$.

③ ادرس الوضع النسبي للخط البياني C ومقاربه d .

④ ارسم في معلم واحد المستقيم d ثم الخط البياني C .

الحل

① التابع $x \mapsto \frac{x}{x+1}$ موجب و متزايد تماماً على I (لأن مشتقه $x \mapsto \frac{1}{(x+1)^2}$ موجب تماماً)،

وعليه يكون $x \mapsto \ln \frac{x}{x+1}$ متزايداً على I ، لأنه تركيب تابعين متزايدين تماماً، وكذلك فإن


$x \mapsto x - 4$ تابع متزايد تماماً على I . نستنتج إذن أن التابع f متزايد تماماً.

② لتأمل

$$h(x) = f(x) - (x - 4) = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$$

لما كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = \ln 1 = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ ، فالمستقيم d الذي معادلته $y = x - 4$ مقارب للخط C في جوار $+\infty$.

③ وكذلك، لأن $\frac{x}{x+1} < 1$ في حالة x من I استنتجنا أن $h(x) < \ln 1 = 0$ على I والخط البياني C يقع دوماً تحت المقارب d .



④ لإنجاز الرسم يلزمنا استكمال جدول تغيرات f بحساب نهاية التابع عند طرفي مجموعة تعريفه. لما كان للتابع f مقارب مائل

في جوار $+\infty$ معادلته $y = x - 4$ استنتجنا أن

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x - 4) = +\infty$$

ومن جهة أخرى يُكتب f على I بالصيغة المكافئة :

$$f(x) = x - 4 - \ln(1 + x) + \ln x$$

إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ لأن

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x - 4 - \ln(1 + x)) = -4 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$$

ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

ومنه الرسم المبين في الشكل المجاور .

23 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على المجال $I =]0, +\infty[$ وفق

$$f(x) = x - \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$$

① ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها .

② أثبت أن المستقيم d الذي معادلته $y = x - \ln 2$ مقارب للخط C في جوار $+\infty$.

③ ادرس الوضع النسبي للخط البياني C ومقاربه d .

④ أثبت أن للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد α ينتمي إلى المجال $]1, 2[$.

⑤ ارسم في معلم واحد المستقيم d ثم الخط البياني C .

① $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} (2 + \frac{1}{x}) = +\infty$ و $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$. نستنتج أن محور

التراتب مستقيم مقارب للخط C . وكذلك فإن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(2 + \frac{1}{x}) = \ln 2$.

التابع $x \mapsto \frac{1}{x}$ متناقص تماماً على I ، ومن اطراد التابع اللوغاريتمي نستنتج أن $x \mapsto \ln(2 + \frac{1}{x})$ متناقص تماماً، وعليه يكون f مجموع تابعين متزايدين تماماً هما $x \mapsto -\ln(2 + \frac{1}{x})$ و $x \mapsto x$ ، فهو إذن تابع متزايد تماماً على I . ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f .

x	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

② لنأمل

$$h(x) = f(x) - (x - \ln 2)$$

$$= \ln 2 - \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) = -\ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right)$$

لما كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) = \ln 1 = 0$ استنتجنا أن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$$

فالمستقيم d الذي معادلته $y = x - \ln 2$ مستقيم مقارب للخط C في جوار $+\infty$.

③ وكذلك لأن $1 + \frac{1}{2x} > 1$ في حالة x من I استنتجنا أن

$$h(x) < 0 \text{ على } I \text{ والخط البياني } C \text{ يقع دوماً تحت } d.$$

④ التابع f تابع مستمر ومطرد تماماً على مجموعة تعريفه، وهو يغير إشارته عليها فللمعادلة

$$f(x) = 0 \text{ حل وحيد } \alpha \text{ في } I \text{ وعلاوة على ذلك}$$

$$f(2) = 2 - \ln 2.5 > 2 - \ln e > 0 \text{ و } f(1) = 1 - \ln 3 < 1 - \ln e = 0$$

إذن $\alpha \in]1, 2[$.

⑤ الرسم مبين في الشكل المجاور.

24 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على المجال $I =]4, +\infty[$ وفق

$$f(x) = 5 - 2x + 3 \ln\left(\frac{x+1}{x-4}\right)$$

① أثبت أن المستقيم d الذي معادلته $y = 5 - 2x$ مقارب للخط C .

② ادرس الوضع النسبي للخط C ومقاربه d .

③ ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها. ثم ارسم في معلم واحد المستقيم d ثم الخط البياني C .

④ أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α ، واحصره في مجال طوله يساوي 1.

$$h(x) = f(x) - (5 - 2x) = 3 \ln \left(\frac{x+1}{x-4} \right) = 3 \ln \left(1 + \frac{5}{x-4} \right) \quad \text{① لتأمل :}$$

لما كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{5}{x-4} \right) = \ln 1 = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ ، فالمستقيم d الذي معادلته $y = 5 - 2x$ يقارب للخط C في جوار $+\infty$.

② وكذلك لأن $1 + \frac{5}{x-4} > 1$ في حالة x من I استنتجنا أن $h(x) > 0$ على I والخط البياني C يقع دوماً فوق المقارب d .

③ لما كان $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x+1}{x-4} = +\infty$ و $\lim_{X \rightarrow \infty} \ln X = +\infty$ ، استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty$ ، فالمستقيم Δ الموازي لمحور الترتيب والذي معادلته $x = 4$ يقارب لخط C .


ولما كان $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{x+1}{x-4} \right) = \ln 1 = 0$ ، و $\lim_{x \rightarrow \infty} (5 - 2x) = -\infty$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$.

لحساب $f'(x)$ ، نلاحظ أن $f(x) = 5 - 2x + 3(\ln(x+1) - \ln(x-4))$ ، فيكون :

$$f'(x) = -2 + \frac{3}{x+1} - \frac{3}{x-4} = -2 - \frac{15}{(x+1)(x-4)} < 0$$

فالتابع f متناقص تماماً وله جدول التغيرات الآتي :

x	4	$+\infty$
$f'(x)$		-
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$



④ نجد في جدول تغيرات f أن مجموعة قيم التابع f هي \mathbb{R} ، والتابع متناقص تماماً فللمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد وليكن α ينتمي إلى المجال I . نحسب

$$f(5) = 3 \ln 6 - 5 \approx 0.375$$

$$f(6) = 3 \ln \frac{7}{2} - 7 \approx -3.34$$

إذن $5 < \alpha < 6$.

25 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على المجال $I =]1, +\infty[$ وفق

$$f(x) = x + \ln(x^2 - 1)$$

① أثبت أن f متزايد تماماً على I .

② أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α .

③ أثبت أن $1 < \alpha < \sqrt{1 + e^{-1}}$.

الحل

- ① التابع $x \mapsto x^2 - 1$ موجبٌ تماماً ومتزايدٌ تماماً على I ، وعليه يكون التابع $x \mapsto \ln(x^2 - 1)$ متزايداً تماماً على I وعليه يكون f متزايداً تماماً على I بصفته مجموع تابعين متزايدين تماماً.
- ② لما كان $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ استنتجنا أن $f(I) =]-\infty, +\infty[$ ، فللمعادلة $f(x) = 0$ حلٌ وحيدٌ α ينتمي إلى I .

③ المتراجحة الأولى أي $\alpha > 1$ واضحة لأن $\alpha \in I$. لإثبات المتراجحة الثانية نحسب :

$$f(\sqrt{1+e^{-1}}) = \sqrt{1+e^{-1}} + \ln e^{-1} = \sqrt{1+e^{-1}} - 1 = \frac{e^{-1}}{\sqrt{1+e^{-1}} + 1} > 0$$

هذا يبرهن على أن $\alpha < \sqrt{1+e^{-1}}$ (لأنه لو افترضنا أن $\alpha \geq \sqrt{1+e^{-1}}$ لنتج من تزايد التابع f أن $0 = f(\alpha) \geq f(\sqrt{1+e^{-1}}) > 0$ وهذا تناقض). فنكون قد أثبتنا المتراجحة المطلوبة.

26 ليكن C الخط البياني للتابع f المعطى وفق : $f(x) = \ln\left(\frac{2x}{x-1}\right)$

① تحقق أن مجموعة تعريف f ولتكن D_f هي $]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$.

② احسب نهاية f عند كل طرف من أطراف مجموعة تعريفه D_f .

③ أثبت أن f متناقص تماماً على كل من مجالي D_f .

④ ارسم في معلم متجانس الخط البياني C .

الحل

① التابع f عندما يكون $\frac{2x}{x-1} > 0$ وهذا يكافئ قولنا $x(x-1) > 0$ ومجموعة حلول هذه المتراجحة

هي خارج المجال $[0, 1]$. إذن $D_f =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$.

② حساب النهايات.

■ لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x-1} = 2$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 2$. نستنتج أن

المستقيم d_1 الموازي لمحور الفواصل والذي معادلته $y = \ln 2$ مقارب للخط C .


■ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x}{x-1} = 0$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$. نستنتج أن محور الترتيب مستقيم مقارب للخط C .

■ وأخيراً $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x}{x-1} = +\infty$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$. نستنتج أن المستقيم d_2 الموازي لمحور

الترتيب والذي معادلته $x = 1$ مستقيم مقارب للخط C .

③ دراسة اطراد f . نلاحظ أن : $f'(x) = \frac{x-1}{2x} \left(\frac{2x}{x-1} \right)' = \frac{x-1}{2x} \cdot \frac{-2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{x(x-1)} < 0$

فالتابع f متناقص تماماً على كل من مجالي D_f .



④ لرسم الخط البياني C ، ننظم الجدول الآتي بتغيرات f :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$				
$f(x)$	$\ln 2$	\searrow	$-\infty$	$+\infty$
				\searrow
				$\ln 2$

ونجد في الشكل المجاور الخط البياني للتابع f .

27 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف بالعلاقة $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{3-x}\right)$.

- ① تحقق أن مجموعة تعريف f ولتكن D_f هي $]1, 3[$.
- ② أثبت أن $(4-x) \in D_f$ ، أيًا يكن $x \in D_f$.
- ③ a . احسب عند كل x من D_f المقدار $f(4-x) + f(x)$.
- ④ b . استنتج أن النقطة $A(2, 0)$ هي مركز تناظر للخط C .
- ④ احسب نهاية f عند كل طرف من أطراف مجموعة تعريفه D_f .
- ⑤ ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها.
- ⑥ ارسم الخط C في معلم متجانس.

الحل

- ① التابع f عندما يكون $\frac{x-1}{3-x} > 0$ وهذا يكافئ قولنا $(x-3)(x-1) < 0$. ومجموعة حلول هذه المتراجحة هي المجال $]1, 3[$. إذن $D_f =]1, 3[$.
- ② التابع $x \mapsto s(x) = 4-x$ تابع متناقص تماماً ومنه $]1, 3[=]s(3), s(1)[= s(]1, 3[)$ أي إذا كان $x \in D_f$ ، كان $s(x) = (4-x) \in D_f$.
- ③ a

$$\begin{aligned} f(4-x) + f(x) &= \ln\left(\frac{4-x-1}{3-4+x}\right) + \ln\left(\frac{x-1}{3-x}\right) \\ &= \ln\left(\frac{3-x}{x-1}\right) + \ln\left(\frac{x-1}{3-x}\right) \\ &= \ln\left(\frac{3-x}{x-1} \times \frac{x-1}{3-x}\right) = \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

b . تكون نقطة $A(x_0, y_0)$ مركز تناظر الخط البياني لتابع f ، إذا تحقق الشرطان:

- ① $x_0 = 2$. هذا الشرط محقق حيث $x \in D_f \Rightarrow 2x_0 - x \in D_f$
- ② $y_0 = 0$. هذا الشرط محقق أيضاً حيث $f(2x_0 - x) = 2y_0 - f(x)$

وبتحقيق f لهذين الشرطين تكون النقطة $A(2,0)$ مركز تناظر للخط C .

④ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{X \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{3-x} = 0$. نستنتج أن المستقيم d_1 الموازي لمحور


التراتب، والذي معادلته $x = 1$ مستقيم مقارب للخط C .

وكذلك فإن $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-1}{3-x} = +\infty$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty$. نستنتج أن المستقيم d_2 الموازي لمحور

التراتب، والذي معادلته $x = 3$ مقارب للخط C .

⑤ دراسة تغيرات f :

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{x-1}{3-x}\right)'}{\frac{x-1}{3-x}} = \frac{2}{(3-x)^2} \times \frac{3-x}{x-1} = \frac{2}{(x-1)(3-x)}$$



إشارة $(x-1)(3-x)$ موجبة تماماً على D_f . فالتابع f متزايد تماماً على D_f . ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	1	3
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

⑥ الرسم المجاور يبين الخط البياني للتابع f . ولقد وضعنا عليه المقاربين ومركز التناظر.

②⑧ ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على المجال \mathbb{R}_+^* وفق

$$f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$$

① احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. ما مقاربات الخط C ؟

② ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها، ثم ارسم الخط C .

الحل

① حساب نهايتي f المطلوبتين . لدينا

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x} = 1$$


إذن $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. نستنتج أن محور الترتيب مستقيم مقارب للخط C .

وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. نستنتج أن محور الفواصل مستقيم مقارب للخط C .

② نلاحظ أنّ

$$f'(x) = \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} + \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{x(1+x)} = \frac{-1}{x(1+x)^2}$$

نستنتج أنّ $f'(x)$ سالب تماماً على \mathbb{R}_+^* .



وبناءً عليه ننظم الجدول الآتي بتغيرات التابع f :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		-
$f(x)$	$+\infty$	↘ 0

الرسم المجاور يبين الخط البياني للتابع f .

29 في كلٍ من الحالتين الآتيتين، ادرس التابع f على $I = \mathbb{R}_+^*$ ، وارسم خطه البياني \mathcal{C} .

① $f(x) = (x+1)\ln x$

② $f(x) = \frac{1}{x} + x \ln x$

الحل

① دراسة $f(x) = (x+1)\ln x$ على \mathbb{R}_+^* .


• $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \times (-\infty) = -\infty$. نستنتج أنّ محور الترتيب مستقيم مقارب للخط \mathcal{C} .

وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

• وعلى I لدينا $f'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{x}$ إشارة f' غير واضحة لذلك نسعى إلى دراسة اطراد

المشتق، فنحسب $f''(x) = \frac{x-1}{x^2}$ ، بهذا نجد جدول اطراد f' الآتي:

x	0	1	$+\infty$
$f''(x)$		- 0 +	
$f'(x)$		↘ 2 ↗	



يبين الجدول أنّ $f'(x) \geq 2 > 0$ على I ، فالتابع f متزايد تماماً على I . وله

جدول التغيرات الآتي:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	↗ $+\infty$

• الرسم مبيّن في الشكل المجاور. نلاحظ أنّ النقطة $(1, 0)$ نقطة من الخط البياني تساعد في الرسم.

② دراسة $f(x) = \frac{1}{x} + x \ln x$ على \mathbb{R}_+^* .

• لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. نستنتج أن محور الترتيب مستقيم مقارب للخط \mathcal{C} .


وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

• وعلى I لدينا $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x$ ، إشارة f' غير واضحة لذلك نسعى إلى دراسة اطراد المشتق، فنحسب على \mathbb{R}_+^*

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x} > 0$$

فالتابع f' تابع متزايد تماماً، ولأن $f'(1) = 0$ استنتجنا جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	\searrow 1 \nearrow	$+\infty$



• الرسم مبين في الشكل المجاور.

30 ليكن \mathcal{C} الخط البياني للتابع f المعرف على المجال $I =]0, +\infty[$ وفق

$$f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$$

① احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. ما مقاربات الخط \mathcal{C} ؟

② ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها، ثم ارسم الخط \mathcal{C} .

③ لنكن M_1 و M_2 و M_3 و M_4 النقاط المعرّفة كما يأتي:

- M_1 نقطة تقاطع \mathcal{C} مع محور الفواصل.
- M_2 نقطة من \mathcal{C} مماسه منها يمر بمبدأ الإحداثيات.
- M_3 نقطة من \mathcal{C} مماسه منها يوازي محور الفواصل.
- M_4 نقطة من \mathcal{C} ينعدم فيها المشتق الثاني للتابع f .

a. احسب فواصل هذه النقاط.

b. أثبت أنّ تلك الفواصل هي أربعة حدود متعاقبة من متتالية هندسية. ما أساسها؟

① • $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \ln x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$. نستنتج أن محور

التراتب مستقيم مقارب للخط C .

• وكذلك $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. نستنتج أن محور الفواصل

مستقيم مقارب للخط C .


② يعطى مشتق f على المجال I بالعلاقة

$$f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$$

ينعدم $f'(x)$ عند $x = 1$. وإشارته تعاكس إشارة $\ln x$ ، نستنتج إذن جدول تغيرات f الآتي:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow 1 \searrow	0

• رسم C مبين في الشكل الآتي.



③ a . يتقاطع C مع محور الفواصل في M_1 التي تحقق فاصلتها x_1 العلاقة $\ln x_1 + 1 = 0$ إذن

$$x_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

• لنرمز إلى فاصلة M_2 بالرمز x_2 ، فيكون ترتيبها $y_2 = f(x_2) = \frac{1 + \ln x_2}{x_2}$ ، ويكون ميل المماس

$$\text{عندها } f'(x_2) = \frac{-\ln x_2}{x_2^2} \text{ فمعادلته } y = y_2 + f'(x_2)(x - x_2) \text{ أي}$$

$$y = \frac{1 + \ln x_2}{x_2} - \frac{\ln x_2}{x_2^2}(x - x_2)$$

يمر هذا المماس بالمبدأ، إذا حققت النقطة $(0,0)$ معادلته أي $0 = \frac{1 + \ln x_2}{x_2} - \frac{\ln x_2}{x_2^2}(0 - x_2)$ ، أي

$$2 \ln x_2 + 1 = 0 \text{ ، ومنه } x_2 = e^{-1/2} = 1/\sqrt{e} \text{ . وهي فاصلة } M_2 \text{ .}$$

• مماس C عند $M_3(x_3, y_3)$ يوازي محور الفواصل، إذن $f'(x_3) = 0$. إذن $x_3 = 1$ ، وهي فاصلة M_3 .

• لتكن فاصلة M_4 لدينا $f''(x) = \frac{2 \ln x - 1}{x^3}$ ، ينعدم $f''(x)$ عند حلول المعادلة $2 \ln x = 1$ ، ومنه $x_4 = e^{1/2} = \sqrt{e}$ وهي فاصلة M_4 .

إذن فواصل (M_1, M_2, M_3, M_4) هي بالترتيب $x_1 = \frac{1}{e}$ ، $x_2 = \frac{1}{\sqrt{e}}$ ، $x_3 = 1$ ، $x_4 = \sqrt{e}$.

b نستنتج (x_1, x_2, x_3, x_4) هي أربعة حدود متعاقبة من متتالية هندسية. أساسها يساوي \sqrt{e} ، لأن $x_k = \frac{1}{e\sqrt{e}} e^{k/2}$ في حالة $k = 1, 2, 3, 4$.

31 ليكن f التابع المعرف على $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ وفق $f(x) = -\frac{x}{2} + \ln \left| \frac{x-1}{x} \right|$ ، وليكن C

خطه البياني في معلم متجانس.

① a . أثبت أن $\frac{f(x) + f(1-x)}{2} = -\frac{1}{4}$ ، أيًا يكن x من D_f .

b . استنتج أن النقطة $A\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$ هي مركز تناظر الخط C .

② ادرس تغيرات f على مجموعة تعريفه.

③ أثبت أن المستقيم d الذي معادلته $y = -\frac{1}{2}x$ مقارب للخط C . وادرس الوضع النسبي للخط

C بالنسبة إلى مقاربه d .

④ ارسم في معلم واحد d ثم C .

الحل

① a . لاحظ أنه إذا كان x مختلفاً عن 0 و 1 كان كذلك المقدار $1-x$. وعليه إذا كان x عنصراً من

D_f كان $1-x$ أيضاً عنصراً من D_f وأمكننا حساب

$$\begin{aligned} f(x) + f(1-x) &= -\frac{x}{2} + \ln \left| \frac{x-1}{x} \right| - \frac{1-x}{2} + \ln \left| \frac{1-x-1}{1-x} \right| \\ &= -\frac{1}{2} + \ln \left(\left| \frac{x-1}{x} \right| \cdot \left| \frac{x}{x-1} \right| \right) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

ومنه المساواة المطلوبة.

b . ينتج من تحقق الشرطين : (1) أيًا كان x من D_f كان $1-x$ عنصراً من D_f ، و (2) أيًا كان

x من D_f كان $\frac{f(x) + f(1-x)}{2} = -\frac{1}{4}$ أن النقطة $A\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$ هي مركز تناظر للخط البياني للتابع f .

② تكفي الدراسة على كلٍّ من المجالين $[\frac{1}{2}, 1[$ و $]1, +\infty[$ ، ثمَّ نتممها بالاستفادة من الخاصّة التناظرية.

على المجال $[\frac{1}{2}, 1[$ لدينا $\left| \frac{x-1}{x} \right| = \frac{1-x}{x}$ إذن للتابع f الصيغة الآتية على هذا المجال

$$f(x) = -\frac{x}{2} + \ln\left(\frac{1-x}{x}\right) = -\frac{x}{2} + \ln(1-x) - \ln x$$

ولدينا $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ فالمستقيم الذي معادلته $x = 1$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f . وكذلك

فإنَّ

$$f'(x) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$$

وهو سالب تماماً على المجال $[\frac{1}{2}, 1[$ لأنه يساوي مجموع ثلاثة مقادير سالبة تماماً. ومنه جدول التغيرات

الآتي للتابع f على المجال $[\frac{1}{2}, 1[$:

x	$\frac{1}{2}$		1
$f'(x)$	$-\frac{9}{2}$	-	
$f(x)$	$-\frac{1}{4}$	\searrow	$-\infty$

وعلى المجال $]1, +\infty[$ لدينا $\left| \frac{x-1}{x} \right| = \frac{x-1}{x}$ إذن للتابع f الصيغة الآتية على هذا المجال

$$f(x) = -\frac{x}{2} + \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) = -\frac{x}{2} + \ln(x-1) - \ln x$$

ولدينا $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ فالمستقيم الذي معادلته $x = 1$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f .

ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ لأنَّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) = \ln 1 = 0$

وكذلك فإنَّ

$$f'(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{2+x-x^2}{2(x-1)x} = \frac{(1+x)(2-x)}{2(x-1)x}$$

> 0

على المجال $]1, +\infty[$ ينعدم $f'(x)$ عند $x = 2$. ومنه جدول التغيرات الآتي لـ f على هذا المجال:

x	1		2		$+\infty$
$f'(x)$			-		
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	$-\frac{\ln 2 - 1}{2} \approx -1.7$	\searrow	$-\infty$

③ لنلاحظ أنَّ

$$f(x) + \frac{x}{2} = \ln\left|\frac{x-1}{x}\right| = \ln\left|1 - \frac{1}{x}\right|$$


إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + \frac{x}{2}\right) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \frac{x}{2}\right) = 0$ فالمستقيم d الذي معادلته $y = -\frac{1}{2}x$

مستقيم مقارب للخط C .

وأخيراً $f(x) + \frac{x}{2} = 0$ إذا فقط كان $\left|1 - \frac{1}{x}\right| = 1$ وهذا يكافئ $x = \frac{1}{2}$. إذن يحافظ $f(x) + \frac{x}{2}$ على إشارة ثابتة على كل من المجالات $]-\infty, 0[$ و $]0, \frac{1}{2}[$ و $] \frac{1}{2}, 1[$ و $]1, +\infty[$ ومنه

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
C	فوق d		تحت d	تحت d	

④ نرسم C على كل من المجالين $] \frac{1}{2}, 1[$ و $]1, +\infty[$ ونستفيد من الخاصية التناظرية لنتمّم الرسم على كامل مجموعة التعريف.



32 ليكن f التابع المعرف على $D_f = \mathbb{R}_+^*$ وفق $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ ، وليكن C خطه البياني في معلم متجانس.


- ① ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها.
- ② لنكن A النقطة من الخط C التي فاصلتها 1.
 - a. جد معادلةً للمستقيم T_A المماس للخط C في النقطة A .
 - b. ارسم في معلم واحد T_A ومقاربات C ، ثم C .
- ③ لنكن B نقطة من الخط C فاصلتها u . أثبت أنّ $u^3 - 1 + 2 \ln u = 0$ هو الشرط اللازم والكافي ليكون المماس T_B للخط C في النقطة B موازياً للمستقيم الذي معادلته $y = x$.
- ④ a. حل المعادلة $u^3 - 1 + 2 \ln u = 0$.
- b. استنتج أنّ A هي النقطة الوحيدة من C يكون المماس فيها موازياً للمستقيم الذي معادلته $y = x$.

①

- لما كان $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ ، استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$. إذن محور الترتيب الذي معادلته $x = 0$ مستقيم مقارب للخط C .
- ولما كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ ، استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. إذن محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للخط C .
- دراسة التغيرات نحسب المشتق :

$$f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

ينعدم المشتق $f'(x)$ عندما $1 - 2 \ln x = 0$ ، أي في حالة $x = \sqrt{e}$. وهذا يتيح لنا وضع جدول التغيرات الآتي:



x	$-\infty$	\sqrt{e}	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{2e}$	$\searrow 0$

② معادلة المماس T_A في النقطة التي فاصلتها 1 أي $A(1, 0)$

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1) \text{ أي } y = x - 1$$

ونجد في الشكل المجاور الرسم المطلوب.

③ معادلة المماس T_B في النقطة التي فاصلتها u هي $y = f(u) + f'(u)(x - u)$ ، وميله $f'(u)$.

يوازي هذا المماس المستقيم الذي معادلته $y = x$ إذا وفقط إذا كان ميله مساوياً للواحد أي إذا وفقط إذا

$$\text{تحقق الشرط } \frac{1 - 2 \ln u}{u^3} = 1 \text{ وهذا يكافئ } u^3 + 2 \ln u - 1 = 0$$

④ a . لنتأمل التابع $g(x) = x^3 - 1 + 2 \ln x$ ، ولنلاحظ أنّه يساوي مجموع تابعين متزايدين تماماً على

\mathbb{R}_+^* هما التابع $x \mapsto \ln x$ و $x \mapsto x^3 - 1$ ، فهو إذن تابع متزايد تماماً على \mathbb{R}_+^* . من الواضح أنّ

$g(1) = 0$ ، (لأننا نعرف مسبقاً أنّ T_A يوازي منتصف الربع الأول Δ ، إذن $u = 1$ حلّ للمعادلة

المدروسة). وعليه لأنّ التابع g متزايداً تماماً كان الحلّ $u = 1$ هو الحلّ الوحيد للمعادلة $g(x) = 0$.

b . نستنتج مما سبق أنّ المماس T_A للخط C في A هو المماس الوحيد الذي يوازي المستقيم Δ .

في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على $[0, +\infty[$ وفق:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{3}{2} \right), & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

① a . احسب نهاية $\frac{f(x) - f(0)}{x}$ عندما تسعى x إلى الصفر؟ واستنتج أن f اشتقاقي في $x = 0$.

b . احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

c . ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها.

② ليكن T مماس الخط C في النقطة التي فاصلتها $x = 1$ منه، جد معادلة لهذا المماس.

③ نهدف هنا دراسة الوضع النسبي للخط C والمماس T . ولهذا نعرف التابع h على المجال

$$[0, +\infty[\text{ بالعلاقة } h(x) = f(x) + x - \frac{1}{4}.$$

ادرس، إشارة $h''(x)$ لتستنتج إشارة $h'(x)$ ومن ثم إشارة $h(x)$.

④ ارسم المماس T ومماسات C في نقاط تقاطعه مع محور الفواصل ثم ارسم C .

البدل

① a . في حالة $x > 0$ ، المقدار $\frac{f(x) - f(0)}{x}$ هو معدل تغير f عند 0 ، نرمز إليه بالرمز $t(x)$ ،

$$t(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{x}{2} \left(\ln x - \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(x \ln x - \frac{3}{2} x \right)$$
 فيكون

نعلم أن $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = \frac{1}{2}(0 - 0) = 0$. فالتابع f اشتقاقي عند

$$x = 0 \text{ و } f'(0) = 0.$$

b . $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln x - \frac{3}{2} \right) = +\infty$ ، إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

c . وجدنا أن $f'(0) = 0$ وفي حالة $x > 0$ ، لدينا:

$$f'(x) = x \ln x - x = x(\ln x - 1)$$

إذن ينعدم $f'(x)$ في حالة $x = 0$ وفي حالة $x = e$. ومنه جدول تغيرات f الآتي:

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	0	-	0	+	
$f(x)$	0	\searrow	$-e^2/4$	\nearrow	$+\infty$

② معادلة T هي $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$ أي $y = \frac{1}{4} - x$.

③ نعرّف $h(x) = f(x) + x - \frac{1}{4}$ فيكون

$$h'(x) = x \ln x - x + 1$$

$$h''(x) = \ln x$$

إذن للتابع h' جدول الاطراد الآتي

x	0	1	$+\infty$
$h''(x)$	-	0	+
$h'(x)$	\searrow	0	\nearrow


ومنه نستنتج أنّ $h'(x) \geq 0$ ، إذن للتابع h جدول الاطراد الآتي

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	+	+	
$h(x)$	\nearrow	0	\nearrow

ومن هذا الجدول نستنتج أنّ C يقع تحت المماس T على $[0,1]$ ، وأنّ C يقع فوق المماس T على

$]1, +\infty[$.

④ الرسم.



6

التابع الأسّي

- 1 تعريف التابع الأسّي النّيبري
- 2 خواص التابع الأسّي
- 3 دراسة التابع الأسّي
- 4 نهايات مهمة تتعلق بالتابع الأسّي
- 5 دراسة التابع a^x ($a > 0$), $x \mapsto a^x$
- 6 معادلات تفاضلية بسيطة

نقاط التعلّم الأساسية في هذه الوحدة

- تعريف وخواص التابع الأسّي
- النهايات الأساسية المتعلقة بالتابع الأسّي
- اطراد التابع الأسّي واشتقاقته
- اشتقاقية التابع الأسّي
- حل معادلات ومترajحات تحوي تابعا أسياً
- دراسة توابع تضم التابع الأسّي في علاقة ربطها.
- حل بعض المعادلات التفاضلية البسيطة من المرتبة الأولى بأمثال ثابتة.

تَدْرِبْ صَفحة 186 

① اكتب بأبسط ما يمكن كلاً من الأعداد الآتية:

$$B = e^{\frac{1}{2}\ln 16} + e^{\ln 3} \quad 2 \quad A = e^{\ln 2} + e^{\ln 3} \quad 1$$

$$D = e^{-\ln \frac{3}{2}} + e^{\ln \frac{1}{3}} \quad 4 \quad C = \ln e^{-3} + e^{\ln 5} \quad 3$$

الحل

$$B = 7 \quad 2 \quad A = 5 \quad 1$$

$$D = 1 \quad 4 \quad C = 2 \quad 3$$

② اكتب بأبسط ما يمكن كلاً من العبارات الآتية، مبيّناً المجموعة التي تكون معرفّة عليها:

$$A = e^{\ln x} - \ln(2e^x) \quad 1$$

$$B = e^{\ln(x-1) - \ln x} + \frac{1}{x} \quad 2$$

$$C = \ln(e^{1/x}) + e^{-\ln x} \quad 3$$

الحل

$$1 \quad A = e^{\ln x} - \ln(2e^x) = -\ln 2 \quad \text{على }]0, +\infty[\text{ لدينا } 0$$

$$2 \quad B = 1 \quad \text{على }]1, +\infty[\text{ لدينا } 1$$

$$3 \quad C = \frac{2}{x} \quad \text{على }]0, +\infty[\text{ لدينا } 0$$

③ حلّ المعادلات أو المتراجحات الآتية:

$$\frac{e^x}{1 - 2e^x} = 5 \quad 3 \quad e^{2x^2+3} = e^{7x} \quad 2 \quad e^{3-x} = 1 \quad 1$$

$$\ln(2 - e^x) \geq 3 \quad 6 \quad \ln(e^x - 2) = 3 \quad 5 \quad 2e^{-x} = \frac{1}{e^x + 2} \quad 4$$

$$e^{2x^2-1} \geq 3 \quad 9 \quad (e^x - 1)(e^x - 4) < 0 \quad 8 \quad e^{x^2-2} \leq e^{4-x} \quad 7$$

الحل

$$1 \quad e^{3-x} = 1 \quad \text{تكافئ } 3 - x = \ln(1) = 0 \quad \text{ومنه } x = 3$$

$$2 \quad e^{2x^2+3} = e^{7x} \quad \text{تكافئ } 2x^2 + 3 = 7x \quad \text{أو } (x-3)(2x-1) = 0 \quad \text{ومنه } x \in \{3, \frac{1}{2}\}$$

$$3 \quad \frac{e^x}{1 - 2e^x} = 5 \quad \text{تكافئ } e^x = \frac{5}{11} \quad \text{ومنه } x = \ln\left(\frac{5}{11}\right)$$

$$4 \quad 2e^{-x} = \frac{1}{e^x + 2} \quad \text{تكتب } \frac{2}{e^x} = \frac{1}{e^x + 2} \quad \text{فهي تكافئ } e^x + 4 = 0 \quad \text{وهذه مستحيلة لأن } e^x > 0 \quad \text{أياً}$$

كانت قيمة x .

$$5 \quad \ln(e^x - 2) = 3 \text{ هذه تكافئ } e^x - 2 = e^3 \text{ ومنه } x = \ln(2 + e^3)$$

$$6 \quad \ln(2 - e^x) \geq 3 \text{ هذه تكافئ } 2 - e^x \geq e^3 \text{ أو } 2 - e^3 \geq e^x \text{ وهذه مستحيلة لأن } 2 - e^3 < 0$$

$$7 \quad e^{x^2-2} \leq e^{4-x} \text{ تكافئ } x^2 - 2 \leq 4 - x \text{ أو } x^2 + x - 6 \leq 0 \text{ إذن } x \in [-3, 2]$$

$$8 \quad (e^x - 1)(e^x - 4) < 0 \text{ هذه تكافئ } 1 < e^x < 4 \text{ أو } 0 = \ln 1 < x < 2 \ln 2$$

$$9 \quad e^{2x^2-1} \geq 3 \text{ تكافئ } 2x^2 - 1 \geq \ln(3) \text{ ومنه } x \in \left[-\infty, -\sqrt{\frac{1+\ln(3)}{2}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{1+\ln(3)}{2}}, +\infty\right]$$

$$4 \quad \text{أشرح لماذا تتفق إشارة } e^x - \frac{4}{e^x} \text{ مع إشارة } (e^x - 2). \text{ ثم حل المتراحة } e^x - \frac{4}{e^x} < 0$$

الحل

لأن $e^x - \frac{4}{e^x} = (1 + \frac{2}{e^x})(e^x - 2)$ والمقدار $1 + \frac{2}{e^x}$ موجب تماماً. وعليه تكافئ المتراحة

$$e^x - \frac{4}{e^x} < 0 \text{ المتراحة } e^x < 2 \text{ أو } x < \ln 2$$

تَدْرِبْ صَفِيحة 190

1 أثبت صحة كل من المساواتين الآتيتين على \mathbb{R} .

$$1 \quad \ln(e^x + 1) - \ln(e^{-x} + 1) = x \quad 2 \quad \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

الحل

1 نلاحظ أن $e^{-x} + 1 = \frac{1}{e^x} + 1 = \frac{e^x + 1}{e^x}$ إذن $\frac{e^x + 1}{e^{-x} + 1} = e^x$ الطرفان موجبان وبأخذ اللوغاريتم

$$\ln(e^x + 1) - \ln(e^{-x} + 1) = x \text{ نجد}$$

$$2 \quad \text{لقد رأينا أن } e^{-x} + 1 = \frac{e^x + 1}{e^x} \text{ وبأخذ مقلوب الطرفين نجد } \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{e^{-x} + 1}$$

2 اكتب بأبسط ما يمكن كلاً من الأعداد الآتية:

$$1 \quad A = \ln \sqrt{e^5} \quad 2 \quad B = \frac{e}{e^{2+\ln 3}} \quad 3 \quad C = \frac{e^{2+\ln 8}}{e^{3+\ln 4}}$$

$$4 \quad D = \frac{e^{4x}}{e \times (e^x)^2} \quad 5 \quad E = (e^{2x})^3 \times (e^{-x})^6 \quad 6 \quad F = \frac{e^{3\pi} - e^{2\pi}}{e^{2\pi} - e^\pi}$$

$$7 \quad G = (32)^{\frac{3}{2}} \quad 8 \quad H = \frac{-1}{3 \ln 3} \quad 9 \quad I = \sqrt[3]{27} \times 3^{\frac{1}{2}}$$

الحل

$$1 \quad A = \frac{5}{2} \quad 2 \quad B = \frac{1}{3e} \quad 3 \quad C = \frac{2}{e}$$

$$4 \quad D = e^{2x-1} \quad 5 \quad E = 1 \quad 6 \quad F = e^\pi$$

$$7 \quad G = 128\sqrt{2} \quad 8 \quad H = \frac{1}{e} \quad 9 \quad I = 3$$

③ أثبت أن التابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$ تابع ثابت.

الحل

بفك التربيع أو باستعمال متطابقة فرق مربعين نجد $f(x) = 4$ أي كانت قيمة x .

④ حل المعادلات الآتية:

$$e^{2x} - 5e^x + 4 = 0 \quad ① \quad e^{2x} - e^x - 6 = 0 \quad ②$$

$$4e^{2x} - e^x + 2 = 0 \quad ③ \quad e^{-2x} - 7e^{-x} + 6 = 0 \quad ④$$

الحل

① المعادلة تكتب بالشكل $(e^x - 1)(e^x - 4) = 0$ إذن $x \in \{\ln 1, \ln 4\}$ أو $x \in \{0, 2 \ln 2\}$.

② المعادلة تكتب بالشكل $(e^x - 3)(e^x + 2) = 0$ إذن $x = \ln 3$ أو $x = \ln 3$ ، لأن $e^x + 2 > 0$ أي كانت x .

③ المعادلة تكتب بالشكل $(2e^x - 1)^2 + 3e^x + 1 = 0$ وهذه المعادلة مستحيلة لأن مجموع مقادير

موجبة لا يندعم إلا إذا انعدمت جميعها.

④ المعادلة تكتب بالشكل $(e^{-x} - 1)(e^{-x} - 6) = 0$ إذن $x \in \{0, -\ln 6\}$.

⑤ حل المتراجحات الآتية:

$$(e^x - 2)e^x > 2(e^x - 2) \quad ② \quad e^x - 4e^{-x} \leq 0 \quad ①$$

$$e^{2x} - 2e^{-x} - 3 < 0 \quad ④ \quad e^{x+2} \geq \frac{3}{e^x} \quad ③$$

$$e^x + 4e^{-x} \leq 5 \quad ⑥ \quad e^{x+\ln 4} > \frac{2}{3} \quad ⑤$$

الحل

① بضرب الطرفين بالمقدار الموجب e^x نجد أن المتراجحة تكافئ $(e^x - 2)(e^x + 2) \leq 0$ أو

$$e^x - 2 \leq 0 \quad \text{لأن } e^x + 2 > 0 \text{ دوماً. ومنه } x \in]-\infty, \ln 2]$$

② بإصلاح المتراجحة نجدها تكافئ $(e^x - 2)^2 > 0$ ومنه $x \neq \ln 2$.

③ المتراجحة $e^{x+2} \geq \frac{3}{e^x}$ تكافئ $e^{2x+2} \geq 3$ أو $2x + 2 \geq \ln 3$ أي $x \geq \frac{1}{2} \ln 3 - 1$.

④ بضرب الطرفين بالمقدار الموجب e^x ووضع $X = e^x$ تأخذ المتراجحة الصيغة المكافئة

$X^3 - 3X - 2 < 0$ ولكن $X^3 - 3X - 2$ كثير حدود من الدرجة الثالثة، ونظرة سريعة تبين لنا أن

كلاً من $X = 2$ و $X = -1$ جذر له فهو يقبل القسمة على $(X - 2)(X + 1)$ وهذا يتيح لنا تحليله

لنجد $X^3 - 3X - 2 = (X + 1)^2(X - 2)$. إذن المتراجحة المعطاة تكافئ $(e^x + 1)^2(e^x - 2) < 0$

ولكن المقدار $(e^x + 1)^2$ موجب تماماً، إذن هي تكافئ $e^x - 2 < 0$ أو $x < \ln 2$.

$$e^{x+\ln 4} > \frac{2}{3} \quad \text{تكافئ } x > -\ln 6 \quad ⑤$$

⑥ المتراجحة $e^x + 4e^{-x} \leq 5$ تكافئ $(e^x - 1)(e^x - 4) \leq 0$ ومنه $x \in [0, 2 \ln 2]$.

تَدْرِبْ صفحة 194

① ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = \exp\left(\frac{1}{2} - x^2\right)$

- ① احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. استنتج معادلة كل مقارب للخط البياني C .
- ② ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها. أشر إلى قيمة حديّة للتابع.
- ③ اكتب معادلةً للمماس d للخط C في النقطة التي ينعدم فيها $f'(x)$.
- ④ جد إحداثيات النقطتين اللتين ينعدم فيهما $f''(x)$ ، واكتب معادلتَي المماسين d_1 و d_2 فيهما.
- ⑤ ادرس وضع الخط البياني C بالنسبة إلى كل من d و d_1 و d_2 .
- ⑥ ارسم d و d_1 و d_2 ثم ارسم C .

الحل

① لَمَّا كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - x^2\right) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} - x^2\right) = -\infty$ و $\lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0$ استنتجنا أنّ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

إذن محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f .

② نلاحظ أنّ $f'(x) = -2xe^{\frac{1}{2}-x^2}$. إذن إشارة f' تعاكس إشارة x على \mathbb{R} ، ومنه جدول التغيرات:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$
$f(x)$	0	$\nearrow \sqrt{e}$	$\searrow 0$

إذن يبلغ f قيمة حديّة كبرى شاملة (أومحلية) عند $x = 0$.

③ لَمَّا كان $f(0) = \sqrt{e}$ و $f'(0) = 0$ استنتجنا أنّ $y = \sqrt{e}$ هي معادلة المماس d في النقطة التي ينعدم عندها f' .

④ هنا $f''(x) = 2(2x^2 - 1)e^{\frac{1}{2}-x^2}$ إذن $f''(x) = 0$ يكافئ $x \in \left\{-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$. ونلاحظ أنّ

▪ لَمَّا كان $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1$ و $f'\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\sqrt{2}$ استنتجنا أنّ $y = 2 - \sqrt{2}x$ هي معادلة المماس d_1

في النقطة التي فاصلتها $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

▪ ولَمَّا كان $f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1$ و $f'\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}$ استنتجنا أنّ $y = 2 + \sqrt{2}x$ هي معادلة المماس d_2 في

النقطة التي فاصلتها $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.

⑤ لَمَّا كان $f(x) \leq \sqrt{e}$ على \mathbb{R} استنتجنا أنّ C يقع دوماً تحت d .

■ ليكن $g(x) = f(x) - (2 - \sqrt{2}x)$. نلاحظ أنّ $g''(x) = f''(x)$ ، إذن إشارة g'' معروفة. وكذلك

نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} g'(x) = \sqrt{2}$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g'(x) = \sqrt{2}$ إذن $g'(x) = -2\sqrt{e} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{e^{x^2}} + \sqrt{2}$

لأنّ $\lim_{X \rightarrow \infty} \frac{X}{e^X} = 0$ ومنه جدول تغيرات g' الآتي

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$
$g''(x)$		+	-	+
$g'(x)$	$\sqrt{2}$	$\nearrow 2\sqrt{2}$	$\searrow 0$	$\nearrow \sqrt{2}$

نلاحظ من الجدول أنّ g' موجب على كامل \mathbb{R} ولا يعدم إلاّ عند $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$. إذن g تابع متزايدٍ على


\mathbb{R} ولأنّ $g(\frac{1}{\sqrt{2}}) = 0$ استنتجنا أنّ $g(x) < 0$ على $]-\infty, \frac{1}{\sqrt{2}}[$ وأنّ $g(x) > 0$ على $]\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[$. إذن

يقع C تحت d_1 على $]-\infty, \frac{1}{\sqrt{2}}[$ وفوقه على $]\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[$.

ونبرهن بالمثل، أو بالاستفادة من كون التابع المدروس زوجياً، أنّ C يقع فوق d_2 على $]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}[$

وتحتّه على $]-\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[$.

⑥ تتيح الدراسة السابقة رسم C بدقة:



② f و g هما التابعان المعرّفان على \mathbb{R} وفق $f(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ و $g(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ و h

هو التابع المعرّف على \mathbb{R} وفق $h = \frac{g}{f}$. احسب كلاً من $f'(x)$ و $g'(x)$. وأثبت أنّ $h' = \frac{1}{f^2}$.

الحل

بحساب بسيط نلاحظ أنّ $f'(x) = g(x)$ و $g'(x) = f(x)$ وأخيراً

$$f'(x) = \frac{g'(x)f(x) - f'(x)g(x)}{f^2(x)} = \frac{f^2(x) - g^2(x)}{f^2(x)}$$

ولكن $f^2(x) - g^2(x) = 1$ أيّاً كانت x (تدرب ③ صفحة 190) إذن $h' = \frac{1}{f^2}$.

تَدْرِبْ صفحة 199

① ادرس نهاية كل من التابعين f و g عند حدود مجموعة تعريفه.

$$g(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \quad ② \quad f(x) = \ln x - e^x \quad ①$$

الحل

① التابع $x \mapsto f(x) = \ln x - e^x$ معرّف على $]0, +\infty[$.

▪ عند $+\infty$ لدينا حالة عدم تعيين نزيلها بإخراج e^x خارج قوسين فنكتب

$$f(x) = e^x \left(\frac{\ln x}{e^x} - 1 \right) = e^x \left(\frac{\ln x}{x} \cdot \frac{x}{e^x} - 1 \right)$$

الآن لدينا $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

▪ عند الصفر الأمر سهل لأن $e^0 = 1$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$

② التابع $x \mapsto g(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ معرّف على \mathbb{R} .

▪ عند $-\infty$ لدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$

▪ عند $+\infty$ ، لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ و $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X-1}{X+1} = 1$ إذن نستنتج أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = 1$

② ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = (3-x)e^x$

① ادرس تغيرات f .

② اكتب معادلة d مماس الخط C في النقطة التي فاصلتها تعدم $f''(x)$.

③ ارسم في معلم واحد المماس d ثم الخط C .

الحل

① التابع $x \mapsto f(x) = (3-x)e^x$ معرّف على \mathbb{R} .

▪ ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ، أمّا في جوار اللانهاية السالبة فنكتب $f(x) = -e^3 X e^X$ حيث

$X = x - 3$. ولكن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 3) = -\infty$ وكذلك فإن $\lim_{x \rightarrow -\infty} X e^X = 0$ إذن

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. نستنتج أن محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للخط C في

جوار $-\infty$.

▪ نلاحظ أن $f'(x) = (2-x)e^x$ ، وهذا يتيح لنا كتابة جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$	0	\nearrow	$e^2 \searrow -\infty$


② نلاحظ أنّ $f''(x) = (1-x)e^x$ ، وهو ينعدم فقط عند $x = 1$. ولدينا $f(1) = 2e$ و $f'(1) = e$ إذن معادلة المماس d الذي يمس C في النقطة $x = 1$ هي $y = e(x+1)$. **ملاحظة.** مع أنّه غير مطلوب في صيغة السؤال، قد يرغب المرء بدراسة الوضع النسبي للخط البياني C والمماس d ، فنضع

$$h(x) = f(x) - e(x+1) = 3e^x - e - x(e^x + e)$$

من غير الواضح كيف نعين إشارة h . وخاصةً أنّ اشتقاقه يُبقي على الحد xe^x في صيغة المشتق، يمكننا إذن أن نفكر بإخراج أمثال x وهي $(e^x + e)$ خارج قوسين وبخاصةً أنّ هذا المقدار موجب ولا يؤثر في تعيين إشارة h فنكتب إذن $h(x) = (e^x + e)g(x)$ وقد عرّفنا

$$g(x) = \frac{3e^x - e}{e^x + e} - x$$

وهنا نحسب: $g'(x) = \frac{4e \cdot e^x}{(e^x + e)^2} - 1 = -\frac{(e^x - e)^2}{(e^x + e)^2}$ فنستنتج أنّ g' سالب على \mathbb{R} ولا ينعدم إلا عند $x = 1$. إذن التابع g متناقصٌ تماماً على \mathbb{R} . ولكن $g(1) = 0$ (هذه نتيجة معروفة بالنسبة إلينا لأنّ h يمثّل الفرق بين التابع والمماس في النقطة التي فاصلتها 1، فلا بد للفرق أن ينعدم عند $x = 1$).



إذن $g(x) > 0$ على $]-\infty, 1[$ ، و $g(x) < 0$ على $]1, +\infty[$. وعليه يقع C فوق المماس d على المجال $]-\infty, 1[$ ، ويقع تحته على $]1, +\infty[$.

③ الرسم مبين في الشكل المجاور.

③ جد نهاية كلّ من التوابع الآتية عند a :

- | | | | |
|---|---|---|---|
| $f(x) = \left(\frac{x-2}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{3}}$, $a = +\infty$ | ② | $f(x) = (2-x)^{\frac{3}{x-1}}$, $a = 1$ | ① |
| $f(x) = 2xe^{-x}$, $a = +\infty$ | ④ | $f(x) = \frac{e^x - 1}{2x}$, $a = 0$ | ③ |
| $f(x) = e^{2x} - e^x + 3$, $a = +\infty, -\infty$ | ⑥ | $f(x) = \frac{e^x - 1}{x-1}$, $a = +\infty, -\infty$ | ⑤ |
| $f(x) = 2x - 1 + e^{-x}$, $a = -\infty$ | ⑧ | $f(x) = \ln(e^x + 2)$, $a = +\infty, -\infty$ | ⑦ |
| $f(x) = e^{1/x}$, $a = +\infty, 0, -\infty$ | ⑩ | $f(x) = \frac{1}{x}(e^x - 1)$, $a = 0, +\infty$ | ⑨ |

1 نضع $u(x) = x - 1$ ونحسب

$$\ln f(x) = -3 \frac{\ln(1-u)}{-u}$$

ولكن لدينا $\lim_{x \rightarrow 1} u(x) = 0$ و $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1-u)}{-u} = 1$ إذن $\lim_{x \rightarrow 1} \ln f(x) = -3$ وأخيراً $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = e^{-3}$

2 نضع $u(x) = \frac{3}{x+1}$ ونحسب

$$\ln f(x) = -\frac{\ln(1-u)}{-u}$$

ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0$ و $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1-u)}{-u} = 1$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln f(x) = -1$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^{-1}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} \quad 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad 4$$

5 واضح أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ، أما عند $+\infty$ فنكتب

$$f(x) = e \cdot \frac{e^{x-1}}{x-1} - \frac{1}{x-1}$$

لنستنتج أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

6 هنا $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$ وضوحاً. أما عند $+\infty$ فنكتب

$$f(x) = e^x(e^x - 1) + 3$$

لنستنتج أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

7 هنا $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 2) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 2) = +\infty$ إذن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln(2)$$

8 نكتب $f(x) = e^{-x} \cdot (2xe^x - e^x + 1)$ لنستنتج أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad 9$$

10 $f(x) = e^{1/x}$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$

تَدْرِبْ صَفِيحَة 203

① بسّط كتابة كل من العددين $A = 3^{-\frac{1}{\ln 3}}$ و $B = 2^{\frac{1}{\ln 4}}$.

الحل

$$.B = \sqrt{e} \text{ و } A = e^{-1}$$

② حل في كل حالة المعادلة أو المتراجحة المعطاة:

$$3^x > 4 \quad \textcircled{3} \quad 3^x = 4^{2x+1} \quad \textcircled{2} \quad 7^{x-1} = 3^x \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{2^x}{2^x + 1} < \frac{1}{3} \quad \textcircled{6} \quad 5^{-x} < 5^{2x} \quad \textcircled{5} \quad \left(\frac{1}{3}\right)^x > 4 \quad \textcircled{4}$$

الحل

$$x > \frac{2 \ln 2}{\ln 3} \quad \textcircled{3} \quad x = \frac{2 \ln 2}{\ln 3 - 4 \ln 2} \quad \textcircled{2} \quad x = \frac{\ln 7}{\ln 7 - \ln 3} \quad \textcircled{1}$$

$$x < -1 \quad \textcircled{6} \quad x > 0 \quad \textcircled{5} \quad x < -\frac{2 \ln 2}{\ln 3} \quad \textcircled{4}$$

③ فيما يأتي حل كلاً من المعادلات والمتراجحات المعطاة:

$$.4^x + 2^{x+1} - 3 \leq 0 \text{ و } 4^x + 2^{x+1} - 3 = 0 \quad \textcircled{1}$$

$$.2^{x+1} - 10 \times 2^x + 12 \geq 0 \text{ و } 2^{x+1} - 10 \times 2^x + 12 = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$.3^{x+1} + 2 \times 3^{-x} \geq 7 \text{ و } 3^{x+1} + 2 \times 3^{-x} = 7 \quad \textcircled{3}$$

الحل

① بوضع $X = 2^x$ تصبح المعادلة $X^2 + 2X - 3 = 0$ أو $(X + 3)(X - 1) = 0$ ، ولكن العدد

$X = 2^x$ موجبٌ إذن تكافئ المعادلة المعطاة $X = 1$ أو $X = 0$.

أما المتراجحة $(X + 3)(X - 1) \leq 0$ فتكافئ $X \leq 1$ أي $2^x \leq 1$ أو $x \in]-\infty, 0]$.

② بوضع $X = 2^x$ تصبح المعادلة $2X - 10X + 12 = 0$ أو $X = \frac{3}{2}$ ، إذن تكافئ المعادلة المعطاة

$x = \frac{\ln 3}{\ln 2} - 1$. أما المتراجحة فتصبح $X \leq \frac{3}{2}$ أي $x \leq \frac{\ln 3}{\ln 2} - 1$.

③ بوضع $X = 3^x$ تصبح المعادلة $3X + \frac{2}{X} = 7$ أو $X \in \{2, \frac{1}{3}\}$ ، إذن تكافئ المعادلة المعطاة

$x \in \left\{ \frac{\ln 2}{\ln 3}, -1 \right\}$. أما المتراجحة فتصبح $3X^2 - 7X + 2 \geq 0$ (لأن $X = 3^x > 0$)، ومنه

$$.x \in]-\infty, -1] \cup \left[\frac{\ln 2}{\ln 3}, +\infty[$$

④ ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = 2^{x^2-2x}$.

① ادرس تغيرات f .

② اكتب معادلة d مماس الخط C في النقطة التي فاصلتها بعدم $f'(x)$.

③ ارسم في معلمٍ واحد المماس d ثم الخط C .

الحل


1 التابع معرف على \mathbb{R} ، وله الصيغة المكافئة $f(x) = e^{(\ln 2)(x^2 - 2x)}$. ولأن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x) = +\infty$$

استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

علاوة على ذلك لدينا $f'(x) = (2 \ln 2)(x - 1)e^{(\ln 2)(x^2 - 2x)}$ ومنه

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow \frac{1}{2}$	$\nearrow +\infty$



2 النقطة التي يعدم عندها المشتق الأول تمثل قيمة محلية صغيرة

للتابع f ، فالمماس عندها أفقي ومعادلته $y = \frac{1}{2}$.

3 الرسم. يوحي لنا الرسم الأولي وكأن الخط البياني يقبل المستقيم

الذي معادلته $x = 1$ محور تناظر. ويمكننا التيقن من ذلك بملاحظة

$$f(1 - h) = f(1 + h) \quad \text{أيًا كانت قيمة } h.$$

5 جد التابع المشتق لكل من التوابع الآتية:

$$f(x) = x^x \quad 1 \quad f(x) = 3^{x^2} \quad 2 \quad f(x) = \pi^{\ln x} \quad 3$$

الحل

$$f'(x) = (1 + \ln x)x^x \quad 1 \quad f'(x) = (2 \ln 3)x3^{x^2} \quad 2 \quad f'(x) = (\ln \pi)x^{\ln \pi - 1} \quad 3$$

6 حل في \mathbb{R} جملة المعادلتين:

$$3^x \times 3^y = 9 \quad (1)$$

$$3^x + 3^y = 4\sqrt{3} \quad (2)$$

الحل

بوضع $a = 3^x$ و $b = 3^y$ نستنتج أن a و b هما جذرا المعادلة $T^2 - 4\sqrt{3}T + 9 = 0$ إذن

$$(a, b) \in \{(\sqrt{3}, 3\sqrt{3}), (3\sqrt{3}, \sqrt{3})\}$$

ومنه $(x, y) \in \{(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})\}$

7 إذا علمت أن $a > 0$ و $b > 0$ ، فهل صحيح أن $a^{\ln b} = b^{\ln a}$ ؟

الحل

هذا صحيح لأن كلا المقدارين يساوي $e^{(\ln a)(\ln b)}$.

⑧ ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x \cdot 2^{-x}$. ادرس تغيرات f وارسم خطه البياني.

الحل


التابع معرّف على \mathbb{R} ، وله الصيغة المكافئة $f(x) = x \cdot e^{-(\ln 2)x}$. ولدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} Xe^{-X} = 0$. فمحور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب في جوار $+\infty$.

علاوة على ذلك لدينا $f'(x) = (1 - (\ln 2)x)2^{-x}$ ومنه

x	$-\infty$	$\frac{1}{\ln 2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e \ln 2}$	$\searrow 0$

وهذا يتيح لنا رسم الخط البياني المطلوب، وهو يمر بالمبدأ حيث مماسه هو منصف الربع الأول.

الرسم مبين جانباً.



⑨ ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = 4^x - 2^{x+2}$.

① ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها.

② ارسم C .

الحل


التابع معرّف على \mathbb{R} ، وله الصيغة المكافئة

$$f(x) = 2^x(2^x - 4) = e^{(2 \ln 2)x} - 4 \cdot e^{(\ln 2)x}$$

لدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ فمحور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب في جوار $-\infty$. وكذلك

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty \text{ استنتجنا أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

علاوة على ذلك لدينا $f'(x) = 2(\ln 2) \cdot 2^x(2^x - 2)$ وهو يعدم فقط عند $x = 1$. ومنه جدول التغيرات الآتي:




x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	0	$\searrow -4$	$\nearrow +\infty$

وهذا يتيح لنا رسم الخط البياني المطلوب، وهو يقطع محور الفواصل في النقطة التي فاصلتها $x = 2$.

⑩ ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = (1-x) \times 2^x$. ادرس تغيرات f وارسم خطه البياني.

الحل

التابع معرّف على \mathbb{R} ، وله الصيغة المكافئة $f(x) = (1-x) \cdot e^{(\ln 2)x}$. ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} Xe^X = 0$. فمحور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب في جوار $-\infty$. علاوة على ذلك لدينا $f'(x) = (\ln 2 - 1 - (\ln 2)x)2^x$ ومنه



x	$-\infty$	$1 - \frac{1}{\ln 2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	0	$\nearrow \frac{2}{e \ln 2}$	$\searrow -\infty$

وهذا يتيح لنا رسم الخط البياني المطلوب جانباً، وهو يمر بالنقطة $(1,0)$ حيث مماسه هو المستقيم الذي معادلته $y = 2 - 2x$.

تَدْرِبْ صفحة 205

① حلّ المعادلات التفاضلية الآتية:

$$\begin{aligned} y' + 2y &= 0 & \text{②} & & y' &= 3y & \text{①} \\ 2y' + 3y &= 0 & \text{④} & & 3y' &= 5y & \text{③} \end{aligned}$$

الحل

$$y = ke^{-\frac{3}{2}x} \quad \text{④} \quad y = ke^{\frac{5}{3}x} \quad \text{③} \quad y = ke^{-2x} \quad \text{②} \quad y = ke^{3x} \quad \text{①}$$

② في كلّ حالة عيّن حل المعادلة التفاضلية الذي يحقق الشرط المعطى:

$$\begin{aligned} y' &= 2y, \text{ والحل } f \text{ يحقق الشرط } f(0) = 1 & \text{①} \\ y' + 5y &= 0, \text{ والخط البياني } C \text{ للحل يمر بالنقطة } A(-2,1) & \text{②} \\ y' + 2y &= 0, \text{ وميل المماس في النقطة التي فاصلتها } -2 \text{ من الخط البياني للحل يساوي } \frac{1}{2} & \text{③} \end{aligned}$$

الحل

$$f(x) = -\frac{1}{4}e^{-2(x+2)} \quad \text{③} \quad f(x) = e^{-5(x+2)} \quad \text{②} \quad f(x) = e^{2x} \quad \text{①}$$

③ حلّ المعادلات التفاضلية الآتية:

$$\begin{aligned} y + 3y' &= 2 & \text{②} & & y' &= 2y + 1 & \text{①} \\ 2y + 3y' - 1 &= 0 & \text{④} & & 2y' &= y - 1 & \text{③} \end{aligned}$$

الحل

$$y = \frac{1}{2} + ke^{-2x/3} \quad \text{④} \quad y = 1 + ke^{x/2} \quad \text{③} \quad y = 2 + ke^{-x/3} \quad \text{②} \quad y = -\frac{1}{2} + ke^{2x} \quad \text{①}$$

أنشطة

نشاط 1 إحاطة العدد النيري e

نهتم في هذا النشاط بإحاطة العدد النيري e باستعمال متتاليات، ونهتم بسرعة تقارب هذه المتتاليات.

1 إحاطة العدد e

ليكن f التابع المعرف على $]-1, +\infty[$ بالصيغة $f(x) = \ln(1+x) - x$.

① ادرس تغيرات التابع f ، واستنتج أن $\ln(1+x) \leq x$ في حالة $x > -1$.

② ليكن n عدداً طبيعياً أكبر أو يساوي 2.

a. تحقق أن $\frac{1}{n}$ عنصر من $]0,1[$ ، وأن $\frac{-1}{1+n}$ عنصر من $]-1,0[$.

b. بالاستفادة من نتيجة ① استنتج أن

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \quad \text{ومن ثم} \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$$

$$\ln\left(\frac{n}{n+1}\right) \leq -\frac{1}{n+1} \quad \text{ومن ثم} \quad \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq \frac{1}{n+1} \quad \text{وأخيراً} \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \geq e$$

$$(*) \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

③ ليكن n عدداً طبيعياً موجباً تماماً. وليكن g و h التابعين المعرفين على $[0,1]$ وفق

$$g(x) = e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right)$$

$$h(x) = g(x) + e^{-x} \frac{x^{n+1}}{n(n!)}$$

a. ادرس اطراد كل من التابعين g و h على $[0,1]$ ، واستنتج أن $h(1) \geq 1 \geq g(1)$.

b. استنتج أن

$$(**) \quad 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq e \leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n \cdot (n!)}$$

2 تطبيق

لنتأمل المتتاليتين $(u_n)_{n \geq 1}$ و $(v_n)_{n \geq 1}$ الآتيتين: $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ و $v_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$.

① أثبت أن $0 \leq e - u_n \leq \frac{u_n}{n} \leq \frac{3}{n}$ بالاعتماد على (*).

② استنتج من (**). أن $0 \leq e - v_n \leq \frac{1}{n(n!)}$. أي المتتاليتين أفضل لحساب تقريب للعدد e ؟

① هذا سؤال تقليدي، ومررنا به سابقاً، نترك تفاصيله إلى القارئ.

② باختيار $x = \frac{1}{n}$ في المتراجحة $\ln(1+x) \leq x$ نستنتج أنّ $\ln(1 + \frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$ أي $\ln((1 + \frac{1}{n})^n) \leq 1$

ومنه $(1 + \frac{1}{n})^n \leq e$. ثمّ باختيار $x = \frac{-1}{n+1}$ في المتراجحة نفسها نجد $\ln(1 - \frac{1}{n+1}) \leq -\frac{1}{n+1}$ وهذا يكافئ $\ln(\frac{n}{n+1}) \leq -\frac{1}{n+1}$ أو $\ln(\frac{n+1}{n}) = -\ln(\frac{n}{n+1}) \leq \frac{1}{n+1}$ أي $1 \leq \ln(1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ ومن ثمّ $e \leq (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$. فنكون قد أثبتنا صحة (*).

③ نلاحظ أولاً أنّ

$$\begin{aligned} g'(x) &= e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \cdots + \frac{x^n}{n!} \right)' - e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) \\ &= e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right) - e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!} \right) \\ &= -\frac{x^n}{n!} e^{-x} \end{aligned}$$

إذن $g'(x)$ سالب على المجال $[0,1]$ فالتابع g متناقص على المجال $[0,1]$.

من ناحية أخرى، لأنّ $h(x) = g(x) + e^{-x} \frac{x^{n+1}}{n(n!)}$ استنتجنا أنّ

$$\begin{aligned} h'(x) &= g'(x) - e^{-x} \frac{x^{n+1}}{n(n!)} + \frac{(n+1)x^n}{n(n!)} e^{-x} \\ &= -\frac{x^n}{n!} e^{-x} - e^{-x} \frac{x^{n+1}}{n(n!)} + \frac{(n+1)x^n}{n(n!)} e^{-x} \\ &= \frac{x^n e^{-x}}{n(n!)} (-n - x + n + 1) = \frac{x^n e^{-x}}{n(n!)} (1 - x) \end{aligned}$$

إذن $h'(x)$ موجب على المجال $[0,1]$ فالتابع h متزايد على المجال $[0,1]$. إذن

$$h(1) \geq h(0) = 1 = g(0) \geq g(1)$$

وتنتج المتراجحة (***) من $h(1) \geq 1 \geq g(1)$ بضرب الطرفين بالعدد e .

② نستنتج من (*) أنّ $\frac{1}{n} u_n = \frac{1}{n} (1 + \frac{1}{n})^n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1} - (1 + \frac{1}{n})^n = \frac{1}{n} (1 + \frac{1}{n})^n = \frac{1}{n} u_n$ وبتنتج

$$. u_n \leq e \leq (1 + \frac{1}{5})^6 < 3 \text{ أو } u_n \leq e < 3$$

② هذه مجرد عملية طرح، ولكن النتيجة مهمة؛ فإذا أردنا حساب e لثلاثة أرقام بعد الفاصلة أي بخطأ

أصغر تماماً من 10^{-3} علينا حساب u_{3000} ، في حين يكفي أن نحسب v_6 لنحصل على المطلوب. إذن

المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$ أسرع تقارباً من $(u_n)_{n \geq 1}$ نحو العدد e .

مُربّيات ومساائل

1 في كلٍ من الحالات الآتية، احسب التابع المشتق للتابع f على المجموعة I المشار إليها.

$I =]0, +\infty[$, $f(x) = e^{-x} \ln x$ ②	$I = \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 2x)e^x$ ①
$I = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ $f(x) = \frac{1}{x}e^x$ ④	$I = \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x}$ ③
$I = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = xe^{1/x}$ ⑥	$I = \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x - 1}{1 + e^{-x}}$ ⑤
$I =]0, +\infty[$, $f(x) = e^{x \ln x}$ ⑧	$I = \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1 + e^x)$ ⑦
$I = \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(e^{2x} - e^x + 1)$ ⑩	$I = \mathbb{R}$, $f(x) = (\sin x + \cos x)e^x$ ⑨

الحل

$$f'(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{x} - \ln x \right) \quad ② \quad f'(x) = (x^2 - 2)e^x \quad ①$$


$$f'(x) = \frac{x-1}{x^2} e^x \quad ④ \quad f'(x) = -(x^2 - 3x + 2)e^{-x} \quad ③$$

$$f'(x) = \frac{x-1}{x} e^{1/x} \quad ⑥ \quad f'(x) = \frac{(e^{3x} + e^x + 2)}{(e^x + 1)^2} \quad ⑤$$

$$f'(x) = x^x (\ln x + 1) \quad ⑧ \quad f'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} \quad ⑦$$

$$f'(x) = \frac{2e^{2x} - e^x}{e^{2x} - e^x + 1} \quad ⑩ \quad f'(x) = 2e^x \cos x \quad ⑨$$


2 C هو الخط البياني لتابع f معرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = (ax + b)e^{-x}$ ، حيث a و b عدنان



حقيقيان. اعتماداً على ما تجد في الشكل:

- ① احسب قيمة كلٍ من a و b .
- ② احسب $f'(x)$ ، واستنتج إحداثيتي النقطة A الموافقة للقيمة الكبرى للتابع f .
- ③ أثبت أنّ محور الفواصل مقارب للخط C في جوار $+\infty$.

- ① من الشكل نلاحظ أنّ $f(-2) = 0$ و $f(0) = 2$ ومنه $a = 1$ و $b = 2$.
- ② لدينا $f(x) = (x+2)e^{-x}$ ومنه $f'(x) = -(x+1)e^{-x}$. والتابع يبلغ قيمة حدية كبرى عند $x = -1$ تساوي $f(-1) = e$.
- ③ هذا واضح لأنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ يقتضي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- 3 ارسم الخط البياني C للتابع الأسّي exp. ثمّ استنتج رسم الخط البياني لكلّ من التوابع الآتية:
- ① $f : x \mapsto e^x - 2$ ② $g : x \mapsto 1 - e^x$ ③ $h : x \mapsto |1 - e^x|$




4 ليكن C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$.

- ① ما نهاية f عند كلّ من طرفي مجموعة تعريفه؟
- ② ادرس تغيرات f وارسم C .
- ③ هو التابع المعرفة على \mathbb{R} وفق $g(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$. أثبت أنّ $g(x) = f(-x)$ ، ثم استنتج رسم الخط البياني للتابع g انطلاقاً من C .

- ① لما كان $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.
- ② نستنتج مما سبق أنّ C يقبل محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيماً مقارباً في جوار $+\infty$ ، والمستقيم الذي معادلته $y = 1$ مستقيماً مقارباً في جوار $-\infty$. وعلاوة على ذلك التابع الأسّي متزايداً تماماً ويأخذ قيمه في \mathbb{R}_+ والتابع $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ متناقصٌ تماماً على \mathbb{R}_+ إذن f تابعٌ متناقصٌ تماماً على \mathbb{R} ، ومنه جدول التغيرات الآتي:

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	1	0

- ③ واضحٌ أنّ $g(x) = f(-x)$ أيّاً كانت قيمة x إذن C_g هو نظير C_f بالنسبة إلى محور الترتيب. ومنه الرسم البياني المبين أدناه.



- 5 في الحالات الآتية بين أنّ الخطّ البياني C للتابع f المعطى على \mathbb{R} يقبل مُقارباً مائلاً d ، عيّنه وادرس الوضع النسبي لهذا الخط بالنسبة إلى d .

$$f(x) = x + 2 + xe^x \quad \text{③} \quad f(x) = x + 1 + 4e^{-x} \quad \text{②} \quad f(x) = x - 1 + e^{-2x} \quad \text{①}$$

- ① نلاحظ أنّ $g(x) = f(x) - (x - 1) = e^{-2x}$ يحقق $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. إذن المستقيم d الذي معادلته $y = x - 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C في جوار $+\infty$. وعلاوة على ذلك، لأنّ $g(x) > 0$ أيّاً كانت x ، استنتجنا أنّ C يقع دوماً فوق d .
- ② نلاحظ أنّ $g(x) = f(x) - (x + 1) = 4e^{-x}$ يحقق $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. إذن المستقيم d الذي معادلته $y = x + 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C في جوار $+\infty$. وعلاوة على ذلك، لأنّ $g(x) > 0$ أيّاً كانت x ، استنتجنا أنّ C يقع دوماً فوق d .
- ③ نلاحظ أنّ $g(x) = f(x) - (x + 2) = xe^x$ يحقق $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$. إذن المستقيم d الذي معادلته $y = x + 2$ مستقيم مقارب للخط البياني C في جوار $-\infty$. وعلاوة على ذلك، لأنّ إشارة $g(x)$ تماثل إشارة x ، استنتجنا أنّ C يقع فوق d على $]0, +\infty[$ ، ويقع تحته على $]-\infty, 0[$.

6

بين أن الخط البياني C للتابع f المعطى على \mathbb{R} بالصيغة $f(x) = \ln(3 + e^x)$ يقبل خطين مقاربتين أحدهما أفقي والآخر مائل يُطلب تعيينهما.

الحل

لما كان $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln(3)$ ، فالمستقيم الذي معادلته $y = \ln(3)$ مستقيم مقارب أفقي للخط البياني للتابع f في جوار $-\infty$.

أما في جوار $+\infty$ ، فيكون العدد 3 صغيراً جداً أمام e^x ومن ثم نتوقع أن يكون $\ln(e^x + 3)$ قريباً من $\ln(e^x) = x$ ، وللتأكد من صحة توقعنا نتأمل الفرق $g(x) = f(x) - x$ فنلاحظ أن

$$\begin{aligned} g(x) &= \ln(e^x + 3) - x = \ln(e^x + 3) - \ln(e^x) \\ &= \ln\left(\frac{e^x + 3}{e^x}\right) = \ln(1 + 3e^{-x}) \end{aligned}$$

ولما كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \ln(1) = 0$ ، إذن المستقيم الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للخط البياني للتابع f في جوار $+\infty$.

7

ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \frac{2e^x - 3}{e^x + 1}$.

- ① لماذا المستقيمان d_1 الذي معادلته $y = 2$ و d_2 الذي معادلته $y = -3$ مقاربان للخط C ؟
- ② ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.
- ③ اكتب معادلة المماس T للخط البياني C في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب.
- ④ ادرس وضع C بالنسبة إلى T م ارسم في معلم متجانس d_1 و d_2 و T و C .

الحل

① نعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ و $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{2X - 3}{X + 1} = 2$ ، اعتماداً على خاصية نهاية تابع مركب نستنتج

أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ ، فالمستقيم d_1 الذي معادلته $y = 2$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع C في

جوار $+\infty$. وكذلك لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$ ، فالمستقيم d_2 الذي معادلته

$y = -3$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع C في جوار $-\infty$.

② نلاحظ بسهولة أن $f'(x) = \frac{5e^x}{(e^x + 1)^2}$ وهو موجب دوماً، فالتابع f متزايداً تماماً على \mathbb{R} . ومنه

جدول التغيرات الآتي:

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	-3	2

③ يتقاطع C مع محور الترتيب في النقطة $(0, -\frac{1}{2})$ ، وميل المماس عندها $f'(0) = \frac{5}{4}$ إذن معادلة


المماس T في نقطة التقاطع مع محور الترتيب هي $y = -\frac{1}{2} + \frac{5}{4}x$.

④ لتأمل الفرق $g(x) = f(x) - (-\frac{1}{2} + \frac{5}{4}x)$ فنلاحظ أن

$$g(x) = \frac{5}{2} \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} - \frac{x}{2} \right)$$

ومنه

$$g'(x) = \frac{5}{2} \left(\frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} - \frac{1}{2} \right) = -\frac{5}{4} \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2$$



إذن g' سالب على \mathbb{R} ، والتابع g متناقص تماماً عليها. ولكن $g(0) = 0$ إذن $g(x) > 0$ على $]-\infty, 0[$ و $g(x) < 0$ على $]0, +\infty[$. فالخط البياني C يكون فوق المماس T على $]-\infty, 0[$ وتحتة على $]0, +\infty[$.


⑧ ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = (x-1)e^x$. ادرس نهايات التابع عند أطراف مجموعة تعريفه، وادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها، ثم ارسم C .

الحل

■ ولدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، أما في جوار اللانهاية السالبة فنكتب $f(x) = e^X X$ حيث

$X = x - 1$. ولكن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1) = -\infty$ وكذلك $\lim_{x \rightarrow -\infty} X e^X = 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

نستنتج أن محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للخط C في جوار $-\infty$.



■ نلاحظ أن $f'(x) = x e^x$ ، وهذا يتيح لنا كتابة جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$	0	$\searrow -1$	$\nearrow +\infty$

ومنه الخط البياني C للتابع f المبين جانباً.

⑨ ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = e^x - x$.

① جد نهاية f عند أطراف مجموعة تعريفه.

② بيّن أن المستقيم d الذي معادلته $y = -x$ مقارب للخط C ؟

③ ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها، ثم ارسم d و C .


الحل

① لما كان $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = +\infty$ ، وكذلك لأنّ $f(x) = e^x(1 - xe^{-x})$

و $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

② بوضع $g(x) = f(x) + x = e^x$ نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$. إذن المستقيم d الذي معادلته

$y = -x$ مستقيم مقارب للخط البياني C في جوار $-\infty$. وعلاوة على ذلك، لأنّ $g(x) > 0$ أيّاً كانت x ، استنتجنا أنّ C يقع دوماً فوق d .



③ نلاحظ أنّ $f'(x) = e^x - 1$ وهو ينعدم فقط عند $x = 0$ ، وهذا

يتيح لنا كتابة جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	\searrow 1 \nearrow	$+\infty$

ومنه الخط البياني C للتابع f المبين جانباً .

⑩ ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x + 1}$.

- ① جد نهاية f عند أطراف مجموعة تعريفه .
- ② أثبت أنّ المستقيم d الذي معادلته $y = x - 1$ مقارب مائل للخط C في جوار $+\infty$.
- ③ أثبت أنّ المستقيم d' الذي معادلته $y = x + 3$ مقارب مائل للخط C في جوار $-\infty$.
- ④ ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها .
- ⑤ اكتب معادلة المماس T للخط البياني C في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب .
- ⑥ ادرس وضع C بالنسبة إلى T . ثم ارسم في معلم متجانس d و d' و T و C .

الحل

① لما كان $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ، وكذلك نجد $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

② بوضع $g(x) = f(x) - (x - 1) = \frac{4}{e^x + 1}$ نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. إذن المستقيم d الذي

معادلته $y = x - 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C في جوار $+\infty$. وعلاوة على ذلك، لأنّ $g(x) > 0$ أيّاً كانت x ، استنتجنا أنّ C يقع دوماً فوق d .

③ بوضع $h(x) = f(x) - (x + 3) = -\frac{4e^x}{e^x + 1}$ نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$. إذن المستقيم d'

الذي معادلته $y = x + 3$ مستقيم مقارب للخط البياني C في جوار $-\infty$. وعلاوة على ذلك، لأنّ $h(x) < 0$ أيّاً كانت x ، استنتجنا أنّ C يقع دوماً تحت d' .


④ نلاحظ أنّ $f'(x) = 1 - 4 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2}$ وهو ينعدم فقط عند $x = 0$ ، دون أن يغير

إشارته الموجبة. وهذا يتيح لنا كتابة جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

⑤ واضح أنّ $f(0) = 1$ و $f'(0) = 0$. إذن معادلة المماس T للخط البياني C في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب هي $y = 1$.

⑥ التابع f متزايداً تماماً ويحقق $f(0) = 1$ ، إذن $f(x) < 1$ في حالة $x < 0$ و $f(x) > 1$ في حالة $x > 0$. وهذا يبرهن أنّ C يقع تحت T على $]-\infty, 0[$ وفوقه على $]0, +\infty[$ ، ومنه الرسم المبين.



11 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = 2e^x - x - 2$.

- ① جد نهاية f عند أطراف مجموعة تعريفه.
- ② ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.
- ③ استنتج من ② أنّ للمعادلة $f(x) = 0$ جذرين، أحدهما يساوي الصفر.
- ④ نرسم إلى الجذر الآخر للمعادلة $f(x) = 0$ بالرمز α . أثبت أنّ $-2 < \alpha < -1$.
- ⑤ ادرس إشارة $f(x)$ تبعاً لقيم x .

الحل


① لما كان $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. وكذلك لأنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$

استنتجنا من المساواة $f(x) = e^x(2 - xe^{-x}) - 2$ أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

② نلاحظ أنّ $f'(x) = 2e^x - 1$ وهو ينعدم فقط عند $x = -\ln 2$ ، وهذا يتيح لنا كتابة جدول التغيرات الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	$-\ln 2$	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	$-1 + \ln 2$	\nearrow	$+\infty$

③ نستنتج من جدول التغيرات أنّ التابع متناقص تماماً على $]-\infty, -\ln 2[$ وبغير إشارته على هذا المجال فيوجد جذر وحيد α ينتمي إلى $]-\infty, -\ln 2[$ للمعادلة $f(x) = 0$. وبالمثل نرى أنّ التابع f متزايداً تماماً على $]-\ln 2, +\infty[$ وبغير إشارته على هذا المجال فيوجد جذر وحيد β ينتمي إلى $]-\ln 2, +\infty[$ للمعادلة $f(x) = 0$. وأخيراً لمّا كان $f(0) = 0$ استنتجنا أنّ $\beta = 0$.



④ نلاحظ أنّ $f(-1) = 2e^{-1} - 1 < 0$ و $f(-2) = 2e^{-2} > 0$ ، إذن $-2 < \alpha < -1$.

⑤ التابع f تابع مستمرّ ينعدم فقط عند 0 و α ، فهو يحافظ على إشارة ثابتة على كل مجال من $\mathbb{R} \setminus \{\alpha, 0\}$ ، وتحديداً لدينا

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$			
$f(x)$	$+\infty$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+\infty$



لنتعلم البحث معاً

12 مماسات مشتركة

ليكن C_L و C_E الخطان البيانيان للتابعين الأسّي \exp واللوغاريتمي \ln بالترتيب. أيقبل هذان الخطان مماسات مشتركة؟

نحو الحل

لنرسم الخطين C_L و C_E ثم لنأملهما. كم مماساً مشتركاً لهذين الخطين برأيك؟ حاول أن ترسم مماسين مشتركين أترى غيرهما؟

لنتأمل مماساً T_E يمس C_E في النقطة $A(a, e^a)$ ، ومماساً T_L يمس C_L في النقطة $B(b, \ln b)$ ، $b > 0$. ثم لنبحث عن الشروط على a و b التي يجب أن يحققها كي ينطبق المستقيمان T_E و T_L .

1. اكتب بالصيغة $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ معادلةً للمستقيم T_E وأخرى للمستقيم T_L .
2. أثبت إذن أنّ العبارتين الآتيتين متكافئتان:

$$e^{-a} = \frac{a-1}{a+1} \text{ و } b = e^{-a} \quad \text{②} \quad \text{① المستقيمان } T_L \text{ و } T_E \text{ منطبقان}$$

يبقى علينا معرفة إن كان ثمة عدد حقيقي a يحقق $e^{-a} = \frac{a-1}{a+1}$. لا تُحل هذه المعادلة جبرياً.

هذا يدفعنا للتفكير بدراسة التابع f المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ وفق $f(x) = e^{-x} - \frac{x-1}{x+1}$.

1. ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.
2. استنتج أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلين فقط a_1 و a_2 .
3. أثبت أن

$$f(-x) + \frac{x+1}{x-1} \cdot e^x f(x) = 0 \text{ في حالة } x \notin \{1, -1\}$$

ثمّ بين أن $a_1 = -a_2$.

أنجز الحلّ واكتبه بلغة سليمة.

الحل

هذه محاولة مطلوبة من القارئ، الهدف منها إعطاء فكرة عما نريد البحث عنه.

1. معادلة T_E هي $y = e^a + e^a(x-a)$ أو $e^a x - y + e^a(1-a) = 0$ ومعادلة T_L هي

$$y = \ln b + \frac{1}{b}(x-b) \text{ أو } \frac{1}{b}x - y + \ln b - 1 = 0$$

2. وعليه ينطبق المستقيمان T_E و T_L إذا تناسبت أمثالهما، أي إذا تحقق الشرطان

$$e^a(1-a) = \ln b - 1 \text{ و } e^a = \frac{1}{b}$$

ولكن المساواة الأولى تقتضي $\ln b = -a$ فتصبح الثانية $(a+1)e^{-a} = a-1$ ولأن $a = -1$ ليس حلاً لهذه المعادلة استنتجنا أن المستقيمين T_E و T_L ينطبقان إذا وفقط إذا تحقق الشرطان:

$$e^{-a} = \frac{a-1}{a+1} \text{ و } b = e^{-a}$$

1. من الواضح أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$ فالخط البياني للتابع f يقبل مقارباً

المستقيم الذي معادلته $y = -1$ في جوار $+\infty$. وكذلك

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$$

فالمستقيم الذي معادلته $x = -1$ مستقيم مقارب شاقولي للخط البياني للتابع f . وعلاوة على ذلك لدينا

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{2}{(x+1)^2}$$

فالتابع f' سالبٌ دوماً، ومنه جدول التغيرات الآتي:


x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		-	-
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	$+\infty$
		$-\infty$	\searrow
			-1

2. نستنتج من جدول التغيرات أنّ التابع متناقص تماماً على $]-\infty, -1[$ ويغير إشارته على هذا المجال فيوجد جذر وحيد a_1 ينتمي إلى $]-\infty, -1[$ للمعادلة $f(x) = 0$. وبالمثل نرى أنّ التابع f متناقص تماماً على $]-1, +\infty[$ ويغير إشارته على هذا المجال فيوجد جذر وحيد a_2 ينتمي إلى $]-1, +\infty[$ للمعادلة $f(x) = 0$. إذن تقبل المعادلة $f(x) = 0$ حلين هما a_1 و a_2 .

3. نفترض أنّ $x \notin \{-1, 1\}$ ونحسب

$$\begin{aligned} f(-x) + \frac{x+1}{x-1} \cdot e^x f(x) &= \left(e^x - \frac{-x-1}{-x+1} \right) + \frac{x+1}{x-1} \cdot e^x \left(e^{-x} - \frac{x-1}{x+1} \right) \\ &= e^x - \frac{x+1}{x-1} + \frac{x+1}{x-1} - e^x = 0 \end{aligned}$$

وعليه نستنتج من كون $f(a_1) = 0$ وبالإستفادة من المساواة السابقة- أنّ $f(-a_1) = 0$ ولكن $-a_1 \in]-1, +\infty[$ لأنّ $a_1 < -1$ ، وعلى هذا، كلّ من a_1 و a_2 جذر للمعادلة $f(x) = 0$ في المجال $]-1, +\infty[$ ، ولأننا أثبتنا أنّ لهذه المعادلة جذراً وحيداً في هذا المجال استنتجنا أنّ $a_2 = -a_1$.



13 تابع القوة

ليكن α عدداً حقيقياً غير معدوم. نهدف إلى دراسة التابع P_α المعرف على $]0, +\infty[$ بالصيغة

$$P_\alpha(x) = x^\alpha$$

نحو الحل

تذكّر أنّ $P_\alpha(x) = e^{\alpha \ln x}$ فالتابع P_α من النمط $x \mapsto e^{u(x)}$ حيث $u(x) = \alpha \ln x$.

1. عيّن، تبعاً لإشارة α ، جهة اطراد التابع u ، واستنتج جهة اطراد P_α .
2. ادرس تبعاً لإشارة α نهاية P_α عند طرفي مجموعة تعريفه. وبيّن أنّه في حالة $\alpha > 0$ يمكننا أن نعرّف $P_\alpha(0) = 0$ فنحصل على تابع مستمرّ على $]0, +\infty[$ في هذه الحالة.

لندرس اشتقاقية التابع P_α . ✂

1. أثبت أنّ P_α اشتقاقي على $]0, +\infty[$ وأنّ $P'_\alpha = \alpha P_{\alpha-1}$ أو كما جرت العادة أن نكتب $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

2. نفترض أنّ $0 < \alpha < 1$. وأتينا عرّفنا في هذه الحالة $P_\alpha(0) = 0$. احسب نهاية نسبة التغير $x \mapsto t(x) = \frac{P_\alpha(x) - P_\alpha(0)}{x}$ عند الصفر. ماذا تستنتج؟

3. أعد السؤال السابق في حالة نفترض أنّ $1 < \alpha$.

✂ أثبت $P_\alpha \circ P_\beta = P_{\alpha\beta}$. وبوجه خاص $P_{1/\alpha}$ هو التقابل العكسي للتابع P_α . في حالة عدد طبيعي موجب تماماً n نسمي التابع $P_{1/n}$ تابع الجذر من المرتبة n ، ونرمز عادة إلى $x^{1/n}$ بالرمز $\sqrt[n]{x}$ ، فيكون $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ التقابل العكسي للتابع $x \mapsto x^n$ المعرفين على المجال $]0, +\infty[$.
✂ مقارنة تابع القوة بالتابعين الأسّي واللوغاريتمي.

1. أثبت أنّه في حالة $\alpha > 0$ يكون $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} (x^\alpha \ln x) = 0$

2. أثبت أنّه في حالة $\alpha > 0$ يكون $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^\alpha e^{-x}) = 0$

✍ أنجز الحلّ واكتبه بلغة سليمة.

الحل

✂ 1. التابع اللوغاريتمي متزايداً تماماً إذن في حالة $\alpha > 0$ يكون $x \mapsto \alpha \ln x$ متزايداً تماماً، ومن ثمّ يكون $P_\alpha : x \mapsto e^{\alpha \ln x}$ متزايداً تماماً. أمّا في حالة $\alpha < 0$ فيكون $x \mapsto \alpha \ln x$ متناقصاً تماماً، ومن ثمّ يكون $P_\alpha : x \mapsto e^{\alpha \ln x}$ متناقصاً تماماً أيضاً.

2. في حالة $\alpha < 0$ لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha \ln x = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha \ln x = +\infty$ ومن ثمّ

$$\lim_{x \rightarrow 0} P_\alpha(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P_\alpha(x) = 0$$

و في حالة $\alpha > 0$ لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha \ln x = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha \ln x = -\infty$ ومن ثمّ

$$\lim_{x \rightarrow 0} P_\alpha(x) = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P_\alpha(x) = +\infty$$

فإذا عرّفنا في هذه الحالة $P_\alpha(0) = 0$ كان $\lim_{x \rightarrow 0} P_\alpha(x) = P_\alpha(0) = 0$ وصار P_α مستمراً على $]0, +\infty[$ في هذه الحالة.

✂ 1. التابع $u : x \mapsto u(x) = \alpha \ln x$ اشتقاقي على $]0, +\infty[$ إذن التابع $x \mapsto e^{u(x)}$ أيضاً اشتقاقي على المجال ذاته ومشتقه

$$P'_\alpha(x) = u'(x)e^{\alpha \ln x} = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x} = \alpha e^{-\ln x} e^{\alpha \ln x} = \alpha e^{(\alpha-1)\ln x} = \alpha P_{\alpha-1}(x)$$

2. في حالة $0 < \alpha < 1$ لدينا

$$t(x) = \frac{P_\alpha(x) - P_\alpha(0)}{x} = x^{\alpha-1}$$

ولأن $\alpha - 1 < 0$ نستنتج أن $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = +\infty$ ، فالتابع ليس اشتقاقياً في هذه الحالة عند الصفر، ولكن لخطه البياني مماس شاقولي في النقطة $(0, 0)$.

3. أما في حالة $\alpha > 1$ فلدينا

$$t(x) = \frac{P_\alpha(x) - P_\alpha(0)}{x} = x^{\alpha-1}$$

ولأن $\alpha - 1 > 0$ نستنتج أن $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = 0$ ، فالتابع P_α في هذه الحالة اشتقافي عند الصفر ومشتقه معدوم عند الصفر. أي تبقى العلاقة $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ صحيحة في هذه الحالة على $[0, +\infty[$.

في حالة $x > 0$ لدينا

$$P_\alpha(P_\beta(x)) = \exp(\alpha \ln(e^{\beta \ln x})) = \exp(\alpha \beta \ln x) = P_{\alpha\beta}(x)$$

وهي تكتب بالصيغة المألوفة $(x^\beta)^\alpha = x^{\alpha\beta}$.

في حالة $\alpha > 0$ لدينا $\frac{\ln x}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\ln x^\alpha}{x^\alpha}$ ، ولكن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$ و $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$ إذن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$$

وكذلك لأن $x^\alpha \ln x = -\frac{\ln t}{t^\alpha}$ حيث $t = \frac{1}{x}$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln x = -\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha} = 0$.

ومن جهة أخرى نعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ إذن في حالة $\alpha > 0$ لدينا أيضاً $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x/\alpha}}{x} = +\infty$ ،

ولأن $\lim_{X \rightarrow +\infty} P_\alpha(X) = +\infty$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{x/\alpha}}{x}\right)^\alpha = +\infty$ وهذا يكافئ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$

$$\text{أو } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$$



قُدماً إلى الأمام

14 حل كلاً من المعادلات أو المتراجحات الآتية:

$$e^x + \frac{e}{e^x} = 1 + e \quad (5)$$

$$e^{3x} - (e^2 - 1)e^{2x} = e^{x+2} \quad (6)$$

$$\frac{e^x - 1}{e^{2x} + 1} < \frac{e^x - 2}{e^x + 2} \quad (7)$$

$$\frac{e^{-x} - 1}{e^x - 1} = -2 \quad (1)$$

$$4e^{2x} + e^{-2x} \leq 5 \quad (2)$$

$$e^{3x+1} + 4e^{2x+1} - 5e^{x+1} = 0 \quad (3)$$

$$e^{2x} - 3e^{x+1} + 2e^2 = 0 \quad (4)$$

الحل

$$\begin{array}{ll} x \in \{0,1\} & \textcircled{5} \quad x = -\ln 2 & \textcircled{1} \\ x = 2 & \textcircled{6} \quad x \in]-\ln 2, 0[& \textcircled{2} \\ x > \ln 3 & \textcircled{7} \quad x = 0 & \textcircled{3} \\ & & x = \{1, 1 + \ln 2\} & \textcircled{4} \end{array}$$

15 في كل حالة آتية، جد الحل المشترك لجملتي المعادلتين.

$$\begin{cases} x + y = 1 & \textcircled{3} \\ 3e^x - e^{y+3} - 2e^2 = 0 & \end{cases} \quad \begin{cases} e^{4x}e^y = \frac{1}{e^2} & \textcircled{2} \\ xy = -2 & \end{cases} \quad \begin{cases} e^x - \frac{1}{e}e^y = 1 & \textcircled{1} \\ 2e^x + e^y = 4 + e & \end{cases}$$

الحل

$$(x, y) = (2, -1) \quad \textcircled{3} \quad (x, y) \in \{(-1, 2), \{\frac{1}{2}, -4\}\} \quad \textcircled{2} \quad (x, y) = (\ln 2, 1) \quad \textcircled{1}$$

16 ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

a. بين أن التابع f فردي، ادرس تغيرات f وارسم C .

b. اكتب معادلة المماس d للخط C في المبدأ، وادرس الوضع النسبي للخط C والمستقيم d .

2. ليكن m عدداً حقيقياً. أثبت أن للمعادلة $f(x) = m$ حلاً وحيداً في \mathbb{R} . ليكن α هذا

الحل.

b. أثبت أن المعادلة $f(x) = m$ تكافئ $e^{2x} - 2me^x - 1 = 0$ ، ثم استنتج أن

$$\alpha = \ln(m + \sqrt{m^2 + 1})$$

الحل

a. 1. التابع معرف على كامل \mathbb{R} ، لدينا $f(-x) = \frac{1}{2}(e^{-x} - e^x) = -\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = -f(x)$

فالتابع فردي. وخطه البياني متناظر بالنسبة إلى المبدأ.

ولأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ استنتجنا أن


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

من ناحية أخرى، لدينا $f'(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ وهو موجب تماماً

على \mathbb{R} ، فالتابع f متزايداً تماماً وله جدول التغيرات الآتي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 0 \nearrow$	$+\infty$

ونجد في الشكل المجاور خطه البياني C .



① **b.** لَمَّا كان $f(0) = 0$ و $f'(0) = 1$ ، استنتجنا أنّ معادلة المماس في المبدأ هي $y = x$ ، وإذا عرّفنا $g(x) = f(x) - x$ استنتجنا أنّ

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x) - 1 = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x} - 2) \\ &= \frac{1}{2e^x}(e^{2x} - 2e^x - 1) = \frac{(e^x - 1)^2}{2e^x} \end{aligned}$$

هذا يبرهن أنّ التابع $g'(x)$ موجبٌ على \mathbb{R} ولا ينعدم إلا عند $x = 0$. فالتابع g متزايدٌ تماماً، ولأنّ $g(0) = 0$ استنتجنا أنّ إشارة $g(x)$ تتفق مع إشارة x . فالخط البياني C يقع فوق المماس في المبدأ على $]0, +\infty[$ وتحتة على $] -\infty, 0[$.

② **a.** لَمَّا كان f مستمراً ومتزايداً تماماً على \mathbb{R} وكان $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ، استنتجنا أنّ $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ ، فمهما كانت قيمة m من \mathbb{R} كان للمعادلة $f(x) = m$ حلٌّ في \mathbb{R} وهذا الحل وحيدٌ لأنّ التابع f مطردٌ تماماً. ليكن α هذا الحل.

② **b.** المعادلة $f(x) = m$ تكافئ $e^x - e^{-x} = 2m$ أو $e^{2x} - 2me^x - 1 = 0$ وأخيراً

$$e^x \in \{m - \sqrt{m^2 + 1}, m + \sqrt{m^2 + 1}\}$$

ولكن $m - \sqrt{1 + m^2} \leq 0$ فلا يمكن أن يكون مساوياً للمقدار الموجب تماماً e^x ، إذن لا بدّ أن يكون $e^x = m + \sqrt{m^2 + 1}$ أو $x = \ln(m + \sqrt{m^2 + 1})$. هذا يبرهن أنّ $\alpha = \ln(m + \sqrt{m^2 + 1})$.

ملاحظة: يسمى هذا التابع: تابع الجيب الزائدي hyperbolic sine ورمزه \sinh .

① **17** ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ وفق $f(x) = e^x + \ln|x|$. وليكن g

التابع المعرفة على \mathbb{R} وفق $g(x) = xe^x + 1$.

① ادرس تغيرات g واستنتج إشارة $\frac{g(x)}{x}$ على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

② ادرس تغيرات f وارسم الخط C .

③ أثبت أنّ المعادلة $f(x) = m$ تقبل حلّين مختلفين أيّاً يكن m من \mathbb{R} .

الحل

① لَمَّا كان $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$. وكذلك نلاحظ أنّ

$g'(x) = e^x(x + 1)$ إذن إشارة $g'(x)$ تتفق مع إشارة $(x + 1)$ ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع g :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$+$
$g(x)$	1	$\searrow 1 - e^{-1}$	$\nearrow +\infty$

إذن التابع g موجبٌ تماماً على \mathbb{R} . ينتج من ذلك أنّ إشارة $\frac{g(x)}{x}$ تتفق مع إشارة x على \mathbb{R}^* .

② هنا لدينا $f(x) = e^x + \ln(x)$ في حالة $x > 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ومن ناحية أخرى،

لدينا $f(x) = e^x + \ln(-x)$ في حالة $x < 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ أيضاً.

أمّا عند الصفر، فلدينا $\lim_{x \rightarrow 0} \ln|x| = -\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ فمحور الترتيب الذي معادلته

$x = 0$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f .


نلاحظ أيضاً أنّ

$$f'(x) = \begin{cases} e^x + \frac{1}{x} & : x > 0 \\ e^x + \frac{-1}{-x} & : x < 0 \end{cases}$$

إذن $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ أيّا كانت x من \mathbb{R}^* . ولقد درسنا سابقاً إشارة

هذا المقدار لنجد:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
$f(x)$	$+\infty \searrow$	$-\infty$	$-\infty \nearrow +\infty$



ومنه الخط البياني المبين في الرسم المجاور.

③ نستنتج من جدول التغيرات أنّ $f(]-\infty, 0[) = \mathbb{R}$ ، والتابع f مستمرّ ومتناقصّ تماماً على

$]-\infty, 0[$. إذن مهما كان m فللمعادلة $f(x) = m$ حلٌّ وحيدٌ a في المجال $]-\infty, 0[$. وبالمثل نستنتج

من جدول التغيرات أنّ $f(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$ ، والتابع f مستمرّ ومتزايدٌ تماماً على $]0, +\infty[$. إذن مهما

كان m فللمعادلة $f(x) = m$ حلٌّ وحيدٌ b في المجال $]0, +\infty[$. وعليه، مهما كان m من \mathbb{R}

فللمعادلة $f(x) = m$ حلّان حقيقيان أحدهما موجبٌ تماماً والآخر سالبٌ تماماً.

ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف وفق $f(x) = \ln(e^{2x} - e^x + 1)$.

18

① تحقّق من كلّ من المقولات الآتية:

a. f معرّف على \mathbb{R} .

b. يكتب $f(x)$ بالصيغة $f(x) = 2x + \ln(1 - e^{-x} + e^{-2x})$.

c. المستقيم d الذي معادلته $y = 2x$ مقارب مائل للخط C .

d. الخط C يقبل مماساً وحيداً Δ موازياً لمحور الفواصل.

② ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها.

③ اكتب معادلة المماس T للخط البياني C في النقطة التي فاصلتها 0 منه.

④ ارسم كلاً من d و Δ و T ، ثم ارسم C في المعلم ذاته.

① a . نلاحظ أنّ $e^{2x} - e^x + 1 = (e^x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ فالمقدار $e^{2x} - e^x + 1$ موجب تماماً مهما كانت قيمة x ، والتابع f معرف على كامل \mathbb{R} .

① b . لأنّ $e^{2x} - e^x + 1 = e^{2x}(1 - e^{-x} - e^{-2x})$ إذن $f(x) = 2x + \ln(1 - e^{-x} + e^{-2x})$.

① c . بوضع $g(x) = f(x) - 2x = \ln(1 - e^{-x} + e^{-2x})$ نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \ln(1) = 0$

لأنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$. نستنتج أنّ المستقيم d الذي معادلته $y = 2x$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f في جوار $+\infty$.

① d . نجد بحساب بسيط أنّ $f'(x) = \frac{e^x(2e^x - 1)}{e^{2x} - e^x + 1}$ إذن $f'(x) = 0$ إذا وفقط إذا كان $e^x = \frac{1}{2}$ أو $x = -\ln 2$.

② لَمَّا كان $f(x) = 2x + g(x)$ حيث g معرف في ① c . استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ولقد


وجدنا أنّ المستقيم d الذي معادلته $y = 2x$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f في جوار $+\infty$ ولأنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln(1) = 0$ ، إذن محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع f في جوار $-\infty$.

علاوة على ما سبق، لقد رأينا أنّ $f'(x)$ يحافظ على إشارة ثابتة على كل من المجالين $]-\infty, -\ln 2[$ و $]-\ln 2, +\infty[$ ، ومنه جدول التغيرات الآتي:

x	$-\infty$	$-\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	0	$\searrow \ln\left(\frac{3}{4}\right)$	$\nearrow +\infty$

③ هنا $f(0) = 0$ و $f'(0) = 1$ إذن معادلة المماس T في النقطة التي فاصلتها 0 هي $y = x$.

④ الرسم.



ليكن f التابع المعرف على المجال \mathbb{R}_+^* وفق $f(x) = e^{-x}(3 + \ln x)$.

① ادرس تغيرات $g : x \mapsto e^x f'(x)$.

② استنتج دراسة تغيرات f .

الحل

① نلاحظ أنّ $g(x) = e^x f'(x) = -3 - \ln x + \frac{1}{x}$ ولدينا

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

فمحور الترتيب الذي معادلته $x = 0$ مستقيم مقارب للخط البياني للتابع g . ومن ناحية أخرى، نلاحظ

أنّ g يساوي مجموع تابعين متناقصين تماماً على \mathbb{R}_+^* هما $x \mapsto -3 + \frac{1}{x}$ و $x \mapsto -\ln x$ ، فالتابع g

متناقصٌ تماماً على \mathbb{R}_+^* . ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع g .

x	0	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$-\infty$

نلاحظ بوجه خاص أنّ التابع المستمر g متناقصٌ تماماً ويغير إشارته على المجال $]0, +\infty[$ ، فيوجد

حلٌ وحيد α للمعادلة $g(x) = 0$ ويكون $g(x) > 0$ على $]0, \alpha[$ و $g(x) < 0$ على $]\alpha, +\infty[$. وكذلك

نلاحظ أنّ $g(0.4) \approx 0.416 > 0$ و $g(0.5) \approx -0.307 < 0$ إذن $\alpha \in]0.4, 0.5[$ ، ويمكن أن نعتبر

$$\alpha \approx 0.45$$

② لدراسة f نلاحظ أولاً أنّ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ فمحور الترتيب الذي معادلته $x = 0$ مستقيم مقارب


للخط البياني للتابع f . ومن ناحية أخرى $f(x) = 3e^{-x} + \frac{x}{e^x} \cdot \frac{\ln x}{x}$ ونعلم أنّ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = 0$

و $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. فمحور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للخط

البياني للتابع f .

ومن ناحية أخرى، $f'(x) = e^{-x}g(x)$ ، وكنا قد درسنا إشارة g في الطلب السابق، ومنه جدول التغيرات

الآتي للتابع f :



x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	0

حيث $f(\alpha) \approx 1.4$. ونلاحظ أنّ الخط البياني C للتابع f يقطع

محور الفواصل عند $(e^{-3}, 0)$. ومنه الرسم البياني للتابع f .

20

ادرس تغيرات التابع f المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ بالصيغة $f(x) = \exp\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ وارسم خطه

البياني.

الحل

لما كان

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1+x}{1-x} = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1+x}{1-x} = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x}{1-x} = -1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+x}{1-x} = -1$$

استنتجنا أنّ


$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^{-1} \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = e^{-1}$$

نستنتج أنّ المستقيم الأفقي الذي معادلته $y = e^{-1}$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f . وكذلك أنّ المستقيم الذي معادلته $x = 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C ، وأخيراً أنّ النقطة $(1, 0)$ نقطة مقاربة.

من ناحية أخرى التابع $x \mapsto \frac{1+x}{1-x}$ متزايداً تماماً على كل من المجالين $]-\infty, 1[$ و $]1, +\infty[$ وعليه يكون التابع f متزايداً تماماً على كل من المجالين $]-\infty, 1[$ و $]1, +\infty[$ ، لأنّ التابع الأسّي متزايداً تماماً على \mathbb{R} . ومنه جدول التغيرات الآتي:

x	1	
$f(x)$	$e^{-1} \nearrow +\infty$	$0 \nearrow e^{-1}$

الرسم:



21

ليكن C هو الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \ln(e^{-x} + 1)$.

a. جد نهاية f عند $-\infty$ وعند $+\infty$. هل يقبل الخط C مقاربات غير مائلة؟

b. أثبت أنّ $f(x) = -x + \ln(e^x + 1)$.


c. استنتج أنّ الخط C يقبل مقارباً مائلاً، وليكن d ، في جوار $-\infty$.

② ادرس تغيرات f ونظّم جدولاً بها، ثمّ ارسم في معلم واحد d ثم C .

③ نرسم إلى نقاط C التي فواصلها 0 و 1 و -1 على التوالي بالرموز A و B و D . أثبت أنّ

مماس C في A يوازي المستقيم (BD) .

① لما كان $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$ استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ln(1) = 0$ فالخط البياني C للتابع f يقبل محور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مقارباً أفقياً. وكذلك $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ولكن $e^{-x} + 1 = e^{-x}(1 + e^x)$ إذن $f(x) = -x + \ln(1 + e^x)$ ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x) = \ln(1) = 0$. هذا يبرهن أنّ المستقيم d الذي معادلته $y = -x$ مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f في جوار $-\infty$.



② التابع $x \mapsto e^{-x} = \frac{1}{e^x} + 1$ تابع متناقص تماماً، والتابع اللوغاريتمي متزايد تماماً إذن التابع f متناقص تماماً. ومنه جدول التغيرات الآتي:

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	0

③ ميل المماس T في النقطة $A(0, \ln(2))$ يساوي $f'(0) = -\frac{1}{2}$ وميل المستقيم (BD) يساوي

$$\frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{1}{2} \ln \frac{e^{-1} + 1}{e + 1} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{e} \right) = -\frac{1}{2}$$

ولما كان للمستقيمين T و (BD) الميل نفسه استنتجنا توازيهما: $T \parallel (BD)$.

22 حل هندسي

نتأمل التابعين $f_1: x \mapsto e^x$ و $f_2: x \mapsto e^{-x}$ ، وخطاهما البيانيان C_1 و C_2 في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. يقطع المستقيم المرسوم من $A(m, 0)$ موازياً محور الترتيب الخطين C_1 و C_2 في M و N . بالترتيب.

① ارسم C_1 و C_2 .

② نرمز بالرمزين T_1 و T_2 إلى مماسي C_1 و C_2 في M و N بالترتيب. اكتب معادلة لكل من T_1 و T_2 . واستنتج أنّ T_1 و T_2 متعامدان.

③ أثبت أنّ إحداثيتي P ، نقطة تقاطع T_1 و T_2 ، هما $\left(m - \frac{e^m - e^{-m}}{e^m + e^{-m}}, \frac{2}{e^m + e^{-m}} \right)$

④ لتكن النقطة I منتصف القطعة $[MN]$.

a. احسب، بدلالة m ، إحداثيتي النقطة I .

b. جد Γ المحل الهندسي للنقطة I عندما تتحول m في \mathbb{R} .

c. ارسم مجموعة النقاط I في المعلم الذي رسمت فيه الخطين C_1 و C_2 .

5 a. احسب، بدلالة m ، مركبات الشعاعين \overrightarrow{IP} و \overrightarrow{AP} .

b. استنتج أن المستقيم (IP) مماس للخط Γ في النقطة I ، وأنّ الطول AP ثابت.

الحل

1 تذكر أنّ C_2 نظير C_1 بالنسبة إلى محور الترتيب.

2 إحدائنا M هما (m, e^m) وإحدائنا N هما (m, e^{-m}) .

■ معادلة المماس T_1 للخط C_1 في M هي $y = e^m + e^m(x - m)$.

■ معادلة المماس T_2 للخط C_2 في N هي $y = e^{-m} - e^{-m}(x - m)$.

وعلى الخصوص ميل T_1 يساوي e^m وميل T_2 يساوي $-e^{-m}$ وجداء ضرب هذين الميلين يساوي -1 ، فالمماسان متعامدان.

3 إذا كانت $P(x, y)$ هي نقطة تقاطع المستقيمين T_1 و T_2 كان

$$\begin{cases} y = e^m + e^m(x - m) \\ y = e^{-m} - e^{-m}(x - m) \end{cases}$$

وبالحل المشترك نجد

$$y_P = \frac{2}{e^m + e^{-m}} \quad \text{و} \quad x_P = m - \frac{e^m - e^{-m}}{e^m + e^{-m}}$$

4 لما كانت I منتصف $[MN]$ استنتجنا أنّ

$$y_I = \frac{e^m + e^{-m}}{2} \quad \text{و} \quad x_I = m$$

وعليه عندما تتحوّل m في \mathbb{R} ترسم I الخطّ البياني Γ للتابع $x \mapsto g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

التابع g زوجي، إذن Γ متناظرٌ بالنسبة إلى محور الترتيب، وكذلك فإنّ $g'(x)$ موجب على $]0, +\infty[$ فالتابع g متزايدٌ تماماً على $]0, +\infty[$. أمّا رسم g فبسيط استناداً إلى رسم الخطين البيانيين C_1 و C_2 .

5 نجد بحساب بسيط أنّ

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} &= (x_P - x_M, y_P - y_M) = \left(-\frac{e^m - e^{-m}}{e^m + e^{-m}}, \frac{2}{e^m + e^{-m}} \right) \\ \overrightarrow{IP} &= (x_P - x_I, y_P - y_I) = \left(-\frac{e^m - e^{-m}}{e^m + e^{-m}}, -\frac{(e^m - e^{-m})^2}{2(e^m + e^{-m})} \right) \end{aligned}$$

نحسب من \overrightarrow{IP} ميل المستقيم (IP) فنجد


$$\frac{(e^m - e^{-m})^2}{2(e^m + e^{-m})} \cdot \frac{e^m + e^{-m}}{e^m - e^{-m}} = \frac{e^m - e^{-m}}{2}$$

أما ميل المماس T للمنحني Γ في النقطة I التي فاصلتها m فيساوي $g'(m) = \frac{e^m - e^{-m}}{2}$ ،
 نستنتج أنّ كلا المستقيمين (IP) و T يمران بالنقطة I ولهما الميل نفسه $\frac{e^m - e^{-m}}{2}$ فهما منطبقان.

ومن جهة أخرى نحسب

$$AP^2 = \left(\frac{e^m - e^{-m}}{e^m + e^{-m}} \right)^2 + \left(\frac{2}{e^m + e^{-m}} \right)^2 = \frac{e^{2m} + 2 + e^{-2m}}{(e^m + e^{-m})^2} = 1$$

ف نجد أنّ طول AP يبقى ثابتاً عندما تتحوّل m .



23 ابحث عن نهاية كلٍّ من المتتاليات $(u_n)_{n \geq 0}$ الآتية:

$$u_n = \ln(2 + e^{-n}) \quad \text{3} \quad u_n = \frac{e^{2n}}{(1+n)^2} \quad \text{2} \quad u_n = \frac{e^{-n} + 1}{e^{-n} + 3} \quad \text{1}$$

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} \quad \text{6} \quad u_n = n(e^{1/n} - 1) \quad \text{5} \quad u_n = e^{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}} \quad \text{4}$$

الحل

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ln(2) \quad \text{3} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty \quad \text{2} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1}{3} \quad \text{1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = e^2 \quad \text{6} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1 \quad \text{5} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = e \quad \text{4}$$

24 المشتق من المرتبة n

ليكن f التابع المعرف وفق $f(x) = (x^2 + x - 1)e^x$. ولتكن $f^{(1)} = f'$ و $f^{(2)} = f''$ و $f^{(3)}$

و ... و $f^{(n)}$ المشتقات المتوالية للتابع f ($n \geq 1$) .

① احسب $f^{(1)}(x)$ و $f^{(2)}(x)$.

② a . أثبت أن $f^{(n)}(x) = (x^2 + a_n x + b_n)e^x$ مع $a_{n+1} = a_n + 2$ و $b_{n+1} = b_n + a_n$.

b . استنتج أن a_n و b_n أعداد عادية .

③ في هذا السؤال نريد كتابة a_n و b_n بدلالة n .

a . أثبت أن المتتالية (a_n) حسابية . استنتج كتابة a_n بدلالة n .

b . تحقق من أن $b_n = a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_2 + a_1$ (أيما يكن $n \geq 1$) ثم استنتج كتابة

b_n بدلالة n .

الحل

① هذا حساب بسيط :

$$f(x) = (x^2 + x - 1)e^x$$

$$f^{(1)}(x) = (x^2 + 3x)e^x$$

$$f^{(2)}(x) = (x^2 + 5x + 3)e^x$$

② الخاصة $E(n)$ هي :

”يوجد عدنان a_n و b_n يحققان $f^{(n)}(x) = (x^2 + a_n x + b_n)e^x$ أيما كان x “ .

يبين ما سبق أن $E(1)$ صحيحة حيث $a_1 = 3$ و $b_1 = 0$ ، وكذلك $E(2)$ صحيحة حيث $a_2 = 5$

و $b_2 = 3$. وإذا افترضنا أن $E(n)$ صحيحة استنتجنا أن

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= \left(f^{(n)}\right)'(x) = (x^2 + a_n x + b_n)(e^x)' + (x^2 + a_n x + b_n)'e^x \\ &= (x^2 + a_n x + b_n)e^x + (2x + a_n)e^x \\ &= \left(x^2 + (a_n + 2)x + (a_n + b_n)\right)e^x \\ &= (x^2 + a_{n+1}x + b_{n+1})e^x \end{aligned}$$

فالخاصة $E(n+1)$ صحيحة أيضاً حيث $a_{n+1} = a_n + 2$ و $b_{n+1} = a_n + b_n$. وهذا يثبت صحة

الخاصة $E(n)$ أيما كانت قيمة n .

لنضع $\tilde{E}(n)$ دلالة على الخاصة ” a_n و b_n عدنان عاديان “ .

وجدنا سابقاً أن $(a_1, b_1) = (3, 0)$ فالخاصة $\tilde{E}(1)$ صحيحة . وإذا افترضنا أن $\tilde{E}(n)$ صحيحة، استنتجنا

من المساواتين $a_{n+1} = a_n + 2$ و $b_{n+1} = a_n + b_n$ أن $\tilde{E}(n+1)$ صحيحة أيضاً، فالخاصة $\tilde{E}(n)$

صحيحة أيما كانت قيمة n .

③ نستنتج من المساواة $a_{n+1} - a_n = 2$ أن المتتالية $(a_n)_{n \geq 1}$ متتالية حسابية أساسها 2 وحدها a_1

يساوي 3. إذن من $a_n - a_1 = 2(n-1)$ نستنتج أن $a_n = 2n + 1$.

ونستنتج من المساواة $b_{n+1} = b_n + a_n$ أيًا كانت n أن

$$b_2 - b_1 = a_1$$

$$b_3 - b_2 = a_2$$

$$b_4 - b_3 = a_3$$

⋮

$$b_n - b_{n-1} = a_{n-1}$$

وبالجمع نجد $b_n - b_1 = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}$ ولكن $b_1 = 0$ ومن ثم

$$b_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} = (n-1) \frac{a_1 + a_{n-1}}{2}$$

$$= (n-1) \frac{3 + 2n - 1}{2} = n^2 - 1$$

وهي النتيجة المطلوبة.

25 معادلة تفاضلية

① لتكن (E) المعادلة التفاضلية $2y' + 3y = 0$. عيّن جميع حلول (E) .

② لتكن (E') المعادلة التفاضلية $2y' + 3y = x^2 + 1$.

a. عيّن كثير حدود من الدرجة الثانية f يُحقّق المعادلة (E') .

b. بيّن أنه إذا كان g حلاً للمعادلة (E') كان $g - f$ حلاً للمعادلة (E) ، ويرهن بالعكس،

أنه إذا كان $g - f$ حلاً للمعادلة (E) كان g حلاً للمعادلة (E') .

c. استنتج جميع حلول المعادلة التفاضلية (E') .

الحل

① الشكل القانوني لهذه المعادلة هو $y' = -\frac{3}{2}y$ وحلولها هي التتابع $x \mapsto ke^{-\frac{3}{2}x}$ حيث $k \in \mathbb{R}$.

② يكون $x \mapsto ax^2 + bx + c$ حلاً للمعادلة (E') إذا وفقط إذا، مهما كان x من \mathbb{R} كان

$$2(ax^2 + bx + c)' + 3(ax^2 + bx + c) = x^2 + 1$$

أو $(3a-1)x^2 + (3b+4a)x + 2b+3c-1 = 0$. وهذا يكافئ $a = \frac{1}{3}, b = -\frac{4}{9}, c = \frac{17}{27}$. إذن

كثير الحدود $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{17}{27}$ هو حلّ للمعادلة (E') .

نعلم من جهة أولى أن

$$2f'(x) + 3f(x) = x^2 + 1 \quad (*)$$

فإذا كان g حلاً للمعادلة (E') كان

$$2g'(x) + 3g(x) = x^2 + 1 \quad (**)$$

وبطرح المساويتين (*) و (***) طرفاً من طرف نجد $2(g - f)'(x) + 3(g - f)(x) = 0$ أي إنّ الفرق $g - f$ حلٌّ للمعادلة (E).

وبالعكس، إذا كان $g - f$ حلاً للمعادلة (E) كان $2(g - f)'(x) + 3(g - f)(x) = 0$ أي

$$2g'(x) + 3g(x) = 2f'(x) + 3f(x) = x^2 + 1$$

أي إنّ g حلٌّ للمعادلة (E').

إنّ g حلٌّ للمعادلة (E') إذا وفقط إذا كان $g - f$ حلاً للمعادلة (E) أي إذا وجد k في \mathbb{R} بحيث

$$g(x) - f(x) = ke^{-\frac{3}{2}x}$$

$$\left\{ x \mapsto \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{17}{27} + ke^{-\frac{3}{2}x} : k \in \mathbb{R} \right\}$$

26 نتأمل المعادلة التفاضلية (E) : $y' + 3y = 2e^{-x}$.

① عيّن العدد a ليكون التابع $x \mapsto ae^{-x}$ حلاً للمعادلة التفاضلية (E).

② ليكن a العدد الذي وجدناه في ①، وليكن g تابعاً اشتقاقياً على \mathbb{R} . نعرّف التابع

$h : x \mapsto g(x) - ae^{-x}$ أثبت أنّ التابع g حلٌّ للمعادلة التفاضلية (E)، إذا وفقط إذا كان

$$h \text{ حلاً للمعادلة التفاضلية (F) : } y' + 3y = 0$$

③ حلّ المعادلة التفاضلية (F)، واستنتج مجموعة حلول (E).

الحل

① يكون $x \mapsto ae^{-x}$ حلاً للمعادلة (E) إذا وفقط إذا، مهما كان x من \mathbb{R} كان

$$(ae^{-x})' + 3(ae^{-x}) = 2e^{-x}$$

$$. a = 1 \text{ أو}$$

② لنحسب:

$$h'(x) + 3h(x) = (g(x) - e^{-x})' + 3(g(x) - e^{-x}) = g'(x) + 3g(x) - 2e^{-x}$$

إنّ g حلٌّ للمعادلة (E) إذا وفقط إذا كان h حلاً للمعادلة (F) : $y' + 3y = 0$.

③ ولكن مجموعة حلول المعادلة (F) هي $\{x \mapsto ke^{-3x} : k \in \mathbb{R}\}$. إذن مجموعة حلول المعادلة

$$(E) \text{ هي } \{x \mapsto e^{-x} + ke^{-3x} : k \in \mathbb{R}\}.$$

27 ليكن n عدداً طبيعياً أكبر أو يساوي 2.

$$a \text{ ① حلّ المعادلة التفاضلية (1) الآتية: } y' - \frac{1}{n}y = 0.$$

b. نتأمل المعادلة التفاضلية (2) الآتية: $y' - \frac{1}{n}y = -\frac{x+1}{n(n+1)}$ عيّن عددين a و b

ليكون التابع $x \mapsto g(x) = ax + b$ المعرّف على \mathbb{R} حلاً للمعادلة (2).

c. ① أثبت أنه ليكون تابع h معرّف على \mathbb{R} حلاً للمعادلة (2) يلزم ويكفي أن يكون $h - g$ حلاً للمعادلة (1).

② استنتج من ذلك حلول المعادلة (2).

③ ومن بينها عيّن تلك الحلول f التي تحقق $f(0) = 0$.

② نتأمل التابع f_n المعرّف على \mathbb{R} بالعلاقة $f_n(x) = 1 + \frac{x}{n+1} - e^{x/n}$

a. ادرس إشارة f_n' ، واستنتج جدول تغيرات التابع f_n . أثبت على الخصوص أنّ التابع f_n يبلغ قيمة كبرى M موجبة تماماً يطلب تعيينها.

b. أثبت أنّ الخط البياني C_n للتابع f_n يقبل مقارباً مائلاً d_n . أعط معادلةً للمستقيم d_n . وارسم كلاً من d_2 و C_2 .

الحل

① حلول (1) هي $x \mapsto ke^{x/n}$ حيث k من \mathbb{R} .

② يكون $x \mapsto g(x) = ax + b$ حلاً للمعادلة (2) إذا تحقق، مهما كانت قيمة x المساواة

$$(ax + b)' - \frac{1}{n}(ax + b) = -\frac{x+1}{n(n+1)}$$

ومنه $a = \frac{1}{n+1}$ و $b = 1$. فالتابع $x \mapsto g(x) = \frac{x}{n+1} + 1$ حلٌّ للمعادلة التفاضلية (2).

③ نلاحظ أنّ

$$\begin{aligned} (h - g)'(x) - \frac{1}{n}(h - g)(x) &= h'(x) - \frac{1}{n}h(x) - \left(g'(x) - \frac{1}{n}g(x) \right) \\ &= h'(x) - \frac{1}{n}h(x) + \frac{x+1}{n(n+1)} \end{aligned}$$

وهذا يبرهن أنّ h حلٌّ للمعادلة (2) إذا وفقط إذا كان $h - g$ حلاً للمعادلة (1)، ولكن حلول الأخيرة معروفة وقد وجدناها في ① a. إذن h حلٌّ للمعادلة (2) إذا وفقط إذا وجد عدد k من \mathbb{R} يحقق

$$h(x) - g(x) = ke^{x/n} \quad \text{أي إنّ مجموعة حلول (2) هي} \\ \left\{ x \mapsto \frac{1}{n+1}x + 1 + ke^{x/n} : k \in \mathbb{R} \right\}$$

والحل الوحيد الذي يندم عند الصفر هو التابع الموافق لقيمة $k = -1$ أي

$$x \mapsto f(x) = \frac{x}{n+1} + 1 - e^{x/n}$$

② لدراسة التابع f_n نلاحظ أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = -\infty$ ، ولأنّ

$$f_n(x) = 1 + e^{x/n} \left(\frac{n}{n+1} \cdot \frac{x}{n} \cdot e^{-x/n} - 1 \right)$$

نستنتج من $\lim_{X \rightarrow \infty} X e^{-X} = 0$ أنّ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{n} e^{-x/n} = 0$ ومن ثمّ $\lim_{x \rightarrow \infty} f_n(x) = -\infty$

ومن جهة أخرى $f'_n(x) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}e^{x/n}$ وهو ينعدم فقط في حالة $x = \alpha_n = n \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$ ومنه

جدول التغيرات الآتي

x	$-\infty$	α_n	$+\infty$		
$f'_n(x)$		+	-		
$f_n(x)$	$-\infty$	\nearrow	$f_n(\alpha_n)$	\searrow	$-\infty$

فالتابع f_n يبلغ قيمة كبرى $M = f(\alpha_n)$ على \mathbb{R} .

نلاحظ أنّ $0 < \frac{n}{n+1} < 1$ إذن $\alpha_n < 0$ ولكن التابع f_n متناقصٌ تماماً على المجال $[\alpha_n, +\infty[$ إذن

$M = f(\alpha_n) > f_n(0) = 0$ فالقيمة الكبرى M موجبة تماماً، كما هو مطلوب. وأخيراً نلاحظ أنّ


$$M = \frac{1}{n+1} + \frac{n}{n+1} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

وأخيراً بوضع $h(x) = f_n(x) - \left(\frac{x}{n+1} + 1\right) = -e^{x/n}$ ، نرى أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ فنستنتج أنّ المستقيم

d_n الذي معادلته $y = \frac{x}{n+1} + 1$ مستقيم مقارب للخط البياني C_n للتابع f_n في جوار $-\infty$ ، والخط

C_n يقع دوماً تحت d_n لأنّ $h(x) < 0$ على \mathbb{R} .

وفيما يأتي نجد الرسم البياني لكل من d_2 و C_2 .



7

التكامل والتوابع الأصلية

- 1 التوابع الأصلية
- 2 بعض قواعد حساب التوابع الأصلية
- 3 التكامل المحدد وخواصه
- 4 التكامل المحدد وحساب المساحة

نقاط التعلّم الأساسية في هذه الوحدة

- تعريف التتابع الأصلية، والتمكن من بعض طرائق حسابها
- صلة التتابع الأصلية بمفهوم التكامل المحدّد
- بعض طرائق حساب التكامل المحدّد، وخصوصاً التكامل بالتجزئة
- التكامل المحدّد وحساب المساحة وتطبيقات أخرى

تَدْرِبْ صفحة 222

① في كلّ من الحالات الآتية، تحقّق أنّ F تابع أصلي للتابع f على المجال I .

$$I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \quad F(x) = \tan x - x, \quad f(x) = \tan^2 x \quad ①$$

$$I = \mathbb{R}, \quad F(x) = x \cos x, \quad f(x) = \cos x - x \sin x \quad ②$$

$$I =]0, +\infty[, \quad F(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2, \quad f(x) = \frac{2(x^4 - 1)}{x^3} \quad ③$$

$$I =]0, 1[, \quad F(x) = \frac{-1}{x(x-1)}, \quad f(x) = \frac{2x-1}{x^2(x-1)^2} \quad ④$$

$$I =]0, +\infty[, \quad F(x) = x \ln x - x, \quad f(x) = \ln x \quad ⑤$$

$$I =]1, +\infty[, \quad F(x) = \ln(\ln x), \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x} \quad ⑥$$

$$I = \mathbb{R}, \quad F(x) = x - \ln(1 + e^x), \quad f(x) = \frac{1}{1 + e^x} \quad ⑦$$

$$I = \mathbb{R}, \quad F(x) = 2\sqrt{e^x}, \quad f(x) = \sqrt{e^x} \quad ⑧$$

الحل

هذا تمرين بسيط يكفي في كل حالة حساب F' والتيقن أنّه يساوي f .

② في كلّ من الحالات الآتية، تحقّق أنّ F و G تابعان أصليان للتابع f نفسه على المجال I .

$$I =]1, +\infty[, \quad G(x) = \frac{x^2 + 7x - 5}{x-1}, \quad F(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x-1} \quad ①$$

$$I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \quad G(x) = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad F(x) = \tan^2 x \quad ②$$

$$I =]\frac{5}{4}, +\infty[, \quad G(x) = \frac{-4x^2 + 2x - 9}{10 - 8x}, \quad F(x) = \frac{2x^2 - 3x + 7}{4x - 5} \quad ③$$

$$I = \mathbb{R}, \quad G(x) = \frac{5 + 3x^2}{2(1 + x^2)}, \quad F(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \quad ④$$

$$I = \mathbb{R}, \quad G(x) = 2 - \cos^2 x, \quad F(x) = \sin^2 x \quad ⑤$$

الحل

هذا تمرين بسيط يكفي في كل حالة حساب F' و G' والتيقن أنّهما متساويان.

- ③ أليكون التابعان F و G الآتيان تابعين أصليين للتابع f ذاته على \mathbb{R} ؟
 $G(x) = \sin x - 3 \sin^3 x$ و $F(x) = \sin(3x) - 2 \sin x$.

الجل

إذا افترضنا أن F و G تابعان أصليان للتابع f ذاته وجب أن يكون
 $F'(x) = 3 \cos(3x) - 2 \cos x = f(x)$
 $G'(x) = \cos x - 9 \sin^2 x \cos x = f(x)$
وعلى الخصوص يجب أن يكون $F'(\frac{\pi}{6}) - G'(\frac{\pi}{6}) = 0$ وهذا غير صحيح لأننا نجد بحساب بسيط أن
 $F'(\frac{\pi}{6}) - G'(\frac{\pi}{6}) = -\frac{3\sqrt{3}}{8} \neq 0$. إذن الجواب هو لا.

تَدْرِبْ صفحة 227

- ① في كل من الحالات الآتية جد تابعاً أصلياً للتابع $f : x \mapsto f(x)$ على المجال I .

$$I = \mathbb{R}, \quad f(x) = 8x^3 + 6x^2 - 2x + 3 \quad \text{①}$$

$$I =]0, +\infty[, \quad f(x) = \frac{1}{x^4} \quad \text{②}$$

$$I =]-\infty, 0[, \quad f(x) = \sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{3}{x^2} \quad \text{③}$$

$$I =]1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{1}{1 - 2x + x^2} \quad \text{④}$$

$$I =]-\infty, -1[, \quad f(x) = \frac{2x + 1}{(x^2 + x)^2} \quad \text{⑤}$$

$$I =]1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{4x - 2}{\sqrt{x^2 - x}} \quad \text{⑥}$$

$$I =]-\infty, \frac{3}{4}[, \quad f(x) = \frac{5}{4x - 3} \quad \text{⑦}$$

$$I =]0, +\infty[, \quad f(x) = \frac{3x + 1}{2x} \quad \text{⑧}$$

$$I =]-\infty, 2[, \quad f(x) = \frac{x + 1}{x - 2} \quad \text{⑨}$$

$$I =]\frac{1}{2}, +\infty[, \quad f(x) = \frac{3x + 2}{2x - 1} \quad \text{⑩}$$

$$\begin{array}{ll}
 F(x) = -\frac{1}{3x^3} & \textcircled{2} \quad F(x) = 2x^4 + 2x^3 - x^2 + 3x \quad \textcircled{1} \\
 F(x) = -\frac{1}{x-1} & \textcircled{4} \quad F(x) = \frac{3}{4}x\sqrt[3]{x} + \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} + \frac{3}{x} \quad \textcircled{3} \\
 F(x) = 4\sqrt{x^2 - x} & \textcircled{6} \quad F(x) = -\frac{1}{x^2 + x} \quad \textcircled{5} \\
 F(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}\ln x & \textcircled{8} \quad F(x) = \frac{5}{4}\ln(3 - 4x) \quad \textcircled{7} \\
 F(x) = \frac{3}{2}x + \frac{7}{4} \cdot \ln(2x - 1) & \textcircled{10} \quad F(x) = x + 3\ln(2 - x) \quad \textcircled{9}
 \end{array}$$

② في كلٍّ من الحالات الآتية جد تابعاً أصلياً للتابع $f : x \mapsto f(x)$ على المجال I .

$$\begin{array}{ll}
 I = \mathbb{R}, & f(x) = \cos^4 x \quad \textcircled{2} \quad I = \mathbb{R}, & f(x) = \cos^2 3x \quad \textcircled{1} \\
 I =]0, \pi[, & f(x) = \cot^2 x \quad \textcircled{4} \quad I = \mathbb{R}, & f(x) = \cos 3x \cdot \cos x \quad \textcircled{3} \\
 I =]0, \pi[, & f(x) = \cot x \quad \textcircled{6} \quad I =]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[, & f(x) = \tan x \quad \textcircled{5} \\
 I =]-\infty, \frac{3}{2}[, & f(x) = \frac{1}{\sqrt{3-2x}} \quad \textcircled{8} \quad I =]\frac{1}{2}, +\infty[, & f(x) = \sqrt{(2x-1)^3} \quad \textcircled{7} \\
 I =]-\sqrt{3}, \sqrt{3}[, & f(x) = \frac{x}{\sqrt{3-x^2}} \quad \textcircled{10} \quad I = \mathbb{R}, & f(x) = x \cdot \sqrt[3]{(x^2+1)^2} \quad \textcircled{9}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 F(x) = \frac{3x}{8} + \frac{1}{4}\sin(2x) + \frac{1}{32}\sin(4x) & \textcircled{2} \quad F(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{12}\sin(6x) \quad \textcircled{1} \\
 F(x) = -x - \cot(x) & \textcircled{4} \quad F(x) = \frac{1}{4}\sin(2x) + \frac{1}{8}\sin(4x) \quad \textcircled{3} \\
 F(x) = \ln(\sin x) & \textcircled{6} \quad F(x) = -\ln(-\cos x) \quad \textcircled{5} \\
 F(x) = -\sqrt{3-2x} & \textcircled{8} \quad F(x) = \frac{1}{5}(2x-1)^{5/2} \quad \textcircled{7} \\
 F(x) = -\sqrt{3-x^2} & \textcircled{10} \quad F(x) = \frac{3}{10}(x^2+1)^{5/3} \quad \textcircled{9}
 \end{array}$$

تَدْرِبْ صَفحة 235

① احسب التكاملات الآتية:

$$J = \int_{-1}^2 x|x-1|dx \quad ②$$

$$L = \int_{-2}^{-1} \frac{2x-1}{x-1} dx \quad ④$$

$$N = \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx \quad ⑥$$

$$I = \int_{3\pi/2}^{2\pi} \sqrt{2-2\cos 2x} dx \quad ①$$

$$K = \int_0^1 (e^{2x} - e^{-2x}) dx \quad ③$$

$$M = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \tan x dx \quad ⑤$$

الحل

① نلاحظ أنّ $2 - 2\cos 2x = 4\sin^2 x$ ولكن $\sin x < 0$ عندما $\frac{2\pi}{3} < x < 2\pi$ إذن في هذه الحالة

لدينا

$$I = \int_{3\pi/2}^{2\pi} (-2\sin x) dx = \left[2\cos x \right]_{3\pi/2}^{2\pi} = 2$$

② إشارة $|x-1|$ ثابتة على كل من المجالين $]-\infty, 1[$ و $]1, +\infty[$ ، إذن استناداً إلى علاقة شال نكتب

$$\begin{aligned} J &= \int_{-1}^1 x|x-1|dx + \int_1^2 x|x-1|dx \\ &= \int_{-1}^1 (x-x^2)dx + \int_1^2 (x^2-x)dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\cdot K = -1 + \frac{e^2 + e^{-2}}{2} \quad ③$$

$$\cdot L = 2 - \ln\left(\frac{3}{2}\right) \quad \text{بكتابة } \frac{2x-1}{x-1} = 2 + \frac{1}{x-1} \quad \text{نجد} \quad ④$$

$$\cdot M = \frac{1}{2} \ln(3) \quad ⑤$$

$$\cdot N = \frac{1}{2} \ln(2) \quad \text{ومنه } (\cos x + \sin x)' = \cos x - \sin x \quad \text{لاحظ أنّ} \quad ⑥$$

② احسب التكاملات الآتية باستعمال التكامل بالتجزئة.

$$J = \int_0^{\pi} (x-1) \cos x \, dx \quad \textcircled{2}$$

$$L = \int_0^{\pi/3} x \sin(3x) \, dx \quad \textcircled{4}$$

$$N = \int_0^{\pi} e^x \sin x \, dx \quad \textcircled{6}$$

$$I = \int_1^e x \ln x \, dx \quad \textcircled{1}$$

$$K = \int_0^1 (x+2)e^x \, dx \quad \textcircled{3}$$

$$M = \int_0^{\pi} e^x \cos x \, dx \quad \textcircled{5}$$

مساعدة: احسب M و N في آن معاً.

الحل

$$I = \int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4} \quad \textcircled{1}$$

$$J = \int_0^{\pi} (x-1) \cos x \, dx = \left[(x-1) \sin x \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x \, dx = -2 \quad \textcircled{2}$$

$$K = \int_0^1 (x+2)e^x \, dx = \left[(x+2)e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = 2e - 1 \quad \textcircled{3}$$

$$L = \int_0^{\pi/3} x \sin(3x) \, dx = \left[x \frac{-\cos(3x)}{3} \right]_0^{\pi/3} + \frac{1}{3} \int_0^{\pi/3} \cos(3x) \, dx = \frac{\pi}{9} \quad \textcircled{4}$$

⑤ و ⑥ هنا لدينا

$$M = \int_0^{\pi} e^x \cos x \, dx = \left[\cos x e^x \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\sin x) e^x \, dx = -e^{\pi} - 1 + N$$

$$N = \int_0^{\pi} e^x \sin x \, dx = \left[\sin x e^x \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (\cos x) e^x \, dx = -M$$

$$\text{إذن } M = -\frac{1+e^{\pi}}{2} \text{ و } N = \frac{1+e^{\pi}}{2}$$

③ جد تابعاً أصلياً للتابع $f : x \mapsto f(x)$ على المجال I .

$$I = \mathbb{R}, \quad f(x) = x \cdot \sin 2x \quad \textcircled{2}$$

$$I =]0, +\infty[, \quad f(x) = x^2 \cdot \ln x \quad \textcircled{4}$$

$$I = \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 \cdot \cos 3x \quad \textcircled{6}$$

$$I = \mathbb{R}, \quad f(x) = x \cdot \cos x \quad \textcircled{1}$$

$$I = \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 \cdot e^x \quad \textcircled{3}$$

$$I = \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 \cdot \sin 2x \quad \textcircled{5}$$

١ لما كان $\int_0^x t \cos t dt = \left[t \sin t \right]_0^x - \int_0^x \sin t dx = x \sin x + \cos x - 1$ استنتجنا أنّ التابع

$x \mapsto F(x) = x \sin x + \cos x$ هو تابع أصلي للتابع $x \mapsto x \cos x$ على \mathbb{R} .

٢ $x \mapsto F(x) = \frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{2} x \cos(2x)$ هو تابع أصلي للتابع $x \mapsto x \sin(2x)$ على \mathbb{R} .

٣ هنا نكتب

$$\begin{aligned} \int_0^x t^2 e^t dt &= \left[t^2 e^t \right]_0^x - \int_0^x 2te^t dx \\ &= x^2 e^x - 2 \left(\left[t e^t \right]_0^x - \int_0^x e^t dx \right) \\ &= x^2 e^x - 2 \left(x e^x - e^x + 1 \right) = (x^2 - 2x + 2)e^x - 2 \end{aligned}$$

فنستنتج أنّ التابع $x \mapsto F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x$ هو تابع أصلي للتابع $x \mapsto x^2 e^x$ على \mathbb{R} .

٤ $x \mapsto F(x) = \frac{1}{3} x^3 \ln(x) - \frac{1}{9} x^3$ هو تابع أصلي للتابع $x \mapsto x^2 \ln x$ على $]0, +\infty[$.

٥ $x \mapsto F(x) = \frac{1}{2} x \sin(2x) - \frac{1}{4} (2x^2 - 1) \cos(2x)$ هو تابع أصلي للتابع $x \mapsto x^2 \sin(2x)$.

٦ $x \mapsto F(x) = \frac{1}{27} (9x^2 - 2) \sin(3x) + \frac{2}{9} x \cos(3x)$ هو تابع أصلي للتابع $x \mapsto x^2 \cos(3x)$.

٤ جد تابعاً أصلياً للتابع $f : x \mapsto f(x)$ على المجال I .

$$I =]-\infty, -2[, \quad f(x) = \frac{x+1}{x^2-4} \quad \text{②} \quad \left| \quad I =]1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{x+3}{x^2-1} \quad \text{①}$$

$$I =]-1, 0[, \quad f(x) = \frac{2x-1}{x^2+x} \quad \text{④} \quad \left| \quad I =]-2, 3[, \quad f(x) = \frac{x}{x^2-x-6} \quad \text{③}$$

$$I =]-\infty, -2[, \quad f(x) = \frac{2x-1}{(x+2)^2} \quad \text{⑥} \quad \left| \quad I =]2, +\infty[, \quad f(x) = \frac{x^3}{x^2-x-2} \quad \text{⑤}$$

ملاحظة: التكامل الأخير ليس من النوع الذي درسناه بل هو أبسط من ذلك!

$$. F(x) = \frac{1}{2} \ln(2-x) + \frac{1}{4} \ln(x^2-4) \quad \text{②} \quad . F(x) = 2 \ln(x-1) - \ln(x+1) \quad \text{①}$$

$$. F(x) = 3 \ln(x+1) - \ln(-x) \quad \text{④} \quad . F(x) = \frac{3}{5} \ln(3-x) + \frac{2}{5} \ln(x+2) \quad \text{③}$$

$$. F(x) = \frac{5}{x+2} + \log((x+2)^2) \quad \text{⑥} \quad . F(x) = \frac{1}{2} x^2 + x + \frac{8}{3} \ln(x-2) + \frac{1}{3} \ln(x+1) \quad \text{⑤}$$


أنشطة

نشاط 1 حساب مساحة سطح مستو

1 مساحة السطح المحصور بين منحنيين

لنتأمل الخطين البيانيين C_f و C_g للتابعين $f: x \mapsto e^x$ و $g: x \mapsto e^{-x}$ المعرفين على \mathbb{R} .

- ① ارسم الخطين البيانيين C_f و C_g .
- ② احسب مساحة السطح المحصور بين C_f و C_g والمستقيم الذي معادلته $x = \lambda$ حيث λ عدد حقيقي. (ناقش تبعاً لإشارة λ).



نقبل عموماً أنه إذا كان C_f و C_g الخطين البيانيين

لتابعين مستمرين f و g على مجال I ، وكان a و b

عديدين من I يحققان $b > a$. عندئذ $\int_a^b |f - g|$ يساوي

مساحة السطح المحصور بين C_f و C_g والمستقيم d_a الذي

معادلته $x = a$ والمستقيم d_b الذي معادلته $x = b$.

يتطلب هذا الحساب دراسة إشارة الفرق $f - g$ على

$[a, b]$.



2 منحن ومقارب مائل

ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} بالعلاقة $f(x) = x(1 + e^{-x})$. وليكن C_f الخط البياني المُمثل للتابع

f . الهدف من هذا النشاط دراسة مساحة السطح المحصور بين الخط البياني C_f ومُقاربه.

① ادرس نهايات التابع f عند $-\infty$ و $+\infty$. واكتب جدول تغيرات f . (استعمل f'' لدراسة إشارة

المشتق f').

b . تحقق أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = x$ مستقيم مُقارب للخط C_f في جوار $+\infty$. وادرس


وضع C_f بالنسبة إلى المقارب Δ .

c . ارسم Δ و C_f .

② a . ليكن λ عدداً حقيقياً موجباً تماماً. احسب $A(\lambda)$ مساحة السطح المحصور بين C_f و Δ

والمستقيم الذي معادلته $x = \lambda$.

b . ما نهاية $A(\lambda)$ عندما تسعى λ إلى $+\infty$ ؟



1 لنرمز بالرمز $A(\lambda)$ إلى مساحة السطح المحصور بين C_g و C_f والمستقيم الذي معادلته $x = \lambda$. في حالة $\lambda > 0$ يقع C_f فوق C_g على المجال $[0, \lambda]$ ومن ثمَّ

$$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} e^x dx - \int_0^{\lambda} e^{-x} dx = e^{\lambda} + e^{-\lambda} - 2$$

في حالة $\lambda < 0$ يقع C_g فوق C_f على المجال $[\lambda, 0]$ ومن ثمَّ

$$A(\lambda) = \int_{\lambda}^0 e^{-x} dx - \int_{\lambda}^0 e^x dx = e^{\lambda} + e^{-\lambda} - 2$$

إذن أياً كانت $\lambda \in \mathbb{R}$ كان $A(\lambda) = e^{\lambda} + e^{-\lambda} - 2$.

2 هنا $f(x) = x(1 + e^{-x})$.

1 a. لأن $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$ استنتجنا أن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$. وكذلك لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ استنتجنا

أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. ونجد بحساب بسيط أن $f'(x) = 1 + e^{-x} - xe^{-x}$. ليس من السهل

تعيين إشارة $f'(x)$ مباشرة لذلك نتأمل مشتقه $f''(x) = (1-x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}$. إذن f'

متناقصٌ تماماً على $]-\infty, 2[$ و متزايدٌ تماماً على $]2, +\infty[$ ، فهو يبلغ قيمة حدية صغيرة تساوي

$f'(2) = 1 - e^{-2} > 0$ عند $x = 2$. نستنتج إذن أن f' موجبٌ تماماً على كامل \mathbb{R} ، ومنه جدول

التغيرات الآتي للتابع f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

1 b. لنضع $g(x) = f(x) - x = xe^{-x}$ نعلم أن $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$

إذن المستقيم Δ الذي معادلته $y = x$ هو مستقيم مقارب للخط

البياني C للتابع f . ولأنَّ إشارة g تماثل إشارة x استنتجنا أنَّ


الخط البياني C يقع فوق المقارب Δ على $]0, +\infty[$ ويقع تحته

على $]-\infty, 0[$.

2 لدينا

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= \int_0^{\lambda} (f(x) - x) dx = \int_0^{\lambda} xe^{-x} dx \\ &= \left[-xe^{-x} \right]_0^{\lambda} + \int_0^{\lambda} e^{-x} dx = 1 - (\lambda + 1)e^{-\lambda} \end{aligned}$$

ومن ثمَّ $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} A(\lambda) = 1$.



نشاط 2 حساب حجم مجسم

ليكن S مجسماً يحدّه مستويان P_a و P_b معادلتهما بالترتيب $z = a$ و $z = b$ في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نرمز بالرمز \mathcal{V} إلى حجم هذا المجسم، وبالرمز $A(z)$ إلى مساحة مقطع هذا المجسم بالمستوي P الذي يوازي كلاً من P_b و P_a وراقمه يساوي z ($a \leq z \leq b$). نقبل أن \mathcal{V} يُحسب بالعلاقة:

$$(*) \quad \mathcal{V} = \int_a^b A(z) dz$$

نجد فيما يأتي عدداً من الأمثلة على استعمال هذه العلاقة.


1 حجم كرة نصف قطرها R

يكفي حساب حجم نصف الكرة ثم نضرب الناتج بالعدد 2.

1 اشرح باستعمال رموز الشكل، لماذا

$$? \quad A(z) = \pi(R^2 - z^2)$$

2 استنتج مجدداً العبارة $\mathcal{V} = \frac{4}{3} \pi R^3$



2 حجم مجسم دوراني

نجد في الشكل المجاور الخط البياني C للتابع f المعطى على المجال $[0, 4]$ بالصيغة $f(x) = \sqrt{x}$. عندما يدور C دورة كاملة حول محور الفواصل، يولّد مجسماً دورانياً S .

1 ما طبيعة مقطع هذا المجسم بمستوي عمودي على

محور الفواصل ويمر بالنقطة $I(x, 0)$ ($0 \leq x \leq 4$)؟

2 عبّر عن $A(x)$ ، مساحة هذا المقطع، بدلالة x .

3 استنتج \mathcal{V} حجم المجسم S .

الجل

1 استناداً إلى الشكل، وعملاً بمبرهنة فيثاغورث، يكون نصف قطر القرص $\sqrt{R^2 - z^2}$ فمساحته تساوي $A(z) = \pi(R^2 - z^2)$.

2 وعليه يعطى حجم الكرة $\mathcal{V} = 2 \int_0^R \pi(R^2 - z^2) dz = 2\pi \left[R^2 z - \frac{1}{3} z^3 \right]_0^R = \frac{4\pi}{3} R^3$

2 المقطع دائرة نصف قطرها \sqrt{x} ، ومن ثمّ تعطى مساحتها بالصيغة $A(x) = \pi x$. أمّا حجم الجسم فيساوي $\mathcal{V} = \int_0^4 A(x)dx = 8\pi$. وندعو القارئ ليقارن نتيجة هذه النشاط بنتيجة النشاط 2 من الوحدة الرابعة.

مُربّيات ومساائل

1 في كل حالة من الحالات الآتية، جد تابعاً أصلياً F للتابع f على المجال I :

$$I =]-\infty, \frac{1}{2}[, \quad f(x) = \frac{2}{\sqrt{1-2x}} \quad \textcircled{2} \quad I =]0, +\infty[, \quad f(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} \quad \textcircled{1}$$

$$I = \mathbb{R}, \quad f(x) = (2x-1)^3 \quad \textcircled{4} \quad I =]1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}} \quad \textcircled{3}$$

$$I =]-1, 3[, \quad f(x) = \frac{x-1}{(x^2-2x-3)^2} \quad \textcircled{6} \quad I =]-\infty, \frac{1}{3}[, \quad f(x) = \frac{1}{(1-3x)^2} \quad \textcircled{5}$$

الحل

$$F(x) = -2\sqrt{1-2x} \quad \textcircled{2} \quad F(x) = x + \frac{1}{x} + 3 \ln x \quad \textcircled{1}$$

$$F(x) = \frac{1}{8}(2x-1)^4 \quad \textcircled{4} \quad F(x) = 2\sqrt{x^2-1} \quad \textcircled{3}$$

$$F(x) = -\frac{1}{2(x^2-2x-3)} \quad \textcircled{6} \quad F(x) = \frac{1}{3(1-3x)} \quad \textcircled{5}$$

2 في كل حالة من الحالات الآتية، جد تابعاً أصلياً F للتابع f على المجال I :

$$I =]4, +\infty[, \quad f(x) = \frac{1}{x-4} \quad \textcircled{2} \quad I = \mathbb{R}, \quad f(x) = \cos x (\sin^2 x - 3 \sin x) \quad \textcircled{1}$$

$$I =]-\infty, 4[, \quad f(x) = \frac{1}{x-4} \quad \textcircled{4} \quad I =]0, \frac{\pi}{2}[, \quad f(x) = \frac{2}{\cos^2 x} - 1 \quad \textcircled{3}$$

$$I =]-1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{2x-1}{x+1} \quad \textcircled{6} \quad I = \mathbb{R}, \quad f(x) = 2e^{3x-1} \quad \textcircled{5}$$

الحل

$$F(x) = \ln(x-4) \quad \textcircled{2} \quad F(x) = \frac{\sin^3(x)}{3} + \frac{3 \cos^2(x)}{2} \quad \textcircled{1}$$

$$F(x) = \ln(4-x) \quad \textcircled{4} \quad F(x) = 2 \tan(x) - x \quad \textcircled{3}$$

$$f(x) = 2x - 3 \ln(x+1) \quad \textcircled{6} \quad F(x) = \frac{2}{3} e^{3x-1} \quad \textcircled{5}$$

3 في كلٍّ من الحالات الآتية، هاتِ تابعاً أصلياً F للتابع f على مجال I يطلب تحديده ويحقق الشرط المعطى.

$$F(0) = 0, \quad f(x) = \frac{1}{(2x+1)^2} \quad \textcircled{2} \quad F(1) = 0, \quad f(x) = \frac{2}{x^2} + x \quad \textcircled{1}$$

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x \quad \textcircled{4} \quad F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \quad \textcircled{3}$$


$$F(0) = 0, \quad f(x) = \frac{x}{(x^2-1)^2} \quad \textcircled{6} \quad F(1) = 1, \quad f(x) = \frac{-1}{3-x} \quad \textcircled{5}$$

الحل

$$x > -\frac{1}{2}, \quad F(x) = \frac{x}{2x+1} \quad \textcircled{2} \quad x > 0, \quad F(x) = \frac{x^3 + 3x - 4}{2x} \quad \textcircled{1}$$

$$x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = -\frac{1}{3} \cos^3(x) \quad \textcircled{4} \quad x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \frac{1}{4} \left(-2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2} \right) \quad \textcircled{3}$$

$$x \in]-1, 1[, \quad F(x) = \frac{x^2}{2(1-x^2)} \quad \textcircled{6} \quad x < 3, \quad F(x) = \ln(3-x) + 1 - \ln 2 \quad \textcircled{5}$$



4 نرمز عادة بالرمز $\min(a, b)$ إلى أصغر العددين a و b .

تحقق أنّ الخط البياني C_f للتابع f المعرّف على المجال

$[0, 2]$ بالصيغة $f(x) = \min(x^2, 2-x)$ ، هو الخط المرسوم

في الشكل المجاور. احسب التكامل $\int_0^2 f(x) dx$ ، وقلّ ماذا

يمثل هذا العدد؟

احسب بالمثل $\int_0^1 h(x) dx$ و $\int_0^2 g(x) dx$ في حالة

$$h(x) = \min(x^2, (x-1)^2) \quad \text{و} \quad g(x) = 1 - |1-x|$$

بعد رسم خطيهما البيانيين على مجال المُكاملة.

الحل


لاحظ أنّ المتراجحة $x^2 \leq 2-x$ تكافئ $(x+2)(x-1) \leq 0$ أي $x \in [-2, 1]$. إذن في حالة x من

$[0, 2]$ يكون $x^2 \leq 2-x$ على $[0, 1]$ ويكون $2-x \leq x^2$ في حالة $x \in [1, 2]$ ومنه نرى أنّ

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & : 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & : 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2-x) dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[-\frac{(2-x)^2}{2} \right]_1^2 = \frac{5}{6} \quad \text{إذن}$$

وهو يمثل مساحة السطح المحصور بين الخط البياني للتابع f ومحور الفواصل.




وبالمثل في حالة $g(x) = 1 - |1 - x|$ على المجال $[0, 2]$ نجد

$$g(x) = \begin{cases} x & : 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & : 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

ومنه

$$\int_0^2 g(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (2 - x) dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[-\frac{(2-x)^2}{2} \right]_1^2 = 1$$

وكذلك في حالة $h(x) = \min(x^2, (x-1)^2)$ على المجال $[0, 1]$ نجد



$$h(x) = \begin{cases} x^2 & : 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ (1-x)^2 & : \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

ومنه

$$\int_0^1 h(x) dx = \int_0^{1/2} x^2 dx + \int_{1/2}^1 (1-x)^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{1/2} + \left[-\frac{(1-x)^3}{3} \right]_{1/2}^1 = \frac{1}{12}$$

احسب التكاملات الآتية:

5

$$I = \int_{-1}^2 (x-2)(x^2 - 4x + 3) dx \quad \textcircled{2}$$

$$I = \int_{-1}^2 (x^2 - 4x + 3) dx \quad \textcircled{1}$$

$$I = \int_0^{\frac{2}{3}} \frac{dt}{\sqrt{1+t}} \quad \textcircled{4}$$

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(t^2 + t - \frac{1}{t} \right) dt \quad \textcircled{3}$$

$$I = \int_0^{\pi} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) dx \quad \textcircled{6}$$

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x^3}{x^4 + 2} dx \quad \textcircled{5}$$

$$I = \int_0^1 te^{t^2-1} dt \quad \textcircled{8}$$

$$I = \int_{-2}^{-1} \frac{x-3}{x} dx \quad \textcircled{7}$$

$$I = \int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx \quad \textcircled{10}$$

$$I = \int_0^2 \sqrt{2x+1} dx \quad \textcircled{9}$$

الحل

$$I = \frac{63}{4} \quad \textcircled{2} \quad I = -6 \quad \textcircled{1}$$

$$I = 2 \quad \textcircled{4} \quad I = \frac{23}{6} - \ln(2) \quad \textcircled{3}$$

$$I = \sqrt{2} \quad \textcircled{6} \quad I = \frac{1}{4} \ln(6) \quad \textcircled{5}$$

$$I = \frac{e-1}{2e} \quad \textcircled{8} \quad I = 1 + \ln(8) \quad \textcircled{7}$$

$$I = \ln\left(\frac{e+e^{-1}}{2}\right) \quad \textcircled{10} \quad I = \frac{1}{3}(5\sqrt{5} - 1) \quad \textcircled{9}$$

6 ليكن f التابع المعرف على $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ وفق $f(x) = \frac{4x^2 - 5x + 1}{x + 3}$

① جد الأعداد a و b و c التي تحقق $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 3}$ ، أيّاً يكن x من D .

② احسب $J = \int_2^0 f(x) dx$

الحل

① بإجراء قسمة إقليدية للبيسط على المقام نجد مباشرة $4x^2 - 5x + 1 = (x + 3)(4x - 17) + 52$ ومنه

$$f(x) = 4x - 17 + \frac{52}{x + 3}$$

② إذن

$$J = \left[2x^2 - 17x + 52 \ln(3 + x) \right]_2^0 = 26 + 52 \ln\left(\frac{3}{5}\right)$$

7 ليكن f التابع المعرف على $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ وفق $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)^2}$

① جد الأعداد a و b و c التي تحقق $f(x) = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$ ، أيّاً يكن x من D .

② احسب $J = \int_{-3}^0 f(x) dx$

الحل

① الأسهل هنا أن نضع $X = x - 1$ متحولاً جديداً فيكون

$$f(x) = \frac{x^2}{(x-1)^2} = \frac{(X+1)^2}{X^2} = 1 + \frac{2}{X} + \frac{1}{X^2} = 1 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

② إذن

$$J = \left[x + 2 \ln(1-x) - \frac{1}{x-1} \right]_{-3}^0 = \frac{15}{4} - 4 \ln(2)$$

8 أثبت أن $\frac{1}{1+e^x} = 1 - \frac{e^x}{1+e^x}$ ، واستنتج قيمة $I = \int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx$

الحل

إثبات المساواة الأولى تحقق مباشرة، ومنه

$$I = \left[x - \ln(1+e^x) \right]_0^1 = 1 - \ln\left(\frac{1+e}{2}\right)$$

9

باستعمال صيغتي $\sin^2 a$ و $\cos^2 a$ بدلالة $\cos 2a$ ، أو بأية طريقة تراها مناسبة اكتب $\sin^4 x$

$$.I = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \sin^4 x dx \text{ ثم احسب } \cos 4x \text{ و } \cos 2x$$

الحل

لدينا $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ ومنه $\sin^4 x = \frac{1}{4}(1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x)$ ولكن نعلم أيضاً أنّ $\cos^2 2x = \frac{1}{2}(1 + \cos 4x)$ إذن

$$(*) \quad \sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x$$

ومنه نستنتج أنّ

$$I = \left[\frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x \right]_0^{\pi/8} = \frac{3\pi}{64} + \frac{1 - 4\sqrt{2}}{32}$$

ملاحظة: يمكن الوصول إلى (*) بالاستفادة من علاقة أويلر:

$$\begin{aligned} \sin^4 x &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^4 = \frac{e^{4ix} - 4e^{2ix} + 6 - 4e^{-2ix} + e^{-4ix}}{16} \\ &= \frac{2\cos 4x - 8\cos 2x + 6}{16} = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x \end{aligned}$$

10

احسب التكاملات الآتية باستعمال تكامل بالتجزئة.

$$\begin{array}{l|l} I = \int_{\ln 2}^{\ln 3} (x^2 - 1)e^x dx & \textcircled{2} \quad I = \int_1^e (x - 1)\ln x dx & \textcircled{1} \\ I = \int_1^2 (t - 2)e^{2t} dt & \textcircled{4} \quad I = \int_0^1 (2x + 1)e^{-x} dx & \textcircled{3} \end{array}$$

الحل

$$I = 1 - 2\ln^2(2) + 3\ln^2(3) - 2\ln\left(\frac{27}{4}\right) \quad \textcircled{2} \quad I = \frac{1}{4}(e^2 - 3) \quad \textcircled{1}$$

$$I = -\frac{1}{4}e^2(e^2 - 3) \quad \textcircled{4} \quad I = 3 - \frac{5}{e} \quad \textcircled{3}$$



لنتعلم البحث معاً

11 إثبات متراجحة


نفترض أنّ a و b عدنان حقيقيان وأنّ $0 \leq a < b \leq \pi$. أثبت صحة المتراجحة

$$\cos a - \cos b \geq \frac{1}{2}(b - a)\sin b$$

نحو الحل

قد نفكر في دراسة تابع، كأن نفترض b ثابتاً ونبرهن أن التابع g المعروف وفق الصيغة الآتية موجب على المجال $[0, b]$: $g(x) = \cos x - \cos b - \frac{1}{2}(b-x)\sin b$ ، ولكن سرعان ما نقتنع أن هذا الطريق لا يؤدي إلى إثبات سهل للمترابحة فأشارة المشتق الأول ليست سهلة التعيين.

ولكنّ المقدار $\cos a - \cos b$ يدفعنا إلى التفكير بالتكامل $\cos a - \cos b = \int_b^a f(t) dt$ حيث $f(t) = \cos' t = -\sin t$ أو $\cos a - \cos b = -\int_b^a \sin t dt = \int_a^b \sin t dt$.



1. ليكن C الخط البياني للتابع $x \mapsto \sin x$ على المجال

$[0, \pi]$. برّر كون $\int_a^b \sin t dt$ هو مساحة منطقة

عليك تحديدها. نرّمز إلى تلك المساحة بالرمز A .

علل كون A أكبر من مساحة شبه المنحرف

$ABCD$ المبين في الشكل.

2. احسب مساحة شبه المنحرف $ABCD$ وتحقق أنها أكبر من $\frac{1}{2}(b-a)\sin b$.

3. تبيّن أن المترابحة صحيحة في حالة $a = 0$ و $b = \pi$.

أنجز الحلّ واكتبه بلغة سليمة.

الحل

نلاحظ أنّ $\int_a^b \sin t dt$ يمثل A مساحة السطح الذي يعينه الخط البياني للتابع \sin ومحور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتاهما $x = b$ و $x = a$ بالترتيب، وهذا السطح يحوي شبه المنحرف $ABCD$ المبين في الرسم، إذن A أكبر أو يساوي مساحة $ABCD$.

ولكن $AD = \sin a$ و $BC = \sin b$ والارتفاع AB يساوي $(b-a)$ إذن مساحة شبه المنحرف

$ABCD$ تساوي $\frac{\sin a + \sin b}{2}(b-a)$. وهذا أكبر من $\frac{1}{2}(b-a)\sin b$ لأنّ $\sin a \geq 0$. نستنتج مما

سبق أنّ $A \geq \frac{1}{2}(b-a)\sin b$. ولكن

$$A = \int_a^b \sin t dt = \cos a - \cos b$$

فنكون قد أثبتنا صحة المترابحة $\cos a - \cos b \geq \frac{1}{2}(b-a)\sin b$.

لاحظ أنّه في حالة $a = 0$ تصبح المترابحة $1 - \cos b \geq \frac{1}{2}b \sin b$ وهي تكافئ $\tan \frac{b}{2} \geq \frac{b}{2}$ التي أثبتنا

صحتها سابقاً. أمّا في حالة $b = \pi$ فتؤول المترابحة إلى المترابحة المعروفة $\cos a + 1 \geq 0$.

12 البحث عن تابعٍ أصلي

ليكن التابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = e^{2x} \sin x$. عيّن تابعاً أصلياً F للتابع f .

نحو الحل

التابع المدروس مستمر فله تابع أصلي، ولكننا لا نتعرّف على صيغته بين الصيغ المألوفة لدينا، لذلك نسعى لكتابته بالشكل $F(x) = \int_0^x e^{2t} \sin t dt$ ، آملين أن تفيدنا مُكاملة بالتجزئة لأنّ للتابع المُكامل شكل جداء ضرب. أثبت أنّ

$$F(x) = \int_0^x e^{2t} \sin t dt = \frac{1}{2} e^{2x} \sin x - \frac{1}{2} \int_0^x e^{2t} \cos t dt$$

التكامل في الطرف الأيمن يشبه التكامل المطلوب ولكن استبدل فيه تابع التجيب بتابع الجيب. ومنه تأتي فكرة إجراء مُكاملة بالتجزئة ثانية، إذ نتوقّع أن يظهر التابع F مجدداً.

$$1. \text{ أثبت أنّ } \int_0^x e^{2t} \cos t dt = \frac{1}{2} e^{2x} \cos x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} F(x)$$

2. استنتج عبارة F .

طريقة ثانية. قد يخطر لنا أن نقم المشتقات المتتالية للتابع f ونبحث عن علاقة بين f و f' و f'' .

1. احسب $f'(x)$ و $f''(x)$.

2. جد العددين الحقيقيين a و b اللذين يحققان $f(x) = af'(x) + bf''(x)$.

3. استنتج عبارة $F(x)$ حيث F تابعٍ أصلي للتابع f .

أنجز الحلّ واكتبه بلغةٍ سليمة.

الحل

ليكن $F(x) = \int_0^x e^{2t} \sin t dt$ ، بإجراء مُكاملة بالتجزئة نجد

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x e^{2t} \sin t dt = \left[\frac{e^{2t}}{2} \sin t \right]_0^x - \int_0^x \frac{e^{2t}}{2} \cos t dt \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \sin x - \frac{1}{2} \int_0^x e^{2t} \cos t dt \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \sin x - \frac{1}{2} \left(\left[\frac{e^{2t}}{2} \cos t \right]_0^x - \int_0^x \frac{e^{2t}}{2} (-\sin t) dt \right) \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \sin x - \frac{1}{4} e^{2x} \cos x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \int_0^x e^{2t} \sin t dt \end{aligned}$$

إذن

$$F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{4}e^{2x} \cos x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}F(x)$$

ومنه

$$F(x) = \frac{1}{5}e^{2x}(2 \sin x - \cos x) + \frac{1}{5}$$

طريقة ثانية. نلاحظ أنّ

$$f(x) = e^{2x} \sin x$$

$$f'(x) = e^{2x}(\cos x + 2 \sin x)$$

$$f''(x) = e^{2x}(4 \cos x + 3 \sin x)$$

إذن $4f'(x) - f''(x) = 5e^{2x} \sin x = 5f(x)$ ومنه نستنتج أنّ

$$f = \frac{4}{5}f' - \frac{1}{5}f'' = \left(\frac{4}{5}f' - \frac{1}{5}f'' \right)'$$

إذن

$$x \mapsto \frac{4}{5}f(x) - \frac{1}{5}f'(x) = \frac{1}{5}e^{2x}(2 \sin x - \cos x)$$

هو تابع أصلي للتابع f .

12 البحث عن تابع أصلي

ليكن التابع f المعروف على \mathbb{R} وفق $f(x) = (1 + x + x^2 + x^3)e^{-x}$. أوجد تابع كثير الحدود P بحيث يكون $F : x \mapsto P(x)e^{-x}$ تابعاً أصلياً للتابع f على \mathbb{R} ؟

نحو الحل 


التحليل: لنفترض وجود كثير الحدود P هذا.

1. أثبت أنّ كون F تابعاً أصلياً للتابع f يقتضي أن يكون

$$(*) \quad P'(x) - P(x) = 1 + x + x^2 + x^3$$

2. لماذا يجب أن يكون $\deg P = 3$ ؟

3. بوضع $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ عيّن اعتماداً على $(*)$ الأمثال a و b و c و d .

التركيب: أثبتنا أنّه إذا كان P موجوداً فمن الواجب أن يكون له الصيغة التي وجدناها أعلاه. 

وبالعكس تحقق أنّ التابع F الذي وجدته تابعاً أصلياً للتابع f على \mathbb{R} .

أنجز الحل وكتبه بلغة سليمة. 

لنفترض وجود كثير حدود P بحيث يكون $F : x \mapsto P(x)e^{-x}$ تابعاً أصلياً للتابع f عندئذ من

$$F' = f \text{ نستنتج أن } (P'(x) - P(x))e^{-x} = (1 + x + x^2 + x^3)e^{-x} \text{ أي}$$

$$P'(x) - P(x) = 1 + x + x^2 + x^3$$

ولكن درجة P' أصغر تماماً من درجة P فدرجة الطرف الأيسر تساوي درجة P في حين درجة الطرف الأيمن تساوي 3. إذن لا بد أن يكون $\deg P = 3$. هذا يجعلنا نفترض أن

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

وبالتعويض في (*) نجد

$$-ax^3 + (3a - b)x^2 + (2b - c)x + c - d = x^3 + x^2 + x + 1$$

نتحقق العلاقة (*) إذا تحققت الشروط

$$c - d = 1, 2b - c = 1, 3a - b = 1, a = -1$$

$$\text{أي } d = -10, c = -9, b = -4, a = -1$$

وبالعكس، نتيقن مباشرة أن

$$\left((-x^3 - 4x^2 - 9x - 10)e^{-x} \right)' = f(x)$$

الجواب إذن: نعم يوجد تابع كثير الحدود P بحيث يكون $F : x \mapsto P(x)e^{-x}$ تابعاً أصلياً للتابع f على \mathbb{R} .



قُدماً إلى الأمام

في كل حالة من الحالات الآتية، جد تابعاً أصلياً F للتابع f على المجال I :

13

$$I =]-\pi, 0[, \quad f(x) = \cot x \quad \textcircled{2} \quad I = \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1 - 2x}{(2x^2 - 2x + 1)^3} \quad \textcircled{1}$$

$$I =]0, \frac{\pi}{2}[, \quad f(x) = \frac{1}{\sin(2x)} \quad \textcircled{4} \quad I = \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1 - x}{\sqrt{x^2 - 2x + 2}} \quad \textcircled{3}$$

$$I = \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = \frac{1}{x^2} \times e^{-\frac{2}{x}} \quad \textcircled{6} \quad I = \mathbb{R}, \quad f(x) = (1 - 2x)^4 \quad \textcircled{5}$$

$$I = \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = \frac{\ln x - 1}{x^2} \quad \textcircled{8} \quad I = \mathbb{R}, \quad f(x) = 2e^{2-3x} \quad \textcircled{7}$$

$$I =]-1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{3x + 2}{2\sqrt{x + 1}} \quad \textcircled{10} \quad I = \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{x^2} \quad \textcircled{9}$$

الحل

$$\begin{array}{ll}
I =]-\pi, 0[, & f(x) = \ln(-\sin(x)) \quad \textcircled{2} \\
I =]0, \frac{\pi}{2}[, & f(x) = \frac{1}{2} \ln(\tan x) \quad \textcircled{4} \\
I = \mathbb{R}_+^*, & f(x) = \frac{e^{-2/x}}{2} \quad \textcircled{6} \\
I = \mathbb{R}_+^*, & f(x) = -\frac{\ln x}{x} \quad \textcircled{8} \\
I =]-1, +\infty[, & f(x) = x\sqrt{x+1} \quad \textcircled{10}
\end{array}
\quad
\begin{array}{ll}
I = \mathbb{R}, & F(x) = \frac{1}{4(2x^2 - 2x + 1)^2} \quad \textcircled{1} \\
I = \mathbb{R}, & F(x) = -\sqrt{x^2 - 2x + 2} \quad \textcircled{3} \\
I = \mathbb{R}, & F(x) = \frac{1}{10}(2x - 1)^5 \quad \textcircled{5} \\
I = \mathbb{R}, & F(x) = -\frac{2}{3}e^{2-3x} \quad \textcircled{7} \\
I = \mathbb{R}_+^*, & F(x) = -\frac{\sin(x)}{x} \quad \textcircled{9}
\end{array}$$

14 في كل من الحالات الآتية احسب التكامل المعطى.

$$\begin{array}{ll}
I = \int_0^2 \frac{4x - 5}{2x + 1} dx \quad \textcircled{2} & I = \int_{-2}^0 \frac{x}{x - 1} dx \quad \textcircled{1} \\
I = \int_0^3 \frac{x + 2}{(x + 1)^4} dx \quad \textcircled{4} & I = \int_{-1}^2 \frac{2x}{x^2 - 9} dx \quad \textcircled{3} \\
I = \int_1^2 \frac{8x^2 - 4}{4x^2 - 1} dx \quad \textcircled{6} & I = \int_0^1 \frac{2x^3 - 3x - 4}{x - 2} dx \quad \textcircled{5}
\end{array}$$

الحل

$$\begin{array}{ll}
I = 4 - \frac{7}{2} \ln(5) \quad \textcircled{2} & I = 2 - \ln(3) \quad \textcircled{1} \\
I = \frac{51}{64} \quad \textcircled{4} & I = -\ln\left(\frac{8}{5}\right) \quad \textcircled{3} \\
I = 2 - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{9}{5}\right) \quad \textcircled{6} & I = \frac{23}{3} - 6 \ln(2) \quad \textcircled{5}
\end{array}$$

15 في كل من الحالات الآتية جد تابعاً أصلياً للتابع f مستفيداً من العلاقة $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

$$f(x) = \sin^3 x \cdot \cos^2 x \quad \textcircled{3} \quad f(x) = \sin x + \sin^3 x \quad \textcircled{2} \quad f(x) = \cos^3 x \quad \textcircled{1}$$

الحل

هنا ①

$$f(x) = \cos^3 x = (1 - \sin^2 x) \sin' x = \left(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x\right)'$$

إذن $F : x \mapsto \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x$ هو تابع أصلي للتابع $f : x \mapsto \cos^3 x$.

هنا ②

$$f(x) = \sin x + \sin^3 x = (\cos^2 x - 2) \cos' x = \left(\frac{1}{3} \cos^3 x - 2 \cos x\right)'$$

إذن $F : x \mapsto \frac{1}{3} \cos^3 x - 2 \cos x$ هو تابع أصلي للتابع $f : x \mapsto \sin x + \sin^3 x$.

③ هنا

$$f(x) = \sin^3 x \cdot \cos^2 x = (\cos^4 x - \cos^2 x) \cos' x = \left(\frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x\right)'$$

إذن $f : x \mapsto \sin^3 x \cdot \cos^2 x$ هو تابع أصلي للتابع $F : x \mapsto \frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x$

16 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \sin^4 x$

① احسب $f'(x)$ و $f''(x)$. واكتب $f(x)$ بدلالة $\cos 4x$ و $f''(x)$

② استنتج تابعاً أصلياً F للتابع f على \mathbb{R} .

الحل

① لدينا

$$f(x) = \sin^4 x$$

$$f'(x) = 4 \sin^3 x \cos x$$

$$f''(x) = 12 \sin^2 x \cos^2 x - 4 \sin^4 x$$

$$= 3 \sin^2 2x - 4f(x) = 3 \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} - 4f(x)$$

② نستنتج مما سبق أنّ

$$f(x) = \frac{3}{8} - \frac{3}{8} \cos 4x - \frac{1}{4} f''(x) = \left(\frac{3}{8} x - \frac{3}{32} \sin 4x - \frac{1}{4} f'(x) \right)'$$

إذن $f : x \mapsto \sin^4 x$ هو تابع أصلي للتابع $F : x \mapsto \frac{3}{8} x - \frac{3}{32} \sin 4x - \sin^3 x \cos x$

17 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = x^3 e^{2x}$ ، جد تابعاً أصلياً F للتابع f على \mathbb{R}

بالصيغة $F(x) = P(x)e^{2x}$ ، حيث P تابع كثير حدود.

الحل

باتباع أسلوب التمرين 12 نبحث عن F بالصيغة $F(x) = (ax^3 + bx^2 + cx + d)e^{2x}$. الشرط

$$F' = f \text{ يُكافئ: } x^3 = (3ax^2 + 2bx + c) + 2(ax^3 + bx^2 + cx + d) \text{ أو}$$

$$(2a - 1)x^3 + (2b + 3a)x^2 + 2(c + b)x + 2d + c = 0$$

وعليه يكفي أن نختار $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{4}, c = \frac{3}{4}, d = -\frac{3}{8}$. لنجد أنّ

$$x \mapsto F(x) = \frac{1}{8}(4x^3 - 6x^2 + 6x - 3)e^{2x}$$

تابع أصلي للتابع $f(x) = x^3 e^{2x}$.

18 نريد حساب $I = \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2} dx$. احسب $J = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ ، ثم $I + J$ ، واستنتج I .

الحل

من جهة أولى

$$J = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2$$

ومن جهة ثانية

$$\begin{aligned} I + J &= \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x+x^3}{1+x^2} dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

إذن $I = \frac{1}{2}(1 - \ln 2)$

19 نريد حساب $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{1+2\sin x} dx$. احسب $J = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+2\sin x} dx$ ، ثم $I + J$ ، واستنتج I .

الحل

من جهة أولى

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+2\sin x} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(1+2\sin x) \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \ln 3$$

ومن جهة ثانية

$$\begin{aligned} I + J &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{1+2\sin x} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+2\sin x} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{2\sin x \cos x + \cos x}{1+2\sin x} dx = \int_0^{\pi/2} \cos x dx = 1 \end{aligned}$$

إذن $I = 1 - \frac{1}{2} \ln 3$

20 ليكن التابع f المعرفة على \mathbb{R} وفق $f(x) = e^{2x} \cos x$.

① احسب $f'(x)$ و $f''(x)$.

② عيّن عددين a و b يحققان المساواة $f(x) = af'(x) + bf''(x)$ أيّاً كان x .

③ استنتج تابعاً أصلياً F للتابع f على \mathbb{R} .

الحل

① لدينا

$$f(x) = e^{2x} \cos x$$

$$f'(x) = e^{2x}(2 \cos x - \sin x)$$

$$f''(x) = e^{2x}(3 \cos x - 4 \sin x)$$

② علينا حذف الحد الذي يحوي $\sin x$ من صيغتي $f'(x)$ و $f''(x)$ فنجد

$$4f'(x) - f''(x) = e^{2x}(5 \cos x) = 5f(x)$$

③ نستنتج إذن أنّ $f(x) = \left(\frac{4}{5}f'(x) - \frac{1}{5}f''(x)\right)'$ وهذا يبرهن أنّ

$$x \mapsto F(x) = \frac{4}{5}f'(x) - \frac{1}{5}f''(x) = \frac{1}{5}e^{2x}(2 \cos x + \sin x)$$

هو تابع أصلي للتابع $x \mapsto f(x) = e^{2x} \cos x$ على \mathbb{R} .

21 F و G تابعان أصليّان للتابعين $f : x \mapsto \cos(\ln x)$ و $g : x \mapsto \sin(\ln x)$ على $]0, +\infty[$ ،

ينعدمان عند $x = 1$. انطلاقاً من الصيغتين

$$G(x) = \int_1^x \sin(\ln t) dt \quad \text{و} \quad F(x) = \int_1^x \cos(\ln t) dt$$

① أثبت باستعمال التكامل بالتجزئة أنّ:

$$G(x) = x \sin(\ln x) - F(x) \quad \text{و} \quad F(x) = x \cos(\ln x) - 1 + G(x)$$

② استنتج عبارتي $G(x)$ و $F(x)$.

الحل

① من جهة أولى

$$F(x) = \int_1^x \cos(\ln t) dt = \left[t \cos(\ln t) \right]_1^x - \int_1^x t(-\sin(\ln t)) \frac{1}{t} dt$$

$$= x \cos(\ln x) - 1 + \int_1^x \sin(\ln t) dt = x \cos(\ln x) - 1 + G(x)$$

$$G(x) = \int_1^x \sin(\ln t) dt = \left[t \sin(\ln t) \right]_1^x - \int_1^x t(\cos(\ln t)) \frac{1}{t} dt$$

$$= x \sin(\ln x) - \int_1^x \cos(\ln t) dt = x \sin(\ln x) - F(x)$$

إذن

$$\begin{cases} F(x) - G(x) = x \cos(\ln x) - 1 \\ F(x) + G(x) = x \sin(\ln x) \end{cases}$$

② وبالحل المشترك لجملة المعادلتين السابقتين نجد

$$F(x) = \frac{1}{2}(x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - 1)$$

$$G(x) = \frac{1}{2}(x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) + 1)$$

22 إثبات متراجحة

① تبيّن أنه في حالة $0 < x < a$ يكون $\frac{1}{1+a} \leq \frac{1}{1+x} \leq 1$

② استنتج أنّ $\frac{a}{1+a} \leq \ln(1+a) \leq a$ في حالة $a > 0$.

الحل

① التابع $x \mapsto x+1$ متزايداً على \mathbb{R}_+ ، فيكون $g: x \mapsto \frac{1}{1+x}$ متناقصاً على \mathbb{R}_+ ، وينتج من ذلك

أنه في حالة $0 < x < a$ لدينا $g(a) \leq g(x) \leq g(0)$ وهي المتراجحة المطلوبة.

② إذن في حالة $a > 0$ لدينا

$$\int_0^a \frac{1}{1+a} dx \leq \int_0^a \frac{1}{1+x} dx \leq \int_0^a dx$$

$$\cdot \frac{a}{1+a} \leq \ln(1+a) \leq a \text{ أي}$$


23 فيما يأتي، ارسم الخط البياني C الذي يُمثل التابع f ، ثم احسب مساحة السطح المحصور بين

C ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = a$ و $x = b$.

$$a = 1, \quad b = 4, \quad f(x) = \frac{6}{(2x+1)^2} \quad \text{②} \quad \left| \quad a = 0, \quad b = 1, \quad f(x) = 2 + x - x^2 \quad \text{①}$$

$$a = -1, \quad b = \ln 2, \quad f(x) = (x+1)e^{-x} \quad \text{④} \quad \left| \quad a = 0, \quad b = \frac{\pi}{4}, \quad f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \quad \text{③}$$

الحل



① الخط البياني للتابع f قطع مكافئ فتحته نحو الأسفل ومحور


تناظره المستقيم الذي معادلته $x = \frac{1}{2}$ ، وخطه البياني C يقطع

محور الفواصل عند $x = 2$ و $x = -1$ ، وعلى المجال $[0, 1]$

يقع الخط البياني للتابع f فوق محور الفواصل. إذن مساحة

$$\text{السطح المطلوب تساوي } \int_0^1 (2 + x - x^2) dx = \frac{13}{6}$$

② هنا التابع f معرف على $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$ ، ويحقق $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ فمحور



الفواصل الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للخط البياني، وكذلك فإن $\lim_{x \rightarrow -1/2} f(x) = +\infty$ ، فالمستقيم الذي معادلته $x = -\frac{1}{2}$ مستقيم مقارب للخط البياني \mathcal{C} .

وأخيراً نجد بحساب بسيط للمشتق أن f متناقص تماماً على كل من المجالين $]-\infty, -\frac{1}{2}[$ و $]-\frac{1}{2}, +\infty[$. وهو موجب على كامل مجموعة الدراسة. إذن مساحة السطح المطلوب تساوي


$$\int_1^4 \frac{6}{(1+2x)^2} dx = \frac{2}{3}$$

③ هنا التابع f تابع دوري ويقبل العدد π دوراً. فنكفي دراسته على المجال $[0, \pi]$. المشتق

$f'(x) = -2 \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ ينعدم على مجال الدراسة فقط عند $x = \frac{\pi}{8}$ و $x = \frac{5\pi}{8}$ ، وهذا يتيح لنا

وضع جدول التغيرات الآتي:

x	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{8}$	π			
$f'(x)$		+	-	+			
$f(x)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	\nearrow	1	\searrow	-1	\nearrow	$\frac{\sqrt{2}}{2}$



التابع f موجباً على المجال $[0, \frac{\pi}{4}]$. إذن مساحة السطح


$$\int_0^{\pi/4} \cos(2x - \frac{\pi}{4}) dx = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

④ هنا التابع f معرف على \mathbb{R} ، ويحقق $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ فمحور الفواصل

الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للخط البياني.

أما المشتق فيعطى بالصيغة $f'(x) = -xe^{-x}$ فإشارته تعاكس إشارة x ، وهذا يتيح لنا وضع

جدول التغيرات الآتي:



x	$-\infty$	0	$+\infty$		
$f'(x)$		+	-		
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	1	\searrow	0


الخط البياني للتابع f يقع فوق محور الفواصل على المجال

$]-1, +\infty[$ ، إذن مساحة السطح المطلوب تساوي

$$\int_{-1}^{\ln 2} (x+1)e^{-x} dx = \left[-(x+1)e^{-x} \right]_{-1}^{\ln 2} + \int_{-1}^{\ln 2} e^{-x} dx = e - 1 - \frac{1}{2} \ln 2$$

24 ارسم في جملة متجانسة الخطين البيانيين للتابعين $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto x \sin x$ على المجال $[0, \pi]$. ما مساحة السطح المحصور بين هذين الخطين على المجال $[0, \pi]$.


الحل



الخط البياني للتابع $x \mapsto \sin x$ على المجال $[0, \pi]$ معروف. ويوافق أية نقطة $M(x, \sin x)$ من هذا الخط توافقها نقطة $N(x, x \sin x)$ من الخط البياني للتابع $x \mapsto x \sin x$. النقطة N تقع تحت M في حالة $0 < x < 1$ وتقع فوقها في حالة $1 < x < \pi$. هذه الملاحظة تفيد في إعطاء الرسم المبين في الشكل المجاور.

إذن مساحة السطح المطلوب تساوي

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^{\pi} |\sin x - x \sin x| dx = \int_0^{\pi} |1 - x| \sin x dx \\ &= \int_0^1 (1 - x) \sin x dx + \int_1^{\pi} (x - 1) \sin x dx \\ &= \left[(1 - x)(-\cos x) \right]_0^1 - \int_0^1 \cos x dx + \left[(x - 1)(-\cos x) \right]_1^{\pi} + \int_1^{\pi} \cos x dx \\ &= \pi - \left[\sin x \right]_0^1 + \left[\sin x \right]_1^{\pi} = \pi - 2 \sin(1) \end{aligned}$$



25 ليكن الخط البياني للتابع $x \mapsto x^2$ مرسوماً على المجال $[-2, 2]$. المستقيم d_m الذي معادلته $y = m$ ($0 \leq m \leq 4$) يقسم داخل جزء القطع المكافئ \mathcal{P} إلى منطقتين.

عند أية قيمة للوسيط m تتساوى مساحتا هاتين المنطقتين؟

الحل

لتكن $\mathcal{A}(m)$ مساحة الجزء من داخل القطع الذي يحده المستقيم d_m . يقطع d_m القطع في النقطتين اللتين فاصلتاها $-\sqrt{m}$ و \sqrt{m} . وعليه

$$\mathcal{A}(m) = \int_{-\sqrt{m}}^{\sqrt{m}} (m - x^2) dx = \frac{4}{3} m \sqrt{m}$$

يتحقق الشرط المعطى عند قيمة m التي تحقق $\mathcal{A}(m) = \frac{1}{2} \mathcal{A}(4)$ ، وهذا يكافئ $m = 2\sqrt[3]{2}$.

ليكن f الخط البياني للتابع f المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = (2-x)e^x$. وليكن C خطه البياني في جملة متجانسة.

① ادرس تغيرات f وارسم C .

② ليكن C_1 الجزء من الخط البياني C المحصور بين المستقيمين اللذين معادلتهما $x=0$ و $x=2$ ، وليكن S السطح المحصور بين C_1 ومحور الفواصل . احسب مساحة S .

③ عندما يدور السطح S حول محور الفواصل فإنه يولد مجسماً دورانياً حجمه \mathcal{V} .

a . عيّن الأعداد a و b و c حتى يكون التابع $G : x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^{2x}$ تابعاً أصلياً

للتابع $(f(x))^2$. $x \mapsto$


b . استنتج قيمة \mathcal{V} .

الجدل

① لدينا من جهة أولى $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ ، ومن جهة ثانية $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ لأن $\lim_{X \rightarrow \infty} X e^{-X} = 0$ و $f(x) = e^2 X e^{-X}$ حيث $X = 2 - x$. فمحور الفواصل الذي معادلته $y = 0$ هو مستقيم مقارب للخط البياني C للتابع f في جوار $-\infty$.

وكذلك $f'(x) = (1-x)e^x$. ومنه جدول التغيرات الآتي:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	0	$\nearrow e$	$\searrow -\infty$



ونلاحظ على الخصوص أنّ C يتقاطع مع محور الفواصل في $(2,0)$. ومنه الرسم البياني المرافق.


② لدينا : $\mathcal{A}(S) = \int_0^2 (2-x)e^x dx = \left[(2-x)e^x \right]_0^2 + \int_0^2 e^x dx = e^2 - 3$.

③ يكون $G : x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^{2x}$ تابعاً أصلياً للتابع $(f(x))^2 = (x^2 - 4x + 4)e^{2x}$ إذا وفقط إذا تحقّق أيّاً كانت x المساواة : $2(ax^2 + bx + c) + (2ax + b) = (x^2 - 4x + 4)$ أو

$$(2a-1)x^2 + 2(b+a+2)x + 2c + b - 4 = 0$$

إنّ نأخذ $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{5}{2}, c = \frac{13}{4}$ ، نستنتج أنّ $G(x) = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{13}{4} \right) e^{2x}$ هو تابع أصلي للتابع $(f(x))^2$. إذا رمزنا بالرمز $A(x)$ إلى مساحة مقطع الجسم الدوراني المدروس بالمستوي العمودي على محور الدوران المار بالنقطة التي فاصلتها x استنتجنا أنّ $A(x) = \pi(f(x))^2$. إنّه حجم الجسم المدروس يساوي

$$\mathcal{V} = \int_0^2 \pi(f(x))^2 dx = \left[\pi G(x) \right]_0^2 = \frac{\pi(e^4 - 13)}{4}$$



27 مسألة مركبة

1 في معلم متجانس رسمنا الخطين البيانيين C و Γ لتابعين اشتقاقيين على \mathbb{R} . نعلم أن أحدهما مشتق للآخر، لذلك يمكن أن نرمز إليهما g و g' .

1 بين معلماً أي هذين الخطين هو الخط البياني للتابع g وأيهما لمشتقه.

2 ما ميل المماس للخط C في النقطة التي فاصلتها 0 ؟

2 نتأمل المعادلة التفاضلية : $y' + y = 2(x+1)e^{-x}$ (E)

1 أثبت أن $f_0 : x \mapsto (x^2 + 2x)e^{-x}$ هو حل للمعادلة التفاضلية (E).

2 لتكن (E') المعادلة التفاضلية $y' + y = 0$. أثبت أن « حل للمعادلة (E) » يكافئ

« $u = f - f_0$ حل للمعادلة (E') ». ثم حل (E') واستنتج صيغة $f(x)$ عندما يكون f

حلاً للمعادلة (E).

3 إذا علمت أن التابع g من الجزء 1 هو حل للمعادلة (E)، فأعط صيغة $g(x)$ بدلالة x .

4 عيّن h حل المعادلة (E) الذي يقبل مماساً أفقياً عند $x = 0$.

3 ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$.

1 ادرس التابع وضع جدولاً بتغيراته، مبيّناً نهاياته عند $+\infty$ و $-\infty$.

2 ليكن C' الخط البياني الذي يمثّل f في معلم متجانس. اكتب معادلة للمماس T للخط C'

في النقطة Ω التي فاصلتها -1. وارسم C' و T .

3 عيّن الأعداد a و b و c حتى يكون التابع $F : x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ تابعاً أصلياً للتابع

f على \mathbb{R} . ثم احسب $A(\alpha)$ مساحة السطح المحصور بين محور الفواصل و C'

والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = \alpha$ و $x = 0$.

الحل

1 لو افترضنا جديلاً أن Γ هو الخط البياني للتابع g لوجدنا g يبلغ قيمة عظمى محلياً عند نقطة

من المجال $]-1, 0[$ ، ولوجب أن ينعدم مشتقه عندها، أي وجب أن يقطع الخط البياني C للمشتق

محور الفواصل في نقطة من هذا المجال وهذا يناقض الرسم المعطى. إذن لا بد أن يكون C هو الخط

البياني للتابع g ، و Γ هو الخط البياني للتابع g' .

2 نقرأ من الرسم أن ميل المماس للخط C في النقطة التي فاصلتها 0 يساوي الواحد أي $g'(0) = 1$.

2 نلاحظ أن

$$f_0(x) + f_0'(x) = (x^2 + 2x)e^{-x} + (2x + 2)e^{-x} - (x^2 + 2x)e^{-x} = 2(x + 1)e^{-x}$$

إذن f_0 هو حل للمعادلة التفاضلية (E).

② نلاحظ أنّ

$$u(x) + u'(x) = f(x) + f'(x) - f_0(x) - f_0'(x) = f(x) + f'(x) - 2(x+1)e^{-x}$$

إذن $u(x) + u'(x) = 0$ يكافئ $f(x) + f'(x) - 2(x+1)e^{-x} = 0$ أي يكون $u = f - f_0$ حلاً للمعادلة التفاضلية (E') إذا وفقط إذا كان f حلاً للمعادلة التفاضلية (E). ولكن لأي حلّ للمعادلة التفاضلية (E') الصيغة $u(x) = ke^{-x}$ حيث k ثابت حقيقي. إذن $f(x) = (x^2 + 2x + k)e^{-x}$ حيث $k \in \mathbb{R}$.

③ التابع g هو حلّ للمعادلة التفاضلية (E)، فهو من الصيغة $g(x) = (x^2 + 2x + \lambda)e^{-x}$ حيث يتعيّن الثابت λ بالشرط $g(0) = 1$ ومنه $\lambda = 1$. إذن $g(x) = (x+1)^2 e^{-x}$.

④ التابع g هو أيضاً حلّ للمعادلة التفاضلية (E)، فهو من الصيغة $h(x) = (x^2 + 2x + \mu)e^{-x}$ حيث يتعيّن الثابت μ بالشرط $h'(0) = 0$. ولكن من (E) لدينا $h(0) + h'(0) - 2 = 0$ أي $\mu = h(0) = 2$ ومنه $h(x) = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$.


③ ① لما كان $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2x + 2) = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. ومن جهة أخرى، لأنّ

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$ أيّاً كانت $n \geq 0$ ، استنتجنا أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. فمحور الفواصل الذي معادلته

$y = 0$ هو مستقيم مقارب للخط البياني C' للتابع f . ومن جهة أخرى

$$f'(x) = (2 + 2x)e^{-x} - f(x) = -x^2 e^{-x}$$

وهو موجب على \mathbb{R} ولا ينعدم إلا في حالة $x = 0$. ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f :



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$ 0 $-$	
$f(x)$	$+\infty$	\searrow 2 \searrow	0

② لدينا $f(-1) = e$ و $f'(-1) = -e$ ، إذن معادلة المماس T للخط C' في النقطة Ω التي فاصلتها

$$-1 \text{ هي } y = -ex$$

③ إنّ مشتق $F : x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ يساوي f إذا وفقط إذا كان

$$(a+1)x^2 + (2+b-2a)x + 2+c-b = 0$$

أيّاً كانت قيمة x ، وهذا يكافئ $a = -1, b = -4, c = -6$. إذن $F : x \mapsto (-x^2 - 4x - 6)e^{-x}$ هو تابع أصلي للتابع f .

$$A(\alpha) = \int_0^\alpha f(x)dx = F(\alpha) - F(0) = 6 - (\alpha^2 + 4\alpha + 6)e^{-\alpha}$$

وهي النتيجة المطلوبة. لاحظ بوجه خاص أنّ $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha) = 6$