



بَنك أسئلة المتتاليات

دورة 2021



بنك أسئلة المتتاليات

دورة 2021

إعداد :

0936497038

اللاذقية

أوسيم فاطمة

0936834286

سلمية

أزياد داوود

0998024183

الرقة

أحمد الشيخ عيسى

0930170828

حمص

م . مروان بجور

التمرين 1 :

لتكن لدينا المتتالية $u_n = 3n + 1$ والمطلوب :

① أثبت أن المتتالية حسابية ثم أوجد حدها الأول وأساسها

② احسب $S = u_3 + u_4 + \dots + u_8$

التمرين 2 :

$(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية حسابية تحقق $u_3 = -5$, $u_{15} = 31$

عين r , u_{25} , u_n بدلالة n ثم احسب

$$S = u_3 + u_4 + \dots + u_{25}$$

التمرين 3 :

لتكن لدينا المتتالية $u_n = \frac{2}{3^n}$ والمطلوب

① أثبت أن المتتالية هندسية ثم أوجد أساسها و حدها الأول

② احسب $S_1 = u_1 + \dots + u_4$, $S_2 = u_2 + u_4 + \dots + u_{10}$

التمرين 4 :

$(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية فيها $u_3 = 6$ و $u_6 = 48$ عين أساسها q وعين u_n بدلالة n

ثم احسب $S = u_2 + u_3 + \dots + u_9$

التمرين 5 : دورة 2018 الثانية

$(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية فيها $q = 2$ $u_0 = 1$ احسب u_3 ثم احسب المجموع

$$S = u_3 + u_4 + u_5 + u_6 + u_7$$

التمرين 6 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة وفق : $u_n = \frac{n-1}{n}$ والمطلوب :

① أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة تماما.

② أثبت أن $0 \leq u_n < 1$ ثم استنتج تقارب المتتالية واحسب نهايتها

③ جد عددا طبيعيا n_0 يجعل $u_n \in]0.99, 1.01[$ عند كل n أكبر تماما من n_0

التمرين 7 : دورة 2019 الثانية

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة كما يأتي: $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$ و المطلوب:

① أدرس اطراد المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$

② أثبت أن العدد 2 راجح على $(u_n)_{n \geq 0}$

③ احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$ ثم حدد عدداً طبيعياً n_0 يحقق أياً كان $n \geq n_0$ كان u_n في المجال

$$]1.9, 2.1[$$

التمرين 8 :

المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ معرفة وفق $u_n = \frac{n^3}{n!}$

1 أحسب حدودها الثلاثة الأولى

2 أثبت أن $n! \geq n(n-1)(n-2)(n-3)$ أيًا يكن $n \geq 4$

3 استنتج نهاية $(u_n)_{n \geq 1}$

التمرين 9 :

ليكن عند كل عدد طبيعي n ، $u_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

1 أوجد عددين حقيقيين b و a يحققان عند كل عدد طبيعي n ، $u_n = \frac{a}{2n-1} + \frac{b}{2n+1}$

2 ليكن، في حالة عدد طبيعي n ،

$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. عبّر عن S_n بدلالة n واستنتج نهاية المتتالية $(S_n)_{n \geq 0}$.

التمرين 10 :

a, b, c ثلاث حدود متعاقبة في متتالية هندسية متزايدة تحقق :

$$a + b + c = 14 \quad , \quad a + 3b + 2c = 30$$

أوجد كل من a, b, c

التمرين 11 :

a, b, c ثلاث حدود متعاقبة في متتالية هندسية أساسها q ($a \neq 0$) أحسب q : إذا علمت أن

$$a \quad , \quad \frac{b}{4} \quad , \quad \frac{c}{18}$$

ثلاث حدود متعاقبة من متتالية حسابية

التمرين 12 : دورة 2017 الثانية (معدل)

1 المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

a. أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة

b. أثبت أن $0 \leq u_n \leq 1$ واستنتج أنها متقاربة واحسب نهايتها

2 المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$ معرفة عند كل $n \geq 1$ وفق

$$v_n = 1 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n}}$$

a. أثبت أن $u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$

ثم استغذ من عبارة u_n بصيغتها الوردتين لاستنتاج عبارة بسيطة للحد v_n بدلالة n

b. استنتج قيمة المجموع $S = \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$

c. استنتج نهاية المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$

التمرين 13 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ التي تحقق : $u_n = \left(\frac{n}{2} - 1\right)^n$

① جد عدداً طبيعياً n_0 يحقق $u_n \geq 9^n$ عندما $n > n_0$

② استنتج نهاية u_n

التمرين 14 : دورة 2018 الأولى

ليكن لدينا المتتاليتان $(u_n)_{n \geq 1}$ ، $(v_n)_{n \geq 1}$ المعرفتان وفق: $u_n = 5 - \frac{1}{n}$ ، $v_n = 5 + \frac{1}{n^2}$ والمطلوب :

- ① أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة .
- ② أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$ متناقصة .
- ③ هل المتتاليتان $(u_n)_{n \geq 1}$ ، $(v_n)_{n \geq 1}$ متجاورتان ؟ علل إجابتك .

التمرين 15 : النموذج الوزاري الخامس

التمرين الأول:

لتكن المتتالية $u_n = 4n + 1$ أثبت أن المتتالية حسابية

وأحسب $u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$

التمرين الثاني:

لتكن المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ المعرفتين وفق

$$y_n = \frac{4n + 1}{n + 2} \text{ و } x_n = \frac{4n + 5}{n + 1}$$

أثبت أن المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}$ و $(y_n)_{n \geq 0}$ متجاورتان.

التمرين 16 : النموذج الوزاري الثاني 2020

لتكن المتتاليتين $(u_n)_{n \geq 1}$ و $(v_n)_{n \geq 1}$ المعرفتين وفق العلاقتين : $u_n = -\frac{1}{n}$ و $v_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$

- ① ادرس اطراد كل من $(u_n)_{n \geq 1}$ و $(v_n)_{n \geq 1}$.
- ② أثبت أن المتتاليتان $(u_n)_{n \geq 1}$ و $(v_n)_{n \geq 1}$ متجاورتان

التمرين 17 :

أثبت أن $4^n + 5$ مضاعف للعدد 3 أو $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ مضاعف للعدد 7

التمرين 18 :

أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق $u_0 = 2$, $u_{n+1} = u_n - 3$ حسابية
ثم عين أساسها واحسب u_2, u_1 ثم أدرس اطرافها

التمرين 19 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق $u_n = \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1}$
أثبت أن $1 \leq u_n \leq 3$ أيًا كان العدد الطبيعي n

التمرين 20 :

جد نهاية المتتاليتين : $u_n = \frac{2n+(-1)^n}{3n}$, $v_n = \frac{n!-2}{n!}$

التمرين 21 :

المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$: $n \geq 1$
أولا : في حالة $u_0 = 1$

① أثبت أن $0 \leq u_n \leq 2$ ، أيًا كان العدد الطبيعي n

② أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة تماما

③ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة واحسب نهايتها

ثانيا : في حالة $u_0 = 2 \cos \theta$ و θ عدداً حقيقياً من المجال $]0, \frac{\pi}{2}[$

① احسب u_1 ② أثبت بالتدريج أن $u_n = 2 \cos \left(\frac{\theta}{2^n} \right)$

التمرين 22 : الاختبار 1

أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً بالعلاقات: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}$
متزايدة تماما.

التمرين 23 : النموذج الوزاري الرابع

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً بالشكل $u_{n+1} = e\sqrt{u_n}$ و $u_0 = e^3$
 $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية معرفة بالشكل $v_n = \ln(u_n) - 2$ والمطلوب:

① أثبت أن v_n هندسية وعين q و v_0 .

② اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n .

③ أثبت أن: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^2$

التمرين 24 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً بالشكل $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$: $u_0 = 1$

و المتتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالشكل $t_n = \ln(u_n) - \ln 2$ والمطلوب:

- ① أثبت أن $0 \leq u_n \leq 2$
- ② أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة
- ③ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة واحسب نهايتها
- ④ أثبت أن المتتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ هندسية و أوجد حدها العام احسب نهايتها

التمرين 45 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق : $u_{n+1} = \frac{2u_n - 1}{u_n}$, $u_0 = \frac{3}{2}$

① أثبت أن التابع $g(x) = \frac{2x-1}{x}$ متزايد تماماً واستنتج أن $1 < u_n \leq \frac{3}{2}$

② أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة تماماً .

③ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة واحسب نهايتها

التمرين 26 : النموذج الوزاري السادس

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة كما يأتي:

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} \text{ و } u_0 = 0$$

المطلوب:

① أثبت أن $0 \leq u_n \leq 1$

② أثبت أن $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة.

③ علّل تقارب المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ واحسب نهايتها.

التمرين 27 :

لتكن $(u_n)_{n \geq 0}$ المتتالية المعرفة كما يلي : $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{4}$

① لتكن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفة كما يلي $v_n = u_n - 2$

(a) أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ هندسية يُطلب إيجاد أساسها وحدها الأول .

(b) أوجد عبارة v_n بدلالة n واستنتج عبارة u_n بدلالة n . واحسب نهايتها

② احسب المجموع $S = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

التمرين 28 :

لتكن المتتاليتين $(t_n)_{n \geq 0}$, $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفتين وفق :

$$t_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2} \quad \text{و} \quad u_{n+1} = \frac{2}{u_n + 1}, \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{و عند كل } u_0 = 3$$

- ① أثبت أن $u_n > 0$ أيًا يكن $n \in \mathbb{N}$
- ② أثبت أن المتتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ هندسية واحسب نهايتها
- ③ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة واحسب نهايتها

التمرين 29 : النموذج الوزاري الأول 2020

لتكن $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية معرفة تدريجياً وفق: $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+4u_n}$ من أجل كل n من \mathbb{N} .

- ① أثبت بالتدرج أن $u_n > 0$ أيًا كان العدد الطبيعي n .
- ② أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة $v_n = \frac{1}{u_n}$ متتالية حسابية، ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n
- ③ ليكن S_n المجموع المعرف بالشكل $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ اكتب S_n بدلالة n واستنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

التمرين 30 : النموذج الوزاري الثالث

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة التدرجية

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n} \quad \text{و} \quad u_0 = \frac{1}{2}$$

- ① أثبت أن $0 < u_n < 1$ أيًا كان $n \in \mathbb{N}$
- ② نعرّف $(v_n)_{n \geq 0}$ حيث: $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$ أثبت أن $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية واستنتج v_n بدلالة n
- ③ اكتب u_n بدلالة n واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

التمرين 31 :

لتكن $(u_n)_{n \geq 1}$ متتالية معرفة على \mathbb{N}^* وفق $u_n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$

- ① جد نهاية هذه المتتالية.
- ② نضع $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.
 a . أثبت أن $S_n = \ln(n+1)$
 b . ما نهاية $(S_n)_{n \geq 1}$.

التمرين 32 : دورة 2017 الأولى

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق : $u_0 = 1$: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - 2$

و لتكن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق $v_n = u_n + 3$

① أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ هندسية و أوجد أساسها .

② اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم عبارة u_n بدلالة n .

③ ليكن في حالة عدد طبيعي n : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$,

عبر عن S_n بدلالة n واستنتج نهاية المتتالية $(S_n)_{n \geq 0}$

التمرين 33 : النموذج الوزاري الأول

لتكن $(x_n)_{n \geq 0}$ المتتالية المعطاة وفق $x_0 = 4$ و $x_{n+1} = \frac{3}{4}x_n + 2$ في حالة $n \geq 0$.

نعرف $(y_n)_{n \geq 0}$ بالعلاقة $y_n = x_n - 8$. أثبت أن $(y_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية.

واكتب y_n بدلالة n . واحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} y_n$

التمرين 34 : النموذج الوزاري الثاني

لتكن $(x_n)_{n \geq 0}$ المتتالية المعطاة وفق $x_0 = 5$ و $x_{n+1} = \frac{6}{5}x_n + \frac{4}{5}$.

① احسب x_1 , x_2 , x_3 ثم ادرس أطراد المتتالية.

② نعرف $(y_n)_{n \geq 0}$ بالعلاقة $y_n = x_n + 4$ أثبت أن $(y_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية.

③ اكتب y_n بدلالة n ثم احسب $y_2 + y_3 + \dots + y_{10}$ بدلالة قوة للعدد $\frac{6}{5}$.

التمرين 35 :

$(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية معرفة وفق $u_0 = \frac{1}{2}$, $u_{n+1} = -\frac{1}{3}u_n^2 + 2u_n$,

① أثبت أن العدد 3 راجع على المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$

② أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة تماماً.

③ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة واحسب نهايتها

التمرين 36 :

المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق : $u_0 = \frac{3}{2}$ وعند كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2$,

① أثبت مستعملاً البرهان بالتدرج أن $1 \leq u_n \leq 2$ أيأً يكن $n \in \mathbb{N}$

② أثبت أن $u_{n+1} - u_n = (u_n - 2)(u_n - 1)$ أيأً يكن $n \in \mathbb{N}$

③ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة , هل هي متقاربة

التمرين 37 :

نتأمل المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المُعرّفة وفق $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$

① أدرس اطراد المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$

② أثبت بالتدرّج أن $u_n = (n + 1)^2$

التمرين 38 :

نتأمل المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المُعرّفة وفق $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 2u_n + 3n^2 + n$

① عيّن كثير حدود من الدرجة الثانية P بحيث يجعل المتتالية $(t_n)_{n \geq 0}$ التي حدّها العام $t_n = P(n)$

تحقق العلاقة $t_{n+1} = 2t_n + 3n^2 + n$ أيّاً كانت n

② أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ التي حدّها العام $x_n = u_n - t_n$

هي متتالية هندسيّة

③ عبر عن v_n و x_n بدلالة n ثم u_n بدلالة n

التمرين 39 :

نتأمل متتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المُعرّفة وفق : $u_0 = 1, u_1 = 4$ و $u_{n+1} = 5u_n - 6u_{n-1}$ ($n \geq 1$)

① لتكن $(v_n)_{n \geq 0}$ المتتالية $v_n = u_{n+1} - 2u_n$ أثبت أن $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسيّة أساسها 3

② لتكن $(w_n)_{n \geq 0}$ المتتالية $w_n = u_{n+1} - 3u_n$ أثبت أن $(w_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسيّة أساسها 2

③ عبّر عن v_n و w_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n

التمرين 40 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ التي تحقق : $u_0 = s$ ، $0 \leq u_{n+1} - 3 \leq \frac{3}{4}(u_n - 3)$

① أثبت مستعملاً البرهان بالتدرّج أن $0 \leq u_n - 3 \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n (u_0 - 3)$ أيّاً يكن $n \in \mathbb{N}$

② استنتج نهاية u_n

③ من أجل $u_0 = 4$ عين عدداً طبيعياً N يحقق

$u_n \in]3 - 10^{-3}, 3 + 10^{-3}[$ عند كل $N < n$

التمرين 41 :

لتكن لدينا المتتاليتين $(v_n)_{n \geq 0}$ و $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفتين تدريجياً وفق :

$$v_0 = 1 \text{ و } s_0 = 12 \text{ و } v_{n+1} = \frac{v_n + 2u_n}{3} \text{ و } u_{n+1} = \frac{v_n + 3u_n}{4} \text{ والمطلوب :}$$

- ① أثبت أن المتتالية $(u_n - v_n)_{n \geq 0}$ هندسية واحسب نهايتها
- ② أثبت أن المتتاليتين $(u_n)_{n \geq 0}$ و $(v_n)_{n \geq 0}$ متجاورتان
- ③ أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق $u_n = 3v_n + 8u_n$ ثابتة ثم عين قيمتها الثابتة
- ④ استنتج النهاية المشتركة للمتتاليتين المتجاورتين $(v_n)_{n \geq 0}$ و $(u_n)_{n \geq 0}$

التمرين 42 : دورة 2020 الأولى

نتأمل المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة التدرجية: $u_0 = 3$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{2}{u_n}$ عند كل $n \geq 0$.

- ① أثبت أن التابع $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$ متزايد تماماً على $[2, +\infty[$.
 - ② أثبت بالتدرج أن $2 \leq u_{n+1} \leq u_n$ أيأ كان العدد الطبيعي n .
- استنتج أن المتتالية متقاربة , واحسب نهايتها.

التمرين 43 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة عند $n \geq 1$ وفق $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

و لتكن المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$ المعرفة عند $n \geq 1$ وفق : $v_n = u_{2n} - u_n$

- ① اثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة
- ② اثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$ متزايدة
- ③ اثبت $v_n \geq \frac{1}{2}$
- ④ أثبت مستعملاً البرهان بالتدرج أن $u_{2^n} \geq \frac{n}{2}$ أيأ كان $n \geq 1$
- ⑤ هل للمتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ نهاية حقيقية

التمرين 44 : دورة 2019 الأولى

لتكن المتتالية $(S_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق $S_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^n}$

- ① أثبت أن المتتالية $(S_n)_{n \geq 0}$ متزايدة تماماً
- ② أثبت أن S_n يكتب بالشكل وفق $S_n = \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{3^n} \right)$ ثم استنتج عنصر راجحاً على المتتالية $(S_n)_{n \geq 0}$ وبين أنها متقاربة

التمرين 45 : دورة 2020 الثانية

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة وفق: $u_n = \frac{1}{e} + \frac{2}{e^2} + \dots + \frac{n}{e^n}$. المطلوب:

- ① أثبت أن $n \leq 2^n$ أيأ كان العدد الطبيعي $n \geq 1$.
- ② استنتج أن $\frac{2}{e-2}$ عنصر راجح على المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$.
- ③ أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة.

التمرين 46 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة عند $n \geq 1$ وفق: $u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$

- ① اثبت مستعملا البرهان بالتدرج أن: $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$
- ② استنتج أن العدد 3 راجح على المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$
- ③ أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة

التمرين 47 :

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة عند كل $n \geq 1$ وفق $u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

و لتكن المتتالية $(v_n)_{n \geq 1}$ المعرفة عند كل $n \geq 1$ وفق $v_n = u_n + \frac{1}{n}$

- ① أثبت أن $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة
- ② أثبت أن $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ أيأ يكن $n \geq 1$,
- استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة
- ③ أثبت أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان

التمرين 48 :

المتتاليتان (u_n) , (v_n) معرفتان من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ :

$$v_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n} \quad \text{و} \quad u_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n+1}$$

أثبت أن المتتاليتين (v_n) و (u_n) متجاورتان .

التمرين 49 : الاختبار 3

لتكن المتتاليتان $(u_n)_{n \geq 0}$ و $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفتان كما يأتي:

$$v_n = u_n + \frac{1}{4n} \quad \text{و} \quad u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

أثبت أن هاتين المتتاليتين متجاورتين.

التمرين 50 :

نتأمل المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً وفق $u_0 = 7$ و $u_{n+1} = 10u_n - 18$

احسب u_1 و u_2 و u_3 و خمن عبارة u_n بدلالة n ثم حدّد عبارة u_n بدلالة n

التمرين 51 : الاختبار 4

نعرف المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ كما يلي : $u_0 = \frac{1}{2}$, $u_{n+1} = \frac{5u_n+4}{u_n+2}$

1 باستخدام الرسم ،

مثّل على محور الفواصل ودون حساب الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 .


2 ضع تخميناً حول أطراف المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ وتقاربها.

3 نعزّف المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ بالعلاقة: $v_n = \frac{u_n-4}{u_n+1}$

1. بين أن $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية، وعيّن أساسها وحدّها الأول.

2. اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

وعيّن نهاية المتتالية u_n .



التمرين 52 : النموذج الوزاري الثالث 2020

ليكن C_f الخط البياني للتابع f المعرفة على $]0, +\infty[$ وفق $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{4}{x}\right)$, والمطلوب:

- ① ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها.
- ② أثبت أن المستقيم d الذي معادلته $y = \frac{1}{2}x$ يقارب مائل للخط C_f , ثم ادرس الوضع النسبي.
- ③ حل المعادلة $f(x) = x$
- ④ لتكن $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية معرفة تدريجياً بالشكل: $u_0 = 4$ و $u_{n+1} = f(u_n)$ عند كل $n \in \mathbb{N}$
والمطلوب :

(a) احسب u_1 و u_2

(b) استنتج من تزايد التابع f على المجال $[2, +\infty[$ صحة الخاصة

$$E(n): 2 < u_{n+1} < u_n \quad : n \in \mathbb{N}$$

(c) استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة، واحسب نهايتها

(d) ارسم مقاربات C_f وارسم المستقيم $\Delta: y = x$ ثم ارسم C_f

ومثل الحدود الأولى للمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ على الرسم نفسه

