



الأسباب والأعراض
التشخيص والعلاج



خناق لودفيغ Ludwig's angina

- ◀ هو إصابة جلدية جرثومية نادرة تحدث في قاع الفم تحت اللسان، تكون تاليةً لخراج سني أو أي نوع من الإصابات الفموية، وهي أكثر شيوعاً لدى البالغين مقارنةً مع الأطفال.
- ◀ الأشخاص المصابون بخناق لودفيغ الذين يخضعون للعلاج باكراً يستردون عافيتهم تماماً.



أعراض خناق لودفيغ Symptoms of Ludwig's angina:

تتضمن الأعراض ما يلي:

- ألم أو حساسية عند اللمس في قاع الفم.
- صعوبة في البلع.
- سيلان اللعاب.
- مشاكل في التكلم.
- ألم وتورم واحمرار في الرقبة.
- الوهن والتعب.
- ألم أذني.
- ضخامة اللسان.
- حمى.
- قشعريرة.
- تشوش أو اضطراب.

اتصل بالطبيب إذا ظهرت عليك أعراض خناق لودفيغ.

مع تقدم الإصابة يمكن أن تعاني من صعوبة في التنفس وألم صدري.

قد تسبب أيضاً مضاعفات خطيرة مثل: انسداد المجرى الهوائي والانتان الدموي الذي يحدث كإستجابة إتهابية شديدة للجراثيم. تكون هذه الإختلالات مُهددة للحياة.

ستحتاج لأن تُسعف مباشرةً في حال انسداد المجرى الهوائي.





أسباب خناق لودفيغ: Causes of Ludwig's angina:

خناق لودفيغ هو إصابة جرثومية سببها الأكثر شيوعاً هو المكورات العنقودية والعنقودية Streptococcus and Staphylococcus، وغالباً ما تتبع إصابة فموية كالخراج السني.

يمكن للعوامل التالية أن تساهم في تطور الخناق:

- إهمال النظافة الفموية.
- قلع الأسنان الحديث.
- رض أو جرح في الفم.

ما هو الإنذار طويل الأمد؟

- ◀ الإنذار يعتمد على شدة الإنتان وعلى سرعة المريض في طلب المعالجة.
- ◀ التأخر في المعالجة يزيد من خطورة حصول مضاعفات ربما تكون مهددة للحياة مثل:

(١) انسداد المجرى الهوائي.

(٢) إنتان الدم (sepsis) والذي يكون كرد فعل حاد تجاه البكتيريا أو الجراثيم الأخرى.

(٣) الصدمة الإنتانية (septic shock) والتي تكون عبارة عن عدوى تؤدي إلى هبوط في ضغط الدم بشكل خطير.

مع تلقي المعالجة المناسبة فإن معظم المرضى يتعافون بشكل كامل.

كيفية الوقاية من خناق لودفيغ (Ludwig's angina):

يمكن الإنقاص من خطورة تطور خناق لودفيغ عبر:

- ◀ المحافظة على الصحة الفموية.
- ◀ القيام بفحوصات سنوية منتظمة.
- ◀ طلب المعالجة بشكل عاجل للآفات الفموية والسنية.



إذا كنت تخطط للحصول على ثقب في اللسان تأكد من إجراء هذه العملية من قبل شخص محترف باستخدام أدوات معقمة ونظيفة.

يجب مراجعة الطبيب مباشرة إذا كان هنالك نرف زائد أو تورم لا يتراجع.



◀ يجب تفريش الأسنان مرتين في اليوم واستخدام غسول فموي مع سائل مطهر (Antiseptic liquid) مرة كل يوم.

◀ يجب على المريض عدم تجاهل أي ألم في اللثة أو الأسنان كما يجب على المريض أيضاً زيارة طبيب الأسنان إذا لاحظ وجود رائحة فموية كريهة أو كان هنالك نرف من اللسان واللثة أو الأسنان.



◀ من الضروري أن يتم توخي الحذر لوجود أية مشاكل فموية، وأن تتم مراجعة الطبيب المختص مباشرة في حالات ضعف المناعة أو الرضوض الفموية ومن الضروري أيضا أن تتم مراجعة الطبيب في حال الإصابة بأذية فموية مهما كانت بسيطة، حتى يتأكد المريض أنه يتعافى منها بشكل صحيح.

يتم تشخيص خناق لودفيغ (Diagnosing) عن طريق:

(١) الفحص العياني وملاحظة الأعراض (احمرار وانتفاخ الرأس والعنق واللسان، امتداد التورم إلى قاع الفم، تورم شديد في اللسان، توضع اللسان خارج مكانه).

(٢) الفحص الوظيفي.

(٣) الصور التشخيصية (الرنين المغناطيسي ذو التباين المحسن والتصوير الطبقي المحوسب) تؤكد التورم في قاع الفم.

(٤) اختبار زرع جرثومي لللسان من المنطقة المصابة تُحدد نوع الجراثيم المسببة للإنتان.




المعالجة (Treatment):

- تأمين مجرى التنفس: في حال شكّ الانتباج إعاقة للتنفس يكون الهدف الأول من العلاج تأمين مجرى الهواء.
- بإدخال أنبوب تنفسي عبر الأنف أو الفم إلى الرئتين، إجراء شق من العنق إلى الرغامى يدعى هذا الإجراء خزع الرغامى (Tracheotomy) ويقوم به الأطباء في الحالات الإسعافية.



• الجراحة لتصريف السوائل الزائدة التي تسبب انتباج في الحفرة الفموية وتعيق مجرى الهواء.

• مكافحة الإنتان: أخذ صادات حيوية عبر الوريد حتى زوال الأعراض، ثم تتابع بأخذ الصادات الحيوية الفموية إلى أن تُظهر التحاليل زوال الجراثيم.



- ولكن قد يكون هناك حاجة إلى معالجة لاحقة، في حال كان خناق لودفيغ ناشئ من إنتان سنّي

المصدر:

<https://www.healthline.com/health/ludwigs-angina>

IN TEAM DENT

IN TEAM
DENT



IN DENT TEAM



@in_dent_team



IN DENT TEAM