

من كتاب برق للمعلومات الطبية

الكتاب الشامل تجدونه في صفحة موقع برق الطبي على الفيس بوك

باقي مواضيعنا تجدونه ايضا على صفحتنا في الفيس بوك

صفحة موقع برق الطبي

الدكتور رامي الراوي









drrami13@yahoo.com









الفصل الثالث (الادوية الشائعة)

قبل الدخول في هذا الفصل يجب ان تعلموا ان هناك شركات متنوعة بالنسبة للأسماء التجارية ولكن المذكورة هنا هي الأكثر شيوعا










الموانع الاستخدام	الاستخدام	الاسم التجاري	الاسم العلمي
إذا استخدم للاطفال او للحوامل يجب ان تكون لجرعة قليلة ولاقل فترة ممكنة	تخفيف وعلاج اعراض الالتهاب والحكة والامراض الجلدية التي تستجيب لمشتقات الكورتيزون الموضعية مثل الصدفية والحساسية	ديرموفيت Dermovate	Clobetasol Propionate 
لا يعطى في حالات أمراض الكبد النشطة ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع	ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط	ليبيتور Lipitor	Atorvastatin 
لا يوجد	يستخدم في معالجة السعال	زيكوف Zecuf	Herbal cough lozenges Herbal cough syrup











			
يمنع استخدامه للاشخاص دون 18 عاما ، انخفاض شديد في وظائف الكبد	يستخدم في حالات الاكتئاب لدى البالغين ، القلق ، الوسواس القهري	زولفت Zoloft	 Sertraline hydrochloride <chem>CN(C)C1Cc2ccccc2C1c3cc(Cl)c(Cl)cc3</chem> · HCl
تناول مع مهدئات الجملة العصبية ، يستعمل بحذر عند المرضى المصابين باختلال في وظيفة المثانة وفشل شديد في وظائف الكبد والكلى ، يعطى أثناء الحمل والإرضاع للضرورة فقط	لنزلات البرد والأنفلونزا ، التهاب الجيوب الأنفية ، مزيل للاحتقان ، التهاب الأذن ، التهاب الأنف الموسمي	اكتفيد Actifed	 Pseudoephedrine HCL + Triprolidine HCL
يمنع استخدامه مع النساء الحوامل او المرضعات ، كما يمنع استخدامه لمن يعاني من نوبات الربو ، أعراض تضخم البروستات ، مع مرضى الغدة الدرقية.	يستخدم في علاج حالات احتقان الأنف والجيوب الأنفية كما يستعمل في معالجة الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والإنفلونزا والرشح او مع حالات الحكة في لانف أو الحلق، يستعمل في حالة ارتفاع درجة الحرارة كما يعمل على معالجة حساسية الأنف كما يقوم الدواء بتجفيف الانف و الصدر من السوائل ويعالج حالات انسداد الأنف.	دي اند نايث ان Night And Day N	 Paracetamol + Diphenhydramine + Pseudoephedrine
لا يستخدم للاطفال اقل من 6 سنوات.	يعد الدواء مهدىء قوي للسعال والكحة الجافة حيث يعتبر مادة دكستروميثور فان هيدروبروميد مهدىء قوي جدا للسعال وله تأثير المسكن ومادة الفينيل إفرين هيدروكلوريد يعمل على انقباض الاوعية الدموية الصغيرة مما يترتب عليه تخفيف احتقان الاغشية المخاطية في الجهاز التنفسي ، وبالتالي فالدواء يعد مسكن ومهدىء قوى للكحة.	كوديلار شراب Codilar Syrup	 Dextromethorphan hydrobromide+ Chlorpheniramine maleate+ Phenylephrine hydrochloride syrup
تجنب استعماله للاطفال اقل من سنتين	موسع للقصات الهوائية ومقشع	اكسوساف ايلكسر Exosaf elixir	Theophylline + Glyceryl guaiacolate











<p>بسبب خطر حدوث تحفيز للقلب والجهاز العصبي</p>			
<p>ممنوع للمرأة الحامل</p>	<p>يستخدم في حالات التخسيس</p>	<p>أورلي Orly</p> 	<p>Orlistat</p> 
<p>لا يعطى للمرضى المصابين بانتانات وحيدات النوى ، يعطى بحذر في حالات القصور الكبدي والكلي وفي الإرضاع الحمل فئة B</p>	<p>التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات</p>	<p>امبي كلوكس Ampiclox</p> 	<p>Ampicillin + Cloxacillin</p>
<p>لا يستعمل زاناكس لفترات طويلة حيث يسبب ذلك الاعتياد عليه وادمانه بدرجات متفاوتة ، لا يعطى في حالات القصور التنفسي الحادة ، لا يعطى في الحمل والإرضاع يعطى بحذر في القصور الكبدي أو الكلي ، لا يستخدم ممن يعانون من مشاكل في العضلات ووهن عضلي</p>	<p>يستخدم زاناكس في حالات التوتر والقلق الناجم عن ضغوط الحياة والعمل حيث يصفه الاطباء لمن يواجهون ضغوط شديدة في العمل او للطلبة في اوقات امتحاناتهم لتقليل التوتر والقلق ولكنه قد يسبب ايضا فقدان التركيز .</p>	<p>زاناكس Xanax</p> 	<p>Alprazolam</p> 
<p>يعطى بحذر في اختلال كبدي حاد ، المرضى المسنين ، تضيق الأبهري الحمل فئة C</p>	<p>في إدارة ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية</p>	<p>املوديبيين Amlodipine</p> 	<p>Amlodipine</p> 
<p>يستخدم بحذر عند المرضى المصابين باضطراب شديد في الوظيفة الكبدية ،</p>	<p>يستخدم لمعالجة التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة ،</p>	<p>اموكسيسيلين Amoxicillin</p>	<p>Amoxicillin</p>













<p>تعديل الجرعة في حالات الفشل الكلي المتوسط إلى الشديد ، وفي الإرضاع الحمل فئة B</p>	<p>والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، جراثيم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات</p>		 <p>Amoxicillin</p>
<p>يمنع استخدام الدواء للأشخاص الذين يعانون من حساسية للبنسلين أموكسيسيلين</p>	<p>يستخدم لمعالجة التهابات اللوزتين ، والقصبات ويستخدم بصورة كبيرة للأطفال</p>	<p>اموكسيسيلين Amoxicillin</p> 	<p>Amoxicillin</p>  <p>Amoxicillin</p>
<p>التهاب القرنية الظهاري الحلي الحاد ، الأمراض الفطرية لمكونات العين التصنيف بالنسبة للحمل النمط C</p>	<p>الحالات الالتهابية المستجيبة للستيرويدات في الملتحمة الجفنية والبصلية ، والقرنية ، والقسم الأمامي لكرة العين</p>	<p>أوفتاديس Ophtadex</p> 	<p>Dexamethasone sodium phosphate</p> 
<p>لا توجد موانع</p>	<p>لعلاج الانتفاخ والمغص في الأطفال</p>	<p>سيميثكون نقط Simethicone oral drops</p> 	<p>Simethicone</p> $H_3C-Si(CH_3)_2-O-Si(CH_3)_2-CH_3 + SiO_2$
<p>لا توجد موانع</p>	<p>يستخدم في حالة الانتفاخ وبلع الهواء وسوء الهضم ، المغص المعوي ، اضطرابات الجهاز الهضمي</p>	<p>ببي رست Baby rest</p> 	<p>Simethicone</p> $H_3C-Si(CH_3)_2-O-Si(CH_3)_2-CH_3 + SiO_2$
<p>في حالة القصور الكبدى او الكلى</p>	<p>يستخدم كمسكن للالام</p>	<p>ريليف Relief</p>	<p>Diclofenac Sodium+ Paracetamol +Chlorpheniramine Maleate + Magnesium Trisilicate</p>

			
في حالات الجلوكوما ، والتهاب الفيروسي أو الطفيلي للعين ، وجود ثقب في طبلة الأذن	تستعمل في حالات الحساسية والتهاب في العين والأذن والأنف	اودوسول ان Odosol n 	Betamethasone sod. + Neomycin sulphate + Thiomersal
يعطى بحذر في حالات القصور الكبدى والكلى وفي الإرضاع الحمل فئة B	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات	او كمتين Augmentin اموكسيكلاف Amoxiclav 	Amoxicillin + Clavulanic acid
يجب الحذر عند استخدامه لمرضى القرحة المعدية ، الربو ، مرضى الكبد ، مرضى الكلى	يستخدم في تسكين الالام الأسنان واللثة ، نوبات النقرس الحادة ، لإلتهابات والتورمات بعد العمليات الجراحية ، عسر الطمث ، الام العمود الفقري والام الركبة	اولفين Olfen 	Diclofenac sodium 
يجب استخدامه عند الضرورة فقط اثناء الحمل بعد استشارة الطبيب ، يمنع استخدامه في حالات الربو ، التهاب الأنف الحاد ، نزيف الأمعاء ، القرحة الهضمية ، القصور الكبدى ، القصور الكلى .	مسكن للألم ومضاد للروماتيزم	دولفين جيل Dolphin Gel 	Diclofenac sodium 
لا يستخدم في حالات السعال الناتج عن التدخين	يساعد على تخفيف البلغم (المخاط) وإفرازات الشعب الهوائية.	غوايفنيزين Guaifenesin	Guaifenesin










			
في حالات الذبحة الصدرية العرضية التي تظهر في سياق بعض الأمراض كعرض لنقص الأوكسجين مثل فقر الدم - النزيف الدماغي ، الجلوكوما ، يجب الحذر عند الاستعمال خلال فترة الحمل إلا للضرورة القصوى	في معالجة الذبحة الصدرية وللوقاية منها ، وفي معالجة القصور القلبي	ايزورديل Isordil 	Isosorbide dinitrate  isosorbide dinitrate
يستخدم بحذر في حالات تضخم البروستات واحتباس البول وانسداد الاثنى عشر وأمراض الكبد والفشل الكلوي وفي الصرع ، في الحمل والإرضاع يستعمل للضرورة القصوى	مضاد للسعال ، طارد للبلغم مضاد للحساسية.	ايزيلين Isilin 	Diphenhydramine HCL + Ammonium Chloride
يجب ضبط الجرعة بدقة لمرضى الاعتلال الكلوي ، الحمل فنة C الفترة الأولى من الحمل وفنة D الفترة الثانية والثالثة من الحمل	فرط ضغط الدم الأساس والخبيث معالجة قصور القلب الاحتقاني	اينابريل Enapril 	Enalapril 
لا يعطى في الجلوكوما ، تسرع القلب ، ضخامة البروستات واحتباس البول ، الوهن العضلي الوخيم ، يعطى بحذر خلال الإرضاع والحمل خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل	تشنجات الجهاز الهضمي ، تشنج الاقنية الصفراوية ، تشنجات الجهاز البولي ، عسر الطمث ، الإقياء بعد العمل الجراحي	بسكوپان Buscopan سبازمين انتي Anti spasmen 	Hyoscine-n-butyl bromide 
يجب أن لا تستخدم أكثر من 15 غم من المرهم في يوم	يستخدم لعلاج مرض الصدفيه	دايفوبيت Daivobet	Betamethasone dipropionate+








<p>واحد وأكثر من 100 غم في أسبوع واحد</p>			<p>calcipotriol hydrate</p>
<p>الحمل فئة C كذلك لا ينصح باستخدامه للأطفال</p>	<p>يستخدم في معالجة حكة الجلد بما في ذلك الجرب</p>	<p>كريم يوراكس Eurax</p> 	<p>Crotamiton</p> 
<p>يمنع اعطائه للأطفال أقل من سنة الخامسة ، والاشخاص فوق 65 سنة ، فشل القلب</p>	<p>يستخدم في حالة التبول اللاارادي</p>	<p>منيرين Minirin</p> 	<p>Desmopressin</p> 
<p>يعطى بحذر في مرض السكري ، قد يغير الاستجابة للأنسولين ، الأطفال ، والمرضى ، المسنين ، الحمل الفئة B</p>	<p>مضاد للقيء ، علاج ركود المعدة بعد الجراحة والسكري .</p>	<p>Plasil بلازيل بريميران Primperan</p> 	<p>Metoclopramide HCL</p> 
<p>لا يعطى في حالات القرحة الهضمية ، نزف داخل القحف ، الإرضاع يعطى بحذر في الحمل وللأطفال</p>	<p>مضاد لتجلط الدم ، الحد من تصلب الشرايين ، السكتة الدماغية</p>	<p>بلافكس Plavix</p> 	<p>Clopidogrel</p> 
<p>يستخدم بحذر عند المرضى المصابين باضطراب شديد في الوظيفة الكبدية ،تعديل الجرعة في حالات الفشل الكلوي المتوسط إلى الشديد ، وفي الإرضاع الحمل فئة B</p>	<p>التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ،التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات</p>	<p>بلموكلوكس Pulmoclox</p> 	<p>Amoxicillin + Cloxacillin</p>
<p>يوصى خاصة النساء الحوامل بعدم استعمال هذا الدواء</p>	<p>لعلاج التهاب وخشونة المفاصل</p>	<p>دوروفين Dorofen</p>	<p>Glucosamine sulfate</p>







			
لا يستعمل للذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية ، المرضى ذوي ارتفاع ضغط دم شديد ، يستعمل في الحمل للحاجة فقط في الأشهر الستة الأولى من الحمل لا يجوز في الأشهر الثلاثة الأخيرة ، يجب أخذ الحذر للمرضعة	مضاد للحساسية ، معالجة السعال المترافقة باضطرابات تحسسيه ، مضاد احتقان .	بولارامين Polaramine 	Dexchlorpheniramine 
لا يجوز استخدامها في المرضى الذين يتعافون من احتشاء عضلة القلب	يساعد على تعديل مزاج المريض و إزالة الاكتئاب .	تريبتيزلول Tryptizol 	Amitriptyline 
يمنع اعطائه للمرضعات ، امراض الكلى الحاده	يستخدم في حالة اضطرابات الذاكرة (الزهايمير)	ايبكسا Ebixa 	Memantine hydrochloride 
يعطى بحذر في اختلال كلوي و كبدي ، الوهن ، يمنع استخدام الدواء في فترة الحمل	الوقاية من التهاب الشعب الهوائية المزمن من التفاقم ، التهاب اللثة ، علاج السيلان	تتراسايكلين Tetracycline 	Tetracycline 
الأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الدم يسمى البورفيريا	علاج القرحة الهضمية ، منع النزيف المتكرر من القرحة الهضمية ، مرض الجزر المعدي المريئي ، علاج ومنع القرحة الهضمية	زانتاك Zantac	Ranitidine











	<p>في الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (المسكنات) ، إفراز مفرط لحمض المعدة بسبب ورم أو تضخم في البنكرياس (متلازمة زولينجر إليسون)</p>		
<p>يعطى بحذر في الجلوكوما ، تضخم البروستات ، فشل القلب الحاد ، يعطى بحذر أيضا في الحمل والإرضاع</p>	<p>مضاد للحساسية</p>	<p>تفاجيل Tavegyl</p> 	<p>Clemastine</p> 
<p>الجلوكوما ، المسنين ، تضخم البروستات ، الحمل فئة C</p>	<p>مهدي ، وفي حالات سلس البولي ، اتقاء الأوعية الدموية والصداع</p>	<p>تفرانيل Tofranil</p> 	<p>Imipramine HCL</p> 
<p>يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي ، المرضى المسنين ، وفي الحمل والإرضاع</p>	<p>علاج قرحة الاثني عشر وقرحة المعدة ، العلاج والوقاية من حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضية والحامض في المعدة ، الوقاية والعلاج من التوتر الناتج عن النزيف في الجهاز الهضمي العلوي</p>	<p>تكاميت Tagamet</p> 	<p>Cimetidine</p> 
<p>يعطى بحذر في حالات أمراض القلب ، أمراض الكبد ، المسنين ، تضخم البروستات الحمل فئة C</p>	<p>علاج الصرع ، بعض آلام الأعصاب</p>	<p>تكريتول Tegretol</p> 	<p>Carbamazepine</p> 
<p>تناذر جيبي ، قصور بطيني أيسر ، حصار أذيني بطيني ، لا يوصف للحامل أو المرضع أو الأطفال</p>	<p>العلاج الوقائي لهجمات خناق الصدر خاصة عند الجهد ، معالجة ارتفاع التوتر الشرياني الأساسي</p>	<p>التيازيم Altiazem</p> 	<p>Diltiazem</p> 
<p>الحساسية للدكسترومثورفان, او للمواد المستخدمة في المركب</p>	<p>مضاد للسعال الجاف</p>	<p>توسيلر Tussilar</p>	<p>Dextromethorphan</p>









			
الامساك ، يعطى بحذر لمرضى الربو ، الاطفال اقل من سنتين	مهدي للسعال الجاف ، موسع للشعب الهوائية ، مضاد للحساسية	Tussiram توسيرام Tussivan توسيفان 	Chlorpheniramine maleat + Phenylephrine HCL + Ephedrine HCL + Codeine phosphate
لا يستعمل في حالة الحمل والإرضاع.	معالجة السعال الجاف والارجي.	توكسيل Toxil 	Dextromethorphan HBr + Oxomemazine HCl + Sodium Benzoate
في الحمل والإرضاع يجب استشارة الطبيب ، لا تستعمل هذا الدواء مع أدوية أخرى تحتوي براسيتول	مسكن للسعال و مضاد للاحتقان ومضاد تحسس ومسكن آلام وخافض للحرارة	D تولين Tullin-D 	Paracetamol + Chlorpheniramine + Dextromethorphan HBr + Pseudo-Ephedrine HCl
وجود عدسات لاصقة ، يجب استشارة الطبيب للحوامل والمرضعات قبل الاستعمال	التخفيف المؤقت من الحرقة والتهيج الناجم عن جفاف العين ، الوقاية من حدوث تهيج آخر	تيرموند Tearmond 	Glycerin + Hypromellose + Polyethylene glycol
اختلال كبدى أو كلوي ، الوهن ، الحمل أو الرضاعة(وإن لم يثبت سلامة) ، تم استخدامها بدون ضرر أثناء فترة الحمل	علاج أشكال مختلفة من الاكتئاب ، الوسواس القهري ، اكتئاب المسنين	بروزاك prozac 	Fluoxetine 
في حالة القصور الكبدى او	علاج داء السكري نوع الثاني	داونيل	Glibenclamide











<p>الكلوي ، لا يعطى للحوامل</p>		<p>Daonil glibenclamide Voie orale / Oral use 100 comprimés sécables / scored tablets sanofi aventis</p> 	
<p>الحمل خاصة الأشهر الثلاث الأولى والمرضع</p>	<p>للالتهابات الفطرية المهبلية البسيطة والقوية</p>	<p>شي كيت اف Shekit -f</p> 	<p>Fluconazole + Azithromycin + Secnidazole</p>
<p>يراعى تخفيض الجرعة في كبار السن والمرضى بقصور في وظائف الكبد ، لا يعطى أثناء الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى وكذلك خلال الرضاعة والأطفال اقل من سنتين.</p>	<p>علاج عدوى الاميبا في الأمعاء والأنسجة الأخرى وفي خارج الأمعاء وإصابات طفيلية أخرى</p>	<p>دايلوزول Dilozole</p> 	<p>Diloxanide furoate + Metronidazole – Benzoyl</p>
<p>انسداد في الجهاز الهضمي ، وهن ، والأمعاء ، التهاب القولون ، الأمراض القلبية الوعائية ، الجلوكوما ، تجنب إعطاء الدواء للحوامل والمرضعات.</p>	<p>كمضاد تشنج للعضلات ، الملساء ، السلس البولي ، التبول اللاإرادي عند الأطفال ، اضطراب أو عسرة البول</p>	<p>دربتا سير Drepttasir ديتروسيام Ditrospam</p> 	<p>Oxybutynin chloride</p> 
<p>التهابات الجلد الفيروسية والبكتيرية ، جدري الماء ، الزهري ، تدرن الجلد ، حب الشباب ، يستعمل بحذر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وكذلك الإرضاع</p>	<p>التهابات الناتجة عن أمراض حساسية الجلد ، والحكة الجلدية ، الحرقة ، الألم</p>	<p>درمودين Dermodin</p> 	<p>Clobetasol propionate in Anhydrous paraffin</p> 
<p>يعتبر مادة سامة لا يجوز تقريبه على العينين او الفم</p>	<p>يستعمل لحساسية الجلد ، لدغة الحشرات</p>	<p>درموكال Dermocal</p> 	<p>Calamine + Glycerine + Camphor</p>
<p>لا يعطى للأطفال اقل من 6</p>	<p>اضطرابات القولون</p>	<p>دسبتالين</p>	<p>Mebeverine HCL</p>













<p>سنوات</p>	<p>التشنجية ، آلام الأمعاء المرتبطة بأعراض القولون ، تهيج القولون</p>	<p>Duspatalin Duspatalin mebeverine Hydrochloride 135 mg 50 coated tablets Solvay Pharmaceuticals</p> 	 <p>HCl</p>
<p>قصور كلوي حاد ، انحباس البول ، فرط بوتاسيوم الدم ، الحمل فئة C</p>	<p>علاج ارتفاع ضغط الدم ، تشمع الكبد مع وذمة ، إدارة فشل القلب الاحتقاني</p>	<p>الدكتور Aldactone ALDACTONE 100mg SPIRONOLACTONE Pfizer</p> 	<p>Spirolactone</p> 
<p>حساسية من المكونات</p>	<p>يستخدم في حالة ارتجاع المريء ، عسر لهضم</p>	<p>Gaviscon</p> 	<p>Sodium Alginate</p> 
<p>اضطرابات نفسية ، اضطرابات حادة للدورة الدموية الشريانية ، ذبحة قلبية ، اختلال وظيفة الكلى أو غسل الكلى ، أثناء الحمل والإرضاع يفضل استشارة الطبيبة</p>	<p>لدى النساء :اضطراب حاد للعادة الشهرية ، العقم ، سيلان الحليب خارج الفتحات الطبيعية للإرضاع. لدى الرجال : تضخم الثدي والعجز الجنسي. علاج مرض باركنسون</p>	<p>دوبرجين Dopergin</p> 	<p>Micronised Acid Lisuride + Micronised Tartaric acid + Micronised Sodium Calcium + Lactose + Magnesium Stearate + Microcrystalline Cellulose</p>
<p>لا تستخدم أقراص جانوميت لمرضى الفشل الكلوي</p>	<p>يستخدم في علاج السكر من النوع الثاني</p>	<p>جانوميت Janumet</p> 	<p>Sitagliptin+ Metformin</p>
<p>لا يعطى في حالة قلة تجمع الصفائح الدموية . أمراض الكبد ، خلال الحمل</p>	<p>يعطى لتقليل الدهون في الدم ، يمنع تجمع الدم الصفائح</p>	<p>دوسبين A Dospin-A</p> 	<p>Clopidogrel Bisulfate + Atorvastatin + Aspirin</p>
<p>يعطى بحذر لمرضى الكبد ولمرضى الكلى ، قصور الغدة الدرقية</p>	<p>يخفض نسبة الكوليسترول في الدم</p>	<p>كريستور Crestor</p>	<p>Rosuvastatin</p>




			
لا يعطى في حالات ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ، يعطى بحذر في الاختلال الكلوي ، الحمل فئة B	يستعمل لعلاج عدم الاتزان في هرمون البرولاكتين عندما تزيد كمية البرولاكتين في الدم	دوستنكس Dostinex	Cabergoline 
يستعمل بحذر عند المرضى المصابين بأمراض كبدية أو قصور كبدي ، اضطراب في نظم القلب	التهاب القصبات ، ذات الرئة ، التهاب الحنجرة ، التهاب الجيوب ، التهاب اللثة ، التهاب الأذن الوسطى ، داء المقوسات ، الوقاية من داء المقوسات الخلقي أثناء الحمل	روفامايسين Rovamycine	Spiramycin 
في حالات الجلوكوما ، وتضخم البروستات	آلام تقلصات القناة الهضمية وزيادة حركتها ، التهاب المعدة ، التهاب الأمعاء والقولون ، القرحة الهضمية ، آلام تقلصات الصفراء ، تقلص المجرى البولي ، التهاب البنكرياس	ريبال Riabal	Prifinium bromide + Paracetamol
لا يستخدم مع أي علاج جلدي آخر ، لا يطبق على الأغشية المخاطية والجروح ، لا يستخدم أثناء الحمل	كمادة مضادة لتقرن الجلد ، لمعالجة حب الشباب ، وفي إزالة تجاعيد الوجه والكلف والحزاز المسطح وحالات الاكزيما	ريتن A Retin A ريتيناويد Retinoid	Tretinoin 
يعطى بحذر في حالات قصور بوظائف الكبد أو الكلى ، وفي أمراض القلب والأوعية الدموية ، الصرع ، خلال الحمل والإرضاع للضرورة القصوى	علاج الفصام والاضطرابات العقلية الأخرى	ريسدا Risdal	Risperidone 








<p>يعطى بحذر للأمراض الكبدية ، الرضاعة ، (الحمل فئة C)</p>	<p>إدارة السلسل النشط (بالاشتراك مع عوامل أخرى) ، القضاء على ناقل لمرض التهاب السحايا</p>	<p>ريفادين Rifadin</p> 	<p>Rifampicin</p> 
<p>يستخدم بحذر أثناء الإرضاع ، وفي حالات اضطرابات وظيفة الكبد ، لا يستخدم أثناء الحمل</p>	<p>طاردة للديدان ، علاج مرض الاكياس المائية و إصابة الدماغ بيرقات الديدان الشريطية</p>	<p>زنتيل Zentel</p> 	<p>Albendazole</p> 
<p>لا يعطى في حالات القصور التنفسي الحادة ، لا يعطى في الحمل والإرضاع يعطى بحذر في القصور الكبدية أو الكلى ، لا يستخدم ممن يعانون من مشاكل في العضلات ووهن عضلي</p>	<p>حالات القلق ، حالات الاكتئاب ، اضطرابات نتيجة عن الخوف ، علاج رعاش الحركة الأساسي</p>	<p>زولام Zolam</p> 	<p>Alprazolam</p> 
<p>الربو الشعبي ، مرض انسداد الرئة ، بطء القلب ، قصور القلب ، الصدمة القلبية ، لا ينصح في الحمل والرضاعة</p>	<p>لخفض الضغط المرتفع داخل العين للمرضى الذين يعانون من الجلوكوما مفتوحة الزاوية</p>	<p>زولامول Xolamol</p> 	<p>Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>طاردة للديدان (الإصابة بالاسكاريس ، الانكلوستوما ، الدودة الشريطية ، الدبوسية ، السوطية)</p>	<p>فلوب Flub</p> 	<p>Flubendazole</p> 
<p>لا يعطى في أمراض الكبد أو الارتفاع غير المبرر لإنزيمات الكبد ، لا يعطى للنساء الحوامل والمرضعات</p>	<p>ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط ، ارتفاع الدهون في الدم</p>	<p>سيمفور Simvator سيمفاتين Simvatin</p> 	<p>Simvastatin</p> 











<p>يحظر استعمال في الأشهر الأخيرة للحمل، يجب اخذ الحذر عند الإرضاع ، كذلك يستخدم بحذر في المرضى المصابين باحتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم والقصور القلبي</p>	<p>الام الظهر ،التهاب المفاصل، حالات الألم المفاجئة ، ألم الأسنان ، حالات الألم والحرارة المترافقة مع الالتهاب</p>	<p>ديكوليف Dicoliv</p> 	<p>Paracetamol + Diclofenac Potassium+ Chlorzoxazone</p>
<p>يجب تعديل الجرعة لدى مرضى اعتلال الوظيفة الكلوية ، يجب مراقبة المرضى الخاضعين للديال باهتمام ، الحمل فئة B</p>	<p>التهاب البلعوم ،التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب ،التهاب القصبات ، التهاب الأذن الوسطى ،التهابات المجري البولية</p>	<p>سوبراكس Suprax</p> 	<p>Cefixime</p> 
<p>انخفاض نسبة البوتاسيوم أو الصوديوم في الدم ، القصور الكلوي أو الكبدى أو قصور الغدة الدرقية ، توخي الحذر أثناء الحمل والإرضاع</p>	<p>الجلوكوما ،علاج ثانوي لبعض نوبات الصرع ، علاج مساعد في حالات الاوديما الناتجة عن هبوط القلب الاحتقاني أو عن بعض الأدوية</p>	<p>دياموكس Diamox سيدامكس Cidamex</p> 	<p>Acetazolamide</p> 
<p>لا يعطى للحوامل</p>	<p>علاج السعال الجاف والمعدن والمتهيج</p>	<p>سيدو بكت sedo-pect</p> 	<p>Diphenhydramine HCL + Sodium Citrate + Codeine phosphate + Menthol</p>
<p>يمنع في حالات ارتفاع الجالاكتور في الدم</p>	<p>يعمل على زيادة كمية الماء في البراز و بالتالي يعمل على تليينه</p>	<p>سيدالاك Sedalac</p> 	<p>Lactulose</p> 
<p>لا يوجد موانع</p>	<p>يستعمل للجروح والحروق والتقرحات الجلدية</p>	<p>سيتريميد Cetrimide</p>	<p>Cetrimide</p>









			$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{CH}_2-\text{N}^+\text{-(CH}_3)_2\text{Br}^-$
لا يعطى للمرضى المصابين بالربو أو الارتكاس التحسسي ، لا يعطى للأطفال دون سن 10 سنة ، كما لا ينصح للمرضعات ولا يعطى للحوامل وخاصة الأشهر الأخيرة من الحمل	لتخفيف أعراض وعلامات الالتهاب العظمي المفصلي. يستخدم لشخص إذا كان يعاني من التهاب ولديه في نفس الوقت قرحة	سيلبيريكس Celebrex 	Celecoxib 
لا يعطى في الجلوكوما ، إصابة بأفات جلدية ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع	لمعالجة أعراض داء باركنسون	سينامت Sinemet 	Carbidopa + Levodopa
يستعمل في الحمل والإرضاع للضرورة فقط	الالتهابات الجلدية ، تطهير البثور الجرثومية وفي حالات الإصابة بالدمامل والحروق والجروح	فوسين Fucine فيوسيدين Fucidin 	Fusidic acid 
يجب الحذر عند استخدامه لمرضى القرحة المعدية ، الربو ، مرضى الكبد ، مرضى الكلى	علاج الإلتهابات الحادة والمتوسطة وتسكين الألم بشكل سريع	فولتارين حقن Voltaren Ampoules 	Diclofenac Sodium. 
يجب الحذر عند استخدامه لمرضى القرحة المعدية ، الربو ، مرضى الكبد ، مرضى الكلى	مسكن للآلام وخافض للحرارة والتهاب المفاصل والنقرس ، هشاشة العظام	فولتارين Voltaren 	Diclofenac Sodium. 
يستخدم بحذر: لمرضى هبوط القلب ، القرحة المعدية ، المصابين	يستخدم لتسكين الآلام الحادة البسيطة و المتوسطة مثل الام الدورة الشهرية، علاج	كتافلام Cataflam	Diclofenac potassium











<p>بالجفاف، إرتفاع ضغط الدم، خلل في وظائف الكبد أو الكلى</p>	<p>الروماتويد و التهاب المفاصل.</p>		
<p>يستعمل بأمان لكن يجب تجنب فرط الجرعة</p>	<p>لتكوين الحمض النووي ومضاد للأنيميا الخبيثة</p>	<p>B12 فيتامين Vitamin B12</p> 	<p>Cyanocobalamin</p> 
<p>يستعمل بأمان لكن يجب تجنب فرط الجرعة</p>	<p>يساعد الجسم على استعمال الأحماض الامينية التي تعتبر قوالب بناء البروتينات</p>	<p>B6 فيتامين Vitamin B6</p> 	<p>Pyridoxine</p> 
<p>لا يوجد.</p>	<p>مرهم جلدي مطهر للقروح والجروح والحروق</p>	<p>بوفيدين Povidine</p> 	<p>Povidone Iodine</p> 
<p>الحمل فئة B</p>	<p>يستخدم لعلاج عدوي الهيريس التي تصيب الجلد، الفم، الإغشية المخاطية، الهيريس التي تصيب الأعضاء التناسلية. وأيضاً عدوي الهيريس زوستر وكذلك الجدري</p>	<p>زوفيراكس Zovirax</p> 	<p>Acyclovir</p> 
<p>أخذ الحذر عند الاستعمال لدى المرضى الذين يعانون من اضطراب في وظائف الكلية، فرط بوتاسيوم الدم كذلك الذين يعانون من تضيق في الشريان الابهر، يستخدم عند الأطفال في حال عدم جدوى الطرق الأخرى</p>	<p>علاج لارتفاع ضغط الدم، معالجة قصور القلب الاحتقاني</p>	<p>كابوتين Capoten</p> 	<p>Captopril</p> 











<p>الخافضة للضغط الحمل فئة C</p>			
<p>أثناء الحمل يستعمل فقط للضرورة القصوى وحسب الاحتياج</p>	<p>طارد للديدان.</p>	<p>كاتركس Katrex</p> 	<p>Levamisole</p> 
<p>لا يستعمل للحوامل والمرضعات.</p>	<p>أعراض تضخم البروستات الحميد ، ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المعتدل</p>	<p>كاردورا Cardura</p> 	<p>Doxazosin mesylate</p> 
<p>يمنع اعطائه للحوامل , المرضعات , الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة</p>	<p>يستخدم في التهابات الجهاز البولي , الجمرة الخبيثة , حمى التيفوئيد , التهاب البروستات ، التهاب الجهاز التنفسي</p>	<p>باكتيفلوكس Bactiflox</p> 	<p>Ciprofloxacin</p> 
<p>لا يعطى في الرجفان البطيني الليفي ، يعطى بحذر في قصور وظائف الكلى ، وحالات خلل الغدة الدرقية . يعطى في الحمل والإرضاع للضرورة القصوى</p>	<p>حالات فشل القلب و الرجفان الأذيني الليفي</p>	<p>كارديكسين Cardixin</p> 	<p>Digoxin</p> 
<p>لا يوجد</p>	<p>يستخدم في دوالي الساقين والخصيتين</p>	<p>دافلون Daflon</p> 	<p>Diosmin + Hesperidin</p>
<p>لا يعطى في حالات الصدمة القلبية ، بطء كبير في نبضات القلب ،عجز في وظيفة الكبد ، الانحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية ، والثالثة ،</p>	<p>يستخدم في فرط ضغط الدم ، فشل القلب الاحتقاني.</p>	<p>ديلاتريند Dilatrend</p>	<p>Carvedilol</p> 







<p>الأطفال دون 10 سنة ، الحمل فئة C</p>			
<p>يمنع استخدامه لمن يعاني قصور بالكلى ، الكبد ، امراض القلب ، الاطفال اقل من 13 عام كما يمنع استخدامه في حالات الحمل والرضاعة.</p>	<p>يستخدم في علاج حالات المغص الحاد كالمغص الكلوي والصفراوي .</p>	<p>سبازموفين Spasmofen</p> 	<p>Hyoscine butylbromide+ Ketoprofen</p>
<p>لا يعطى لمرضى الجلوكوما</p>	<p>لعلاج المغص والتقلصات عند الرضع والاطفال</p>	<p>فيسرالجين شراب Visceralgine Syrup</p> 	<p>Tiemonium methyilsulfate</p> 
<p>لا يوجد موانع</p>	<p>الانتفاخ ، المغص الناتج عن الانتفاخ بسبب الغازات ، طارد للغازات</p>	<p>كارمينكس Carminex</p> 	<p>Cinnamon oil + Caraway oil + Fennel oil</p>
<p>قصور رئوي حاد ، تثبيط تنفسي ، تجنب الاستعمال أثناء الحمل والإرضاع.</p>	<p>يستعمل لكل أنواع الصرع والنوبات الصرعية التي تحدث للرضع والأطفال والبالغين</p>	<p>ريفوتريل Rivotril</p> 	<p>Clonazepam</p> 
<p>لا يستعمل في الحالات : تدرن الجلد ، الإصابات الجلدية الإفرنجية ، والإخماج الفيروسي في الجلد ، يستعمل أثناء الحمل والإرضاع للضرورة فقط.</p>	<p>لمعالجة الالتهابات الجلدية والفطرية والحكة والتحسس الجلدي</p>	<p>كوادريدريم Quadriderm بولي ديرم Polyderm تتراديرم Tetraderm</p>	<p>Betamethasone + Gentamicin + Clioquinol + Tolnaftate</p>







			
<p>لا يعطى في فرط الغدة الدرقية ، بطء القلب ، يجب إخبار طبيب التخدير في حال استعمال هذا العلاج قبل العملية الجراحية ، لا يعطى بعد الشهر الرابع من الحمل</p>	<p>للقاية من بعض أنواع الاضطرابات في نظم القلب ومعالجتها</p>	<p>كوردارون Cordarone</p> 	<p>Amiodarone HCL</p> 
<p>الحساسية من المادة ، اطفال اقل من 10 سنوات</p>	<p>اضطرابات وظائف المعدة والامعاء ، حالات المغص بالقناة الهضمية ، القولون العصبي</p>	<p>كولونا Colona</p> 	<p>Sulpiride +Mebeverine HCL</p>
<p>فرط الحساسية لمادة كيتوتيفين.</p>	<p>علاج وقائي لحدوث الربو الشعبي ، الوقاية وعلاج اضطرابات الحساسية</p>	<p>بروفيلار PROFILAR</p> 	<p>Ketotifen Hydrogen Fumarate</p> 
<p>مرض الكبد النشط. الرضاعة الطبيعية. الحمل</p>	<p>يستخدم في ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط</p>	<p>اتور Ator</p> 	<p>Atorvastatin</p> 
<p>ينصح بعدم الاستعمال عند وجود إصابات فطرية أو حمى راشحة أو آفات جرثومية في الفم والحلق</p>	<p>معجون لمعالجة تقرحات الفم</p>	<p>كينالوغ Kenalog</p> 	<p>Triamcinolone Acetonide</p> 










<p>الجلوكوما ، خطر الاحتباس البولي ، أمراض القلب والشرابيين ، أمراض الكبد ، يستخدم بحذر في مرض السكري ، أمراض الجهاز التنفسي تضخم البروستات ، أورام الجهاز العصبي المركزي ، صرع ، انسداد معوي ، في الحمل أو الإرضاع : لم تثبت السلامة</p>	<p>يستعمل في بعض اضطرابات المزاج ، الفواق العنيد ، الغثيان والقيء.</p>	<p>لارجكتيل Largactil</p> 	<p>Chlorpromazine HCL</p> 
<p>يعطى بحذر في المرضى الذين يعانون من الصرع ، المسنين ، مرضى اختلال كلوي ، والرضاعة ، والأطفال الحمل فئة C</p>	<p>معالجة التشنج ، علاج التشنج الشديد الناشئة في الحبل الشوكي ، إدارة الألم في التهاب العصب الثالث</p>	<p>ليورسال Lioresal</p> 	<p>Baclofen</p> 
<p>لا يوجد</p>	<p>تخفيف آلام المغص ، تخفيف الحموضة والنفخة عند الأطفال</p>	<p>ماء غريب Gripe Water</p> 	<p>Dill seed oil + Sodium bicarbonate</p>
<p>ينقص الاموكسيسيلين من فعالية مانعات الحمل الفموية. الحمل فئة B</p>	<p>التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب الأنفية ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب المسالك البولية والتناسلية ، التهاب البروستات ، التهاب الجلد والأنسجة ، خراجات داخل البطن ، خراج الرئة.</p>	<p>ماكسين Maxipen</p> 	<p>Amoxicillin + Flucloxacillin</p>
<p>يجب الحذر عند الإعطاء للام المرضعة ، لا ينصح باستعماله للمرأة الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى</p>	<p>لعلاج التهابات الفطرية وكذلك الالتهاب الثانوي الناتج عن البكتريا</p>	<p>مايكوهيل Mycoheal</p> 	<p>Miconazole Nitrate</p> 
<p>لا يعطى في الجلوكوما ، انحباس البول</p>	<p>الالام الخفيفة والمتوسطة كحالات اضطراب</p>	<p>مايوجسك Myogestic</p>	<p>Orphenadrine citrate +</p>






<p>، الوهن العضلي ، لا يعطى للأطفال دون 10 سنة ، يعطى بحذر للمرضى الذين يعانون من خفقان القلب ، يعطى بحذر في الحمل والإرضاع</p>	<p>العضلات ، آلام أسفل الظهر، انزلاق الغضروف ، آلام المفاصل ، الصداع ، آلام عسر الطمث</p>	<p>كاناجيسك Kanagesic </p>	<p>Paracetamol</p>
<p>يمنع استخدامه لمرضى الضغط بسبب إحتوانه علي كميات كبيره من الصوديوم الذي يقوم بحبس الماء بالجسم ورفع الضغط.</p>	<p>يستخدم لمعادلة حموضة المعدة</p>	<p>فوار فروت Fawar Fruit </p>	<p>Sodium bicarbonate + Tartaric acid + Citric acid</p>
<p>يمنع استخدامه في المرضى الذين أظهروا فرط الحساسية للعلاج</p>	<p>علاج قرحة الأثني عشر علاج القرحة المعدية</p>	<p>انتودين Antodine </p>	<p>Famotidine </p>
<p>لا يجوز الاستعمال في اضطراب الوظيفة الكبدية والكلى ، ولا يجوز أثناء الحمل</p>	<p>في حالات النزوف النسائية ، الوقاية من النزف الرحمي بعد الولادة</p>	<p>مثرجين Methergin Ergot اركوت </p>	<p>Methylethergometrine </p>
<p>لا يستعمل في القرحة الهضمية ، القصور الكبدى الحاد والقصور الكلوي الشديد ، لا يعطى للأطفال وأثناء الحمل والإرضاع</p>	<p>لعلاج أعراض الالتهابات الرئوية ، لعلاج أعراض الالتهاب العظمي المؤلم) داء المفاصل ، الداء المفصلي التنكسي)</p>	<p>موبك Mobic </p>	<p>Meloxicam </p>
<p>نزف المعدة والأمعاء ، انسداد أو ثقب في الجهاز الهضمي ، ينصح باستشارة الطبيب أثناء الحمل ، لا يستخدم أثناء الإرضاع</p>	<p>معالجة أعراض الغثيان والقيء وحالات عسر الهضم</p>	<p>موتالون Motalon موتيليوم Motilium </p>	<p>Domperidone </p>








<p>خلل في وظائف الكلى ،ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم ، في حالات تعاطي أدوية تحتوي على البوتاسيوم ، لا يعطى في الحمل والإرضاع</p>	<p>مدر للبول في حال ارتفاع ضغط الدم ، في حالات تليف الكبد المصحوب باستسقاء.</p>	<p>موديوريتك Moduretic</p> 	<p>Amiloride Hydrochloride + Hydrochlorothiazide</p>
<p>يعطى بحذر في القصور الكبدى أو الكلوي أو القصور التنفسي لا يعطى في فقدان الوعي ، فرط التوتر داخل القحف ، الأطفال ، الصرع ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصى.</p>	<p>مسكن مركزي قوي يستعمل لتسكين الآلام المتوسطة أو الشديدة</p>	<p>ترامادول Tramadol</p> 	<p>Tramadol HCL</p> 
<p>فرط الحساسية لهذا الدواء، وذمة وعائية</p>	<p>يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم</p>	<p>ليزيناويل Lisinopril</p> 	<p>Lisinopril</p> 
<p>لا يعطى في حالة انسداد الشريان التاجي ، احتشاء العضلة القلبية</p>	<p>لعلاج ارتفاع ضغط الدم</p>	<p>A هبيريل Hipril - A</p> 	<p>Amlodipine + Lisinopril</p>
<p>لا يستعمل في نوبات الربو الحادة ، الإرضاع ، يستعمل بحذر في أمراض الكبد ،المسنين ، الحمل فئة B</p>	<p>مضاد للحساسية.</p>	<p>الليريجيس فورت Allergex fort</p> 	<p>Chlorpheniramine</p> 
<p>مضاد استنطاب في التثبيط الشديد والسمي للجملة العصبية المركزية ، داء باركنسون ، يعطى للضرورة القصوى في الحمل ، يجب تجنب الارضاع عند</p>	<p>الاضطرابات النفسية ، علاج مشاكل السلوك الشديدة عند الأطفال مفرطي الحركة ، اضطرابات التقلصات الارادية</p>	<p>هادول Haldol</p> 	<p>Haloperidol</p> 










<p>أخذ العلاج ، يعطى بحذر للمصابين باضطرابات قلبية وعائية</p>			
<p>ضخامة البروستات ، الزرق مغلق الزاوية ، قرحة المعدة والاثني عشري ، الأمراض القلبية والكلى الحادة الانتانات الفيروسية كالحماق وشلل الأطفال ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع ، لا يعطى مع الاندوسيد والأسبرين ، لا يعطى للأطفال دون سنتين ، يعطى بحذر في حالة الصرع</p>	<p>التهاب الأنف التحسسي بأنواعه ، التحسس لغبار الطلع وحمل الكلى ، الإصابات الجلدية الارجية مثل الاكزيما ، التهاب الملتحة التحسسي.</p>	<p>هيانيل Hayanil</p> 	<p>Dexamethasone + Dexchlorpheniramine + Ascorbic Acid (Vit .C)</p>
<p>يعطى خلال الحمل والإرضاع للضرورة فقط</p>	<p>الأمراض الناشئة عن اضطراب ايض الكالسيوم ، لين العظام ، الكساح ، نقص الكالسيوم عند الأطفال حديثي الولادة ، سوء امتصاص الكالسيوم في حالات الكساح</p>	<p>ون ألفا One – Alpha</p> 	<p>Alfacalcidol</p> 
<p>لا يعطى خلال الحمل والإرضاع إلا للضرورة</p>	<p>معالجة أعراض التهاب الأنف التحسسي الفصلي وتشتمل على (: العطاس ، سيلان الأنف ، حكة في الأنف وباطن الفم والحنجرة ، تدمع واحمرار العين) ، المعالجة العرضية للحكة الناجمة عن ألسري الجلدي المزمن.</p>	<p>زاناكس Xanax</p> 	<p>Fexofenadine HCL</p> 
<p>لا ينصح باستعمالها في معالجة الاخماج العينية القحبية الحادة ، وداء القوباء السطحي الحاد ، وجدري البقر ومعظم الأمراض الفيروسية الأخرى للقرنية والملتحمة</p>	<p>علاج التهابات التي تستجيب للسررويد والأعراض التحسسية غير الخمجية الخفيفة المتوسطة للجفن والملتحمة البصلية والقسم الأمامي للعين والقرنية.</p>	<p>ابيکورت Apicort</p> 	<p>Prednisolone acetate + Benzalkonium chloride</p>









<p>الربو القصبي ، بطء القلب الجيبي ، الصدمة القلبية ، لا ينصح للحوامل وكذلك الأطفال</p>	<p>في خفض الضغط الداخلي للعين ، وفي الجلوكوما المزمنة والجلوكوما الثانوي</p>	<p>ابيمول Apimol تيمولير Timolyre</p> 	<p>Timolol maleate</p> 
<p>يمنع استخدامه في حالة المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية لأي من مكونات الدواء</p>	<p>تستخدم القطرة في علاج التهابات العين التي تنتج عن الإصابة بالعدوى كما يستعمل في علاج حالات التهاب القرحة التي تصيب القرنية أو في حالات التهاب القرحة والتهاب ملتحمه.</p>	<p>إيكونوبريد بلس Econopred Plus</p> 	<p>Prednisolone acetate</p> 
<p>يمنع استخدامه لمن يعاني من حالات الحساسية لأي من مكونات الدواء ، يمنع استخدامه مع الأطفال دون سنتين</p>	<p>يستخدم في حالات الحساسية المختلفة حيث يعالج كلاً من سيلان الأنف و العطس والحكة كما يستخدم في حالات العيون الدامعة وحكة في الأنف والحجرة وايضاً حساسية في جيوب الأنفية</p>	<p>زيرتك Zyrtec</p> 	<p>Cetirizine hydrochloride</p> 
<p>في حالة وجود ثقب في طبلة الأذن ، للحوامل إلا للضرورة ، ويعطى بحذر للمرضعات ، لا يستعمل أكثر من 10 أيام</p>	<p>التهاب الأذن الوسطى ، التسكين الفوري للألم وتخفيف الالتهاب في المراحل الاحتقانية ، وكعلاج مساعد مع المضادات الحيوية</p>	<p>أتوكاين Otocain</p> 	<p>Phenazone + Procaine HCL</p>
<p>يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي أو كبدي ، المرضى المسنين ، عدم انتظام ضربات القلب البطيئي ، لا يعطى الأطفال والإرضاع الحمل فئة C</p>	<p>ارتفاع ضغط الدم الذبحة الصدرية</p>	<p>ادلات Adalat</p> 	<p>Nifedipine</p> 
<p>يستعمل بحذر للمرضى الذين لديهم خلل في وظائف الكبد ، يستعمل بحذر في الرضاعة</p>	<p>عدوى الجهاز التنفسي ، السعال الأديكي ، الالتهاب الرئوي ، الدفتريا ، الاميبيا المعوية ، التهاب الجلد ، التهاب الجهاز</p>	<p>اريثرومايسين Erythromycin</p>	<p>Erythromycin</p>











<p>الحمل فئة B</p>	<p>البولي والتناسلي</p>		
<p>لا يستعمل في حالات القصور الكبدي الحاد ، يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى</p>	<p>التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب الأذن الوسطى ، التهابات الجلد ، الكلاميديا ، التهاب البلعوم ، التهاب اللوزتين</p>	<p>ازي ونس Azi-once</p> 	<p>Azithromycin Azithromycin</p> 
<p>في حال حدوث حساسية مع المسكنات الأخرى ، اضطرابات النزف أو الصفحات ، يعطى بحذر في القرحة ، أمراض الكلى الشديدة أو كبدى حاد ، في الحمل لا يستعمل ابتداء من الشهر السادس للحمل ولا يستعمل أثناء فترة الإرضاع</p>	<p>التهاب المفاصل الروماتيزم ، هشاشة العظام ، ألم خفيف إلى معتدل ، الحمى</p>	<p>اسبجك Aspegic</p> 	<p>Acetylsalicylic acid Lysine</p> 
<p>تجنبها في المرضى الذين يعانون من التعصب ، في حديثي الولادة ، يعطى بحذر للأشخاص ممن لديهم ضعف السمع ، والأطفال الخدج ، السمنة المرضى / الرضاعة ، والرضع وحديثي الولادة (لم يثبت سلامة) الحمل فئة C</p>	<p>علاج الالتهابات الجرام سلبية خطيرة العصوي والالتهابات التي تسببها العقنوديات عند موانع بنسليبات أو غيرها من المخدرات أقل سمية</p>	<p>اميكاسين Amikacin</p> 	<p>Amikacin</p> 
<p>الذين يعانون من أمراض الكبد الحادة ، الإسهال المرتبطة بالتهاب القولون الغشائي الكاذب ، الأطفال دون سنتين ، الحمل فئة C</p>	<p>مضاد للإسهال.</p>	<p>انترستوب Enterostop لوموتيل Lomotil</p> 	<p>Diphenoxylate HCL + Atropine sulphate</p>
<p>انخفاض الضغط الشديد ،</p>	<p>الآلم الصدري الحاد الناجم</p>	<p>انجسيد</p>	










<p>فقر الدم الشديد ، ارتفاع الضغط داخل القحف بسبب الرض أو النزف الدماغي ، الحمل والإرضاع</p>	<p>عن الذبحة الصدرية ، احتشاء القلب</p>	<p>Angised www.worldwidepharmaceuticals.info www.kurom.com www.esk.com GlaxoSmithKline Angised™ Tablets Glyceryl Trinitrate (Stabilised) 0.5 mg GLYCERYL TRINITRATE 0.5 mg/Tab 100 Tablets</p> 	<p>glyceryl trinitrate</p> $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{ONO}_2 \\ \\ \text{HC}-\text{OH} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{ONO}_2 \end{array}$
<p>لا يعطى للأشخاص الذين لديهم احتباس البول ، لا يعطى للحوامل والمرضعات</p>	<p>علاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب</p>	<p>انجيزار H Angizaar -H</p> 	<p>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</p>
<p>لا يعطى في حالة القرحة ، التهاب المستقيم ، يعطى بحذر للمرضى المسنين ، الإرضاع والحمل</p>	<p>التهاب المفاصل الروماتيزم ، التهاب المفاصل النقرسي ، هشاشة العظام التهاب الفقر المقسط ، مسكن للآلام</p>	<p>اندوسيد Indocid</p> 	<p>Indomethacin</p> <chem>CC(=O)N1C=C(C(=O)O)C2=CC(OC)=CC=C12C3=CC=C(Cl)C=C3</chem>
<p>لا يجوز الاستعمال في حالات الصدمة القلبية ، انسداد المجاري التنفسية ، حصار قلبي ، تباطؤ ضربات القلب لا يستعمل في الحمل والإرضاع</p>	<p>ارتفاع ضغط الدم ، اضطراب نظم القلب ، تسرع ضربات القلب ، اعتلال العضلة القلبية ، الاحتشاء</p>	<p>انديرال Inderal</p> 	<p>Propranolol</p> <chem>CC(C)NCC(O)COc1ccc2ccccc12</chem>
<p>التهاب القرنية السطحي القوباء البسيط ، إصابة العين الناتجة من البكتريا الفطرية ، الجلوكوما (الماء الأزرق) لا ينصح في الحمل والرضاعة</p>	<p>لمعالجة حالات العين المستجيبة للاستيرويدات والتي تتطلب في نفس الوقت المعالجة الوقائية بالمضادات الحيوية ، لمعالجة حالات التهاب الملتحمة</p>	<p>اوبتيدكس ت Optidex T</p> 	<p>Tobramycin + Dexamethasone</p>
<p>لا يعطى للذين لديهم حساسية من مضادات الالتهاب الغير ستيرونيديية ، لا ينصح للحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال دون 10 سنة</p>	<p>يستعمل للإزالة المؤقتة للحكة العينية الناجمة عن التحسسي الموسمي للملتحمة ، علاج الالتهاب التالي للعمليات عند المرضى الذين أجريت لهم عملية استخراج الساد</p>	<p>اوبتيلار Optilar</p>	<p>Ketorolac tromethamine + Benzalkonium chloride + Edetate disodium + Octoxynol + Sodium chloride</p>










			
بعد التداخلات الجراحية ، لا يستعمل أثناء الحمل ، يستعمل تحت إشراف طبي أثناء الإرضاع ، لا يستعمل على مدى فترات طويلة	مزيل احتقان الأنف ، للمساعدة في تصريف الإفرازات الأنفية ، إزالة احتقان الغشاء المخاطي للبلعوم ، تسهيل تنظيف الأنف	أوتريفين Otrivin 	Xylometazoline HCL + Benzalkonium chloride + Sodium phosphate + Sodium chloride + Methylhydroxypropylcellulose
التهاب القرنية ، وامرض فيروسية أخرى للقرنية والملتحمة ، إصابة العين بالمتفطرات ، داء فطريات مكونات العين ، في الحمل والإرضاع للضرورة	في حالات التهاب العين ، وفي حالات التهاب العنبيّة المزمن وجروح القرنية الناتجة عن حروق كيميائية أو اختراق أجسام غريبة.	د.ن.ب P.N.D 	Dexamethasone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate
يعطى بحذر للمرضى المصابين بأمراض القلب ، الكبد ، الاضطرابات النفسية ، القرحة المعدية ، لا يعطى للحوامل	الاضطرابات الغدية المترافقة مع ارتفاع بروتاكتين الدم ، العناية والعقم عند الرجال ، متلازمة المبيض متعدد الكيسات ، الطمث ، الم واحتقان الثدي ، لمعالجة داء باركنسون	بارلوديل Parlodel رونالين Ronali 	Bromocriptine 
يمنع استعماله في اماكن الإصابة في جفن العين او بالقرب من العين	يستخدم في علاج الالتهابات الجلدية التي تصاحبها أحمرار لطبقة الجلد مثل الاكزيما كما يستعمل في علاج الحساسية والحكة (الهرش) الجلدية والتهاب الجلد بالتماس والتهاب الجلد الاستشراني.	بيتاديرم مرهم Betaderm Ointment 	Betamethasone 
لا يستعمل بحالة فطريات الجلد.	يستعمل للحساسية والالتهابات الجلدية	بتنوفيت Betnovate N	Betamethasone + Neomycin

			
تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول ، يعطى بحذر لأمراض الكبد/ مرض كلوي سوء التغذية ، الحمل الفئة B	مسكن للآلام خافض للحرارة	براسيتول Paracetol 	Acetaminophen  acetaminophen
يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة الحمل فئة C	تستخدم في طائفة واسعة من الأمراض / التهابي ، الحساسية ، الأورام ، حالات الربو	بردنزلون Prednisolone 	Prednisolone 
لا توجد موانع	يستخدم في تسكين الآلام المؤقت كآلام الأسنان او بسبب إصابة ما كلاعب الكرة في المباراة ، في حالات تسكين الآلام قبل العمليات الجراحية	بخاخ ليدوكاين Lidocaine Spray 	Lidocaine 
لا يستعمل للحوامل والمرضعات.	أعراض تضخم البروستات الحميد ، ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المعتدل	بروستانور Prosta-nor 	Terazosin hydrochloride 
لا يعطى مع المسكنات الأخرى ، حالات القرحة ، مرضى الكلى الحمل الفئة B ، في الثلث الأول	مسكن للآلام ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام ، خفض الحمى	بروفين Brufen	Ibuprofen











			
يمنع استخدامه إذا كان المريض يعاني من قرحة ، مرضى الكلى، يجب استشارة الطبيب في حالة مرضى القلب ،يمنع على الاطفال الاقل من 6 شهور،	يستخدم في تسكين الالام المفاصل والعظام ويعالج حالات الالام الاسنان والتهاب اللثة ،خافض للحرارة سريع المفعول وكمسكن للالام الطمث اثناء الدورة الشهرية.	أدفيل Advil 	Ibuprofen 
لا يستعمل خلال الحمل والإرضاع.	البواسير الشرجية والحكة والألم والحرقة المرافقة لها	بروكتوسيديل Proctosedyl 	Cinchocaine HCL + Hydrocortisone
لا يستخدم للأطفال اقل من سن الثالثة	مسكن للسعال ومذيب للبلغم	بلسم Balsam 	Guava leaf extract + Thyme leaf extract + Tilia flower extract + Honey + Fennel oil.
لا يوصف للمرضى الذين يعانون من قصور شديد في وظيفة الكليتين ، ولا يوصف في التهاب الأمعاء أو قرحة الأمعاء وقرحة المعدة ، لا يستعمل عند الإرضاع . الحمل فنة C	لتخفيف الألم البسيط أو المتوسط الشدة وحالات الصداع	بونستان Ponstan 	Mefenamic acid 
أمراض القناة الهضمية الانسدادية.	المغص المعوي والمعدي ، تقلص فتحتي البواب والفؤاد بالمعدة ، القيء	سبازتولين Spastolin	Pipenzolate methyl bromide + Phenobarbital









			
التهاب الجلد حول الفم ، الإصابة الجرثومية لقشرة الرأس ، الإصابة الجلدية الفيروسية ، يستعمل بحذر في الإرضاع ، لا يستعمل في الحمل	لمعالجة الصدفية والإصابات الجلدية المتقرنة	بيتا ساليك Beta-salic 	Betamethasone + Salicylic acid
القرحة المعدية العفجية ، يحذر إعطاء هذا الدواء عند مرضى الربو والحوامل	المعالجة العرضية للدوار أدهليزي ، لمعالجة داء منيير (دوار ،طنين ،غثيان)	بيتاسيرك Rabestine 	Betahistine dichlorhydrate 
يعطى بحذر في حال وجود الجلوكوما ، احتباس بولي ، لا يستعمل أثناء الحمل والإرضاع	للمعالجة الوقائية للصداع الوعائي المنشأ المتكرر بما فيه الشقيقة والصداع النصفي ذو المنشأ العصبي	بيزوفين Pizofen 	Pizotifen 
لا يستعمل عند المرضى الفشل القلبي الحاد، انسداد شديد في الجهاز التنفسي، بطء قلبي واضح ، الحذر عند الإعطاء للأمهات المرضعات الحمل فئة C	دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، الذبحة الصدرية ، ويستخدم لعلاج انتظام ضربات القلب ،الفشل القلبي	كونكور Concor 	Bisoprolol 
في حالة القصور الكبدى او الكلوي ، يجب استشارة الطبيب للحوامل والمرضعات	الآلام وإزالة التشنجات وتخفيض الحرارة ، الصداع . ألم الأسنان ، ألام عسر الطمث	دي انتالفك DI-Antalvic 	Dextropropoxyphen e + Paracetamol
لا يستعمل عند وجود إصابات جلدية جروح أو التهاب . لا يستعمل عند	لمعالجة حب الشباب (العد).	بانوكسيل PanOxyl 	Benzoyl Peroxide









<p>الحمل أو المرضع أو الأطفال دون سن الثانية عشر إلا باستشارة الطبيب</p>			
<p>يعطى بحذر للذين يعانون من أمراض القلب والسكري والجلوكوما والمسنين ، الحمل فئة C</p>	<p>موسع للشعب الهوائية عند نوبات الربو والأمراض الأخرى</p>	<p>بيوتادين Butadiene فنتولين ventolin</p> 	<p>Salbutamol</p> 
<p>يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد والنقرس ، احتباس البول ، ضعف السمع ، انخفاض ضغط الدم ، داء السكري ، لا يعطى في الجفاف ، الأطفال دون 10 سنة ، الحمل فئة C</p>	<p>مدرر للبول ، إزالة السوائل الزائدة في الجسم ، وفي حالات زيادة السوائل واحتباسها في الجسم ، يستخدم أيضا لعلاج ارتفاع ضغط الدم</p>	<p>بيورنيكس Burinex</p> 	<p>Bumetanide</p> 
<p>مرض في الجهاز التنفسي مثل الربو ، أمراض معينة في القلب ، اضطرابات كلوية شديدة ، لا يجوز الاستعمال أثناء الحمل والإرضاع وللأطفال</p>	<p>لخفض الضغط المرتفع في العين ومعالجة الزرق</p>	<p>تيمودور Timodor</p> 	<p>Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate</p>
<p>لا يعطى في وذمة رئوية ، صدمة قلبية ، بطء القلب أو إحصار القلب ، يعطى بحذر في اختلال كبدى أو كلوي والمسنين ومرض رئوي وداء السكري ، الحمل والإرضاع والأطفال لا يعطى</p>	<p>لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، لتخفيف آلام الذبحة الصدرية ويستخدم لتنظيم ضربات القلب وللرجفة</p>	<p>تينورمين Tenormin</p> 	<p>Atenolol</p> 
<p>لا يستعمل بحالة ارتفاع عمل الغدة الدرقية ، أمراض القلب ، وبحالة الحمل فلا بد من تغيير الجرعة</p>	<p>يستخدم لمرضى انخفاض عمل الغدة الدرقية والأورام الحميدة لهذه الغدة ، ويستخدم بحالة الأورام السرطانية</p>	<p>ثايروكسين L-Thyroxin</p>	<p>Levothyroxine sodium</p>







<p>لأنه تزداد الحاجة لهورمونات الغدة الدرقية</p>	<p>للغدة الدرقية بعد خضوع المريض للجراحة</p>		
<p>لا ينصح هذا الدواء للأطفال والمراهقين دون 18 سنة من العمر</p>	<p>يستخدم لمعالجة الصرع ، الألم العصبي</p>	<p>ليريكا Lyrica</p> 	<p>Pregabalin</p> 
<p>لا يعطى في حالات الالتهاب الحاد في البنكرياس ، تخفيض الجرعة لدى المصابين في قصور وظائف الكلى ، الحمل والإرضاع للضرورة القصوى</p>	<p>لعلاج آلام الاعتلال العصبي لدى البالغين ، كعلاج منفرد أو إضافي في الصرع</p>	<p>جابا تركس Gabatrex</p> 	<p>Gabapentin</p> 
<p>في حالة القصور الكبدى او الكلوي ، لا يعطى للحوامل</p>	<p>علاج داء السكري نوع الثاني</p>	<p>اماريل Amaryl</p> 	<p>Glimepiride</p> 
<p>لا توجد موانع</p>	<p>لمعالجة السعال.</p>	<p>جوافلكس Guaflex</p> 	<p>Guava leaves + Tilia Flowers + Fennel oil</p>
<p>لا توجد موانع</p>	<p>الخدوش ، الجروح القطعية أو تهتكات الجلد ، العمليات الجراحية (بما في ذلك بعد عمليات الولادة القيصرية) ،</p>	<p>جل كونتراكتيوبكس Contractubex</p>	<p>Obtained from onions + Heparin + Allantoin</p>










	<p>الحروق أو السفعات ، العلاج بالليزر (مثل إزالة الوشم)</p>		
<p>ينصح بإيقاف الإرضاع أثناء أخذ العلاج ، يعطى للحوامل</p>	<p>نقص البروجيستيرون مثل :آلام الطمث ، داء البطانة الرحمية ، انقطاع الطمث الثانوي ، عدم انتظام الدورة ، العقم ، الإجهاض المتكرر المصحوب بنقص البروجيستيرون.</p>	<p>دوفاستون Duphaston</p> 	<p>Dydrogesterone</p> 
<p>يعطى بحذر في اختلال كلوي أو كبدية ، الوهن ، يمنع استخدامه أثناء الحمل ، الاطفال دون سن الثامنة</p>	<p>علاج حب الشباب ، علاج الجمرة الخبيثة ، علاج السيلان ، علاج الزهري</p>	<p>دوكسيسايلين Doxycycline</p> 	<p>Doxycycline</p> 
<p>يمنع استخدامه مع السلفا (سبترين أقراص)</p>	<p>يستخدم التخلص من زيادة املاح اليورات urate في الجسم ، طرد الحصوات الموجودة في الجهاز البولي ، مطهر لمجري البول urinary tract الذي قد تصيبه البكتريا في حالة زيادة املاح ال urate لانها تجعل مجرى البول مكان مناسب لنمو البكتريا</p>	<p>بروكسيمول Proximol</p> 	<p>Halfa bar + hexamine +piperazine</p>
<p>قصور وظائف الكبد حيث تنتج الامونيا من تحلل الهكسامين وحالات الفشل الكلي والجفاف الشديد</p>	<p>يستخدم في التهابات المسالك البولية وللقضاء علي بلورات الاملاح (اليورات) Urate الزائدة في البول لأن أهمالها يسبب حصوات بالكلي والحالب.</p>	<p>جدكورين فوار Jedcorene</p> 	<p>Piperazine + Hexamine+ Khellin</p>
<p>قصور وظائف الكبد حيث تنتج الامونيا من تحلل الهكسامين وحالات الفشل الكلي والجفاف الشديد</p>	<p>يستخدم في التهابات المسالك البولية وللقضاء علي بلورات الاملاح (اليورات) Urate الزائدة في البول لأن أهمالها يسبب حصوات بالكلية والحالب</p>	<p>يوريكول فوار Uricol</p> 	<p>Piperazine + Hexamine+ Khellin</p>






<p>يعطى بحذر للمرضى المسنين</p>	<p>علاج ارتفاع ضغط الدم يعتبر الخيار الاول للمرأة الحامل.</p>	<p>الدوميت Aldomet</p> 	<p>Methyldopa</p> 
<p>يجب اخذ الحذر عند المرضى المصابين بقصور كبدي معتدل أو شديد أن لا يزيد الجرعة اليومية عن 8 ملغم الحمل فئة B</p>	<p>للقاية والعلاج من الغثيان الذي تسببه المواد الكيميائية ، للوقاية والعلاج من الغثيان والاقياء بعد التداخلات الجراحية</p>	<p>دي فوميت De-vomit</p> 	<p>Ondansetron HCL</p> 
<p>يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة. الحمل فئة C</p>	<p>تستخدم في طائفة واسعة من الأمراض / التهابي ، الحساسية ، الأورام ، وحالات الربو</p>	<p>ديبوميديول Depo-medrol</p> 	<p>Methylprednisolone</p> 
<p>يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة . الحمل فئة C</p>	<p>في طائفة واسعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك : التهابي ، الربو ، الحساسية ، الدموية ، الأورام</p>	<p>ديكارون Decadron دكسون Dexon</p> 	<p>Dexamethasone</p> 
<p>لا توجد موانع.</p>	<p>لمعالجة انتفاخ البطن ، لطرذ الغازات والهواء من القناة الهضمية</p>	<p>ديميثيكون Dimethicone</p> 	<p>Dimethicone</p> 
<p>لا توجد موانع</p>	<p>يستخدم ميبو اصلاح الحرق مرهم لجميع الحروق بما في ذلك حروق الشمس ، و طفح الحفاض ، طفح العرق ، تقرحات السكري،</p>	<p>ميبو MEBO</p>	<p>B-sitosterol,sesame oil ,bees wax</p>






			
يجب أخذ الحذر مع المرضى المصابين بقصور حاد في وظائف الكبد ، لا يعطى للحوامل والمرضعات	علاج قرحة الاثني عشر والمعدة ، علاج التهاب المريء الارتجاعي ، التهاب وقرحة الجهاز الهضمي.	رابيزول Rabezole 	Rabeprazole 
لا يستعمل في نوبات الربو الحادة الإرضاع، انسداد عنق المثانة، أعراض تضخم البروستات	مضاد للحساسية.	اليرمين Allermine 	Chlorpheniramine maleate 
عدم الاستعمال في حالات المغص الشديد وحصر البول ، لا يستعمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل	لعلاج المغص الكلوي ، وعلاج الالتهاب المرافق للحصى الكلوي ، ويساعد على تذويب وطرده الحصى	رواتينكس Rowatinex 	Pinene + Camphene + Borneol + Anethol + Fenchone + Cineol + Olive oil
اضطراب في وظيفة الكلية والكبد ، يستعمل للضرورة أثناء الحمل والإرضاع	معالجة ارتفاع حمض البول ، اعتلال الكلية اليوراتي ، النقرس	زيلوريك Zyloric 	Allopurinol 
لا يعطى خلال الحمل والإرضاع.	علاج سرطان الثدي بعد الجراحة والأشعة ، معالجة مرافقة لسرطان الثدي المتقدم	زيموبليكس Zymoplex	Tamoxifen citrate












			
يمنع لمن لديهم اضطرابات في الأوعية الدموية المحيطية ، داء القلب ، التاجي ، فرط ضغط الدم ، الحمل ، والإرضاع ، حالات قصور الكبد والكلية	لمعالجة الشقيقة الحادة كما يستعمل لمعالجة أنواع أخرى من الصداع.	ميغرين ساندو Sandu Migrain آسيا ميغرين Asia Migrain 	Ergotamine tartrate + Caffeine
يستعمل بحذر في حالة الصرع ، الوهن العضلي . لا يستعمل في حالات: الاطفال والمراهقين دون 18 عاما ، الحمل والإرضاع	التهاب البروستات ، التهابات المجاري البولية ، حمى التيفونيد ، الجمرة الخبيثة	سيرودار Ciprodar 	Ciprofloxacin 
لا ينصح بإعطائه للحوامل بدون استشارة الطبيب ، عند المصابين بهبوط التوتر الشرياني	معالجة اضطرابات الدورانية الدماغية ، اضطرابات التوازن ، معالجة الشقيقة	ستاجيرون Stugeron 	Cinnarizine 
يمنع تناوله اثناء الحمل ،يمنع استخدامة في حالة الرضاعة الطبيعية لانه يوقف انتاج الحليب من الثدي	يستخدم لمنع الحمل	مارفيلون Marvelon 	Desogestrel + Ethinyl Estradiol






<p>لتهاب الوريد الخثاري أو اضطرابات انصمامية خثارية ، أمراض الشرايين التاجية أو الأوعية الدموية الدماغية، ارتفاع ضغط الدم الشديد ، أورام الكبد ، الحمل ، مرض السكري مع إصابة الصمامات.</p>	<p>يستخدم لمنع الحمل</p>	<p>ياسمين Yasmin</p> 	<p>Drospirenone + Ethinyl estradiol</p>
<p>يمنع استخدامه في حالات الانسداد التجلطي او تجلط الدم أو في حالات وجود مرض السكري كما يمنع استخدامه لمن تعاني من صداع نصفي</p>	<p>يستخدم لمنع الحمل</p>	<p>جينيرا Gynera</p> 	<p>Ethinylestradiol + Gestodene</p>
<p>لا يعطى في أمراض الكبد ، أمراض القلب والأوعية الدموية ، الجلوكوما ، يعطى ، بحذر في داء السكري ، أمراض الجهاز التنفسي ، تضخم البروستات ، أورام الجهاز العصبي المركزي ، صرع ، انسداد معوي ، الحمل فئة C</p>	<p>علاج الذهان الحاد والمزمن ، مساعد في إدارة القلق</p>	<p>ستلازين Stelazine</p> 	<p>Trifluoperazine HCL</p> 
<p>يجب إنقاص الجرعة للمرضى المصابين بخلل كلوي شديد ، يجب أخذ الحذر عند استعماله لحديثي الولادة المصابين باليرقان ، يجب أخذ الحذر عند استعماله للنساء الحوامل والمرضعات ، يجب عدم الاستعمال مع المحاليل المحتوية على الكالسيوم حيث يتسبب ذلك في حدوث آثار جانبية مميتة.</p>	<p>التهابات الجهاز التنفسي ، التهابات الجلد ، التهابات المسالك البولية ، داء السيلان ، تسمم الدم الجرثومي ، التهابات أغشية البطن ، التهاب السحايا ، التهاب الأذن الوسطى الحاد ،</p>	<p>سفترايكون Ceftriaxone</p> 	<p>Ceftriaxone</p> 
<p>يعطى بحذر في قرحة</p>	<p>مقشع ومذيب للإفرازات ،</p>	<p>برومهيكسين</p>	<p>Bromhexine HCL</p>











<p>المعدة ، ينصح بعدم استعماله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، أما خلال الإرضاع للضرورة فقط</p>	<p>تخفيف الأعراض المصاحبة للالتهابات القصبية الشعبية</p>	<p>Bromhexine</p> 	
<p>يعطى بحذر في أمراض الجهاز التنفسي ، في الحمل والإرضاع ، أمراض القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، الغدة الدرقية ، داء السكر ، القرحة انسداد الأمعاء</p>	<p>مسكن للآلام العضلي/ المفاصل ، الصداع/ الأسنان ، التشنج العضلي</p>	<p>سيدافيد بلس Siidafed plus</p> 	<p>Paracetamol + Tramadol + Diclofenac sodium</p>
<p>لا يعطى في حالات مرض كبدى شديد ، البورفيريا ، يعطى للحوامل للضرورة فقط</p>	<p>لعلاج جميع أشكال الصرع</p>	<p>ديباكين Depaken</p> 	<p>Valproate sodium</p> 
<p>يعطى بحذر للمرضى الذين لديهم خلل في وظائف الكبد ، اختلال كلوي حاد المسنين أو المرضى بالوهن والأطفال ، لايعطى للحوامل</p>	<p>مهدئ حالات الهستيريا والتشنج ، ارتخاء العضلات ، القلق</p>	<p>فاليوم Valium</p> 	<p>Diazepam</p> 
<p>عدم انتظام ضربات القلب غير المنضبط ، فرط الدرقية . ، يعطى بحذر للمرضى المسنين فوق 61 سنة ، الحمل فئة C</p>	<p>حالات ضيق التنفس والربو انسداد مجرى الهواء الناجم عن انعكاس أو الربو المزمن</p>	<p>فايلوكوتين Phyllocontin</p> 	<p>Aminophylline</p> 
<p>يستعمل بحذر كبير عند المرضى المصابين باضطرابات دموية أو أمراض فعالة في الجملة العصبية ، يمنع للحوامل في</p>	<p>داء الأميبة المعوي والكبدى ، إسهال ، وفي الإصابة بالجراثيم اللاهوائية ، داء الجيراديات.</p>	<p>فلاجيل Flagyl</p>	<p>Metronidazole</p>







<p>فترة الثلاث شهور الأخيرة من الحمل , لا يتسعمل فلوجل أثناء فترة الرضاعة</p>			<chem>CN(C)C(=O)O</chem>
<p>لا يعطى في حالة القرحة ، ولا يعطى في الإرضاع ، يعطى بحذر في أمراض القلب ، الاختلال الكلوي ، الحمل والأطفال لم تثبت السلامة</p>	<p>حالات متعددة التي تتطلب تأثير مضاد للالتهابات/أو تأثير مسكن ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام</p>	<p>فلدين Feldene</p> 	<p>Piroxicam</p> <chem>CN(C)C(=O)O</chem>
<p>لا يستعمل لمعالجة التهابات القرنية الناجمة عن الهريز سمبلكس السطحي ، تدرن العين ، لا ينصح في الحمل</p>	<p>معالجة التهابات الجفن وبصلة الملتحمة وقرنية العين الجزء الأمامي من الكرة.</p>	<p>فلوكا Fluca</p> 	<p>Sodium cromoglicate + Fluorometholone</p>
<p>يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد أو الكلى ، لا يعطى للأطفال وخلال الإرضاع والحمل</p>	<p>معالجة العدوى الفطرية التي تسببها الكائنات الحساسة ، المبيضات ، التهاب المسالك البولية ، التهاب الصفاق ، التهاب السحايا المستشفيات الوقاية من داء المبيضات</p>	<p>ديفلوكان Diflucan</p> 	<p>Fluconazole</p> <chem>CN1C=NC2=C1N=CN2</chem>
<p>لا يستعمل للرضع في الأشهر الأولى من الولادة ، الخدج ، لا يستعمل أثناء الحمل</p>	<p>لمعالجة الحروق والتقرحات الجلدية</p>	<p>فلوميزين Floumizin همازين Hmazzin</p> 	<p>Silvers Sulphadiazine</p> <chem>CN1C=NC2=C1N=CN2</chem>
<p>حساسية من المادة</p>	<p>يستخدم لعلاج التهاب و تضخم البروستات</p>	<p>بروستامول اونو prostamol uno</p>	<p>serenoa repens</p>










			
لا يعطى في حالات قصور الكلوي ، الحمل والإرضاع ، اختلال المريء	العلاج والوقاية من مرض هشاشة العظام في النساء بعد سن اليأس ، علاج ترقق العظام لدى الرجال ، علاج مرض باجيت للعظام	Fosamax فوزماكس Oste اوستي	Alendronate 
لا يستعمل في حالات القصور الكلوي الشديد ، الرضع وحديثي الولادة الحمل فئة C	المعالجة العرضية لقرط الحموضة ، المعالجة العرضية لعسر الهضم وحرقة الفؤاد	Gastrogel كاستروجيل anti acid أسيد انتي	Mg. trisilicate + Al. hydroxide gel
يجب اخذ الحذر في حالة أمراض الكبد لا يعطى في الحمل والإرضاع والأطفال دون 10 سنة إلا للضرورة القصوى	قرحة الأثني عشر النشطة ، القرحة المعدية ، القرحة المعدية الحميدة النشطة ، داء الجزر المعدي المريئي ، التهاب المريء الناتج عن عملية التنظير ، كما يستخدم كجزء من العلاج المتعدد الأدوية لاستئصال الـ H.Pylori (الملوية البوابية)	كاسك Gasec اوميرازول Omeprazole	Omeprazole 
يجب اخذ الحذر في حالة أمراض الكبد لا يعطى في الحمل والإرضاع والأطفال دون 10 سنة إلا للضرورة القصوى	قرحة الأثني عشر النشطة ، القرحة المعدية ، القرحة المعدية الحميدة النشطة ، داء الجزر المعدي المريئي ، التهاب المريء الناتج عن عملية التنظير ، كما يستخدم كجزء من العلاج المتعدد الأدوية لاستئصال الـ H.Pylori (الملوية البوابية)	رايسك Risek	Omeprazole 
فرط الحساسية للمادة الفعالة التي يحتويها بروكتو جليفينول	يستخدم لعلاج البواسير	بروكتو جليفينول procto glyvenol	Tribenoside + lidocaine









			
<p>تجنبها في المرضى الذين يعانون من التعصب، في حديثي الولادة ، يعطى بحذر للأشخاص لديهم ضعف السمع ، والأطفال الخدج ، السمنة المرضى /الرضاعة ، والرضع وحديثي الولادة(لم يثبت سلامة) الحمل فئة C</p>	<p>علاج الالتهابات الجرام سلبية خطيرة العسوي والالتهابات التي تسببها العقنوديات عند موانع بنسلينات أو غيرها من المخدرات أقل سمية</p>	<p>كراميسين Garamycin</p> 	<p>Gentamicin</p> 
<p>بالنسبة للحمل فئة B ، يجب توخي الحذر عند الإعطاء للام المرضعة</p>	<p>التهاب المسالك البولية/ التهاب الجلد/ التهاب الحلق واللوزتين</p>	<p>سيفادروكس Cefadrox</p> 	<p>Cefadroxil</p> 
<p>في حالة الفشل الكلوي يجب أن تحدد الجرعة بدقة ، (الحمل فئة B) .</p>	<p>التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب الأنفية ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب المسالك البولية والتناسلية ، التهاب البروستات ، التهاب الجلد والأنسجة</p>	<p>كفلكس Keflex</p> 	<p>Cephalexin</p> 
<p>يعطى بحذر لدى المرضى المصابين بأمراض في الجهاز الهضمي ، في الحمل والإرضاع للضرورة فقط</p>	<p>التهابات الجهاز التنفسي السفلي ، الالتهابات البولية والتناسلية ، تجرثم الدم ، التهابات الجلد والأنسجة ، التهابات داخل البطن ، السحايا.</p>	<p>كلافوران Claforan</p> 	<p>Cefotaxime</p> 
<p>أمراض الكبد ، سرطان البطانة الرحمية ، الكيسات المبيضية الحمل والإرضاع</p>	<p>في معالجة العقم الناجم عن غياب الإباضة أو خلل الإباضة.</p>	<p>كلوميد Clomid</p> 	<p>Clomiphene Citrate</p> 
<p>نوبات الربو ، الزرق، حالات نقص الإنزيم</p>	<p>ارتفاع درجة الحرارة والصداع المصاحب للزكام ونزلات البرد</p>	<p>كونجستال Congestal</p>	<p>Paracetamol + pseudoephedrine</p>






<p>غلكوز 6 - فوسفات ديهيدروجينييز</p>	<p>الحادة، إحتقان الأنف وإحتقان الجيوب الأنفية وآلامها، رشح الأنف والعطس وحكة الأنف والحلق.</p>		<p>hydrochloride + chlorpheniramine maleate</p>
<p>لا يستعمل كونجستال شراب قبل مرور أسبوعين على إيقاف استعمال هذا الدواء.</p>	<p>إرتفاع درجة الحرارة والصداع المصاحب للزكام ونزلات البرد الحادة، إحتقان الأنف وإحتقان الجيوب الأنفية وآلامها، رشح الأنف والعطس وحكة الأنف والحلق.</p>	<p>كونجستال Congestal</p> 	<p>Paracetamol + pseudoephedrine hydrochloride + chlorpheniramine maleate</p>
<p>يعطى بحذر لمرضى الضغط الدم المرتفع، لا يستعمل نوبات الربو. الزرق ضيق الزاوية. أعراض تضخم البروستات، الغدة الدرقية، الحمل فئة C</p>	<p>إرتفاع درجة الحرارة والصداع المصاحب للزكام ونزلات البرد الحادة، إحتقان الأنف وإحتقان الجيوب الأنفية وآلامها، رشح الأنف والعطس وحكة الأنف والحلق.</p>	<p>كولد فري cold free</p> 	<p>Paracetamol + Pseudoephedrine hydrochloride + Chlorpheniramine maleate</p>
<p>لا يستعمل في حالات القصور الكلوي، القصور التنفسي أو الكبدي ، وحدوث جفاف ، قصور القلب للحوامل غالبا غير مستخدم لم تجري ابحاث كافية على نساء الحوامل</p>	<p>علاج داء السكر من النوع الثاني ، وكعلاج مساعد لمرضى داء السكري المعتمدين على الأنسولين</p>	<p>كلوكوفج Glucophage</p> 	<p>Metformin</p> <chem>CN(C)C(=N)NC(=N)N</chem>
<p>يعطى بحذر في حالات القصور الكلوي أو الكبدي ، الحمل فئة C في الأشهر الثلاثة الأولى وفئة D في الأشهر الأخيرة للحمل</p>	<p>في معالجة ارتفاع الضغط الشرياني يستخدم بمفرده أو مع خافضات أخرى</p>	<p>دايوفان Diovan</p> 	<p>Valsartan</p> <chem>CC(C)C(=O)N(C(=O)O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2N3=CN=CN=C3</chem>
<p>القصور الكلوي، التهاب الكبد الشديد ، لا يستعمل في الحمل إللا للضرورة</p>	<p>لإزالة الألم والشعور بالحرقان والأعراض الأخرى التي تنشأ عن تهيج الغشاء المخاطي للجزء السفلي من الجهاز البولي المتسبب عن</p>	<p>يوريسبت Urisept</p>	<p>Phenazopyridine HCL</p>








	العدوى بالميكروبات		
لا توجد حيث أنه لا يمتص ولا يصل إلي الدم وتأثيره موضعي	علاج الإلتهابات الفطرية بالفم والبلعوم	ميكوناز جل Miconaz Oral Gel 	Miconazole 
لا يستعمل في حب الشباب ، وردية الوجه ، الحكة الشرجية ، لا يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى	لمعالجة المناطق الجلدية مفرطة التقرن مثل الاكزيما المزمنة ، الحزاز البسيط ، الطفح الجلدي والصدفية	الیکا سال Elicasal 	Mometasone Furoate + Salicylic acid
يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى	في حالات الالتهابات الجلدية والحكة المصاحبة بعدوى فطرية	الیکا-M Elica M 	Mometasone Furoate + Miconazole Nitrate
لا يستعمل في حب الشباب ، وردية الوجه ، التهابات ما حول الفم ، يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى.	حالات الالتهابات الجلدية والحكة مثل الصدفية والتهابات سطحية، والاكزيما	الیکا Elica 	Mometasone Furoate 
لا يعطى لمرضى القصور الكيدي او الكلوي ، لا يعطى خلال الحمل ، يعطى بحذر اثناء الارضاع وكذلك لكبار السن	معالجة امراض القولون القرحية الحادة والوقاية من الاندفاعات النزفية المتطورة بدءا من القولون حتى الشرج	ميزا كول Mesacol 	Mesalazine 
لا يعطى في حالات القرحة	مسكن ألم ، للحمى ، عسر	أليف	Naproxen










<p>يعطى ، بحذر في حالات امراض القلب الوعائية والكلية والكبدية والحمل والرضاعة أو الأطفال اقل من 1 سنة.</p>	<p>الطمث ، التهاب المفاصل الروماتزم ، هشاشة العظام ، النقرس الحاد</p>	<p>Aleve </p>	<p><chem>CC(O)C(=O)c1ccc2cc(OC)ccc2c1</chem></p>
<p>الاستعمال المطول لهذه القطرات يؤدي الى احداث اذى كبير للاغشية المخاطية مما يؤدي الى انسداد الانف</p>	<p>يعطى في حالة انسداد الانف</p>	<p>نازوفرين Nasophrine </p>	<p>Naphthazoline nit. + Phenylephrine HCL + Chlorbutol</p>
<p>لا يعطى للرضع دون الثلاثة أشهر ، والحوامل ، وخلال الإرضاع ، يعطى بحذر للمرضى المصابين بقصور في وظائف الكلية أو الكبد.</p>	<p>معالجة التهابات الجهاز البولي السفلي ، معالجة الزحار العصوي ، إسهال حاليا لا يستخدم الا القليل لكثرة اثاره الجانبية</p>	<p>ناليدكسيك اسيد Nalidixic acid </p>	<p>Nalidixic acid <chem>CCN(C)C(=O)c1ccc2nc(C)nc2c1C(=O)O</chem></p>
<p>يعطى بحذر في الاعتلال الكلوي، والكبدى الشديدين، التهاب في الأوتار ، الصرع واضطرابات الجملة العصبية المركزية وعند كبار السن ، لا يستعمل عند الأطفال والمرضعات الحوامل</p>	<p>التهابات الكلية والمجاري البولية ، السيلان ، أيضا لعلاج التهاب الفيروسات.</p>	<p>نورفلوكس Norflo </p>	<p>Norfloracin <chem>CCN(C)C(=O)c1cc(F)c2c(c1)nc3c2ncc3C(=O)O</chem></p>
<p>يستخدم بحذر عند مرضى الربو أو الجلوكوما أو توسع غدة البروستات ، لا ينصح للأطفال دون 10 سنة ، الحمل فئة B</p>	<p>الدوخة والاقياء الناتج عن الحمل.</p>	<p>نافيدوكسين Navidoxine </p>	<p>Meclizine HCL + Vitamin B6</p>
<p>لا يعطى في : قرحة المعدة . يعطى بحذر في الربو ، أمراض المعدة ، فشل الكبد والكلية ، أمراض القلب عجز القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، الحمل خاصة الأشهر الثلاثة</p>	<p>مسكن للآلام وخافض للحرارة</p>	<p>نو بين No pain </p>	<p>Paracetamol + Ibuprofen + Caffeine</p>







<p>الأخيرة</p>			
<p>يعطى بحذر لمرضى السكري الحمل فئة B</p>	<p>الأمراض المسببة بالفطور الخميرية ، داء المبيضات الذي يصيب الأغشية المخاطية ، يستعمل لمنع تطور داء المبيضات خلال المعالجة الطويلة بالمضادات الحيوية</p>	<p>نيستاتين Nystatin</p> 	<p>Nystatin</p> 
<p>لا يستعمل عند وجود التهابات فيروسية موضعية أو جهازية ، لا يستعمل خلال الحمل ، يعطى بحذر للأم المرضعة</p>	<p>مضاد جرثومي ، مضاد فطري مضاد للالتهابات واسع الطيف</p>	<p>نيستاغرام Nystagram</p> 	<p>Triamcinolone acetonide + Gramicidine + Neomycin + Nystatin</p>
<p>يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد ، النقرس داء السكري ، الأطفال دون 10 سنة ، الحمل فئة C</p>	<p>مدر للبول عند ارتفاع ضغط الدم ، علاج تجمع السوائل (الوذمة) المرتبطة بقصور القلب الاحتقاني</p>	<p>لازكس Lasix</p> 	<p>Furosemide</p> 
<p>يمنع في حالات ارتفاع الجالاكتوز في الدم</p>	<p>لمعالجة الإمساك ، مرضى اعتلال الدماغ الكبدي</p>	<p>لاكتولاك Lactolac</p> 	<p>Lactulose</p> 
<p>لا يعطى في حالات وجود ألم بطني حاد ، التهاب زائدة ، نزف شرجي ، التهاب المعدة والأمعاء ، انسداد معوي ، الحمل فئة B</p>	<p>لمعالجة الإمساك</p>	<p>لاكسدل Laxadyl بسكوديل Bisacodyl</p> 	<p>Bisacodyl</p> 
<p>إذا كان للمريض حساسية لعنصر لانزوبرازول يمنع الاستخدام</p>	<p>التهابات المعدة والاثني عشر والقرحة والحرقة</p>	<p>لانزور Lanzor</p>	<p>Lansoprazole</p>


			
إذا كان للمريض حساسية لعنصر إيسومببازول يمنع الاستخدام	علاج قرحة الاثني عشر النشطة أو الملتئمة	نيكسيوم NEXIUM 	Esomeprazole 
يعطى بحذر في الجلوكوما ، ارتفاع ضغط الدم الوهن العضلي ، التهاب القولون التقرحي ، أمراض الكبد والكلى والربو ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع	يمنع تقلصات عضلات جدار الأمعاء ، تخفيف من إنتاج حمض المعدة	لبراكس Librax 	Chlordiazepoxide + Clindidium bromide
الانتفاخ البطني ، داء الأمعاء الالتهابي الحاد ، لا ينصح للرضع ، التهاب القولون المرافق للمضادات الحيوية	مضاد للإسهال.	لوبرمايد Loperamide 	Loperamide HCL 
الحساسية للمادة	يستخدم للسعال الجاف	سايكود Sinecod 	Butamirate citrate+ manilyn saccharin sodium
لا توجد موانع	التهاب الشعب الهوائية وعلاج الكحة	كيفبان Kifpan 	Dried ivy leaf extract

<p>لا يعطى في حالات الصدمة القلبية ، قصور القلب ، حصار القلب ، بطء ، القلب الجيبي ، يعطى بحذر للحوامل والمرضعات وتحت إشراف الطبيب</p>	<p>الذبحة الصدرية ، ارتفاع الضغط الشرياني ، للوقاية من الشقيقة ، وكعلاج مساعد في فرط نشاط الغدة الدرقية ، تنظيم دقات القلب</p>	<p>لوبريسور Lopressor NDC 0078-0458-05 Lopressor® 50 mg metoprolol tartrate USP 100 tablets Rx only NOVARTIS</p>	<p>Metoprolol <chem>CCN(C)C(O)COc1ccc(COC)cc1</chem></p>
<p>يحذر استخدام الدواء على الأطفال دون 6 سنوات وفي حالة القصور الكبدي والكليوي</p>	<p>التهاب الأنف التحسسي ، التهاب الملتحمة ، الاضطرابات التحسسية الجلدية</p>	<p>لوراتادين Loratadine </p>	<p>Loratadine <chem>CCOC(=O)N1CCN(C1)C2=CN=C3C=CC(=C23)Cl</chem></p>
<p>يعطى بحذر لمرضى القصور الكبدي والكليوي ، بالنسبة للإرضاع يجب إيقاف العلاج أو الإرضاع حسب أهمية العلاج للام ، لا يعطى للحوامل وخاصة بعد الأشهر الثلاثة الأولى</p>	<p>علاج ارتفاع التوتر الشرياني (علاج ضغط الدم) يستعمل لوحده أو بالمشاركة مع خافضات الضغط الأخرى</p>	<p>لوزارتان Losartan </p>	<p>Losartan potassium <chem>CCN1C=NC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3N4=CC=CC=C4N5C(=O)N(C5)C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C7C8=CC=CC=C8C9=CC=CC=C9C10=CC=CC=C10C11=CC=CC=C11C12=CC=CC=C12C13=CC=CC=C13C14=CC=CC=C14C15=CC=CC=C15C16=CC=CC=C16C17=CC=CC=C17C18=CC=CC=C18C19=CC=CC=C19C20=CC=CC=C20C21=CC=CC=C21C22=CC=CC=C22C23=CC=CC=C23C24=CC=CC=C24C25=CC=CC=C25C26=CC=CC=C26C27=CC=CC=C27C28=CC=CC=C28C29=CC=CC=C29C30=CC=CC=C30C31=CC=CC=C31C32=CC=CC=C32C33=CC=CC=C33C34=CC=CC=C34C35=CC=CC=C35C36=CC=CC=C36C37=CC=CC=C37C38=CC=CC=C38C39=CC=CC=C39C40=CC=CC=C40C41=CC=CC=C41C42=CC=CC=C42C43=CC=CC=C43C44=CC=CC=C44C45=CC=CC=C45C46=CC=CC=C46C47=CC=CC=C47C48=CC=CC=C48C49=CC=CC=C49C50=CC=CC=C50C51=CC=CC=C51C52=CC=CC=C52C53=CC=CC=C53C54=CC=CC=C54C55=CC=CC=C55C56=CC=CC=C56C57=CC=CC=C57C58=CC=CC=C58C59=CC=CC=C59C60=CC=CC=C60C61=CC=CC=C61C62=CC=CC=C62C63=CC=CC=C63C64=CC=CC=C64C65=CC=CC=C65C66=CC=CC=C66C67=CC=CC=C67C68=CC=CC=C68C69=CC=CC=C69C70=CC=CC=C70C71=CC=CC=C71C72=CC=CC=C72C73=CC=CC=C73C74=CC=CC=C74C75=CC=CC=C75C76=CC=CC=C76C77=CC=CC=C77C78=CC=CC=C78C79=CC=CC=C79C80=CC=CC=C80C81=CC=CC=C81C82=CC=CC=C82C83=CC=CC=C83C84=CC=CC=C84C85=CC=CC=C85C86=CC=CC=C86C87=CC=CC=C87C88=CC=CC=C88C89=CC=CC=C89C90=CC=CC=C90C91=CC=CC=C91C92=CC=CC=C92C93=CC=CC=C93C94=CC=CC=C94C95=CC=CC=C95C96=CC=CC=C96C97=CC=CC=C97C98=CC=CC=C98C99=CC=CC=C99C100=CC=CC=C100</chem></p>
<p>التهاب القرنية الناتج من هربز سمبلكس ، التهاب الملتحمة والقرنية: فاكسينا ، فارسيلا / التهابات الفطرية</p>	<p>علاج التهابات ملتحمة العين والقرنية الجزء الأمامي من العين</p>	<p>لوكسترا Loxtra </p>	<p>Ofloxacin + Prednisolone acetate + Tetrahydrozolin HCL</p>
<p>يجب تجنبه في حالة المرضى الذين يعانون من تضخم البروستات</p>	<p>حالات تهيج القولون</p>	<p>ستلابيد Stelabid </p>	<p>Isopropamide + Trifluoperazine</p>
<p>حساسية مع المسكنات الأخرى ، اضطرابات النزف أو الصفائح ، يعطى بحذر في القرحة ، أمراض الكلى الشديدة أو كبدي حاد ، الحمل فئة D</p>	<p>التهاب المفاصل الروماتيزم ، هشاشة العظام ، ألم خفيف إلى معتدل ، حمى ، الوقاية من الذبحة الصدرية</p>	<p>أسبرين Aspirin </p>	<p>Acetylsalicylic acid <chem>CC(=O)OC(=O)c1ccccc1</chem></p>

<p>خلال الأشهر الثلاثة الأولى</p> <p>يجب أن لا يلامس العين والأنف و الأغشية المخاطية. بحيث يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد استعمال الكريم مباشرة. لا ينصح بالاستخدام الطويل وخصوصاً عند الأطفال ، يجب أن تطبق هذه المستحضرات أثناء الحمل عند الحاجة لها فقط بحيث أنها لا تطبق لفترة طويلة</p>	<p>الالتهابات الجلدية الفطرية المستجيبة للعلاج بالستيروئيدات. التهاب الجلد بين الثنيات ، التهاب الحشفة والقلقة، التهاب الفم الزاوي، الأكزيما الدهنية (الزهمية)، الأكزيما التي تختلط بإصابة فطرية.</p>	<p>نيستاكورت Nystacort</p> 	<p>Dexamethasone + chlorhexidine HCl + nystatin</p>
<p>الحساسية لأحد مكوناتها ، في حالة الحمل ،الإصابة بجذري الماء أو السل وجود الدوخة أو مشاكل سمعية ، عند وجود ثقب في طبلة الأذن</p>	<p>التهاب الأذن الخارجية والقناة السمعية بسبب جرثومي أو فطري ، تخفيف الحكة ، الحرقة ، الحساسية.</p>	<p>أوتيك تري Tri – Otic</p> 	<p>Triamcinolon Acetonide + Neomycin sulfate + Gramicidin + Nystatin</p>
<p>يمنع استخدام في حالة الالتهابات الفيروسية الفطرية في الاذن كما يجب ابعداء عن العين</p>	<p>الالتهابات البكتيرية في قناة الأذن الخارجية وخصوصا اذا كانت مصحوبة بألم.</p>	<p>أوتال Otal</p> 	<p>Framycetin+ Gramicidin+ Cinchocaine+ Dexamethasone</p>
<p>اضطرابات بصرية استشر الطبيب قبل استخدامه</p>	<p>عدم القدرة على الانتصاب (العجز).</p>	<p>فياجرا Viagra</p> 	<p>Sildenafil</p> 
<p>فنيستيل نقط امن بدرجة كبيرة ولا توجد موانع إستعمال له.</p>	<p>علاج الحكة والهرش والحساسية لأي سبب كان، حساسية الانف الموسمية وحمي القش</p>	<p>فنيستيل Fenistil</p> 	<p>Dimethindene Maleate</p> 
<p>وجود عدوى جرثومية فطرية أو</p>	<p>مضاد للالتهاب ، الحكة ، الحساسية ، تقرحات الفم</p>	<p>دينتي كورت Denti-cort</p>	<p>Triamcinolone Acetonide</p>

<p>فيروسية في الفم أو البلعوم لا يستعمل عند المصابين بالسل ، القرحة ،داء السكري ، أثناء الحمل إلا بعد استشارة الطبيب</p>	<p>الناجمة عن الرضوض أو الجروح</p>		
<p>لا يعطى للأطفال ، يعطى أقل جرعة واقصر وقت في الحالات الآتية: أصحاب الأمراض المزمنة ، الإجهاد الجراحة ، والتهابات ، في الحمل لم يثبت سلامة</p>	<p>في طائفة واسعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك : التهابي ، الحساسية ، الدموية ، الأورام ، اضطرابات المناعة الذاتية</p>	<p>سليستون Celestone 30 Tabletten 0,5 mg/Tab. Schering-Plough</p> 	<p>Betamethasone</p> 
<p>لا تستعمل بعد أربعة أسابيع من فتحها</p>	<p>معالجة التهاب ملتحة العين المثيجة والملتحة التحسسية(نزلة العين الربيعية)</p>	<p>اوفتازولين Optizoline 5ml STERILE</p> 	<p>Tetrahydrozoline</p> 
<p>لا يوجد موانع للاستعمال سوي المرضى الذين يتناولون ليفو دوبا Levo-dopa</p>	<p>تساعد في علاج التهاب الأعصاب ، علاج الأنيميا بسبب نقص فيتامين ب 12 ، أمداد الأم الحامل بفيتامين ب المركب اللازم أثناء الحمل ، الم اسفل الظهر والتشنجات</p>	<p>نيوروبيون فورت Nerubion Forte 100 tabletta/tabletter</p> 	<p>Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12</p>
<p>يعطى بحذر في اختلال كلوي ،المسنين تضخم البروستات ، الجلوكوما ، الأطفال دون 10 سنة الحمل فئة C</p>	<p>علاج انفصام الشخصي</p>	<p>اولان بريكسا Olan-prexa DOMINA</p> 	<p>Olanzapine</p> 
<p>يستعمل بعد الاستشارة في الحالات: الأمراض القلبية ، ارتفاع ضغط الدم ، أمراض درقية ، سكري ،</p>	<p>لتسكين الألم الصدغي وأعراض البرد والرشح ، لتخفيف الآلام ، في حالات الاحتقان الأنفي ، الصداع ، التهاب الحلق ، السعال ،</p>	<p>3 أكت Act-3</p>	<p>Paracetamol + Dextromethorphan + Pseudoephedrine HCL</p>

<p>تضخم البروستات ، الحمل والإرضاع</p>	<p>خافض حرارة</p>		
<p>القصور الكلوي أو الكبدي ، فقر الدم الانحلالي</p>	<p>السعال بكافة أنواعه ، الأنفلونزا ونزلات البرد الراشحة ، الحالات التحسسية التي تصيب الجهاز التنفسي ، التهاب البلعوم والقصبات والجيوب</p>	<p>بكتوميد Pectomed</p> 	<p>Chlorpheniramine maleate + Bromhexine Hcl + Ephedrine Hcl</p>
<p>يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي إذا استخدم بجرعه كبيرة</p>	<p>يستخدم للحفاظ على قوه الشعر ولمعانه ويفيد في تخخين الشعر</p>	<p>بيوتين Biotin</p> 	<p>vitamin B7</p> 
<p>آلام حادة في البطن لسبب غير معروف وخصوصا عندما يرتبط مع حمى ، الأطفال اقل من 3 سنوات الحمل فئة C</p>	<p>مضاد للإسهال.</p>	<p>كابكت Kapect</p> 	<p>Kaolin + Pectin</p>
<p>يستعمل بحذر بحالة أمراض الكبد والدم ، الحامل والمرضع</p>	<p>يستخدم بحالة التشنجات العضلية القوية التي قد تصحبها حمى ، خافض حرارة</p>	<p>كي بي دي KDP-MR</p> 	<p>Diclofenac + Chlorzoxazone + Paracetamol</p>
<p>لا يستعمل للأطفال دون 4 سنوات ، لا ينصح باستعمالها للحوامل والمرضعات إلا لضرورة ملحة</p>	<p>علاج الاضطرابات البصرية ذات الطبيعة التحسسية ، وفي حالات التحسس الناتجة عن استعمال العدسات</p>	<p>دادكروم Dadcrome</p>	<p>Sodium Cromoglycate</p>

			
يجب عدم الاستخدام في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ما لم يري الطبيب ضرورة لذلك	مضاد ومبيد فطري واسع الطيف وقاتل للوحيدات المشعرة	مازول كاندي Candi mazol 	Clotrimazole 
لا يستعمل للرضع دون شهر واحد ، لا ينصح خلال الحمل والإرضاع ،	التهابات الأمعاء والاسهال الجرثومي أو الطفيلية	فورادون Furadon 	Furazolidone 
حساسية للمادة ، يمنع استخدام الوارفارين مع اوميغا 3	يستخدم لرفع مستوى التركيز والقدرات الذهنية للطفل والكبار ، وتأخير سن الزهايمر ، والحماية من مرض الإصابة بأمراض القلب ، ويقلل من عوامل تجلط الدم التي تنتج عنها الأزمات القلبية والجلطات ، يقلل من معدلات الدهون الثلاثية ، يقلل من ترسب الكوليسترول والدهون على جدار الشرايين ، ينشط الجهاز العصبي والعضلي والتناسلي	اوميغا 3 omega 3 	Eicosapentaenoic acid + Docosahexaenoic acid (DHA)