

وزارة التعليم  
Ministry of Education

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

الرقم (٢٨٠)

الشؤون التعليمية

إدارة نشاط الطالبات

# الحقيبة التدريبية للأولمبياد الوطني للعلوم للمرحلة المتوسطة

تقديم

المشرفة التربوية بإدارة نشاط الطالبات

فوزية عائض العتيبي

المشرفة التربوية بإدارة نشاط الطالبات

لمياء عبود باسليمان


مديرة إدارة نشاط الطالبات

لمياء عبد العزيز بشاوري

إ. البنيان


## مقدمة

### حقيبة:



إن حقائبنا التي نحملها لا نستطيع أن نضمنها كل أغراضنا ولكن نضع فيها عادة ما نتوقع أن نحتاجه في مشوارنا، وكذلك حقيبتنا هذه فإننا لا نستطيع أن نحمل في طياتها كل أمتعتنا العلمية ولكن جعلنا فيها قدرأ كافياً لفهم الفيزياء والتعامل مع مسائله الحياتية.

### أولمبياد:



أولمبياد هي كلمة مشتقة من مدينة أولمبيا اليونانية وهي أول مدينة تحتضن المسابقات على مر التاريخ والتي بدأت عام ٧٧٦ قبل الميلاد...

### العلوم:



العلوم الطبيعية هي العلوم التي تهتم بدراسة النواحي الطبيعية المادية لكافة الظواهر الموجودة على الأرض والكون المحيط بنا. يحاول العلم الطبيعي أن يشرح كيفية عمل العالم والظواهر الموجودة فيه .

## الوحدات الفيزيائية

الفيزياء ( physics ) : هو ذلك العلم الذي يدرس الطاقة و المادة و العلاقة بينهما .  
الفيزياء و الرياضيات : تستخدم الفيزياء الرياضيات باعتبارها لغة قادرة على التعبير عن القوانين و الظواهر الفيزيائية بشكل واضح و مفهوم .

### الوحدات ( Units )

الفيزياء و القياس : القياس هو مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية . و يعتمد علم الفيزياء على قياس الكميات الفيزيائية بشكل كبير حيث تتحدد أي كمية طبيعية بعاملين اثنين هما :

العدد و وحدة القياس

أي أنه لا يمكن ذكر أعداد أو أرقام مجردة دون تحديد الوحدة التي تقاس بها تلك الكمية .

مثال 1 : A ( ماذا تعني لك الأرقام التالية :

5	10	4	20	16
---	----	---	----	----

الإجابة : هي مجرد أرقام ليس لها أي دلالة .

B ( ماذا تعني لك الأرقام الآتية :

5 m	10 Kg	4 s	20 m/s	16 m <sup>2</sup>
-----	-------	-----	--------	-------------------

الإجابة : لكل رقم دلالة حسب وحدة القياس المقترنة به و الجدول التالي يوضح ذلك :

5 m	تعني طول شيء ما	طول غرفة الصف
10 Kg	تعني كتلة شيء ما	كتلة صندوق العصير
4 s	تعني فترة زمنية ما	زمن الاهتزازة للبندول
20 m/s	تعني سرعة شيء ما	سرعة سيارة
16 m <sup>2</sup>	تعني مساحة شيء ما	مساحة غرفتي

-لاحظ كيف أن وحدة القياس أعطت مدلولاً واضحاً للرقم و حددت الكمية الفيزيائية التي قمنا بقياسها ، لذلك نؤكد مره أخرى على أهمية معرفة وحدات القياس و أجزائها ومضاعفاتها لأي كمية فيزيائية

الكميات الفيزيائية ( Physical Quantities ) : هي التي تبني هيكل الفيزياء ، و بها نكتب القوانين الفيزيائية و تنقسم الكميات الفيزيائية إلى أساسية و مشتقة .

الكميات الأساسية : في الميكانيكا هناك ثلاث كميات أساسية موضحة في الجدول الآتي :

الكميات الأساسية و وحدات قياسها في النظام الدولي ISU		
الكمية الأساسية	الوحدة الأساسية	رمز الوحدة الأساسية
الطول ( L )	Meter	M
الكتلة ( m )	Kilogram	Kg
الزمن ( t )	Second	S

**ملاحظة :**

يسمى النظام الدولي أحيانا النظام الفرنسي عند استخدام cm للطول ، و g للكتلة و s للزمن و يختصر النظام الفرنسي ( CGS ) ، و هناك النظام البريطاني للوحدات ( FBS ) حيث تستخدم وحدة القدم للطول ، و وحدة الباوند للكتلة ، و وحدة الثانية للزمن .

-أما باقي الكميات في الميكانيكا فتدعى كميات مشتقة لأنه يمكن أن نعبر عنها بدلالة الكميات الأساسية الثلاث .

مثال : أعط أمثلة على كميات فيزيائية مشتقة . الجواب : السرعة ، التسارع ، القوة ، الشغل ، الطاقة ، الزخم

### تحويل الوحدات : Conversion of Units

من الضروري في بعض الأحيان أن نحول الوحدات من نظام إلى آخر و من المهم جدا عند التحويل معرفة عامل التحويل ، فمثلا عند تحويل 100 دولار إلى الريال السعودي لن نستطيع إجراء التحويل دون معرفة عامل التحويل ، أما إن أعطيت عامل التحويل ( كل 1 دولار = 3.7 ريال ) فيصبح من السهل تحويل المبلغ و يكون الناتج =  $370 = 3.7 \times 100$  ريال

**أمثلة محلولة :** حول ما يلي :

1 ( 50cm إلى m ) : **الإجابة :** معامل التحويل  $1m=100cm$  ، بما أننا نرغب بالتحويل من cm إلى m فإننا نقسم على 100 فيكون الحل :

$$L = 50cm \times \frac{1m}{100cm} = 0.50 m$$

$$\frac{1m}{100cm} = 1 \text{ : ملاحظة تذكر أن}$$

2 ( 3 Kg إلى g ) : **الإجابة :** معامل التحويل  $1Kg=1000g$  ، بما أننا نرغب في التحويل من Kg إلى g فإننا نضرب في 1000 فيكون الحل :

$$L = 3Kg \times \frac{1000g}{1Kg} = 3000 g$$

3 ( 20km/h إلى m/s : هذا التحويل تحويل مزدوج الأول في البسط من Km الى m نضرب في 1000 و التحويل الثاني في المقام من h الى s نضرب في 3600 في المقام ( 1 h=60 min=3600 s ) ، لذلك معامل التحويل من Km/h الى m/s يكون  $\frac{1000}{3600}$  =

$$\frac{20Km}{h} \times \frac{1000m}{1Km} \times \frac{1h}{3600s} = \frac{20 \times 1000}{3600} = 5.55m/s$$

4 ( 450 cm<sup>3</sup> إلى m<sup>3</sup> : عند التحويل من cm الى m نقسم على 100 ، ولكن عن التحويل من cm<sup>3</sup> الى m<sup>3</sup> فاننا نقسم على 10<sup>6</sup> = 100 × 100 × 100 .

$$450cm^3 \times \frac{1m^3}{10^6 cm^3} = 4.5 \times 10^{-4}m^3$$

5 ( 10 mm إلى m : لتحويل من mm الى m نقسم على 1000 .

$$10mm \times \frac{1m}{1000mm} = 0.01m$$

**تدريبات على تحويل : حول ما يلي :**

1: 30m الى mm

2: 25g الى Kg

3: 0.004m<sup>2</sup> الى cm<sup>2</sup>

4: 35m/s الى Km/h

5: 4.66g/cm<sup>3</sup> الى Kg/m<sup>3</sup>

6: 2days الى sec

الإجابات :

1: 30000mm ، 2: 0.025Kg ، 3: 40cm<sup>2</sup> ، 4: 126Km/h ، 5: 4660Kg/m<sup>3</sup> ، 6: 518400 s


مثال : إذا علمت أن : ( الكثافة  $\rho$  تساوي الكتلة  $m$  تقسيم الحجم  $V$  ) ، فأوجد كثافة مكعب من الصلب كتلته 856 g وطول ضلعه 5.32 cm بوحدة النظام  $Kg/m^3$  ؟

$$m = 856g \times \frac{1Kg}{1000g} = 0.856Kg \leftarrow Kg \text{ إلى } g$$

$$V = L^3 = 0.0532^3 = 1.5 \times 10^{-4}m^3 \leftarrow \text{نحسب الحجم}$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0.856}{1.5 \times 10^{-4}} = 5706.66Kg/m^3 \leftarrow \text{نحسب الكثافة}$$

**مثال 3 :** ماذا يعني كل رمز و رقم في ما يأتي



**تدريب 4 :** اذكر معنى حرف ( m ) في كل مما يأتي :

أ :  $m = 4 Kg$  ← كمية فيزيائية ( الكتلة )

ب :  $L = 6 m$  ← وحدة قياس للطول ( متر )

ج :  $t = 3 ms$  ← بادئة ( مللي )

**تدريب 5 :** ماذا يعني كل رمز و رقم فيما يأتي :

$t = 0.3 \mu s$  ← الكمية الفيزيائية ( الزمن ) : t ، وحدة القياس للزمن ( الثانية ) s =

البادئة ( ميكرو  $10^{-6}$  ) ، الرقم المقاس = 0.3

$p = 4 Gw$  ← الكمية الفيزيائية ( القدرة ) p ، وحدة قياس القدرة ( واط ) W =

البادئة ( جيجا  $10^9$  ) ، الرقم المقاس = 4

اخي الطالب : تدريب عن البادئات يفيدك بالتعرف على رموزها و قيمها ؟

كم ثنائية من الزمن في : حاول ان تحل بنفسك	كم مترا من المسافة في :
$10^{-9} = n$ البادئة ..... s ← 4.67 ns	$5.356 \times 10^{-3} m$ ← 5.356 mm : البادئة m : مللي $10^{-3}$
$10^6 = M$ البادئة ..... s ← 24.0 Ms	$1.2 \times 10^3 m$ ← 1.2Km : البادئة K : كيلو $10^3$
$10^{-6} = \mu$ البادئة ..... s ← 8.5 $\mu s$	$3.4 \times 10^{-12} m$ ← 3.4 pm : البادئة p : بيكو $10^{-12}$

## تدريبات إضافية

1 ( كم ثانية في السنة الكبيسة = 366day

$$\text{الحل : } 1\text{year} \times \frac{366\text{days}}{1\text{year}} \times \frac{24\text{h}}{1\text{day}} \times \frac{60\text{min}}{1\text{h}} \times \frac{60\text{sec}}{1\text{min}} = 31622400\text{sec}$$

2) صندوق طوله 19.2cm و عرضه 18.1cm و ارتفاعه 20.3cm اوجد حجم الصندوق بوحدة  $m^3$  ؟

الحل : نحول الطول و العرض و الارتفاع من cm الى m من خلال القسمة على 100 لكل منها

$$V = L \times w \times h = 0.192 \times 0.181 \times 0.203 = 7.05 \times 10^{-3} m^3$$

3) احسب كتلة الماء بوحدة Kg اللازمة لملء وعاء طوله 1.4m و عرضه 0.60m و عمقه 0.34m

علما أن كثافة الماء =  $1.0\text{g/cm}^3$  ؟

الجواب :  $m=285.6\text{Kg}$

4) ما طول ضلع مكعب بوحدة m إذا كان حجمه  $588\text{mm}^3$  ؟

الجواب :  $L= 0.008377\text{m}$

## الفصل الثاني: الكميات القياسية ( Scalar quantities ) و الكميات المتجهة ( Vector quantities )

الكميات القياسية ( Scalar quantities ) و الكميات المتجهة ( Vector quantities )

أولا : الكميات القياسية (Scalar quantities): كميات فيزيائية يكفي لتحديدتها ذكر مقدارها فقط ( العدد )

- يتم التعامل مع الكميات القياسية من خلال العمليات الحسابية ( جمع ، طرح ، ضرب ، قسمة ) بالطرق الجبرية المعتادة و من أمثلة الكميات القياسية : الطول ، الكتلة ، الزمن ، الكثافة ، الحجم ، الشغل ، الطاقة .

مثال1: اشترى احمد 5Kg من التفاح ، ثم قرر شراء 3Kg أخرى من التفاح كم اشترى احمد من التفاح ؟

الحل : نجمع 5Kg مع 3Kg فيكون مجموع ما اشترى أحمد من التفاح = 8Kg


نلاحظ سهولة العمليات الحسابية على الكميات القياسية لأننا نتعامل مع الأعداد فقط

**ثانياً : الكميات المتجهة ( Vector quantities ) :** الكميات الفيزيائية التي تحدد بالمقدار و الاتجاه معا

- التعامل مع الكميات المتجهة في العمليات الحسابية ( الجمع ، الطرح ، الضرب ) ليس بنفس الطريقة التي تعودنا عليها ( الطريقة الجبرية ) في الكميات القياسية ، و من أمثلة الكميات المتجهة : السرعة المتجهة velocity ، التسارع (acceleration) ، القوة (force) ، الوزن (weight) ...


**ملاحظة :** لتمييز الكميات المتجهة سنرمز لها بأحرف غامقة **Bold**

**مثال 2 :** لو ذكر لك صديقك أن تلاقه في مكان يبعد عن برج المملكة 10 km فأين ستذهب ؟





**الإجابة :** سيكون هناك عدد لانهائي من الأماكن التي يحتمل وجود صديقك بها و هي محيط الدائرة التي نصف قطرها 10km و مركزها برج المملكة ، لأنه يلزمك للوصول إلى زميلك الاتجاه بالإضافة إلى المقدار الذي أعطي لك ، لذلك لن تصل بدون الاتجاه .

-الآن لو أن زميلك ذكر لك أنه متواجد شرق برج المملكة و على بعد 10 km ، في هذه الحالة سيكون من السهل عليك الوصول إليه لأنه أعطى لك المقدار ( 10km ) و الاتجاه ( شرق برج المملكة ) ، لذلك تعتبر الإزاحة من الكميات المتجه .



**أنظمة الإحداثيات ( Coordinate Systems )**

يمكن أن نستخدم الاتجاهات المعروفة لدينا :



**من المهم في حلول مسائل الفيزياء استخدام المرجعيات الصحيحة -**

تمثيل المتجهات : يلزم لتمثيل المتجهات على المحاور  $x, y$  معرفة المقدار و الاتجاه و نقطة التأثير ، حيث يتم



اعتماد مقياس رسم مناسب لتمثيل المتجهات


**مثال 3:** مثل كل من المتجهات التالية على مجاور الإحداثيات :

أ) المتجه  $A$  مقداره  $5 \text{ unit}$  و اتجاهه شرقا .

ب) المتجه  $B$  مقداره  $3 \text{ unit}$  و اتجاهه غربا .

ج) المتجه  $C$  مقداره  $6 \text{ unit}$  و اتجاهه بزاوية  $30^\circ$  عن محور  $x$  عكس عقارب الساعة ( يعبر عنها بـ  $\theta = 30^\circ$  )

د) المتجه  $D$  مقداره  $2 \text{ unit}$  و اتجاهه بزاوية  $60^\circ$  عن محور  $x$  مع عقارب الساعة ( يعبر عنها بـ  $\theta = -60^\circ$  )



بعض خصائص المتجهات ( *some properties of vectors* )

أولاً: تساوي متجهين ( *Equality of Two Vectors* )

- نقول أن المتجه  $A$  يساوي المتجه  $B$  ، إذا كان مقدار  $A$  يساوي مقدار  $B$  و كلاهما في نفس الاتجاه ، و من هذه القاعدة يمكننا نقل المتجه من مكان إلى آخر بشرط المحافظة على المقدار و الاتجاه

→  $A$

→  $B$


يمكن نقل المتجه  $A$  إلى أي مكان بشرط ان يبقى له نفس المقدار ( الطول بالرسم ) و نفس الاتجاه

→  $A$

ثانياً: ضرب المتجه بكمية قياسية ( *Multiplying a Vector by Scalar* )

- عند ضرب المتجه بعدد موجب يحافظ المتجه على اتجاهه .
- عند ضرب المتجه بعدد سالب يعكس المتجه اتجاهه .

مثال : إذا كان المتجه  $A$  كما هو ممثل بالشكل ، فارسم المتجه  $3A$  ،  $0.5A$  ،  $-2A$




ثالثا : جمع المتجهات ( Adding Vectors )

- يحقق جمع المتجهات الخاصية الإبدالية :  $A+B = B+A$

- يحقق جمع المتجهات الخاصية التجميعية :  $(A+B)+C = A+(B+C)$

( جمع المتجهات على استقامة واحدة : و هو أبسط وضع لجمع المتجهات عندما تكون في استقامة واحدة : 1 ) إن كانت بنفس الاتجاه (  $\theta = 0^\circ$  ) تجمع جبريا و يكون اتجاه المحصلة بنفس اتجاه المتجهات .  
 ( 2 ) إن كانت متعاكسة بالاتجاه (  $\theta = 180^\circ$  ) تطرح جبريا و يكون اتجاه المحصلة  $R$  باتجاه الأكبر


مثال 4 : من الشكل المجاور أوجد محصلة المتجهات  $R$  ( مقدارا و اتجاهها ) :



الحل :  $R = F_1 + F_2 + F_3$

$$R = 12 + 5 - 4 = 13N$$

$A = 6 \text{ unit}$
$B = 7 \text{ unit}$
$C = 15 \text{ unit}$



تدريب 2 : أوجد المحصلة  $R$  للمتجهات في الرسم المجاور

الجواب :  $R = -16 N$

الفصل الثالث : الحركة في بعد واحد ( motion in one Dimension )


- العالم جاليليو أول من فكر في تكميم الحركة و إعطاء السرعة قيمة و هو أول من فكر في القصور الذاتي

الميكانيكا : تدرس حركة الأجسام ( mechanics ; study of objects in motion )	
دايناميك ( Dynamics )	كينماتيكا ( Kinematics )
لماذا تتحرك الأجسام ( Why objects move )	تصف حركة الأجسام ( Description of how objects move )

- لوصف حركة الجسم يجب علينا أن نتعرف على المسافة ( Distance ) و هي كمية قياسية ، و الإزاحة ( Displacement ) و هي كمية متجهة .

قارن بين المسافة و الإزاحة من خلال الجدول التالي :

وجه المقارنة	المسافة	الإزاحة
نوع الكمية	قياسية ( مقدار فقط )	متجهة ( مقدار و اتجاه )
الرمز	d	$\Delta x$
القيم	موجبة أو صفر	موجبة أو صفر أو سالب
وحدة القياس	m	m
المفهوم	البعد بين نقطتين	البعد المستقيم المتجه من البداية الى النهاية



**مثال 1:** تحرك خالد 3m غربا ثم 4m شرقا ، اوجد المسافة و الإزاحة لحركة خالد

الحل : المسافة :  $d=3+4=7m$  ، الإزاحة :  $\Delta x=-3+4=1m$

**تدريب 1:** دار احمد دورة كاملة في دوار نصف قطرة 100m ، اوجد المسافة و الإزاحة .

الاجابة : المسافة :  $d=2\pi r = (2)(3.14)(100)= 628 m$  ، لاحظ ان المسافة هي محيط الدائرة

الإزاحة :  $\Delta x = 0 m$  ، لأنه رجع إلى نفس نقطة البداية .

**2:** اعد حل لفقرة 1 : باعتبار أحمد دار نصف دورة ؟ ( حاول أن ترسم السؤال لتفهم الإجابة )

المسافة :  $d=314 m$  ، الإزاحة :  $\Delta x = 200 m$

$$v = \frac{d}{t}$$

السرعة ( speed ) : مقدار المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن

$$\text{Average speed} = \frac{\text{total distance}}{\text{total time}}$$

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$$

- ملاحظات على السرعة ( speed ) : وحدة قياسها m/s ، السرعة دوما موجبة أو صفر

$$v = \frac{\Delta X}{\Delta t}$$

السرعة المتجهة ( Velocity ) : الإزاحة خلال وحدة الزمن .

$$\text{Average Velocity} = \frac{\text{total Displacement}}{\text{total time}}$$

$$\text{السرعة المتوسطة المتجهة} = \frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}}$$

ملاحظات على السرعة المتجهة ( Velocity ) : وحدة قياسها m/s ، تأخذ قيم موجبة أو صفر أو سالبة .

**مثال 3 :** ما المسافة التي قطعها خالد في 1.5h و هو يركض بسرعة متوسطة 2m/s

لحل السؤال يجب أولا تحويل الزمن ليتوافق مع وحدة السرعة .

$$t = 1.5h \times \frac{3600sec}{1h} = 5400sec$$

نعوض بالقانون المسافة = السرعة × الزمن :

$$d = vt = 2 \times 5400 = 10800m$$

**مثال 4 :** تحركت سيارة 7km شرقا ، ثم 3km غربا خلال 0.25 h أوجد السرعة المتوسطة

( Average speed ) ثم احسب السرعة المتجهة المتوسطة ( Average Velocity )


$$\text{السرعة المتوسطة} : v = \frac{d}{t} = \frac{7+3}{0.25} = \frac{10}{0.25} = 40m/s$$

$$\text{السرعة المتوسطة المتجهة} : v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{7-3}{0.25} = \frac{4}{0.25} = 16m/s ، \text{باتجاه الشرق}$$

**مثال 5:** سافر زياد بسيارته من القرية إلى المدينة بسرعة ثابتة قدرها 70km/h ، وكانت سرعته في أثناء العودة 100km/h ، احسب السرعة المتوسطة ( speed ) لسيارة زياد خلال الرحلة . علما ان المسافة بين القرية والمدينة = 160 Km

$$v = \frac{d_1+d_2}{t_1+t_2} = \frac{160+160}{\frac{160}{70}+\frac{160}{100}} = \frac{320}{3.886} = 82.34m/s$$

$$v = \frac{d}{t} \rightarrow t = \frac{d}{v}$$



منحنى الموقع و الزمن ( Position vs time )

- يمكن حساب الإزاحة لأي فترة زمنية من خلال العلاقة الرياضية :

$$\Delta x = x_f - x_i$$

- يمكن حساب السرعة المتجهة ( velocity ) من ميل منحنى ( الموقع - الزمن )

مثال : احسب السرعة المتوسطة المتجهة بين النقطتين A,D ؟

الحل : ميل الخط المستقيم بين النقطة A والنقطة B يمثل السرعة المتوسطة المتجهة ، لذلك نجد الميل

$$slop = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

تذكر أن ميل الخط المستقيم = فرق الصادات على فرق السينات ،

من الرسم لاحظ أن احداثيات النقطة A هي : ( 0,30 ) ، احداثيات النقطة B هي : ( 30,0 )

$$v = \frac{30 - 0}{0 - 30} = -1m/s$$

**مثال 7:** الرسم البياني يمثل حركة جسم نقطي بخط مستقيم بالنسبة للزمن ، احسب السرعة المتوسطة و السرعة

المتجهة المتوسطة خلال 20s ؟


الحل : السرعة المتوسطة = المسافة ÷ الزمن

$$v = \frac{d}{t} = \frac{80}{20} = 4m/s$$

السرعة المتوسطة المتجهة = الإزاحة ÷ الزمن

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0}{20} = 0 m/s$$

الإزاحة = صفر ، لان الجسم تحرك ذهابا وإيابا و رجع الى نفس نقطة البداية .



التسارع ( Acceleration ) : هو معدل تغير السرعة المتجهة بالنسبة للزمن .

$$\text{Average Acceleration} = \frac{\text{change in velocity}}{\text{time interval}}$$

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_i}{t - t_i}$$

- ملاحظات على التسارع : وحدة التسارع  $m/s^2$  ، التسارع كمية متجهة .

**مثال 9 :** تبلغ سرعة سيارة على قمة تلة  $10m/s$  و بعد مرور  $2s$  أصبحت سرعة السيارة  $26m/s$  باتجاه أسفل التلة ، احسب تسارع السيارة .

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_i}{t - t_i}$$


$$\bar{a} = \frac{26 - 10}{2} = 8m/s^2$$

ماذا تعني لك الإجابة ؟ أن السيارة تزداد سرعتها باتجاه أسفل التل بمقدار  $8m/s$  في كل  $1s$

### حساب التسارع المتوسط من منحنى السرعة مع الزمن ( a v - t ) :

يمكننا حساب التسارع في فترة زمنية ما بحساب ميل منحنى السرعة مع الزمن

**مثال 10 :** استعن بالشكل الآتي و احسب



1 : تسارع الجسم المتحرك في الأزمنة التالية :

أ ) خلال أول  $5s$  من الرحلة

$$a = \frac{30 - 0}{5 - 0} = 6 m/s^2$$

ب) بين  $10s$  و  $15s$  من الرحلة

$$a = \frac{20 - 30}{15 - 10} = -2m/s^2$$

ج ) بين  $15s$  و  $20s$  من الرحلة

$$a = \frac{20 - 20}{20 - 15} = 0 m/s^2$$

تذكر عزيزي الطالب :

أن ميل الخط المستقيم لمنحنى السرعة المتجهة و الزمن يمثل التسارع


أن المساحة تحت المنحنى تمثل الإزاحة

2 : إزاحة الجسم في أول  $5s$  من الرحلة : الحل / مساحة المثلث المضلل تمثل الإزاحة .

$$\Delta x = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع} = \frac{1}{2} \times 5 \times 30 = 75m$$

## اختبر فهمك 2 :

- 1 ( هل السرعة المتجهة و التسارع دائما بنفس الاتجاه ؟ و وضح إجابتك ؟  
الجواب : لا ، لأنه قد يكون الجسم يتباطأ فتكون السرعة المتجهة و التسارع متعاكسان في الاتجاه
- 2 ( هل من الممكن أن يكون تسارع الجسم يساوي صفراً و سرعته المتجهة لا تساوي صفراً ؟ وضح إجابتك ؟  
نعم ، الجسم يسير بسرعة ثابتة ( مثل  $v=5\text{m/s}$  ) لا تتغير سرعته لذلك تسارعه يساوي صفراً .
- 4 ( استخدم الرسم البياني المجاور الذي يمثل سرعة جسيم بالنسبة للزمن للإجابة عن الأسئلة التي تليه :



- a ( احسب التسارع في الفترة الزمنية من 3s إلى 5s  
b ( السرعة المتوسطة خلال الفترة الزمنية من 6s إلى 8s  
c ( المسافة المقطوعة خلال أول 3s من الرحلة  
d ( في أي مراحل الحركة كان للجسم أكبر تسارع  
e ( خلال الفترة الزمنية من 8s إلى 10s ماذا حصل لسرعة الجسم  
f ( ما هي أعلى سرعة وصل إليها الجسم أثناء حركته  
الجواب :

- a: التسارع  $= 7.5\text{m/s}^2$  ، نحسب ميل الخط المستقيم بين C→D  
b: السرعة المتوسطة  $= 17.5\text{m/s}$  ، نحسب المسافة الكلية و نقسمها على الزمن الكلي  
c: المسافة المقطوعة  $= 25\text{m}$  ، نحسب المساحة تحت المنحنى ( مساحة المثلث ) في أول 5s  
d: A→B : لأنه كان لديه أكبر تغير في السرعة  
e: تناقصت سرعة الجسم حتى توقف .  
f: أعلى سرعة  $= 25\text{m/s}$  ، من خلال النظر إلى الشكل و معرفه أكبر سرعة

## السقوط الحر ( Free Fall )

- متى نسمي الحركة سقوطا حرا ؟ إذا كان الجسم يتحرك بتأثير قوة الجاذبية فقط ، وقريبا من سطح الأرض

( جسم سقط من السكون - قذف جسم إلى الأعلى - قذف جسم إلى الأسفل )

جميعها حالات للسقوط الحر ، تسارع الجاذبية الأرضية  $g = -9.8 \text{ m/s}^2$

المقدار  $= 9.8 \text{ m/s}^2$  والاتجاه دوما للأسفل نحو مركز الأرض ( إشارة السالب )

- تصل الأجسام الثقيلة والخفيفة في نفس الوقت إذا سقطت في الفراغ

### اختبر فهمك 3 :

- 1- ماذا يحصل لسرعة في مرحلة الصعود ..... تقل ..... مرحلة الهبوط ..... تزداد .....
- 2- ما قيمة التسارع في أ- الصعود ... 9.8 ... ب- الهبوط .. 9.8 ... ج- أقصى ارتفاع ... 9.8 ...
- 3- هل يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية أثناء حركته في السقوط الحر ؟ لا ، لأنه يتسارع فتزداد سرعته مع مرور الزمن لذلك تزداد المسافة المقطوعة مع مرور الزمن
- 4 - إذا كان تسارع الجاذبية على سطح المريخ يساوي  $\frac{1}{3}$  تسارع الجاذبية على سطح الأرض فإذا قذفت كرة إلى أعلى من على سطح كل من المريخ و الأرض بالسرعة نفسها ، قارن بين أقصى ارتفاع وزمن التحليق لكرة على سطح الأرض والمريخ ؟

أقصى ارتفاع : تصل الكرة إلى ارتفاع أكبر على سطح المريخ لان جاذبيته أقل

زمن التحليق : زمن تحليق الكرة على سطح المريخ أكبر لان جاذبيته أكبر و ارتفع إلى ارتفاع أكبر

5 - افرض انك قذفت كرة إلى أعلى ، صف التغيرات في كل من سرعة الكرة وتسارعها ؟

السرعة : تقل والكرة صاعدة للأعلى حتى تتوقف لحضيا و تصبح سرعتها صفرا ثم تعود السرعة و تزداد والكرة نازله للأسفل

التسارع : ثابت مقدارا ( 9.8 ) و اتجاها ( للأسفل ) اثناء الصعود و النزول و أقصى ارتفاع

6 - أطلقت رصاصتين بسرعة  $30 \text{ m/s}$  احدهما (A) إلى أعلى والأخرى (B) إلى أسفل جرف فأبي تعبير يصف السرعة النهائية لكلاهما عند ارتطامهما أسفل الجرف

$$v_a = 2 v_b \quad , \quad 2v_a = v_b \quad , \quad v_a > v_b \quad , \quad \underline{v_a = v_b} \quad , \quad v_a < v_b$$

1- اسقط عامل بناء عرضا قطعة قرميد من سطح بناية ، فما سرعة القطعة بعد  $4 \text{ s}$  ؟

$$v = v_0 + at = 0 + (-9.8)(4) = -39.2 \text{ m/s}$$

مقدار السرعة :  $39.2 \text{ m/s}$  ، اتجاه السرعة : للأسفل ( - )



الكيمياء : علم يختص بدراسة المادة وخواصها وتغيراتها

الهدف من دراسة الكيمياء : تفسير الأحداث التي لا ترى بعين المجردة

المادة : كل شيء يشغل حيز من الفراغ وله ثقل




المادة الكيميائية : مادة نقية لها تركيب محدد وثابت

ما هو دور علم الكيمياء في جعل حياتنا أكثر سهولة ؟


صناعة الأسمدة , صناعة المبيدات الحشرية , صناعة المواد الحافظة , صناعة الأدوية , صناعة المواد البلاستيكية

لماذا ندرس الكيمياء ؟





المادة تحيط بنا , ودراستها مهمة حتى نفهمها ونقوم بتحويلها للاستفادة منها ومعرفة ما هو ضار منها فلا نستخدمه وما هو مفيد فنستخدمه .  
علم الكيمياء علم تجريبي: يعتمد على اجراء التجارب العلمية , لذلك يتطلب دائما وجود مختبرات علمية في المدارس والجامعات لتطبيق التجارب وتطوير الأبحاث أيضاً في المصانع



أدوات قياس حجم السوائل : مخبر مدرج , دורך مخروطي , دורך حجمي , سحاحة , ( للغازات سرنج ) .




- \* اكتب الرقم المناسب بجانب كل أداة مما يلي :
- 1- قمع
  - 2- ماصة حجمية
  - 3- نظارة واقية
  - 4- لهب بنزن
  - 5- ملقط حمل
  - 6- تملّاح للجزيئات
  - 7- حامله أنابيب اختبار
  - 8- قاعدة معدنية



من أهم المهارات التي يجب أن يتقنها الكيميائي هو القياس للحصول على نتائج دقيقة وأكثر مصداقية , وتجنباً للأخطاء

وحدات القياس بالنظام العالمي وتحويلاتهما : ( SI ) UNITS أهملها :

Quantity	Unit	Symbol
1- الطول Length	متر meter	m
2- الكتلة Mass	كيلوجرام kilogram	kg
3- الحجم Volume	لتر liter	L
3- الوقت Time	ثانية second	s
4- درجة الحرارة Temperature	كلفن Kelvin	K
5- كمية المادة Amt. substance	مول mole	mol



الكتلة : مقدار ما يحتويه الجسم من مادة  
الحجم : الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ

**الحجم :**  
لتر واحد =  $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ ml}$   
 $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ liter}$

**الكتلة :**  
كيلو جرام واحد =  $1000 \text{ g}$

**درجة الحرارة :**  
من منوي إلى كلفن وبالعكس:  
 $K = ^\circ\text{C} + 273$

مثال: لورق حجمي يحتوي على  $0.25 \text{ L}$  ماء كم مليلتر يساوي هذا المقدار؟

مثال: جسم تبلغ كتلته  $23.45 \text{ Kg}$  كم تبلغ بوحدته الجرام؟

مثال: كم تبلغ درجة حرارة جسمك بالكلفن؟

.....  
.....  
.....  
.....

الكثافة ( density ) = mass / volume .....  $d = m/v$

وحدة قياس الكثافة unit of density = mass unit / volume unit

مثال example  $\text{g/ml}$  , or  $\text{Kg/L}$

علاقة الكثافة مع الكثافة طرئية عند ثبوت الحجم

علاقة الحجم مع الكثافة عكسية عند ثبوت الكتلة

مثال: ما هو حجم عينة من الزئبق السائل والتي كتلتها  $76.2 \text{ g}$  وكثافتها  $13.6 \text{ g/ml}$

مثال: احسب كثافة قطعة من معدن الألمونيوم كتلتها  $8.4 \text{ g}$  وحجمها  $3.1 \text{ cm}^3$

.....  
.....  
.....

### Density قياس الكثافة

تدريب:

الترميز العلمي ( أمثلة ):

اكتب الترميز العلمي للأرقام التالية

a. 7056130. = .....

b. 0.0000432 = .....

c. 10613400 = .....

اكتب الأرقام التالية بالطريقة العادية

a.  $0.56 \times 10^{-3}$  = .....

b.  $18.20 \times 10^3$  = .....

اكتب الترميز العلمي للأرقام التالية

a. 65310. =  $6.5310 \times 10^4$

b. 0.000630 =  $6.30 \times 10^{-4}$


c. 85600 =  $8.560 \times 10^4$

اكتب الأرقام التالية بالطريقة العادية

a.  $5.06 \times 10^{-3}$  = 0.00506



b.  $8.24 \times 10^3$  = 8240

### حالات المادة




الحالة	الغازية gas (g)	السائلة liquid (l)	الصلبة (Solid) (s)
الشكل	غير محدد	شكل الوعاء الموجود فيه	ثابت
الحجم	غير محدد	ثابت	ثابت
الإنضغاط	قابل	غير قابل	غير قابل
الكثافة	قليلة	متوسطة	كبيرة
تماسك الجزيئات	ضعيف	متوسط	قوي
حركة الجزيئات	سريعة	متوسطة	قليلة جدا
نوع الحركة	عشوائية	انزلاقية	اهتزازية

### تحويلات المادة




من A إلى D  
ماص للحرارة



من A إلى D طارد  
للحرارة

- عرف:
- ..... الانصهار
  - ..... التجمد:
  - ..... التبخير:
  - ..... التكثف:
  - ..... التسامي:
  - ..... الترسيب:



**طرق فصل المخاليط**

**الترشيح**

لفصل مادتين غير ذائبتين  
( صلب + سائل )  
مثل رمل وماء

**قمع الفصل**

لفصل مادتين سائلتين غير  
ذائبتين عن بعضهما  
مثل الزيت والماء

**الترسيب**


لفصل مادة قابلة للتسامي  
عن مادة أخرى لا تتسامي  
تتضمن تبخير + تكثيف

كيف يمكنك فصل سكر عن رمل ؟

.....


.....

### التقطير البسيط



لفصل مادتين ذائبتين  
مثل ماء عن سكر أو أي  
شوائب

### التقطير التجزيئي



لفصل مادتين سائلتين ممتزجتين  
مختلفتين بدرجة الغليان  
مثل كحول و ماء

- 1- ميزان حرارة
- 2- مكثف
- 3- خليط غير نقي
- 4- دورق تجميع  
السائل النقي
- 5- مصدر ماء
- 6- دورق تسخين
- 7- لهب بنزن
- 8- قاعدة وحامل
- 9- عمود تكثيف

السائل النقي : درجة غليانه محددة وثابتة , وجود شوائب فيه يزيد درجة الغليان  
للمادة الصلبة النقية : درجة انصهارها ثابتة , وجود شوائب فيها يقلل درجة الانصهار

### خواص المادة :

1- فيزيائية: يمكن قياسها او ملاحظتها دون  
تغيير التركيب

كمية : تعتمد على كمية المادة مثل الكتلة , الحجم  
نوعية : لا تعتمد على كمية المادة مثل الرائحة ,  
اللون, الكثافة.....

2- كيميائية: تبين قدرة المادة على التحول الى  
مادة جديدة مختلفة

### تغيرات المادة :

1- فيزيائية: تغيير في الشكل الخارجي للمادة دون  
تغيير التركيب

تتضمن : تغيرات حالات المادة , الكسر ,  
التمزيق , التقطيت.....

2- كيميائية: تغيير في المادة بحيث ينتج مادة  
جديدة مختلفة (تفاعل كيميائي)

ويرافقها : تغيرات حرارية , تغيير اللون ,  
تكون غازات او مواد صلبة , تغيير طعم ,  
انبعاث رائحة .....

### صنف التغيرات التالية الى فيزيائية او كيميائية؟

انصهار الشمع , حرق الورق , انكسار الزجاج , تمزيق الورق , تبخر الماء , تسامي اليود , تقطيت الرمل , فساد الطعام  
.....

تفاعل الخارصين مع حمض الكلور , طهو الطعام , حرق الشمع , ترسيب الاملاح  
.....

## الذرة : والبنية الذرية

الذرة : أصغر جزء من العنصر تتحلل التفاعل الكيميائي دون أن تنقسم

العنصر: يحتوي على نفس النوع من الذرات

### مكونات الذرة ( تركيبها )

1- النواة : وهي مركز الذرة , شحنتها موجبة  
تتركز فيها كتلة الذرة

تحتوي على:

1- بروتونات موجبة ( P )

2- نيوترونات متعادلة ( n )

2- مستويات الطاقة: وتحيط بالنواة

تحتوي على:

\* الإلكترونات السالبة ( e )




Table 1-1 Fundamental Particles of Matter

Particle (symbol)	Approximate Mass (amu)*	Charge (relative scale)
electron ( $e^-$ )	0.0	1 -
proton ( $p$ or $p^+$ )	1.0	1 +
neutron ( $n$ or $n^0$ )	1.0	none

\* 1 amu =  $1.6605 \times 10^{-24}$  gr.

### نلاحظ من الجدول أعلاه:

\* كتلة البروتون تقريبا تساوي كتلة النيوترون

\* كتلة الإلكترون مهملة وتساوي  $1/1840$  من كتلة البروتون

\* شحنة البروتون والإلكترون متساويتان بالمقدار ومتعاكستان بالإشارة

\* في أي ذرة منفردة عدد البروتونات = عدد الإلكترونات ..... لذلك تكون الذرة متعادلة كهربائياً

## العدد الذري والعدد الكتلي

لكل عنصر رمز خاص به يعبر عنه ويتكون من:

الحرف الأول من اسمه الإنجليزي أو اللاتيني.


- K رمز البوتاسيوم ( KALIUM ) و S رمز الكبريت SULFUR

- الحرف الأول والثاني من اسمه الإنجليزي أو اللاتيني

رمز الصوديوم Na من Natrium , و Ne رمز النيون Neun

- الحرف الأول والثالث من اسمه الإنجليزي أو اللاتيني

دائما الحرف الأول كبير والثاني صغير , أمثلة:



العدد الذري = عدد البروتونات في الذرة

العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات

عدد النيوترونات = العدد الكتلي - عدد البروتونات

املأ الفراغات في الجدول التالي:

الرمز	العنصر	الرمز	العنصر	الرمز	العنصر
Cl	كلور	Ba	باريوم	Li	ليثيوم
I	يود	B	بورون	Ag	فضة
He	هيليوم	Br	بروم	Fe	حديد
Ar	أرجون	N	نيتروجين	Au	ذهب
Kr	كربتون	Ne	نيون	Mg	مغنيسيوم
Xe	زينون	S	كبريت	Mn	منغنيز
Sn	قصدير	Si	سيلكون	Cu	نحاس
U	يورانيوم	C	كربون	Zn	خارصين
Al	ألومنيوم	O	أكسجين	Ni	نيكل
Ti	تيتانيوم	P	فسفور	Pb	رصاص
V	فاناديوم	F	فلور	Cr	كروم

العنصر	الرمز	P	e	n	العدد الكتلي
الصوديوم	Na	11			23
الكالسيوم	Ca	20			20
البوتاسيوم	K		19		20
الهيدروجين	H	1			1

**النظائر (Isotopes) :** ذرات نفس العنصر تتشابه بالعدد الذري وتختلف بالعدد الكتلي بسبب اختلاف عدد النيوترونات

1H  
هيدروجين

2H  
ديوتيريوم

3H  
تريتيوم

**Key**

+ = proton

● = neutron

⊖ = electron

نظائر الهيدروجين

\* نحسب عدد البروتونات والإلكترونات والنيوترونات ونلاحظ:  
 • لكل نظير يوجد نسبة مئوية محددة في الطبيعة.  
 • لا نغير عن كتلة العنصر بالعدد الكتلي , بل بمعدل الكتلة الذرية لجميع نظائر العنصر.

النظير	H-1	H-2	H-3
P	1	1	1
e	1	1	1
n	0	1	2
النسبة %	99.98%	0.02%	.....

معدل الكتلة الذرية = ( كتلة النظير الأول × نسبة وجوده ) + ( كتلة النظير الثاني × نسبة وجوده ) + .....

النظير	Cl-35	Cl-37
P	17	17
e		
n		
النسبة %	75%	25%

اعتمادا على الجدول المجاور والذي يضم نظائر الكلور :

- 1- املا الفراغات في الجدول
- 2- لحسب معدل الكتلة الذرية للكلور

.....

.....

تدريب: اكتب التوزيع الإلكتروني للعناصر التالية:

العدد الذري	رمز العنصر	المدار n=1	المدار n=2	المدار n=3	المدار n=4
6	C	2	4		
20	Ca	2	8	8	2
17	Cl	2	8	7	
15	P	2	8	5	
8	O	2	6		


المربعات العمودية تسمى مجموعات  
 المربعات الأفقية تسمى دورات  
 رتب العنصر حسب زيادة الحد الذري  
 من اليسار الى اليمين

**الجدول الدوري**

رقم المجموعة = مجموع الكترونات التكافؤ  
 رقم الدورة = عدد المستويات حول النواة

كيف ترتب الجسيمات ( p , e , n ) في الذرة؟

\* البروتونات والنيوترونات داخل النواة  
 \* الإلكترونات تتحرك في الفراغ المحيط بالنواة كما تتحرك الكواكب حول الشمس  
 \* وتكون حركتها في مسارات محددة الطاقة تسمى مستويات الطاقة رمزها ( n ) .  
 المسعة القصوى للمستوى =  $2n^2$




توزع الإلكترونات في  
 ذرة الكبريت  
 16 عددها الذري = 16

المستوى	المسعة $2n^2$	e عدد
n=1	$2(1)^2$	2
n=2	$2(2)^2$	8
n=3	$2(3)^2$	18
n=4	$2(4)^2$	32

المستوى قبل الأخير دائما ممتلئ  
 إلكترونات المستوى الأخير تسمى إلكترونات التكافؤ

**الجدول الدوري الحديث**

اليسار : فلزات  
اليمن : لافلزات




الدورة : .....  
المجموعة : .....

من التوزيعات المجاورة  
حدد موقع العنصر في  
الجدول الدوري




- 1 I
- 2 II
- 3 III
- 4 IV
- 5 V
- 6 VI
- 7 VII
- 8 VIII


**العنصر في المجموعات من (I - VIII)**





**عناصر مجموعة II**




**عناصر مجموعة III**



**عناصر مجموعة V**



**عناصر مجموعة IV**



عناصر مجموعة VI




عناصر مجموعة VII



## الجدول الدوري وخواص العناصر

تحديد نوع العنصر من التوزيع الإلكتروني



### ملاحظات:

الجدول الدوري يحتوي على عناصر بعدة حالات فيزيائية في درجة حرارة الغرفة

- 1- الغازات : مثل :  $F_2$ ,  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $H_2$ ,  $Cl_2$  , وهي لا فلزات
- 2- العناصر السائلة : البروم  $Br_2$  ( لا فلز ) , والزنبرق  $Hg$  ( الفلز الوحيد السائل في حرارة الغرفة).
- 3- العناصر الصلبة : بقية عناصر الجدول الدوري (معظمها فلزات).  
( لا فلزات صلبة مثل  $I_2$ ,  $P_4$ ,  $S_8$ ,  $C$  . بعضها شبه فلز مثل  $Si$  .

### خواص الفلزات واللافلزات الفيزيائية


الفلزات	اللافلزات	الغازات الخاملة
1- صلبة في حرارة الغرفة ما عدا الزنبرق	1- منها غاز , سائل , صلب	1- لها عموماً صفات تتوسط بين الفلزات واللافلزات
2- درجات انصهارها مرتفعة	2- درجات انصهاره وغليانها منخفضة	2- لها بريق ولمعان
3- لها بريق ولمعان	3- ليس لها بريق	3- موصلة للحرارة والكهرباء
3- موصلة للحرارة والكهرباء	3- غير موصلة للحرارة والكهرباء	4- قابلة للطرق والسحب
4- قابلة للطرق والسحب	4- الصلب منها حش سهل الكسر	

الغازات الخاملة وهي:  $Ne, He, Ar, Kr, Xe$  لها عدة استخدامات خصوصاً في صناعة المصابيح وهي خاملة كيميائياً لأن مستواها الأخير ممتلئ ( يحتوي ثمان إلكترونات عدا الهيليوم ) وهذه حالة الاستقرار لدى العناصر

**قاعدة الثمانية:** أن تحتوي ذرة العنصر ثمان إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير , مثل الغاز الخامل , عن طريق فقد إلكترونات ( الفلزات) أو كسب إلكترونات ( اللافلزات)

بين نوع وعدد الذرات الموجودة في الصيغ التالية

**نوع وعدد الذرات**



**مقارنة بين المركب والمخلوط**

المخلوط	المركب
طرق فيزيائية لفصل مكوناته	طرق كيميائية لفصل عناصره
مكوناته بأي نسبة	عناصره تتحد بنسب ثابتة
الخواص لا تتغير بين مكوناته	خواصه تختلف عن خواص عناصره
لا يحدث تفاعل كيميائي	يحدث تفاعل كيميائي عند تكونه


أي المواد التالية مخاليط, مركبات, عناصر?  
الهواء, ماء البحر, السبائك, سلك نحاس, الماء النقي

كيف تتمكن الذرات (العناصر) من تحقيق الاستقرار؟

عن طريق تكوين المركبات او الجزيئات

المركب: مادة نقية تتكون من اتحاد عنصرين مختلفين أو أكثر  
الجزيئ: أصغر جزء من العنصر يحتوي على ذرتين أو أكثر  
جميع الذرات في المركب تحقق الاستقرار غالبا (قاعدة الثمانية)

لكل مركب او جزيئ صيغة كيميائية مثل:



اهمية الصيغة الكيميائية:

معرفة أنواع الذرات, وعددها الفعلي في المركب  
يكون العدد على يمين رمز العنصر في الصيغة دال على عدد ذرات العنصر

مثال: في الجزيء الواحد من سكر الجلوكوز يوجد

6 ذرات كربون, 12 ذرة هيدروجين, 6 ذرات اكسجين



**الأيونات**

سالبة (anions)

موجبة (Cations)

بسيطة: وهي ذرة فلز كسبت إلكترون  
أو أكثر حتى تستقر, مثل:

معدنة (الجذور)

بسيطة: وهي ذرة فلز فقدت إلكترون  
أو أكثر حتى تستقر, مثل:

معدنة (الجذور)

الذرة	الرمز	الصيغة	الشحنة
4	C	كربون	
	Si	سليكون	
1	H	هيدروجين	
2	F	فلور	-1
	Cl	كلور	-1
	Br	بروم	-1
	I	يود	-1
2	O	أكسجين	-2
	S	كبريت	-2
2, 3	N	نيتروجين	-3

الصيغة	الشحنة
$F^-$	-1
$Cl^-$	-1
$Br^-$	-1
$I^-$	-1
$OH^-$	-1
$CH_3COO^-$	-1
$NO_3^-$	-1
$O^{2-}$	-2
$S^{2-}$	-2
$SO_4^{2-}$	-2
$SO_3^{2-}$	-2
$CO_3^{2-}$	-2
$PO_4^{3-}$	-3

الذرة	الرمز	الصيغة	الشحنة
3	Li	ليثيوم	+1
11	Na	صوديوم	+1
19	K	بوتاسيوم	+1
47	Ag	فضة	+1
20	Ca	كلسيوم	+2
12	Mg	مغنسيوم	+2
56	Ba	باريوم	+2
30	Zn	زنك	+2
29	Cu	نحاس	+1
29	Cu	نحاس	+2
26	Fe	حديد	+2
26	Fe	حديد	+3
13	Al	ألومنيوم	+3

الذرة	الرمز	الصيغة	الشحنة
17	Cl	كلور	+1
11	Na	صوديوم	+1
19	K	بوتاسيوم	+1
31	P	فسفور	+3
33	As	أرسين	+3
35	Br	بروم	+1
53	I	يود	+1
81	Tl	ثاليوم	+1
83	Bi	بيسموت	+3
85	At	أستاتين	+3
87	Fr	فرانسيوم	+1
89	Ac	أكتينيوم	+3

فثقول: كلوريد, بروميد, .....

أمونيوم	هيدروكسيد	كبريتات	كبريتات	كبريتات	نترات	نترات
---------	-----------	---------	---------	---------	-------	-------


أكتب رموز الأيونات

خطوات كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات الأيونية


- 1- كتابة الأيون المرغوب على اليسار والأيون السالب على اليمين
- 2- تكون التكافؤات بأبسط نسبة ( قد يلزم الاختصار )
- 3- مبادلة التكافؤات ( أو الشحنتان بدون إشارات )

اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات التالية

مثال: اكتب صيغة



مثال: اكتب صيغة



اسم المركب	هيدروكسيد الكالسيوم	اسم المركب	كبريتات الحديد ( III )
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	
اسم المركب	كبريتات الصوديوم	اسم المركب	سليكات الصوديوم
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	
اسم المركب	كبريتيد الحديد ( II )	اسم المركب	هيدروكسيد الخارصين
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	
اسم المركب	بيكربونات الماغنيسيوم	اسم المركب	بروميدي البوتاسيوم
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	
اسم المركب	كربونات الألمنيوم	اسم المركب	فلوريد النحاس ( II )
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	

اسم المركب	هيدروكسيد الكالسيوم	اسم المركب	كبريتات الحديد ( III )
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	
اسم المركب	كبريتات الصوديوم	اسم المركب	سليكات الصوديوم
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	
اسم المركب	كبريتيد الحديد ( II )	اسم المركب	هيدروكسيد الخارصين
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	
اسم المركب	بيكربونات الماغنيسيوم	اسم المركب	بروميدي البوتاسيوم
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	
اسم المركب	كربونات الألمنيوم	اسم المركب	فلوريد النحاس ( II )
الصيغة الجزيئية		الصيغة الجزيئية	

**الجزيئات والرابطة التساهمية** ← لا فلز + لا فلز

الرابطة التساهمية تنشأ بين الذرات التي لا تميل لفقد إلكترونات  
\*تقوم الذرات بالمشاركة بالإلكترونات (تداخل) حتى تحقق الاستقرار  
أنواع الروابط التساهمية:

- تساهمية أحادية: تحتاج إلى زوج إلكترونات بحيث تساهم كل ذرة بإلكترون واحد
- تساهمية ثنائية: تحتاج إلى زوجين من الإلكترونات بحيث تساهم كل ذرة بإلكترونين
- تساهمية ثلاثية: تحتاج إلى ثلاث أزواج من الإلكترونات بحيث تساهم كل ذرة بثلاث إلكترونات


أهم أنواع الذرات التي تكون روابط تساهمية  
C, H, I, P, S, Br, Cl, N, O, F, Si

العنصر	Si/C	N/P	O/S	H	الهالوجين
عدد الروابط	4	3	2	1	1


عدد الروابط التساهمية التي تكونها ذرة العنصر يساوي عدد الإلكترونات التي تشارك بها ذرة اللافلز

**كيف تتكون المركبات الأيونية؟ (الرابطة الأيونية)**

**كيف يتكون كلوريد الصوديوم NaCl**



**كيف يتكون فلوريد المغنسيوم MgF<sub>2</sub>**




عدد الروابط الأيونية التي تكونها ذرة العنصر يساوي عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكسبها ذرة العنصر

**عدد رسم الجزيئات تتبع الخطوات التالية:**

- 1- تكتب التوزيع الإلكتروني.
- 2- ترسم إلكترونات التكافؤ ومستوى الطاقة الأخير
- 3- تحدد نوع العنصر (فلز أو لا فلز)
- 4- تحدد عدد الروابط التي يكونها العنصر
- 5- تجري التداخل بحيث تحقق قاعدة الثمانية
- 6- تكون الذرة المركزية هي التي تكون أكبر عدد روابط وتكتب الصيغة


ارسم الجزيئات التالية:



ما الفرق بين الإلكترونات الرابطة وغير الرابطة؟


املأ الفراغات في الجدول التالي:

الصيغة	نوع رابطة	زوج غير رابطة (جذب)
H <sub>2</sub>		
Cl <sub>2</sub>		
O <sub>2</sub>		
H <sub>2</sub> O		
CO <sub>2</sub>		



### مقارنة بين المركبات الأيونية والجزئيات التساهمية

المركب الأيوني	المركب التساهمي
صلب في حرارة الغرفة	صلاب أو سائل أو غاز في حرارة الغرفة
درجات غليانها وانصهارها مرتفعة	درجات غليانها وانصهارها منخفضة
معظمها يذوب ويتفكك في الماء إلى أيونات	معظمها لا يذوب في الماء
في الحالة الصلبة غير موصلة للتيار الكهربائي ومصاهيرها ومحاليلها المائية موصلة	غير موصلة للتيار الكهربائي




الجزئيات التي أيونها الموجب  $H^+$  تسمى أحماض مثل:

الصيغة	اسم الحامض
HCl	حامض الكلور
HBr	حامض البروم
$H_2SO_4$	حامض الكبريتيك
$HNO_3$	حامض النيتريك
$CH_3COOH$	حامض الخل

قوة تجاذب بين أيونات الفلزات الموجبة وبحر الإلكترونات المحيط بها

### الرابطة الفلزية



### حساب النسبة المئوية للعنصر في المركب

$$\% \text{العنصر} = \frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{كتلة المركب}} \times 100$$

في جزيء السكر

$$\% C = \frac{72}{180} \times 100 = 40\%$$

$$\% H = \frac{12}{180} \times 100 = 6.7\%$$

$$\% O = \frac{96}{180} \times 100 = 53.3\%$$

100%

نلاحظ ان المجموع الجبري لجميع النسب يساوي 100%

وهذا ما يسمى التركيب النسبي للعناصر في المركب

س: ما هو التركيب النسبي للعناصر في  $NaNO_3$

### حساب الكتلة الجزيئية للمركبات

الكتلة الجزيئية = مجموع الكتل الذرية لجميع الذرات في الجزيء الواحد (معدل الكتلة الذرية)

تدريب : اذا علمت ان الكتل الذرية للعناصر التالية هي :

$$C=12, O=16, H=1, N=14, Na=23, S=32, K=39, Ca=40$$

احسب الكتلة الجزيئية للمركبات التالية ثم املأ الفراغات كما هو مطلوب في الجدول

الصيغة	الكتلة الجزيئية
$C_6H_{12}O_6$	$6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180$
كتل العناصر في المركب	$C = 72, H = 12, O = 96$
$Na_2SO_4$	$2 \times 23 + 1 \times 32 + 4 \times 16 = 142$
كتل العناصر في المركب	$Na = 46, S = 32, O = 64$
$CaCO_3$	
$NaNO_3$	

س3: أي المركبين يحتوي نيتروجين بنسبة أكبر  
(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> , NaNO<sub>3</sub>

س2: احسب نسبة الكبريت في المركب  
Ca(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>

تدريبات:  
س1: احسب التركيب النسبي للمركب  
Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

### حساب كتلة عنصر في عينة من مركب

كتلة العنصر = نسبة العنصر × كتلة العينة

س1: ما هي كتلة الصوديوم الموجودة في 10 gram من كربونات الصوديوم  
Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

$$M(\text{Na}) = \frac{(2 \times 23)}{(2 \times 23 + 12 + 3 \times 16)} \times 10 = 4.34 \text{ g}$$

↓  
كتلة العينة

↓  
نسبة الصوديوم

س: تفاعل 8.0 g من الأكسجين مع كمية من  
المغنيسيوم لينتج 20.0 g من أكسيد المغنيسيوم.  
ما هي نسبة المغنيسيوم الكتلية في العينة ؟

### التفاعلات الكيميائية

اعادة ترتيب الذرات بحيث ينتج مواد جديدة تختلف عن المتفاعلات

المعادلة الكيميائية: وصف مختصر للتفاعل الكيميائي

نواتج → متفاعلات

لكتابة معادلة كيميائية يلزم ما يلي :

1- كتابة الصيغ الكيميائية بصورة صحيحة

2- تكتب الحالة الفيزيائية لكل مادة

( صلب , سائل , غاز , محلول )

( s ) , ( l ) , ( g ) , ( aq ) على التوالي.


3- نوزن المعادلة بحيث نحقق قانون حفظ الكتلة

كتلة المواد المتفاعلة = كتلة المواد الناتجة

عن طريق ضرب الصيغ بأعداد محددة

مثال:

أكسيد المغنيسيوم → أكسجين + مغنيسيوم



عبر عن المعادلات الفظية التالية بمعادلات رمزية موزونة



أكسيد النحاس الثنائي → أكسجين + نحاس

كلوريد الكالسيوم → غاز الكلور + كالسيوم


H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub> + كلوريد الكالسيوم → حمض الكلور + كربونات الكالسيوم

H<sub>2</sub>O + كبريتات البوتاسيوم → حمض الكبريتيك + هيدروكسيد البوتاسيوم

أنواع التفاعلات الكيميائية




في تفاعلات الإحلال الأحادي يحل الفلز الأثقل محل الفلز الأقل نشاطاً في مركباته حسب السلسلة التالية



تتناقص النشاطية الكيميائية




في تفاعلات الإحلال الأحادي يحل اللافلز الأثقل محل اللافلز الأقل نشاطاً في مركباته حسب السلسلة التالية








تتناقص النشاطية الكيميائية

اسم التفاعل	صيغته العامة
التكوين ( اتحاد )	$A + B \rightarrow AB$
التحلل	$AB \rightarrow A + B$
إحلال احادي	$A + BC \rightarrow AC + B$
إحلال مزدوج	$AB + CD \rightarrow AD + CB$
احتراق (أكسدة)	التفاعل مع الأوكسجين


صنف التفاعلات التالية حسب نوعها: ثم اوزنها



بين أي التفاعلات التالية تحدث وأيها لا يحدث ثم حاول إكمال التي تحدث  
قم بوزن التفاعلات التي تحدث



بين بالأرقام كيف ان المعادلة الأولى بعد وزنها تحقق قانون حفظ الكتلة



نلاحظ ان كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة