

الإشعة في الفراغ

نوطه خاصة بأفكار الأشعة





أ.د. برانت صبري مطيط





ونور أشقر










طلاب الثالث الثانوي العلمي












قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ أَمْرٌ مَّا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَّخِذُهَا ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "




-- ملخص للأفكار المهمة --

الأشعة		
$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$	$\vec{AB} = ((x_B - x_A), (y_B - y_A), (z_B - z_A))$	تكتب مركبات الشعاع AB مساقط أفقية / عمودية
$\vec{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}$		شعاعياً
$\ \vec{u}\ = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$	$\vec{u}(x_1, y_1, z_1)$ $\vec{v}(x_2, y_2, z_2)$	نظيم الشعاع (طول الشعاع)
لهما نفس المنحى ونفس الطول $\ \vec{u}\ = \ \vec{v}\ $ ونفس الجهة (تتساوى مركباتهم المتقابلة)		شعاعين متساويين
نفس المنحى ونفس الطول $\ \vec{u}\ = \ \vec{v}\ $ وجهتان متعاكستان		شعاعين متعاكسين
	$\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$ قطر $ABCD$	جمع الأشعة (1) قاعدة متوازي الأضلاع
(نهاية الأول هي بداية الثاني)		(2) قاعدة شال
جمع الأشعة تبديلي وتجميعي	عند تغير الترتيب تتغير الإشارة $\vec{AB} = -\vec{BA}$	ملاحظات
إذا لم يكن الشعاعين متعاكبين ولم يكن لهما نفس البداية، نستبدل أحدهما بشعاع آخر مساوٍ له حتى تتمكن من تطبيق شال أو متوازي الأضلاع. وإذا لم يكن ذلك ممكناً اختر معلماً كيفياً وحل المسألة.		
يتم جمع وطرح الأشعة عبر المساقط ويتم ضرب الشعاع بعدد عن طريق ضرب العدد بالمساقط		
انتبه إلى ترتيب رؤوس الأضلاع $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -\vec{AB} \cdot \vec{CA}$	إذا لم تكن النقاط الأربعة A, B, C, D على استقامة واحدة وكان $(ABCD) \Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{CD}$ متوازي الأضلاع	
المعلم في الفراغ (تعيين إحداثيات من شكل بوجود معلم)		
الأشعة $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ متعامدة متنى	$(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$	المعلم متجانس
$\ \vec{u}\ = \ \vec{v}\ = \ \vec{w}\ = 1$	نقطة وثلاثة أشعة غير مرتبطة خطياً	
	في المعلم المتجانس يكون $(A, \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD})$ $A(0,0,0), B(1,0,0), C(0,1,0), D(0,0,1)$	مثال: اختيار معلم
حساب مسافة		
$ \vec{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$	بين نقطتين A و B (معلم متجانس)	
$\frac{ ax_0 + by_0 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$	$d: ax + by + c = 0$ و $A(x_0, y_0)$	بين نقطة ومستقيم
$\frac{ ax_0 + by_0 + cz_0 + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$	$P: ax + by + cz + d = 0$ و $A(x_0, y_0, z_0)$	بين نقطة ومستوي
$\left(\frac{x_B + x_A}{2}, \frac{y_B + y_A}{2}, \frac{z_B + z_A}{2}\right)$	احداثيات منتصف قطعة مستقيمة $[AB]$	

مساحات وحجوم شهييرة			
	مساحة المستطيل = الطول × العرض		مساحة المثلث = $\frac{\text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{2}$
	مساحة المثلث متساوي الأضلاع (طول ضلعه a) $S = \frac{\sqrt{3} a^2}{4}$		مساحة المثلث القائم = $\frac{\text{جدا طول الضلعين القائمين}}{2}$
	مساحة شبه المنحرف = الارتفاع × $\frac{(\text{القاعدة الكبرى} + \text{القاعدة الصغرى})}{2}$		مساحة المربع = $(\text{طول الضلع})^2$
	حجم الهرم ورباعي الوجوه = $\frac{\text{الارتفاع} \times \text{مساحة القاعدة}}{3}$ $V = \frac{1}{3} \cdot \delta \cdot h$		مساحة الدائرة $S = \pi R^2$
تذكرة: لإثبات أن الشكل الرباعي متوازي أضلاع: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ أو $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ إما أن نثبت أن أقطاره متناصفة			مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع

أشكال فراغية			
	متوازي المستطيلات: هو مجسم أوجهه مستطيلات وكل وجهين متقابلين فيه طبقين وأحرفه (متوازية إذا كانت متقابلة ومتعامدة إذا التقت برأس مشترك).		متوازي السطوح: مجسم ثلاثي الأبعاد له ستة أوجه كل وجه من أوجهه متوازي أضلاع (كل وجهين فيه متقابلين متوازيين وطبوقين)، (الزوايا ليست بالضرورة قائمة).
	رباعي الوجوه: مكون من أربع أوجه مثلثة.		المكعب: هو مجسم ثلاثي الأبعاد له ستة أوجه مربعة واثنا عشر حرفاً (حافة) وثمانية رؤوس، جميع أحرفه (حوافه) متساوية الطول (متوازية إذا كانت متقابلة ومتعامدة إذا التقت برأس مشترك).

معادلة كرة	
$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$	مركزها $A(x_0, y_0, z_0)$ ونصف قطرها R
	<ol style="list-style-type: none"> المركز ونصف القطر معلومين نعوض مباشرة. المركز معلوم ونمر بنقطة (نحسب R المسافة بين المركز والنقطة). المركز معلوم وتمس مستويًا في نقطة (R المسافة بين المركز والمستوي) طرفا قطرها معلومين (نحسب R بحساب المسافة وتقسيمها على 2، والمركز من احداثيات منتصف قطعة مستقيمة)
معادلة أسطوانة	
	<p>محورها (o, \vec{i}) نصف قطرها r مركزي قاعدتها $(a, 0, 0), (b, 0, 0)$ $y^2 + z^2 = r^2, \quad a \leq x \leq b$</p> <p>محورها (o, \vec{j}) نصف قطرها r مركزي قاعدتها $(0, a, 0), (0, b, 0)$ $x^2 + z^2 = r^2, \quad a \leq y \leq b$</p> <p>محورها (o, \vec{k}) نصف قطرها r مركزي قاعدتها $(0, 0, a), (0, 0, b)$ $x^2 + y^2 = r^2, \quad a \leq z \leq b$</p>
معادلة مخروط	
	<p>رأسه O ومحوره (o, \vec{i}) ومركز قاعدته $(h, 0, 0)$ ونصف قطر القاعدة r $y^2 + z^2 - \frac{r^2}{h^2}x^2 = 0, \quad 0 \leq x \leq h$</p> <p>رأسه O ومحوره (o, \vec{j}) ومركز قاعدته $(0, h, 0)$ ونصف قطر القاعدة r $x^2 + z^2 - \frac{r^2}{h^2}y^2 = 0, \quad 0 \leq y \leq h$</p> <p>رأسه O ومحوره (o, \vec{k}) ومركز قاعدته $(0, 0, h)$ ونصف قطر القاعدة r $x^2 + y^2 - \frac{r^2}{h^2}z^2 = 0, \quad 0 \leq z \leq h$</p>
الجداء السلمي في المستوي	
1 $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$	للشعاعين $\vec{u}(x_1, y_1, z_1), \vec{v}(x_2, y_2, z_2)$
2 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \ \vec{u}\ \cdot \ \vec{v}\ \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$	3 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\ \vec{u} + \vec{v}\ ^2 - \ \vec{u}\ ^2 - \ \vec{v}\ ^2]$
إذا كانت الزاوية بين الشعاعين صفرًا يكون الشعاعان في جهة واحدة، وإن كانت مساوية لـ π فإنهما في جهتين متعاكستين	
$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\ \vec{u}\ \cdot \ \vec{v}\ }{\vec{u} \cdot \vec{v}}$	يمكن حساب الزاوية بين الشعاعين باستخدام
	علاقة الكوشي $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
	مبرهنة المتوسط $b^2 + c^2 = 2m^2 + \frac{a^2}{2}$


	<p>خاصة الإسقاط في الجداء السلمي</p> <p>لا تتغير قيمة الجداء السلمي لشعاعين عند استبدال الشعاع بالمسقط القائم</p> $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AC'}$		
<p>1 $\vec{u} \cdot \vec{u} = \ \vec{u}\ ^2$</p>	<p>2 $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ \Rightarrow الشعاعان متعامدان</p>	<p>3 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$</p>	<p>خواص الجداء السلمي</p>
<p>4 $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$</p>	<p>5 $(a\vec{u}) \cdot (b\vec{v}) = a \cdot b \cdot (\vec{u} \cdot \vec{v})$</p>	<p>6 $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$</p>	
	<p>لإثبات أن نقطة M هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC، نثبت أن:</p> $\vec{AM} \cdot \vec{BC} = 0$ $\vec{BM} \cdot \vec{AC} = 0$ $\vec{CM} \cdot \vec{AB} = 0$		
<ul style="list-style-type: none"> • لإثبات أن مستقيم يعامد مستوي يكفي إثبات أنه يعامد مستقيمين متقاطعين فيه. • إذا عماد شعاع مستويًا فإنه يعامد كل شعاع محتوي في هذا المستوي. • كل شعاع يعامد مستويًا يُسمى بالشعاع الناظم \vec{n}. 	<p>إثبات التعامد</p> <p>يكون الشعاعان \vec{u}, \vec{v} متعامدان إذا كان جداؤهما السلمي مساويًا للصفر:</p> $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$		
<p>الارتباط الخطي</p>			
	<p>الارتباط الخطي لشعاعين $\vec{u}(x_1, y_1, z_1), \vec{v}(x_2, y_2, z_2)$</p> <p>يتم إثبات أن \vec{u}, \vec{v} مرتبطين خطياً (متوازيين) بطريقتين (تختار احدها حسب المسألة)</p>		
<p>2 $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} = k$ المركبات متناسبة</p> <p>وتجاهل حالة $\frac{0}{0}$ في حال ظهورها</p>	<p>1 $\vec{u} = k \cdot \vec{v}; k \in \mathbb{R}^*$</p>		
<p>نستفيد من الارتباط الخطي لشعاعين</p>			
<p>2. لإثبات وقوع أو عدم وقوع ثلاثة نقاط A, B, C على استقامة واحدة، إذا كان الشعاعان \vec{AB}, \vec{AC} غير مرتبطين، فإن النقاط ليست على استقامة واحدة، وتشكل المستوي (ABC).</p>	<p>1. لإثبات توازي مستقيمين: إذا كان الشعاعان \vec{AB}, \vec{CD} مرتبطين خطياً فإن المستقيمان (AB), (CD) متوازيان، وبالتالي يشكلان مستويًا.</p>		



قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْفَهُ فِي بطنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَظْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَاقِبَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيحٍ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا"

الارتباط الخطي لثلاثة أشعة	
<p>// نعوض مركبات الأشعة الثلاث في العلاقة السابقة فنحصل على ثلاث معادلات بمجهولين α, β نحصل على قيمهم بحل أول معادلتين ونتحقق من النتيجة في المعادلة الثالثة (إذا كانت محققة فالأشعة مرتبطة خطياً وتقع في مستو واحد، وإن كانت غير محققة فالأشعة غير مرتبطة ولا تقع في مستو واحد) //</p>	<p>ليكن \vec{u}, \vec{v} شعاعين غير مرتبطين خطياً، نقول عن الأشعة $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ أنها مرتبطة خطياً (تقع في مستو واحد) إذا وجدنا عددين حقيقيين $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ بحيث يتحقق:</p> $\vec{w} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$
نستفيد من الارتباط الخطي لثلاثة أشعة	
<p>2. لإثبات توازي مستقيم مع مستو. نقول عن المستقيم d أنه يوازي المستوي \mathcal{P} إذا كان المستقيم d يوازي أي مستقيم محتو في المستوي \mathcal{P}.</p>	<p>1. لإثبات وقوع أو عدم وقوع أربعة نقاط في مستو واحد. تكون النقاط A, B, C, D واقعة في مستو واحد إذا كانت ثلاثة أشعة مثل $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ مرتبطة خطياً، وإذا لم تكن مرتبطة خطياً فهي لا تقع بمستو واحد (ويمكن اعتبارها رؤوس رباعي وجوه أو هرم ثلاثي).</p>
مركز الأبعاد المتناسبة	
$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$ <p>يكون G منتصف AB إذا كان $\alpha = \beta$</p>	<p>مركز الأبعاد المتناسبة G لنقطتين $(A, \alpha), (B, \beta)$ تحقق</p> $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}; \alpha + \beta \neq 0$
<p>مبرهنة: إذا كانت G مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(A, \alpha), (B, \beta)$ وأياً كانت النقطة M عندئذٍ تتحقق العلاقة:</p> $\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} = (\alpha + \beta) \vec{MG}$ <p>تبقى هذه المبرهنة محققة من أجل ثلاثة أو أربعة نقاط.</p>	
مركز الأبعاد المتناسبة لثلاثة نقاط	
$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} = \vec{0}; \alpha + \beta + \gamma \neq 0$	<p>G مركز الأبعاد المتناسبة لـ $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ هي نقطة وحيدة تحقق</p>
<p>الخاصة التجميعية (نستفيد منها في تعيين مركز الأبعاد المتناسبة لثلاثة نقاط):</p> <p>إذا كانت G مركز الأبعاد المتناسبة لـ $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ وكانت H مركز أبعاد متناسبة لـ $(A, \alpha), (B, \beta)$ فإن G مركز الأبعاد المتناسبة لـ $(H, \alpha + \beta), (C, \gamma)$.</p>	
<p>إذا كانت G مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المتقلة:</p> $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ <p>فإن إحداثيات G</p> $x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma}, y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma},$ $z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}$	
<p>G مركز ثقل للمثلث أو للنقاط A, B, C فإن إحداثيات G تكون:</p> $x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3},$ $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$	<p>مركز ثقل المثلث ABC هو مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط A, B, C عندما $\alpha = \beta = \gamma$ وهي نقطة تلاقي متوسطاته</p>
نستفيد من مركز الأبعاد المتناسبة	
<p>لإثبات وقوع ثلاثة نقاط على استقامة واحدة (نثبت وجود مركز أبعاد مشترك بين نقطتين من كل مستقيم)</p>	<p>لإثبات وقوع أربع نقاط في مستو واحد (نثبت أن إحدى هذه النقاط مركز أبعاد متناسبة للنقاط الباقية)</p>

المستقيم	
$ax + by + c = 0$	لتعيين مستقيم في المستوي نحتاج نقطة $A(x_0, y_0)$ وناظم $\vec{u}(-b, a)$ أو شعاع توجيهه $\vec{n}(a, b)$
$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + bt, \quad z = z_0 + ct$	لتعيين مستقيم في الفراغ باستخدام المعادلات الوسيطة له نحتاج نقطة $A(x_0, y_0, z_0)$ وشعاع توجيهه $\vec{u}(a, b, c)$
$\left. \begin{array}{l} t \in \mathbb{R} \text{ مستقيم} \\ t \in [0, \infty) \text{ نصف مستقيم} \\ t \in [0, 1] \text{ قطعة مستقيمة} \end{array} \right\} t$	
الوضع النسبي لمستقيمين حسب شعاعا التوجيه	
إذا كان الشعاعان غير مرتبطين خطياً فالمستقيمان إما متقاطعان (بالحل المشترك نحصل على نقطة التقاطع) ويكونان بمستوي واحد أو متخالفاً (المساواة غير محققة أبداً) ولا يقعان في مستوي واحد.	إذا كان الشعاعان مرتبطين خطياً فالمستقيمان إما متوازيان (المساواة بين احداثياتهما الوسيطة خاطئة) أو طوبوقان (المساواة محققة) وفي الحالتين يقعان في مستوي واحد.
المستوي	
$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$	لتعيين المستوي نحتاج إلى نقطة $A(x_0, y_0, z_0)$ وناظم $\vec{n}(a, b, c)$
1. نقطة معلومة وناظم معلوم.	2. نقطة معلومة ويوازي مستوي (ناظم الأول يساوي الثاني).
3. نقطة معلومة ويعامد مستويين $\vec{n} \cdot \vec{n}_1 = 0, \vec{n} \cdot \vec{n}_2 = 0$	4. نقطتين معلومتين ويعامد مستوي $\vec{n} \cdot \vec{n}_1 = 0$
5. ثلاثة نقاط معلومة (شعاعي توجيهه (حيث يكون الناظم عمودي عليهم)).	
نثبت أن مستويين متقاطعين من خلال إثبات الارتباط الخطي لناظم الأول والثاني \vec{n}_1, \vec{n}_2 ، ونوجد معادلة الفصل المشترك بالحل المشترك وكتابة أحد المجاهيل بدلالة الباقي.	
معادلة المستوي المحوري لقطعة مستقيمة $[AB]$ (وهو مجموعة نقط الفراغ التي تبعد عن طرفي القطعة A, B نفس المسافة)	
1. بفرض $M(x, y, z)$ نقطة من المستوي، فإن $\ \vec{MA}\ = \ \vec{MB}\ $.	2. نوجد منتصف القطعة المستقيمة (وهي نقطة من المستوي)، والشعاع \vec{AB} هو ناظم المستوي.




قال رسول الله ﷺ: " إِنَّ الخَلالَ بَينَ وَرَأْسِ الحَرَامِ بَينَ وَبَينَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ "

-- الأشعة في الفراغ --

الطلب الأول: عين النقطة M التي تحقق:

$$\vec{AB} + \vec{AE} + \vec{FI} = \vec{AM}$$

الحل:



البداية من الطرف الأول للعلاقة

$$\vec{AB} + \vec{AE} = \vec{AF}$$

$$\vec{AB} + \vec{BF} = \vec{AF}$$

لكن $\vec{AE} = \vec{BF}$ متوازي أضلاع


$$\vec{AB} + \vec{AE} = \vec{AF}$$

نعود للعلاقة

$$\vec{AF} + \vec{FI} = \vec{AM}$$

$$\vec{AI} = \vec{AM}$$

$$I = M$$



الطلب الثاني: أثبت صحة العلاقة

$$\vec{AB} + \vec{CF} = \vec{AF} + \vec{CB}$$

الحل:

نبدأ من الطرف الأول وصولاً للثاني

نحاول إدخال F

$$\vec{AB} = \vec{AF} + \vec{FB}$$

$$\vec{AB} + \vec{CF} = \vec{AF} + \vec{FB} + \vec{CF} = \vec{AF} + \vec{CB}$$

الطرف الأول

$\vec{CF} + \vec{FB}$

تعريف: يمتلك الشعاع

منحى هو منحى المستقيم AB
اتجهاً يتفق مع الانتقال من A إلى B
طولاً هو المسافة من A إلى B

المنحى ذاته
الاتجاه ذاته
الطول ذاته

تتساوى الأشعة عندما تمتلك

$$ABCD \text{ متوازي أضلاع } \Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{CD}$$

يكافئ

أيما كانت A من الفراغ
أيما كان \vec{u} شعاع
توجد نقطة واحدة B تحقق $\vec{AB} = \vec{u}$

الأشعة المرتبطة خطياً:


\vec{AB}, \vec{CD} مرتبطين خطياً أي أنهما متوازيان

ميرهنة:


$$\vec{u}, \vec{v} \text{ مرتبطين خطياً } \Leftrightarrow \vec{u} = \alpha \vec{v}$$

تكون النقط المختلفة A, B, C على استقامة واحدة إذا
كان \vec{AC} و \vec{AB} مرتبطين خطياً.


A, B نقطتين مختلفتين، عندئذٍ المستقيم AB هو
مجموعة النقط M التي تجعل \vec{AM} و \vec{AB} مرتبطين
خطياً، أي مجموعة النقط
 $\vec{AM} = \alpha \vec{AB}$



مثال (صفحة 14): مكعب $ABCDEFGH$ و I منتصف الحرف $[FG]$



تدريب (1) (صفحة 16): مكعب $ABCDEFGH$ ، I منتصف الحرف $[EF]$ و J منتصف الحرف $[FG]$ بين إذا كانت M المحققة للمساواة الشعاعية المفروضة تنطبق أو لا تنطبق على أحد رؤوس المكعب. وعلل إجابتك.



$$\boxed{1} \quad \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DH}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DH}$$

هنا العمل A نتركها

متقابلان في المكعب $\overrightarrow{DH} = \overrightarrow{BF}$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AF}$$

M تنطبق على F

$$\boxed{2} \quad \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$$

خاصة قطري مربع A نتركها

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AC}$$

قطري متوازي أضلاع

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AG}$$

M تنطبق على G

$$\boxed{3} \quad \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{DG}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{DG}$$

ندخل A

$$\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AF} \text{ متوازي أضلاع } AFGD$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AE}$$

$$\boxed{4} \quad \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BF}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BF}$$

متساويان في المكعب $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE}$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AE}$$

لا نستفيد من \overrightarrow{GE} ، ندخل O منتصف \overrightarrow{GE}

كيف نثبت وقوع نقاط على استقامة واحدة؟


الجواب من خلال الارتباط الخطي

مثال (صفحة 15): ليكن $ABCDIJKL$ متوازي سطوح

وليكن G مركز ثقل المثلث BIK

$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GK} = \vec{0} \quad (1)$$

أثبت أن J, G, D على استقامة واحدة.



لنثبت أن \overrightarrow{DJ} و \overrightarrow{DG} مرتبطين خطياً

من العلاقة (1) ندخل D حسب علاقة ثال لجمع الأشعة،

ثم ندخل للعلاقة الجديدة J فقط لحددين ونترك الثالث

نستفيد للحد الثالث من تساوي الأقطار

الحل:

$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GK} = \vec{0}$$

$$(\overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DB}) + (\overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DI}) + (\overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DK}) = \vec{0}$$

$$3\overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DI} + \overrightarrow{DK} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{JB} \quad \overrightarrow{DI} = \overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{JI} \quad \overrightarrow{DK} = \overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{KI}$$

أقطار مكعب

$$3\overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{AJ} = \vec{0}$$

$$3\overrightarrow{GD} + 2\overrightarrow{DJ} + \left(\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{AJ} \right) = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{AJ} = \vec{0}$$

$$3\overrightarrow{GD} + 2\overrightarrow{DJ} = \vec{0}$$

$$-3\overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{DJ}$$

$$3\overrightarrow{DG} = 2\overrightarrow{DJ}$$

فالنقاط J, G, D على استقامة واحدة.

2] $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{EC}$

استخدم فكرة تعاقب لثلاثة أشعة

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{EC} &= \overrightarrow{BF} + (\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{BC}) \\ &= \underbrace{\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FB}}_{=0} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BC} \\ &= \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EG} \quad \text{قطر (مكعب) } EH\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EG} \quad \text{قطر}$$

3] $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$

$$\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IE}) + (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IF}) = 2\overrightarrow{AI}$$


لأن I منتصف EF

4] $\frac{1}{2}\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{JF}$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{JF} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG}) + \overrightarrow{JF} \\ \text{إدخال F حسب شال} \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{EF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{JF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF} + \underbrace{\overrightarrow{FJ} + \overrightarrow{JF}}_{=0} \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EI}\end{aligned}$$

تدريب (2) (صفحة 16):

متوازي سطوح ABCDEFGH




الطلب الأول: أثبت صحة ما يلي:

$$1] \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BE} = \vec{0}$$

نجد من قاعدة أقطار متوازي الأضلاع

$$\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB}$$

$$\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BE} = \vec{0}$$



$$2] \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{CF} = \vec{0}$$

لدينا $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DE}$ ، إذاً

$$\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DE} = \vec{0}$$

$$3] \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{EB} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{CH} + \overrightarrow{EB} = \vec{0}$$

قطران متوازيان متعاكسان (متساويان بإشارة (-))

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OE}$$

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AO} + \underbrace{\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OE}}_{=0}$$

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AO}$$

إذاً M لا تقع على الرؤوس.

$$5] \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{HB})$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{HB})$$

ندخل G ندخل B

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{HB})$$

$$= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GB})$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \underbrace{\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GB}}_{=0})$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(2\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB}$$

M تنطبق على B

الطلب الثاني: حدد موقع N المحققة للمساواة الشعاعية:

$$1] \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{FJ}$$

$$\overrightarrow{AN} = \underbrace{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}}_{\text{قطر AF في ABEF}} + \overrightarrow{FJ} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FJ} = \overrightarrow{AJ}$$

إذاً N هي J

$$2] \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{HJ}$$

$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AE} + \underbrace{\overrightarrow{BC}}_{=\overrightarrow{AD}} + \overrightarrow{HJ} = \underbrace{\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD}}_{\text{قطر AH في AEHD}} + \overrightarrow{HJ}$$

$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HJ} = \overrightarrow{AJ}$$

إذاً N هي J

$$3] \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{EI}$$

$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CF} + \underbrace{\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{EI}}_{\text{حسب شال أشعة متعاقبة}} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FE}$$

$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EI} = \overrightarrow{AI}$$

تعاقب أشعة

إذاً N هي I

الطلب الثالث: عبر عن المجموع الشعاعي بشعاع واحد باستخدام نقطتين من الشكل حصراً

$$1] \overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{BA}$$

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{BJ}$$




Please wait...

I'm thinking!

$$\vec{AQ} = \frac{1}{2} \left(2\vec{AO}_1 + \underbrace{\vec{O}_1\vec{G} + \vec{O}_1\vec{E}}_{=\vec{0}} \right) = \vec{AO}_1$$

إذاً Q هي O_1 .



$$\text{[3]} \quad \vec{CR} = \frac{1}{2}\vec{AE} - \vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AD}$$

لدينا في متوازي الأضلاع

$$\begin{aligned} -\vec{AB} &= \vec{BA} = \vec{CD} \\ \vec{CR} &= \frac{1}{2}\vec{AE} - \vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AD} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\vec{AE} - \vec{AD}}{\vec{DE}} \right) - \vec{AB} \\ &= \frac{1}{2}\vec{DE} + \vec{CD} = \vec{DO}_2 + \vec{CD} \\ &= \vec{CD} + \vec{DO}_2 = \vec{CO}_2 \end{aligned}$$

حيث O_2 منتصف $[DE]$
إذاً R هي O_2 .

الطلب الثالث: عيّن شعاعاً يساوي

$$\vec{DC} + \vec{BD} + \vec{BF}$$

وأثبت أنّ هذا الشعاع مرتبط خطياً بالشعاع \vec{AH} .

$$\vec{DC} + \vec{BD} + \vec{BF} = \vec{BC} + \vec{BF} = \vec{BG}$$

بما أنّ \vec{BG} يوازي \vec{AH} في متوازي السطوح فهما مرتبطان.

الطلب الرابع: أوجد شعاعاً

$$\vec{FE} + \vec{FG} + \vec{FB}$$

وأثبت أنّ هذا الشعاع مرتبط خطياً بالشعاع \vec{DF} .

$$\vec{FE} + \vec{FG} + \vec{FB} = \vec{FH} + \vec{FB} = \vec{FD}$$

قطر في $GFED$

قطر في $FBHD$

بما أنّ \vec{FD} و \vec{DF} لهما ذات الحامل فهما مرتبطان خطياً.

$$\text{[4]} \quad \vec{FE} + \vec{FB} + \vec{FG} = \vec{FD}$$

طريقة (1): نغير الترتيب

$$\vec{FE} + \vec{FG} + \vec{FB} = \vec{EG} + \vec{FB}$$

قطر \vec{EG}

الأقطار متساوية \vec{HF}

$$= \vec{HF} + \vec{FB} = \vec{HB} = \vec{FD}$$

أقطار $HFBD$

طريقة (2):

$$\vec{FE} + \vec{FB} + \vec{FG} = \vec{FA} + \vec{FG}$$

قطر \vec{FA}

قطر \vec{GD}

$$\vec{FG} + \vec{GD} = \vec{FD}$$

الطلب الثاني: وُضِعَ النقاط P, Q, R بحيث يكون:

$$\text{[1]} \quad \vec{AP} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AE}$$

$$\vec{AP} = \vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{AE}) = \vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{AH})$$

$$= \vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{BG}) = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BG}$$

$$= \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AG} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AG})$$

ليسا في متوازي أضلاع

لتكن O منتصف $[BG]$

$$= \frac{1}{2}(\vec{AO} + \vec{OB} + \vec{AO} + \vec{OG})$$

$$= \frac{1}{2}(2\vec{AO} + \underbrace{\vec{OB} + \vec{OG}}_{=\vec{0}})$$

$$\vec{AP} = \frac{1}{2}(2\vec{AO} + \vec{0}) = \vec{AO}$$

إذاً P هي O .

$$\text{[2]} \quad \vec{AQ} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} + \vec{AE}$$

$$\vec{AQ} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AE} + \frac{1}{2}\vec{AE}$$

$$\vec{AQ} = \frac{1}{2} \left(\frac{\vec{AB} + \vec{AD}}{\vec{AC}} + \vec{AE} \right) + \frac{1}{2}\vec{AE}$$

حيث $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ قطر متوازي الأضلاع
 $= \vec{EG}$

و $\vec{AC} = \vec{EG}$ قطران متوازيان

$$\vec{AQ} = \frac{1}{2}(\vec{AE} + \vec{EG}) + \frac{1}{2}\vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{AG} + \frac{1}{2}\vec{AE}$$

لتكن O_1 منتصف $[GE]$

$$= \frac{1}{2}(\vec{AO}_1 + \vec{O}_1\vec{G})$$

$$= \frac{1}{2}(\vec{AO}_1 + \vec{O}_1\vec{G} + \vec{AO}_1 + \vec{O}_1\vec{E})$$



قال رسول الله ﷺ: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعمَلوا صالحاً) (المؤمنون: الآية 51)، وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) (البقرة: الآية 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك"

--الارتباط الخطي لثلاثة أشعة--


ميرهنة (3): لنكن C, B, A ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة عندئذٍ المستوي (ABC) هو مجموعة النقاط M المعرفة بالعلاقة:

$$\overrightarrow{AM} = \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AC}$$

حيث $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$


ونقول إن $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ شعاعاً توجيه في المستوي (ABC)

يتعين مستو P } شعاعين غير مرتبطين خطياً نقطة



تعريف:

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ مرتبطين خطياً \Leftrightarrow إذا وجدت نقطة O تجعل الأشعة $\overrightarrow{OA} = \vec{u}, \overrightarrow{OB} = \vec{v}, \overrightarrow{OC} = \vec{w}$ تقع في مستو واحد.



ملاحظة:

إذا كان \vec{u}, \vec{v} مرتبطين خطياً عندئذٍ تكون النقاط O, A, B على استقامة واحدة، عندئذٍ يوجد (مستو) يحوي \overrightarrow{OA} والنقطة C ، وعندئذٍ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ مرتبطين خطياً.

ميرهنة:

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ ثلاثة أشعة وبفرض \vec{u}, \vec{v} ليسا مرتبطين خطياً، عندئذٍ:

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ مرتبطين خطياً} \Leftrightarrow$$


$$\exists a, b \in \mathbb{R}, \vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$$

مثال (صفحة 18): مكعب $ABCDEFGH$ ، منتصف الحرف I و J منتصف الحرف $[FG]$ ، أثبت أن $\overrightarrow{IJ}, \overrightarrow{BG}, \overrightarrow{EF}$ مرتبطة خطياً.

نكتب \overrightarrow{IJ} بدلاتهم

\overrightarrow{EF} ينتمي للمستوي $ABFE$ \Leftrightarrow متعامدان \Leftrightarrow غير مرتبطين \overrightarrow{BG} ينتمي للمستوي $BFGC$

وبالتالي $\overrightarrow{BG}, \overrightarrow{EF}$ متعامدان، وبالتالي غير مرتبطين خطياً.



ولدينا حسب علاقة شال:

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FJ} \quad (1)$$

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GJ} \quad (2)$$


بجمع (1)، (2) نجد:

$$2\overrightarrow{IJ} = \underbrace{\overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IB}}_{=\vec{0}} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BG} + \underbrace{\overrightarrow{FJ} + \overrightarrow{GJ}}_{=\vec{0}}$$

$$2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BG}$$

$$\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BG}$$

وهو المطلوب.



كيف نثبت توازي مستقيم ومستو؟

كيف نثبت توازي مستقيم ومستو؟

شعاعياً هندسياً

نجد مستقيم في المستوي يوازي المستقيم الأول $\vec{u} = \vec{AB}$ نجد d في المستوي يحققان $\vec{u} = \vec{AB}$

كيف نثبت توازي مستويين؟

كيف نثبت توازي مستويين؟

شعاعياً هندسياً

نثبت مستقيمين متقاطعين في الأول يوازيان مستقيمين متقاطعين في الثاني

نوجد شعاعين غير مرتبطين في الأول \vec{AB}, \vec{AC} يوجد شعاعين غير مرتبطين في الثاني $\vec{A'B'}, \vec{A'C'}$ بحيث مرتبطة خطياً $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{A'B'}$ مرتبطة خطياً $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{A'C'}$

نعلم أن $\vec{BE} = \vec{BA} + \vec{AE}$ ومنه $\vec{AE} = \vec{BE} - \vec{BA}$

$$\vec{AF} = \frac{1}{2}\vec{AE} = \frac{1}{2}(\vec{BE} - \vec{BA}) = \frac{1}{2}(\vec{BE} + \vec{AB})$$

$$= \frac{1}{2}(4\vec{BC} + \vec{AB})$$

$$= 2\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{AB}$$

لدينا $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$ ومنه $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$

$$\vec{AF} = 2(\vec{AC} - \vec{AB}) + \frac{1}{2}\vec{AB} = 2\vec{AC} - \frac{3}{2}\vec{AB}$$

وهو المطلوب.

تدريب (1) (صفحة 20): A, B, C ثلاث نقط متمايزة في الفراغ. هل الأشعة $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{BC}$ مرتبطة خطياً؟ نعم لأننا يمكن أن نكتب حسب علاقة شال $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$

تدريب (2) (صفحة 20): A, B, C ثلاث نقط متمايزة في الفراغ. هل نقطة تحقق $\vec{BE} = 4\vec{BC}$ ونقطة تحقق $\vec{AF} = \frac{1}{2}\vec{AE}$ هل تقع النقاط F, E, C, B, A في مستو واحد؟

1 نثبت أن E نقطة تقع في المستوي (ABC)

2 نثبت أن F نقطة تقع في المستوي (ABC) عندئذ تكون النقاط F, E, C, B, A في مستو واحد

نثبت **1** من خلال الارتباط الخطي $\vec{BE}, \vec{AC}, \vec{AB}$ لدينا $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$ لدينا من نص التمرين $\vec{BC} = \frac{1}{4}\vec{BE}$ ومنه: $\vec{AC} = \vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{BE}$

نثبت **2** من خلال الارتباط الخطي $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AF}$ لدينا $\vec{AF} = \frac{1}{2}\vec{AE}$

تدريب (3) (صفحة 20): $ABCDEFGH$ مكعب. I منتصف الحرف $[EF]$ و J منتصف الحرف $[FG]$ الطلب الأول: هل تنتمي J للمستوي (ABI) ؟ كلا، J تنتمي للمستوي $(CBFG)$ وهو عامودي على المستوي (ABI)

الطلب الثاني: هل تقع الأشعة $\vec{AJ}, \vec{AI}, \vec{AB}$ في مستو واحد؟ J لا تنتمي للمستوي (ABI) فالأشعة $\vec{AJ}, \vec{AI}, \vec{AB}$ لا تقع في مستو واحد

تدريب (1) (صفحة 20): A, B, C ثلاث نقط متمايزة في الفراغ. هل الأشعة $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{BC}$ مرتبطة خطياً؟ نعم لأننا يمكن أن نكتب حسب علاقة شال $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$

تدريب (2) (صفحة 20): A, B, C ثلاث نقط متمايزة في الفراغ. هل نقطة تحقق $\vec{BE} = 4\vec{BC}$ ونقطة تحقق $\vec{AF} = \frac{1}{2}\vec{AE}$ هل تقع النقاط F, E, C, B, A في مستو واحد؟

1 نثبت أن E نقطة تقع في المستوي (ABC)

2 نثبت أن F نقطة تقع في المستوي (ABC) عندئذ تكون النقاط F, E, C, B, A في مستو واحد

نثبت **1** من خلال الارتباط الخطي $\vec{BE}, \vec{AC}, \vec{AB}$ لدينا $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$ لدينا من نص التمرين $\vec{BC} = \frac{1}{4}\vec{BE}$ ومنه: $\vec{AC} = \vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{BE}$


نثبت **2** من خلال الارتباط الخطي $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AF}$ لدينا $\vec{AF} = \frac{1}{2}\vec{AE}$

تدريب (4) (صفحة 20):

ABCD رباعي وجوه. M نقطة محققة للعلاقة

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$$

عبر عن \overrightarrow{AM} بدلالة \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{BC} . واستنتج أن M تنتمي للمستوي (ABC).



$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$$

ندخل B باستخدام شال

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

\overrightarrow{AM} مرتبط مع \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{BC} ومنه \overrightarrow{AM} يقع في المستوي (ABC)

تدريب (5) (صفحة 20):

ABCDEFGH مكعب. فيه M نقطة تحقق:

$$\overrightarrow{EM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EH} \quad (1)$$


و N نقطة تحقق:

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \quad (2)$$

الطلب الأول: أثبت أن $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DB}$

نكتب \overrightarrow{MN} بالاستفادة من شال ثم نستخدم العلاقة

الأولى بعد ادخال A والعلاقة الثانية بعد ادخال D



$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} \Rightarrow$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} \quad (*)$$

لدينا من (1)

$$\overrightarrow{EM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EH}$$

$$\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AH})$$

$$\overrightarrow{AM} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AH}$$

$$\overrightarrow{AM} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{EH} - \overrightarrow{EA})$$

$$\overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{EH} \quad (3)$$

ومن (2) نجد:

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB})$$

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{DB})$$

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EH} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DB} \quad (4)$$

نعوض (3), (4) في (*)

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM}$$

$$= \frac{1}{3}\overrightarrow{EH} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DB} - \left(-\overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{EH}\right)$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DB}$$

وهو المطلوب.

الطلب الثاني: هل الأشعة \overrightarrow{EA} , \overrightarrow{MN} , \overrightarrow{HB} مرتبطة خطياً؟

استفد من الطلب السابق (\overrightarrow{MN} هي المفتاح)

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DB}$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{DH} + \overrightarrow{HB})$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}(-\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{HB})$$

$$\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{HB}$$

فالأشعة \overrightarrow{EA} , \overrightarrow{MN} , \overrightarrow{HB} مرتبطة خطياً.

تدريب (6) (صفحة 20):

مكعب ABCDEFGH. I و J و K و L بالترتيب منتصفات [AB] و [BC] و [CG] و [AE]. M النقطة المحققة للعلاقة:

$$3\overrightarrow{EM} = 2\overrightarrow{EI}$$

الطلب الأول: لماذا M هي مركز ثقل المثلث AEB؟

$$[CD] \text{ منتصف } \left(\frac{x_C + x_D}{2}, \frac{y_C + y_D}{2}, \frac{z_C + z_D}{2} \right) \\ = \left(-1, \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right) \\ [EF] \text{ منتصف } \left(\frac{x_E + x_F}{2}, \frac{y_E + y_F}{2}, \frac{z_E + z_F}{2} \right) \\ = \left(\frac{11}{2}, 11, \frac{5}{2} \right)$$

الطلب الثاني: احسب مركبات الأشعة $\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AB}$.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \\ z_D - z_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} x_F - x_E \\ y_F - y_E \\ z_F - z_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

الطلب الثالث: عين إحداثيات النقطة K بحيث يكون الرباعي $ABCK$ متوازي أضلاع.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{KC} \Leftrightarrow \text{متوازي أضلاع } ABCK$$

إذا فرضنا $K(x, y, z)$ فإن:

$$\overrightarrow{KC} = \begin{pmatrix} -x \\ -2 - y \\ 2 - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \\ \Rightarrow x = 1, \quad y = 4, \quad z = 1$$

ومنه $K(1, 4, 1)$.


الطلب الرابع: جد مركبات كل من الشعاعين

$$\vec{v} = 2\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} + 3\overrightarrow{EF} \quad \text{و} \quad \vec{u} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CD}$$

$$\vec{u} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CD} = 3 \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = 2\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} + 3\overrightarrow{EF} \\ = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 14 \\ 7 \\ -\frac{7}{2} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 14 \\ 7 \\ \frac{11}{2} \end{pmatrix}$$

it's easy



AEB مثلث فيه EI متوسط

كي نثبت أن M مركز ثقل للمثلث AEB نثبت أنها تقع على المتوسط بنسبة معينة (تبعد عن E (رأس المتوسط) مسافة قدرها ثلثي طول المتوسط)

لدينا

$$3\overrightarrow{EM} = 2\overrightarrow{EI} \Rightarrow \overrightarrow{EM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EI}$$

إذا M مركز ثقل للمثلث AEB

طريقة ثانية: بأن نثبت أن $\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} = \vec{0}$



الطلب الثاني: هل الأشعة $\overrightarrow{HK}, \overrightarrow{CJ}, \overrightarrow{LM}$ مرتبطة خطياً؟

• \overrightarrow{CJ} هي مفتاح الحل

\overrightarrow{CJ} عمود على $ABFE$ ، \overrightarrow{CJ} عمود على LM
 \overrightarrow{CJ} عمود على $CDHG$ ، \overrightarrow{CJ} عمود على HK

إذا لا يمكن كتابة \overrightarrow{CJ} بدلتهم

إذا غير مرتبطين خطياً

إذا غير واقعين بمستوي واحد

--المعلم في الفراغ--

تدريب (1) (صفحة 24):

تتأمل النقاط $A(3, 5, 2)$ و $B(2, -1, 3)$ و $C(0, -2, 2)$ و $D(-2, 5, 1)$ و $E(3, 9, 2)$ و $F(8, 13, 3)$ في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ للفراغ.

الطلب الأول: احسب إحداثيات منتصفات القطع المستقيمة $[AB]$ و $[CD]$ و $[EF]$.

$$[AB] \text{ منتصف } \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right) \\ = \left(\frac{5}{2}, 2, \frac{5}{2} \right)$$



Please wait...

I'm thinking!

تدريب (2) (صفحة 24):

في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ للفرغ. نعطي إحداثيات أربع من رؤوس متوازي السطوح $ABCDEFGH$ المرسوم جانبياً، وهي $A(2,1,-1)$ و $B(1,3,-1)$ و $C(-3,2,0)$ و $E(3,-1,3)$. جد إحداثيات الرؤوس الأربعة الأخرى.

$A(2,1,-1)$	$B(1,3,-1)$	$C(-3,2,0)$	$E(3,-1,3)$
-------------	-------------	-------------	-------------


في متوازي الأضلاع، نعلم أن:

$$\overline{AE} = \overline{BF}$$

$$\begin{aligned} (x_E - x_A, y_E - y_A, z_E - z_A) &= (x_F - x_B, y_F - y_B, z_F - z_B) \\ (1, -2, 4) &= (x_F - 1, y_F - 3, z_F + 1) \\ \Rightarrow \begin{cases} x_F - 1 = 1 \Rightarrow x_F = 2 \\ y_F - 3 = -2 \Rightarrow y_F = 1 \\ z_F + 1 = 4 \Rightarrow z_F = 3 \end{cases} &\Rightarrow \boxed{F(2,1,3)} \end{aligned}$$

$$\overline{AD} = \overline{BC}$$

$$\begin{aligned} (x_D - x_A, y_D - y_A, z_D - z_A) &= (x_C - x_B, y_C - y_B, z_C - z_B) \\ (x_D - 2, y_D - 1, z_D + 1) &= (-4, -1, 1) \\ \Rightarrow \begin{cases} x_D - 2 = -4 \Rightarrow x_D = -2 \\ y_D - 1 = -1 \Rightarrow y_D = 0 \\ z_D + 1 = 1 \Rightarrow z_D = 0 \end{cases} &\Rightarrow \boxed{D(-2,0,0)} \end{aligned}$$




$$\overline{FG} = \overline{BC}$$

$$\begin{aligned} (x_G - x_F, y_G - y_F, z_G - z_F) &= (x_C - x_B, y_C - y_B, z_C - z_B) \\ (x_G - 2, y_G - 1, z_G - 3) &= (-4, -1, 1) \\ \Rightarrow \begin{cases} x_G - 2 = -4 \Rightarrow x_G = -2 \\ y_G - 1 = -1 \Rightarrow y_G = 0 \\ z_G - 3 = 1 \Rightarrow z_G = 4 \end{cases} &\Rightarrow \boxed{G(-2,0,4)} \end{aligned}$$

$$\overline{EH} = \overline{FG}$$

$$\begin{aligned} (x_H - 3, y_H + 1, z_H - 3) &= (-4, -1, 1) \\ \Rightarrow \begin{cases} x_H - 3 = -4 \Rightarrow x_H = -1 \\ y_H + 1 = -1 \Rightarrow y_H = -2 \\ z_H - 3 = 1 \Rightarrow z_H = 4 \end{cases} &\Rightarrow \boxed{H(-1,-2,4)} \end{aligned}$$



تدريب (3) (صفحة 24):

لدينا في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ للفرغ، النقاط $A(3,0,-1)$ و $B(-2,3,2)$ و $C(1,2,-2)$.

الطلب الأول: جد إحداثيات النقطة I منتصف $[AB]$.

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right) \Rightarrow I\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

الطلب الثاني: جد إحداثيات النقطة D نظيرة I بالنسبة إلى C .


D نظيرة I بالنسبة إلى C ، أي أن:

$$\overline{IC} = \overline{CD}$$

$$(x_C - x_I, y_C - y_I, z_C - z_I) = (x_D - x_C, y_D - y_C, z_D - z_C)$$

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{5}{2}\right) = (x_D - 1, y_D - 2, z_D + 2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_D - 1 = \frac{1}{2} \Rightarrow x_D = \frac{3}{2} \\ y_D - 2 = \frac{1}{2} \Rightarrow y_D = \frac{5}{2} \\ z_D + 2 = -\frac{5}{2} \Rightarrow z_D = -\frac{9}{2} \end{cases}, \boxed{D\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, -\frac{9}{2}\right)}$$



"المعلم ليس بالضرورة متجانس"

الطلب الثالث: جد إحداثيات النقطة M التي تحقق العلاقة:

$$\overline{BM} = \overline{AB} + 3\overline{AC}$$



$$[4] \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$$

وهي غير محققة إلا عندما $A = B$ ، وهذا غير محقق من الفرض.

تدرب (5) (صفحة 24):

أيمكن تعيين a و b لتقع النقاط $A(2,3,0)$ و $B(3,2,1)$ و $M(a, b, 2)$ على استقامة واحدة.

💡 A و B و M على استقامة واحدة $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ و \overrightarrow{BM} مرتبطين

$A(2,3,0)$	$B(3,2,1)$	$M(a, b, 2)$
------------	------------	--------------

$$\overrightarrow{AB}(1, -1, 1)$$

$$\overrightarrow{BM}(a - 3, b - 2, 1)$$

$$\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{AB} \Rightarrow (a - 3, b - 2, 1) = k(1, -1, 1)$$

$$\begin{cases} k = 1 \\ b - 2 = -1 \Rightarrow b = 1 \\ a - 3 = 1 \Rightarrow a = 4 \end{cases}$$

تدرب (6) (صفحة 24):

أيمكن تعيين a ليكون الشعاعان $\vec{v}(1, -2, a)$ و $\vec{u}(2, a, 5)$ مرتبطين خطياً؟

💡 إذا أمكن إيجاد عدد حقيقي k يحقق:

$$\vec{v} = k\vec{u}$$

$$(1, -2, a) = k(2, a, 5)$$

$$\begin{cases} 2k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}a = -2 \Rightarrow a = -4 \\ 5k = a \Rightarrow a = \frac{5}{2} \end{cases}$$

وهذا تناقض، إذاً لا يمكن تعيين a .

تدرب (7) (صفحة 24):

في كل من الحالات الآتية، بين إذا كانت النقاط A و B و C تقع على استقامة واحدة؟

💡 A و B و C على استقامة واحدة $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ و \overrightarrow{BC} مرتبطين

$$[1] A(3, -1, 2), B(0, 2, 4), C(2, 0, -3)$$

$$\overrightarrow{AB}(-3, 3, 2), \overrightarrow{BC}(2, -2, -7)$$

$$\frac{-3}{2} = \frac{3}{-2} \neq \frac{2}{7} \Rightarrow \text{المركبات غير متناسبة}$$

فالشعاعان \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{BC} غير مرتبطين خطياً، وبالتالي النقاط لا تقع على استقامة واحدة.

$$[2] A(-4, 1, 3), B(-2, 0, 5), C(0, -1, 7)$$

$$\overrightarrow{AB}(2, -1, 2), \overrightarrow{BC}(2, -1, 2) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$$

وبالتالي النقاط تقع على استقامة واحدة.

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$$

$$\begin{pmatrix} x_M + 2 \\ y_M - 3 \\ z_M - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_M + 2 = -5 - 6 \Rightarrow x_M = -13 \\ y_M - 3 = 3 + 6 \Rightarrow y_M = 12 \\ z_M - 2 = 3 - 3 \Rightarrow z_M = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow M(-13, 12, 2)$$

الطلب الرابع: جد إحداثيات النقطة N التي تحقق العلاقة

$$\overrightarrow{NA} = 2\overrightarrow{NC}$$

$$\overrightarrow{NA} = 2\overrightarrow{NC}$$

$$\overrightarrow{NC} + \overrightarrow{CA} = 2\overrightarrow{NC}$$

$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{NC} \Rightarrow \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CN}$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_N - 1 \\ y_N - 2 \\ z_N + 2 \end{pmatrix} \Rightarrow N(-1, 4, -3)$$

تدرب (4) (صفحة 24):

لدينا النقطتان $A(2, 3, -2)$ و $B(5, -1, 0)$. جد إن أمكن، في كل حالة، إحداثيات النقطة M المحققة للعلاقة المفروضة

$$[1] \overrightarrow{MA} = 2\overrightarrow{AB}$$

$$\begin{pmatrix} 2 - x_M \\ 3 - y_M \\ -2 - z_M \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 - x_M = 6 \Rightarrow x_M = -4 \\ 3 - y_M = -8 \Rightarrow y_M = 11 \\ -2 - z_M = 4 \Rightarrow z_M = -6 \end{cases}, M(-4, 11, -6)$$

$$[2] \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MB}$$

$$\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{MB} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BA} = \vec{0}, \text{ أيًا كانت } M$$

وهذا يناقض الفرض، إذاً لا يوجد M تحقق المساواة.

$$[3] 3\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$$

$$3\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{MB} \Rightarrow \overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{BA}$$

$$\begin{pmatrix} x_M - 5 \\ y_M + 1 \\ z_M \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_M - 5 = -9 \Rightarrow x_M = -4 \\ y_M + 1 = 12 \Rightarrow y_M = 11 \\ z_M = -6 \Rightarrow z_M = -6 \end{cases}, M(-4, 11, -6)$$

💡 لاحظ أن:

$$3\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$$

$$2 \frac{\overrightarrow{BA}}{-\overrightarrow{BA}} + \frac{\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA}}{\overrightarrow{MA}} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{MA} = 2\overrightarrow{AB}$$

وهي ذات المعادلة الأولى [1].


$$[2] A(1,3,-2), B(2,-1,0), C(6,-3,-1)$$

$$\overrightarrow{AB}(1,-4,2) \Rightarrow AB = \sqrt{1+16+4} = \sqrt{21}$$

$$\overrightarrow{BC}(4,-2,-1) \Rightarrow BC = \sqrt{16+4+1} = \sqrt{21}$$

$$\overrightarrow{AC}(5,-6,1) \Rightarrow AC = \sqrt{25+36+1} = \sqrt{62}$$

نلاحظ أن المثلث غير قائم ولا متساوي الأضلاع، ولكن $AB = AC$ إذا هو متساوي الساقين.




تدريب (3) (صفحة 27):

لدينا النقطتان $A(5,2,-1)$ و $B(3,0,1)$. بين أي النقاط C أو D أو E تنتمي إلى المستوي المحوري للقطعة $[AB]$ ، في حالة $C(-2,5,-2)$ و $D(1,1,-3)$ و $E(3,2,1)$.

المستوي المحوري لقطعة مستقيمة هو مجموعة النقاط

التي تبعد عن طرفيها المسافة نفسها

$A(5,2,-1)$	$C(-2,5,-2)$	$B(3,0,1)$
$\overrightarrow{AC}(-7,3,-1)$	$\overrightarrow{CB}(5,-5,3)$	
$AC = \sqrt{49+9+1} = \sqrt{59}$	$CB = \sqrt{25+25+9} = \sqrt{59}$	
النقطة C تنتمي للمستوي المحوري		
$A(5,2,-1)$	$D(1,1,-3)$	$B(3,0,1)$
$\overrightarrow{AD}(-4,-1,-2)$	$\overrightarrow{DB}(2,-1,4)$	
$AD = \sqrt{16+1+4} = \sqrt{21}$	$DB = \sqrt{4+1+16} = \sqrt{21}$	
النقطة D تنتمي للمستوي المحوري		
$A(5,2,-1)$	$E(3,2,1)$	$B(3,0,1)$
$\overrightarrow{AE}(-2,0,2)$	$\overrightarrow{EB}(0,-2,0)$	
$AE = \sqrt{4+0+4} = 2\sqrt{2}$	$EB = \sqrt{0+4+0} = 2$	
النقطة E لا تنتمي للمستوي المحوري		



$$[3] A(1,-1,0), B(1,-1,4), C(1,-1,-3)$$

$$\overrightarrow{AB}(0,0,4), \overrightarrow{BC}(0,0,-7)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = -\frac{4}{7}\overrightarrow{BC}$$

فالشعاعان \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{BC} مرتبطين خطياً، وبالتالي النقاط تقع على استقامة واحدة.

--المسافة في الفراغ--

تدريب (1) (صفحة 27):

احسب نظيم \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} في كل من الحالات الآتية:

$$[1] \vec{u}(2,-2,3), \vec{v}(4,-4,-2), \vec{w}(4,1,-2)$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{17}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{36} = 6$$

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{21}$$

$$[2] \vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j},$$

$$\vec{v} = \vec{i} + 5\vec{k}, \vec{w} = \sqrt{2}\vec{i} - \sqrt{3}\vec{j} + \vec{k}$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 0^2} = \sqrt{13}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 5^2} = \sqrt{26}$$

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{\sqrt{2}^2 + (-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

تدريب (2) (صفحة 27):

فيما يأتي، بين هل المثلث ABC قائم؟ هل هو متساوي الساقين؟ هل هو متساوي الأضلاع؟

$$[1] A(1,3,-1), B(3,6,-2), C(0,4,0)$$

حساب أطوال الأضلاع $[AB], [BC], [AC]$

$$\overrightarrow{AB}(2,3,-1) \Rightarrow AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4+9+1} = \sqrt{14}$$


$$\overrightarrow{BC}(-3,-2,2) \Rightarrow BC = \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{9+4+4} = \sqrt{17}$$

$$\overrightarrow{AC}(-1,1,1) \Rightarrow AC = \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

نلاحظ أن المثلث غير متساوي الأضلاع ولا الساقين، لكن نجد أن:


$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

إذاً حسب عكس فيثاغورث المثلث قائم في A .



نلاحظ أن النقاط B و C و E تقع على دائرة واحدة مركزها A ونصف قطرها 5 ، ويكون لها المعادلة

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 25$$




بينما نلاحظ أن النقطة $D(1, -3, 3)$ لا تقع على نفس الدائرة

$$AD = \sqrt{(1 - 2)^2 + (-3 - 3)^2 + (3 + 1)^2} = \sqrt{53}$$

--مركز الأبعاد المتناسبة--

تدريب (1) (صفحة 31):

بالاستفادة من المعلومات المبينة في الشكل المجاور، عيّن الأعداد الأربعة a و b و c و d ليتحقق ما يلي:



1 مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين (A, a) و (D, d) .

من الرسم نجد أن $\vec{KD} = 2\vec{AK}$ أي

$$\vec{KD} + 2\vec{KA} = \vec{0}$$

وبالتالي K مركز أبعاد متناسبة للنقطتين $(A, 2)$ و $(D, 1)$.

$$a = 2d \neq 0$$

تدريب (4) (صفحة 27):

نتأمل النقاط $A(1, 1, \sqrt{2})$ و $B(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$ و C نظيرة A بالنسبة إلى المبدأ O . أثبت أن المثلث ABC مثلث قائم ومتساوي الساقين.

C نظيرة A بالنسبة إلى المبدأ O ، إذاً

$$C(-1, -1, -\sqrt{2})$$

$$\vec{AC}(2, 2, 2\sqrt{2}) \Rightarrow AC = \sqrt{4 + 4 + 8} = 4$$

$$\vec{BC}(-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}, -\sqrt{2}) \Rightarrow$$

$$BC = \sqrt{(-1 - \sqrt{2})^2 + (-1 + \sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{1 + 2 + 2\sqrt{2} + 1 + 2 - 2\sqrt{2} + 2} = 2\sqrt{2}$$

$$\vec{BA}(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}, \sqrt{2}) \Rightarrow$$

$$BA = \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2 + (1 + \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{1 + 2 - 2\sqrt{2} + 1 + 2 + 2\sqrt{2} + 2} = 2\sqrt{2}$$


واضح أن المثلث متساوي الساقين رأسه B حيث $BC = BA$

نتأكد من أنه قائم باستخدام عكس فيثاغورث

$$BC^2 + BA^2 = AC^2$$

$$8 + 8 = 16$$

العلاقة محققة فهو قائم في B



تدريب (5) (صفحة 27):

نتأمل النقاط $A(2, 3, -1)$ و $B(2, 8, -1)$ و $C(7, 3, -1)$ و $D(1, -3, 3)$ و $E(5, 3, 3)$. أثبت أن B و C و D تقع على كرة واحدة مركزها A .

إذا كان بعد النقاط عن A متساوي

$$AB = \sqrt{(0)^2 + (8 - 3)^2 + (0)^2} = 5$$

$$AC = \sqrt{(7 - 2)^2 + 0 + 0} = 5$$

$$AE = \sqrt{(5 - 2)^2 + 0 + (3 + 1)^2} = 5$$

تدريب (3) (صفحة 31):

لدينا ثلاث نقاط في الفراغ A و B و C .

الطلب الأول: أثبت وجود نقطة وحيدة M تحقق

$$\vec{MA} + \vec{MB} - \vec{MC} = \vec{0}$$

نلاحظ من العلاقة أن M هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط

المثقلة $(A, 1), (B, 1), (C, -1)$ حيث $1 + 1 - 1 \neq 0$

ووفقاً لتعريف مركز الأبعاد المتناسبة تكون M نقطة وحيدة تحقق ما سبق.

نلاحظ أيضاً

$$\vec{MA} + \vec{MB} - \vec{MC} = \vec{0} \Rightarrow \vec{AM} = \vec{CB}$$

أي أن M صورة A وفق الانسحاب الذي شعاعه \vec{CB} .

الطلب الثاني: ما القول عن M عندما تكون A و B و C على استقامة واحدة؟

$$\vec{AM} = \vec{CB}$$

بما أن A نقطة من المستقيم (BC) ، فإن صورتها M تنتمي لـ (BC) أيضاً، أي أن النقاط الأربعة على استقامة واحدة.

الطلب الثالث: ما القول عن الرباعي $ACBM$ عندما لا تقع A و B و C على استقامة واحدة؟

$$\vec{AM} = \vec{CB}$$

نستنتج من هذه العلاقة عندما لا تكون النقاط A و B و C على استقامة واحدة يكون الرباعي $ACBM$ متوازي أضلاع.

تدريب (4) (صفحة 31):

ليكن $ABCD$ رباعي وجوه و k عدد حقيقي غير معدوم ولا يساوي 1. لتكن I و J و K و L النقاط المعرفة بالعلاقات:

$$\vec{AI} = k \vec{AB} \quad \text{و} \quad \vec{AJ} = k \vec{AD} \quad \text{و} \quad \vec{CK} = k \vec{CD}$$

$$\vec{CL} = k \vec{CB}$$

الطلب الأول: أثبت أن

$$\vec{IJ} = k \vec{BD} = \vec{LK} \quad (*)$$

واستنتج أن النقاط الأربع I و J و K و L تقع في مستوٍ واحد.

$$\vec{IJ} = k \vec{BD} = \vec{LK}$$

$$\begin{aligned} \vec{IJ} &= \vec{IA} + \vec{AJ} = -k \vec{AB} + k \vec{AD} \\ &= k(\vec{AD} - \vec{AB}) = k \vec{BD} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\vec{IJ} = k \vec{BD} = \vec{LK}$$

$$\begin{aligned} \vec{LK} &= \vec{LC} + \vec{CK} = -k \vec{CB} + k \vec{CD} \\ &= k(\vec{CD} - \vec{CB}) = k \vec{BD} \quad (2) \end{aligned}$$

من (1) و (2) أن العلاقة (*) محققة، وأن $\vec{IJ} = \vec{LK}$ أي أن المستقيم (IJ) يوازي (LK) ، فالنقاط I و J و K و L تقع في مستوٍ واحد.

الطلب الثاني: ما طبيعة الشكل الرباعي $IJKL$ ؟

بما أن $\vec{IJ} = \vec{LK}$ فالرباعي $IJKL$ متوازي أضلاع.

2] مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين (B, b) و (C, c) .

بما أن I منتصف $[BC]$ فهي مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(B, 1)$ و $(C, 1)$. أي $b = c \neq 0$.

3] مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المثقلة (A, a) و (D, d) و (B, b) و (C, c) .

نلاحظ من الشكل أن G مركز أبعاد متناسبة للنقطتين $(I, 3)$ و $(K, 2)$

ولما كانت I منتصف $[BC]$ كانت $(I, 3)$ مركز أبعاد متناسبة للنقطتين $(B, \frac{3}{2}), (C, \frac{3}{2})$.

وبما أن $\vec{KD} + 2\vec{KA} = \vec{0}$ كانت $(K, 2)$ مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(D, \frac{2}{3}), (A, \frac{4}{3})$.

أو يمكن القول بشكل أعم أن

$$\frac{a+d}{2} = \frac{b+c}{3} \Rightarrow \frac{3}{2}d = \frac{2}{3}b \Rightarrow 9d = 4b$$

أي يمكن اختيار أي ثابت تحقق العلاقات

$$\begin{cases} a = 2d \\ b = c \\ 9d = 4b \end{cases}$$

تدريب (2) (صفحة 31):

عين مركز ثقل المثلث ABC ، في حالة

$$A(-4, -1, 2), \quad B(-2, 1, 0), \quad C(6, 3, -5)$$

مركز ثقل المثلث ABC هو مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, 1)$ و $(B, 1)$ و $(C, 1)$ ، ومنه:

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

$$y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$


$$z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

$$y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

ومنه $G(0, 1, -1)$.



Please wait...

I'm thinking!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا عَلَّامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ : أَحْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، أَحْفَظُ اللَّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْتَفْتَ فَاسْتَغْنِ بِاللَّهِ، وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، زُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَتِ الصُّحُفُ"

-- تمارين إضافية عن فكرة الأبعاد المتناسبة للتكئين --

$$\vec{0} = 4 \frac{\vec{GB}}{\beta} + 3 \frac{\vec{AG}}{\alpha} + 2 \frac{\vec{GC}}{\gamma}$$

$$(A, 3), (B, 4), (C, 2)$$

تمرين (5): قطعة مستقيمة عين H مركز أبعاد متناسبة لـ

$$\left(A, \frac{1}{\alpha} \right), \left(B, \frac{2}{\beta} \right)$$

$$\vec{AH} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB} \Rightarrow \vec{AH} = \frac{2}{3} \vec{AB}$$

أو

$$\vec{HA} + 2 \frac{\vec{HB}}{\frac{\beta}{\alpha + \beta}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{HA} + 2(\vec{HA} + \vec{AB}) = \vec{0}$$

$$3\vec{HA} + 2\vec{AB} = \vec{0} \Rightarrow \vec{HA} = -\frac{2}{3}\vec{AB}$$

$$\Rightarrow \vec{AH} = \frac{2}{3}\vec{AB}$$

تمرين (6): أوجد α, β لتكون M مركز أبعاد متناسبة لـ تحقق $(A, \alpha), (B, \beta)$

$$\boxed{1} \quad \vec{AM} = \frac{2}{7}\vec{AB}$$

$$\beta = 2, \quad \alpha + \beta = 7 \Rightarrow \alpha = 5$$

$$\boxed{2} \quad 2\vec{AM} + \vec{AB} = \vec{0}$$

$$2\vec{AM} + \vec{AB} = \vec{0} \Rightarrow \vec{AM} = -\frac{1}{2}\vec{AB}$$

$$\beta = -1, \quad \alpha + \beta = 2 \Rightarrow \alpha = 3$$

$$\boxed{3} \quad \vec{MA} - 3\vec{AB} = \vec{0}$$

$$\vec{AM} = -3\vec{AB}$$

$$\beta = -3, \quad \alpha + \beta = 1 \Rightarrow \alpha = 4$$

العلاقة

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} = \vec{0}$$

تكافئ

$$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta + \gamma} \vec{AB} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} \vec{AC}$$

حيث تنتج بإدخال A للحدين الثاني والثالث من العلاقة

$$\alpha \vec{GA} + \beta \frac{\vec{GB}}{\frac{\beta}{\alpha + \beta}} + \gamma \frac{\vec{GC}}{\frac{\gamma}{\alpha + \beta}} = \vec{0}$$

تمرين (7): ABC مثلث، عين α, β, γ لتكون M مركز أبعاد متناسبة لنقاطه $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ ، وبحيث تحقق

$$\boxed{1} \quad \vec{AM} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$$

$$\beta = 2, \quad \gamma = -1$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 1 \Rightarrow \alpha = 0$$

تمرين (1): أوجد α, γ لتكون A مركز أبعاد متناسبة لـ $(B, \alpha), (C, \gamma)$



$$\frac{\vec{AB}}{\vec{AC}} = \frac{3}{8} \Rightarrow 8\vec{AB} = 3\vec{AC} \Rightarrow 8\vec{AB} - 3\vec{AC} = \vec{0}$$

ومنه A مركز أبعاد متناسبة لـ $(B, 8), (C, -3)$ أو بأسلوب آخر:

$$8\vec{AB} - 3 \frac{\vec{AC}}{\frac{\beta}{\alpha + \beta}} = \vec{0} \Rightarrow 5\vec{AB} - 3\vec{BC} = \vec{0}$$

$$\vec{AB} = \frac{3}{5}\vec{BC} \Rightarrow \vec{BA} = \frac{-3}{5}\vec{BC}$$

تمرين (2): قطعة مستقيمة عين G مركز أبعاد متناسبة لـ


$$\left(A, \frac{2}{\alpha} \right), \left(B, \frac{3}{\beta} \right)$$



$$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB} \Rightarrow \vec{AG} = \frac{3}{5}\vec{AB}$$

تمرين (3): قطعة مستقيمة عين G مركز أبعاد متناسبة لـ

$$\left(A, \frac{-1}{\alpha} \right), \left(B, \frac{2}{\beta} \right)$$



$$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB} \Rightarrow \vec{AG} = \frac{2}{1}\vec{AB}$$

تمرين (4): أوجد α, β, γ لتكون G مركز أبعاد متناسبة لـ تحقق $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$

$$\vec{BG} = -3\vec{BA} + 2\vec{GC}$$

الحل: G مركز أبعاد متناسبة للنقاط السابقة، إذاً

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} = \vec{0}$$

لدينا

$$\vec{BG} = -3\vec{BA} + 2\vec{GC} \Rightarrow$$

$$\vec{0} = -\vec{BG} - 3\vec{BA} + 2\vec{GC}$$

$$\vec{0} = \vec{GB} + 3 \frac{\vec{AB}}{\frac{\beta}{\alpha + \beta}} + 2\vec{GC}$$

$$\vec{0} = \vec{GB} + 3(\vec{AG} + \vec{GB}) + 2\vec{GC}$$



Please wait...

I'm thinking!

تمرين (9): عبر عن النقاط A و B و C بصفتها مركز أبعاد متناسبة للنقطتين المتبقيتين.



1] مركز أبعاد متناسبة

$$(A, 2), (C, 3) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AC}$$

2] مركز أبعاد متناسبة

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{BC}} = \frac{3}{2} \Rightarrow \overrightarrow{BA} = \frac{-3}{2} \overrightarrow{BC}$$

$(B, 5), (C, -3)$


3] مركز أبعاد متناسبة

$$\frac{\overrightarrow{BC}}{\overrightarrow{AB}} = \frac{2}{3} \Rightarrow \overrightarrow{BC} = \frac{2}{-3} \overrightarrow{BA}$$

$(A, 2), (B, -5)$

تمرين (10): ليكن $ABCD$ رباعي و E فيه من $[BC]$ تحقق $\overrightarrow{BE} = 2 \overrightarrow{EC}$ ، النقطة I منتصف $[DE]$ و G تحقق $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AI}$ المطلوب:

1] عين $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ لتكون G مركز أبعاد متناسبة لـ $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (D, \delta)$



$(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (D, \delta)$ لدينا

$$\overrightarrow{BE} = 2 \overrightarrow{EC} \Rightarrow 2 \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{EB} = \vec{0} \Rightarrow (E, 3)$$

و I منتصف $[DE]$ إذاً E و D لهما الثقل نفسه $(E, 3), (D, 3)$ (I,6)

وتكون $(I, 6)$ مركز أبعاد متناسبة لـ $(B, 1), (C, 2), (D, 3)$

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AI} \Rightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{6}{18} \overrightarrow{AI} \Rightarrow \alpha = 18 - 6 = 12$$

$$2] \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$$

$$\alpha = 1, \quad \gamma = -1$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 1 \Rightarrow \beta = 1$$

$$3] \overrightarrow{CM} = 3 \overrightarrow{CA} + 2 \overrightarrow{CB}$$

$$\alpha = 3, \quad \beta = 2$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 1 \Rightarrow \gamma = -4$$

$$4] \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{MB}}{\overrightarrow{MA+AB}} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} \Rightarrow 2 \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$$


$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4} \overrightarrow{AC} \Rightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{2}{4} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4} \overrightarrow{AC}$$

$$\beta = 2, \quad \gamma = 1$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 1 \Rightarrow \alpha = 1$$

تمرين (8): انطلاقاً من الشكل المجاور أوجد α, β, γ لتكون I مركز أبعاد متناسبة لـ $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ واستنتج λ التي تحقق

$$\overrightarrow{GA} + \lambda \overrightarrow{GB} = \vec{0}$$



B' منتصف $[AC]$ \Leftrightarrow فهي مركز أبعاد متناسبة لـ

$$(A, 1), (C, 1)$$

مجموع الوزنين $1+1=2$

$$(B', 2)$$

I منتصف $[BB']$ (أي للنقطتين نفس الوزن) فهي مركز أبعاد متناسبة

$$(B', 2), (B, 2)$$

$$(I, 4)$$

ومنه حسب الخاصة التجميعية $(I, 4)$ مركز أبعاد متناسبة لـ

$$(A, 1), (B, 2), (C, 1)$$

لدينا GC مار من I ويقطع AB في G ، G مركز أبعاد متناسبة لـ $(A, 1), (B, 2)$ ، أي

$$1 \overrightarrow{GA} + 2 \overrightarrow{GB} = \vec{0} \Rightarrow \lambda = 2$$



Please wait...

I'm thinking!



إذاً G مركز أبعاد متناسبة لـ $(I, 6)$ و $(A, 12)$ ،

ومنه تكون G مركز أبعاد متناسبة للنقاط

$(B, 1), (C, 2), (D, 3), (A, 12)$

[2] عين M التي تحقق

$$2\vec{AM} = \vec{AD} + \vec{AE}$$

ثم استنتج أن M تنتمي للمستوي (ADE) .

ندخل للطرف الثاني I ونستفيد من أن I منتصف

$[DE]$

$$2\vec{AM} = \underbrace{\vec{AD}}_{\vec{AI} + \vec{ID}} + \underbrace{\vec{AE}}_{\vec{AI} + \vec{IE}}$$

$$2\vec{AM} = 2\vec{AI} + \underbrace{\vec{ID} + \vec{IE}}_{\vec{0}}$$

$$\vec{AM} = \vec{AI}$$

ومنه M طبوقة على I .

$$2\vec{AM} = \vec{AD} + \vec{AE}$$

ثلاثة أشعة مرتبطة خطياً إذاً تقع في مستوي واحد.



-- معادلات أسطوانة ومخروط --

لنحسب MH

$$MH^2 = (x - 0)^2 + (y - 0)^2 + (z - z)^2$$

$$MH^2 = x^2 + y^2$$

ولما كان من الفرض $x^2 + y^2 = 9$ ، فإن

$$MH^2 = 9 \Rightarrow MH = 3$$

ومنه فإن النقطة M تنتمي للأسطوانة المفروضة، وتكون معادلة هذه الأسطوانة:

$$x^2 + y^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 7$$

3. أي النقاط الآتية تقع على الأسطوانة $D(3,0,3)$

$$F(1,3,1) \text{ و } E(\sqrt{3}, \sqrt{6}, 4)$$



$x^2 + y^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 7$		
$D(3,0,3)$	$E(\sqrt{3}, \sqrt{6}, 4)$	$F(1,3,1)$
تحقق معادلة الأسطوانة	تحقق معادلة الأسطوانة	لا تحقق معادلة الأسطوانة (لا تقع)
$3^2 + 0 = 9$ $0 \leq z = 3 \leq 7$	$3 + 6 = 9$ $0 \leq z = 4 \leq 7$	$1 + 3^2 \neq 9$

4. (a) جد معادلة للأسطوانة التي محورها (O, \vec{j}) وقاعدتها الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2.

مركز قاعدتها
نصف قطرها
المحور (الارتفاع)

إذا كان h ارتفاع الأسطوانة فإن معادلتها:

$$x^2 + z^2 = 4, \quad 0 \leq y \leq h$$

4. (b) أعد السؤال (a) في حال مركز قاعدة الأسطوانة هو النقطة $Q(0,8,0)$.

إذا كان h ارتفاع الأسطوانة فإن معادلتها:

$$x^2 + z^2 = 4, \quad 8 \leq y \leq h + 8$$

5. جد معادلة للأسطوانة التي محورها (O, \vec{i}) ومركز قاعدتها $T(3,0,0)$ ونصف قطرها $\sqrt{6}$.

إذا كان h ارتفاع الأسطوانة فإن معادلتها:

$$y^2 + z^2 = 6, \quad 3 \leq x \leq h + 3$$

-- معادلة أسطوانة --

لتكن A النقطة التي إحداثياتها $(0,0,7)$ في معلم متجانس معطى في الفراغ $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نتأمل الأسطوانة المولدة من دوران الضلع $[BC]$ من المستطيل $OABC$ حول المستقيم (OA) ، حيث $AB = 3$ ، ولتكن M نقطة متحولة من الأسطوانة مسقطها القائم على القطعة المستقيمة $[OA]$ هو H .

1. نفترض أن $M(x, y, z)$. ما إحداثيات H ؟ أثبت أن إحداثيات M تحقق العلاقاتين

$$0 \leq z \leq 7 \text{ و } x^2 + y^2 = 9$$

$$MH = 3$$

بما أن H المسقط القائم للنقطة $M(x, y, z)$ على المحور Oz فإحداثيات H تكون $(0,0,z)$ ، وهي نقطة من $[OA]$ إذاً

$$0 \leq z \leq 7$$

وبما أن $MH = 3$ فإن $MH^2 = 9$ ، أي

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 + (z - z)^2 = 9$$

$$x^2 + y^2 = 9$$


2. بالعكس إذا كانت $M(x, y, z)$ نقطة من الفراغ تحقق

إحداثياتها $x^2 + y^2 = 9$ و $0 \leq z \leq 7$ فأثبت

أن $MH = 3$ واستنتج أن M تقع على الأسطوانة.

تكون M من الأسطوانة إذا كان بعدها عن محور الأسطوانة Oz يساوي 3، أي إذا كان $MH = 3$ حيث H مسقط M على محور الأسطوانة،

ولما كانت $M(x, y, z)$ فإن $H(0,0,z)$ حيث $0 \leq z \leq 7$ كما في الفرض.



--معادلة مخروط--

لتكن A النقطة التي إحداثياتها $(0,0,5)$ في معلم متجانس معطى في الفراغ $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، تتأمل المخروط المولد من دوران الضلع $[OK]$ من المثلث OAK القائم في A حول المستقيم (OA) ، حيث $AK = 2$.

1. لتكن M نقطة من المخروط و H مسقطها القائم على القطعة المستقيمة $[OA]$.

(a) أثبت أن

$$MH^2 = \frac{4}{25} OH^2 \quad \text{ثم} \quad \frac{MH}{OH} = \frac{2}{5}$$

(b) اكتب المساواة السابقة بدلالة إحداثيات M ولتكن (x, y, z) وأثبت أنه إذا كانت $M(x, y, z)$ نقطة من المخروط كان:

$$0 \leq z \leq 5 \quad \text{و} \quad x^2 + y^2 - \frac{4}{25} z^2 = 0$$

من تشابه المثلثين OAK و OHM تتناسب الأضلع أو من


$$\tan \widehat{HOM} = \tan \widehat{AOK}$$

نصف قطر الدائرة

$$\frac{MH}{OH} = \frac{\widehat{AK}}{OA} = \frac{2}{5} \Rightarrow MH^2 = \frac{4}{25} OH^2$$

إن مسقط $M(x, y, z)$ على Oz هو $H(0,0, z)$ حيث

$$0 \leq z \leq 5$$



وبالتالي:

$$MH^2 = \frac{4}{25} OH^2 \Rightarrow$$





$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 + (z - z)^2 = \frac{4}{25} z^2$$

6. صف مجموعة النقط $M(x, y, z)$ التي تحقق إحداثياتها العلاقات

$$1 \leq z \leq 4 : x^2 + y^2 = 25$$

مجموعة النقاط M واقعة على أسطوانة مركز قاعدتها النقطة $(0,0,1)$ ونصف قطرها 5، ومحورها Oz ، وارتفاعها

$$h = 4 - 1 = 3$$



Please wait...

I'm thinking!




4. اكتب معادلة المخروط الذي رأسه O ومحوره (O, \vec{i}) وقاعدته الدائرة التي مركزها $B(4,0,0)$ ونصف قطرها 3.

في هذه الحالة محور المخروط هو Ox ، وليكن $H(x,0,0)$ مسقط M على المحور Ox وحيث $0 \leq x \leq 4$

$$\frac{MH}{OH} = \frac{3}{4}$$

والمعادلة تكون:

$$y^2 + z^2 - \frac{4}{25}x^2 = 0; \quad 0 \leq x \leq 4$$



ومنه معادلة المخروط:

$$x^2 + y^2 - \frac{4}{25}z^2 = 0; \quad 0 \leq z \leq 5$$

2. بالعكس لتكن $M(x,y,z)$ نقطة من الفراغ تحقق إحداثياتها العلاقات

$$0 \leq z \leq 5 \quad \text{و} \quad x^2 + y^2 - \frac{4}{25}z^2 = 0$$

أثبت أنه إذا كان $z \neq 0$ كان $\frac{MH}{OH} = \frac{2}{5}$ ، واستنتج أن M تقع على المخروط، ولا تنسى حالة $z = 0$.

بفرض H مسقط M على Oz فإن $H(0,0,z)$ حيث $0 \leq z \leq 5$

لدينا

$$MH^2 = (x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-z)^2 = x^2 + y^2$$

$$OH^2 = 0 + 0 + (z-0)^2 = z^2$$

ولدينا من الفرض

$$\frac{x^2 + y^2}{MH^2} - \frac{4}{25} \frac{z^2}{OH^2} = 0 \Rightarrow MH^2 = \frac{4}{25} OH^2$$

$$\Rightarrow MH = \frac{2}{5} OH \Rightarrow \frac{MH}{OH} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{MH}{OH} = \frac{2}{5} = \frac{AK}{OA}$$

وبالتالي فإن M نقطة من الضلع $[OK]$ فهي من المخروط حتماً.

في حال كانت $z = 0$ فإن H تنطبق على $O(0,0,0)$ ومنه M تنطبق على O أيضاً، و O نقطة من المخروط وضوحاً.

3. عين من بين النقاط الآتية تلك التي تقع على المخروط مبرراً إجابتك

$$T(2,2\sqrt{3},10), S(1,1,3), R(-2,1,5), Q(2,0,5)$$

$x^2 + y^2 - \frac{4}{25}z^2 = 0; \quad 0 \leq z \leq 5$	
$T(2,2\sqrt{3},10)$	$S(1,1,3)$
لا تحقق المعادلة	لا تحقق المعادلة
$0 \leq z = 10 \not\leq 5$	$1^2 + 1^2 - \frac{4}{25}3^2 \neq 0$
$R(-2,1,5)$	$Q(2,0,5)$
لا تحقق المعادلة	تحقق المعادلة
$4 + 1 - \frac{4}{25}25 \neq 0$	$4 + 0 - \frac{4}{25}25 = 0$
$1 \neq 0$	$0 \leq z = 5 \leq 5$

عن النبي ﷺ فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي كلّم ضالاً إلا من هديته فاستهذوني أهدكم، يا عبادي كلّم جاعاً إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلّم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تحطنون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ..."

-- تمارينات ومسائل الوحدة الأولى --

الطلب الرابع:
لتكن K منتصف $[AD]$ و L منتصف $[BC]$ أثبت أن:

$$\vec{IK} = \frac{1}{2}\vec{BD}$$


لدينا:

$$\begin{aligned}\vec{IK} &= \vec{IA} + \vec{AK} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{AD} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\vec{AD}}{\vec{AB}+\vec{BD}} - \vec{AB}\right) = \frac{1}{2}\vec{BD}\end{aligned}$$

وبالمثل نجد:

$$\vec{LJ} = \frac{1}{2}\vec{BA}$$

من النتيجتين نجد $\vec{IK} = \vec{LJ}$ فالشكل $IKJL$ متوازي أضلاع.



المسألة الثانية: (صفحة 35)

$ABCD$ رباعي وجوه. وضع على الشكل النقاط...
الطلب الأول: بين وضع I بالنسبة لـ \vec{BA} والمحقة I مركز الأبعاد المتناسبة $(A, 1), (B, 2)$.
لدينا


$$\begin{aligned}\vec{IA} + 2\vec{IB} &= \vec{0} \\ \vec{IA} + 2\vec{IB} &= \vec{0} \\ \vec{IB} + \vec{BA} + 2\vec{IB} &= \vec{0} \\ \vec{BI} &= \frac{1}{3}\vec{BA}\end{aligned}$$

الطلب الثاني: J مركز الأبعاد المتناسبة $(D, 1), (C, 2)$

$$\begin{aligned}2\vec{JC} + \vec{JD} &= \vec{0} \\ 2\vec{JC} + \vec{JC} + \vec{CD} &= \vec{0} \\ \vec{CJ} &= \frac{1}{3}\vec{CD}\end{aligned}$$



المسألة الأولى: (صفحة 35)
 $ABCD$ رباعي وجوه. I منتصف $[AB]$ و J منتصف $[CD]$ و O منتصف $[IJ]$



الطلب الأول: املا الفراغ

$$\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AN} = \vec{AD} + \dots + \vec{CD}$$

$$\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AN} = \vec{AD} + \vec{DB} + \vec{CD}$$

استنتج أن:

$$\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AD} + \vec{CB}$$

لدينا

$$\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AD} + \vec{CD} + \vec{DB} = \vec{AD} + \vec{CB}$$

الطلب الثاني: بسط كلاً من

$$\boxed{1} \vec{AI} + \vec{IJ} + \vec{JC} = \vec{AC}$$

$$\boxed{2} \vec{BI} + \vec{IJ} + \vec{JD} = \vec{BD}$$

استنتج أن

$$\vec{AC} + \vec{BD} = 2\vec{IJ}$$

بجمع $\boxed{1}$ و $\boxed{2}$ مع ملاحظة المنتصفات نجد المطلوب.

الطلب الثالث:

(1) لماذا؟

$$\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OI}$$

لأن \vec{OI} نصف قطر متوازي الأضلاع المنشأ على \vec{OA} و \vec{OB} .

(2) لماذا؟

$$\vec{OC} + \vec{OD} = 2\vec{OJ}$$

لأن \vec{OJ} نصف قطر متوازي الأضلاع المنشأ على \vec{OC} و \vec{OD} .

استنتج

$$\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$$

بجمع (1) و (2) وملاحظة O منتصف $[\vec{IJ}]$.



Please wait...

... يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجَكُمْ وَأَسْكَمَ وَجْهَكُمْ كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجَكُمْ وَأَسْكَمَ وَجْهَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجَكُمْ وَأَسْكَمَ وَجْهَكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ عَدْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، ...

خطأ،

$$\begin{aligned} 2\vec{IA} &= \vec{DA} + \vec{BC} + \vec{CA} \\ 2\vec{IA} &= \vec{DA} + \vec{CA} + \vec{BC} \\ 2\vec{IA} &= \vec{DI} + \vec{IA} + \vec{CI} + \vec{IA} + \vec{BI} + \vec{IC} \\ \vec{DI} + \vec{BI} &= \vec{0} \\ \vec{ID} + \vec{IB} &= \vec{0} \end{aligned}$$

I منتصف \vec{DB} .

3. نتأمل الأشعة $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ نفترض أن أي شعاعين منها ليسا مرتبطين خطياً، عندها تكون الأشعة $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ غير مرتبطة خطياً.

نميز حالتين

1} في مستو واحد مرتبطة
2} ليست في مستو واحد غير مرتبطة

4. النقاط $A(5,1,3)$ و $B(2, -\sqrt{5}, -2)$ و $C(3, -3, 3)$ و $K(2, 0, 1)$ متساوية البعد عن $K(2, 0, 1)$.

العبارة صحيحة لأن

$$AK^2 = 14, BK^2 = 14, CK^2 = 14$$

5. النقاط

$F(5,1,1), E(1,2,6), D(0, -2, 0), C(4, 0, 0)$ تنتمي إلى المستوي المحوري للقطعة المستقيمة التي طرفيها $B(2, 2, 0), A(4, -2, 2)$.

نكتب معادلة المستوي المحوري:

نفرض $M(x, y, z)$ من هذا المستوي،

$$MA^2 = MB^2 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-0)^2 \\ = (x-4)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 \end{aligned}$$

ومنه

$$x - 2y + z - 4 = 0$$

نعوض كل نقطة:

C تقع في المستوي و D تقع و F تقع، E لا تقع في المستوي.


المسألة الرابعة: (صفحة 36)

--إثبات وقوع نقاط في مستو واحد--


$A(2, 0, 1)$ والنقاط $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ معلم متجانس، والنقاط

$E(3, 1, 2), D(-3, -5, 6), C(5, 5, 0), B(1, -2, 1)$

أثبت أن النقاط A, B, C, D تقع في مستو واحد \mathcal{P} ، وبين إذا كانت E تنتمي إلى المستوي.



الرسم هنا غير مطلوب ولن يساعدك في الحل كثيراً (عليك بحل المسألة تحليلياً)



الطلب الثالث: مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(D, 1), (C, 2)$ و $(B, 2), (A, 1)$

تقع K منتصف $[IJ]$ لتساوي التقليل في I و J
 $(I, 3), (J, 3)$

الطلب الرابع: L مركز الأبعاد المتناسبة $(B, -2), (A, 1)$

$$\vec{LA} - 2\vec{LB} = \vec{0}$$

$$\vec{LA} - 2(\vec{LA} + \vec{AB}) = \vec{0}$$

$$-\vec{LA} - 2\vec{AB} = \vec{0}$$

$$\vec{AL} = 2\vec{AB}$$

الطلب الخامس: M مركز الأبعاد المتناسبة $(B, -2)$ و $(A, 1)$ و $(C, -1)$.

$$\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC} = \vec{0}$$

فهي منتصف $[LC]$

الطلب السادس: N مركز الأبعاد المتناسبة $(B, -2)$ و $(A, 1)$ و $(C, -1)$ و $(D, 1)$.

$$\vec{NA} - 2\vec{NB} + \vec{NC} + \vec{ND} = \vec{0}$$

$$\vec{ND} - 2\vec{NM} = \vec{0}$$

$$\vec{ND} - 2(\vec{ND} + \vec{DM}) = \vec{0}$$

$$\vec{DN} = 2\vec{DM}$$

المسألة الثالثة: (صفحة 35)

في المقولات الآتية، بين الصحيح من الخطأ معللاً إجابتك.

1. مثلث ABC مهما كانت D من الفراغ كانت الأشعة

\vec{DA} و \vec{DB} و \vec{DC} مرتبطة خطياً.

1} خارج المستوي (ABC) لا يمكن أن تكون الأشعة مرتبطة لأنها ليست على استقامة واحدة

2} داخل المستوي (ABC) نعم

$$\exists \alpha, \beta: \vec{DC} = \alpha\vec{DA} + \beta\vec{DB}$$

2. $ABCD$ رباعي وجوه و I نقطة تحقق

$$2\vec{IA} = \vec{DA} + \vec{BC} + \vec{CA}$$

عندئذ تقع I على أحد حروف رباعي الوجوه.

الحل: خطوات الحل

1] نوجد شعاعين غير مرتبطين مثلًا \vec{AC} و \vec{AB}

2] نثبت أن D واقعة في المستوى (ABC) غير مرتبطين

$$\begin{cases} \vec{AB} = (-1, -2, 0) \\ \vec{AC} = (3, 5, -1) \end{cases} \quad [1]$$

2] لنرى إمكانية كتابة \vec{AD} بدلالة \vec{AB} و \vec{AC} ،

$$\vec{AD} = (-5, -5, 5) = \alpha \vec{AB} + \beta \vec{AC}$$

$$\alpha = -10 \left\{ \begin{array}{l} -5 = -\alpha + 3\beta \\ -5 = -2\alpha + 5\beta \\ 5 = -\beta \end{array} \right.$$

إذاً النقاط A, B, C, D واقعة في مستو واحد.

هل تنتمي E إلى مستوي النقط الأربعة؟

نبحث عن وجود شعاع \vec{AE} في المستوي بحيث

$$\vec{AE} = \alpha \vec{AB} + \beta \vec{AC}$$

$$(1, 1, 1) = \alpha(-1, -2, 0) + \beta(3, 5, -1)$$

بحلها نجد $\alpha = -3$ و $\alpha = -4$ وبالتالي لا يمكن تحقق

المعادلات لوجود قيمتين، إذاً E لا تنتمي.

المسألة الخامسة: (صفحة 37)

--إثبات تقاطع مستقيمين--

$(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ معلم متجانس، والنقطتين $A(3, -1, 1)$ و

$B(3, -3, -1)$ ، والشعاعان $\vec{u}(1, 0, -2)$ و $\vec{v}(2, 1, -3)$


d مستقيم مار من A وموجه بالشعاع \vec{u}

d' مستقيم مار من B وموجه بالشعاع \vec{v}

أثبت أن d و d' متقاطعان، ثم أوجد نقطة تقاطعها I .

1] نثبت أن d و d' غير متوازيين

2] يقعان في مستو واحد



1] إن d لا يوازي d' لأن \vec{u} لا يوازي \vec{v} لعدم تناسب المركبات

$$\frac{1}{2} \neq \frac{0}{1} \neq \frac{-2}{-3}$$

2] لنبحث عن وجود d و d' بمستو واحد، يكفي أن نبرهن أن:

\vec{AB} و \vec{u} و \vec{v} مرتبطة خطياً

$$\vec{AB} = (0, -2, -2)$$

والسؤال هل يوجد $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ بحيث

$$\vec{AB} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$$

الجواب نعم

$\alpha = 4$ و $\beta = -2$ فالمستقيمان يقعان بمستو واحد.

إيجاد نقطة التقاطع

$$\vec{AI} = \alpha \vec{u} \iff d \text{ من } I$$

$$\vec{BI} = \beta \vec{v} \iff d' \text{ من } I$$

$$\vec{AI} = (x - 3, y + 1, z - 1)$$

$$\vec{BI} = (x - 3, y + 3, z + 1)$$

$$\begin{array}{|l} \vec{AI} = \beta \vec{v} \\ x = 7, y = -1, \\ z = -7 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \vec{AI} = \alpha \vec{u} \\ z + 2x = 7, y = -1 \end{array} \right.$$

تحقق المعادلة، إذاً

$$I = (7, -1, -7)$$


المسألة السادسة: (صفحة 38)

--التوازي في الفراغ--

مكعب $ABCDEFGH$. نقطة I تحقق $[\vec{CD}]$ تحقق $\vec{DI} = \frac{1}{4} \vec{DC}$

والنقطة J من $[BC]$ تحقق $[\vec{BC}]$ تحقق $\vec{BJ} = \frac{3}{4} \vec{BC}$ ، أثبت أن المستقيم

(HI) يوازي المستوي (EGJ) .



نثبت أن \vec{HI} يرتبط بمستقيمين متقاطعين في المستوي

\vec{EG} و \vec{EJ} أي نثبت أن الأشعة الثلاثة السابقة مرتبطة

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \vec{HI} = \alpha \vec{EG} + \beta \vec{EJ} \quad *$$


(حتى نستطيع تعيين الإحداثيات وإيجاد المجاهيل α, β)

نختار المعلم $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ فنجد

$$I \left(\frac{1}{4}, \quad \quad \quad 1, \quad \quad \quad 0 \right)$$

مستقيها على AD هو D و D بعدها عن A يساوي 1

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ أَنَسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: ...



نبحث عن المستقيم المشترك للمستويين (DCGH) و (MNP)

\overrightarrow{HG} و \overrightarrow{NP} يقعان في نفس المستوي (EFGH) وغير متوازيين فهما متقاطعان، ولتكن Q نقطة تقاطعهما من Q نرسم موازي لـ \overrightarrow{MN} يقطع الحرف GC في R، ويقطع DC في S. نستنتج أن (MNP) يقطع (DCGH) بالفصل المشترك (RS).

بالمثل نبحث عن المستقيم المشترك بين المستويين (ABCD) و (MNP)

لاحظ أن المستوي (ABCD) يوازي (EFGH) الموجود فيه المستقيم (NP) نرسم من النقطة S الموجودة على [DC] مستقيماً موازياً لـ (NP) يقطع (AD) في T. فيكون (ST) الفصل المشترك للمستويين.

كذلك نبحث عن المستقيم المشترك بين المستويين (EADH) و (MNP)

الفصل المشترك (MT)	M مشتركة بين المستويين
	T مشتركة بين المستويين

والمستقيم المشترك بين المستويين (ABFE) و (MNP)

الفصل المشترك (MN)	M مشتركة بين المستويين
	N مشتركة بين المستويين

والمستقيم المشترك بين المستويين (EFGH) و (MNP)

الفصل المشترك (NP)	N مشتركة بين المستويين
	P مشتركة بين المستويين

والمستقيم المشترك بين المستويين (FBCG) و (MNP)

الفصل المشترك (PR)	P مشتركة بين المستويين
	R مشتركة بين المستويين

$$H \left(0, \frac{1}{4}, 1 \right)$$

مسطحتها على AD هو D و D بعدها عن A يساوي 1

$$J \left(1, \frac{3}{4}, 0 \right)$$

مسطحتها على AB هو B و B بعدها عن A يساوي 1

$$I \left(\frac{1}{4}, 1, 0 \right) \quad H(0,1,1)$$

$$J \left(1, \frac{3}{4}, 0 \right) \quad E(0,0,1)$$

$$G(1,1,1) \quad E(0,0,1)$$

$$\overrightarrow{HI} = \left(\frac{1}{4}, 0, -1 \right)$$

$$\overrightarrow{EJ} = \left(1, \frac{3}{4}, -1 \right)$$

$$\overrightarrow{EG} = (1,1,0)$$


نعوض في * نجد:

$$\alpha = -\frac{3}{4}, \quad \beta = 1$$

المسألة السابعة: (صفحة 39)

--مقطع مكعب بمستوي--

مكعب ABCDEFGH. M و N و P ثلاث نقاط من الأحرف [AE] و [EF] و [FG] بالترتيب، أوجد مقطع المكعب بالمستوي (MNP).



يعتمد الحل على فكرة: إذا قطع مستوي مستويين

متوازيين \Leftarrow يقطعهما بمستقيمين متوازيين

نلاحظ (MNP) يقطع (ABFE) بالمستقيم (MN) فهو يقطع المستوي الموازي له (DCGH)،

... " أَوَلَيْسَ فَمَجَلَّ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنْ يَكُنْ تَسْبِيحَةَ صَدَقَةٍ. وَكُنْ تَكْبِيرَةَ صَدَقَةٍ وَكُنْ تَحْمِيدَةَ صَدَقَةٍ وَكُنْ تَهْلِيلَةَ صَدَقَةٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٍ وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ "

المسألة الثامنة: (صفحة 39)

--حساب مسافة--

هرم $ABCDE$ رأسه E وقاعدته مربع $[BE]$ عمودي على المستوي $(ABCD)$ ، $EB = 4\sqrt{2}$ و $AB = 4$.
 نقطة M من القطعة $[ED]$ تحقق $3\overline{DM} = \overline{DE}$ ، لتكن P المسقط القائم للنقطة M على المستوي $(ABCD)$ و H المسقط القائم للنقطة P على المستقيم (AB) .
 احسب طول القطعة المستقيمة $[MH]$.


هناك طريقتين للحل إما من خلال تشابه المثلثات،

أو باستخدام الأشعة (حساب مسافة (ولديك زاوية قائمة

في الشكل) ← خذ معلماً متجانساً

$$HM^2 = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}\right)^2 + \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{32}{9} + \frac{64}{9} = \frac{96}{9}$$

$$\Rightarrow HM = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$



الطريقة الثانية: بأخذ $(B; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ معلم متجانس حيث
 $\overline{BA} = 4\vec{i}$, $\overline{BC} = 4\vec{j}$, $\overline{BE} = 4\sqrt{2}\vec{k}$
 وبالتالي:

$$D(4,4,0)$$

$$E(0,0,4\sqrt{2})$$

نحدد إحداثيات النقطة M بالاستفادة من العلاقة:

$$3\overline{DM} = \overline{DE}$$

$$3(x-4, y-4, z-0) = (-4, -4, 4\sqrt{2})$$

$$\Rightarrow x = \frac{8}{3}, y = \frac{8}{3}, z = \frac{4\sqrt{2}}{3} \Rightarrow M\left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}, \frac{4\sqrt{2}}{3}\right)$$

P المسقط القائم للنقطة M على $(ABCD)$ وبالتالي:

$$P\left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}, 0\right)$$

H المسقط القائم للنقطة P على المستقيم (AB)


$$H\left(\frac{8}{3}, 0, 0\right)$$

ومنه

$$MH^2 = \left(\frac{8}{3} - \frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{8}{3} - 0\right)^2 + \left(\frac{4\sqrt{2}}{3} - 0\right)^2$$

$$MH^2 = \frac{64}{9} + \frac{32}{9} = \frac{96}{9}$$

$$\Rightarrow MH = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$



الطريقة الأولى: الفكرة منها حساب $[MH]$ من المثلث MPH القائم في P ,

$$HM^2 = \underbrace{MP^2}_{\text{تشابه المثلثين } \triangle DEB, \triangle DMP} + \underbrace{PH^2}_{\text{تشابه المثلثين } \triangle BAD, \triangle BPH}$$

$BD = 4\sqrt{2}$ لأنه قطر المربع وهو مسقط ED ، ومنه P مسقط M على مستوي المربع تقع على القطر BD .
 من تشابه المثلثين DEB, DMP نستنتج

$$\frac{DM}{DE} = \frac{MP}{EB} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{MP}{4\sqrt{2}} \Rightarrow MP = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

ويكون حسب تالس في المثلث EBD :

$$\frac{BP}{BD} = \frac{2}{3}$$

ومن تشابه المثلثين BAD, BPH (لتوازي PH مع AD (العمودان على مستقيم واحد متوازيان)) نجد:

$$\frac{BP}{BD} = \frac{PH}{AD} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{PH}{4} \Rightarrow PH = \frac{8}{3}$$


ومن المثلث MPH القائم في P ,

$$HM^2 = MP^2 + PH^2$$

قال رسول الله ﷺ: " كُلُّ سَلَامَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطَلَّعَ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعَدَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَيَكُلُّ خُطْوَةً تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ "

المسألة التاسعة: (صفحة 40)

ABCD رباعي وجوه، و a عدد حقيقي. I منتصف $[AB]$ و J منتصف $[CD]$. E و F نقطتان تحققان العلاقتين:
 $\overline{BF} = a\overline{BC}$ و $\overline{AE} = a\overline{AD}$
 و H منتصف $[EF]$ ، أثبت أن I و J و H تقع على استقامة واحدة.



اثبات وقوع النقاط الثلاث من خلال مركز الأبعاد المتناسبة

(ثبت H مركز أبعاد متناسبة لـ (I, J))

فكرة الحل:

الخطوة الأولى: نبدأ بإثبات أن:

$$E \text{ [1] مركز أبعاد متناسبة لـ } (D, a), (A, 1 - a)$$

(E,1)

$$F \text{ [2] مركز أبعاد متناسبة لـ } (C, a), (B, 1 - a)$$

(F,1)

فيكون مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط في منتصف EF أي H .
 الخطوة الثانية: نثبت أن مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط الأربعة $(D, a), (A, 1 - a), (C, a), (B, 1 - a)$ يقع على IJ .
 وبالتالي IJ يمر من H \Leftrightarrow إذا هم على استقامة واحدة.

الحل:

بما أن

$$\overline{AE} = a\overline{AD}$$

$$\overline{AE} = a(\overline{AE} + \overline{ED})$$

$$\overline{AE} - a\overline{AE} - a\overline{ED} = \overline{0}$$

$$(1 - a)\overline{AE} - a\overline{ED} = \overline{0}$$

$$-(1 - a)\overline{EA} - a\overline{ED} = \overline{0}$$

$$(1 - a)\overline{EA} + a\overline{ED} = \overline{0}$$

فالنقطة E مركز الأبعاد المتناسبة لـ $(D, a), (A, 1 - a)$.

بالمثل نجد أن:

$$(1 - a)\overline{FB} + a\overline{FC} = \overline{0}$$

فالنقطة F مركز الأبعاد المتناسبة لـ $(C, a), (B, 1 - a)$
 وبالتالي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(C, a), (B, 1 - a)$ و $(D, a), (A, 1 - a)$

مجموعهما 1

مجموعهما 1

هو مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(F, 1), (E, 1)$.

وهو في منتصف EF لتساوي الثقلين في E و F أي في H .

الخطوة الثانية:

مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين

$$(B, 1 - a), (A, 1 - a)$$

هو منتصف AB لتساوي الثقلين فيهما، أي $(I, 2 - 2a)$.

$$(C, a), (D, a) \quad (B, 1 - a), (A, 1 - a)$$

مجموعهما $2a$

مجموعهما $2 - 2a$

ومركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين

$$(C, a), (D, a)$$

هو منتصف DC لتساوي الثقلين فيهما، أي $(J, 2a)$.

وبالتالي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط الأربعة يقع على IJ ، أي أن IJ يمر من H .


وبالتالي النقاط I و J و H تقع على استقامة واحدة.

المسألة العاشرة: (صفحة 41)

A و B و C ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة من الفراغ، و E و D نقطتان تحققان العلاقتين:

$$\overline{AE} = 3\overline{CE} \text{ و } 3\overline{AD} = 2\overline{AB}$$

الطلب الأول: أثبت النقاط A و B و C و E و D تقع في مستوي واحد.



(ABC) مستوي، نثبت أن E و D تنتمي إليه

(ABC) مستوي

نثبت D تنتمي إليه

نثبت E تنتمي إليه

من خلال الارتباط الخطي لـ

$$\overline{AD}, \overline{AB}$$

$$\overline{AE}, \overline{AC}$$

D واقعة على (AB) أي بالمستوي (ABC)


E واقعة على (AC) أي بالمستوي (ABC)

القطعتين BC و AE متناصفتان (E نظيرة A بالنسبة لمنتصف BC) وبالتالي $ACEB$ متوازي أضلاع لتناصف قطريه، وبالتالي:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BE}$$

القطعتين DC و AF متناصفتان (F نظيرة A بالنسبة لمنتصف DC) وبالتالي $ACFD$ متوازي أضلاع لتناصف قطريه، وبالتالي:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DF}$$




الطلب الثاني: استنتج أن للقطعتين $[DE]$ و $[FB]$ المنتصف نفسه.


من الطلب السابق وجدنا أن

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DF}$$

فالشكل $DFEB$ متوازي أضلاع قطراه $[FB]$ و $[DE]$ متناصفتان.



الطلب الثالث: أثبت أن المستقيمات (BF) و (DE) و (CG) متلاقية في نقطة واحدة.



من الطلب الأول وجدنا أن $ACEB$ متوازي أضلاع، وبالتالي

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$$

ولدينا القطعتين BD و AG متناصفتان (G نظيرة A بالنسبة لمنتصف BD) وبالتالي $ABGD$ متوازي أضلاع لتناصف قطريه، وبالتالي:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DG}$$

$$\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{CE}$$

$$\overrightarrow{AE} = 3(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE})$$

$$3\overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{0}$$

$$2\overrightarrow{AE} = -3\overrightarrow{CA} = 3\overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

فالنقطة E واقعة على (AC) أي بالمستوي (ABC) . ولدينا أيضاً

$$3\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

فالنقطة D واقعة على (AB) أي بالمستوي (ABC) .

وبالتالي النقاط A و B و C و E و D تقع في مستو واحد. الطلب الثاني: لتكن I منتصف $[CD]$ و J منتصف $[BE]$. أثبت وقوع النقاط A و I و J على استقامة واحدة.

الارتباط الخطي بين \overrightarrow{AI} , \overrightarrow{AJ} (استفد من الطلب السابق) لدينا

$$\boxed{1} \quad 2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$$

$$\boxed{2} \quad 2\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AB}$$

ولدينا من الطلب السابق

$$\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AD}$$

نعوض في [2]


$$2\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{3}{2}2\overrightarrow{AI}$$

$$\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AJ}$$


المسألة الحادية عشرة: (صفحة 41)

$ABCD$ رباعي وجوه E و F و G هي نظائر A بالنسبة إلى منتصفات $[BC]$ و $[CD]$ و $[DB]$ بالترتيب: الطلب الأول: أثبت أن

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BE} \quad \text{و} \quad \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DF}$$



اثبات متوازي أضلاع من خلال تناصف الأقطار والاستفادة من الطلبات السابقة



في المثلث ADC لدينا

$$[1] \quad \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC}$$

في المثلث DCE لدينا

$$[2] \quad \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EC}$$

بجمع [1] و [2] نجد:

$$\boxed{2\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DE}}$$

حيث \overrightarrow{AC} و \overrightarrow{EC} متعاكسان (مجموعهم $\vec{0}$)، الآن نعوض في

$$\overrightarrow{DG} = 2\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC}$$

ومنه فإن الأشعة \overrightarrow{BC} و \overrightarrow{DC} و \overrightarrow{DG} مرتبطة خطياً، وبالتالي تكون في مستوى واحد، أي أن النقاط G, D, C, B تقع في مستوى واحد.

المسألة الثالثة عشر: (صفحة 41)

نتأمل في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقاط $A(3,2,1)$ و $B(1,2,0)$ و $C(3,1,-2)$.
الطلب الأول: أثبت أن النقاط C, B, A ليست على استقامة واحدة.

نثبت أن \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{AC} غير مرتبطان خطياً

$$\overrightarrow{AB} = (1 - 3, 2 - 2, 0 - 1)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-2, 0, -1)$$

$$\overrightarrow{AC} = (3 - 3, 1 - 2, -2 - 1)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC} = (0, -1, -3)$$

$$\frac{-2}{0} \neq \frac{0}{-1} \neq \frac{-1}{-3}$$

واضح أن المركبات غير متناسبة وبالتالي الشعاعان غير مرتبطان خطياً وبالتالي النقاط C, B, A ليست على استقامة واحدة.


$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{DG}$$

وبالتالي $DCEG$ متوازي أضلاع قطراه $[GC]$ و $[DE]$ ومتناصفان ولدينا من الطلب السابق $DFEB$ متوازي أضلاع قطراه $[DE]$ و $[FB]$ متناصفان، وبالتالي نستنتج أن (BF) و (DE) و (CG) متناصفة فهي متلاقية في نقطة واحدة.

المسألة الثانية عشر: (صفحة 41)

$ABCD$ رباعي وجوه، E هي نظيرة A بالنسبة إلى C ، و F و G هما النقطتان اللتان تجعلان $EBCF$ و $FDAG$ متوازي أضلاع:
الطلب الأول: أثبت أن

$$[*] \quad \overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{BC}$$



مفتاح الحل DG قطر متوازي الأضلاع $FDEG$

$$\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DF}$$

$$\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF}$$

$$\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{BC}$$

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC}$ في متوازي الأضلاع $EBCF$ وبالتالي:

$$\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{BC}$$

الطلب الثاني: استنتج أن

$$\overrightarrow{DG} = 2\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC}$$

ثم أن النقاط G, D, C, B تقع في مستوى واحد.

استنتاج أن $2\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DE}$ (إما من المبرهنة

حيث C منتصف $[AE]$ أو كما يلي)

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: "لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم حنة، والصدقة تطفي الخطيئة كما تطفي الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا: "تتجافى جنوبهم عن المضاجع" حتى بلغ: "يعلمون"....

المسألة الرابعة عشر: (صفحة 41)

--مجموعة نقاط--

لتكن \mathcal{E} مجموعة النقاط $M(x, y, z)$ التي تحقق احداثياتها العلاقة


$$x - 2y + 3z - 5 = 0 \quad (*)$$

الطلب الأول: أثبت أن النقاط $A(7,1,0)$ و $B(5,0,0)$ و $C(2,0,1)$ تنتمي إلى المجموعة \mathcal{E} .

نعوض في معادلة المستوي

إذا كانت النقاط تحقق المعادلة (*) فهي تنتمي إلى المجموعة \mathcal{E} .

	$x - 2y + 3z = 5$	
$A(7,1,0)$	$7 - 2 + 0 = 5$	محقة $5 = 5$
$B(5,0,0)$	$5 - 0 + 0 = 5$	محقة $5 = 5$
$C(2,0,1)$	$2 - 0 + 3 = 5$	محقة $5 = 5$



الرسم هنا غير ضروري

الطلب الثاني: أثبت أن النقاط A و B و C تحدد مستويًا \mathcal{P} .

من خلال عدم الارتباط الخطي لـ \vec{AB} و \vec{AC}

إذا كان الشعاعان \vec{AB} و \vec{AC} غير مرتبطين خطياً فالنقاط A و B و C تقع في مستو واحد.

$A(7,1,0)$	$B(5,0,0)$	$C(2,0,1)$
------------	------------	------------

$$\vec{AB} = (5 - 7, 0 - 1, 0) = (-2, -1, 0)$$

$$\vec{AC} = (2 - 7, 0 - 1, 1 - 0) = (-5, -1, 1)$$

$$\frac{-2}{-5} \neq \frac{-1}{-1} \neq \frac{0}{1}$$

فالشعاعان \vec{AB} و \vec{AC} غير مرتبطين خطياً لعدم تناسب مركباتهما، ومنه النقاط A و B و C تحدد مستويًا \mathcal{P} .

الطلب الثالث: أثبت أن مركبات الشعاع \vec{BM} هي $(2y - 3z, y, z)$.

ثم استنتج أن $\vec{BM} = y\vec{BA} + z\vec{BC}$ ، ماذا يمكنك أن تستنتج من ذلك؟

نوجد \vec{BM} علماً أن $M(x, y, z)$ وتحقق (*)

$M(x, y, z)$	$B(5,0,0)$
--------------	------------

$$\vec{BM} = (x - 5, y, z)$$

الطلب الثاني: عند أية قيمة للوسيط m تنتمي النقطة $M(m, 1, 3)$ إلى المستوي (ABC) ؟

تنتمي M للمستوي إذا ارتبطت خطياً مع \vec{AM}

$$\vec{AC} \text{ و } \vec{AB}$$

أي إذا أمكن كتابة \vec{AM} بدلالة \vec{AB} و \vec{AC}

$$\vec{AM} = (m - 3, 1 - 2, 3 - 1)$$

$$\vec{AM} = (m - 3, -1, 2)$$

$$\vec{AM} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$$

$$(m - 3, -1, 2) = \alpha(-2, 0, -1) + \beta(0, -1, -3)$$

ومن هنا تنتج المعادلات التالية:

$$\boxed{1} \quad -2\alpha = m - 3$$

$$\boxed{2} \quad -\beta = -1$$

$$\boxed{3} \quad -\alpha - 3\beta = 2$$

من $\boxed{2}$ نجد $\beta = 1$ نعوض في $\boxed{3}$

$$-\alpha - 3 = 2 \Rightarrow \alpha = -5$$

نعوض في $\boxed{1}$ نجد:

$$-2(-5) = m - 3 \Rightarrow m = 10 + 3 = 13$$

$$m = 13$$

ومن هنا من أجل $m = 13$ تكون النقطة $M(13, 1, 3)$ تنتمي للمستوي (ABC) .

الطلب الثالث: ما العلاقة بين x و y لتقع النقاط A و B و C و $D(x, y, 3)$ في مستو واحد.

الارتباط الخطي \vec{AD} مع \vec{AB} و \vec{AC}

$$\vec{AD} = (x - 3, y - 2, 3 - 1)$$

$$\vec{AD} = (x - 3, y - 2, 2)$$

$$\vec{AD} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$$

$$(x - 3, y - 2, 2)$$

$$= \alpha(-2, 0, -1) + \beta(0, -1, -3)$$

$$\boxed{1} \quad -2\alpha = x - 3$$

$$\boxed{2} \quad -\beta = y - 2$$

$$\boxed{3} \quad -\alpha - 3\beta = 2$$

(من هذه المعادلات نستنتج علاقة بين x, y بدون وجود α و β)
نضرب طرفي العلاقة $\boxed{2}$ بالعدد 3

$$\boxed{4} \quad -3\beta = 3y - 6$$

$$\boxed{3} \quad -\alpha - 3\beta = 2$$

بطرح $\boxed{3}$ من $\boxed{4}$ نجد:

$$\alpha = 3y - 8$$

نعوض في $\boxed{1}$ نجد:

$$-2(3y - 8) = x - 3 \Rightarrow -6y + 16 = x - 3$$

$$\boxed{x + 6y = 19}$$

وهي العلاقة المطلوبة.

... ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بإصبعه وقال: كُنْتُ عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِرُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: تُكَلِّمُكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ. وَهَلْ يَكْفُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ"

1 نثبت أنهما غير متوازيان

2 أن يكونا في مستو واحد $(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AB})$ مرتبطة
 \vec{u}, \vec{v} شعاعا توجيهه المستقيمين d, d' غير مرتبطين خطياً لعدم تناسب مركباتهما

$$\frac{2}{1} \neq \frac{5}{2} \neq \frac{-1}{1}$$

ومنه المستقيمان غير متوازيان، ويتقاطعان إذا كانا في مستو واحد، ولتحقق ذلك يجب أن تكون الأشعة $\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AB}$ مرتبطة خطياً، أي يجب أن تتحقق العلاقة

$$\overrightarrow{AB} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$$

لنتأكد من صحتها

$A(2,0,5)$	$B(2,2,-1)$
------------	-------------

$$\overrightarrow{AB} = (2-2, 2-0, -1-5) = (0, 2, -6)$$

$$\overrightarrow{AB} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$$

$$(0, 2, -6) = \alpha (2, 5, -1) + \beta (1, 2, 1)$$

$$\begin{cases} 0 = 2\alpha + \beta \\ 2 = 5\alpha + 2\beta \\ -6 = -\alpha + \beta \end{cases}$$

نحسب قيمة α و β من أي معادلتين ثم نعوض بالثالثة، إن حقيقتها تكون الأشعة مرتبطة وبالتالي \overrightarrow{AB} و d و d' في مستو واحد، وإلا فهي غير مرتبطة وليست في مستو واحد.

نضرب طرفي [3] بالعدد 2 ثم نجمعها مع [1] نجد:

$$-12 = 3\beta \Rightarrow \beta = -4$$

نعوض [1] نجد:

$$\alpha = 2$$

نتأكد من صحتها بتعويض القيم $\alpha = 2$ و $\beta = -4$ في [2] في

$$2 = 5(2) + 2(-4) \Rightarrow 2 = 10 - 8 \Rightarrow 2 = 2$$

المساواة محققة فالأشعة مرتبطة خطياً وتقع في مستو واحد، وبالتالي متقاطعان.

لإيجاد نقطة التقاطع $M(x, y, z)$

$$\overrightarrow{BM} = b \vec{v} \quad | \quad \overrightarrow{AM} = a \vec{u}$$

تنتج علاقة بين x, y, z | تنتج علاقة بين x, y, z

نقاط العلاقات

إذا كانت $M(x, y, z)$ نقطة تقاطع d و d' عندئذ يكون:

$$\overrightarrow{AM} = a \vec{u}, \quad \overrightarrow{BM} = b \vec{v}$$

$A(2,0,5)$	$B(2,2,-1)$	$M(x, y, z)$
------------	-------------	--------------

$$\overrightarrow{AM} = (x-2, y-0, z-5) = (x-2, y, z-5)$$

$$\overrightarrow{AM} = a \vec{u} \Rightarrow (x-2, y, z-5) = a(2, 5, -1)$$

ومن (*) لدينا: $x - 2y + 3z - 5 = 0$ فإن:

$$x - 5 = 2y - 3z$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BM} = (2y - 3z, y, z)$$

$A(7,1,0)$	$B(5,0,0)$	$C(2,0,1)$
------------	------------	------------

$$\overrightarrow{BA} = (2,1,0) \Rightarrow y\overrightarrow{BA} = (2y, y, 0)$$

$$\overrightarrow{BC} = (2-5, 0, 1-0) = (-3, 0, 1) \Rightarrow$$

$$z\overrightarrow{BC} = (-3z, 0, z)$$

$$y\overrightarrow{BA} + z\overrightarrow{BC} = (2y, y, 0) + (-3z, 0, z)$$

$$= (2y - 3z, y, z) = \overrightarrow{BM}$$

نستنتج من ذلك أن النقاط M واقعة في المستوي \mathcal{P} .

الطلب الرابع: بالعكس أثبت أن أية نقطة $M(x, y, z)$ من المستوي \mathcal{P} تحقق المعادلة:

$$x - 2y + 3z - 5 = 0$$

ما هي المجموعة \mathcal{E} ؟

$$M(x, y, z) \begin{cases} \overrightarrow{BM} = (x-5, y, z) \\ \overrightarrow{BM} = (2y-3z, y, z) \end{cases}$$

$M(x, y, z)$ نقطة من المستوي \mathcal{P} فهي تحقق المساواة السابقة

$$\overrightarrow{BM} = (2y - 3z, y, z)$$

كما تحقق:

$$\overrightarrow{BM} = (x - 5, y, z)$$

بموازنة العلاقات نجد:

$$x - 5 = 2y - 3z \Rightarrow x - 2y + 3z - 5 = 0$$


فالنقطة M من المستوي \mathcal{P} إذا وفقط إذا حققت العلاقة السابقة

$$x - 2y + 3z - 5 = 0$$

والمجموعة \mathcal{E} هي مجموعة النقاط $M(x, y, z)$ التي تحقق العلاقة السابقة.

المسألة الخامسة عشر: (صفحة 42)

نتأمل في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ المستقيم d المار بالنقطة $A(2,0,5)$ والموجه بالشعاع $\vec{u}(2,5,-1)$ ، والمستقيم d' المار بالنقطة $B(2,2,-1)$ والموجه بالشعاع $\vec{v}(1,2,1)$. هل d, d' متقاطعان؟ في حالة الإيجاب عين نقطة تقاطعهما.



الرسم هنا غير ضروري



Please wait...

I'm thinking!

C نقطة من محور الفواصل فأحداثياتها بالشكل $(x, 0, 0)$

$A(2, -1, 3)$	$B(0, 5, -1)$	$C(x, 0, 0)$
---------------	---------------	--------------

$$CA^2 = CB^2$$


$$\begin{aligned} (x-2)^2 + (0+1)^2 + (0-3)^2 \\ = (x-0)^2 + (0-5)^2 + (0+1)^2 \\ \Rightarrow x^2 - 4x + 4 + 1 + 9 = x^2 + 25 + 1 \\ -4x + 14 = 26 \Rightarrow x = \frac{12}{-4} \Rightarrow x = -3 \end{aligned}$$

إذا النقطة هي $C(-3, 0, 0)$.

المسألة السابعة عشر: (صفحة 42)

ليكن α عدداً حقيقياً، ولنتأمل النقاط الثلاث $A(3, 1, -3)$ و $B(-1, 5, -3)$ و $C(-1, 1, \alpha)$. أثبت أن المثلث ABC متساوي الساقين، أيًا كانت α . أيمن أن يكون متساوي الأضلاع؟

••• لحساب أطوال أضلاع المثلث



الرسم هنا غير ضروري

$A(3, 1, -3)$	$B(-1, 5, -3)$	$C(-1, 1, \alpha)$
---------------	----------------	--------------------

$$AC^2 = (-1-3)^2 + (1-1)^2 + (\alpha+3)^2$$

$$AC^2 = 16 + (\alpha+3)^2$$

$$BC^2 = (-1+1)^2 + (1-5)^2 + (\alpha+3)^2$$

$$BC^2 = 16 + (\alpha+3)^2$$

نلاحظ أنه أيًا كانت قيمة α فإن

$$AC^2 = BC^2 \Rightarrow AC = BC$$

وبالتالي المثلث ABC متساوي الساقين رأسه C .

$$AB^2 = (3+1)^2 + (1-5)^2 + (-3+3)^2 = 32$$

$$AB = 4\sqrt{2}$$

وبالتالي يكون المثلث ABC متساوي الأضلاع إذا كان

$$AC = BC = AB = 4\sqrt{2}$$

$$16 + (\alpha+3)^2 = 32 \Rightarrow \alpha+3 = \pm\sqrt{16}$$


ويكون المثلث متساوي الأضلاع إذا كانت $\alpha = 1$ أو $\alpha = -7$

$$\begin{cases} 1 & x - 2 = 2a \\ 2 & y = 5a \\ 3 & z - 5 = -a \end{cases}$$

من [3] نجد أن $a = 5 - z$ ، نعوض في [1] و [2] ينتج:

$$x - 2 = 2(5 - z) \Rightarrow x + 2z = 12 \quad (1)$$

$$y = 5(5 - z) \Rightarrow y + 5z = 25 \quad (2)$$



$$\vec{BM} = (x-2, y-2, z+1) = b(1, 2, 1)$$

$$\begin{cases} 1 & x - 2 = b \\ 2 & y - 2 = 2b \\ 3 & z + 1 = b \end{cases}$$

نعوض [3] في [1] و [2] ينتج:

$$x - 2 = z + 1 \Rightarrow x - z = 3 \quad (3)$$

$$y - 2 = 2(z + 1) \Rightarrow y - 2z = 4 \quad (4)$$

إذا النقطة M تحقق المعادلات (1), (2), (3), (4) بحلها حل مشترك نحصل على المطلوب:

ب طرح (3) من (1) نجد:

$$3z = 9 \Rightarrow z = 3$$

نعوض في (3) و (4) نجد:

$$x = 6, \quad y = 10$$


إذا نقطة التقاطع هي

$$M(6, 10, 3)$$

المسألة السادسة عشر: (صفحة 42)

جد على محور الفواصل نقطة C متساوية البعد عن النقطتين $A(2, -1, 3)$ و $B(0, 5, -1)$.

بعد $C(x, 0, 0)$ عن B يساوي بعدها عن A



الرسم هنا غير ضروري

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 + z^2$$

$$= x^2 + 2x + 1 + y^2 - 8y + 16 + z^2 - 4z + 4$$

$$\Rightarrow 6x - 6y - 4z + 16 = 0$$


$$\Rightarrow \boxed{3x - 3y - 2z + 8 = 0}$$

وهي معادلة المستوي المحوري للقطعة $[AB]$ ، كل نقطة منه متساوية البعد عن A و B .

المسألة التاسعة عشر: (صفحة 42)

تتأمل النقاط $A(2,3,0)$ و $B(2,3,6)$ و $M(4,-1,2)$ نهدف إلى حساب بعد M عن المستقيم (AB) .
الطلب الأول: أثبت أن M لا تقع على المستقيم (AB) .

إثبات عدم الارتباط الخطي لـ \vec{MA} و \vec{AB}



الرسم هنا غير ضروري

إذا لم يكن الشعاعان \vec{MA} و \vec{AB} مرتبطين خطياً فالنقطة M لا تقع على (AB) .

$A(2,3,0)$	$B(2,3,6)$	$M(4,-1,2)$
------------	------------	-------------

$$\vec{AB} = (2 - 2, 3 - 3, 6 - 0) = (0, 0, 6)$$

$$\vec{MA} = (2 - 4, 3 + 1, 0 - 2) = (-2, 4, -2)$$

$$\frac{0}{-2}, \frac{0}{4} \neq \frac{6}{-2}$$

فالشعاعان \vec{MA} و \vec{AB} غير مرتبطين خطياً لعدم تناسب مركباتهما.

الطلب الثاني: اثبت أن لكل نقطة K من المستقيم (AB) إحداثيات من النمط $(2, 3, z)$.

K من المستقيم (AB) فـ \vec{KA} و \vec{AB} مرتبطين

إذا كان K من المستقيم (AB) فإن \vec{KA} و \vec{AB} مرتبطين خطياً.

$$\vec{KA} = \alpha \vec{AB}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$A(2,3,0)$	$B(2,3,6)$	$K(x, y, z)$
------------	------------	--------------

المسألة الثامنة عشر: (صفحة 42)

تتأمل النقطتين $A(2,1,0)$ و $B(-1,4,2)$.
الطلب الأول: أوجد نقطة متساوية البعد عن A و B .

منتصف $[AB]$ $N(x_N, y_N, z_N)$

N منتصف $[AB]$ فهي متساوية البعد عن A و B


$A(2,1,0)$	$B(-1,4,2)$	$N(x_N, y_N, z_N)$
------------	-------------	--------------------

$$x_N = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{2 - 1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$y_N = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1 + 4}{2} = \frac{5}{2}$$

$$z_N = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{0 + 2}{2} = 1$$

$$\Rightarrow N\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, 1\right)$$



الرسم هنا غير ضروري

الطلب الثاني: أوجد العدد الحقيقي λ الذي يجعل النقطة $C(1,1,\lambda)$ متساوية البعد عن A و B .

C متساوية البعد عن A و B أي $|AC| = |BC|$

$A(2,1,0)$	$B(-1,4,2)$	$C(1,1,\lambda)$
------------	-------------	------------------

$$AC^2 = BC^2$$

$$(1 - 2)^2 + (1 - 1)^2 + (\lambda - 0)^2$$

$$= (1 + 1)^2 + (1 - 4)^2 + (\lambda - 2)^2$$

$$\Rightarrow 1 + \lambda^2 = 4 + 9 + \lambda^2 - 4\lambda + 4$$

$$\Rightarrow 4\lambda = 16 \Rightarrow \lambda = 4$$

الطلب الثالث: أثبت أن نقطة $M(x, y, z)$ من المستوي المحوري للقطعة $[AB]$ ، إذا وفقط إذا تحقق الشرط

$$3x - 3y - 2z + 8 = 0$$

M متساوية البعد عن A و B أي $|MA| = |MB|$

$A(2,1,0)$	$B(-1,4,2)$	$M(x, y, z)$
------------	-------------	--------------

$$MA^2 = MB^2$$

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 0)^2$$

$$= (x + 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 2)^2$$

$A(\sqrt{3}, 3, 0)$	$M(0, 6, m)$	$N(0, 0, n)$
---------------------	--------------	--------------

$$\overrightarrow{AN} = (0 - \sqrt{3}, 0 - 3, n - 0) = (-\sqrt{3}, -3, n)$$

$$\overrightarrow{AM} = (0 - \sqrt{3}, 6 - 3, m - 0) = (-\sqrt{3}, 3, m)$$

$$\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} = (-\sqrt{3} \times -\sqrt{3}) + (-3 \times 3) + m \cdot n = 0$$

$$0 = 3 - 9 + m \cdot n \Rightarrow \boxed{m \cdot n = 6} \quad (*)$$

الهرم $AOBMN$ رأسه A وقاعدته شبه المنحرف $ONMB$
وارتفاعه h هو بعد A عن القاعدة يساوي $\sqrt{3}$.
مساحة شبه المنحرف $ONMB$

$$S = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\overrightarrow{BM}}{z_M} + \frac{\overrightarrow{ON}}{z_N} \right) \times \frac{\overrightarrow{OB}}{y_B} \right) = \frac{1}{2} (m + n) \times 6 = 3(m + n)$$

حجم الهرم

$$V = \frac{1}{3} S \cdot h = \frac{1}{3} 3(m + n) \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3}(m + n)$$

من الفرض لدينا

$$V = 5\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}(m + n) = 5\sqrt{3} \Rightarrow \boxed{m + n = 5} \quad (**)$$


بحل (*) و(**) حلاً مشتركاً نجد:

$$m = 5 - n \Rightarrow n(5 - n) = 6 \Rightarrow$$


$$n^2 - 5n + 6 = 0 \Rightarrow n = 2 \text{ أو } n = 3$$

ومنه يكون لدينا حلان ممكنان

$$\begin{cases} n = 2, m = 3 \\ n = 3, m = 2 \end{cases}$$



لكن لدينا من الفرض $n > m$ إذاً $n = 3, m = 2$



$$\overrightarrow{KA} = (2 - x, 3 - y, -z)$$

$$\overrightarrow{AB} = (0, 0, 6)$$

$$(2 - x, 3 - y, -z) = \alpha(0, 0, 6)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 - x = 0 \Rightarrow x = 2 \\ 3 - y = 0 \Rightarrow y = 3 \\ -z = 6\alpha \Rightarrow z = -6\alpha \end{cases} \Rightarrow K(2, 3, z)$$

الطلب الثالث: احسب MK^2 بدلالة z .

$$\boxed{M(4, -1, 2)} \quad \boxed{K(2, 3, z)}$$

$$MK^2 = (2 - 4)^2 + (3 + 1)^2 + (z - 2)^2$$

$$MK^2 = 4 + 16 + (z - 2)^2 = 20 + (z - 2)^2$$

الطلب الرابع: عند أية قيمة للعدد z يكون MK أصغر ما يمكن؟
حدد إذاً بعد M عن (AB) .

يكون المقدار الموجب أصغر ما يمكن إذا كان مساوياً للصفر

$$MK = \sqrt{20 + (z - 2)^2}$$

المسافة مقدار موجب

يكون MK أصغر ما يمكن إذا كان $(z - 2)^2$ أصغر ما يمكن،
أي عندما

$$(z - 2)^2 = 0 \Rightarrow z = 2$$

وعندها يكون

$$MK = \sqrt{20 + (z - 2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

// يمكن التأكد أن \overrightarrow{MK} عمود على \overrightarrow{AB} بالتأكد من أن الجداء
السلمي $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MK} = 0$:

$$\overrightarrow{MK} = (2, -4, 0), \quad \overrightarrow{AB} = (0, 0, 6)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MK} = 0 \times 2 + 0 \times -4 + 6 \times 0 = 0$$

المسألة العشرون: (صفحة 42)

--المسافات وحجم الهرم--

n و m عدنان حقيقيان موجبان يحققان $n > m > 0$. نتأمل
النقاط $M(0, 6, m)$ و $B(0, 6, 0)$ و $A(\sqrt{3}, 3, 0)$ و $N(0, 0, n)$
في معلم متجانس $(0; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. عين m و n
ليكون المثلث MAN قائماً في A وحجم المجسم $AOBMN$
يساوي $5\sqrt{3}$.

$$\overrightarrow{AN} \perp \overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$$

$$V = \frac{1}{3} S \times h$$

$$S = \frac{\text{الارتفاع} \times \text{مجموع القاعدتين}}{2}$$

المثلث MAN قائماً في A أي $\overrightarrow{AN} \perp \overrightarrow{AM}$ أي

$$\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$$

$$4\vec{GE} + 3\vec{GF} = \vec{0}$$

$$4\vec{GE} + 3\vec{GE} + 3\vec{EF} = \vec{0}$$


$$7\vec{GE} + 3\vec{EF} = \vec{0} \Rightarrow -7\vec{EG} + 3\vec{EF} = \vec{0}$$

$$\vec{EG} = \frac{3}{7}\vec{EF}$$

المسألة الثانية والعشرون: (صفحة 43)

نتأمل رباعي وجوه $ABCD$ ، ونقطتين I و J معرفتين وفق
 $\vec{IA} = 2\vec{IB}$ و $\vec{JC} = 2\vec{JD}$ يمكن أن نتطبق إحدى النقطتين I و J على الأخرى؟

مستقيمان متخالفان لا يمكن أن يتلاقيا



$$\vec{IA} = 2\vec{IB}$$

$$\vec{IA} = 2(\vec{IA} + \vec{AB}) \Rightarrow \vec{AI} = 2\vec{AB}$$

فالنقطة I واقعة على المستقيم (AB) .

$$\vec{JC} = 2\vec{JD}$$

$$\vec{JC} = 2(\vec{JC} + \vec{CD}) \Rightarrow \vec{CJ} = 2\vec{CD}$$

فالنقطة J واقعة على المستقيم (CD) .

وبما أن المستقيمين (AB) و (CD) متخالفان فلا يمكن أن تتطبق I على J .

الطلب الثاني: أثبت أنه أيًا كانت النقطة M من الفراغ، كان:
 $\vec{MA} - 2\vec{MB} = -\vec{MI}$ و $\vec{MC} - 2\vec{MD} = -\vec{MJ}$

ننطلق من العلاقة المعطاة وندخل M

$$\vec{IA} = 2\vec{IB}$$

$$\frac{\vec{MA} - \vec{MI}}{\vec{MA} - \vec{MI}} = \frac{2(\vec{MB} - \vec{MI})}{\vec{MA} - \vec{MI}}$$


$$\vec{MA} - \vec{MI} = 2\vec{MB} - 2\vec{MI}$$

$$\vec{MA} - 2\vec{MB} = -\vec{MI}$$

المسألة الواحدة والعشرون: (صفحة 43)

نتأمل رباعي وجوه $ABCD$ ، ونقطتين E و F معرفتين وفق
 $\vec{AF} = \frac{2}{3}\vec{AD}$ و $\vec{BE} = \frac{1}{4}\vec{BC}$
 المتناسبة للنقاط $(A, 1)$ و $(B, 3)$ و $(C, 1)$ و $(D, 2)$ يقع على $[EF]$. ثم عين النقطة G على $[EF]$.

$(C, 1), (B, 3), (A, 1), (D, 2)$



إنَّ مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(B, 3)$ و $(C, 1)$ وليكن I يحقق:

$$3\vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0}$$

$$3\vec{IB} + \vec{IB} + \vec{BC} = \vec{0}$$

$$4\vec{IB} + \vec{BC} = \vec{0} \Rightarrow -4\vec{BI} + \vec{BC} = \vec{0}$$

$$\vec{BI} = \frac{1}{4}\vec{BC}$$

ومن الفرض لدينا

$$\vec{BE} = \frac{1}{4}\vec{BC}$$

ومنه I هي E أي E هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(B, 3)$ و $(C, 1)$ مثقلة بـ 4 أي $(E, 4)$.

إنَّ مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(D, 2)$ و $(A, 1)$ وليكن J يحقق:

$$2\vec{JD} + \vec{JA} = \vec{0}$$

$$2\vec{JA} + 2\vec{AD} + \vec{JA} = \vec{0}$$

$$3\vec{JA} + 2\vec{AD} = \vec{0} \Rightarrow -3\vec{AJ} + 2\vec{AD} = \vec{0} \Rightarrow$$

$$\vec{AJ} = \frac{2}{3}\vec{AD}$$

ومن الفرض لدينا

$$\vec{AF} = \frac{2}{3}\vec{AD}$$

ومنه J هي F أي F هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(D, 2)$ و $(A, 1)$ مثقلة بـ 3 أي $(F, 3)$.

مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(B, 3)$ و $(C, 1)$ و $(D, 2)$ و $(A, 1)$ هو مركز الأبعاد المتناسبة لـ $(E, 4)$ و $(F, 3)$ وبالتالي فهو يقع على EF ، وتحديدًا في نقطة G من EF تحقق:


$$f(M) = 18$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 18 = 18$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 0 \Rightarrow x = y = z = 0$$

ومنه مجموعة النقاط M التي تحقق $f(M) = 18$ هي النقطة الوحيدة $O(0,0,0)$.

الطلب الثالث: أثبت أن مجموعة النقاط M التي تحقق $f(M) = 30$ كرة مركزها O . أوجد نصف قطرها.



$$f(M) = 30$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 18 = 30$$

$$\underbrace{x^2 + y^2 + z^2}_{OM^2} = 6$$

$$\|\overrightarrow{OM}\|^2 = 6 \Rightarrow \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{6}$$

ومجموعة النقاط هي كرة مركزها O ونصف قطرها $\sqrt{6}$.

الطلب الرابع: أثبت أنه، وفق شرط على العدد الحقيقي k ، مجموعة النقاط M المحققة للعلاقة $f(M) = k$ هي كرة مركزها O .

$$f(M) = k$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 18 = k$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{k-18}{2}$$

$$\underbrace{x^2 + y^2 + z^2}_{\text{موجب}} = \frac{k}{2} - 9$$

الطرف الأول موجب، لذا تكون المعادلة محققة في حال

$$\frac{k}{2} - 9 \geq 0 \Rightarrow k \geq 18$$

وتكون مجموعة النقاط M في هذه الحالة كرة مركزها O ونصف قطرها

$$r = \sqrt{\frac{k}{2} - 9}$$

ومستحيلة في حال $\frac{k}{2} - 9 < 0$ أي $k < 18$.

$$\overrightarrow{JC} = 2 \overrightarrow{JD}$$

$$\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MJ} = 2\overrightarrow{MD} - 2\overrightarrow{MJ}$$

$$\overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MJ}$$

$$\overrightarrow{MC} - 2\overrightarrow{MD} = -\overrightarrow{MJ}$$

الطلب الثالث: جد مجموعة نقاط الفراغ M التي تحقق:

$$\|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\|$$

$$= \|3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}\|$$

$$\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 3\overrightarrow{MG}$$

G مركز ثقل المثلث BCD

لدينا

$$\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 3\overrightarrow{MG}$$

حيث G مركز ثقل المثلث BCD .

$$3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}$$

$$= 3\overrightarrow{MA} - (\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD})$$

$$= 3\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MG} = 3\overrightarrow{GA}$$

وبالتالي تؤول المساواة المفروضة إلى:

$$\|3\overrightarrow{MG}\| = \|3\overrightarrow{GA}\| \Rightarrow \|\overrightarrow{MG}\|^2 = \|\overrightarrow{GA}\|^2$$

$$MG^2 = GA^2 \Rightarrow MG = MA$$

وبما أن AG ثابت لثبوت A و G (مركز ثقل المثلث BDC)، فإن مجموعة النقاط M هي كرة مركزها G ونصف قطرها AG .

المسألة الثالثة والعشرون: (صفحة 43)

لدينا في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقطتان $A(2, -1, 2)$ و $B(-2, 1, -2)$. نقرن بكل نقطة $M(x, y, z)$ من الفراغ المقدار

$$f(M) = MA^2 + MB^2$$

الطلب الأول: احسب $f(M)$ بدلالة x, y, z .

$A(2, -1, 2)$	$B(-2, 1, -2)$	$M(x, y, z)$
$MA^2 = (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2$	$MB^2 = (x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2$	$f(M) = MA^2 + MB^2$
$f(M) = (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 + (x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2$		
$= 2x^2 + 8 + 2y^2 + 2 + 2z^2 + 8$		
$f(M) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 18$		

الطلب الثاني: أثبت أن مجموعة النقاط M التي تحقق $f(M) = 18$ مؤلفة من نقطة واحدة.

مجموع أعداد موجبة يساوي الصفر إذا كان كلاً منهم


مساوياً للصفر

قال رسول الله ﷺ: " لا تحاسدوا، ولا تناجسوا، ولا تباغضوا، ولا تباؤروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحذيه، ولا يحقره، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"

المسألة الرابعة والعشرون: (صفحة 43)

نتأمل رباعي وجوه $ABCD$.


الطلب الأول: نقطة من الحرف $[AC]$. جد مقطع رباعي الوجوه بالمستوي المار بالنقطة M موازياً للمستوي (BCD) .



نرسم من M في المستوي ACB موازياً لـ (CB) يقطع AB في نقطة M_1 ولتكن M_1 .

نرسم من M في المستوي ACD موازياً لـ (CD) يقطع AD في نقطة M_2 ولتكن M_2 .

فيكون المستوي (M_1M_2M) هو مقطع رباعي الوجوه بالمستوي المار من M والموازي للمستوي (BCD) .




الطلب الثاني: نقطة من الحرف $[AD]$ ، J نقطة من المستقيم (CD) ، K نقطة من المستقيم (BC) . عين مقطع رباعي الوجوه بالمستوي (IJK) .

عين الفصل المشترك للمستوي مع وجهين لرباعي الوجوه، ثم ضع نقاط التقاطع


I تنتمي للمستقيم (AD) المحتوي في المستوي (ACD) و J تنتمي للمستقيم (DC) المحتوي في المستوي (ACD) إذاً (IJ) واقع في المستوي (ACD)

(IJ) ينتمي للمستوي (ACD)	(IJ) ينتمي للمستوي (IJK) وضوحاً
إذاً (IJ) هو الفصل المشترك للمستويين (ACD) و (IJK) و (IJ) يقطع (AC) في نقطة ولتكن N_1 .	

نجد أيضاً بطريقة مماثلة أن (KN_1) هو الفصل المشترك للمستويين (ABC) و (IJK) ، وأنه يقطع (AB) في نقطة N_2 ولتكن N_2 . وهكذا يكون مقطع رباعي الوجوه بالمستوي (IJK) هو المثلث N_2N_1I .



الطلب الثالث: نقطة L من المستوي (ABD) ، أوجد مقطع رباعي الوجوه بالمستوي (KJL) .



لتكن S نقطة تقاطع المستقيمين (BD) و (KJ) من المستوي (BCD) .

S تنتمي أيضاً إلى المستويين (KJL) و (ABD)

(SL) هو الفصل المشترك للمستويين (KJL) و (ABD) يقطع (AB) و (AD) في نقطتين U و V على الترتيب

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ"

مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(G, 1)$, $(E, 1)$ هو منتصف GE أي في K وثقلها $2 = 1 + 1$ أي $(K, 2)$.

مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(A, 1)$, $(B, 1)$ هو منتصف AB أي في L وثقلها $2 = 1 + 1$ أي $(L, 2)$.

مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(G, 1)$ و $(B, 1)$ و $(A, 1)$ و $(E, 1)$ هو مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(K, 2)$ و $(L, 2)$ وهو منتصف القطعة $[KL]$ لتساوي الثقليين في K و L . أي أن M منتصف $[KL]$.

الطلب الثالث: استنتج أن النقاط I و J و K و L تقع في مستو واحد وعين طبيعة الرباعي $ILJK$.


مركز ثقل النقاط الأربع تقع منتصف $[IJ]$ و $[KL]$ ، أي أن المستقيمان (IJ) و (KL) متقاطعان فهما يشكلان مستويًا، والشكل $ILJK$ متوازي أضلاع لتناصف قطريه.

K تنتمي لـ (ABC) و (KJL)	U تنتمي لـ (ABC) و (KJL)
(KU) ينتمي لـ (ABC)	(KU) ينتمي لـ (KJL)
(KU) هو الفصل المشترك للمستويين (ABC) و (KJL)	
ويقطع (AC) في W	
مقطع رباعي الوجوه بالمستوي (KJL) هو المثلث UVW .	

المسألة الخامسة والعشرون: (صفحة 44)

نتأمل مكعباً $ABCDEFGH$ ، والنقاط I و J و K و L منتصفات $[AE]$ و $[BG]$ و $[EG]$ و $[AB]$ بالترتيب. والنقطة M مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, 1)$ و $(B, 1)$ و $(G, 1)$ و $(E, 1)$.
الطلب الأول: أثبت أن M تنتمي إلى $[IJ]$ وعين موضعها على هذه القطعة.

$(G, 1), (B, 1), (A, 1), (E, 1)$
 M




مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(G, 1)$, $(B, 1)$ هو منتصف GB أي في J وثقلها $2 = 1 + 1$ أي $(J, 2)$.

مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(A, 1)$, $(E, 1)$ هو منتصف AE أي في I وثقلها $2 = 1 + 1$ أي $(I, 2)$.

مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(G, 1)$ و $(B, 1)$ و $(A, 1)$ و $(E, 1)$ هو مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(J, 2)$ و $(I, 2)$ وهو منتصف القطعة $[IJ]$ لتساوي الثقليين في I و J . أي أن M منتصف $[IJ]$.

الطلب الأول: أثبت أن M تنتمي إلى $[KL]$ وعين موضعها على هذه القطعة.

$(G, 1), (E, 1), (A, 1), (B, 1)$
 M



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنْ أَلَّهِ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفَ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً"

-- مسأله امتحانیه --

حل الطلب الأول:
حتى تكون النقاط D, K, F واقعة على استقامة واحدة، نثبت الارتباط الخطي للشعاعين $\overrightarrow{DF}, \overrightarrow{DK}$

$$\overrightarrow{DF}(2, -2, 2)$$

$$\overrightarrow{DK} \left(\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$$

نلاحظ أن:

$$\frac{2}{\frac{4}{3}} = \frac{-2}{-\frac{4}{3}} = \frac{2}{\frac{4}{3}} \Rightarrow \text{المركبات متناسبة}$$

فالأشعة مرتبطة خطياً، والنقاط تقع على استقامة واحدة.

حل الطلب الثاني:

معادلة المستوي (EBG)

$$a(x - x_B) + b(y - y_B) + c(z - z_B) = 0$$

$$a(x - 2) + b(y - 0) + c(z - 0) = 0$$

حيث نفرض $\vec{n}(a, b, c)$ ناظم المستوي (EBG) ، عندئذ لإيجاده:

$\overrightarrow{EB}(2, 0, -2)$	$\overrightarrow{EG}(2, 2, 0)$	$\vec{n}(a, b, c)$
---------------------------------	--------------------------------	--------------------

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{EB} \Rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{EB} = 0$$

$$\Rightarrow 2a + 2c = 0 \quad (1)$$

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{EG} \Rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{EG} = 0$$

$$\Rightarrow 2a + 2b = 0 \quad (2)$$

معادلتين بثلاث مجاهيل، نفرض قيمة لأحدهم ونعوض

نفرض $c = 1$ ، ونعوض في (1) نجد

$$a = -1$$

نعوض في (2) نجد:

$$b = 1$$

وبالتالي تكون معادلة المستوي (EBG) حيث $\vec{n}(-1, 1, 1)$

$$-(x - 2) + y + z = 0$$

$$-x + y + z + 2 = 0$$

بعد F عن المستوي (EBG)

$$\text{dist}(F, (EBG)) = \frac{|-x_F + y_F + z_F + 2|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

حل الطلب الثالث:

معادلة الكرة التي مركزها F وتمس المستوي (EBG)


$$(x - x_F)^2 + (y - y_F)^2 + (z - z_F)^2 = R^2$$

لنحسب R^2 (بما أن الكرة تلمس المستوي (EBG) إذاً بعد F عن المستوي (EBG) يساوي R)

(R يساوي R)

$ABCDEFGH$ مكعب طول ضلعه 2، $(A; \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}, \frac{1}{2}\overrightarrow{AE})$ معلم متجانس، K مركز ثقل المثلث EBG ، المطلوب:

- 1) أثبت أن النقاط D, K, F تقع على استقامة واحدة.
- 2) اكتب معادلة المستوي (EBG) ثم استنتج بعد النقطة F عن المستوي (EBG) .
- 3) اكتب معادلة الكرة التي مركزها F وتمس المستوي EBG .
- 4) احسب حجم الهرم $BFGE$.
- 5) عين المسقط القائم للنقطة N منتصف $[AD]$ على المستوي (EBG) .
- 6) اكتب معادلة المخروط الناتج عن دوران AF حول AE .



الحل:

قبل الحل

نكتب إحداثيات رؤوس المكعب، والنقاط المذكورة N و K

$$A(0,0,0), B(2,0,0), C(2,2,0), D(0,2,0),$$

$$E(0,0,2), F(2,0,2), G(2,2,2), H(0,2,2)$$

$$N(0,1,0)$$

K مركز ثقل المثلث EBG ، إذاً

$$K \left(\frac{x_E + x_B + x_G}{3}, \frac{y_E + y_B + y_G}{3}, \frac{z_E + z_B + z_G}{3} \right)$$

$$K \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \right)$$

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنَّهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى آخِيَهُ، فَإِذَا آخَيْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. وَلَنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ"


$$(MN): \begin{cases} x = -t + 0 \\ y = t + 1, & t \in \mathbb{R} \\ z = t + 0 \end{cases}$$

الخطوة الثانية: نعوض المعادلات الوسيطة لـ (MN) في معادلة المستوي (EBG)

$$-(-t) + (t + 1) + t + 2 = 0 \\ \Rightarrow t = -1$$

نعوض t بالمعادلات الوسيطة للحصول على إحداثيات النقطة M من المستوي (EBG)

$$x = 1, \quad y = 0, \quad z = -1 \\ \Rightarrow M(1,0,-1)$$




حل الطلب السادس:

محور الدوران هو OZ ، والرأس $A(0,0,0)$ ، ومركز القاعدة $r = EF$ ، ونصف قطر القاعدة $E(0,0,2)$

$$\text{الارتفاع} = h = |z_A - z_E| = 2$$

لحساب r

$$r = \sqrt{(x_F - x_E)^2 + (y_F - y_E)^2 + (z_F - z_E)^2} \\ r = \sqrt{4 + 0 + 0} = 2$$



معادلة المخروط هي


$$x^2 + y^2 - \frac{r^2}{h^2} z^2 = 0, \quad z_A \leq z \leq z_E$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0, \quad 0 \leq z \leq 2$$

ومنه تصبح معادلة الكرة

$$(x - 2)^2 + (y - 0)^2 + (z - 0)^2 = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$(x - 2)^2 + y^2 + z^2 = \frac{4}{3}$$



حل الطلب الرابع:

حجم الهرم $BFG E$

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{القاعدة}} \times \text{الارتفاع}$$

رأس الهرم هو F وقاعدته المثلث المتساوي الأضلاع EBG (أضلاعه عبارة عن أطوار وجوه المكعب)

$$h = \text{بعد } F \text{ عن المستوي } (EBG) = \text{الارتفاع} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$S_{\text{القاعدة}} = \frac{\sqrt{3} a^2}{4}, \quad a = |EB| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$S_{\text{القاعدة}} = 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{3} 2\sqrt{3} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3} \text{ وحدة مكعبة}$$

حل الطلب الخامس:

N منتصف $[AD]$ ، ومنه $N(0,1,0)$

نفرض أن M هي المسقط القائم لـ N على المستوي (EBG) بما أن

$$(EBG) \perp (MN)$$

إذا شعاع توجيه المستقيم هو نفسه ناظم المستوي، أي

$$\vec{u}_{MN} = \vec{n} = (-1,1,1)$$

الخطوة الأولى نكتب المعادلات الوسيطة للمستقيم (MN)

حيث النقطة N معلومة، وشعاع التوجيه معلوم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسِيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ "

نلتقاكم في أعمال أخرى إن شاء الله



45



الموقع التعليمي
علوم للجميع



+963943608577 نور أشقر



+963941114148 برلنت مطيط






berlantcommunication@gmail.com



Please wait...

I'm thinking!

تم التحميل من موقع علوم للجميع
<https://www.3lom4all.com>



1444/4/13
2022/11/7

