



نوطة الريان 2022

محتويات نوطة فورنيكس:

- تمت تجزئة كل درس إلى فقراته.
- كل فقرة منسقة في جدول واحد.
- جميع المعلومات بخصوص هذه الفقرة من الكتاب 2022 + دليل المعلم 2022.
- تجزئة المعلومات وتلويها مع وضع خط تحت كل كلمة يمكن استخراج سؤال منها.
- إرفاق الصور المتعلقة بها من الكتاب.
- إضافة صور خارجية لتوضيح الأفكار والآليات غير المفهومة جيداً في الكتاب.
- بأخر كل فقرة قسم يحوي معظم الأسئلة التي قد ترد في الامتحان.

علوم – بكالوريا

المدرس:

حازم ضعيف



تمت تجزئة كل درس إلى فقراته، بحيث أصبحت كل فقرة منسقة في جدول واحد يحوي:

- جميع المعلومات بخصوص هذه الفقرة من الكتاب 2021 + دليل المعلم 2021.
- تجزئة المعلومات وتلوينها مع وضع خط تحت كل كلمة يمكن استخراج سؤال منها.
- الصور المتعلقة بها من الكتاب.
- إضافة صور خارجية لتوضيح الأفكار والآليات غير المفهومة جيدا في الكتاب.
- بأخر كل فقرة قسم يحوي معظم الأسئلة الامتحانية التي قد تأتي من هذه الفقرة ويمكن الإجابة عليها جميعها من المعلومات في الجدول بسهولة.
- يكون ترتيب الجدول كما يلي:

هنا: عنوان الفقرة	
الإشارة قبل كل صورة:	هنا: جميع المعلومات بخصوص هذه الفقرة بشكل منظم ووضع خط تحت أي كلمة توحى بسؤال (حدد موقع – اذكر وظيفة – ماذا ينتج عن – فسر – رتب – كيف)
*** تعني: الصورة من الكتاب ومطلوب حفظ مسمياتها ** تعني: الصورة من الكتاب ولكنها للفهم فقط * تعني: الصورة خارجية من المدرس للفهم والتوضيح	هنا: معظم الأسئلة التي قد تأتي من الفقرة السابقة
(ارسم) تعني: الرسمة من المحتمل أن يُطلب من الطالب رسمها	

انتبه لرقم إصدار النوطة الموجود على غلاف النوطة من الأعلى، كلما ازداد هذا الرقم فذلك يعني أن النسخة التي تمتلكها أحدث، لذلك احرص أن يكون رقم الإصدار الذي تشتريه هو أحدث إصدار موجود في المكاتب.

V: 1.2

1 = نسخة 2021
2 = نسخة 2022 ... الخ

رقم التحديث لهذه النسخة:
(في هذا المثال التحديث الثاني
لنسخة 2021)

لمزيد من الشروحات والنماذج والأسئلة المؤتمنة يرجى الانضمام إلى
قناة المدرس على التلغرام:
علوم بكالوريا مع د.حازم ضعيف
<https://t.me/science12hazem>




يتوفر من نوطة فورنيكس:

1- **نسخة إلكترونية PDF:** دقة الصور فيها منخفضة – والصفحات ذات خلفية ملونة لمنع طباعتها.



2- **نسخة مطبوعة ورقية:** الصور ذات دقة عالية جداً والطباعة ممتازة، للحصول عليها من خارج مدينة حلب التواصل معي على الرقم 0942249948


قسم الجهاز العصبي




الدرس(1): الجهاز العصبي

مراحل تطور الجملة العصبية للكائنات الحية :

<p>***</p> 	<p>الجهاز العصبي عند الباراميسيوم كيف تتحرك الأهداب جميعها سوياً بانتظام؟ إن كل هدب يتصل بـ : حبيبة قاعدية (موقع الحبيبة القاعدية): مغمورة في السيتوبلازم (المادة الحية). الحبيبات القاعدية تتصل مع: اللييفات العصبية؛ (فبالنتيجة): تكوّن: شبكة عصبية</p>
<p>*</p> 	<p>ماذا نتوقع أن ينتج عن تلف بعض اللييفات العصبية؟ - تتوقف حركة الأهداب المتصلة بها. 1- ما أعضاء الحركة لدى الباراميسيوم. ج- الأهداب 2- مم يتكون الجهاز العصبي عند الباراميسيوم؟ 3- أين توجد (حدد موقع) الحبيبة القاعدية عند الباراميسيوم؟ 4- بماذا تتصل الحبيبات القاعدية؟ وماذا تكون؟ 5- كيف تتحرك الأهداب جميعها سوياً بانتظام لدى الباراميسيوم؟ ماذا ينتج عن: تلف بعض اللييفات العصبية لدى الباراميسيوم؟</p>


<p>*1</p> 	<p>الجهاز العصبي عند هيدرية الماء العذب اللمس المفاجئ للوامس هيدرية الماء العذب (ينتج عنه): تنكمش هيدرية الماء العذب بأكملها (فسر): لأن الجهاز العصبي لديها يتكون من: شبكة من خلايا عصبية أولية (وظيفتها): توصل السيالة العصبية: في كل الاتجاهات.</p> <p>وتتوضع هذه الخلايا الأولية في: قاعدة كل من الطبقتين الخارجية والداخلية على جانبي الهلامية المتوسطة لجدار جسم الهيدرية</p>
	<p>1- مم يتكون الجهاز العصبي عند هيدرية الماء العذب؟ 2- ما هي وظيفة الخلايا العصبية عند هيدرية الماء العذب؟ 3- حدد موقع - اذكر وظيفة الخلايا العصبية الأولية عند هيدرية الماء العذب؟ 4- فسر: تنكمش هيدرية الماء العذب بأكملها عند اللمس المفاجئ للوامسها.</p>

**الجهاز العصبي عند دودة الأرض**

فسر: انجذاب الدودة نحو الغذاء والرطوبة.
يعود ذلك لـ: تعقد نسبي في جهازها العصبي الذي يتكون من:


- حبل عصبي بطني
- وعقد
- وأعصاب.

- 1- مم يتكون الجهاز العصبي عند دودة الأرض؟
- 2- فسر: انجذاب الدودة نحو الغذاء والرطوبة

الجهاز العصبي عند الحشرات**الجهاز العصبي عند الحشرات**

فسر:
تمكنت الحشرات من التكيف مع البيئات المختلفة؟
بسبب امتلاكها جهازاً عصبياً مركزياً معقداً نسبياً،
يتكون من:

- حبل عصبي بطني
- وعقد عصبية
- وأعصاب
- وجهاز عصبي حشوي.



- 1- مم يتكون الجهاز العصبي عند الحشرات؟
- 2- بماذا يتميز الجهاز العصبي عند الحشرات عن الجهاز العصبي عند دودة الأرض؟
- 3- فسر: تمكنت الحشرات من التكيف مع البيئات المختلفة؟

النتيجة: يزداد الجهاز العصبي تعقيداً كلما ارتقينا في سلم التطور , ليصل إلى أقصى درجات التعقيد والكفاءة لدى الإنسان.

تلخيص أقسام الجهاز العصبي عند الكائنات:

الحشرات	دودة الأرض	الهيديرية	الباراميسيوم
<p>أ- جهاز عصبي مركزي: يتكون من: 1- حبل عصبي بطني. 2- عقد عصبية. 3- أعصاب.</p> <p>ب- جهاز عصبي حشوي.</p>	<p>1- حبل عصبي بطني 2- عقد 3- أعصاب</p>	<p>شبكة من: <u>خلايا عصبية أولية:</u> توصل السيالة العصبية في كل الاتجاهات.</p>	<p>1- حبيبات قاعدية 2- لييفات عصبية</p>

الجهاز العصبي

الدماغ
النخاع الشوكي
عقد عصبية
أعصاب

الدماغ
النخاع الشوكي
عقد عصبية
أعصاب

الجهاز العصبي المحيطي
PNS

الجهاز العصبي المركزي
CNS

البنية العامة للجهاز العصبي لدى الإنسان

الجهاز العصبي
يتكون تشريحياً من:

جهاز عصبي محيطي
يتكون من:

عقد عصبية
- عقد قحفية
- عقد شوكية
- عقد ذاتية

أعصاب
تقسم بحسب المنشأ إلى:

أعصاب شوكية

أعصاب دماغية

جهاز عصبي مركزي
يتكون من:

النخاع الشوكي

الدماغ

تقسم الأعصاب حسب المنشأ إلى:

- أعصاب دماغية (قحفية) (تنشأ من الدماغ)
- أعصاب شوكية (تنشأ من النخاع الشوكي)

1- مم يتألف الجهاز العصبي لدى الإنسان؟ أو ما هي أقسام الجهاز العصبي؟

2- مم يتألف الجهاز العصبي المركزي؟

3- مم يتألف الجهاز العصبي المحيطي؟

4- ما أنواع الأعصاب في الجهاز العصبي المحيطي؟ ومن أين ينشأ كل منها؟ وكم عددها؟

السكتة الدماغية

كثير في الآونة الأخيرة انتشار حالات السكتة الدماغية،

والسكتة الدماغية هي:

حالة تحدث نتيجة: عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، كحالة طبية طارئة تبدأ فيها: خلايا الدماغ بالموت (فسر): بعد: بضع دقائق من عدم وصول الأكسجين.

وهناك نوعان رئيسان من السكتة هما:

- السكتة الدماغية التي تحدث بسبب الجلطات الدموية.

وتشكل: 87% من الحالات.

- السكتة الدماغية التي تحدث بسبب النزيف في الدماغ أو حوله.

أعراضها:

- الخدر المفاجئ
- وعدم القدرة على تحريك: الوجه أو الذراع أو الساق
- (لاسيما في: أحد جانبي الجسم)
- والارتباك
- ومشاكل في التحدث والرؤية
- والدوخة
- وصعوبة في المشي
- وفقدان التوازن
- والصداع المفاجئ والشديد
- ومشاكل في التنفس
- وفقدان الوعي.

أهم العوامل المؤدية لحدوث السكتة الدماغية:

- السمنة
- ارتفاع في ضغط الدم
- ارتفاع الكوليسترول في الدم
- نقص في النشاط البدني
- التغذية السيئة
- والتدخين


إن أغلب إصابات الجهاز العصبي تأتي من: الأجهزة الأخرى،

وهذا يساعدنا على:


فهم العلاقات بين أجهزة الجسم المختلفة.

*

السكتة الدماغية التي تحدث بسبب النزيف في الدماغ أو حوله




السكتة الدماغية التي تحدث بسبب الجلطات الدموية



جلطة دموية

**



جلطة دموية متوضعة في الشريان الدماغي مسببة السكتة

جلطة دماغية متفككة ومنتقلة

شريان سباتي طبيعي

- 1- فسر حدوث السكتة الدماغية؟
- = فسر موت خلايا الدماغ في السكتة الدماغية.
- 2- ما هي أنواع السكتة الدماغية؟
- 3- ما هي أعراض السكتة الدماغية؟
- 4- ما هي أهم العوامل المؤدية لحدوث السكتة الدماغية؟
- 5- من أين تنتج أغلب إصابات الجهاز العصبي؟

المنشأ الجنيني للجهاز العصبي**يمر تشكل الجهاز العصبي لدى الجنين بـ 3 مراحل:**

- أ- تشكل اللويحة العصبية.
- ب- تشكل كل من الأنبوب العصبي والعرف العصبي بدءاً من اللويحة العصبية.
- ت- تمايز الأنبوب العصبي.

أ- تشكل اللويحة العصبية

ينشأ الجهاز العصبي

خلال الأسبوع الثالث من الحياة الجنينية
من: الوريقة الجنينية الخارجية

تزداد ثخانة: الوريقة الخارجية

على طول: الوجه الظهري الأوسط للجنين
لتشكل: لويحة عصبية

1- متى ينشأ الجهاز العصبي؟


2- سم الوريقة التي يتطور منها النسيج العصبي.

3- صف كيف تتشكل اللويحة العصبية؟


4- أين تزداد ثخانة الوريقة الخارجية قبل تشكل اللويحة العصبية؟

5- ماذا ينتج عن: ازدياد ثخانة الوريقة

الجنينية الخارجية على طول الوجه الظهري الأوسط للجنين؟



مراحل تشكل كل من الأنبوب العصبي والعرف العصبي بدءاً من اللويحة العصبية



س : رتب مراحل تشكل كل من الأنبوب العصبي والعرف العصبي بدءاً من اللويحة العصبية.

1- تتشكل في اللويحة العصبية طيتان جانبيتان مفصولتان بـ: ميازبة عصبية.

2- تبرز الطيتان وتلتحمان مع بعضهما في: الوسط (بالنتيجة).

تتحول الميازبة العصبية إلى: أنبوب عصبي.

3- ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية في: نهاية الأسبوع الرابع من الحمل.

4- يتشكل العرف العصبي من: انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقة الجنينية الخارجية وتوضعها: فوق الأنبوب العصبي.

استنتاجات:

موقع الميازبة العصبية:

بين الطيتين الجانبيتين للويحة العصبية.

ينتج عن انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقة الجنينية الخارجية وتوضعها فوق الأنبوب العصبي: العرف العصبي.

موقع خلايا العرف العصبي:

فوق الأنبوب العصبي

وظيفة خلايا العرف العصبي:

تشكل العقد العصبية.

1- رتب مراحل تشكل كل من الأنبوب العصبي والعرف العصبي بدءاً من اللويحة العصبية.

2- متى ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية؟


3- مم يتشكل العرف العصبي؟

4- حدد موقع: خلايا العرف العصبي.

5- ماذا ينتج عن:

- بروز الطيتين والتحامهما مع بعضهما في الوسط ضمن اللويحة العصبية؟

- انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقة الجنينية الخارجية وتوضعها فوق الأنبوب العصبي؟



تمايز الأنبوب العصبي

ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية

في: نهاية الأسبوع الرابع من الحمل.
ويظهر في الأنبوب العصبي من الأمام:
ثلاث حويصلات
موقع الحويصلات الثلاث:
في الأنبوب العصبي من الأمام
وظيفة الحويصلات الثلاث: ↓

تشكل الحويصلات الثلاث للأنبوب العصبي:

دماغ أمامي - دماغ متوسط - دماغ خلفي

ويشكل القسم المتبقي من الأنبوب العصبي:
النخاع الشوكي

وتشكل خلايا العرف العصبي:
العقد العصبية.

- 1- ماذا يظهر في الأنبوب العصبي من الأمام بعد انفصاله عن الوريقة الجنينية الخارجية؟
- 2- ما هو المنشأ الجنيني للنخاع الشوكي؟
- 3- ما هو المنشأ الجنيني للعقد العصبية؟
- 4- ما هي وظيفة العرف العصبي؟
- 5- ماذا تشكل الحويصلات التي ظهرت الأنبوب العصبي من الأمام؟
- 6- ماذا ينتج عن تمايز خلايا العرف العصبي؟
- 7- عدد الوريقات الجنينية؟

تطور الدماغ في الفقاريات

ألاحظ الأشكال الآتية لبنية الدماغ لدى بعض الأحياء من صفوف مختلفة من الفقاريات، وأقارن بينها، ثم أدرس دماغ الإنسان.

بنية الدماغ تتعقد تدريجياً كلما ارتقينا في سلم تطور الفقاريات.

وعند الثدييات: نما الدماغ،

وتخصصت أقسامه وتعددت مراكزه ووظائفه.


تبلغ كتلة الدماغ في الإنسان البالغ نحو: 1400 غراماً، ويستهلك نحو: % 20 تقريباً من الأكسجين الذي وصل للجسم.

الغذاء الرئيس لخلايا الدماغ هو: الجلوكوز.

يتكون دماغ الإنسان من:

مخ – مخيخ – دماغ بيني (مهادي) – جذع الدماغ.

- 1- كم تبلغ كتلة الدماغ في الإنسان البالغ؟
- 2- كم يستهلك الدماغ من الأكسجين الذي يصل للجسم؟
- 3- ما هو الغذاء الرئيس لخلايا الدماغ؟
- 4- مم يتكون الدماغ؟



التراكيب التي تحمي الدماغ

1- عظام القحف.

2- السحايا:

الأم الجافية - الغشاء العنكبوتي - الأم الحنون.

3- السائل الدماغى الشوكى:

أهميته (وظيفته):

يشكل وسادة مائية تحيط بالدماغ والنخاع الشوكى وتحميهما من الصدمات.

وهو نوعان:

أ- **سائل دماغى شوكى خارجى**: يوجد في الحيز تحت العنكبوتى

الحيز تحت العنكبوتى:

هو حيز يقع بين الغشاء العنكبوتى وغشاء الأم الحنون.


ب- **سائل دماغى شوكى داخلى**: يوجد في قناة السيساء وبطينات الدماغ.

4- الحاجز الدماغى الدموى:


وظيفته:

- يمنع وصول المواد الخطرة التي قد تأتي مع الدم إلى الدماغ.

- وينظم البيئة الداخلية لخلايا الدماغ. (شرحه في الدرس الثانى)



سائل دماغى شوكى خارجى
(في الحيز تحت العنكبوتى)



سائل دماغى شوكى داخلى
(في قناة السيساء - وبطينات الدماغ)

أنواع السائل الدماغى الشوكى

- 1- ما هي التراكيب التي تحمي الدماغ؟
- 2- ما هي أنواع السائل الدماغى الشوكى؟
- 3- ما الذي يملأ الحيز تحت العنكبوتى؟
- 4- حدد موقع أو أين يوجد السائل الدماغى الشوكى الخارجى والداخلى؟
- 5- حدد موقع الحيز تحت العنكبوتى.
- 6- ما أهمية السائل الدماغى الشوكى اذكر وظيفة الحاجز الدماغى الدموى؟

	***	<p>المخ أكبر أقسام الدماغ.</p> <p>أفسر اتساع سطح القشرة الرمادية (السنجابية) للمخ. لوجود الكثير من التلافيف والشقوق فيها.</p> <p>- يقسم المخ إلى نصفي كرة مخية (فسر:) بسبب وجود الشق الأمامي الخلفي.</p> <p>(وظيفة الشق الأمامي الخلفي = ينتج عن وجود الشق الأمامي الخلفي:) يقسم المخ إلى نصفي كرة مخية.</p>
	***	<p>- تقسم القشرة في كل نصف كرة مخية إلى: أربعة فصوص: الفص الجبهي - الفص الجداري - الفص الصدغي - الفص القفوي. (فسر:)</p> <p>بسبب وجود الشقوق الثلاثة: (شق رولاندو - شق سيلفيوس (الوحشي) - الشق الخلفي (القائم)) في كل نصف كرة مخية.</p> <p>(وظيفة هذه الشقوق الثلاثة = ينتج عن وجود الشقوق الثلاثة:) تقسم القشرة في كل نصف كرة مخية إلى: أربعة فصوص.</p>
<p>1- كيف يقسم المخ إلى نصفي كرتين مخيتين؟ 2- فسر: يقسم المخ إلى نصفي كرة مخية. ماذا ينتج عن: وجود الشق الأمامي الخلفي في المخ؟ 3- عدد الشقوق (3) والفصوص (4) في قشرة كل نصف كرة مخية. 4- أكبر أقسام الدماغ هو؟ 5- علل: اتساع سطح القشرة الرمادية (السنجابية) للمخ. 6- فسر: تقسم القشرة في كل نصف كرة مخية إلى 4 فصوص. 7- ماذا ينتج عن وجود 3 شقوق في قشرة كل نصف كرة مخية؟</p>		

المخيخ – البصلة السيسانية**المخيخ:**

يقع خلف البصلة السيسانية والحدبة الحلقية.

يتألف من:

نصفي كرة مخيخية - وفص متوسط دودي الشكل


(فسر تسمية الفص المتوسط بالدودي:)

لوجود أثلام عرضية عليه.


البصلة السيسانية:

شكلها: مخروطي، ولونها: أبيض

الغدة الصنوبرية تقع أمام الحدبات التوعمية الأربع.



- 1- مم يتألف المخيخ / ما هي أقسام المخيخ؟
- 2- حدد موقع المخيخ.
- 3- علل تسمية الفص المتوسط للمخيخ بالفص الدودي.
- 4- ما هو شكل البصلة السيسانية ولونها؟
- 5- حدد موقع الغدة الصنوبرية؟



الوجه البطني للدماغ (من الخلف إلى الأمام)

نلاحظ من الخلف إلى الأمام البنى التالية بالترتيب:

1- البصلة السيسائية:

تقع بين الحذبة الحلقية في الأعلى والنخاع الشوكي في الأسفل.

2- الحذبة الحلقية (جسر فارول):

تبارز مستعرض يقع أمام البصلة السيسائية. لونه: أبيض.

3- السويقتان المخيتان:

امتدادان بشكل حرف V لونهما: أبيض. وهما من أجزاء الدماغ المتوسط. المنطقة الموجودة مكان تباعدهما اسمها: الوطاء.

4- الدماغ المتوسط:**يتألف من:**

- السويقتين المخيتين.
- الحذبات التوعمية الأربع.

5- الغدة النخامية:


تقع على الوجه السفلي للدماغ وترتبط بالوطاء.

6- تصالب العصبين البصريين:

يقع أمام الوطاء.

7- الفص الشمي:

امتداد بشكل لسان يقع أمام وأسفل كل نصف كرة مخية



- 1- حدد موقع البصلة السيسائية.
- 2- حدد موقع ولون جسر فارول (الحذبة الحلقية).
- 3- حدد موقع وشكل ولون السويقتين المخيتين.
- 4- مم يتألف / ما هي أقسام الدماغ المتوسط.
- 5- حدد مكان ارتباط الغدة النخامية بالدماغ.
- 6- حدد موقع الغدة النخامية.
- 7- حدد موقع تصالب العصبين البصريين.
- 8- حدد موقع وشكل الفص الشمي.

الأجزاء الداخلية للدماغ

الجسم الثفني:

جسر من: مادة بيضاء (يوجد: في قاع الشق الأمامي الخلفي للمخ.

مثلث المخ:

جسر آخر (لونه: أبيض (يقع: تحت الجسم الثفني.

الجسم الثفني ومثلث المخ:

جسران من: مادة بيضاء (وظيفتهما: يصلان بين نصفي الكرة المخية.

المهادان:

كثلتان عصبيتان كبيرتان شكلهما: بيضوي يتكونان من: مادة رمادية، ويقع بينهما: **البطين الثالث**.

الوطاء:

يشكل: أرضية البطين الثالث.

البطينان الجانبيان:

يوجد في: كل نصف كرة مخية بطين جانبي واحد.


الجسم المخطط:

هو كتلة رمادية (يقع: في قاعدة كل بطين جانبي لونه: رمادي.

الدماغ البيني (المهادي):


يضم: المهادين – والوطاء

مثلث المخ



الجسم الثفني

البطين الجانبي



الجسم المخطط	المهاد	مثلث المخ	الجسم الثفني	المادة المكونة
مادة رمادية	مادة رمادية	مادة بيضاء	مادة بيضاء	مادة بيضاء

1- اذكر وظيفة الجسم الثفني ومثلث المخ؟

2- قارن بين الجسم الثفني – مثلث المخ – المهاد – الجسم المخطط من حيث: المادة المكونة لكل منها.

3- (حدد موقع) البطين الثالث؟


4- (حدد موقع) الوطاء؟

5- (حدد موقع) البطين الجانبي؟

6- (حدد موقع) الجسم المخطط؟ وما لونه؟

7- مم يتكون الدماغ البيني (المهادي)؟

بطينات الدماغ



بطينات الدماغ

2+1: البطينان الجانبيان:

يقع: في كل نصف كرة مخية بطين جانبي.

8- البطين الثالث:

يقع: بين المهادين.

يتصل البطين الثالث مع البطينين الجانبيين عبر: فرجتي مونرو.
(وظيفة فرجتي مونرو):
تصل البطين الثالث مع البطينين الجانبيين.

يتصل البطين الثالث مع البطين الرابع عبر:
قناة سيلفيوس.
(وظيفة قناة سيلفيوس):
تصل البطين الثالث مع البطين الرابع.

9- البطين الرابع:

يقع: بين البصلة السيسائية والحدبة الحلقية والمخيخ.
يتصل الرابع مع البطين الثالث عبر:
قناة سيلفيوس.

ينفتح البطين على الحيز تحت العنكبوتي عبر:
3 ثقوب: (ثقب ماجندي وثقبي لوشكا).

وظيفة ثقب ماجندي وثقبي لوشكا:

- تفتح البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتي.
- يمر منها: السائل الدماغي الشوكي.
- يتصل البطين الرابع من الأسفل ب: قناة السيساء.

- 1- حدد موقع:(البطينين الجانبيين – البطين الثالث – البطين الرابع).
- 2- ما اسم القناة التي تصل بين البطين الثالث والرابع؟
- 3- اذكر وظيفة قناة سيلفيوس؟
- 4- ما اسم القناة التي يتصل بها البطين الرابع من الأسفل؟
- 5- ما هي وظيفة فرجتي مونرو؟
- 6- كيف يتصل البطين الثالث مع البطينين الجانبيين؟
- 7- كيف يفتح البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتي؟
- 8- اذكر وظيفة ثقب ماجندي وثقب لوشكا؟
- 9- سم بطينات الدماغ وحدد موقع كل منها.



*

الاستسقاء الدماغى

الاستسقاء الدماغى هو: تراكم السائل الدماغى الشوكى فى بطينات الدماغ، فيزداد حجمها وتضغط على الدماغ.


الأسباب:

- 1- انسداد جزئي يمنع التدفق الطبيعي للسائل الدماغى الشوكى المتجدد بين بطينات الدماغ.
- 2- فرط إنتاج السائل الدماغى الشوكى بمعدل أسرع مما يمكن امتصاصه.


وقد يؤدي ذلك إلى: (ينتج عن ذلك):

- إتلاف أنسجة الدماغ
- وزيادة سريعة في حجم الرأس
- يتبعه تخلف عقلي لدى الرضع.

**



- 1- ماذا ينتج عن الانسداد فى إحدى القنوات التي تصل بين بطينات الدماغ؟
- ج1) تراكم السائل الدماغى الشوكى فى بطينات الدماغ فيزداد حجمها وتضغط على الدماغ. وتسمى هذه الحالة: الاستسقاء الدماغى.
- 2- ماذا ينتج عن الاستسقاء الدماغى؟
- 3- ما هي أسباب الاستسقاء الدماغى؟
- 4- ماذا ينتج عن: تراكم السائل الدماغى الشوكى فى بطينات الدماغ؟



الدماغ البييني (المهادي) + جذع الدماغ

الدماغ البييني:

يتألف من: المهادين - والوطاء
(موقع = وظيفة الدماغ البييني):
يشكل: صلة وصل بين: نصفي الكرة المخية وجذع الدماغ.

جذع الدماغ:

يتألف من:

1- الدماغ المتوسط:

يقع: بين الحديبة الحلقية من الأسفل والدماغ البييني من الأعلى.

يتألف من:


- السويقتين المخيتين.
- والحديبات التوعمية الأربعة.

2- الحديبة الحلقية (جسر فارول):

تقع: بين البصلة السيسائية من الأسفل والدماغ المتوسط من الأعلى.

3- البصلة السيسائية:

تقع: بين النخاع الشوكي من الأسفل والحديبة الحلقية من الأعلى.




1- (اذكر وظيفة) الدماغ البييني؟

2- حدد موقع الدماغ البييني.

3- مم يتألف الدماغ البييني؟

4- حدد موقع (الدماغ المتوسط - الحديبة الحلقية - البصلة السيسائية).



توزع (المادة البيضاء - والمادة الرمادية) في كل من (المخ - والمخيخ)


توزع المادة البيضاء والمادة الرمادية (السنجابية) في كل من: **المخ - والمخيخ:**

المخيخ	المخ	
محيطية	محيطية	المادة الرمادية
مركزية	مركزية	المادة البيضاء
تتوزع على شكل: تغصنات شجيرية داخل المادة الرمادية		

*

المخ	المخيخ	النخاع الشوكي	
مركزية	مركزية	محيطية	المادة البيضاء
محيطية	محيطية	مركزية	المادة الرمادية

- 1- أين تقع (كيف تتوزع) المادة الرمادية والمادة البيضاء في كل من المخ والمخيخ؟
- 2- كيف تتوزع المادة البيضاء في المخيخ؟



النخاع الشوكي**النخاع الشوكي:**

هو: حبل عصبي أبيض أسطواني عليه انتفاخان: رقبى - وقطني. يمتد حتى: مستوى الفقرة القطنية الثانية. يسكن: داخل القناة الفقرية.

وبعد الفقرة القطنية الثانية:

فإن القناة الفقرية لا تحوي بداخلها إلا على:

- السحايا.
- والسائل الدماغي الشوكي.
- ومجموعة أعصاب تشكل: ذيل الفرس.

في نهايته السفلية:

يستدق النخاع الشوكي ويشكل: المخروط النخاعي.

النهاية السفلية للنخاع الشوكي

ترتبط ب: نهاية القناة الفقرية

عبر امتداد (رباط ضام) يسمى: الخيط الانتهائي.



(وظيفة الخيط الانتهائي:)

يربط النهاية السفلية للنخاع الشوكي بنهاية القناة الفقرية.

أو: يربط المخروط النخاعي بنهاية القناة الفقرية.


النهاية العلوية للنخاع الشوكي

تنتهي ب: البصلة السيسائية.



- 1- أين يسكن النخاع الشوكي؟
- 2- ماذا تحوي القناة الفقرية بعد الفقرة القطنية الثانية؟
- 3- ما البنية العصبية التي تنتهي بها النهاية العلوية للنخاع الشوكي؟
- 4- ماذا يشكل النخاع الشوكي في نهايته السفلية؟
- 5- ما اسم الامتداد الذي يربط النهاية السفلية للنخاع الشوكي بنهاية القناة الفقرية؟
- 6- اذكر وظيفة الخيط الانتهائي.
- 7- اكتب المصطلح:
- مجموعة أعصاب توجد في القناة الفقرية بعد الفقرة القطنية الثانية.
- المنطقة المستدقة في النهاية السفلية للنخاع الشوكي.
- امتداد أو رباط ضام يربط النهاية السفلية للنخاع الشوكي بنهاية القناة الفقرية.

*** (ارسم)



مقطع عرضي حقيقي في النخاع الشوكي

مقطع عرضي في النخاع الشوكي

أدقق في الشكل الآتي لمقطع عرضي في النخاع الشوكي، وأميز بين منطقتين: ما هما؟

1- في المركز:

توجد المادة الرمادية متوضعة حول قناة السيضاء، وتبدو: بشكل حرف (X) لها قرنان أماميان وقرنان خلفيان.

العرض	قرنان خلفيان	قرنان أماميان
الطول	طويلان	عريضان
	قصيران	

القرن الجانبي ويوجد: بين كل قرن خلفي وقرن أمامي.

2- في المحيط:

توجد المادة البيضاء، وتميز فيها (6) أثلام، هي: التلم الأمامي والتلم الخلفي والأثلام الأربعة الجانبية.

تبدو المادة البيضاء مقسومة إلى قسمين متناظرين. (فسر): بسبب: وجود التلمين الأمامي والخلفي.

ينتج عن وجود التلمين الأمامي والخلفي:

تبدو المادة البيضاء مقسومة إلى قسمين متناظرين

العرض	التلم الخلفي	التلم الأمامي
العمق	عميق	عريض
الامتداد	يصل إلى حدود المادة الرمادية	لا يصل إلى حدود المادة الرمادية

تقسم المادة البيضاء إلى ستة حبال:

حبلان أماميان - حبلان جانبيان - حبلان خلفيان

وذلك بواسطة: القرون الأربعة والأثلام

1- قارن بين القرنين الأماميين والقرنين الخلفيين للنخاع الشوكي من حيث العرض - الطول.

2- حدد موقع: القرن الجانبي للنخاع الشوكي.

3- فسر: تبدو المادة البيضاء مقسومة إلى قسمين متناظرين؟

4- فسر: تقسم المادة البيضاء إلى ستة حبال.

5- قارن بين التلم الخلفي والتلم الأمامي من حيث: العرض - العمق - الامتداد.

6- تقسم القرون الأربعة والأثلام المادة البيضاء إلى 6 حبال. سم هذه الحبال.

7- ماذا ينتج عن وجود القرون الأربعة والأثلام داخل المادة البيضاء للنخاع الشوكي؟

8- قارن بين موقع المادة البيضاء والمادة الرمادية في كل من الدماغ والنخاع الشوكي.

النخاع الشوكي	الدماغ	
محيطية	مركزية	المادة البيضاء
مركزية (تتوضع حول: قناة السيضاء، وتبدو: بشكل حرف (X))	محيطية	لمادة الرمادية

البزل القطني**(كيف يتم البزل القطني؟)**

بإدخال إبرة معقمة إلى الحيز تحت العنكبوتي بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة (فسر:)
لأن النخاع الشوكي يمتد حتى مستوى الفقرة القطنية الثانية وبالتالي لا تتم أذيته عند سحب السائل الدماغي الشوكي.

بعض الأمراض التي يمكن الكشف عنها من خلال عملية البزل القطني.

1-يشير وجود خلايا دم حمراء و الاصفار في السائل الدماغي الشوكي إلى نزف تحت عنكبوتي.

2-معرفة إصابة الجهاز العصبي المركزي بعدوى كما هو الحال في التهاب السحايا عبر الاستدلال بارتفاع أعداد خلايا الدم البيضاء في السائل الدماغي الشوكي.

3 -تشخيص أمراض المناعة الذاتية والكشف عن التصلب المتعدد والذئبة الحمامية من خلال اختبارات الأجسام المناعية النوعية.

4-قد يجرى البزل القطني لقياس الضغط داخل القحف، و الذي قد يزداد في أنماط محددة من استسقاء الدماغ.

المضاعفات التي قد تحدث عند إجراء البزل القطني؟

1-الإحساس بالصداع بعد سحب السائل الدماغي الشوكي.

2-الألم أو عدم الارتياح في مكان إدخال الإبرة.

3 -قد تتضمن المضاعفات الأندر تشكل كدمة أو التهاب سحايا أو تسرب للسائل الدماغي الشوكي بعد البزل القطني.

1- اكتب المصطلح: الحصول على السائل الدماغي


الشوكي من المنطقة القطنية للقناة الفقرية.

2- حدد موقع إجراء البزل القطني.

3- اذكر بعض الأمراض التي يمكن الكشف عنها من خلال عملية البزل القطني.


4- ما المضاعفات التي قد تحدث عند إجراء البزل القطني؟

5- فسر: ينفذ إجراء البزل القطني عادة بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة؟



وضعية الاستلقاء

وضعية الجلوس



سائل دماغي شوكي طبيعي

سائل دماغي شوكي مصفر

التقويم النهائي**أولاً: أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:**

1. إحدى هذه البنى العصبية ليست جزءاً من جذع الدماغ:
 أ- المهاد ب- البصلة السيسائية ج- الدماغ المتوسط د- الحذبة الحلقية.

2. يمر السائل الدماغى الشوكى من البطين الرابع إلى الحيز تحت العنكبوتى عن طريق :
 أ- قناة سيليفيوس ب- ثقب ماجندى وثقبى لوشكا ج- قناة السيساء د- البطين الثالث.

ثانياً: حدد موقع كل من البنى العصبية الآتية:

الجسم المخطط - الغدة النخامية - الغدة الصنوبرية - السويقتين المخيتين - الفصين الشميين.

ثالثاً: أعطى تفسيراً علمياً:

1. تنكمش هيدرية الماء العذب بأكملها عند لمسها.
 2. يعد الجهاز العصبى لدى دودة الأرض أكثر تطوراً من الجهاز العصبى لدى هيدرية الماء العذب.

رابعاً:**أذكر وظيفة كل مما يأتي:**

الخيوط الانتهاى - ثقب ماجندى وثقبى لوشكا - السائل الدماغى الشوكى - فرجتى مونرو.

ورقة

ورقة عمل:

يتم تشخيص بعض الأمراض العصبية من خلال تحليل السائل الدماغى الشوكى، ويتم الحصول عليه بإدخال إبرة معقمة إلى الحيز تحت العنكبوتى بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة.

أبحث أكثر في مصادر التعلم المختلفة عن الإجابة للأسئلة الآتية:

- لماذا ينفذ إجراء عملية البزل القطنى عادة بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة؟
- ما المضاعفات التى قد تحدث عند إجراء البزل القطنى؟
- أذكر بعض الأمراض التى يمكن الكشف عنها من خلال عملية البزل القطنى.
- أكتب تقريراً وأناقش زملائى، وأحتفظ به فى ملف إنجازى.

حل التقويم النهائي

أولاً - أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- 1- إحدى هذه البنى العصبية ليست جزءاً من جذع الدماغ: (أ- المهاد.)
- 2- يمر السائل الدماغي الشوكي من البطين الرابع إلى الحيز تحت العنكبوتي عن طريق: (ب- ثقب ماجندي وثقبي لوشكا.)

ثانياً - أعدد موقع كل من البنى العصبية الآتية:

- الجسم المخطط : في قاعدة البطين الجانبي.
 الغدة النخامية : على الوجه السفلي للدماغ وترتبط بالوطاء.
 الغدة صنوبرية: أمام الحديبات التوعمية الأربعة.
 السويقتان المخيتان: أمام الحديبة الحلقية (جسر فارول).
 الفصان الشميان: أسفل وأمام كل من الكرة المخية.

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً:

- 1- تنكمش هيدرية الماء العذب بأكملها عند لمسها.
 (بسبب وجود خلايا عصبية أولية توصل السيالة العصبية في كل الاتجاهات.)
- 2- يعد الجهاز العصبي لدى دودة الأرض أكثر تطوراً من الجهاز العصبي لدى هيدرية الماء العذب.
 (لأن الخلايا العصبية لدى الهيدرية تتوزع على جانبي الهلامة المتوسطة، بينما في دودة الأرض تجتمع لتكون نسجا عصبية تتضمن حبل عصبي بطني وعقد عصبية وأعصاب.)

رابعاً- أذكر وظيفة كل مما يأتي:

- الخيط الانتهائي: يثبت النخاع الشوكي بنهاية القناة الفقرية.
- ثقب ماجندي وثقبي لوشكا : يفتح بوساطتها البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتي ويمر منهما السائل الدماغي الشوكي.
- السائل الدماغي الشوكي : يشكل وسادة مائية تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي وتحميهما من الصدمات.
- فرجتي مونرو : تصلان البطين الثالث مع البطينين الجانبيين.

ورقة عمل:

- لماذا ينفذ إجراء البزل القطني عادة بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة؟
 لأن النخاع الشوكي يمتد حتى مستوى الفقرة القطنية الثانية وبالتالي لا تتم أذيته عند سحب السائل الدماغي الشوكي .

- ما المضاعفات التي قد تحدث عند إجراء البزل القطني؟

- 1- الإحساس بالصداع بعد سحب السائل الدماغي الشوكي.
- 2- الألم أو عدم الارتياح في مكان إدخال الإبرة.


3- قد تتضمن المضاعفات الأندر تشكل كدمة أو التهاب سحايا أو تسرب للسائل الدماغي الشوكي بعد البزل القطني.

أذكر بعض الأمراض التي يمكن الكشف عنها من خلال عملية البزل القطني.

- 1-يشير وجود خلايا دم حمراء و الاصفار في السائل الدماغي الشوكي إلى نزف تحت عنكبوتي.
- 2-معرفة إصابة الجهاز العصبي المركزي بعدوى كما هو الحال في التهاب السحايا عبر الاستدلال بارتفاع أعداد خلايا الدم البيضاء في السائل الدماغي الشوكي.
- 3-تشخيص أمراض المناعة الذاتية والكشف عن التصلب المتعدد والذئبة الحمامية من خلال اختبارات الأجسام المناعية النوعية.
- 4-قد يجرى البزل القطني لقياس الضغط داخل القحف، و الذي قد يزداد في أنماط محددة من استسقاء الدماغ.

حازم ضعيف

الدرس (2): النسيج العصبي



**

النسيج العصبي

النسيج العصبي

يتألف النسيج العصبي من خلايا تصنف وظيفياً إلى نوعين:

1- الخلايا العصبية (العصبونات):

(وظيفتها):

تتنبه - وتنقل التنبيه.

2- الخلايا الدبقية:

(وظيفتها):

لها دور في دعم العصبونات - وحمايتها - وتغذيتها.

ألاحظ الصورة الآتية، التي تمثل محضراً مجهرياً لنسيج عصبي،

أقارن بين نوعي الخلايا فيه من حيث الوظيفة، العدد، الحجم، القدرة على الانقسام.

القدرة على الانقسام	الحجم	العدد	الوظيفة	
غير قادرة على الانقسام	أكبر حجماً	أقل عدداً	تتنبه - وتنقل التنبيه	الخلايا العصبية
تنقسم وتتغوز	أصغر حجماً	أكثر عدداً	دعم العصبونات - وحمايتها - وتغذيتها	الخلايا الدبقية


1- مم يتألف النسيج العصبي؟

2- ما هما خاصيتا الخلايا العصبية؟

3- اذكر وظيفة الخلايا الدبقية؟

4- قارن بين الخلايا العصبية والخلايا الدبقية من حيث: الوظيفة - العدد - الحجم - القدرة على الانقسام.

1- الخلايا العصبية:



الخلية العصبية (العصبون)

ألاحظ الشكل، وأجيب عن الأسئلة الآتية:

1- هل تمتلك الخلية العصبية جسيماً مركزياً؟ ماذا

أستنتج؟

= فسر: عدد الخلايا العصبية عند الإنسان في

تناقص مستمر.

لا تمتلك جسيماً مركزياً لذلك فهي غير قادرة على الانقسام والتكاثر وبالتالي الخلايا التي تفقد لا تعوض.

2- أسمى الأجزاء الرئيسية التي يتكون منها العصبون.

يتركب العصبون من الأجزاء الرئيسية الآتية:

- جسم الخلية

- والمحوار

- والاستطلايات الهيولية

1- ماذا ينتج عن عدم امتلاك العصبونات جسيماً

مركزياً؟

2- فسر: الخلايا العصبية التي تفقد لا تعوض.

3- فسر: عدد الخلايا العصبية عند الإنسان في تناقص

مستمر.

4- عدد الأجزاء الرئيسية التي يتكون منها العصبون.

جسم الخلية**جسم الخلية:**

يحيط به: غشاء سيتوبلازمي،
(موقع هذا الغشاء السيتوبلازمي): يحيط بجسم الخلية

ويحتوي جسم الخلية:

- نواة كبيرة الحجم،
- وسيتوبلازما تحوي: معظم العضيات الخلوية،

(وظيفة جسم الخلية):

له دور رئيس في الاستقلاب والتغذية.

ما التراكيب الخاصة بالخلية العصبية؟

- جسيمات نيسل
- اللييفات العصبية

جسيمات نيسل:

تجمعات من:

- الشبكة السيتوبلازمية الداخلية الخشنة
- والريبوزومات الحرة التي تحوي ال RNA

(وظيفتها):

لها دور في: تركيب بروتينات الخلية.

(توجد في):

جسم الخلية والاستطالات الهيولية، وتندم في: المحوار.

اللييفات العصبية:

تشكلات خيطية دقيقة

توجد في: جميع أقسام العصبون،

تتوضع بشكل متواز في: المحوار.

1- ماذا يحيط بجسم الخلية العصبية، وماذا

يحتوي؟

2- اذكر وظيفة جسم الخلية.

3- حدد موقع العضيات الخلوية.

4- ما وظيفة جسم الخلية؟

5- حدد موقع: جسيمات نيسل – اللييفات


العصبية.

6- مم تتألف جسيمات نيسل؟ ما وظيفتها؟ حدد

موقعها.

7- مم تتألف اللييفات العصبية؟ وأين توجد؟ وكيف

تتوضع في المحوار؟



الاستطالات الهيولية - والمحاور**أفسر: الاستطالات الهيولية كثيرة العدد:**

لتحقق أكبر قدر من إمكانية الالتقاء بالعصبونات.

ينتهي المحوار بالتفرعات المنتهية.

تشكل التفرعات المنتهية للمحوار:

انتفاخات تسمى **الأزرار**.

(وظيفة الأزرار: تختزن فيها النواقل الكيميائية العصبية).

تتواصل التفرعات المنتهية للمحوار مع:

- خلايا عصبية أخرى.

- أو خلايا مستجيبة كـ **الخلايا الغدية** - أو **العضلية عبر**: المشابك.
(وظيفة المشابك:)


تحقق تواصل التفرعات المنتهية للمحوار مع خلايا عصبية أخرى أو خلايا مستجيبة كـ **الخلايا الغدية** أو **العضلية**.

أفسر: النقل مستقطب في الخلية العصبية.

لأنه يتم بجهة واحدة من الاستطالات الهيولية نحو جسم الخلية ثم للمحوار الذي ينقلها بعيداً عن جسم الخلية.

مقارنة بين الاستطالات الهيولية والمحاور:

المحاور	الاستطالات الهيولية	
من جسم الخلية (ربوة المحوار)	من جسم الخلية	المنشا
مفرد ومعدوم أحياناً	يختلف باختلاف العصبونات	العدد
له تفرعات جانبية وينتهي بتفرعات نهائية	لها تغطينات شجرية عديدة	التفرعات
طويل	قصيرة غالباً	الطول
قطر ثابت على طول امتداده	تستدق بالابتعاد عن جسم الخلية	القطر
ينقل السائلة العصبية بعيداً عن جسم الخلية	استقبال المعلومات الواردة ونقلها نحو جسم الخلية	الوظيفة
لا توجد	توجد	جسيمات نيسل







- 1- أفسر: الاستطالات الهيولية كثيرة العدد؟
- 2- ما وظيفة الاستطالات الهيولية؟
- 3- حدد موقع الأزرار. وما وظيفتها؟
- 4- ماذا تشكل التفرعات المنتهية للمحوار؟ ومع من تتصل؟
- 5- قارن بين الاستطالات الهيولية والمحوار.
- 6- أفسر: النقل مستقطب في الخلية العصبية.

تصنيف الخلايا العصبية: شكلياً (من حيث الشكل)

تصنف الخلايا العصبية (العصبونات) من حيث الشكل:



عديمة المحاور	متعددة القطبية	ثنائية القطب	أحادية القطب
<p>داخل الدماغ.</p> <p>وفي بعض أعضاء الحس.</p>	<p>تأخذ شكلاً:</p> <p>نجمياً</p> <p>في القرون الأمامية النخاع الشوكي</p>	<p>هرمياً</p> <p>- في قشرة المخ</p> <p>- خلايا بوركنج</p> <p>موقع خلايا بوركنج: في القشرة المخيخية.</p>	<p>في العقد الشوكية</p>

الموقع



الصورة

(ارسم)




مثال

*

الأسئلة عن فقرة تصنيف الخلايا العصبية من حيث الشكل:

- 1- عدد أنواع العصبونات من حيث الشكل.
- 2- حدد موقع العصبونات (أحادية القطب – ثنائية القطب – متعددة الأقطاب – عديمة المحاور).
- 3- حدد موقع العصبونات النجمية والعصبونات الهرمية.
- 4- قارن بين العصبونات التالية من حيث الشكل: (العصبون في القرون الأمامية للنخاع الشوكي – العصبون المحرك في قشرة المخ – العصبون في العقدة الشوكية – العصبونات الحسية الشمية – خلايا بوركنج – الخلايا في الطبقة الوسطى للوريقة الداخلية من شبكية العين) (سؤال من درس العين).
- 5- في أي الأنواع من العصبونات يوجد المحاور، وفي أي الأنواع ينعدم؟


تصنيف الخلايا العصبية: وظيفياً (من حيث الوظيفة)**عناصر القوس الانعكاسية****تصنيف العصبونات وظيفياً****موصلة (بيئية)****نايذة (محركة أو مفرزة)****جابذة (حسية)****في المراكز العصبية****في القرون الأمامية للنخاع الشوكي وقشرة المخ****في العقد الشوكية**

مستعيناً بالمخططين السابقين قارن بين:

- عصبونات العقد الشوكية
 - وعصبونات القرون الأمامية للنخاع الشوكي
- من الناحية الشكلية والوظيفية:

عصبونات القرون الأمامية للنخاع الشوكي	عصبونات العقد الشوكية	
متعددة القطب (نجمية)	أحادية القطب	الناحية الشكلية
نايذة (محركة)	جابذة (حسية)	الناحية الوظيفية

- 1- عدد أنواع العصبونات من حيث الشكل.
- 2- حدد موقع (أين توجد) العصبونات (الجابذة – النايذة – الموصلة).
- 3- ما نوع الخلايا التالية من حيث الوظيفة: (العصبون في القرون الأمامية للنخاع الشوكي – العصبون المحرك في قشرة المخ – العصبون في العقدة الشوكية)؟
- 4- أين تتصل العصبونات الحسية مع العصبونات الحركية؟ وكيف؟



محوار أو استطالة هيولية طويلة قد يحاط بأغمد

الليف العصبي

الليف العصبي:

محوار أو استطالة هيولية طويلة قد يحاط بأغمد.

غمد النخاعين:

غمد أبيض لامع يكسب المادة البيضاء لونها،
يتركب من: مادة دهنية فوسفورية تسمى: السفينغوميلين.
(موقعه): يحيط ببعض الألياف العصبية.
ثخنته: منتظمة.

إذ يتقطع على مسافات متساوية بين اختناقات رانفييه
(وظيفة اختناقات رانفييه):

- تقطع غمد النخاعين على مسافات متساوية.
- تحدد قطعاً بين حلقيه بطول: 1 مم.
- (موقع اختناقات رانفييه):
- على مسافات متساوية من غمد النخاعين.
- (وقد تخرج من اختناقات رانفييه):
- امتدادات جانبية للمحوار.

يتشكل غمد النخاعين:

في الجهاز العصبي المركزي: بدءاً من خلايا الدبق قليلة الاستطالات.

في الجهاز العصبي المحيطي: من خلايا شوان.

ما وظيفة غمد النخاعين؟

- يعزل الألياف العصبية كهربائياً.
- ويزيد من سرعة السيالة العصبية.


غمد شوان:

غمد هيولي رقيق شفاف يحوي نوى عديدة،
موقع نواة خلية شوان في:


نواة في كل قطعة بين حلقيه.

في اختناقات رانفييه: يبقى غمد شوان وحده.
وظيفته:

- له دور في مساعدة الألياف العصبية المحيطية على التجدد بعد انقطاعها.
- ويشكل غمد النخاعين في الجهاز العصبي المحيطي.



تشكل غمد النخاعين:
في الجهاز العصبي المحيطي



تشكل غمد النخاعين:
في الجهاز العصبي المركزي

- 1- عرف الليف العصبي.
- 2- ما هي الأغمد التي تحيط بالليف العصبي؟
- 3- كيف يبدو غمد النخاعين؟ ومم يتركب؟
- 4- حدد موقع - وانذكر وظيفة اختناقات رانفييه.
- 5- ماذا يخرج من اختناقات رانفييه؟ وما الغمد فيها؟
- 6- ماذا يخرج من اختناقات رانفييه؟
- 7- ما وظيفة غمد النخاعين؟

علل: الألياف العصبية المحيطة قابلة للتجدد بعد انقطاعها بخلاف الألياف العصبية المركزية.
ج- لأن غمد شوان له دور في مساعدة الألياف العصبية المحيطة على التجدد بعد انقطاعها.





- 8- من أين يتشكل غمد النخاعين؟
- 9- كيف يبدو غمد شوان؟
- 10- حدد موقع نوى غمد شوان؟
- 11- ما هو دور (وظيفة) غمد شوان؟


حازم

ضعيف

تصنيف الألياف العصبية

الألياف العصبية

الألياف عديمة النخاعين		الألياف ذات النخاعين		
ألياف عارية لا تحاط بأي غمد	ألياف مجردة من النخاعين تحاط بغمد شوان فقط	ألياف مغمدة بالنخاعين فقط	ألياف مغمدة بالنخاعين وشوان	
المادة الرمادية للمراكز العصبية	العصب الشمي	- المادة البيضاء - العصب البصري	معظم الأعصاب مثل: (العصب الوركي)	توجد في
				صورة *



الأعصاب:

حبال بيض لامعة اللون
مختلفة: الأطوال والأقطار.
تتألف من: تجمع حزم من ألياف عصبية.

1- كيف تصنف الألياف العصبية حسب تغميدها؟

2- حدد موقع (أين توجد) الألياف العصبية (المغمدة بالنخاعين فقط - المغمدة بالنخاعين وشوان - المغمدة بغمد شوان فقط - العارية)؟

3- ما نوع الألياف العصبية في: (العصب الوركي - المادة البيضاء - العصب البصري - العصب الشمي - المادة الرمادية)؟

4- بماذا تختلف الأعصاب عن بعضها؟ وما لونها؟

5- مم يتألف العصب؟

2-خلايا الدبق العصبي:


الدبق العصبي

يوجد في:

- الجهاز العصبي المحيطي PNS
- الجهاز العصبي المركزي CNS

الخلايا الدبقية في الجهاز العصبي المحيطي PNS



الخلايا التابعة (الساتلة)	خلايا شوان
تحيط بـ: أجسام العصبونات في: العقد العصبية الكبيرة	(وظائفها): - تشكل غمد النخاعين حول بعض الألياف العصبية.
تقوم بـ: - دعم العصبونات - وتغذيتها.	- وتساهم في تجديدها بعد تعرضها للأذية.



- 1- ما أقسام الخلايا الدبقية؟
- 2- ما هي الخلايا الدبقية الموجودة في الجهاز العصبي المحيطي؟
- 3- اذكر وظيفة خلايا شوان.
- 4- حدد موقع الخلايا الساتلة.
- 5- اذكر وظيفة الخلايا الساتلة.

الخلايا الدبقية في الجهاز العصبي المركزي CNS

خلايا البطانة العصبية	الخلايا الدبقية النجمية	خلايا الدبق قليلة الاستطالات	خلايا الدبق الصغيرة
(موقعها): - تبطن قناة السيساء - وبطينات الدماغ - وتغطي سطوح الصفائر المشيمية. (وظيفتها): تفرز السائل الدماغي الشوكي.	(وظيفتها): - تسهم في تشكيل الحاجز الدماغي الدموي. - وتعمل على تنظيم التوازن الشاردي حول العصبونات. - وتقوم بتغذية العصبونات - وإعادة امتصاص النواقل العصبية.	(وظيفتها): - تشكل غمد النخاعين حول محاور الخلايا العصبية في المادة البيضاء.	(وظيفتها): خلايا مناعية تقوم بـ: بلعمة: - العصبونات التالفة - والخلايا الغريبة.



الحاجز الدماغي الدموي:

يتألف من:

- الأبواق الوعائية، وهي: النهايات المتوسعة لبعض استطالات خلايا الدبق النجمية.
- والأوعية الدموية المرتبطة بها.

(وظيفته):

- يحمي الدماغ من المواد الخطرة التي قد تأتي مع الدم.
- وينظم البيئة الداخلية لخلايا الدماغ.

الأسئلة عن فقرة الخلايا الدبقية في الجهاز العصبي المركزي:

- 1- ما أقسام الخلايا الدبقية؟
 - 2- ما هي الخلايا الدبقية الموجودة في الجهاز العصبي المركزي؟
 - 3- حدد موقع (خلايا الدبق الصغيرة – خلايا الدبق قليلة الاستطالات – الخلايا الدبقية النجمية).
- ج- في الجهاز العصبي المركزي.

التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. خلايا دبقيّة تفرز السائل الدماغي الشوكي:
أ- التابعة ب- النجمية ج- قليلة الاستطالات د- البطانة العصبية.
2. يصنف العصبون في العقد الشوكية شكلياً:
أ- متعدد القطبية ب- أحادي القطب ج- ثنائي القطب د- عديم المحوار

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. عدد الخلايا العصبية عند الإنسان في تناقص مستمر.
2. يعد غمد شوان بمثابة خلايا.
3. لا يحيط غمد النخاعين بكامل الليف العصبي.

ثالثاً قارن بين الاستطالات الهيولية والمحوار الاسطواني من حيث :

العدد - القطر - الوظيفة

حازم ضعيف

حل التقويم النهائي:

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. خلايا دبقية تفرز السائل الدماغي الشوكي: د. البطانة العصبية
2. يصنف العصبون في العقد الشوكية شكلياً: ب - أحادي القطب

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. عدد الخلايا العصبية عند الإنسان في تناقص مستمر.
لأن التالف منها لا يعوض إذ أنها فقدت قدرتها على الانقسام لغياب الجسيم المركزي.

2. يعد غمد شوان بمثابة خلايا.

(لأنه يحوي نوى عديدة، نواة واحدة في كل قطعة بين حلقيه.)


3. لا يحيط غمد النخاعين بكامل الليف العصبي.

(ليسمح بانتقال السائلة العصبية من عصبون لآخر.)

ثالثاً: أقرن بين الاستطالات الهيولية والمحوار الاسطواني من حيث: العدد - القطر - الوظيفة.

الاستطالات الهيولية	المحوار	
تستدق بالابتعاد عن جسم الخلية	ثابت على امتداده	العدد
يختلف باختلاف العصبونات	مفرد دوماً وأحياناً معدوم	القطر
استقبال المعلومات الواردة ونقلها نحو جسم الخلية	ينقل السائلة العصبية بعيداً عن جسم الخلية	الوظيفة

الدرس(3): الجهاز العصبي المحيطي (الطرفي) PNS



الجهاز العصبي المحيطي

تتعرض حياتنا لكثير من التغيرات، فتارة نعيش حالة من الراحة والهدوء وتارة تنتابنا حالة من التوتر والقلق.
فما الجهاز المسؤول عن تلك المتغيرات؟
ج- الجهاز العصبي المحيطي (الطرفي).

ما قسما الجهاز العصبي المحيطي من حيث الوظيفة؟
يقسم وظيفياً إلى قسمين: **جسمي إرادي** - وذاتي لا إرادي.

الجهاز العصبي المحيطي:

يشمل: جميع البنى والتراكيب الواقعة خارج القحف والقناة الفقرية،


ويتألف من:

- عقد عصبية.
- أعصاب.

- 1- ماذا يشمل الجهاز العصبي المحيطي؟ ومم يتألف؟
- 2- ما قسما الجهاز العصبي المحيطي من حيث الوظيفة؟

العقد العصبية**العقد العصبية هي:****بنى تحوي:**

- تجمعات أجسام عصبونات
- وخلايا دبقية
- مدعومة بنسيج ضام

تنشأ من: العرف العصبي**(وظيفةها: تعمل كمحطة استقبال وإرسال للسياالات العصبية).****أحدد نوع الخلايا الدبقية التي تدخل في بنية العقد العصبية.**
ج - الخلايا التابعة (الساتلة).**أنواع العقد:****1- عقد قحفية****تقع على: الأعصاب القحفية (الدماغية).****2- عقد شوكية****تقع على: الجذر الخلفي الحسي للعصب الشوكي.****3- عقد ذاتية** (مستقلة لإرادية)،**وهي نوعان:****1- عقد ودية****2- عقد نظيرة ودية.**

*

1- مم تتألف العقد العصبية؟**2- من أين تنشأ العقد العصبية جنينياً؟****3- اذكر وظيفة العقد العصبية.****4- أحدد نوع الخلايا الدبقية التي تدخل في بنية العقد العصبية.****5- حدد موقع (العقد القحفية – العقد الشوكية).****6- كيف تعمل العقد الذاتية.****7- ما هما قسما العقد الذاتية؟**

الأعصاب

تصنيف الأعصاب:

تصنف الأعصاب حسب: المنشأ والوظيفة.


تصنيف الأعصاب حسب المنشأ:

1- أعصاب قحفية (دماغية) عددها: 12 شفعاً.

2- أعصاب شوكية عددها: 31 شفعاً.

تصنيف الأعصاب حسب الوظيفة:

1-حسية 2-حركية 3-مختلطة



*

1- ما هما تصنيفا الأعصاب؟

2- ما نوع الأعصاب من حيث المنشأ؟ وكم يبلغ عدد كل منها؟

3- ما نوع الأعصاب من حيث الوظيفة؟

الأعصاب الشوكية


العصب الشوكي:

يتألف من اتحاد جذرين:

1- جذر خلفي حسي.

2- جذر أمامي محرك

الوظيفة و الشكل:



جذر أمامي محرك

تمر فيه: السيالات العصبية المحركة القادمة من: الجهاز العصبي المركزي إلى: المنفذات

لا يحمل: عقدة شوكية (محرك)

جذر خلفي حسي

تمر فيه: السيالات العصبية الحسية القادمة من: المستقبلات الحسية إلى: الجهاز العصبي المركزي

يحمل: عقدة شوكية (حسي)

الوظيفة

الشكل

(أو كيف نميز بينهما)

1- مم يتألف العصب الشوكي؟

2- يكون الجذر الخلفي؟ ويكون الجذر الأمامي؟

3- ما وظيفة (الجذر الخلفي الحسي – الجذر الأمامي المحرك)؟

4- كيف نميز بين جذري العصب الشوكي؟

5- قارن بين جذري العصب الشوكي من الناحية الوظيفية والشكلية؟

الجهاز العصبي الذاتي

يقسم الجهاز العصبي الذاتي إلى:

1- القسم الودي**2- القسم نظير الودي**

يتألف كل منهما من: مراكز عصبية – عقد عصبية – أعصاب.

القسم الودي	القسم نظير الودي	الوظيفة
يعد الجسم لمواجهة الخطر – وتهينة الجسم للأنشطة الفورية	يعمل على إعادة الجسم إلى حالة: الراحة - والهدوء	
تأثيرها على أعضاء الجسم المختلفة		
تقلص العضلات الشعاعية للقزحية (توسع الحدقة)	تقلص العضلات الدائرية للقزحية (تضييق الحدقة)	الحدقة
تشبيط إفراز اللعاب	زيادة إفراز اللعاب	الغدد الدمعية
توسع القصبات	تضييق القصبات	اللعاب
يزيد ضربات القلب	يبطئ ضربات القلب	القصبات
تشبيط إفراز	تنشيط إفراز	ضربات القلب
تحرر الغلوكوز	تخزين الغلوكوز	البنكرياس
نقص نشاط الجهاز الهضمي وإفرازاته	زيادة نشاط الجهاز الهضمي وإفرازاته	الكبد
استرخاء المثانة	تقلص المثانة	الجهاز الهضمي
يأخذ لب الكظر دور عقدة ودية وعند تنبيهه ودياً: يفرز: الأدرينالين – والنورأدرينالين في الدم	(لا يزود بعصبونات إلا من القسم الودي)	المثانة
		لب الكظر

أقسام كل من القسم نظير الودي والقسم الودي


- في القرون الجانبية للنخاع الشوكي في: المنطقتين الظهرية – والقطنية. وفي الوطاء	- في جذع الدماغ والمنطقة العجزية للنخاع الشوكي وفي الوطاء	المراكز العصبية
- سلسلتان على: جانبي العمود الفقري - لب الكظر	قرب الأحشاء أو في جدارها	العقد العصبية
تخرج من: العقد الودية إلى: مختلف الأعضاء الداخلية	تخرج من: - جذع الدماغ ك: العصب المجهول - ومن المنطقة العجزية للنخاع الشوكي ك: الأعصاب الحوضية	الأعصاب

<p>تتصل العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور بفرعين هما: - فرع واصل أبيض - فرع واصل رمادي</p>	-----	كيف ترتبط معظم العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور
<p>1- مركز عصبي ودي 2- ليف قبل العقدة 3- عقدة ودية 4- ليف بعد العقدة</p>	<p>1- مركز عصبي نظير ودي 2- ليف قبل العقدة 3- عقدة نظيرة ودية 4- ليف بعد العقدة</p>	المسلك
<p>1- عصبون نابذ قبل العقدة: يخرج ليفه من الجهاز العصبي المركزي (من القرن الجانبي للنخاع الشوكي). يشكل مشبكاً في العقدة الودية مع: عصبون حركي يقع جسمه في العقدة الودية. 2- عصبون حركي: يقع جسمه في العقدة الودية وينتهي ليفه العصبي إلى العضو المستجيب.</p>		العصبونات
<p>قصيرة (لأن العقد الودية سلسلتان تقعان على جانبي العمود الفقري أي قريبة من المراكز العصبية)</p>	<p>طويلة (لأن العقد نظيرة الودية تقع قرب الأحشاء أو في جدارها أي بعيدة عن المراكز العصبية)</p>	الألياف قبل العقدة
<p>طويلة (نفس التعليل الذي فوقه)</p>	<p>قصيرة (نفس التعليل الذي فوقه)</p>	الألياف بعد العقدة
<p>أستيل كولين</p>	<p>أستيل كولين</p>	نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية في العقد الذاتية
<p>نورأدرينالين</p>	<p>أستيل كولين</p>	نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة
<p>يكون الناقل الكيميائي بين العصبون المحرك - والأعضاء المستجيبة (في الجهاز العصبي الجسمي) هو: الأستيل كولين</p>		


الجهاز العصبي الجسمي – الجهاز العصبي الذاتي:

الجهاز العصبي الذاتي		الجهاز العصبي الجسمي	عدد العصبونات
القسم الودي	القسم نظير الودي		
(قبل العقدة – وبعد العقدة)		1 (محرك)	موقع جسم العصبونات
في كلتا الجملتين: (العصبون قبل العقدة) (العصبون بعد العقدة)		في القرن الأمامي للنخاع الشوكي	عقد النخاعين
في العقدة الذاتية	في المركز العصبي الذاتي	مغمد بالنخاعين	غير مغمد بالنخاعين


يكون الناقل الكيميائي بين العصبون المحرك - والأعضاء المستجيبة (في الجهاز العصبي الجسمي) هو: **الأسيتيل كولين**.




*** (ارسم)



(الجهاز العصبي الجسدي)




(القسم الودي (الجهاز العصبي الذاتي))




الأسئلة عما سبق:

- 1- مم يتألف كل من القسمين الودي ونظير الودي؟
- 2- قارن بين القسم الودي والقسم نظير الودي من حيث: (المراكز العصبية – العقد العصبية – الأعصاب – الوظيفة – التأثير على الحدقة – إفراز اللعاب – القصابات – ضربات القلب – إفراز البنكرياس – الغلوكوز في الكبد – الجهاز الهضمي – المعدة – الأمعاء – المثانة).
- 3- قارن بين طول الألياف قبل العقدة الألياف بعد العقدة في كل من القسم الودي والقسم نظير الودي.
- 4- قارن بين القسم الودي والقسم نظير الودي من حيث: (نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية في العقد الذاتية).
- 5- قارن بين القسم الودي والقسم نظير الودي من حيث (نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة).
- 6- قارن بين الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي من حيث (عدد العصبونات الصادرة عن كل منهما إلى الخلايا المستجيبة – موقع جسم كل عصبون – غمد النخاعين).
- 7- ما هو الناقل الكيميائي في الجهاز العصبي الجسمي؟
- 8- كيف ترتبط العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور؟
- 9- مم يتألف المسلك العصبي الودي؟
- 10- ما هي العصبونات المشكلة للمسلك الودي؟ وأين توجد؟ وأين تتشابك؟
- 11- علل: تكون الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي، وطويلة في القسم نظير الودي.
- 12- ما العضو الذي لا يزود بعصبونات إلا من القسم الودي وماذا ينتج عن تنبيهه ودياً؟


ح
ضعيف




تأثير القسم الودي - والقسم نظير الودي على: إفراز اللعاب




تأثير القسم الودي - والقسم نظير الودي على: الحدقة




تأثير القسم الودي - والقسم نظير الودي على: ضربات القلب




تأثير القسم الودي - والقسم نظير الودي على: القصبات




تأثير القسم الودي - والقسم نظير الودي على: الكبد




تأثير القسم الودي - والقسم نظير الودي على: البنكرياس



تأثير القسم الودي - والقسم نظير الودي على: المثانة



تأثير القسم الودي - والقسم نظير الودي على: الجهاز الهضمي



تأثير القسم الودي (فقط) على: لب الكظر

مسار القسم نظير الودي نحو الأحياء المختلفة (مثل حالة الراحة والهدوء)						
تنبيه العضو المستجيب	الليف بعد العقدة	العقدة	العصب الحامل للليف قبل العقدة	الليف قبل العقدة	المركز العصبي	
الناقل الكيميائي بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة: أستيل كولين	قصير مجرد من النخاعين	الناقل الكيميائي في العقدة: أستيل كولين	العصب المجهول (10)	طويل مغمد بالنخاعين	جذع الدماغ	الحدقة (العضلات الدائرية) الغدة اللعابية القصبات القلب البنكرياس الكبد
			العصب المجهول + الأعصاب الحوضية		جذع الدماغ + المنطقة العجزية للنخاع الشوكي	الجهاز الهضمي
			الأعصاب الحوضية		المنطقة العجزية للنخاع الشوكي	المثانة
						لب الكظر

لا يزود بعضونات إلا من القسم الودي

مسار القسم الودي نحو الأحشاء المختلفة (مثل حالة الوقوف لمحاضرة أو حالة طوارئ)					
تنبيه العضو المستجيب	الليف بعد العقدة	العقدة	الليف قبل العقدة	المركز العصبي	
الناقل الكيميائي بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة: نورأدرينالين	طويل مجرد من النخاعين	(سلسلتان من العقد على جانبي العمود الفقري) الناقل الكيميائي في العقدة: أستيل كولين	قصير مغمد بالنخاعين	في القرون الجانبية للمنطقة الظهرية للنخاع الشوكي	الحدقة (العضلات الشعاعية) الغدد اللعابية القصبات القلب البنكرياس الكبد
				في القرون الجانبية للمنطقين الظهرية والقطنية للنخاع الشوكي	الجهاز الهضمي
				في القرون الجانبية للمنطقة القطنية للنخاع الشوكي	المثانة
				في القرون الجانبية للمنطقة الظهرية للنخاع الشوكي	لب الكظر
يأخذ دور عقدة ودية و الناقل فيه مثل الناقل في العقدة: أستيل كولين وعند تنبيهه ودياً: يفرز: الأدرينالين – والنورأدرينالين في الدم					

التقويم النهائي**أولاً: أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي:**

1. تحدث الاستجابة في ظروف الضغط النفسي والغضب عن طريق:
- أ. القسم الودي
ب. القسم نظير الودي
ج. تحرر أستيل كولين من العصبونات بعد العقدية
د. الجهاز العصبي الجسبي

2. واحد مما يأتي لا يمكن السيطرة عليه بالفكر الواعية:
- أ. العصبونات الحركية
ب. الجهاز العصبي الجسبي
ج. الجهاز العصبي الذاتي
د. العضلات الهيكلية

3. بينما تجلس بهدوء لتقرأ هذه الجملة يكون جزء الجهاز العصبي الأكثر نشاطاً هو:
- أ. الجسبي الإرادي
ب. الودي
ج. نظير الودي
د. لا شيء مما ذكر

4. الناقل الكيميائي بين العصبون قبل العقدة والعصبون بعد العقدة هو:
- أ. النورأدرينالين
ب. الدوبامين
ج. الأستيل كولين
د. الغلوتامات

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي وطويلة في القسم نظير الودي.
- يعطى المرضى في أثناء نوبة الربو النورأدرينالين.

ثالثاً: ما العضو الذي لا يزود بعصبونات إلا من القسم الودي؟**رابعاً: أصف ما يحدث لكل عضو من الأعضاء الآتية، إذا طلب مني الوقوف لإلقاء محاضرة لم أعد لها:**

القلب - الأمعاء - الغدد اللعابية - حدقة العين

حل التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. تتم السيطرة على استجابتي ظروف الضغط النفسي والغضب عن طريق (أ. القسم الودي)
2. واحد مما يأتي لا يمكن السيطرة عليه بالفكر الواعية (ج. الجهاز العصبي الذاتي).
3. بينما تجلس بهدوء لتقرأ هذه الجملة يكون جزء الجهاز العصبي الأكثر نشاطاً هو: (ج. العصبي نظير الودي).
4. الناقل الكيميائي بين العصبون قبل العقدة والعصبون بعد العقدة هو: (ج. الأستيل كولين).

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي وطويلة في القسم نظير الودي.
- (الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي لأن العقد الودية سلسلتان تقعان على جانبي العمود الفقري وطويلة في القسم نظير الودي لأن العقد نظيرة الودية تقع قرب الأحشاء في جدرانها).
- يعطى المرضى في أثناء نوبة الربو النورأدرينالين.
- (من أجل توسيع الطرق الهوائية التنفسية).

ثالثاً: ما العضو الذي لا يزود بعصبونات إلا من القسم الودي؟

(لب الكظر الذي يزود بعصبونات من القسم الودي)
بالاعتماد على الشكل صفحة 27.

رابعاً: أصف ما يحدث لكل عضو من الأعضاء الآتية، إذا طلب مني الوقوف لإلقاء محاضرة

لم أعد لها.

القلب: تسرع معدل ضرباته.

الأمعاء: تثبيط.

الغدد اللعابية: تثبيط إفراز

حدقة العين: توسع

الدرس (4): خواص الأعصاب

خواص الأعصاب (من خلال تجربة الضفدع والعصب)



*

أجرب وأستنتج خواص الأعصاب:

المواد والأدوات اللازمة:

ضفدع مجهز للتجربة يطلب من المدرس.

وبعد إزالة جلد الطرف الخلفي؛ نباعد بين عضلتي الفخذ عن بعضهما:

فيبرز: العصب الوركي الذي ينتهي في: العضلة الساقية البطنية كما في الشكل المجاور.

نقوم بتنبيه العصب الوركي، ماذا نلاحظ؟ وماذا نستنتج؟

يؤدي تنبيه العصب الوركي إلى تقلص: العضلة الساقية البطنية.

يتمتع العصب بخاصيتي:

1- قابلية التنبيه

2- نقل التنبيه

1- كيف يتم تجهيز الضفدع لدراسة خواص الأعصاب عليه؟

2- إلى ماذا يؤدي تنبيه العصب الوركي لدى الضفدع؟

3- ما هي خواص العصب؟

قابلية التنبيه

المنبه:

هو كل تبدل في: الوسط الداخلي أو الخارجي، يكون تأثيره كافياً لإزاحة المادة الحية من: حالة استتبابها السابقة إلى: حالة جديدة.

تصنف المنبهات (حسب طبيعتها) إلى:

آلية – وحرارية – وإشعاعية – وكيميائية – وكهربائية.


فسر: تعد المنبهات الكهربائية أفضل أنواع المنبهات وأكثرها

استخداماً في التجارب المخبرية.

لسهولة: الحصول عليها واستخدامها.


وإمكانية التحكم ب: شدتها وزمن تأثيرها.

وأقلها ضرراً على الخلية.



	<p>تصنف المنبهات (حسب الاستجابة لها) إلى:</p> <p>المنبه دون العتوي: هو المنبه الذي لا تقوى شدته على توليد الدفعة العصبية والتقلص العضلي خلال زمن تأثير معين.</p> <p>المنبه العتوي: هو المنبه الذي تكفي شدته لتوليد الدفعة العصبية والتقلص العضلي خلال زمن تأثير معين.</p>
	<p>1- عرف المنبه.</p> <p>2- ينقل المنبه المادة الحية من إلى</p> <p>3- ما هي أنواع المنبهات (حسب طبيعتها)؟</p> <p>4- ما هي أنواع المنبهات (حسب الاستجابة لها)؟</p> <p>5- فسر: تعد المنبهات الكهربائية أفضل أنواع المنبهات وأكثرها استخداماً في التجارب المخبرية.</p>

(الشدة الحدية – والزمن المفيد)



الشدة الحدية :


هي الشدة التي تكفي لتوليد الدفعة العصبية، والتقلص العضلي، خلال زمن تأثير معين.

(وعند تثبيت الشدة وتغيير الزمن؛ نلاحظ أن الأزمنة القصيرة لا تتشكل عندها الدفعة العصبية. وبزيادة الزمن تدريجياً نصل إلى زمن يكفي لتوليد الدفعة العصبية، ويسمى: الزمن المفيد).

الزمن المفيد :

هو الزمن اللازم لحدوث التنبيه في نسيج ما إذا كانت شدة المنبه تساوي العتبة الدنيا أو تزيد، ودونه تصبح تلك الشدة غير فعالة.

- 1- عرف (الشدة الحدية – الزمن المفيد).
- 2- ماذا يسمى الزمن الأقل الموافق للشدة الحدية؟
- 3- (يأتي سؤال عن استخراج الشدة الحدية والزمن المفيد من جدول – أو مخطط).

(العتبة الدنيا (الريوباز) – والزمن المفيد الأساسي)**العتبة الدنيا (الريوباز):**

هي شدة محددة لا يحدث من دونها أي تنبيه مهما طال زمن التأثير.

الزمن المفيد الأساسي:

هو الزمن الأقصر الذي لا يزال عنده الريوباز فعالاً.

1- عرف (العتبة الدنيا (الريوباز) – والزمن المفيد الأساسي).

2- ما قيمة الشدة التي لا يحدث من دونها التنبيه مهما طال الزمن؟


3- ما الزمن الأقصر الذي لا يزال الريوباز فعالاً عنده؟

4- (يأتي سؤال عن استخراج الريوباز والزمن المفيد الأساسي من جدول – أو مخطط).

(ضعفا الريوباز – الكروناكسي)**الكروناكسي:**

الزمن المفيد اللازم لحدوث التنبيه في نسيج ما عندما نستخدم تياراً شدته **ضعفا الريوباز**.

- معيار اقترحه العالم: لابييك -:
- إبراز دور الزمن في مفهوم قابلية التنبيه.
- تسمح قيمته بـ مقارنة سرعة قابلية التنبيه في الأنسجة المختلفة.
- يلاحظ أن قيمته: واحدة
- في: النسيج ذات الوظيفة الواحدة المتكاملة.
- تدل قيمته المرتفعة في نسيج ما على:
- بطء في قابلية تنبيه هذا النسيج.
- وبالعكس تدل قيمته المنخفضة
- في نسيج ما على:
- ارتفاع سرعة في قابلية تنبيه هذا النسيج.



1- ما الزمن اللازم لحدوث التنبيه في النسيج، إذا بلغت شدة المنبه ضعفا الريوباز؟

2- أستنتج العلاقة بين قيمتي الريوباز والكروناكسي في نسيج ما وقابلية هذا النسيج للتنبيه.

ج - تزداد قابلية التنبيه بتناقص قيمتي الريوباز والكروناكسي

3- من العالم الذي اقترح مفهوم الكروناكسي؟ ولماذا؟

4- ما أهمية (فائدة) الكروناكسي؟ أو بماذا تسمح قيمة الكاروناكسي؟


5- كيف تكون قيمة الكاروناكسي في النسيج ذات الوظيفة الواحدة المتكاملة؟

6- في أين نسيج تكون قيمة الكاروناكسي واحدة؟

7- على ماذا تدل قيمة الكاروناكسي المرتفعة في نسيج ما؟

- 8- على ماذا تدل قيمة الكاروناكسي المنخفضة نسيج ما؟
 9- كيف تكون قيمة الكاروناكسي في النسيج السريع في قابلية التنبيه؟
 10- كيف تكون قيمة الكاروناكسي في النسيج البطيء في قابلية التنبيه؟
 11- لعناصر القوس الانعكاسية النخاعية الكروناكسي نفسه.

زمن الاستنفاد



زمن الاستنفاد:

هو زمن محدد لا يحدث من دونه أي تنبيه مهما ارتفعت شدة المنبه.

1- عرف زمن الاستنفاد.

2- فسر: ملامسة جسم ساخن بسرعة لا تجعلنا نشعر بسخونته.

العلاقة بين الشدة والزمن

نستنتج مما سبق أن:

العلاقة بين الشدة والزمن علاقة عكسية.

يظهر منحنى عتبات التنبيه بشكل:

فرع من قطع زائد.

يفصل بين:

- منطقة التنبيهات **الفعالة** (فوقه أو عليه)
- ومنطقة التنبيهات **غير الفعالة** (تحتة)

أي من النقاط (أ - ب - ج) يكون المنبه فعالاً عندها؟ ولماذا؟


النقطة (أ) : فعالة لأنها تقع في منطقة التنبيه الفعالة فوق المنحني.

النقطة (ب) : فعالة لأنها تقع على المنحني.

النقطة (ج) غير فعالة لأنها تقع في منطقة

التنبيه غير الفعالة تحت المنحني.

*** (ارسم)



1- ما طبيعة العلاقة بين الشدة والزمن في تنبيه الليف العصبي؟

2- أين تكون المنبهات فعالة وأين تكون غير فعالة؟

3- أي من النقاط (أ - ب - ج) يكون المنبه فعالاً عندها؟ ولماذا؟

تطبيقات هامة على الدرس الرابع:

تطبيق على قيم الكروناكسي

عند تنبيه عدة أعصاب حصلنا على قيم الريبواز والكروناكسي الموضحة بالجدول المجاور:

عصب 4	عصب 3	عصب 2	عصب 1	
4	3	2	4	الريبواز (m.V)
3	2	1.5	2	الكروناكسي (m.s)

1- ما هو العصب الأكثر قابلية للتنبيه.

عصب 2 لأنه يمتلك أقل قيمة كروناكسي.

2- ما هي النسج ذات الوظيفة الواحدة المتكاملة من الجدول السابق.

عصب 1 + عصب 3 لأنهما يمتلكان نفس قيمتي الكروناكسي.

تطبيق على حالة الجدول:

- استخراج من الجدول التالي المقاييس التالية:

الريبواز - الزمن المفيد الأساسي - ضعفي الريبواز - الكروناكسي - زمن الاستنفاد

5	3	2.15	1.5	1.05	0.65	0.45	0.2	0.15	0.10	0.09	زمن التنبية (ms)
34	35	37	40	47	55	70	94	112	120	130	شدة التنبية (mV)
x	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	الاستجابة

الحل:

الريبواز: هي شدة محددة لا يحدث من دونها أي تنبيه مهما طال زمن التأثير (أما عندها فيحدث) <<< الريبواز = 35 mV

الزمن المفيد الأساسي: هو الزمن الأقصر الذي لا يزال عنده الريبواز فعالاً <<< الزمن المفيد الأساسي = 3 ms

ضعفي الريبواز: 70 mV = 2 × 35

الكروناكسي: الزمن المفيد اللازم لحدوث التنبيه في نسيج ما عندما نستخدم تياراً شدته ضعف الريبواز

<<< الكروناكسي = 0.45 ms

زمن الاستنفاد: هو زمن محدد لا يحدث من دونها أي تنبيه مهما ارتفعت شدة المنبه (أما عنده فيحدث)

<<< زمن الاستنفاد = 0.10 ms

تطبيق على حالة مخطط بياني:

1- استخراج من المخطط التالي المقاييس التالية:

الريوباز - الزمن المفيد الأساسي - ضعفي

الريوباز - الكروناكسي - زمن الاستنفاد

2- في أي من النقاط (أ - ب - ج) يكون المنبه فعالاً عندها؟ ولماذا؟

الحل:


1- الريوباز = 35 mV

الزمن المفيد الأساسي = 3 ms

ضعف الريوباز = 70 mv

الكروناكسي = 0.45 ms

زمن الاستنفاد = 0.1 ms



2- أي من النقاط (أ - ب - ج) يكون المنبه فعالاً عندها؟ ولماذا؟

النقطة (أ) : فعالة لأنها تقع في منطقة التنبيه الفعالة فوق المنحنى.

النقطة (ب) : فعالة لأنها تقع على المنحنى.

النقطة (ج) غير فعالة لأنها تقع في منطقة التنبيه غير الفعالة تحت المنحنى.

التقويم النهائي

أولاً: أعطي تفسيراً علمياً لما يأتي:

1. لعناصر القوس الانعكاسية النخاعية الكروناكسي نفسه.
2. ملامسة جسم ساخن بسرعة لا تجعلنا نشعر بسخونته.

ثانياً: عند دراسة تنبيه عصبين وركيين لضفدع: الأول في درجة الحرارة 20 درجة مئوية، والثاني في الدرجة 10 درجة مئوية. حصلنا على النتائج الآتية:

10	5	4	3	2	2	شدة التنبيه بـ mV	t=20oC
1	1.2	1.5	2	5	6	زمن التنبيه بـ ms	
10	6	5	3.5	3	3	شدة التنبيه بـ mV	t=10oC
2	2.3	2.5	4	9	10	زمن التنبيه بـ ms	

والمطلوب:

1. مثل هذه النتائج في رسم بياني واحد مستخدماً ورقاً ميليمترياً.
2. حدد قيم الريوباز والكروناكسي في التجريبتين على الرسم.
3. ما العصب الأكثر قابلية للتنبه؟ ولماذا؟ ماذا تستنتج؟

حل التقويم النهائي

أولاً : أعطي تفسيراً علمياً لما يأتي:

1. لعناصر القوس الانعكاسية النخاعية الكروناكسي نفسه.

(لأن لها وظيفة واحدة متكاملة).


2- ملامسة جسم ساخن بسرعة لا تجعلنا نشعر بسخونته.

(لأن التنبيه خلال زمن يكون أقل من زمن الاستنفاد لذلك يكون غير فعال).

ثانياً:

1- مثل النتائج الآتية بيانياً:

الرسم:



2- (الريوباز 2) (والكروناكسي 1.5).


(الريوباز 3) (والكروناكسي 2.3).

3- الأول هو الأكثر قابلية لأن قيم الريوباز و الكروناكسي أخفض.

حيث تزداد قابلية التنبيه بارتفاع درجة الحرارة.

الدرس (5) : الظواهر الكهربائية في الخلايا العصبية

مقياس الفولط



**

فرق الكمون (كمون الغشاء)

تبدي جميع الخلايا الحية عبر أغشيتها فرقاً في الكمون، يعرف باسم: كمون الغشاء.

ويكون هذا الكمون:

ثابتاً:

في: الخلايا غير القابلة للتنبه
مثل: خلايا الدبق العصبي.

متغيراً:

في: الخلايا القابلة للتنبه
مثل:

- الخلايا العصبية.
- الخلايا الحسية.
- الخلايا العضلية.
- الخلايا الغدية.
- الخلية البيضية الثانوية.

- 1- ماذا يدعى فرق الكمون عبر أغشية الخلايا الحية؟
- 2- ماذا يمثل كمون الغشاء حسب مفهوم الفيزياء؟
- 3- أين يكون كمون الغشاء ثابتاً؟ واذكر مثالا؟
- 4- أين يكون كمون الغشاء متغيراً؟ واذكر مثالا؟

ضعيف

كمون الراحة**كمون الراحة:**

هو الفرق في الكمون في أثناء الراحة بين: **السطح الخارجي للليف** الذي يحمل: **شحنات موجبة**، و: **الداخلي للليف** الذي يحمل: **شحنة سالبة**.

ويقدر بنحو: -70 mV

والإشارة السالبة للكمون هي: اصطلاح إلى نوع الشحنة داخل الليف.

سبب ظاهرة كمون الراحة:

يعود إلى: فروق في التراكيز الشاردية على جانبي غشاء الليف،



لشوارد: **الصوديوم Na^+** و**البوتاسيوم K^+** و**الكلور Cl^-** و**(الشرسبات A^-)** وشوارد أخرى.

الشرسبات A^- : مواد عضوية كبيرة الحجم مشحونة بشحنة سالبة.

لكن الشاردة الأكثر تأثيراً في نشوء كمون الراحة هي: **شاردة البوتاسيوم**.

ملاحظة:

الشوارد الرئيسية **خارج الليف** هي: **الصوديوم والكلور**.
الشوارد الرئيسية **داخل الليف** هي: **البوتاسيوم والشرسبات**.



Key

▲ Cl^- ● A^- ● Na^+ ◆ K^+

مضخة
الصوديوم
والبوتاسيوم




قنوات
البوتاسيوم


قنوات
الصوديوم

- 1- ماذا يمثل كمون الراحة؟
- 2- كم تقدر قيمة كمون الراحة في الليف العصبي؟
- 3- ماذا تمثل الإشارة السالبة للكمون؟
- 4- ما نوع الشحنة داخل العصبون وخارجه؟
- 5- ما هو سبب ظاهرة كمون الراحة؟
- 6- ما هي الشاردة الأكثر تأثيراً في نشوء كمون الراحة؟
- 7- ماذا تكون شحنة شاردة (الصوديوم - البوتاسيوم - الكلور - الشرسبات)؟ وأين توجد كل منها؟ وما هي أكبر شاردة في الليف؟

القنوات البروتينية الموجودة في أغشية الخلايا العصبية

يحتوي غشاء الليف على عدة أنواع من القنوات البروتينية فيه، والتي تتحكم بدخول الشوارد أو خروجها من الليف. (مثل الأبواب في المدرسة التي يدخل الطلاب منها أو يخرجون) (القنوات البروتينية هي أبواب المدرسة، والطلاب هم الشوارد ☺)
(الكلام السابق هو من عند المدرس للفهم فقط)

قنوات التسرب البروتينية	قنوات التبوب الفولطية (الكمونية)	قنوات التبوب الكيميائية	
في غشاء الليف	في غشاء الليف	في الغشاء بعد المشبكي	الموقع
قنوات بروتينية	قنوات بروتينية	قنوات بروتينية + يرتبط معها مستقبل نوعي للنواقل الكيميائية	البنية
مفتوحة باستمرار	تفتح وتغلق	تفتح وتغلق	الحالة
وتتحدد حركة الشوارد عبرها حسب: ممال (تدرج) التراكيز.	تفتح وتغلق: حسب فرق الكمون على جانبي الغشاء.	ينتشر الناقل الكيميائي في: الفالق المشبكي ليرتبط بـ: مستقبل نوعي موجود على: قنوات التبوب الكيميائية مما يؤدي لـ: فتحها ومرور الشوارد النوعية عبرها، كشوارد الصوديوم Na^+	آلية عملها
			صورة *



العوامل التي تسهم في جعل غشاء الليف مستقطباً في حالة الراحة

العوامل التي تسهم في جعل غشاء الليف مستقطباً في حالة الراحة:

1- النفاذية الاصطفائية العالية: لغشاء الليف لشوارد البوتاسيوم، وقلة: نفاذيته لشوارد الصوديوم،

فسر: لأن عدد قنوات التسرب البروتينية الخاصة بشوارد البوتاسيوم في الغشاء، يزيد على عدد القنوات الخاصة بشوارد الصوديوم؛ مما يسمح بـ خروج شوارد البوتاسيوم بنسبة أكبر من دخول شوارد الصوديوم.

2- وجود مواد عضوية كبيرة الحجم مشحونة بشحنة سالبة A^- داخل الليف، لا تستطيع النفاذ عبر الغشاء.

3- مضخات (الصوديوم والبوتاسيوم) الموجودة في الغشاء.

إذ تنقل كل مضخة: ثلاث شوارد صوديوم Na^+ نحو الخارج مقابل استعادة شاردتي بوتاسيوم K^+ نحو الداخل،

ويتم ذلك بصرف طاقة ATP بعملية: النقل النشط.

1- ما العوامل التي تسهم في جعل غشاء الليف مستقطباً في حالة الراحة؟

2- علل: تكون نفاذية الغشاء الاصطفائية عالية لشوارد البوتاسيوم وقليلة بالنسبة لشوارد الصوديوم؟

3- علل: لا تستطيع الشرسبات A^- النفاذ عبر غشاء الليف لتخرج إلى خارج الليف؟

4- كيف تقوم مضخة الصوديوم والبوتاسيوم بعملها عبر الغشاء؟ وما مصدر الطاقة لها؟ وما نوع عملية النقل عبرها؟

5- حدد موقع (مضخة الصوديوم/البوتاسيوم – قنوات التسرب البروتينية).

6- اذكر وظيفة قنوات التسرب البروتينية.

7- متى تكون قنوات التسرب البروتينية مفتوحة؟

10 أعدد جهة انتقال شاردتي الصوديوم والبوتاسيوم عبر قنوات التسرب البروتينية في الغشاء، وأفسر السبب.

جـ-
الصوديوم: نحو داخل الليف لأن تركيزها في الخارج أعلى من الداخل.
البوتاسيوم: نحو خارج الليف لأن تركيزها في الداخل أعلى من الخارج

11 ما تركيز الشوارد على السطح الداخلي والسطح الخارجي للعصبون؟

8- كيف تتحدد حركة الشوارد عبر قنوات التسرب البروتينية؟

9- ما نوع الشحنة داخل العصبون وخارجه؟
ج- سالبة داخله وموجبة خارجه

10 ما مقدار فرق الكمون بين داخل العصبون وخارجه؟
ج- (-70 ميلي فولط).

11 أي من شاردتي الصوديوم والبوتاسيوم أكثر نفاذية عبر الغشاء؟ ولماذا؟
ج- البوتاسيوم أكثر نفاذية لأن عدد أقبية التسرب البروتينية لها أكثر عدداً.

(تركيز الشرسبات و شوارد البوتاسيوم في الداخل أعلى من الخارج.
تركيز شوارد الصوديوم وشوارد الكلور في الخارج أعلى من الداخل)

12 كيف تقوم مضخة الصوديوم والبوتاسيوم بعملها عبر الغشاء؟

(تنقل كل مضخة ثلاث شوارد صوديوم نحو الخارج مقابل استعادة شاردتي بوتاسيوم نحو الداخل، ويتم ذلك بصرف طاقة ATP بعملية النقل النشط).

13 أفسر يعد غشاء الليف مستقطباً كهربائياً في أثناء الراحة.

لأنه يفصل بين نوعين من الشحنات موجبة في الخارج وسالبة في الداخل.


ح
ضعيف

تنبيه الخلايا العصبية بعد أن كانت في حالة الراحة:

لا تكمن قدرة الخلايا العصبية على تشكيل كمون الراحة والحفاظ عليه فقط، وإنما في: إحداث الاضطراب المفاجئ والمؤقت لكمون الراحة استجابة لـ: المنبهات.

ويمكن ملاحظة نوعين من التغيرات عند التنبيه هما:

- أ- حد عتبة التنبيه
ب- كمونات العمل



- 1- تكمن قدرة الخلايا العصبية على تشكيل كمون الراحة والحفاظ عليه فقط (صح/خطأ مع التصحيح).
- 2- كيف تغير المنبهات كمون الراحة؟
- 3- ما هما نوعا التغيرات في الخلية العصبية عند تنبيهها؟

أ- حد العتبة**1- منبه عتوي:**

تنبيه الليف العصبي بشدة كافية يؤدي إلى: زوال جزئي للاستقطاب، (فسر).
نتيجة: دخول شوارد الصوديوم إلى داخل الليف بكميات قليلة جدا في البدء.
وهكذا يزول الاستقطاب تدريجياً للوصول إلى: حد العتبة اللازمة لإطلاق كمون عمل.

2- منبه تحت عتوي:

إذا كانت شدة المنبه لا تكفي للوصول إلى حد العتبة: فلا ينشأ كمون العمل.

في الألياف العصبية الثخينة: تبلغ قيمة حد العتبة بحدود 65-

ميلي فولت، (لذلك: تكون قابلية التنبه فيها أكبر).

في الألياف العصبية صغيرة القطر: تبلغ قيمة حد العتبة 55-

ميلي فولت تقريباً، (لذلك: تكون قابلية التنبه فيها أقل).


11 أحدد المنبهات العتوية ودون العتوية في الشكل.

- ج- المنبهات العتوية: 4,5,6
المنبهات دون العتوية: 1,2,3

- 1- ماذا ينتج عن تنبيه الليف العصبي بشدة كافية للوصول إلى ما قبل حد العتبة؟
- 2- ما سبب الزوال الجزئي للاستقطاب؟
- 3- ماذا ينتج عن دخول شوارد الصوديوم إلى داخل الليف بكميات قليلة جدا في البدء؟

- 12 لماذا لا يستطيع المنبه 3 توليد كمون عمل؟
ج- لأن كمون الغشاء لا يصل لحد العتبة.
- 13 ماذا أسمى الكمونات التي تثيرها المنبهات
1-2-3؟
ج- كمونات تحت عتبية.
- 14 ماهي قيمة التغير في الكمون اللازمة للوصول إلى
حد العتبة؟
قيمة التغير من -70 mV إلى -55 mV
أي حوالي 15 mV
للتوضيح: في الألياف الصغيرة: $70 - 55 = 15$
في الألياف الثخينة $70 - 65 = 5$

- 4- ماذا ينتج عن تنبيه الليف إذا كانت شدة المنبه لا تكفي للوصول إلى حد العتبة؟
- 5- علل: عدم نشوء كمون العمل لمنبه ما.
- 6- أفسر: يبقى العصبون في حالة راحة رغم وصول منبهات عدة إليه.
- 7- ماذا ينتج عن تنبيه الليف إذا كانت شدة المنبه تكفي للوصول إلى حد العتبة؟
- 8- كم تبلغ قيمة حد العتبة في الألياف العصبية الثخينة؟
- 9- كم تبلغ قيمة حد العتبة في الألياف العصبية صغيرة القطر؟
- 10 أفسر: تكون قابلية التنبه في الألياف الثخينة أكبر منها في الألياف صغيرة القطر.



ب- كمون العمل

ينشأ كمون العمل عند:


تنبيه الليف العصبي بمنبه شدته كافية للوصول إلى حد العتبة.

قياس كمون العمل:

عند وضع: أحد مسريي راسم الاهتزاز المهبطي على السطح الخارجي لليف والآخر على السطح الداخلي، وباستخدام: منبه عتبي، يظهر على الشاشة: مجموعة من التبدلات في الكمون بشكل: موجة مؤنفة وحيدة الطور تسمى: الشوكة الكمونية.

- 1- متى ينشأ كمون العمل؟ أو أفسر: نشوء كمون العمل.
- 2- ماذا ينتج عن تنبيه الليف العصبي بمنبه شدته كافية للوصول إلى حد العتبة؟
- 3- ما هو الجهاز المستخدم لقياس كمون العمل؟
- 4- أين أضع كلا من مسريي راسم الاهتزاز المهبطي؟
- 5- ماذا أشاهد على شاشة راسم الاهتزاز؟
- 6- اكتب المصطلح: مجموعة من التبدلات في الكمون بشكل موجة مؤنفة وحيدة الطور ().

*** (ارسم)



الشوكة الكيونية (كمون العمل أحادي الطور)

مراحل كمون العمل:

1- الوصول إلى حد العتبة:
إزالة متدرجة في كمون الغشاء، ليصل إلى حد العتبة (- 55 مثلا).

2- إزالة الاستقطاب:
فتح قنوات التبريب الفولطية للصوديوم، وتتدفق شوارد الصوديوم نحو الداخل، ليصل كمون الغشاء إلى + 30 mV

3- عودة الاستقطاب:
تغلق أقبية الصوديوم وتفتح قنوات التبريب الفولطية الخاصة بالبوتاسيوم، وتتدفق شوارد البوتاسيوم خارج الخلية، وتبدأ عودة الاستقطاب.

4- فرط الاستقطاب:
خلال زمن الاستعصاء النسبي تستجيب الخلية للمنبهات القوية فقط.

5- العودة لوضع الراحة:
تغلق أقبية البوتاسيوم، وتنشط مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، ليعود الغشاء لوضع الراحة.

زمن الاستعصاء المطلق:
خلال زمن الاستعصاء المطلق لا تستجيب الخلية لأي منبه جديد.
يبدأ من: الوصول إلى حد العتبة
ينتهي عند: الوصول إلى فرق كمون -40 خلال عودة الاستقطاب.

السبب: عدم فتح قنوات الصوديوم من جديد إلا بعد العودة إلى كمون الراحة.

زمن الاستعصاء النسبي:
خلال زمن الاستعصاء النسبي تستجيب الخلية للمنبهات القوية فقط.

يبدأ عند: الوصول إلى فرق كمون -40 خلال عودة الاستقطاب.

ينتهي عند: العودة إلى كمون الراحة مجدداً.

السبب: بقاء قنوات الصوديوم مغلقة، وفرط الاستقطاب الناتج

عن تدفق شوارد البوتاسيوم إلى خارج الخلية بكميات كبيرة، مما يجعل تنبيه الليف العصبي يحتاج لمنبه قوي.

مضخات الصوديوم والبوتاسيوم:

ليس لها دور: في تغيير كمون العمل

بل: الحفاظ على تركيز الشوارد على جانبي الغشاء.

1- ما التبدلات في استقطاب الغشاء بدءاً من لحظة الوصول إلى حد العتبة؟

2- ما قنوات التأييب الفولطية التي تفتح في كل من مرحلتي إزالة الاستقطاب وعودة الاستقطاب؟

3- في أية مرحلة تنشط مضخة الصوديوم والبوتاسيوم؟

4- فسر: لا تستجيب الخلية العصبية للمنبهات في زمن الاستعصاء المطلق وتستجيب للمنبهات القوية في زمن الاستعصاء النسبي.

مبدأ الكل أو اللاشيء

مبدأ الكل أو اللاشيء:

إن منبها في عتبه الدنيا يسبب أقصى استجابة يستطيعها الليف الواحد.

ولا تزداد شدة الاستجابة بزيادة شدة المنبه فوق تلك العتبة:


فسر:

كون الاستجابة تعتمد على: الطاقة المخترنة في الليف لا على: طاقة المنبه.

وينطبق: هذا المبدأ على الليف العصبي،

ولا ينطبق: على العصب؛

(فسر): لأن زيادة شدة المنبه تؤدي إلى زيادة عدد الألياف العصبية المنبهة فيه؛ مما يؤدي لزيادة شدة الاستجابة.



1- عرف مبدأ الكل أو اللاشيء.


2- فسر: لا تزداد شدة الاستجابة بزيادة شدة المنبه فوق عتبة التنبيه.

3- على ماذا تعتمد استجابة الليف العصبي؟

4- قارن بين الليف العصبي – والعصب من حيث انطباق قانون الكل أو اللاشيء على كل منهما.

5- فسر: ينطبق قانون الكل أو اللاشيء على الليف العصبي؟

6- فسر: لا ينطبق قانون الكل أو اللاشيء على العصب؟



كمون العمل ثنائي الطور

يقاس كمون العمل ثنائي الطور (كيف):
بوضع مسريي راسم الاهتزاز المهبطي في نقطتين متباعدتين على السطح الخارجي للليف المنبه.

تمثل الموجة الأولى: حالة إزالة الاستقطاب لغشاء الليف،
بينما تمثل الموجة الثانية: حالة إعادة الاستقطاب.

الكمون العمل ثنائي الطور له:

استخدامات طبية مهمة: كالتخطيط الكهربائي للقلب - والعضلات - والدماغ.

- 1- أين يتم وضع مسريي التسجيل لرأسم الاهتزاز المهبطي (الأوسيلوسكوب)؟
- 2- كيف يقاس كمون العمل ثنائي الطور؟
- 3- ماذا تمثل الموجة الأولى؟
- 4- ماذا تمثل الموجة الثانية؟
- 5- ما هي الاستخدامات الطبية لكمون العمل ثنائي الطور؟

6- كيف تفسر انحراف إبرة المقياس A؟

ج- لاختلاف الشحنة بين أ و ب

7- ماهي حالة استقطاب الغشاء في B؟

ج- زوال استقطاب

8- كيف تفسر تشكل الموجة بالاتجاه المعاكس C؟

ج- بسبب انعكاس الشحنة بين النقطتين أ


و ب

9- ماهي حالة استقطاب الغشاء في D؟

ج- استقطاب الراحة

التقويم النهائي**أولا: اختر الإجابة الصحيحة:**

1. الشاردة الأكثر تأثيرا في نشوء كمون الراحة:
 - أ- الكالسيوم ب- البوتاسيوم ج- الصوديوم د- الكلور.
2. الشاردة الأكثر تأثيرا في حدوث كمون العمل:
 - أ- الكالسيوم ب- البوتاسيوم ج- الصوديوم د- الكلور.
3. يؤدي تدفق شوارد البوتاسيوم نحو خارج العصبون في نهاية كمون العمل إلى:
 - أ- انخفاض الاستقطاب ب- فرط الاستقطاب
 - ج- عودة الاستقطاب د- زوال الاستقطاب.
4. واحد مما يأتي حساس لتبدلات الاستقطاب في غشاء الخلية، تؤدي لإزالة الاستقطاب وإعادة الاستقطاب:
 - أ- عتبة التنبيه
 - ب- مضخات الصوديوم والبوتاسيوم
 - ج- قنوات التبويب الفولطية
 - د- قنوات التسرب البروتينية

**ثانيا: الشكل الآتي يمثل الشوكة الكمونية****(كمون العمل) والمطلوب:**


1. أحدد التبدلات في استقطاب الغشاء المقابلة للأرقام في كل مرحلة.
2. ما التبدلات التي تحدث في استقطاب الغشاء في (س)؟
3. ما القنوات الشاردية التي تفتح وتغلق في (ص)؟

ثالثا: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. ينطبق مبدأ الكل أو اللاشيء على الليف ولا ينطبق على العصب.
2. نفوذية الغشاء لشوارد البوتاسيوم تفوق نفوذيته لشوارد الصوديوم في أثناء الراحة

حل التقويم النهائي**أولا: اختار الإجابة الصحيحة:**

1. الشاردة الأكثر تأثيرا في نشوء كمون الراحة: (ب -البوتاسيوم)
2. الشاردة الأكثر تأثيرا في حدوث كمون العمل: (ج -الصوديوم)
3. يؤدي تدفق شوارد البوتاسيوم نحو خارج العصبون في نهاية كمون العمل إلى: (ب -فرط الاستقطاب)
4. حساسة لتبدلات الاستقطاب في غشاء الخلية، تؤدي لإزالة الاستقطاب وإعادة الاستقطاب: (ج -قنوات التيوب الفولطية)

**ثانيا: الشكل الآتي يمثل الشوكة الكمونية****(كمون العمل) والمطلوب:**

(1) التبدلات:

- 1 - كمون راحة
- 2 - إزالة استقطاب
- 3 - عودة استقطاب
- 4 - فرط استقطاب

(2) انخفاض في الاستقطاب تدريجيا للوصول لحد العتبة اللازمة لإطلاق كمون عمل.


(3) تغلق قنوات الصوديوم و تفتح قنوات البوتاسيوم.

ثالثا : أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- 1- لأن الاستجابة تعتمد الطاقة المخترنة في الليف لا على طاقة المنبه، وفي العصب تزداد الاستجابة بزيادة عدد الألياف العصبية المنبهة.
- 2- لأن عدد أوعية التسرب البروتينية لشوارد البوتاسيوم في الغشاء أكثر من عدد القنوات الخاصة بشوارد الصوديوم

الدرس (6) : النقل في الأعصاب

انتقال كمون العمل في الألياف العصبية المجردة من غمد النخاعين



1- يتم إزالة الاستقطاب في القطعة الأولية (1) نتيجة: تدفق شوارد الصوديوم نحو الداخل، تجعل شحنة السطح الداخلي موجبة مقارنة مع الشحنة السالبة للسطح الخارجي ويتشكل كمون عمل.

2- فتتشكل تيارات موضعية (محلية)

قادمة من: المناطق المجاورة (2) نحو المنطقة

المنبهة (1)

خارج الليف - وبالعكس داخله،

مما يؤدي لـ: إزالة تدريجية للاستقطاب في المنطقة المجاورة.

3- فينتقل كمون العمل نحو المنطقة المجاورة (2) ،

بينما تبدأ القطعة الأولية (1) بـ: مرحلة إعادة الاستقطاب،

ثم تعود إلى مرحلة كمون الراحة، بعد أن تمر بزمان الاستعصاء.

4- وهكذا تتكرر العملية بالآلية ذاتها

ليصل كمون العمل إلى: نهاية المحوار (الأزرار) في: النقل الوظيفي.

القطعة الأولية من المحوار:

هي منطقة غشائية متخصصة من المحوار،

(وظيفتها): يتم فيها إطلاق كمونات العمل،

(فسر:) يعود ذلك لاحتوائها على كثافة عالية من قنوات التيوبوب الفولطية.

بينما يكون: عدد هذه القنوات قليل في جسم الخلية

والاستطالات الهولوية القصيرة؛ مما يمنع تشكل كمونات العمل فيها غالباً.

1- كيف يتم انتقال كمون العمل في الألياف العصبية المجردة من غمد النخاعين؟


2- في أي منطقة من الليف يبدأ كمون العمل غالباً؟

3- كيف يتم زوال الاستقطاب في الليف العصبي؟

4- ماذا ينتج عن دخول شوارد الصوديوم إلى داخل الليف العصبي؟

- 5- كيف يصبح توزع الشحنة على جانبي الليف بعد إزالة الاستقطاب؟
- 6- أفسر تشكل التيارات الموضعية في الليف؟ **جـ (الخطوة 1)**
- 7- كيف تكون جهة التيارات الموضعية داخل الليف وخارجه؟
- 8- ماذا ينتج عن تشكل التيارات الموضعية؟
- 9- أفسر إزالة الاستقطاب في المنطقة المجاورة للقطعة المنبهة؟
- 10- اذكر مراحل عودة القطعة الأولية إلى كمون الراحة.
جـ - تبدأ القطعة الأولية بمرحلة إعادة الاستقطاب، ثم تعود إلى مرحلة كمون الراحة، بعد أن تمر بزمنا الاستعصاء.
- 11- أين ينتهي كمون العمل في الليف في النقل الوظيفي؟
- 12- اكتب المصطلح: منطقة غشائية متخصصة من المحوار يتم فيها إطلاق كمونات العمل ().
- 13- اذكر وظيفة القطعة الأولية من المحوار.
- 14- فسر: يتم تشكل كمونات العمل في القطعة الأولية من المحوار غالباً.
- 15- فسر: لا تتشكل كمونات العمل في جسم الخلية والاستطالات الهيولية غالباً.

حازم ضعيف



انتقال كمون العمل في الألياف العصبية المغمدة بغمد النخاعين

يفسر النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين بالآلية ذاتها لدى الألياف المجردة، مع اختلاف يتعلق بـ:

مكان نشوء كمونات العمل؛

الذي يقتصر على: اختناقات رانفييه، (فسر):

- لأن قنوات التنبويب الفولطية يقتصر وجودها على اختناقات رانفييه.
- كما يبدي الغشاء مقاومة عالية لخروج التيارات الموضعية في المناطق التي يغطيها غمد النخاعين.

انتقال كمون العمل في الألياف:

- في الألياف المغمدة بالنخاعين:

ينتقل كمون العمل من اختناق رانفييه إلى آخر قافزا فوق قطع غمد النخاعين، وهذا ما يسمى: النقل القفزي. (علل التسمية: جـ - السطر السابق)

- أما في الألياف المجردة من النخاعين:

يتم النقل من: المنطقة المنبهة إلى: المنطقة المجاورة مباشرة.

مميزات النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين:

- يوفر (يقال) النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين كميات كبيرة من الطاقة التي تلزم لعمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، (فسر): كون الضخ يحدث في اختناقات رانفييه فقط.
- تزداد سرعة السيالة العصبية بوجود غمد النخاعين.

تزداد سرعة السيالة العصبية:

- بوجود غمد النخاعين
- وبزيادة قطر الليف العصبي.

1- قارن بين أماكن نشوء كمونات العمل في كل من الألياف المغمدة والألياف المجردة من النخاعين.

2- فسر: يقتصر مكان نشوء كمونات العمل في الألياف المغمدة بالنخاعين على اختناقات رانفييه.

3- أين توجد قنوات التنبويب الفولطية؟ ما أهمية ذلك؟

4- كيف يتم انتقال كمون العمل في الألياف العصبية المغمدة بغمد النخاعين؟ وماذا يسمى؟

5- كيف يتم انتقال كمون العمل في الألياف العصبية المجردة من غمد النخاعين؟

6- علل: يسمى النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين بالنقل القفزي.

7- ماذا أسمى عملية انتقال كمونات العمل من اختناق رانفييه إلى آخر؟

8- ما هي مميزات النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين.

9- علل: يوفر (يقال) النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين كميات كبيرة من الطاقة التي تلزم لعمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم.

10- فسر: تزداد سرعة السيالة العصبية بوجود غمد النخاعين.

جـ - لأن كمون العمل ينتقل من اختناق رانفييه إلى آخر قافزا فوق قطع غمد النخاعين.

11- أيهما أسرع النقل في الألياف المجردة من النخاعين أو الألياف المغمدة؟ ولماذا؟

انتقال السائلة العصبية من عصبون لآخر**انتقال السائلة العصبية من عصبون لآخر
ألاحظ وأستنتج وأرتب:**

ينتقل كمون العمل على طول المحوار ليصل إلى: نهاية تفرعاته،

هذه الفروع النهائية قد تشكل:

نقاط تواصل مع خلية: عصبية - أو عضلية - أو غدية.
تسمى هذه النقاط: بالمشابك العصبية.


أنواع المشابك: للمشابك نوعان: كيميائية - وكهربائية.

1- أين ينتهي كمون العمل في الليف في النقل الوظيفي؟

2- مع أي خلايا تتواصل نهايات تفرعات المحاور؟

3- اكتب المصطلح: نقاط تواصل تتشكل بين نهاية تفرعات المحوار مع خلية عصبية أو عضلية أو غدية .

4- ما هما نوعا المشابك العصبية؟

**المشبك الكيميائي**

يتألف المشبك الكيميائي من ثلاثة مكونات هي:

- الغشاء قبل المشبكي

- الفالق المشبكي

- الغشاء بعد المشبكي

وتوجد المشابك الكيميائية:

بين نهاية محوار (الزر النهائي) لعصبون أول،

واستطالة هيولية - أو جسم - أو محوار لعصبون ثان.

تنتهي التفرعات الانتهائية للمحوار بـ **أزرار**

تحتوي: حويصلات مشبكية

و التي: تخزن فيها النواقل الكيميائية العصبية.

يتميز الغشاء قبل المشبكي:

ببنية مناسبة لتماس الحويصلات المشبكية، وتحرير الناقل

الكيميائي في الفالق المشبكي.

يتميز الغشاء بعد المشبكي:


بوجود:

مستقبلات نوعية للنواقل الكيميائية العصبية

(موقع هذه المستقبلات:)

مرتبطة مع قنوات تيوبوب الكيميائية

(وظيفة هذه المستقبلات:)

**المشبك الكيميائي**


تتحكم بمرور الشوارد المختلفة عبر قنوات التبويب الكيميائية.

قنوات التبويب الكيميائية:

هي قنوات بروتينية

توجد في: الغشاء بعد المشبكي.

ترتبط معها: مستقبلات نوعية للنواقل الكيميائية العصبية تتحكم بمرور الشوارد المختلفة عبرها.



قنوات التبويب الكيميائية

- 1- ما هي مكونات (م يتألف) المشبك الكيميائي؟
- 2- حدد موقع (أين يوجد) المشبك الكيميائي؟
- 3- اكتب المصطلح: انتفاخات توجد في نهاية التفرعات النهائية للمحاور تحتزن فيها النواقل الكيميائية العصبية ().
- 4- بماذا تنتهي التفرعات النهائية للمحاور؟ وماذا تحوي؟ وما وظيفتها؟
- 5- ما وظيفة الأزرار؟ = ما وظيفة الحويصلات المشبكية؟
- 6- اكتب المصطلح: غشاء يتميز ببنية مناسبة لتماس الحويصلات المشبكية وتحرير الناقل الكيميائي في الفالق المشبكي ().
- 7- اكتب المصطلح: غشاء يتميز بوجود مستقبلات نوعية للنواقل الكيميائية العصبية التي ترتبط معها قنوات تبويب كيميائية لشوارد المختلفة ().
- 8- بماذا ترتبط المستقبلات النوعية للنواقل الكيميائية العصبية؟
- 9- حدد موقع قنوات التبويب الكيميائية؟ وما هي بنيتها؟ وماذا يرتبط معها؟
- 10- ما وظيفة قنوات التبويب الكيميائية؟

آلية النقل في المشبك الكيميائي


يمر النقل عبر المشبك الكيميائي بـ 3 مراحل:

1- تحرير النواقل الكيميائية العصبية في الفالق المشبكي، وارتباطها بالمستقبلات.

2- توليد الكمونات بعد المشبكية.

3- تجميع (تراكم) الكمونات بعد المشبكية.

- ما هي مراحل النقل عبر المشبك الكيميائي؟



1- تحرير النواقل الكيميائية العصبية في الفالق المشبكي، وارتباطها بالمستقبلات

وصول كمون العمل إلى الغشاء قبل المشبكي في الأزرار

يؤدي إلى:

إزالة الاستقطاب في الغشاء قبل المشبكي

يؤدي إلى:

فتح قنوات التأييب الفولطية لشوارد الكالسيوم Ca^{++}


يؤدي إلى:

تنفذ شوارد الكالسيوم Ca^{++} نحو الداخل

يؤدي إلى:

ارتفاع تركيز شوارد Ca^{++}

يؤدي إلى:



1- ماذا ينتج عن وصول كمون العمل إلى الغشاء قبل المشبكي في الأزرار؟

2- ماذا ينتج عن إزالة الاستقطاب في الغشاء قبل المشبكي؟

3- ماذا ينتج عن فتح قنوات التأييب الفولطية لشوارد الكالسيوم في الغشاء قبل المشبكي؟

4- ماذا ينتج عن دخول شوارد الكالسيوم نحو داخل الأزرار؟

5- ماذا ينتج عن ارتفاع تركيز شوارد الكالسيوم ضمن الأزرار؟

<p>6- ماذا ينتج عن انتشار الناقل الكيميائي في الفالق المشبكي؟</p> <p>7- ماذا ينتج عن ارتباط الناقل الكيميائي بالمستقبل النوعي الموجود على قنوات التبويب الكيميائية في الغشاء بعد المشبكي؟</p> <p>8- حدد موقع المستقبل النوعي للناقل الكيميائية.</p> <p>9- حدد موقع قنوات التبويب الكيميائية.</p>	<p>أ- اندماج الحويصلات المشبكية مع: الغشاء قبل المشبكي.</p> <p>ب- وتحرير الناقل الكيميائي في: الفالق المشبكي.</p>
	<p>يؤدي إلى:</p> <p style="text-align: center;">↓</p>
	<p><u>ينتشر الناقل الكيميائي في: الفالق المشبكي</u> <u>ليرتبط بـ: مستقبل نوعي</u> <u>موجود على: قنوات التبويب الكيميائية</u> <u>الموجودة في: الغشاء بعد المشبكي</u></p>
<p>10- <u>فسر:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - إزالة الاستقطاب في الغشاء قبل المشبكي. - فتح قنوات التبويب الفولطية لشوارد الكالسيوم. - دخول شوارد الكالسيوم ضمن الغشاء قبل المشبكي. - ارتفاع شوارد الكالسيوم ضمن الغشاء قبل المشبكية. - اندماج الحويصلات المشبكية مع الغشاء قبل المشبكي وتحرير الناقل الكيميائي في الفالق المشبكي. 	<p>يؤدي إلى:</p> <p style="text-align: center;">↓</p>
	<p>فتح قنوات التبويب الكيميائية ومرور الشوارد النوعية عبرها. وبالتالي توليد كيون بعد مشبكي إما تنبيهي أو تثبيطي. في مثالنا نلاحظ انتشار شوارد Na^+ عبرها</p>

ح
ضعيف

2- توليد الكمونات بعد المشبكية


توليد الكمونات بعد المشبكية:

ارتباط الناقل الكيميائي بمستقبلات نوعية موجودة على أفنية التبوبير الكيميائية في الغشاء بعد المشبكي، يؤدي إلى توليد كمونات بعد مشبكية

بعضها **تنبيهي Excitatory**
وبعضها **تثبيطي Inhibitory**

يمكن أن يكون الناقل **منبهاً** أو **مثبطاً** (فسر):
لأن نوع الكمون بعد المشبكي المتشكل يتحدد ب:

- نوع الناقل الكيميائي.
- ونوع أفنية التبوبير الكيميائية التي ترتبط بها المستقبلات النوعية للناقل الكيميائي.



EPSP و IPSP

مشابك التنبيه	مشابك التثبيط	
<ul style="list-style-type: none"> - الغلوتامات - والأستيل كولين <p>(في معظم حالاتها)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - حمض غاما - أمينو بيوتيريك - GABA - الغليسين 	النواقل الكيميائية العصبية
<p>لشوارد الصوديوم Na^+ أو الكالسيوم Ca^{++} اللتان تنتشران إلى الداخل</p>	<p>لشوارد الكلور Cl^- أو البوتاسيوم K^+ التي تنتشر إلى الخارج</p>	أفنية التبوبير الكيميائية التي يرتبط بها الناقل
إزالة الاستقطاب	فرط استقطاب	التبدل في الاستقطاب للغشاء بعد المشبكي
<p>كمون بعد مشبكي تنبيهي (EPSP) (علل: لأنه يوجه كمون الغشاء إلى حد العتبة</p>	<p>كمون بعد مشبكي تثبيطي (IPSP) (علل: لأنه يبعد كمون الغشاء عن حد العتبة</p>	الكمون المتشكل وسبب تسميته
موجة صاعدة (للأعلى)	موجة نازلة (للأسفل)	شكل المنحنى على شاشة الأسيلوسكوب

- 1- ماذا ينتج عن: ارتباط الناقل الكيميائي بمستقبلات نوعية موجودة على أقبية التيوبوب الكيميائية في الغشاء بعد المشبكي.
- 2- ما سبب نشوء الكمون بعد المشبكي؟
- 3- ما هي أنواع الكمونات بعد المشبكية؟
- 4- فسر: يمكن أن يكون الناقل منبهاً أو مثبطاً.
- 5- قارن بين مشابك التنبيه ومشابك التثبيط من حيث:
 - (الناقل الكيميائية العصبية – أقبية التيوبوب الكيميائية التي يرتبط بها الناقل – التبدل في الاستقطاب للغشاء بعد المشبكي – الكمون المتشكل وسبب تسميته – شكل المنحنى على شاشة الأسيلوسكوب).
- 6- ماذا ينتج عن ارتباط الغوتامات / الأستيل كولين بالمستقبل على قنوات التيوبوب الكيميائية؟
- 7- ماذا ينتج عن ارتباط حمض غاما أمينو بيوتيريك GABA / الغليسرين بالمستقبل على قنوات التيوبوب الكيميائية؟
- 8- فسر تسمية الكمون بعد المشبكي التثبيطي.
- 9- فسر تسمية الكمون بعد المشبكي التثبيطي.
- 10- كيف تكون حركة الشوارد في الغشاء بعد المشبكي في حالة كمون عمل بعد مشبكي تنبيهي؟ وفي حالة التثبيطي؟

3- تجميع (تراكم) الكمونات بعد المشبكية

تجميع (تراكم) الكمونات بعد المشبكية:

تتجمع كمونات بعد مشبكية:

- من نهايات قبل مشبكية عدة.
- أو من نهاية قبل مشبكية واحدة.


(فيالنتيجة):


تطلق كمون عمل في الغشاء بعد المشبكي.

تلخيص:

كمون بعد مشبكي + كمون بعد مشبكي آخر + الخ
← إطلاق كمون عمل في الغشاء بعد المشبكي

- 1- من أين تتجمع كمونات العمل بعد المشبكية؟
- 2- ماذا ينتج عن تجميع الكمونات بعد المشبكية؟





خواص المشبك الكيميائي

خواص المشبك الكيميائي:

1- الإبطاء :

نخفض سرعة السيالة عند مرورها في المشبك الكيميائي (فسر):

بسبب :

- الزمن اللازم لتحرر الناقل الكيميائي.
- وانتشاره في الفالق المشبكي.
- والزمّن اللازم لتثبته على المستقبلات، وتشكيل كمون بعد مشبكي.

2- القطبية :

(فسر اتصاف المشبك الكيميائي بالقطبية):

لأن حالة التنبيه تجتاز المشبك باتجاه واحد. من: الغشاء قبل المشبكي إلى: الغشاء بعد المشبكي.

3- عمله كمحول للطاقة :

(فسر عمل المشبك الكيميائي كمحول للطاقة):

لأنه يحول:

الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية **وبالعكس**.

- 1- ما هي خواص المشبك الكيميائي؟
- 2- فسر: يتصف النقل في المشبك الكيميائي بالإبطاء.
- 3- فسر: تنخفض سرعة السيالة عند مرورها في المشبك الكيميائي.
- 4- فسر: يتصف النقل في المشبك الكيميائي بالقطبية.
- 5- تجتاز حالة التنبيه المشبك باتجاه واحد، من: إلى
- 6- فسر: يتصف النقل في المشبك الكيميائي بعمله كمحولة للطاقة.

النواقل الكيميائية العصبية**تتشكل النواقل العصبية: (أين)**


إما في جسم الخلية (كيف) مباشرة.
أو في الزر النهائي (كيف): بفعل أنظيمات نوعية.

ويكون تأثيره مؤقتا في المشبك؛ (لماذا):

بسبب زوالها بعد أن تؤدي دورها، (كيف؟)

- إما بحلمتها بأنظيمات نوعية
- أو بإعادة امتصاصها من الغشاء قبل المشبكي وخلايا الدبق.
- أو بانتشارها خارج الفالق المشبكي.

مثال: الأستيل كولين يتحلّمه بأنظيم: الكولين أستيراز إلى: كولين - وحمض الخل.




آليات زوال النواقل الكيميائية بعد أن تؤدي دورها

بعض النواقل الكيميائية العصبية:

أخرى	التأثير (الوظيفة)	مكان الإفراز	
<p>البوتوكس سم Toxin: بروتيني مستخرج من: بعض الجراثيم. يستخدم في: عمليات التجميل وإزالة تجاعيد الوجه يؤدي إلى: تثبيط تأثير الأستيل كولين، من ثم ارتخاء العضلات.</p>	<p>- منبه في العضلات الهيكلية. - ويبطئ حركة عضلة القلب. - وله دور مهم في الذاكرة.</p>	<p>الجهاز العصبي</p>	<p>الأستيل كولين</p>
<p>يزداد تأثيره بوجود: النيكوتين – والمواد المخدرة كالكوكائين</p>	<p>- مثبط للجسم المخطط. - ومنشط في الحالات النفسية والعصبية.</p>	<p>-المادة السوداء لجذع الدماغ -وبكميات قليلة من لب الكظر.</p>	<p>الدوبامين</p>
	<p>منبه غالباً</p>	<p>-المسالك الحسية -والقشرة المخية.</p>	<p>الغلوتامات</p>
<p>ببتيد مكون من: 11 حمض أميني</p>	<p>منبه - وناقل للألم</p>	<p>مسالك حس الألم في نخاع الشوكي</p>	<p>المادة P</p>

+ الإندورفينات والإنكفالينات (في الفقرة التالية)

- 1- أين تتشكل النواقل الكيميائية في العصبون؟
- 2- قارن بين طريقة تشكيل النواقل الكيميائية في كل من حسم الخلية – والأزوار.
- 3- فسر: يكون تأثير الناقل الكيميائي مؤقتاً في المشبك.
- 4- كيف تتم إزالة النواقل الكيميائية بعد أن تؤدي دورها؟
- 5- كيف تتم حلمة الأستيل كولين؟ وما نواتج حلمته؟
- 6- قارن بين الأستيل كولين – الدوبامين – الغلوتامات – المادة P من حيث: (مكان الإفراز – التأثير).
- 7- ما هو الاستخدام الطبي لسم البوتوكس؟
- 8- ما آلية عمل البوتوكس في إزالة تجاعيد الوجه؟
- 9- ما هو البوتوكس؟ وما تركيبه؟ ومن أين يستخرج؟ وما تأثيره على الأستيل كولين؟
- 10- ما هي المواد التي تزيد من وجود الدوبامين؟
- 11- فسر: تعاطي بعض الأشخاص مواد مثل النيكوتين والكوكائين.
- 12- ما هو التركيب الكيميائي للمادة P؟

**التحكم بالألم****ألاحظ الشكل المجاور:**

- مستقبلات حس الألم <<
- ترسل سيالات ألمية إلى النخاع الشوكي <<
- تحرير المادة P في مسلك حس الألم في النخاع الشوكي <<
- تصل السيالة إلى الدماغ <<
- فندرك حس الألم.**

يقوم الدماغ بإفراز:

الانكفاليينات – والأندورفينات**(وظيفةها: تثبط تحرير المادة P)****(آلية عملها: من خلال:**

- منع دخول شوارد الكالسيوم إلى الغشاء قبل المشبكي.
- من ثم منع وصول السيالات الألمية للدماغ.

- 1- إلى أين ترسل مستقبلات حس الألم السيالات الألمية؟
- 2- ما هو الناقل الذي يتم تحريره في مسلك الحس الألم في النخاع الشوكي؟
- 3- أين يتم إدراك حس الألم؟
- 4- ما هي المواد المثبطة للمادة P؟
- 5- ما هي وظيفة الإنكفاليينات والإندورفينات؟ وما آلية عملها؟
- 6- ماذا ينتج عن منع دخول شوارد الكالسيوم إلى الغشاء قبل المشبكي الحاوي على حويصلات المادة P؟
- 7- ماذا ينتج عن تثبيط تحرر المادة P في النخاع الشوكي؟

المشابك الكهربائية

ألاحظ الشكل الآتي الذي يوضح مقارنة بين المشبك الكهربائي والمشبك الكيميائي، وأكمل الجدول الذي يليه:

المشبك الكيميائي	المشبك الكهربائي	
*** (ارسم)	*** (ارسم)	صورة ***
<ul style="list-style-type: none"> - غشاء قبل مشبكي - فائق مشبكي - غشاء بعد مشبكي 	بنيتان غشائيتان متناظرتان لخلايا متجاورة يفصلهما: فائق ضيق، ترتبطان بواسطة: قنيات بروتينية	المكونات
20 nm	3.5 nm	الفائق
يحتاج (يوجد) ناقل	لا يحتاج	وجود الناقل الكيميائي
باتجاه واحد: من: الغشاء قبل المشبكي إلى: الغشاء بعد المشبكي	اتجاهين متعاكسين	جهة السيالة العصبية
أقل سرعة (توجد خاصية الإبطاء)	أسرع (لا يتمتع بالإبطاء)	السرعة
يوجد	لا يوجد	الإبطاء
بين: التفرعات النهائية لمحوار عصبون ما مع: خلية عصبية	بين الألياف العضلية للعضو الواحد، كالعضلة القلبية - وعضلات الأحشاء	مكان وجودها في الجسم
<p>1- قارن بين المشبك الكهربائي - والمشبك الكيميائي من حيث: (المكونات - مسافة الفائق - وجود الناقل الكيميائي - جهة السيالة العصبية - السرعة - الإبطاء - مكان وجودها في الجسم).</p> <p>2- كيف ترتبط البنيتان الغشائيتان في المشبك الكهربائي.</p> <p>3- ما وظيفة القنيتات البروتينية في المشبك الكهربائي؟</p> <p>4- اذكر موقع ووظيفة الفائق المشبكي في المشبك الكهربائي. وكم تبلغ مسافته؟</p>		

التقويم النهائي

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. يؤدي ارتباط الناقل الكيميائي الغلوتامات مع مستقبلاته في الغشاء بعد المشبكي غالباً إلى:
أ- خروج شوارد الصوديوم. ب- خروج شوارد الكلور.
ج- دخول شوارد الصوديوم. د- دخول شوارد الكلور.

2. قنوات تفتح وتغلق نتيجة تبادل في كمون (استقطاب) الغشاء.

- أ- التسريب البروتينية. ب- التنبؤب الفولطية
ج- التنبؤب الكيميائيةة. د- القنيات البروتينية.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. تعد القطعة الأولية من المحوار مكاناً لانطلاق كمونات العمل.
2. يقتصر نشوء التيارات المحلية على اختناقات رانفييه في الألياف المغمدة في النخاعين.
3. يمكن أن يكون الناقل منبها في بعض المشابك، ومثبطاً في مشابك أخرى.

حازم ضعيف

حل التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- 1- يؤدي ارتباط الناقل الكيميائي الغلوتامات مع مستقبلاته في الغشاء بعد المشبكي غالباً إلى:
(ج- دخول شوارد الصوديوم).
- 2- قنوات تفتح وتغلق نتيجة تبدل في كمون (استقطاب) الغشاء: (ب – التبويب الفولطية).


ثانياً: أعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- 1- تعد القطعة الأولية من المحوار مكاناً لانطلاق كمونات العمل.
يعود ذلك لاحتوائها على كثافة عالية من قنوات التبويب الفولطية.
- 2- يقتصر نشوء التيارات المحلية على اختناقات رانفييه.
(لأن قنوات التبويب الفولطية للصوديوم يقتصر وجودها على اختناقات رانفييه، التي تكون على اتصال مع السائل خارج الخلوي، بينما يقوم غمد النخاعين بعزل المناطق المغمدة من الغشاء عن السائل خارج الخلوي).
- 3- يمكن أن يكون الناقل منبهاً في بعض المشابك، ومثبطاً في مشابك أخرى.
(لأنه يتحدد نوع الكمون بعد المشبكي المتشكل بنوع الناقل الكيميائي ونوع أفنية التبويب الكيميائية التي ترتبط بها المستقبلات النوعية للناقل الكيميائي).

الدرس (7): وظائف الجهاز العصبي المركزي 1


**

النواة المتكئة (من النوى القاعدية)



موسيقا مفرحة

اللوزة



موسيقا محزنة

الصور الوظيفية للدماغ

ما الذي يحدث في دماغك عندما تقوم بحل مسألة رياضية أو تستمع إلى الموسيقا؟ لقد كانت الإجابة عن هذا السؤال غير ممكنة لوقت طويل. ومع ذلك، بدأ العلماء باكتشاف الآليات الخلوية التي تكمن وراء التفكير والعواطف، وهذا بفضل التكنولوجيا الجديدة الرائعة.

الصور الوظيفية للدماغ:

اعتمد العلماء في تحديد وظائف الدماغ على تقنيات مختلفة أهمها:

التصوير الرنيني المغناطيسي الوظيفي
fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)

فضمن هذا التصوير:

يتم وضع المريض في حقل مغناطيسي كبير، ويتم الكشف عن نشاط الدماغ في منطقة معينة من خلال: التغيرات في تراكيز الأكسجين في تلك المنطقة.

قام الباحثون بمسح نشاط الدماغ في أثناء استماع الأشخاص لموسيقا يصفونها بالمفرحة أو المحزنة.

■ ألاحظ الصور الآتية، وأستنتج الأماكن المسؤولة عن

إدراك تلك الأحاسيس.

الموسيقا المفرحة: النواة المتكئة (من النوى القاعدية)

الموسيقا المحزنة: اللوزة

1- ما هي التقنيات المستخدمة لمعرفة وظائف الدماغ؟

2- في تقنيات fMRI أين يوضع المريض؟ وكيف يتم الكشف عن نشاط الدماغ.

3- حدد موقع: المركز العصبي المسؤول عن الفرح؟

4- حدد موقع: المركز العصبي المسؤول عن الحزن؟

وظائف قشرة المخ**وظائف قشرة المخ**

تقسم قشرة المخ وظيفيا إلى باحات، هي:

1- الباحات القشرية الحسية:

وتقسم كل منها إلى باحتين: **أولية** و**ثانوية** (وظيفتها): تتلقى السيالات العصبية الواردة من المستقبلات الحسية.

2- الباحات القشرية الترابطية:


(وظيفتها): تقوم بـ:

- تفسير المعطيات الحسية الواردة
- ومعالجتها
- ومقارنتها بالمعلومات السابقة
- ثم تعطي الاستجابة.

3- الباحات القشرية الحركية:

(وظيفتها): تصدر السيالات نحو المنفذات.

- 1- اذكر وظيفة الباحات القشرية الحسية.
- 2- اذكر وظيفة الباحات القشرية الحركية.
- 3- اذكر وظيفة الباحات القشرية الترابطية.
- 4- ما هي أقسام كل باحة قشرية حسية؟
- 5- بماذا ينتهي طريق المستقبلات الحسية؟
- 6- بماذا ينتهي طريق الباحات القشرية الحركية؟

**المستويات الوظيفية للجهاز العصبي المركزي**


يقسم الجهاز العصبي المركزي إلى ثلاثة مستويات وظيفية:

1. المستوى الدماغى العلوى:

ويمثل المستوى القشري.

2. مستوى الدماغ السفلى:

الدماغ المهادي - وجذع الدماغ - والمخيخ.

3. مستوى النخاع الشوكي.

- 1- كيف يقسم الجهاز العصبي وظيفيا؟
- 2- مم يتألف المستوى الدماغى العلوى؟
- 3- مم يتألف المستوى الدماغى السفلى؟


الباحات الحسية:

الباحات الحسية الجسمية

تقسم إلى :

- باحة حسية جسمية أولية
- باحة حسية جسمية ثانوية

الباحة الحسية الجسمية الثانوية		الباحة الحسية الجسمية الأولية	
خلف الباحة الحسية الجسمية الأولية (في الفص الجداري)	خلف شق رولاندو (في الفص الجداري)	تقع	
إدراك المحسوس الجسيمي	تستقبل السيالات الحسية من قطاع جسيمي محدد؛ من الجانب المعاكس، (فسر:) (بسبب التصالب الحسي الجسيمي) (وظيفتها): <u>تقوم بالإحساس الجسيمي</u>	وظيفتها	
عند إصابتها بأذية لا يعاني المريض من أعراض الخدر ولكنه يصاب: <u>بالعمه اللمسي</u> <u>أي</u> : يصبح المريض عاجزاً عن تحديد ماهية ما يلمس.	الاستئصال الواسع للباحات الحسية الجسمية الأولية في نصفي الكرة المخية <u>يؤدي إلى</u> : الخدر في الجانب المعاكس من الجسم.	الأذية	
التشكيل الشبكي: شبكة منتشرة من العصبونات الموجودة في: الدماغ المتوسط - والحدبة الحلقية. (وظيفته): يعتقد بأن له دوراً في النوم - واليقظة. تخريب التشكيل الشبكي يؤدي إلى: السبات الدائم.			
<ul style="list-style-type: none"> - تتوضع مراكز الشعور بالألم في: التشكيل الشبكي وفي المهاد. - بينما يقتصر دور القشرة المخية (الباحات الحسية الجسمية) على: تحديد مكان الألم - وصفته. 			
تحديد مكان الألم وصفته		مراكز الشعور بالألم	
القشرة المخية (الباحات الحسية الجسمية)		في التشكيل الشبكي وفي المهاد	
قطع الألياف العصبية الواردة من التشكيل الشبكي والمهادين يؤدي إلى: توقف الشعور بالألم - والسبات الدائم.			




- 1- حدد موقع وفي أي فص تقع (الباحة الحسية الجسمية الأولية – الباحة الحسية الجسمية الثانوية)؟
- 2- ما وظيفة (الباحة الحسية الجسمية الأولية – الباحة الحسية الجسمية الثانوية)؟
- 3- ماذا ينجم عن الاستئصال الواسع للباحات الحسية الجسمية الأولية في نصفي الكرة المخية؟
- 4- ماذا ينتج عن أذية الباحة الحسية الجسمية الثانوية؟
- 5- ما هو العمه اللمسي؟
- 6- ما سبب الإصابة بالخدر؟
- 7- ما هو التشكيل الشبكي؟
- 8- حدد موقع التشكيل الشبكي؟
- 9- اذكر وظيفة لتشكيل الشبكي.
- 10- ماذا ينتج عن تخريب التشكيل الشبكي؟
- 11- ماذا ينتج عن قطع الألياف العصبية الواردة من التشكيل الشبكي والمهادين؟
- 12- حدد موقع مراكز الشعور بالألم.
- 13- ما دور القشرة المخية القشرية المخية (الباحات الحسية الجسمية) في حس الألم.

الباحات البصرية


تقسم إلى :

- باحة بصرية أولية
- باحة بصرية ثانوية



الباحات القشرية في نصف الكرة المخية الأيسر

الباحة البصرية الثانوية	الباحة البصرية الأولية	
في الفصين القفويين	في الفصين القفويين	الموقع
الإدراك البصري. وهو: تحليل شكل الأجسام المرئية - وحركتها - وألوانها.	تصل إليها الألياف العصبية البصرية القادمة من: الشبكيين بعد أن تتصلب: أمام الوطاء جزئياً (وظيفةها): الإحساس البصري	الوظيفة
	يؤدي التخریب ثنائي الجانب إلى: فقدان الرؤية	الآلية
	لا يؤدي التخریب أحادي الجانب إلى فقدان الرؤية (بسبب التصالب البصري الجزئي أمام الوطاء)	




- 1- حدد موقع (الباحة البصرية الأولية - الباحة البصرية الثانوية)
- 2- اذكر وظيفة (الباحة البصرية الأولية - الباحة البصرية الثانوية).
- 3- ما هو الإدراك البصري؟
- 4- أين تتصلب الألياف العصبية البصرية؟ وما نوع التصالب؟
- 5- ماذا ينتج عن التخریب ثنائي الجانب للباحة البصرية الأولية؟
- 6- ماذا ينتج عن التخریب ثنائي الجانب للباحة البصرية الثانوية؟
- 7- ما هي الإصابة القشرية التي تسبب فقدان الرؤية؟
- 8- علل: لا يؤدي التخریب أحادي الجانب إلى فقدان الرؤية؟

الباحات السمعية

تقسم إلى :

- باحة سمعية أولية
- باحة سمعية ثانوية




الباحات القشرية في نصف الكرة المخية الأيسر

الباحة السمعية الثانوية

الباحة السمعية الأولية

في الفصين الصدغيين	في الفصين الصدغيين	الموقع
الإدراك السمعي، وهو: إدراك الأصوات المسموعة.	تصل إليها الألياف العصبية السمعية القادمة من: عضو كورتي في الحلزون بعد أن يتصلب العصب القوقعي في: جذع الدماغ جزئياً ويتم فيها: الإحساس السمعي	الوظيفة
	<u>يؤدي التخریب ثنائي الجانب إلى:</u> فقدان السمع	الأذية
	لا يؤدي التخریب أحادي الجانب إلى فقدان السمع (بسبب التصلب الجزئي في جذع الدماغ).	



- 1- حدد موقع (الباحة السمعية الأولية - الباحة السمعية الثانوية)
- 2- اذكر وظيفة (الباحة السمعية الأولية - الباحة السمعية الثانوية).
- 3- ما هو الإدراك السمعي؟
- 4- أين يتصلب العصب القوقعي؟ وما نوع التصلب؟
- 5- ماذا ينتج عن التخریب ثنائي الجانب للباحة السمعية الأولية؟
- 6- ماذا ينتج عن التخریب ثنائي الجانب للباحة السمعية الثانوية؟
- 7- ما هي الإصابة القشرية التي تسبب فقدان السمع؟
- 8- فسر: لا يؤدي التخریب أحادي الجانب إلى فقدان السمع؟


الباحات الحركية:

الباحات المحركة


تقسم إلى :

- باحة محرقة أولية
- باحة محرقة ثانوية

الباحة المحركة الثانوية	الباحة المحركة الأولية	
أمام الباحة المحركة الأولية (في الفص الجبهي)	أمام شق رولاندو مباشرة (في الفص الجبهي)	الموقع
تقوم بتنسيق التقلصات العضلية وتوجيهها نحو حركة هادفة.	تشرف كل باحة محرقة أولية على: تعصيب الجانب المقابل (المعكس) من الجسم.	الوظيفة
	بسبب: التصلب الحركي	
	تخريب الباحات المحركة الأولية يؤدي إلى: خسارة كبيرة في الفعاليات العضلية الحركية للجسم	الآذية



الباحات القشرية في نصف الكرة المخية الأيسر



السبيل القشري النخاعي

- 1- حدد موقع (الباحة المحركة الأولية - الباحة المحركة الثانوية).
- 2- اذكر وظيفة (الباحة المحركة الأولية - الباحة المحركة الثانوية).
- 3- ماذا ينتج عن تخريب الباحات المحركة الأولية؟
- 4- ما هي الإصابة القشرية التي تسبب خسارة كبيرة في الفعاليات العضلية الحركية للجسم؟
- 5- تشرف كل باحة أولية على تعصيب عضلات الجانب المعكس من الجسم، لماذا؟

الباحات الترابطية:

الباحات الترابطية

حينما أكون في غابة، وأسمع حفيف أوراق الأشجار، وأرى تحرك الأغصان، وأشم رائحة حيوان؛ فإنني أستطيع من خلال معالجة تلك المعلومات أن أحدد الخطر الذي سيواجهني، من ثم أتخذ الموقف المناسب لكل حالة كيف يحدث ذلك؟


من خلال:

الباحات الترابطية في قشرة المخ:

- الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية.
- باحة الترابط أمام الجبهية.
- باحة الترابط الحافية.

1- كيف تتم معالجة المعلومات الحسية التي ندركها بحواسنا من أجل تحديد الخطر ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب لكل حالة؟

2- ما هي الباحات الترابطية الموجودة في قشرة المخ؟



1- الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية**الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية:**

تشغل: مناطق جميع الفصوص الثلاثة (الجداري والقفوي والصدغي) عدا تلك التي تشغلها الباحات الحسية.
تعمل هذه الباحة على:
إدراك معاني السيالات العصبية الحسية القادمة من:
الباحات الحسية الثانوية المجاورة.

باحة فيرنكه:**تقع باحة فيرنكه:**

في الناحية الوحشية لنصف الكرة المخية الأيسر؛ وسط باحة الترابط الجدارية القفوية الصدغية،

وظيفة باحة فيرنكه:

- تتلقى السيالات العصبية من: جميع الباحات الحسية
- وتقوم بتحليلها وإدراكها،
- وترسل سيالات عصبية نحو الباحات المحركة إذا:
- كان الأمر يتطلب إنجازاً حركياً،
- وهي مسؤولة عن: الإدراك اللغوي.

تخريب باحة فيرنكه يؤدي إلى:**حبسة فيرنكه وهي:**

عدم إدراك معاني الكلمات المقروءة - والمسموعة.


ويقابلها في نصف الكرة المخية الأيمن **باحة الفراسة:**

وظيفة باحة الفراسة:

- تمييز تعابير الوجه.
- وإدراك معاني الموسيقى، والفن، والرسم، والرياضة

تقع باحة الفراسة:

في الناحية الوحشية لنصف الكرة المخية الأيمن؛ وسط باحة الترابط الجدارية القفوية الصدغية.



- 4- من أين تتلقى الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية السيالات؟ وما نوع هذه السيالات؟
- 5- حدد موقع باحة فيرنكه.
- 6- اذكر وظيفة باحة فيرنكه.
- 7- من أين تتلقى باحة فيرنكه السيالات العصبية؟
- 8- فسر: ترسل باحة فيرنكه سيالات عصبية نحو الباحات المحركة.
- 9- ما هي الباحة المسؤولة عن الإدراك اللغوي
- 10- ماذا ينتج عن تخريب باحة فيرنكه؟
- 11- ماذا ينتج عن حبسة فيرنكه؟ أو ما هي أعراض حبسة فيرنكه؟
- 12- ما هي الباحة المقابلة لباحة فيرنكه في نصف الكرة المخية الأيمن؟
- 13- حدد موقع باحة الفراسة.
- 14- اذكر وظيفة باحة الفراسة.
- 15- ما هو تشخيصك لمريض لا يفهم ما يقرأ ولا ما يسمع؟

- 1- حدد موقع الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية.
- 2- اذكر وظيفة الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية.

2- باحة الترابط أمام الجبهية**باحة الترابط أمام الجبهية:**

تقع: أمام الباحات الحركية في نصفي الكرة المخية.

وظيفةها:

- تتلقى السيالات من: الباحات الحسية - والحركية - والترابطية الأخرى - ومن المهاد، وتجمع المعلومات.
- وتقوم باتخاذ القرار المناسب لإنجاز مجموعة من الحركات المتتالية الهادفة.
- كما تعد مركز التحكم بالفعاليات الأخلاقية والقيم الاجتماعية.

توجد ضمنها **باحة بروكه**.

موقع **باحة بروكه**: ضمن باحة الترابط أمام الجبهية.

وظيفة باحة بروكه:


- تتلقى الفكر من **باحة فيرنكه**,
- وتقوم بتحويلها إلى كلمات (أي النطق والتصويت).

تخريب باحة بروكه:

يؤدي إلى **الحبسة الحركية** وهي:

العجز عن إنشاء الكلمات وتلفظها.

- 1- حدد موقع باحة الترابط أمام الجبهية.
- 2- اذكر وظيفة باحة الترابط أمام الجبهية.
- 3- من أين تتلقى باحة الترابط أمام الجبهية السيالات العصبية؟
- 4- حدد موقع مركز التحكم بالفعاليات الأخلاقية والقيم الاجتماعية.
- 5- حدد موقع باحة بروكه.
- 6- اذكر وظيفة باحة بروكه.
- 7- ماذا ينتج عن تخريب باحة بروكه؟
- 8- ماذا ينتج عن الحبسة الحركية؟ أو ما هي أعراض الحبسة الحركية؟
- 9- علل: الإصابة بالحبسة الحركية.
- 10- ما هو تشخيصك لمريض يعجز عن إنشاء الكلمات وتلفظها؟



(وسط الباحة الترابطية الجدارية القشرية الصدغية لنصف الكرة المخية الأيسر)
الباحات القشرية لنصف الكرة المخية الأيسر

(وسط الباحة الترابطية الجدارية القشرية الصدغية لنصف الكرة المخية الأيمن)
الباحات القشرية لنصف الكرة المخية الأيمن

3- باحة الترابط الحافية**باحة الترابط الحافية:****تقع:**

في الناحية السفلية للفصين الجبهيين، وإلى الأمام من الفصين الصدغيين.


وظائفها:

- لها علاقة بسلوك الشخص.
- وانفعالاته.
- ودوافعه نحو عملية التعلم.

1- حدد موقع باحة الترابط الحافية.

2- اذكر وظيفة باحة الترابط الحافية.

3- أين يقع مركز سلوك الشخص وانفعالاته ودوافعه إلى عملية التعلم؟



التقويم النهائي

1. أحدد بدقة موقع المركز العصبي لكل مما يأتي:
الشعور بالفرح - الإدراك اللغوي - تحديد مكان الألم وصفته - التحكم بالقيم الاجتماعية.

2. ما وظيفة كل مما يأتي:
الباحة السمعية الثانوية - باحة الترابط الحافية - الباحة البصرية الأولية.

3. ماذا ينتج من تخريب كل من :
باحة بروكه، والباحة الحسية الجسمية الأولية اليسرى

حل التقويم النهائي:

1- أحدد بدقة موقع المركز العصبي لكل مما يأتي:
-مركز الشعور بالفرح: النواة المتكئة.
-مركز الإدراك اللغوي: باحة فيرنكا في الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية.
-مركز تحديد مكان الألم وصفته: الباحات الحسية الجسمية بشكل عام في القشرة المخية.
-التحكم بالقيم الاجتماعية: باحة الترابط أمام الجبهية.

2- ما وظيفة كل مما يأتي:
-الباحة السمعية الثانوية: إدراك الأصوات المسموعة.
-الباحة الترابطية الحافية: لها علاقة بسلوك الشخص وانفعالاته ودوافعه نحو عملية التعلم.
-الباحة البصرية الأولية: يتم فيها الإحساس البصري.

3- ماذا ينتج من:
-تخريب باحة بروكه : الحبسة الحركية أو العجز عن إنشاء الكلمات و تلفظها.
-تخريب الباحة الحسية الجسمية الأولية اليسرى:
خدر في الجانب الأيمن من الجسم
أو فقدان الحس في الجانب الأيمن من الجسم

الدرس(8): وظائف الجهاز العصبي المركزي 2

دور المخ في الحس والحركة والتعلم والذاكرة:

دور المخ في الحس:

1- دور المخ في الحس:

تستقبل القشرة المخية الحسية:

السيالات العصبية الحسية من:

- مستقبلات الحس الخارجي:

مثل: اللمس، والحرارة، والألم،

- ومستقبلات الحس الداخلي العميق:


مثل: حس الاهتزاز،

والحس العميق وهو الحس: المسؤول عن إدراك حركة العضلات - والمفاصل.

تعبر الألياف الحسية جميع الحبال في النخاع الشوكي، وتتصلب: من الجانب الأيسر من الجسم؛ لتصل إلى النصف الأيمن من الكرة المخية وبالعكس،

بعضها يتصلب بشكل تام: كالألياف للمسية

بعضها يتصلب بشكل جزئي: كالألياف العصب البصري وألياف العصب القوقعي.



1- ما أنواع المستقبلات التي تستقبل منها القشرة المخية الحسية السيالات؟ مع أمثلة لكل منها.

2- صنف مستقبلات الأحاسيس التالية إلى خارجية وداخلية (اللمس - الاهتزاز - الحرارة - الحس العميق - الألم).

3- ما هو الحس العميق.


4- اكتب المصطلح الموافق: عبور الألياف من الجانب الأيسر للجسم لتصل إلى نصف الكرة المخية الأيمن وبالعكس. ج - التصالب

5- اكتب المصطلح الموافق: عبور الألياف الحسية من الجانب الأيسر للجسم لتصل إلى نصف الكرة المخية الأيمن وبالعكس. ج - التصالب الحسي

6- ما هي أنواع التصالب الحسي؟ مع مثال لكل منها.

المسالك الحسية

مسلك إحساسات اللمس الدقيق – الاهتزاز – الحس العميق	مسلك إحساسات اللمس الخشن – الألم – الحرارة	
عصبون جسمه في العقدة الشوكية	عصبون جسمه في العقدة لشوكية	عصبون 1
عصبون جسمه في المادة الرمادية للبلصلة السيسائية (هو من يشكل التصالب الحسي)	عصبون جسمه في المادة الرمادية للنخاع الشوكي (هو من يشكل التصالب الحسي)	عصبون 2
عصبون جسمه في المهاد (في نصف الكرة المخية المعاكس لجهة التنبيه)	عصبون جسمه في المهاد (في نصف الكرة المخية المعاكس لجهة التنبيه)	عصبون 3
الاتجاه من الأسفل للأعلى (صاعد)		
جميع الحبال (الخلفيان والجانبين والأماميان).	جميع الحبال (الخلفيان والجانبين والأماميان).	الحبال التي تعبرها الألياف في النخاع الشوكي
ينتهي المسلك الحسي: إلى الباحة الحسية الجسمية الأولية (خلف شق رولاندو في نصف الكرة المخية المعاكس لجهة التنبيه)	ينتهي المسلك الحسي: إلى الباحة الحسية الجسمية الأولية (خلف شق رولاندو في نصف الكرة المخية المعاكس لجهة التنبيه)	نهاية المسلك



- 1- رتب العصبونات التي تشكل المسلك الناقل لحس الحرارة واللمس الخشن والألم.
- 2- أين يتصالب المسلك السابق؟
- 3- أين يقع جسم العصبون الثاني في المسلك السابق؟
- 4- رتب العصبونات التي تشكل المسلك الناقل لحس اللمس الدقيق والاهتزاز والحس العميق.
- 5- أين يتصالب المسلك السابق؟
- 6- أين يقع جسم العصبون الثاني في المسلك السابق؟
- 7- ما هي الحبال التي تعبرها الألياف الحسية في النخاع الشوكي؟
- 8- أين تنتهي المسالك الحسية؟

دور المخ في الحركة:


2- دور المخ في الحركة:

تصدر القشرة المخية الأوامر الحركية بعد:
مرحلة نشاط مخي يحدث في:
الباحات الترابطية

يصدر **السبيل القشري النخاعي** عن:
العصبونات الهرمية في قشرة المخ،

وفي أثناء نزوله:

- يشكل السويقتين المخيتين في: الدماغ المتوسط،
- ثم يشكل الأهرامات في: البصلة السيسانية،
- ثم يتابع نزوله عبر: الحبلين الأماميين - والحبلين الجانبيين للنخاع الشوكي؛
- لتصل أليافه إلى مستويات من: القرون الأمامية للنخاع الشوكي؛
- وفي القرون الأمامية للنخاع الشوكي تشكل ألياف العصبون الهرمي **مشابك** مع: العصبونات النجمية
- العصبونات النجمية: توصل السيالة المحركة عبر محاورها إلى: العضلات المستجيبة



1- ما أهمية وجود مشبك واحد فقط على طول السبيل القشري النخاعي؟


ج- يكسب الحركات السرعة والمهارة.

2- ما العصبونات التي يصدر عنها السبيل القشري النخاعي؟ وفي أية باحة توجد؟

3- يتألف السبيل القشري النخاعي من مسلكين؛ أين يتصالب كل منهما؟ أين ينتهيان؟

4- ما وظيفة العصبونات النجمية في القرون الأمامية للنخاع الشوكي؟ وبماذا تتصل محاورها؟

- المسالك الحركية (السبيل القشري النخاعي)



المسلك الثاني	المسلك الأول	
عصبون هرمي يقع في: قشرة المخ في الباحة المحركة الأولية (يتصلب في النخاع الشوكي)	عصبون هرمي يقع في: قشرة المخ في الباحة المحركة الأولية (يتصلب في البصلة السيانية)	عصبون 1
عصبون نجمي يقع في: القرن الأمامي للنخاع الشوكي	عصبون نجمي يقع في: القرن الأمامي للنخاع الشوكي	عصبون 2
الاتجاه من الأعلى للأسفل (نازل)		
يشكل السويقتين المخيتين في: الدماغ المتوسط، ثم يشكل الأهرامات في: البصلة السيانية	يشكل السويقتين المخيتين في: الدماغ المتوسط، ثم يشكل الأهرامات في: البصلة السيانية	البنى التي يشكلها
الجانبين - والأماميين	الجانبين - والأماميين	الحبال التي تعبرها الألياف في النخاع الشوكي
تصل أليافه إلى مستويات من: القرن الأمامية للنخاع الشوكي ليتشابك العصبون الهرمي مع العصبون النجمي.	تصل أليافه إلى مستويات من: القرن الأمامية للنخاع الشوكي ليتشابك العصبون الهرمي مع العصبون النجمي.	نهاية المسلك

- 1- أين يتصلب العصبون الهرمي في كل من المسلكين الهرمين؟
- 2- حدد موقع العصبون الهرمي في السبيل القشري النخاعي؟
- 3- أين ينتهي العصبون الهرمي في السبيل القشري النخاعي؟
- 4- ما هي البنى التي يشكلها العصبون الهرمي أثناء نزوله في المادة البيضاء؟
- 5- حدد موقع السويقتين المخيتين؟ وكيف تتشكلان؟
- 6- أين يشكل العصبون الهرمي الأهرامات؟
- 7- في أي الحبال من النخاع الشوكي يتابع المسلك القشري نزوله؟
- 8- حدد موقع المشبك في المسلك القشري النخاعي. وما هي العصبونات المشكلة له؟
- 9- ما هو الناقل المتشكل في محوار العصبون النجمي في المشبك بين العصبون المحرك النجمي والعضلات المستجيبة؟ وما نوع الكمون الذي يشكله في الخلايا المستجيبة؟

دور المخ في التعلم والذاكرة:

3- دور المخ في التعلم والذاكرة:

دور المخ في التعلم والذاكرة:

A- المرونة العصبية أو التكيف العصبي.

B- الذاكرة والتعلم

1- ما هما دورا المخ في اكتساب المعرفة؟

A- (المرونة العصبية) أو (التكيف العصبي)

يحتوي المخ: 100 مليار عصبون تقريباً،
يربط بينها نحو: تريليون مشبك
في كل: 1 cm^3

المرونة العصبية:

يمكن: تعديل الارتباطات (المشابك) بين العصبونات،
من ثم: تغيير سعة الجهاز العصبي (فسر):
كاستجابة لنشاط العصبونات وارتباطاتها.

تغيير سعة الجهاز العصبي:

أي تقوى الارتباطات بين العصبونات أو تضعف حسب درجة
النشاط بينها.


1- كم عدد العصبونات في كل 1 cm^3 من نسيج المخ؟ وكم

مشبكا يربط بينها؟

2- عرف المرونة العصبية.

3- ماذا ينتج عن تعديل الارتباطات (المشابك) بين
العصبونات؟4- علل: تتغير سعة الجهاز العصبي.

5- ماذا يعني تغيير سعة الجهاز العصبي؟






B- الذاكرة والتعلم

يتم تنظيم الذاكرة في دماغنا على ثلاث مراحل:


1- الذاكرة الحسية

2- الذاكرة القصيرة الأمد

3- الذاكرة الطويلة الأمد



الذاكرة الحسية	الذاكرة قصيرة الأمد	الذاكرة طويلة الأمد	
تسجل الانطباعات التي تستقبلها الحواس			الوظيفة
تستمر أجزاء من الثانية	تستمر حتى 20 ثانية أو أكثر.	تستمر لمدة طويلة جداً	المدة
كما هو الحال عند النظر لجسم ما، ومن ثم نغلق عيوننا فنلاحظ بقاء الانطباع لمدة قصيرة جداً	كما هي الحال عندما نحفظ رقم هاتف ما ثم ننساه بعد أن نستخدمه لمرة واحدة	تذكر عنوان منزلك القديم، أو قيادة الدراجة	مثالها
	مؤقتة	دائمة	نوع المشابك
	تلفيف الحصين	القشرة المخية	موقع المشبك



الأساس البيولوجي لتشكل عمليتي التعلم والذاكرة:

تعد المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات، (فسر): لأن الذاكرتين الطويلة الأمد والقصيرة الأمد تنشآن عند المشابك؛

إذ تتشكل مشابك مؤقتة في: تلفيف الحصين في أثناء الذاكرة القصيرة الأمد، بينما تتحول إلى روابط (مشابك) دائمة في: القشرة المخية في الذاكرة طويلة الأمد،

ويعتقد بأن ذلك يحدث في: أثناء النوم؛ مما يؤكد أهمية النوم في تشكل الذكريات.

س- فسر أهمية النوم في تشكل الذكريات:
ج- لأنه يحول المشابك المؤقتة في الحصين في أثناء الذاكرة قصيرة الأمد إلى روابط (مشابك) دائمة في القشرة المخية في الذاكرة طويلة الأمد.

تلفيف الحصين:

جزء متطاوّل من: مادة سنجابية
نهايته الأمامية متضخمة،
(موقعه): يمتد في أرضية البطين الجانبي لكل من نصفي الكرة المخية.

وظيفة الحصين:

يعد الحصين ضرورياً لـ: تخزين الذكريات الجديدة الطويلة الأمد
لكن ليس للاحتفاظ بها.

فسر:

يؤكد ذلك أن الأشخاص الذين يعانون من تضرر في تلفيف الحصين؛ لا يستطيعون تشكيل ذكريات جديدة دائمة، ويتذكرون الأحداث التي جرت قبل إصابتهم .

1- ما هي أنواع الذاكرة لدى الإنسان؟ أو ما مراحل تنظيم الذاكرة في دماغنا؟

2- ما هي وظيفة الذاكرة الحسية؟

3- قارن بين أنواع الذاكر من حيث مدة بقائها مع مثال لكل نوع.

4- قارن بين الذاكرة قصيرة الأمد والذاكرة طويلة الأمد من حيث الموقع ونوع المشابك.

5- ما هو مصير الذاكرة قصيرة الأمد؟

6- ما هو الأساس البيولوجي لتشكيل عمليتي التعلم والذاكرة؟

7- فسر: تعد المرونة العصبية أساسية في تشكيل الذكريات.

8- كيف تتحول الذاكرة قصيرة الأمد إلى ذاكرة طويلة الأمد؟

9- أين ومتى تتحول الذاكرة قصيرة الأمد إلى ذاكرة طويلة الأمد؟

10- فسر: أهمية النوم في تشكل الذكريات.

10- ما هي وظيفة الحصين.

11- فسر: لا يعد الحصين ضرورياً للاحتفاظ بالذكريات طويلة الأمد.

12- مم يتألف الحصين؟ وأين يقع؟ وكيف يكون شكله؟

التقويم النهائي

أولاً: ما المقصود بكل مما يأتي: الحصين - المرونة العصبية.

ثانياً: أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- إحدى هذه العصبونات ليست من المسلك الحسي اللمسي الدقيق الصاعد:
- عصبون جسمه يقع في العقدة الشوكية.
 - عصبون جسمه يقع في المهاد.
 - عصبون جسمه يقع في البصلة السيسائية.
 - عصبون جسمه يقع في المادة الرمادية للنخاع الشوكي.

ثالثاً: أرتب العصبونات التي تشكل مسلك حس الألم، وأحدد مكان التصالب الحسي.**رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

- تعد العصبونات النجمية في القرون الأمامية للنخاع الشوكي محرقة.
- تعد المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات.
- أهمية النوم في تشكيل الذكريات.

حل التقويم النهائي**1- ما المقصود بكل مما يأتي:**

الحصين: جزء متطاوول من مادة سنجابية يمتد في أرضية البطن الجانبي لكل من نصفي الكرة المخية ويعد ضروريا لتخزين الذكريات الجديدة طويلة الأمد لكن ليس للاحتفاظ بها.

المرونة العصبية: تعديل الارتباطات (المشابك) بين العصبونات وتغيير سعة الجهاز العصبي كاستجابة لنشاط تلك العصبونات أي تقوى الارتباطات بين العصبونات أو تضعف حسب درجة النشاط بينها.

2- أختار الإجابة الصحيحة:

إحدى هذه العصبونات ليست من المسلك الحسي اللمسي الدقيق الصاعد:
د- عصبون يقع جسمه في المادة الرمادية للنخاع الشوكي

3- أرتب العصبونات التي تشكل مسلك حس الألم وأحدد مكان التصالب الحسي.
عصبون جسمه في العقدة الشوكية – عصبون جسمه في النخاع الشوكي – عصبون جسمه في المهاد. -التصالب الحسي في النخاع الشوكي.


4- أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:


أ- تعد العصبونات النجمية في القرون الأمامية للنخاع الشوكي محركاً. (لأنها تنقل السائلة العصبية المحركة عبر محاورها إلى العضلات المستجيبة).

ب- تعد المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات. (لأن الذاكرة تنشأ عند المشابك، والمرونة العصبية تعدل الارتباطات (المشابك) بين العصبونات حسب درجة النشاط بينها ؛ إذ تتشكل روابط مؤقتة في الحصين في الذاكرة قصيرة الأمد وتتحول إلى روابط دائمة في قشرة المخ في الذاكرة طويلة الأمد).

ج- أهمية النوم في تشكيل الذكريات. (لأن تحول الروابط المؤقتة في الحصين (ذاكرة قصيرة الأمد) إلى روابط دائمة في قشرة المخ (ذاكرة طويلة الأمد) يحدث في أثناء النوم).

الدرس(9): وظائف الجهاز العصبي المركزي 3

* 1- وظائف الدماغ البيني (المهادي)		يشمل:					
 <p>المهاد الوطاء الغدة النخامية</p>	<p>- المهادين - الوطاء</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الوطاء</th> <th>المهاد</th> <th>الوظيفة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>1- له دور في تنظيم حرارة الجسم، 2- وتنظيم فعالية الجهاز الهضمي، 3- ويحوي مراكز الشعور بالعطش والجوع والخوف، 4- كما يتحكم بالنخامة الأمامية، 5- ويتحكم بالجهاز العصبي الذاتي.</p> </td> <td> <p>1- له دور أساسي في تنظيم <u>الفعاليات القشرية الحسية</u>، <u>وذلك</u>: تحديد وتسهيل وتنظيم <u>السيالات العصبية</u> الصاعدة إليها.</p> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الوطاء	المهاد	الوظيفة	<p>1- له دور في تنظيم حرارة الجسم، 2- وتنظيم فعالية الجهاز الهضمي، 3- ويحوي مراكز الشعور بالعطش والجوع والخوف، 4- كما يتحكم بالنخامة الأمامية، 5- ويتحكم بالجهاز العصبي الذاتي.</p>	<p>1- له دور أساسي في تنظيم <u>الفعاليات القشرية الحسية</u>، <u>وذلك</u>: تحديد وتسهيل وتنظيم <u>السيالات العصبية</u> الصاعدة إليها.</p>	
الوطاء	المهاد	الوظيفة					
<p>1- له دور في تنظيم حرارة الجسم، 2- وتنظيم فعالية الجهاز الهضمي، 3- ويحوي مراكز الشعور بالعطش والجوع والخوف، 4- كما يتحكم بالنخامة الأمامية، 5- ويتحكم بالجهاز العصبي الذاتي.</p>	<p>1- له دور أساسي في تنظيم <u>الفعاليات القشرية الحسية</u>، <u>وذلك</u>: تحديد وتسهيل وتنظيم <u>السيالات العصبية</u> الصاعدة إليها.</p>						
<p>1- مم يتألف الدماغ البيني (المهادي)؟ 2- اذكر وظيفة المهاد. 3- <u>اختر الإجابة الصحيحة</u>: المهاد له دور أساسي في تنظيم <u>الفعاليات القشرية</u>: (الحسية – الحركية – الذاتية – الودية – نظيرة الودية – الحسية والحركية – المختلطة). 4- ما هي وظيفة الوطاء؟ 5- حدد موقع مركز الشعور بالعطش - الجوع - الخوف. 6- ما الذي يتحكم بالنخامة الأمامية؟ 7- حدد موقع مركز تنظيم حرارة الجسم.</p>							



2- وظائف النوى القاعدية

النوى القاعدية هي:

بني عصبية حركية

(وظيفة النوى القاعدية):

تعمل بالتعاون مع: القشرة المخية المحركة - والمخيخ

لي: التحكم بالحركات المعقدة،

(موقع النوى القاعدية):

في مستوى الدماغ البيني إلى الجانب الوحشي لكل مهاد، وفي

عمق المادة البيضاء.

من النوى القاعدية:

الجسمان المخططان:

(وظيفتهما): مرحلة لمرور الحزم المحركة النازلة

من: القشرة المخية

إلى: المراكز العصبية في الدماغ المتوسط

(وظيفتهما):

1- هما ضروريان لحفظ توازن الجسم،

2- والحركات التلقائية (السير / الكلام / الكتابة).

1- اختر الإجابة الصحيحة: النوى القاعدية هي بني عصبية:

(حسية - حركية - مختلطة - ذاتية - ودية - نظيرة

ودية).

2- مع من تتعاون النوى القاعدية في عملها؟

3- اذكر وظيفة النوى القاعدية.

4- حدد موقع النوى القاعدية.

5- إلى ماذا يتبع الجسمان المخططان؟

6- اذكر وظيفة الجسمين المخططين؟

7- من أين تنشأ الحزم المحركة المارة في الجسمين

المخططين؟ وأين تنتهي؟

3- وظائف جذع الدماغ

جذع الدماغ يشمل:

- 1- الدماغ المتوسط
- 2- الحدة الحلقية
- 3- البصلة السيسائية


1- وظائف الدماغ المتوسط:

(السويقتين المخيتين – الحداث التوعمية الأربع)


السويقتين المخيتين	الحداث التوعمية الأربع	الوظيفة
تتكون من: مادة بيضاء	1- مركز تنظيم المنعكسات السمعية: (دوران الرأس نحو الصوت).	الوظيفة
تشكل طريقا للسيالات المحركة الصادرة عن: الدماغ	2- والمنعكسات البصرية: (دوران كرتي العين نحو الضوء).	

2- وظائف الحدة الحلقية:

الحدة الحلقية	المادة الرمادية	الوظيفة
تضم: مادة رمادية – مادة بيضاء	مركز عصبي انعكاسي	الوظيفة
المادة البيضاء	يعمل: بالتعاون مع مراكز في: البصلة السيسائية	
	ل: السيطرة على: معدل التنفس – وعمقه.	
	طريق لنقل السيالة العصبية بين: المخ – والمخيخ.	



3- وظائف البصلة السيسانية:



البصلة السيسانية		الوظيفة
المادة البيضاء	المادة الرمادية	
تضم: مادة رمادية – مادة بيضاء		
<p>طريق لنقل السائلة العصبية:</p> <p>- الحسية الصاعدة</p> <p>- والمحركة الصادرة</p> <p>عن: الدماغ</p>	<p>مركز عصبي انعكاسي</p> <p>ل: تنظيم الفعاليات الذاتية:</p> <p>مثل:</p> <p>- حركة القلب والتنفس والبلع والسعال والضغط الدموي</p>	

- 1- ما هي أقسام جذع الدماغ؟
- 2- مم يتألف الدماغ المتوسط؟
- 3- ما وظيفة السويقتين المخيتين؟ ومم تتألفان؟
- 4- كيف تتشكل السويقتان المخيتان؟ (سؤال من الدرس السابق)
- 5- اذكر وظيفة الحدبات التوئية الأربعة.
- 6- ما هي المنعكسات السمعية؟ وما هي المنعكسات البصرية؟
- 7- حدد موقع مركز المنعكسات السمعية والبصرية.
- 8- ما هي أقسام الحدة الحلقية؟
- 9- ما وظيفة المادة الرمادية وما وظيفة المادة البيضاء للحدة الحلقية؟
- 10- حدد موقع الألياف الواصلة بين المخ والمخيخ.
- ج- في المادة البيضاء للحدة الحلقية
- 11- كيف يتم السيطرة على معدل التنفس وعمقه؟
- ج- من خلال تعاون المركز العصبي الانعكاسي في المادة الرمادية للحدة الحلقية مع مراكز في البصلة السيسانية
- 12- ما هي أقسام البصلة السيسانية؟ وكيف يكون توضعها مركزياً ومحيطياً؟
- 13- ما وظيفة المادة الرمادية وما وظيفة المادة البيضاء للبصلة السيسانية؟
- 14- حدد موقع مركز التنفس – البلع – السعال – حركة القلب – الضغط الدموي.

4- وظائف المخيخ

وظائف المخيخ:


1- تتلقى خلايا بوركنج في المخيخ:

أ- **السيالات العصبية الحركية القادمة من:** القشرة المخية المحركة،
وتقوم بمقارنتها مع:

ب- **السيالات العصبية الحسية القادمة إليها من:**
المستقبلات الحسية،

ثم تعمل على: تكامل المعلومات، وتحدث فعالية عضلية تؤدي إلى: حركة دقيقة مما: يؤمن توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون.

2- ضبط الفعاليات العضلية السريعة انعكاسياً،
من مثل: السباحة - وقيادة الدراجة.



*

1- ما هي وظائف المخيخ؟

2- ما وظيفة خلايا بوركنج.

3- حدد موقع خلايا بوركنج. ج- في القشرة المخيخية

4- كيف تصنف خلايا بوركنج شكلياً. (سؤال من الدرس الثاني)

5- ما هما نوعا السيالات التي تقارنها خلايا بوركنج في المخيخ؟ ومن أين يأتي كل منها؟


6- ماذا ينتج تكامل المعلومات في المخيخ؟

7- **اختر:** يؤمن المخيخ للجسم توازن:

(حركي - سكوني - حركي وسكوني).

8- أعط مثالين عن الفعاليات العضلية السريعة التي يضبطها المخيخ انعكاسياً.

**



خلايا بوركنج في المخيخ

(تذكير: خلايا بوركنج هي خلايا متعددة الأقطاب هرمية)

5- وظائف النخاع الشوكي



*

النخاع الشوكي		
يضم: مادة رمادية – مادة بيضاء		
المادة البيضاء (مقسومة لـ 6 حبال)	المادة الرمادية (بشكل حرف X)	
طريق لنقل السائلة العصبية: - الحسية الصاعدة - والمحركة الصادرة عن: الدماغ	مركز عصبي انعكاسي لمنعكسات: - التعرق - والمشي اللاشعوري - والمنعكس الأخمصي + مركز للمنعكسات الشوكية (كالمنعكس الداغصي).	الوظيفة

المنعكس الأخمصي:

انقباض أصابع القدم

استجابة لـ: دغدغة أخمص القدم.



*

- 1- كيف تتوزع كل من المادة البيضاء والمادة الرمادية في النخاع الشوكي؟
- 2- اذكر وظيفة كل من المادة البيضاء والمادة الرمادية للنخاع الشوكي.
- 3- ماذا ينتج عن دغدغة أخمص القدم؟ وما اسم المنعكس؟ وأين مركزه؟
- 4- علل: انقباض أصابع القدم في المنعكس الأخمصي.
- 5- حدد موقع مركز منعكس: التعرق – المشي اللاشعوري – المنعكس الأخمصي – المنعكس الداغصي.

A

التقويم النهائي

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. أحد المنعكسات الآتية ليس بصلياً:

أ- إفراز اللعاب. ب- إفراز العرق.

ج- البلع. د- السعال.

2. طريق لنقل السيالة العصبية بين المخ والمخيخ:

أ- الحذبات التوعمية الأربع. ب- الحذبة الحلقية.

ج- البصلة السيسائية. د- النخاع الشوكي.

ثانياً: كيف يوازن المخيخ توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون؟

ثالثاً: أعدد بدقة موقع كل من:

خلايا بوركنج، النوى القاعدية، المركز العصبي للتحكم بمعدل التنفس وعمقه

حازم ضعيف

حل التقويم النهائي

أولاً- أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1-ب- إفراز العرق.

2-ب- الحدبة الحلقية.

ثانياً:

تتلقى خلايا بوركنج في المخيخ السيالات العصبية الحركية القادمة من القشرة المخية المحركة، وتقوم بمقارنتها مع السيالات العصبية القادمة إليها من المستقبلات الحسية، ثم تعمل على تكامل المعلومات وتحديث فعالية عضلية تؤدي إلى حركة دقيقة، مما يؤمن توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون.

ثالثاً: تحديد الموقع:

-خلايا بوركنج: في المخيخ.
-النوى القاعدية: في مستوى الدماغ البيني وإلى الجانب الوحشي لكل مهاد.
-المركز العصبي للتحكم بمعدل التنفس وعمقه: في الحدبة الحلقية بمادتها الرمادية بالتعاون مع المراكز العصبية في المادة الرمادية للصلة السيسائية.

حازم ضعيف

الدرس(10): الفعل المنعكس

مقدمة عن المنعكسات



أحببت ابنتي الطفل الصغير الذي وضعته حديثاً، ولكن ما أثار حيرتها هو قدرة الصغير على الرضاعة منذ اليوم الأول لولادته، ولم تستطع تفسير ذلك، وعندما سألت مدرسة العلوم عن السبب، أجابتها:
بأنه فعل انعكاسي

لاحظ الشكل المجاور، الذي يمثل ضفدعا شوكيا بعد تنبيهه بحمض الخل. وأجيب عن الأسئلة:

1. هل استجابة الضفدع إرادية؟ ولماذا؟
لا، لأنها حدثت دون تدخل قشرة المخ.

2. ما المركز العصبي الذي أشرف على هذا الفعل؟
النخاع الشوكي

الفعل انعكاسي:

استجابة سريعة تلقائية من الجسم لا إرادية، (علل):
لأنه حدث من دون تدخل قشرة المخ.

أذكر بعض المراكز العصبية للأفعال الانعكاسية؟

- المادة الرمادية للنخاع الشوكي
- المادة الرمادية للبصلة السيسانية
- المادة الرمادية للحلبة الحلقية
- الحدبات التوعمية الأربع


1- ماذا يسمى قيام الرضيع بمص ثدي أمه عند ملامسته لفمه؟

2- ماذا يسمى تقلص رجل الضفدع عند ملامستها لمحلول حمض الخل ذو تركيز مناسب؟

3- فسر: تعتبر المنعكسات لإرادية؟

4- وما هو مركز معظم المنعكسات؟



5- اذكر أمثلة عن مراكز عصبية لأفعال انعكاسية.



الأقواس الانعكاسية

الاحظ الشكل الآتي الذي يوضح الأقواس الانعكاسية الشوكية وحيدة المشبك وثنائية المشابك.

*** (ارسم)



القوس الانعكاسية ثنائية المشابك	القوس الانعكاسية وحيدة المشبك	
مستقبل حسي	مستقبل حسي	يبدأ بـ:
عصبون حسي	عصبون حسي	عصبون 1
عصبون بيني	-----	عصبون 2
عصبون محرك	عصبون محرك	عصبون 3
عضلة مستجيبة	عضلة مستجيبة	ينتهي بـ:

يمكن أن تحتوي القوس الانعكاسية أكثر من عصبون بيني، فتدعى حينئذ: القوس الانعكاسية عديدة المشابك.

القوس الانعكاسية عديدة المشابك	القوس الانعكاسية ثنائية المشابك	القوس الانعكاسية وحيدة المشبك	
أكثر من عصبون بيني	عصبون بيني واحد (1)	لا يوجد (0)	عدد العصبونات البينية
ملاحظة: عدد العصبونات البينية = عدد المشابك - 1	أقل سرعة من القوس وحيد المشبك	أكثر سرعة	السرعة

- 1- أحدد عناصر القوس الانعكاسية وحيدة المشبك، والقوس الانعكاسية ثنائية المشابك
- 2- أي القوسين يحوي عصبونات بينية؟
- 3- من خلال دراستي السابقة لخصائص المشبك، أقرن بين سرعة السيالة في كل من القوسين وحيدة المشبك وثنائية المشابك وعديدة المشابك.
- 4- ما عدد العصبونات البينية المتوقعة في قوس يحتوي أكثر من مشبكين؟

المنعكس الداغصي (قرع الركبة)**تجربة عملية**

أدوات التجربة:

مطرقة طبية صغيرة - كرسي أو طاولة.

مراحل تنفيذ النشاط:

1- أجلس على الكرسي، (كيف؟)

أضع رجلي اليمنى فوق اليسرى بحيث تكون اليمنى مسترخية.

2- يقوم زميلي بالضرب ضربة خفيفة (أين؟)

على وتر العضلة أسفل عظم الرضفة (الداغصة)،

ماذا الأاحظ؟


- تندفع الساق نحو الأمام.

مراحل حدوث المنعكس الداغصي:**مرحلة 1:** النقر على وتر العضلة رباعية الرؤوس.**مرحلة 2:** تلتقط: المستقبلات الحسية في: العضلة رباعية الرؤوس التنبهات وترسلها عبر: العصبون الحسي إلى: النخاع الشوكي.**مرحلة 3:** يقوم: العصبون الحركي بـ: نقل الأوامر الحركية للعضلة رباعية الرؤوس، بعد: معالجة المعلومات في: النخاع الشوكي.**مرحلة 4:** يقوم: العصبون البييني بـ: تثبيط انتقال السيالة عن طريق: تشكيل IPSP في: العصبون الحركي.**مرحلة 5:** يتم: تثبيط تقلص عضلة الأوتار المأبضية، لتعاكس: بعملها العضلة الرباعية الرؤوس، في: تندفع الساق نحو الأمام.**ما أهمية هذ المنعكس طبييا؟**

يستخدم المنعكس الداغصي لـ:

التأكد من سلامة:

- النخاع الشوكي
- والأعصاب الشوكية.



- 1- كيف يتم تنفيذ فحص المنعكس الداغصي؟ وأين يتم الضرب بالمطرقة؟ وما أهمية هذا المنعكس طبيا؟
- 2- كيف تكون الاستجابة السليمة للمنعكس الداغصي؟
- 3- عدد مراحل حدوث المنعكس الداغصي.
- 4- حدد موقع المستقبل الحسي في المنعكس الداغصي؟ ومع من يتصل هذا المستقبل؟
- 5- ما هي العضلة التي تنقلص لتدفع الساق نحو الأمام؟
- 6- ما هي العضلة التي تنقلص لتعاكس عمل العضلة رباعية الرؤوس ودفع الساق نحو الأمام؟
- 7- ما نوع الكمون المتشكل في العصبون البيني في المنعكس الداغصي؟
- 8- أين تتم معالجة المعلومات الحسية في المنعكس الداغصي؟
- 9- ما هو العصبون الذي ينشط بتأثير الكمون التثبيطي الذي يثيره العصبون البيني؟ وفي أي عضلة ينتهي؟
- 10- كيف تستطيع اختبار سلامة النخاع الشوكي والأعصاب الشوكية؟
- 11- اذكر وظيفة المنعكس الداغصي.

ضعيف

مميزات الفعل المنعكس

يتميز الفعل المنعكس بما يلي:

1- غرضي هادف لـ: إبعاد الأذى عن جسم الكائن الحي غالباً.

2- يتمتع به: **الرتابة**: أي يستجيب بالصورة ذاتها تحت تأثير المنبه ذاته.

3- عرضة للتعب (فسر):
بسبب نفاذ النواقل العصبية من الغشاء قبل المشبكي (فسر):
نتيجة الاستخدام الزائد وعدم وجود آليات سريعة لتعويضها.

4- تترافق المنعكسات أحياناً بإحساسات شعورية؛ (فسر):
لأن قسماً من السيلالات الحسية يصل إلى قشرة المخ.



"Reflexes seem normal. You kept him waiting over two hours."

- 1- ما هي مميزات (خواص) الفعل المنعكس؟
- 2- ما هو الغرض (الهدف) (اذكر وظيفة) المنعكسات.
- 3- ماذا تعني الرتابة في المنعكسات.
- 4- اكتب المصطلح: استجابة المنعكس بالصورة ذاتها تحت تأثير المنبه ذاته.
- 5- فسر: المنعكسات عرضة للتعب.
- 6- فسر: نفاذ النواقل العصبية من الغشاء قبل المشبكي.
- 7- ماذا ينتج عن: الاستخدام الزائد للنواقل العصبية في مشابك المنعكس وعد وجود آلية سريعة لتعويضها؟
- 8- ماذا ينتج عن: نفاذ النواقل العصبية من الغشاء قبل المشبكي في مشابك المنعكس؟
- 9- فسر: تترافق المنعكسات أحياناً بإحساسات شعورية.
- 10- ماذا ينتج عن: وصول قسم من السيلالات الحسية إلى قشرة المخ من القوس الانعكاسية؟

الفعل المنعكس الشرطي

ألاحظ الشكل المجاور الذي يوضح تجربة العالم الروسي: إيفان بافلوف:

الفعل المنعكس الشرطي:

هو تقديم منبه ثانوي محايد (الجرس)، مع منبه أولي طبيعي (اللحم) مرات عدة،

يصبح المنبه الثانوي وحده قادرا على إثارة السلوك والاستجابة التي يثيرها

المنبه الأولي عادة، (فسر):

لأن المخ كون رابطة بين المنبه الثانوي (الشرطي) والاستجابة

وهو نمط من: السلوك المتعلم.

تمت إعادة تجربة بافلوف باستخدام مثيرات مختلفة (بصرية - سمعية - شمية) ..

ما أهمية تجربة بافلوف؟


لقد خرجت تجربة بافلوف بقوانين فسرت:

- جوانب كثيرة من عملية التعلم،
- وتكوين العادات عند الإنسان والحيوان.

**

1


منبه أولي طبيعي



الاستجابة: إفراز اللعاب

2

منبه ثانوي محايد




الاستجابة: لا يوجد، لأن المنبه محايد

3

منبه ثانوي محايد



+



الاستجابة: إفراز اللعاب

منبه أولي طبيعي

4

منبه ثانوي محايد



الاستجابة: قرع الجرس وحده يؤدي إلى إفراز اللعاب

عناصر القوس الانعكاسية الشرطية

لمنعكس إفراز اللعاب (استجابة للمنبه الثانوي الشرطي وهو صوت الجرس)

عناصر القوس الانعكاسية الغريزية

لمنعكس إفراز اللعاب (استجابة للمنبه الأولي الطبيعي وهو اللحم المجفف)

1- صوت الجرس

1- نهايات حسية في اللسان

2- الأذن

2- عصبون حسي جابذ

4- القشرة المخية

3- مركز عصبي في البصلة السيسائية

5- مركز عصبي في البصلة السيسائية

4- عصبون مفرز (نابذ)

6- عصبون مفرز (نابذ)

5- غدد لعابية وإفراز اللعاب

7- غدد لعابية وإفراز اللعاب

تطور الأفعال الشرطية وضعفها:

تتطور الأفعال الشرطية: (كيف): بالاقتران بين المنبه الأولي والثانوي
وتضعف الأفعال الشرطية: (كيف): إذا بقي المنبه الشرطي وحيدا.

أعط أمثلة تطبيقية من حياتك اليومية على الفعل المنعكس الشرطي

1- عندما يعدك والدك بهدية تحبها إذا حققت نتيجة جيدة في صفك، فعندما تحقق النتيجة المطلوبة ويقدم لك الهدية سيدفعك ذلك إلى الاستمرار في التفوق، وإذا لم يقدم لك ما وعدك به ستضعف الديك الدافعية في السنوات التالية.

2- عندما لا يشاهد المدرس الوظيفة لطلابه في المرة الأولى ثم يقول لهم إنه سيشاردها لاحقا وتكرر هذه العملية مرات عدة من دون مشاهدتها فإن أكثر الطلاب اهتماماً ستجده قد أهمل وظيفته.

1- ماذا ينتج عن تقديم منبه أولي (اللحم المجفف) للكلب في المرحلة

1؟ ماذا أسمى هذه الاستجابة؟ ولماذا؟

2- أكمل عناصر الفعل المنعكس الغريزي الآتية:

نهايات حسية في اللسان عصبون << مركز عصبي في

..... << عصبون مفرز <<

غدد لعابية وإفراز اللعاب.

3- لماذا لم يستطع المنبه الثانوي (الجرس) أن يثير الاستجابة

(إفراز اللعاب) في المرحلة 2؟

4- ماذا ينتج عن تلازم المنبهين الثانوي والأولي مرات عدة؟

وكيف أفسر النتيجة؟

ج - يصبح المنبه الثانوي وحده قادرا على إثارة السلوك أو الاستجابة

التي يثيرها المنبه الأولي.

التفسير: لأن المخ كون رابطة بين المنبه الثانوي (الشرطي)

والاستجابة

5- أكمل عناصر الفعل المنعكس الشرطي الآتية:

صوت الجرس << الأذن << << البصلة السيسائية <<

الغدد اللعابية وإفراز اللعاب.

6- ما أهمية تجربة بافلوف؟

7- أعط أمثلة تطبيقية من حياتك اليومية على الفعل المنعكس

الشرطي.

8- ماذا ينتج عن اقتران المنبه الأولي بالثانوي؟

ج - تطور الفعل الشرطي

- 9- ماذا ينتج عن بقاء المنبه الشرطي وحيدا؟
 ج- يضعف الفعل الشرطي
 10- علل: تطور الفعل الشرطي.
 11- علل: ضعف الفعل الشرطي.

التقويم النهائي

أولاً: أرتب عناصر الفعل المنعكس الشرطي في تجربة بافلوف على الكلب.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لما يأتي:

- أ- تترافق المنعكسات الشوكية بإحساسات شعورية.
 ب- للمخ علاقة بالمنعكس الشرطي

حل التقويم النهائي

أولاً: أرتب عناصر قوس الانعكاس الشرطي في تجربة بافلوف على الكلب.
 صوت الجرس - الأذن - القشرة المخية - البصلة السيسائية - الغدد اللعابية وإفراز اللعاب.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لما يأتي:

- أ- تترافق المنعكسات الشوكية بإحساسات شعورية.
 (لأن قسماً من السوائل الحسية يصل إلى قشرة المخ).

ب- للمخ علاقة بالمنعكس الشرطي.

لأن المخ كون رابطة بين المنبه الثانوي (الشرطي) والاستجابة .

الدرس (11): بعض أمراض الجهاز العصبي

داء باركنسون (الشلل الرعاشي)

مرض يصيب: المتقدمين في العمر
نتيجة: تلف الخلايا العصبية في المادة السوداء

(فسر:)

- مع التقدم بالعمر
- أو بسبب نقص بعض المركبات الكيميائية
- أو لسبب وراثي،

يتصف بثلاثة أعراض رئيسة وهي:

- 1- تصلب في العضلات.
- 2- ارتعاش إيقاعي في اليدين
- 3- صعوبة في الحركة.

آلية حدوث المرض:

- خلايا المادة السوداء لجذع الدماغ تفرز الناقل العصبي: الدوبامين إلى: الجسم المخطط والدوبامين: هو مثبط لعصبونات الجسمين المخططين.

- وهناك عصبونات في القشرة المخية

تحرر: الأستيل كولين

إلى: الجسم المخطط

والأستيل كولين: منبه للجهاز العصبي المركزي.

- فموت العصبونات في المادة السوداء

(يؤدي إلى:) نقص الدوبامين

- مما (يؤدي إلى:) زيادة فعالية الجسمين المخططين،

مما (يؤدي إلى:) تقلصات مستمرة في معظم



العضلات الهيكلية للجسم.

العلاج:

يعالج بإعطاء المصاب **طليعة الدوبامين L. Dopa** (فسر:)

الذي: يتحول (أين:) في الدماغ إلى دوبامين

لأن الدوبامين لا يمر من خلال الحاجز الدماغي الدموي



آلية داء باركنسون

المادة السوداء:

خلايا عصبية كبيرة
تقع: في الدماغ المتوسط،
سينوبلازماها غنية بـ: الميلانين،
(وظيفة المادة السوداء):
تفرز: الدوبامين
الذي ينتقل عبر: محاورها
إلى: الجسم المخطط.

- 1- من هم الأكثر عرضة للإصابة بداء باركنسون.
- 2- ما هي أسباب داء باركنسون؟
- 3- علل: تلف المادة السوداء في داء باركنسون.
- 4- ما هي أعراض داء باركنسون؟
- 5- ما آلية داء باركنسون؟
- 6- حدد موقع إفراز الدوبامين الذي يقل إنتاجه في داء باركنسون.
- 7- ما تأثير الدوبامين على الجسم المخطط؟
- 8- ما هو الناقل الذي تحرره العصبونات في قشرة المخ نحو الجسم المخطط؟ وما تأثير هذا الناقل؟
- 9- ما تأثير الأستيل كولين في الجهاز العصبي؟
- 10- ماذا ينتج عن موت العصبونات في المادة السوداء؟
- 11- ماذا ينتج عن نقص الدوبامين من المادة السوداء؟
- 12- ماذا ينتج عن زيادة فعالية الجسمين المخططين؟
- 13- علل: تحدث تقلصات مستمرة في العضلات في داء باركنسون.
- 14- علل: زيادة فعالية الجسمين المخططين في داء باركنسون.
- 15- علل: نقص الدوبامين من المادة السوداء في داء باركنسون.
- 16- كيف يعالج داء باركنسون؟
- 17- علل: يعالج داء باركنسون بطليعة الدوبامين بدلا من الدوبامين؟
- 18- أين تتحول طليعة الدوبامين إلى دوبامين؟
- 19- حدد موقع المادة السوداء.
- 20- مم تألف المادة السوداء؟ وماذا تحوي سيتوبلازماها؟
- 21- ماذا تفرز المادة السوداء؟ وإلى من ترسله؟ وكيف؟

**

مرض ألزهايمر (الخرف المبكر)**مرض:** وراثي غالباً

يصيب: بعض المتقدمين في العمر نحو سن الستين غالباً (شيخوخة مبكرة للدماغ).

الأعراض:

- يعاني المصاب صعوبة في تذكر الأحداث القريبة؛
- فيصبح مرتبكاً كثير النسيان،
- ريثما يحدث فقدان تام للذاكرة (متى؟) في المراحل المتأخرة.

آلية حدوث المرض:

يحدث: نتيجة تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني (الأميلويد) (أين؟): حول العصبونات في: القشرة المخية - والحصين؛

مما يؤدي إلى:

- فقدانها القدرة على التواصل مع العصبونات الأخرى
- وضمورها
- ثم موتها.

1- **اختر:** يعد مرض ألزهايمر:

(مكتسب - مناعي ذاتي - وراثي - رضي)

2- ما هي مؤهبات الإصابة بمرض ألزهايمر؟

(ج) **الوراثة - التقدم بالعمر (ستين سنة غالباً)**

3- في أي عمر يظهر ألزهايمر غالباً؟

4- في سياق أي مرض تحدث الشيخوخة المبكرة للدماغ؟

5- ما هي أعراض مرض ألزهايمر؟

6- متى يحدث فقدان التام للذاكرة في مرض ألزهايمر؟

7- **اختر:** يعاني مريض ألزهايمر صعوبة في تذكر:

(الأحداث البعيدة - الأحداث العاطفية - الأحداث

القريبة)

8- ما آلية مرض ألزهايمر؟


9- ما هو البروتين الذي يتراكم في مرض ألزهايمر؟ وأين؟


10- حدد موقع لويحات بروتين الأميلويد.

11- ماذا ينتج عن تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني

(الأميلويد) حول العصبونات في: القشرة المخية

والحصين؟





**

التصلب اللويحي المتعدد

يظهر المرض (متى؟): بين سن 20 – 40 وهو: تنكس عصبي،

سببية:


- فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطالات،
- وتفككها إلى صفائح متصلبة

نتيجة: مرض مناعي ذاتي كما في الشكل المجاور،

تنتج الأعراض: من زوال غمد النخاعين في مناطق متعددة من المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي.

فيحس المريض: بصدمة كهربائية عند تحريك العنق.

*



1- في أي عمر يظهر التصلب اللويحي المتعدد غالباً؟

2- يصنف التصلب اللويحي كـ: (مرض فيروسي – مرض جرثومي – تنكس عصبي)


3- ما آلية مرض التصلب اللويحي المتعدد؟


4- ماذا ينتج عن: المرض المناعي الذاتي في سياق التصلب اللويحي المتعدد؟

5- ما هي أهم أعراض التصلب اللويحي المتعدد؟

6- **علل:** ظهور أعراض التصلب اللويحي المتعدد؟

7- **ماذا ينتج عن:** زوال غمد النخاعين في مناطق متعددة من المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي؟



مرض الشقيقة (الصداع الوعائي)

(آلية المرض): توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي يؤدي إلى: تنبيه النهايات العصبية في هذا الشريان، وينتج عنها: صداع وحيد الجانب، ويثار بـ:

- عوامل بيئية
- أو نفسية محددة

- 1- ما هي آلية حدوث مرض الشقيقة؟
- 2- ماذا ينتج عن: توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي؟
- 3- ماذا ينتج عن: تنبيه النهايات العصبية في فروع الشريان السباتي؟
- 4- علة: يحدث صداع وحيد الجانب في مرض الصداع الوعائي.
- 5- ما نوع الصداع في مرض الشقيقة؟
- 6- علة: تنبيه النهايات العصبية في فروع الشريان السباتي.
- 7- ما هي أسباب (مؤهبات) أو كيف يثار مرض الشقيقة؟

الصرع

اختلال ناجم عن: نوبات من النشاط الكهربائي الدماغى المشوش، يصحبها:

- حركات تشنجية لا إرادية،
- والسقوط أرضاً،
- وفقدان الوعي (لمدة؟): بضع دقائق

- 1- عن ماذا ينجم الصرع؟
- 2- ماذا ينتج عن حدوث نوبات من النشاط الكهربائي الدماغى المشوش؟
- 3- ما هي الأعراض المصاحبة لنوبة الصرع؟
- 4- في أي مرض تشاهد حركات تشنجية لا إرادية وسقوط على الأرض وفقدان الوعي؟
- 5- كم يدوم فقدان الوعي بعد نوبة الصرع؟

التقويم النهائي**أولا: ماذا ينتج عن:**

- أ- موت عصبونات في المادة السوداء لجذع الدماغ.
- ب- ترسب بروتين الأميلويد حول عصبونات في القشرة المخية.
- ج- فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطالات.

ثانيا: ما سبب الإصابة بمرض الشقيقة؟**ثالثا: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

1. فقدان الوعي والسقوط أرضاً في حالة الصرع.
2. ضمور وموت الخلايا العصبية في المخ في حالة الإصابة بالزهايمر.

ورقة عمل: ورقة عمل

- أبحث أكثر في مصادر التعلم أو مستعينا بمختص عن التهاب السحايا (الأسباب، الأعراض) وأعرضها على زملائي وأناقشهم بها.
- أكتب تقريراً وأعرضه على زملائي وأحتفظ به في ملف إنجازي.

حل التقويم النهائي**أولاً: ماذا ينتج عن:****أ- موت عصبونات في المادة السوداء لجذع الدماغ:**

نقص الدوبامين، وزيادة فعالية الجسمين المخططين، وتقلصات مستمرة في معظم العضلات الهيكلية في الجسم
أو: الإصابة بداء باركنسون.

ب- ترسب بروتين الأميلويد حول عصبونات في القشرة المخية:

فقدانها القدرة على التواصل مع العصبونات الأخرى وضمورها ثم موتها .
أو: الإصابة بمرض الزهايمر.

ج- فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطالات:

زوال غمد النخاعين في مناطق متعددة من المادة البيضاء.
أو: الإصابة بمرض التصلب اللويحي المتعدد.

ثانياً: سبب الإصابة بمرض الشقيقة:

توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي مما يؤدي إلى تنبيه النهايات العصبية في هذا الشريان.

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- 1- بسبب حركات تشنجية لإرادية ناجمة عن موجات من النشاط الكهربائي الدماغى المشوش.
- 2- نتيجة تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني (الأميلويد) حولها.

حل ورقة العمل**مرض التهاب السحايا:****سببه:**

إصابة جرثومية - أو فيروسية لأغشية السحايا.

من أعراضه:

- ارتفاع درجة الحرارة.
 - التقيؤ والغثيان.
 - الصداع الشديد.
 - تصلب العنق وتشنج العضلات.
 - تعب وخمول.
 - فقدان الشهية.
- وإذا ترك هذا المرض دون علاج قد يؤدي لموت المصاب.


قسم المستقبلات الحسية



الدرس(1): مفهوم المستقبلات الحسية

مقدمة

**



تعتمد استمرارية حياة الكائن الحي على:
تفاعله المستمر مع التغيرات التي تطرأ على كل من بيئته الخارجية ووسطه الداخلي؛
فالمستقبلات الحسية تتلقى التنبيهات من:
الوسطين الداخلي والخارجي،
وتحولها إلى: سيالات عصبية
تنتقل عبر الأعصاب إلى:
المراكز العصبية المختصة؛ (ما وظيفتها؟)
التي تعالج المعلومات الواردة إليها بهدف تحقيق الاستجابة الملائمة.

يُظهر الشكل الآتي المستقبلات الحسية المحيطة، وعلاقتها بالمراكز العصبية المختصة في الدماغ.

العضو	الحاسة	المركز في القشرة المخية
العين	الإبصار	الفص القفوي
الأذن	السمع	الفص الصدغي
الأنف	الشم	الفص الصدغي
الجلد	الإحساسات العامة (كاللمس)	الفص الجداري (خلف شق رولاندو مباشرة)
اللسان	الذوق	الفص الجداري

- 1- على ماذا تعتمد استمرارية الكائن الحي؟
- 2- من أين تتلقى المستقبلات الحسية التنبيهات؟
- 3- إلى ماذا تتحول التنبيهات بعد استقبالها من قبل المستقبلات الحسية؟
- 4- أين تنتقل السيالات الحسية في المرحلة الأخيرة؟
- 5- اذكر وظيفة المراكز العصبية بشكل عام؟
- 6- حدد موقع مركز حس الرؤية - حس السمع - الإحساسات العامة - حس الذوق - حس الشم في القشرة المخية.

المستقبل الحسي

المستقبل الحسي يعمل ك: محول بيولوجي

(فسر:)

لأنه يحول: طاقة المنبه

إلى: سيالة عصبية (كمون عمل)

تولد إحساس خاص في المركز العصبي المختص.

تغير شدة المنبه (يؤدي إلى:)

تغير شدة الإحساس.

تتميز المستقبلات الحسية بـ: النوعية


(فسر:)

لأنه تكيف كل نوع منها لاستقبال منبه نوعي خاص.

ما نوع طاقة المنبه التي تستجيب لها كل من



المستقبلات الحسية السابقة؟

نوع الطاقة	نوع المستقبل
الحرارية - الآلية	الجلد
الكيميائية	اللسان
الكيميائية	الأنف
الأمواج الضوئية	العين
الأمواج الصوتية	الأذن



- 1- المستقبل الحسي يعمل ك.....
- 2- فسر: يعمل المستقبل الحسي كمحول بيولوجي؟
- 3- اذكر وظيفة السيالة العصبية الصادرة عن المستقبلات الحسية؟
- 4- ماذا ينتج عن تغير شدة المنبه في المستقبل الحسي؟
- 5- فسر تغير شدة الإحساس في المستقبل الحسي.
- 6- فسر: نوعية المستقبل الحسي؟
- 7- ما نوع الطاقة التي يستقبلها المستقبل في (الجلد - اللسان - الأنف - العين - الأذن) وإلى ماذا تتحول؟

*** (ارسم)



تصنيف المستقبلات الحسية

مفهوم المستقبلات الحسية:

خلايا حسية (وظيفتها):
تخصصت لاستقبال المنبهات الداخلية أو الخارجية،
وتحويل طاقتها إلى: كمونات عمل
تنتقل على شكل: سيالة عصبية
إلى: المراكز العصبية المختصة.

المستقبلات الأولية:

خلايا: عصبية جابذة
من منشأ: عصبي
أداة الحس فيها: نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين.

المستقبلات الثانوية:



خلايا: حسية مهدبة
من منشأ: غير عصبي
(وظيفتها): تكيفت لاستقبال التنبيه، ونقل الاستجابة الناتجة
إلى: الاستطالة الهيولية لعصبون حسي (جابذ)
عبر: مشبك يوجد بينهما.

تصنيف أنواع المستقبلات الحسية بحسب منشئها:


المنشأ	المستقبل الأولي	المستقبل الثانوي
عصبي	غير عصبي	
أداة الحس	نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من غمد النخاعين	أهداب الخلية الحسية
وجود مشبك	لا يوجد مشبك	يوجد مشبك

- 1- من أين تتلقى المستقبلات الحسية المنبهات؟
- 2- إلى ماذا تتحول طاقة المنبه عبر المستقبل الحسي؟
- 3- أين تنتهي السيالة العصبية؟
- 4- قارن بين المستقبلات الأولية والثانوية من حيث المنشأ
- أداة الحس - وجود مشبك.
- 5- اذكر وظيفة المستقبلات (بشكل عام).
- 6- اذكر وظيفة المستقبلات الثانوية.


مراحل عمل المستقبل الحسي



5- الإدراك الحسي



4- النقل



3- التحويل الحسي



2- الاستقبال

1- منبه نوعي كافي

1- منبه نوعي كافي (نوعي) + (كافي)

2- الاستقبال:

فتح أو إغلاق: بوابات القنوات الشاردية في: غشاء الخلية الحسية.

3- التحويل الحسي:

تتغير نفاذية الغشاء للشوارد، مما يؤدي إلى: تبدل استقطاب غشاء الخلية الحسية، يسمى هذا التبدل: **كمون المستقبل**.

4- النقل:

تزداد قيمة كمون المستقبل إلى: الحد الذي يكفي لإثارة كمونات عمل **تنتقل**: بشكل سيالات عصبية إلى: المركز العصبي.


5- الإدراك الحسي:

يقوم المركز العصبي بـ: معالجة المعلومات الواردة **مولداً**: إدراكاً حسيّاً للمنبه.


- 1- رتب بدقة مراحل عمل المستقبل الحسي.
- 2- ما هما صفتا المنبه اللازمتان لحدوث التنبيه؟
- 3- كيف يستقبل المستقبل المنبه؟
- 4- ما هو كمون المستقبل؟
- 5- متى يثير كمون المستقبل كمون العمل؟
- 6- ما وظيفة المركز العصبي في الحس؟

العلاقة بين شدة المنبه وشدة الإحساس

من خلال ملاحظة المخطط الآتي أستنتج العلاقة بين شدة المنبه وشدة الإحساس:



- 1- كيف تؤدي زيادة شدة المنبه إلى زيادة شدة الإحساس؟
- 2- ماذا ينتج عن زيادة شدة المنبه؟
- 3- ماذا ينتج عن زيادة قيمة كمون المستقبل؟
- 4- ماذا ينتج عن زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها كمون المستقبل؟
- 5- ماذا ينتج عن زيادة عدد الخلايا الحسية المنبهة؟
- 6- فسر: ازدياد شدة الإحساس بزيادة شدة المنبه.
- 7- فسر: زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها كمون المستقبل.



التقويم النهائي

أولاً:

أين ينشأ كمنون المستقبل؟ وماذا ينتج عن زيادة قيمته؟

ثانياً:

أرتب مراحل عمل الخلية الحسية.

ثالثاً:

أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. تعد المستقبلات الحسية محولات بيولوجية نوعية.
2. تزداد شدة الإحساس بزيادة شدة التنبيه.

رابعاً:

أقارن بين المستقبلات ذات المنشأ العصبي والمستقبلات ذات المنشأ غير العصبي من حيث:
وجود المشبك - أداة الحس

حازم ضعيف

حل التقويم النهائي**أولاً :**

ينشأ كمن المستقبل في: **غشاء الخلية الحسية.**
وينشأ عن زيادة قيمته: **زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها.**

ثانياً :**أرتب مراحل عمل الخلية الحسية.**

- 1-**الاستقبال:** يسبب المنبه النوعي الكافي فتح أو إغلاق بوابات القنوات الشاردية في غشاء الخلية الحسية.
- 2-**التحويل الحسي:** تتغير نفاذية الغشاء للشوارد مما يؤدي إلى تبدل استقطاب غشاء الخلية الحسية، يسمى هذا التبدل كمن المستقبل
- 3-**النقل:** تزداد قيمة كمن المستقبل إلى الحد الذي يكفي لإثارة كمونات عمل تنتقل بشكل سيالات عصبية إلى المركز العصبي.
- 4-**الإدراك الحسي:** يقوم المركز العصبي بمعالجة المعلومات الواردة مؤدداً إدراكاً حسياً للمنبه.

ثالثاً:**أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**


- 1-لأنها تحول طاقة المنبه إلى سيالات عصبية تولد إحساساً خاصاً في المركز العصبي المختص .
- 2-بسبب زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها كمن المستقبل و زيادة عدد الخلايا الحسية المنبهة.

رابعاً:

قارن بين: المستقبلات ذات المنشأ العصبي - و المستقبلات ذات المنشأ غير العصبي
من حيث : وجود المشبك – أداة الحس.

وجه المقارنة	المستقبلات ذات المنشأ العصبي	المستقبلات ذات المنشأ غير العصبي
وجود المشبك	لا يوجد	يوجد
أداة الحس	نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين	أهداب الخلية الحسية

الدرس(2): المستقبلات الحسية في الجلد



مراجعة عن الجلد (ليست من الكتاب) (الفهم)

يتألف الجلد من 3 طبقات:

1- البشرة:

وتقسم بدورها إلى:

أ- طبقة متقرنة

ب- طبقة مولدة

2- الأدمة


3- نسيج دهني تحت الجلد

المستقبلات الحسية في الجلد

ما سبب الحس الشعوري المتولد في قشرة المخ لدي عندما ألمس جسماً ما، وأحدد طبيعته (ساخن، بارد، ناعم، خشن)؟
 وجود مستقبلات حسية مختلفة في الجلد.

أدرس الشكل الآتي الذي يمثل مقطعاً في الجلد، ويتضمن المستقبلات الحسية التي تصنف إلى:

- مستقبلات آلية : (لمس - ضغط)
- ومستقبلات حرارية (سخونة - برودة)
- ومستقبلات الألم



المستقبل	وظيفته	مكان وجوده (الموقع)
جسيمات مايسنر	مستقبلات: للمس الدقيق	- في المناطق السطحية من أدمة الجلد، - وتغزر في رؤوس الأصابع، والشفاه، وراحة اليد.
جسيمات باشيني	مستقبلات: آلية لـ الضغط والاهتزاز	في المناطق العميقة من أدمة الجلد.
جسيمات روفيني	مستقبلات: - تحدد جهة التنبيه. - لها الدور في حس الـ السخونة. - وله دور كمستقبل للضغط.	- في أدمة الجلد - وفي المفاصل.
جسيمات كراوس	مستقبلات: للبرودة	- في أدمة الجلد - وتغزر في أسفل القدمين.
أقراص ميركل	مستقبل: ألي لـ اللمس. يتنبه بـ: المنبهات العمودية على سطح الجلد، والتي تغير من شكل هذا السطح.	(الموقع): تلامس السطح الداخلي للطبقة المولدة في بشرة الجلد؛ (بنية): نهايات استطالات هيولية متوسعة، لخلايا عصبية حسية، وتعلوها خلايا ميركل.
نهايات عصبية حرة مجردة من النخاعين	مستقبلات: للمس - والحرارة - و الألم تتنبه بحركة الأشعار	في بشرة الجلد في جذر الشعرة

تلخيص:

- الضغط: جسيمات باشيني - جسيمات روفيني
- الاهتزاز: جسيمات باشيني
- تحديد جهة التنبيه: جسيمات روفيني.
- الألم: النهايات العصبية الحرة.
- اللمس: جسيمات مايسنر (لمس دقيق) - أقراص ميركل (منبهات عمودية) - النهايات العصبية الحرة.
- الحرارة: تشمل:
- أ- السخونة: جسيمات روفيني - النهايات العصبية الحرة.
- ب- البرودة: جسيمات كراوس.

- 1- ما وظيفة (جسيمات مايسنر - جسيمات باشيني - جسيمات روفيني - جسيمات كراوس - أقراص ميركل - النهايات العصبية الحرة في البشرة - النهايات العصبية الحرة في جذر الشعرة).
- 2- حدد بدقة موقع (جسيمات مايسنر - جسيمات باشيني - جسيمات روفيني - جسيمات كراوس - أقراص ميركل - النهايات العصبية الحرة).
- 3- ما هي بنية قرص ميركل = مم تتألف أقراص ميركل؟
- 4- حدد بدقة موقع خلايا ميركل.
- 5- ما هي أنواع المستقبلات الحسية في الجلد؟
- 6- ماهي المستقبلات المسؤولة عن حس الحرارة بنوعها؟

تصنيف المستقبلات الآلية والحرارية

أصنف المستقبلات الآلية والحرارية في الجلد بحسب بنيتها إلى:

- مستقبلات محفظية:

يتكون المستقبل المحفظي من:
نهاية عصبية مجردة من غمد النخاعين.
تحيط بها: محفظة.
وتتميز: بعتبة تنبيه منخفضة.

المحفظة تأخذ شكلاً ملائماً للاستجابة المثلى بحسب: طبيعة المنبه.


- مستقبلات غير محفظية:

يتكون المستقبل المحفظي من:
تفرعات لنهايات عصبية حرة مجردة من غمد النخاعين.
وتتميز: بعتبة تنبيه مرتفعة.
تستجيب ل: المنبهات المختلفة التي تبلغ شدتها حداً يسبب أذية في النسج؛ فتولد: حس الألم.

مستقبلات محفظية	مستقبلات غير محفظية	
نهاية عصبية مجردة من غمد النخاعين. تحيط بها: محفظة	تفرعات لنهايات عصبية حرة مجردة من غمد النخاعين	البنية
منخفضة	مرتفعة	عتبة التنبيه
مرتفعة	منخفضة	قابلية التنبيه
- جسيم باشيني. - جسيم كراوس.	النهايات العصبية الحرة.	مثال

أمسك قطعة من الجليد بيدي؛ فأشعر بالبرودة أولاً، ثم بالألم بعد مدة زمنية، ما تفسير ذلك؟
لأن مستقبلات البرودة (جسيمات كراوس) تتميز بعتبة تنبيه منخفضة بينما تتميز مستقبلات الألم بعتبة تنبيه مرتفعة.


فسر: تكون عتبة تنبيه جسيمات كراوس منخفضة بينما عتبة تنبيه مستقبلات الألم مرتفعة.
لأن جسيمات كراوس محفظية بينما مستقبلات الألم غير محفظية.

مستقبلات غير محفظية

النهايات العصبية الحرة

مستقبلات محفظية

جسيم باشيني



جسيم كراوس

- 1- ما أنواع المستقبلات حسب بنيتها؟
- 2- قارن بين المستقبلات المحفظية والمستقبلات غير المحفظية من حيث البنية - عتبة التنبيه - قابلية التنبيه.
- 3- كيف تستجيب المستقبلات غير المحفظية؟ وماذا تستقبل؟
- 4- علام يعتمد شكل محفظة المستقبلات المحفظية.
- 5- فسر: يختلف شكل المحفظة بين المستقبلات المحفظية.
- 6- أمسك قطعة من الجليد بيدي؛ فأشعر بالبرودة أولاً، ثم بالألم بعد مدة زمنية، ما تفسير ذلك؟
- 7- فسر: تكون عتبة تنبيه جسيمات كراوس منخفضة بينما عتبة تنبيه مستقبلات الألم مرتفعة.

التخدير الموضعي**إضاعة طبيّة:**

التخدير الموضعي يستخدم في:

بعض العمليات الجراحية البسيطة

يستهدف:

النهايات العصبية الحرة في بشرة الجلد


المسؤولة عن: استقبال حسّ الألم.

عمل المخدر:

يعطل انفتاح قنوات الصوديوم في غشاء النهايات العصبية الحرة.

(تعطيل الانفتاح يؤدي إلى:)

عدم تشكل كمونات عمل في المنطقة المخدرة.



آلية عمل المخدر النوعي

1- متى يستخدم التخدير الموضعي؟

2- حدد موقع عمل المخدر الموضعي = ماذا

يستهدف التخدير الموضعي؟

3- ما آلية عمل المخدر الموضعي؟

4- ماذا ينتج عن استهداف النهايات العصبية

الحرة بالمخدر؟

5- ماذا ينتج عن تعطيل انفتاح قنوات الصوديوم



في غشاء النهايات العصبية الحرة؟

6- فسر: عدم تشكل كمونات عمل في غشاء


النهايات الحرة بعد تخديرها موضعياً.

ضعيف

المسالك الحسية

حس اللمس - الدقيق	حس الحرارة - الألم	الإحساس
		<p>يتصالب مسلك حس الألم - والحرارة في النخاع الشوكي</p>
<ul style="list-style-type: none"> - اللمس الدقيق: جسيمات ميسنر. - الاهتزاز: جسيمات باشيني. 	<ul style="list-style-type: none"> - جسيمات روفيني. - النهايات العصبية الحرة. 	المستقبل الحسي
البصلة السيسانية	النخاع الشوكي	مكان التصالب
<p>1- قارن بين حس الألم - حس الحرارة - حس اللمس الدقيق - حس الاهتزاز، من حيث: المستقبل الحسي - مكان التصالب.</p>		

*** (ارسم)



جسيم باشيني

ألاحظ الشكل المجاور، وأستنتج بنية جسيم باشيني.

بنيته:

1 - استطالة هيولية ثخينة مغمدة بالناخاعين
نهايتها الطرفية مجردة من الغمد.

2- محفظة:

تتألف من: خلايا ضامة تشكل صفائح،
ويوجد في سوية المحفظة: اختناق رانفييه واحدة على الأقل.وظيفته: مستقبل آلي لـ الضغط - والاهتزاز
موقعه: في المناطق العميقة من أدمة الجلد.فسر: السرعة العالية للسيالة العصبية الناتجة عن تنبيه
جسيم باشيني.
لأن الليف العصبي الذي يدخل إلى المحفظة ثخين ومغمد
بالناخاعين.

1- مم يتألف = ما بنية جسيم باشيني؟

2- مم تتألف = ما بنية محفظة جسيم باشيني؟

3- حدد بدقة موقع جسيم باشيني.

4- اذكر وظيفة جسيم باشيني.

5- كم عدد اختناقات رانفييه في سوية محفظة جسيم
باشيني؟6- كيف تكون نهاية الاستطالة الهيولية في جسيم
باشيني؟7- فسر: السرعة العالية للسيالة العصبية الناتجة
عن تنبيه جسيم باشيني.

التقويم النهائي**أولاً: أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:****1. تعد إحدى العبارات الآتية من وظائف جسيمات كراوس:**

- أ- مستقبل للضغط ب- تحديد جهة التنبيه ج- مستقبل للسخونة د- مستقبل للسخونة

2. مناطق تغزر فيها جسيمات مايسنر:

- أ- أسفل القدمين ب- المرفق ج- رؤوس الأصابع د- الركبة.


3. يعد جسيم باشيني مستقبلاً حسيّاً:

- أ- للضغط. ب- للحرارة ج- للبرودة د- للألم.

4. أحد هذه المستقبلات الآتية ليس له علاقة بالحرارة:

- أ- نهايات عصبية حرة في البشرة ب- أقرص ميركل ج- جسيم كراوس د- جسيم روفيني


ثانياً: يمثل الشكل الآتي شكلاً تخطيطياً يوضح بنية جسيم باشيني، أضع المسمى الصحيح المناسب لكل من البنى المشار إليها بالأرقام:

**ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

1. أكثر مناطق الجسم حساسية للبرودة أسفل القدمين.
2. توصف الحساسية الجلدية بأنها نقطية.
3. لمستقبلات الألم دور مهم في حماية الجسم من الأذى.
4. السرعة العالية للسائلة العصبية الناتجة عن تنبيه جسيم باشيني.

حل التقويم النهائي**أولاً- أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:**

- 1-تعد إحدى العبارات الآتية من وظائف جسيمات كراوس: ج- مستقبل للبرودة.
- 2-مناطق تغزر فيها جسيمات مايسنر: ج- رؤوس الأصابع.
- 3-يعد جسيم باشيني مستقبلاً حسيّاً : أ- للضغط.
- 4-أحد هذه المستقبلات الآتية ليس له علاقة بالحرارة : ب- أقراص ميركل.




ثانياً- يمثل الشكل الآتي شكلاً تخطيطياً يوضح بنية جسيم باشيني أضع المسمى الصحيح المناسب لكل من البنى المشار إليها بالأرقام:

- 1-استطالة هيولية ثخينة مغمدة.
- 2-اختناق رانفييه الأول أو عقدة رانفييه الأولى.
- 3-نهاية عصبية مجردة من النخاعين.
- 4-خلايا ضامة
- 5-صفائح

ثالثاً- أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- 1- أكثر مناطق الجسم حساسية للبرودة أسفل القدمين. (بسبب غزارة جسيمات كراوس فيها).
- 2- توصف الحساسية الجلدية بأنها نقطي . (لأن المستقبلات الحسية تتوزع بشكل غير متجانس في الجلد).
- 3- لمستقبلات الألم دور مهم في حماية الجسم من الأذى. (لأنها تستجيب للمنبهات التي تبلغ شدتها حدّاً يسبب أذية في النسيج فيتولد حس الألم).
- 4- السرعة العالية للسيالة العصبية الناتجة عن تنبيه جسيم باشيني. (لأن الليف العصبي الذي يدخل إلى المحفظة تخين ومغمد بالنخاعين).

الدرس (3): المستقبلات الكيميائية



-12

المستقبلات الشمية (خلايا شولتز)

ما الذي يجب أن أفعله حتى أميز رائحة زهرة؟
أقوم باستنشاق الهواء قريباً من الزهرة .
وكيف أتجنب شم رائحة كريهة ؟
أتجنب استنشاق الهواء أو أستخدم ملطفاً للجو.

المستقبلات الشمية (خلايا شولتز):

خلايا حسية شممية، عددها: نحو 20 - 10 مليون خلية.
الخلايا الحسية الشممية
(تقع: في البطانة الشممية.
نوعها من حيث الشكل: عصبونات ثنائية القطب.
وتعد: مستقبلات أولية (فسر: لأنها من منشأ عصبي
وظيفتها: الاستقبال الشمي

يوجد لكل خلية:

- استطالة هيولية تنتهي بـ:
تغصنات تسمى **بروزات هيدبية** أو **أهداب**
(الموقع؟) **تنغرس في:** المادة المخاطية التي
تفرزها: "**غدد بومان**"
- ومحاور ينتهي في: **الفص الشمي**، ويشكل **مشابك**
مع: الاستطالات الهيولية لـ: **خلايا التاجية**
ضمن: **بنية تسمى الكبيبة**

يوجد نوعان من الخلايا
تقع: إلى جوار الخلايا الحسية الشممية:
هي:

الخلايا الاستنادية (الداعمة)

(تقع: إلى جوار الخلايا الحسية الشممية.

الخلايا القاعدية (الجدعية)

(تقع: إلى جوار الخلايا الحسية الشممية.
(وظيفتها: تقوم بتعويض الخلايا الحسية الشممية
باستمرار.
(فسر: لأن عمر الخلايا الحسية الشممية قصير.

الغدد المخاطية (غدد بومان)

توجد في: **البطانة الشممية**
(وظيفتها: تفرز المادة المخاطية

الخلايا التاجية:

(تقع: في الفص الشمي
وظيفةها: تشكل محاورها ألياف العصب الشمي
ونوعها من حيث الشكل: متعددة الأقطاب.

- 1- أين توجد الخلايا الحسية الشمية؟ وما نوعها من حيث الشكل؟ ولماذا تعد مستقبلات أولية؟
- 2- ما نوعا الخلايا التي توجد إلى جوار الخلايا الحسية الشمية؟
- 3- ما أهمية وجود الغدد المخاطية (غدد بومان) في البطانة الشمية؟
- 4- ما الخلايا التي تشكل محاورها ألياف العصب الشمي؟ ما نوعها من حيث الشكل؟ وأين توجد؟
- 5- حدد بدقة موقع خلايا شولتز = حدد موقع الخلايا الشمية.
- 6- كم عدد الخلايا الشمية في البطانة الشمية؟
- 7- حدد موقع الأهداب الشمية.
- 8- بماذا تنتهي الاستطالات الهيولية للخلايا الشمية؟
- 9- بماذا ينتهي محوار الخلايا الشمية؟ ومع من يشكل مشابه؟
- 10- حدد موقع الكبيبة.
- 11- اذكر وظيفة الكبيبة.
- 12- حدد موقع الخلايا القاعدية والخلايا الداعمة في البطانة الشمية.
- 13- اذكر وظيفة الخلايا القاعدية في البطانة الشمية.
- 14- فسر: تتعوض الخلايا الشمية باستمرار.
- 15- حدد موقع غدد بومان.
- 16- اذكر وظيفة غدد بومان.
- 17- حدد موقع الخلايا التاجية.
- 18- اذكر وظيفة الخلايا التاجية.
- 19- ما نوع الخلايا التاجية من حيث الشكل.
- 20- قارن بين الخلايا الشمية والخلايا التاجية من حيث الموقع والشكل والوظيفة.

الخلايا التاجية	الخلايا الشمية	
في الفص الشمي	في البطانة الشمية	الموقع
متعددة الأقطاب	ثنائية القطب	الشكل
تشكل محاورها ألياف العصب الشمي	الاستقبال الشمي	الوظيفة

آلية الاستقبال الشمي

ارتباط: جزيئات المادة الكيميائية

مع: **المستقبلات**

الموجودة في: أغشية الأهداب .

ينتج عنه

تنشيط بروتين G

وظيفته

ينشط أنزيم أدنينيل سيكلاز

وظيفته

يحول: المركب (ATP)

إلى: أدنينوزين أحادي الفوسفات الحلقي cAMP

وظيفته

ارتباط مركب cAMP بقنوات الصوديوم في أغشية خلايا شولتز.

ينتج عنه

تفتح قنوات الصوديوم في الغشاء

ينتج عنه

تدخل شوارد الصوديوم إلى الخلية

ينتج عنه

زوال استقطاب الغشاء وتشكيل كمون المستقبل

ينتج عنه

إثارة كمون عمل في محور الخلية الشمية

ينتقل كمون العمل

عبر: المشابك



إلى: الخلية التاجية

ينتج عنه

تتكون سيالة عصبية

تنتقل عبر: ألياف العصب الشمي

إلى: مراكز الإحساس الشمي



(خلية شمية ← خلية تاجية ← مركز الشم)

1- ماذا ينتج عن: ارتباط جزيئات المادة ذات الرائحة مع مستقبلاتها.

2- اذكر وظيفة بروتين G

3- اذكر وظيفة أنزيم أدنينيل سيكلاز.

4- اذكر وظيفة cAMP

5- ماذا ينتج عن: ارتباط cAMP مع قنوات الصوديوم.

- 6- ماذا ينتج عن: دخول شوارد الصوديوم إلى الخلية الشمية.
- 7- ماذا ينتج عن: تشكل كمون المستقبل في غشاء الخلية الشمية؟
- 8- مع من تتشابه الخلايا الشمية؟ وأين؟
- 9- كيف تصل السيالة العصبية إلى مراكز الإحساس الشمي؟
- 10- فسر: تنشيط بروتين G
- 11- فسر: تنشيط أنزيم أدينيل سيكلاز.
- 12- فسر: يتحول ATP إلى cAMP
- 13- فسر: انفتاح قنوات الصوديوم في غشاء الخلية الشمية.
- 14- فسر: يتشكل كمون مستقبل في غشاء الخلية الشمية.
- 15- فسر: تتكون سيالة عصبية في الخلية الشمية.
- 16- ما هو مسار السيالة العصبية في مسلك الإحساس الشمي؟
- 17- رتب بدقة مراحل الاستقبال الحسي الشمي.



ظاهرة الحجب الشمي

عندما تؤثر مادتان منحلّتان في البطانة الشمية؛
فإن المادة: الأشد تأثيراً

توقف الإحساس الشمي

لـ: لمادة الأخرى،

تسمى هذه الظاهرة: **الحجب الشمي**

التي يستفاد منها: في صناعة ملطفات الجو

- 1- فسر: حدوث ظاهرة الحجب الشمي.
- 2- ماذا يستفاد عملياً من ظاهرة الحجب الشمي.
- 3- ماذا ينتج عن: تأثير مادتين منحلّتين في البطانة الشمية إحداهما أشد تأثيراً من الأخرى؟
- 4- فسر: عندما تؤثر مادتان منحلّتان في البطانة الشمية؛ فإن المادة الأشد تأثيراً توقف الإحساس الشمي للمادة الأخرى.
- 5- ما هو مبدأ عمل ملطفات الجو؟

المستقبلات الذوقية

عندما أتناول أنواع الأطعمة المختلفة أتمكن من تمييز مذاق كل منها.

**ما الخلايا الحسية التي استقبلت التنبية؟
الخلايا الحسية الذوقية**

الخلايا الذوقية

هي مستقبلات ثانوية (فسر:) لأنها من منشأ غير عصبي.

لها أهداب تبرز من: سم البرعم الذوقي

الخلايا الحسية الذوقية تتوضع في:

بني تسمى **البراعم الذوقية**،

البراعم الذوقية توجد:

- ضمن بروزات (تقع:) على السطح العلوي للسان

تسمى: **الحليمات اللسانية**

- كما يوجد براعم ذوقية خارج الحليمات في البلعوم.

البرعم الذوقي:

يحتوي البرعم الذوقي 40 إلى 100 خلية حسية ذوقية


الخلايا القاعدية في البرعم الذوقي؛ تنقسم فتعطي:

خلايا انتقالية تقوم بدورها **كخلايا استنادية** قبل أن تتحول

إلى:

خلايا حسية ذوقية

فسر: لأن عمر الخلايا الحسية الذوقية قصير (10 أيام فقط).



(ارسم)

1- فسر: تعد الخلايا الذوقية مستقبلات ثانوية.

2- حدد موقع الخلايا الحسية الذوقية.

3- حدد موقع البراعم الذوقية.

4- حدد موقع الحليمات اللسانية

5- كم عدد الخلايا الذوقية في كل برعم ذوقي؟

6- ما هي الخلايا الموجودة في البرعم الذوقي؟

7- ما هي بنية البرعم الذوقي؟

8- اذكر وظيفة الخلايا القاعدية في البرعم الذوقي.

9- اذكر وظيفة الخلايا الاستنادية في البرعم الذوقي.

ج9 - مرحلة مؤقتة تنتج عن انقسام الخلايا

القاعدية قبل تحولها لخلايا حسية ذوقية.


10- فسر: تتعوض الخلايا الحسية الذوقية باستمرار

من قبل الخلايا القاعدية والخلايا الاستنادية.


آلية عمل المستقبلات الذوقية


قنوات المالح والحامض:

قنوات: (المالح - والحامض)



مستقبلات: (الحلو - والمر)





إن دخول:

- شوارد الصوديوم Na^+ للمحاليل الملحية.
- أو شوارد الهيدروجين H^+ للمحاليل الحمضية.

عن طريق: الانتشار

إلى: داخل الخلية الحسية الذوقية.

يؤدي إلى:

زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية الذوقية.

ترتبط المادة ذات الطعم الحلو أو المر بـ: مستقبل نوعي موجود في: غشاء أهداب الخلية الذوقية.

مما يؤدي إلى:

تنشيط بروتين G مرتبط بالمستقبل

مما يسبب:


زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية الذوقية.

في كلا الحالتين:

زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية الذوقية

يحفز على:

تحرير النواقل العصبية الكيميائية وإثارة كمن عمل في: بدايات الأعصاب القحفية الذوقية التي: تنقلها على شكل سيالة عصبية إلى: المركز العصبي المختص.



أضع فرضية :

عندما أتذوق رشفة من عصير الليمون المحلى بالسكر، ما العوامل المسببة لزوال استقطاب غشاء الخلية الحسية؟

- دخول شوارد الهيدروجين الحمضية عبر الغشاء.
- ارتباط جزيئات السكر بالمستقبل في غشاء الخلية الحسية.

- 1- (راجع أسئلة فقرة آلية عمل المستقبلات الشمية).
- 2- حدد موقع المستقبل النوعي للمادة ذات الطعم الحلو أو المر.
- 3- حدد موقع البروتين G
- 4- ما آلية دخول شوارد الصوديوم والهيدروجين لداخل قنوات الطعم المالح والحامض؟
- 5- ماذا ينتج عن: انتشار شوارد الصوديوم والهيدروجين إلى داخل الخلية الحسية الذوقية؟
- 6- فسر: زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية الذوقية عند تناول الطعام المر والحلو.
- 7- فسر: زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية الذوقية عند تناول الطعام الحامض والحلو.
- 8- ماذا ينتج عن: زوال استقطاب الخلية الحسية الذوقية؟
- 9- حدد موقع تشكل كيون العمل في النقل الحسي الذوقي.
- 10- رتب بدقة مراحل استقبال حس التذوق في كل من الطعمين المر والحلو والطعمين المالح والحامض.


حازم ضعيف

المستقبلات الذوقية للماء

عند شرب الماء

↓
تتنبيه: مستقبلات ذوقية (موقعها): في البلعوم.↓
وترسل السيالات العصبية
إلى: الوطاء↓
الذي: ينظم توازن الماء في الجسم
(كيف؟) عن طريق: إفراز **الحاثة المضادة****للإبالة ADH**

- 1- حدد موقع المستقبلات الذوقية للماء.
- 2- ماذا ينتج عن تنبيه المستقبلات الذوقية للماء في البلعوم.
- 3- فسر: ينظم الوطاء توازن الماء في الجسم.
- 4- اذكر وظيفة الحاثة المضادة للإبالة ADH
- 5- حدد موقع إفراز الـ ADH

**النكهة**


اجتماع:

الإحساس الشمي
مع الإحساس الذوقي
لمادة ما

يؤدي إلى:

ما يسمى **النكهة**.

- 1- فسر: الإحساس بنكهة الطعام.
- 2- ماذا ينتج عن اجتماع الإحساس الشمي مع الإحساس الذوقي لمادة ما؟



التقويم النهائي**أولاً: أكتب المصطلح الموافق لكل مما يأتي:**

1. عدد مخاطية تنتشر بين الخلايا الحسية الشمية، تفرز المادة المخاطية(.....) .
2. خلايا عصبية توجد في الفص الشمي، وتشكل أليافها العصب الشمي(.....) .
3. بنية في الفص الشمي تتصل فيها الخلايا الحسية الشمية مع الخلايا التاجية عبر المشابك(.....) .
4. خلايا في البرعم الذوقي تنشأ من الخلايا القاعدية، تتحول إلى خلايا حسية ذوقية(.....) .

ثانياً: ماذا ينتج من كل مما يأتي؟

1. دخول شوارد الهيدروجين الحمضية إلى الخلية الحسية الذوقية.
2. ارتباط جزيء الغلوكوز بمستقبله في أغشية أهداب الخلية الحسية الذوقية.
3. ارتباط مركب cAMP بقنوات الصوديوم الموجودة في أغشية أهداب الخلية الحسية الشمية.

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. تعد المستقبلات الحسية الشمية مستقبلات أولية.
2. تعد المستقبلات الحسية الذوقية مستقبلات ثانوية.
3. ضرورة الاستنشاق للإحساس الشمي بالرائحة.

رابعاً: تستخدم مواد كيميائية صناعية مثل:

السكرين والأسبارتام كبديل عن السكر لدى مرضى السكري، ما آلية عمل تلك المواد في إثارة الإحساس بالطعم الحلو لدى هؤلاء المرضى؟

ورقة عمل: عمل

- تناولت الأطعمة الآتية (ليمون، قطعة حلوى، شوكولا داكنة خالية من السكر، حفنة من الموالح).
1. أصنف المواد السابقة من حيث سرعة استجابة المستقبلات الذوقية لها.
 2. لماذا تختلف استجابة المستقبلات لهذه الأطعمة ، وما الأهمية الصحية في ذلك؟

حل التقويم النهائي

أولاً - أكتب المصطلح الموافق لكل مما يأتي:

- 1- غدد مخاطية تنتشر بين الخلايا الحسية الشمية تفرز المادة المخاطية . (غدد بومان)
- 2- خلايا عصبية توجد في الفص الشمي و تشكل أليافها العصب الشمي . (التاجية)
- 3- بنية في الفص الشمي تتصل فيها الخلايا الحسية الشمية مع الخلايا التاجية عبر المشابك. (الكبيبة)
- 4- خلايا في البرعم الذوقي تنشأ من الخلايا القاعدية تتحول إلى خلايا حسية ذوقية. (الانتقالية)

ثانياً - ماذا ينتج عن كل مما يأتي:

- 1- دخول شوارد الهيدروجين الحمضية إلى الخلية الحسية الذوقية.
(زوال استقطاب غشائها و تشكيل كمون المستقبل).
- 2- ارتباط جزيء الغلوكوز بمستقبله في غشاء أهداب الخلية الحسية الذوقية.
(تنشيط البروتين G و زوال استقطاب غشائها و تشكيل كمون المستقبل).
- 3- ارتباط مركب cAMP بقنوات الصوديوم الموجودة في أغشية أهداب الخلية الحسية الشمية.
دخول شوارد الصوديوم.

ثالثاً - أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- 1- تعد المستقبلات الحسية الشمية مستقبلات أولية.
(لأنها من منشأ عصبي).
- 2- تعد المستقبلات الحسية الذوقية مستقبلات ثانوية.
(لأنها من منشأ غير عصبي).
- 3- ضرورة الاستنشاق للإحساس الشمي بالرائحة.
(لأن الاستنشاق يشكل مجرى هوائي يؤمن وصول المادة ذات الرائحة إلى البطانة الشمية).

رابعاً- تستخدم مواد كيميائية صناعية مثل السكرين و الأسبارتام كبديل عن السكر لدى مرضى السكري، ما آلية عمل تلك المواد في إثارة الإحساس بالطعم الحلو لدى هؤلاء المرضى؟
ترتبط المادة بمستقبل نوعي في غشاء الخلية الحسية مما ينشط البروتين G الذي يعمل على إزالة الاستقطاب في غشاء الخلية الحسية و تشكيل كمون المستقبل الذي يثير كمون عمل في قاعدتها ، ينتقل كمون العمل عبر الألياف الذوقية إلى مركز التذوق في القشرة المخية

حل ورقة العمل:

1. أصنف المواد السابقة من حيث سرعة استجابة المستقبلات الذوقية لها.
- تكون استجابة المستقبلات الحسية للمواد الآتية (الشوكولا الداكنة – الليمون الحامض)
بشكل أسرع من استجابتها لـ (قطعة الحلوى – الموالح).

2. لماذا تختلف استجابة المستقبلات لهذه الأطعمة ، وما الأهمية الصحية في ذلك؟
- إن ذلك يفيد في الحماية فالمواد ذات الطعم المر على الأغلب مواد ذات خصائص سمية
والمواد الحمضية تسبب أذية للخلايا الحسية الذوقية.

الدرس(4): المستقبلات الصوتية ومستقبلات التوازن

الصوت


اهتزاز الأجسام، يؤدي إلى:
تخلخل الضغط في الهواء الذي يؤدي إلى:
تولد المنبهات الصوتية.

ينتقل الصوت عبر: الأوساط المادية،
لنتمكن من تنبيه المستقبلات الصوتية في الأذن.

الأذن:

تشكل عضواً حسياً امتلك
تكيفاً عالياً لاستقبال المنبهات الصوتية
التي تقع ضمن مجال التواترات:
بين 20 – 20000 هزة/ ثانية (هرتز).

- 1- كيف تتولد المنبهات الصوتية؟
- 2- فسر: تخلخل الضغط في الهواء؟
- 3- ماذا ينتج عن اهتزاز الأجسام؟
- 4- كيف تنتقل المنبهات الصوتية؟
- 5- عرف الأذن.
- 6- ما هي تواترات الصوت التي تستقبلها الأذن؟




الأقسام الرئيسية للأذن


- 1- أذن خارجية
- 2- أذن وسطى
- 3- أذن داخلية

- 1- الأذن الخارجية:
تتألف من:
أ- الصيوان
ب- مجرى السمع
ت- غشاء الطبل

2- الأذن الوسطى:

جوف عظمي يملؤه: هواء
تقسم إلى:





*

أ- العلية:

تتوضع فيها عظيمات السمع الثلاث:
(المطرقة – السنان – الركاب).

ب- الردهة:

تتصل بـ: البلعوم
عن طريق: قناة لحمية تسمى نفير
أوستاش (وظيفة ↑)

3- الأذن الداخلية:

تتألف من:

قنوات وأجواف تشكل: التيه

يتألف التيه من:

أ- الحلزون

ب- الدهليز والذي يتكون من:

(الكيس والقربية)

ت- القنوات الهلالية

1- ما هي الأقسام الرئيسية للأذن؟

2- مم تتألف الأذن الخارجية؟

3- ما هي أقسام الأذن الوسطى؟

4- مم تتألف العلية في الأذن الوسطى؟

5- مم تتألف الردهة في الأذن الوسطى؟

6- بم تمتلئ الأذن الوسطى؟

7- مم تتألف الأذن الداخلية؟

8- مم يتألف التيه في الأذن الداخلية؟


9- اكتب المصطلح: قنوات وأجواف في الأذن الوسطى.

10- كيف تتصل ردهة الأذن الوسطى مع البلعوم؟

11- اذكر وظيفة الردهة؟

12- اكتب المصطلح: قناة لحمية تصل بين ردهة الأذن الوسطى والبلعوم.

13- ما هي مكونات الدهليز؟



الأذن الداخلية

من خلال الشكل الآتي أستنتج بنية الأذن الداخلية:
أميز:

تية عظمي

(الموقع): في الأذن الداخلية ضمن العظم الصدغي

تية غشائي (الموقع): يسكن ضمن التيه العظمي

التيه العظمي:

(وظيفته): محفظة عظمية

مكون من:

مجموعة قنوات وأجواف محفورة في: العظم الصدغي.

التيه الغشائي:

يتكون من: قنوات وأجواف غشائية.

يملؤها: اللمف الداخلي.

يفصل بين التيه العظمي والتيه الغشائي:

حيز يملؤه: اللمف الخارجي.


منشأ اللمف الداخلي والخارجي:

اللمف الداخلي واللمف الخارجي

عبارة عن: سوائل

تتشأ من: ارتشاح مصورة الدم

- 1- مم تتألف الأذن الداخلية = ما هما نوعا التيه في الأذن الداخلية؟
- 2- حدد موقع: التيه العظمي – التيه الغشائي.
- 3- مم يتألف التيه العظمي؟
- 4- اذكر وظيفة التيه العظمي.
- 5- مم يتألف التيه الغشائي؟
- 6- ما الذي يفصل بين التيه العظمي والتيه الغشائي؟ وبماذا يمتلئ؟
- 7- مم يتألف كل اللمف الداخلي والخارجي؟ ومم ينشأان؟

**القوقعة (الحلزون)**

ألاحظ الشكل الاتي الذي يوضح بنية الحلزون (القوقعة):
للحلزون شكل:

مخروط ملتف حول محور عظمي
بمقدار: دورتين وثلاثة أرباع الدورة.

يقسم إلى: ثلاث قنوات (فسر):

بسبب وجود: الرف العظمي - وغشاء رايسنر - والغشاء القاعدي .

القنوات الثلاث في القوقعة:**1- القناة الدهليزية:**

تقع: فوق الرف العظمي وغشاء رايسنر
يملؤها: لمف خارجي

2- القناة القوقعية:

تقع: بين الغشاء القاعدي وغشاء رايسنر
يملؤها: لمف داخلي
العضو الموجود فيها: عضو كورتي

3- القناة الطبليية:

تقع: تحت الرف العظمي والغشاء القاعدي
يملؤها: لمف خارجي

القناة الدهليزية	القناة القوقعية	القناة الطبليية	
الموقع	فوق الرف العظمي وغشاء رايسنر	بين الغشاء القاعدي وغشاء رايسنر	تحت الرف العظمي والغشاء القاعدي
يملؤها	لمف خارجي	لمف داخلي	لمف خارجي
	يوجد فيها عضو كورتي		
النافذة المتصلة معها	النافذة البيضية	النافذة المدورة	

1- ما القنوات الثلاث في القوقعة؟

2- ما السائل الذي يملأ كلاً منها؟

3- ما القناة التي تقع فوق الرف العظمي وغشاء رايسنر؟

4- ما القناة التي تقع تحت الرف العظمي والغشاء القاعدي؟

5- أين تتوضع القناة القوقعية؟ وما العضو الموجود فيها؟

6- حدد موقع: القناة الدهليزية - القناة القوقعية - القناة الطبليية في الحلزون.

- 7- حدد موقع عضو كورتي. ج - في القناة القوقعية للحلزون
 8- ما هو شكل الحلزون؟ وحول ماذا يلتف؟
 9- كم عدد اللفات في الحلزون؟
 10- كيف يقسم الحلزون إلى 3 قنوات؟ = فسر: يقسم الحلزون إلى ثلاث قنوات؟
 11- ماذا ينتج عن: وجود الرف العظمي والغشاء القاعدي وغشاء رايسنر؟ ج - يقسم الحلزون إلى ثلاث قنوات

عضو كورتي

وظيفة عضو كورتي: المستقبل الصوتي
 (الموقع): داخل القناة القوقعية للحلزون.
 ويرتبط بـ: الغشاء القاعدي.
 يتألف من:

1- خلايا كورتي:

شكلها: قضيبية

تشكل: نفق كورتي

2- خلايا حسية مهدبة:

مستقبل ثانوي (فسر): لأنها من منشأ غير عصبي

أهداب الخلايا الحسية المهدبة:

تلامس: الغشاء الساتر (غشاء هلامي)،

أما قواعد الخلايا الحسية المهدبة:

فتشكل: مشابك مع الاستطالات الهيولية

لعصبونات ثنائية القطب.

توجد أجسام العصبونات ثنائية القطب في: العقدة

الحلزونية


وظيفة العصبونات ثنائية القطب:

تشكل استطالاتها الهيولية مشابك مع قواعد الخلايا

الحسية المهدبة في عضو كورتي.

وتشكل محاورها ألياف العصب القوقعي.

3- خلايا سائدة (داعمة).



عضو كورتي

- 1- اذكر وظيفة عضو كورتي.
 2- حدد موقع عضو كورتي.
 3- ما الغشاء الذي يرتبط بعضو كورتي.
 4- ما أنواع الخلايا الموجودة في عضو كورتي.
 5- ما هو شكل خلايا كورتي؟ وماذا تشكل؟
 6- فسر: الخلايا الحسية السمعية هي مستقبل ثانوي.
 7- مع من تتصل أهداب الخلايا الحسية المهدبة في عضو كورتي؟
 8- مع من تتصل قواعد الخلايا الحسية المهدبة في عضو كورتي؟
 9- حدد موقع أجسام العصبونات ثنائية القطب التي تتصل مع قواعد الخلايا الحسية المهدبة في عضو كورتي؟
 = حدد موقع الخلايا التي تشكل محاورها ألياف العصب القوقعي.
 10- اذكر وظيفة العصبونات ثنائية القطب في العقدة الحلزونية.
 11- اكتب المصطلح: غشاء هلامي يلامس أهداب الخلايا الحسية في عضو كورتي.


الاستقبال الصوتي والإحساس السمعي

تنتقل الأمواج الصوتية إلى الأذن الداخلية بطرائق عدة:

- عبر نفير أوستاش إلى الأذن الوسطى.
- عظام الرأس.
- الطريق الطبيعي الذي يعد الطريق الأهم.


1- ما هي طرق انتقال الأمواج الصوتية إلى الأذن الداخلية؟

2- ما هو أهم طريق لانتقال الأمواج الصوتية إلى الأذن الداخلية؟

**الاستقبال الصوتي والإحساس السمعي**

أتبع الشكل الآتي الذي يوضح مراحل انتقال الأمواج الصوتية في الطريق الطبيعي:

- 1- يهتز غشاء الطبل. ←
- 2- تنتقل: عظيمات السمع الاهتزازات إلى: النافذة البيضية.
- 3- يهتز غشاء النافذة البيضية. ←
- 4- يهتز اللمف الخارجي في: القناة الدهليزية. ←
- 5- يهتز غشاء رايسنر. ←
- 6- تنتقل الاهتزازات إلى اللمف الداخلي في: القناة القوقعية. ←
- 7- اهتزاز الغشاء القاعدي بشكل: موجي

مراحل انتقال الأمواج الصوتية في الطريق الطبيعي:

س- ما دور كل من :

عظيمات السمع:

تقوم بنقل الاهتزازات

من: غشاء الطبل


إلى: غشاء النافذة البيضية

غشاء النافذة البيضية:

يقوم بنقل الاهتزاز

من: عظيمات السمع الثلاث

إلى: اللمف الخارجي في القناة الدهليزية

**غشاء رايسنر:**

يقوم بنقل الاهتزاز
من: اللمف الخارجي في القناة الدهليزية
إلى: اللمف الداخلي في القناة القوقعية

**س- ما أهمية اندفاع غشاء النافذة المدورة نحو جهة
الأذن الوسطى؟**

امتصاص الضغط المتولد على غشاء النافذة البيضية.

3- ما هي طرق انتقال الأمواج الصوتية إلى الأذن
الداخلية؟

4- ما هو أهم طريق لانتقال الأمواج الصوتية إلى
الأذن الداخلية؟

5- رتب بدقة مراحل انتقال الأمواج الصوتية في
الطريق الطبيعي بدءاً من اهتزاز غشاء الطبل
وحتى اهتزاز الغشاء القاعدي.

6- ما دور كل من: عظيمات السمع، غشاء النافذة
البيضية، غشاء رايسنر في عملية السمع؟

7- ما أهمية اندفاع غشاء النافذة المدورة نحو جهة
الأذن الوسطى؟

8- ماذا ينتج عن:

- اهتزاز غشاء الطبل.
- اهتزاز غشاء النافذة البيضية.
- اهتزاز اللمف الخارجي في القناة الدهليزية.
- اهتزاز غشاء رايسنر.
- اهتزاز اللمف الداخلي في القناة القوقعية.

9- فسر:

- اهتزاز الغشاء القاعدي بشكل موجي.
- اهتزاز اللمف الداخلي في القناة القوقعية
- اهتزاز غشاء رايسنر.
- اهتزاز اللمف الخارجي في القناة الدهليزية.
- اهتزاز غشاء النافذة البيضية.

آلية عمل الخلية الحسية السمعية

اهتزاز الغشاء القاعدي يؤدي إلى:
تبدل العلاقة للمسية بين أهداب الخلايا الحسية والغشاء الساتر؛
فتنتني الأهداب.

(بالنتيجة:)

تفتح بوابات قنوات البوتاسيوم،

(بالنتيجة:)

تنتشر شوارد البوتاسيوم إلى الداخل، مسببة زوال استقطاب
غشاء الخلية الحسية، وتشكيل كمون المستقبل.

(بالنتيجة:)

يحقر ذلك تحرير النواقل العصبية في المشبك؛
مما يؤدي إلى: نشوء كمونات عمل في ألياف العصب القوعي.

الذي (وظيفته): ينقل كمونات العمل على شكل سيالات عصبية
إلى: مركز السمع في القشرة المخية.

لماذا تدخل شوارد البوتاسيوم بدلاً من الصوديوم؟

لأن **اللمف الداخلي** يحوي

تراكيز مرتفعة من شوارد البوتاسيوم،


وتراكيز منخفضة من شوارد الصوديوم،

وهذا ما يسبب: انتشار شوارد البوتاسيوم إلى الداخل لدى فتح
قنواتها في: أهداب الخلية الحسية السمعية


أما في **اللمف الخارجي** تكون:

تراكيز منخفضة من شوارد البوتاسيوم،

وتراكيز مرتفعة من شوارد الصوديوم



*** (ارسم)



اللمف الخارجي	اللمف الداخلي	
من ارتشاح مصورة الدم		المنشأ
- في القناة الدهليزية للحلزون. - في القناة الطبلية للحلزون. - في الحيز بين التيه العظمي والتيه الغشائي	- يملأ التيه الغشائي - في القناة القوقعية للحلزون.	الموقع
تراكيز منخفضة من شوارد البوتاسيوم، وتراكيز مرتفعة من شوارد الصوديوم	تراكيز مرتفعة من شوارد البوتاسيوم، وتراكيز منخفضة من شوارد الصوديوم	المكونات

1- ماذا ينتج عن:

- اهتزاز الغشاء القاعدي في عضو كورتي.
- تبدل العلاقة للمسية بين أهداب الخلايا الحسية والغشاء الساتر؛ وانثناء الأهداب.
- فتح قنوات البوتاسيوم في أهداب الخلايا الحسية السمعية.
- تشكيل كمون مستقبل في أهداب الخلايا الحسية السمعية.

2- فسر:

- تحرير النواقل العصبية في المشبك؛ مما يؤدي إلى نشوء كمونات عمل في ألياف العصب القوعي.
- تشكيل كمون مستقبل في أهداب الخلايا الحسية السمعية.
- فتح قنوات البوتاسيوم في أهداب الخلايا الحسية السمعية.
- تبدل العلاقة للمسية بين أهداب الخلايا الحسية والغشاء الساتر؛ وانثناء الأهداب.
- اهتزاز الغشاء القاعدي في عضو كورتي.


3- اذكر وظيفة ألياف العصب القوعي.

4- فسر لماذا تدخل شوارد البوتاسيوم بدلاً من الصوديوم داخل أهداب الخلية الحسية السمعية.

5- ما هي مكونات كل من اللف الداخلي واللف الخارجي.

6- قارن بين اللف الداخلي واللف الخارجي من حيث المنشأ و الموقع والمكونات.

ضعيف



الأقسام الوظيفية للاستقبال الصوتي

أدرس الشكل المجاور الذي يوضح الأقسام الوظيفية للاستقبال الصوتي في الأذن:

أسمي البنى الموضحة بالأرقام من 1 إلى 10

- 1- غشاء الطبل
- 2- المطرقة
- 3- السندان
- 4- الركاب
- 5- النافذة البيضية
- 6- القناة الدهليزية
- 7- القناة القوقعية
- 8- القناة الطبلية
- 9- الكوة القوقعية
- 10- النافذة المدورة.

توزيع الحساسية للتواترات المختلفة في الحلزون:

- قاعدة الحلزون: حساسة للتواترات المرتفعة (العالية)
- والمنطقة القريبة من ذروته: حساسة للتواترات المنخفضة،
- بينما تتوزع الحساسية للتواترات الوسطية: بين: القاعدة و: المنطقة القريبة من الذروة.

- القناة الدهليزية تتصل بـ: النافذة البيضية
- القناة الطبلية تتصل بـ: النافذة المدورة عند: قاعدة الحلزون
- القناة الدهليزية تتصل بـ: بالقناة الطبلية عبر: الكوة القوقعية الموجودة عند: ذروة الحلزون

- 1- كيف تتوزع الحساسية للتواترات المختلفة في الحلزون؟
- 2- مع من تتصل كل من: (القناة الدهليزية – القناة الطبلية)؟
- 3- حدد موقع اتصال القناة الدهليزية بالقناة القوقعية =
- 4- كيف تتصل القناة الدهليزية بالقناة القوقعية؟
- 5- حدد موقع الكوة القوقعية.
- 5- رتب مناطق الحلزون حسب حساسيتها لتواترات الاهتزازات الصوتية من الأعلى إلى الأدنى.


حماية الأذن الداخلية من الأصوات عالية الشدة

تسبب الأصوات مرتفعة الشدة أذيات متفاوتة الخطورة في الأذن الداخلية.

كيف تكيفت الأذن للتقليل من تلك المخاطر؟

يوجد في الأذن الوسطى عضلتان صغيرتان هما:

- **العضلة الشادة الطبلية:** التي ترتبط بـ: المطرقة،
- **والعضلة الشادة الركابية:** التي تتصل بـ: الركاب.

**تقلص العضلة الشادة الطبلية؛**

- ← فتسحب المطرقة نحو الداخل؛ مما يؤدي إلى:
- ← شد غشاء الطبل؛
- ← فتنخفض قدرته على الاهتزاز،

وفي الوقت ذاته تتقلص العضلة الشادة الركابية؛

- ← فتسحب الصفيحة الركابية نحو الخارج، مما يؤدي إلى:
- ← تخفيف حركة الركاب على غشاء النافذة البيضية.

كما أن تقارب سلسلة عظيمات السمع نتيجة: تقلص العضلتين معاً

- ← يخفف من قدرتها على نقل الاهتزازات من: غشاء الطبل

إلى: غشاء النافذة البيضية

1- كيف تكيفت الأذن للتقليل من مخاطر الأصوات مرتفعة الشدة؟

2- بماذا ترتبط العضلة الشادة الطبلية؟

3- بماذا تتصل العضلة الشادة الركابية؟

4- ماذا ينتج عن:

- تقلص العضلة الشادة الطبلية؟

- شد غشاء الطبل؟

5- ماذا ينتج عن:

- تقلص العضلة الشادة الركابية؟

- سحب الصفيحة الركابية نحو الخارج؟

6- ماذا ينتج عن تقلص العضلة الشادة الطبلية والعضلة الشادة الركابية معاً؟

7- ماذا ينتج عن: تقارب سلسلة عظيمات السمع؟

8- فسر: تقارب سلسلة عظيمات السمع عند سماع أصوات مرتفعة الشدة.

*** (ارسم الأمبولة)

مستقبلات التوازن

لماذا يقوم الجسم بفعاليات عضلية متناسقة في أثناء الحركات الدورانية المختلفة؟
ما سبب إحساسنا بحركة المصعد نحو الأعلى أو الأسفل؟ أو انطلاق السيارة بنا؟ أو تغيير مسار طريقها؟

بسبب وجود:

مستقبلات التوازن وهي:

- 1- مستقبلات التوازن في القريبة والكيس
- 2- مستقبلات التوازن في أمبولة القنوات الهلالية

1- مستقبلات التوازن في: القريبة -

والكيس

(وظيفةها): تزودنا بـ:

إحساس التوازن

سواء أكان الجسم: متحركاً - أم ساكناً

الخلايا الحسية المهذبة في القريبة والكيس تتجمع ضمن:

بنى بيضوية تعرف بـ: اللطخات maculae

اللطخة الموجودة في القريبة:

تكون حساسة لـ:

التغيرات الناتجة عن الحركة الأفقية،

بينما اللطخة الموجودة في الكيس:

تكون حساسة لـ:

التغيرات الناتجة عن الحركة الشاقولية.

بنية اللطخة في كل من القريبة والكيس:

- الحصىات التوازنية.
- هي: بلورات كربونات الكالسيوم $CaCO_3$.
- طبقة هلامية.
- خلايا حسية مهذبة.

2- مستقبلات التوازن الموجودة في: أمبولة


القنوات الهلالية:

(وظيفةها): تستجيب إلى: الحركات الدورانية للرأس.

إذ تتنبه الخلايا الحسية المهذبة الموجودة في: الأمبولات

نتيجة: حركة اللف الداخلي فيها،

بينما تصبح غير نشطة (متى؟) عندما يكون الجسم ساكناً.



بنية الأمبولة في القنوات الهلالية:

خلايا حسية مهدبة:

- تجتمع بشكل عرف وتشكل الألياف العصبية.
- تتصل مع بنية تدعى القبية يحيط بها اللف الداخلي.

وتنتقل السيالات العصبية

الناجمة عن: تنبيه مستقبلات التوازن


عبر: العصب الدهليزي

إلى: مراكز التوازن في الدماغ

- 1- اذكر وظيفة مستقبلات التوازن في القريبة والكيس.
- 2- اذكر وظيفة مستقبلات التوازن الموجودة في أمبولة القنوات الهلالية.
- 3- اذكر وظيفة اللطخة الموجودة في القريبة.
- 4- اذكر وظيفة اللطخة الموجودة في الكيس.
- 5- حدد موقع الخلايا الحسية المهدبة في القريبة والكيس.
- 6- حدد موقع: الخلايا الحساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الشاقولية للجسم.
- 7- حدد موقع: الخلايا الحساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الأفقية للجسم.
- 8- حدد موقع: مستقبلات التوازن التي تستجيب للحركات الدورانية للرأس.
- 9- اكتب المصطلح: بنى بيضوية تتجمع ضمنها الخلايا الحسية المهدبة في القريبة والكيس.
- 10- فسر: تنتبه الخلايا الحسية المهدبة الموجودة في الأمبولات.
- 11- ماذا ينتج عن: حركة اللف الداخلي في أمبولة القنوات الهلالية؟
- 12- متى تكون الخلايا الحسية المهدبة في أمبولة القنوات الهلالية غير نشطة؟
- 13- اذكر وظيفة العصب الدهليزي.

أمراض الأذن

صمم توصيلي

*
نتيجة تناقص في مرونة:

غشاء
الطبل
المفاصل
بين
عظيما
البيضية
النافذة
السمع


الصمم التوصيلي:

يظهر لدى بعض الأفراد لإسيما: كبار السن
وهو: درجات من فقدان السمع
نتيجة:

- تناقص في مرونة:
- غشاء الطبل.
 - أو المفاصل بين عظيما السمع.
 - أو غشاء النافذة البيضية.

صمم عصبي

ينتج عن أذيات ضمن:

*
المراكز
العصبيةالمستقبل الصوتي
في
الحلزون

العصب القوقعي

الصمم العصبي:

ينتج عن:

أذيات ضمن:

- المستقبل الصوتي في الحلزون.
- أو في العصب القوقعي.
- أو المراكز العصبية.

1- قارن بين الصمم التوصيلي والصمم العصبي من حيث الأسباب.

2- من هم الأكثر عرضة للإصابة بالصمم التوصيلي؟

3- اكتب المصطلح: درجات من فقدان السمع تظهر لدى بعض الأفراد لإسيما كبار السن نتيجة تناقص في مرونة غشاء الطبل أو المفاصل بين عظيما السمع أو غشاء النافذة البيضية.

4- ماذا ينتج عن: أذيات ضمن المستقبل الصوتي في الحلزون أو في العصب القوقعي أو المراكز العصبية السمعية؟5- ماذا ينتج عن: تناقص في مرونة غشاء الطبل أو المفاصل بين عظيما السمع أو غشاء النافذة البيضية.

التقويم النهائي**أولاً: أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:**

1. عندما تتحرك السيارة انطلاقاً من موقفها يتولد لدي إحساس بالسرعة المتزايدة نتيجة لتنبه المستقبلات الحسية في:
 - أ- الحلزون ب- القريبة ج- القنوات الهلالية د- الكيبس.
2. يزول الاستقطاب في الخلية الحسية السمعية بسبب:
 - أ- دخول Na ب- دخول K ج- خروج Ca د- خروج K
3. تتصل القناة الدهليزية بالقناة الطبلية عبر:
 - أ- النافذة البيضية ب- النافذة المدورة ج- الكوة القوقعية د- الحلقة الطبلية.

ثانياً:

1. أرتب مسار الاهتزازات بدءاً من غشاء الطبل وحتى الغشاء القاعدي.
2. أرتب مناطق الحلزون حسب حساسيتها لتواترات الاهتزازات الصوتية من الأعلى إلى الأدنى.

ثالثاً: أكتب المصطلح الموافق لكل مما يأتي:

1. غشاء هلامي يلامس أهداب الخلايا الحسية في عضو كورتني(.....).
2. بنى بيضوية في القريبة والكيبس تتجمع فيها مستقبلات التوازن(.....).

رابعاً: أحدد بدقة مكان وجود كل مما يأتي:

1. الخلايا التي تشكل محاويرها ألياف العصب القوقعي.
2. الخلايا الحساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الشاقولية للجسم.
3. مستقبلات التوازن التي تستجيب للحركات الدورانية للرأس.

خامساً: أقرن بين القناة الطبلية والقناة الدهليزية من حيث:

الموقع - النافذة التي تصل كلاً منهما مع الأذن الوسطى

حل التقويم النهائي**أولاً - أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:**

- 1- عندما تتحرك السيارة انطلاقاً من موقفها يتولد لدي إحساس بالسرعة المتزايدة نتيجة لتنبه المستقبلات الحسية في : (ب- القريبة)
- 2- يزول الاستقطاب في الخلية الحسية السمعية بسبب : (ب- دخول K^+)
- 3- تتصل القناة الدهليزية بالقناة الطبلية عبر : (ج- الكوة القوقعية).

ثانياً-**1- أرتب مسار الاهتزازات بدءاً من غشاء الطبل و حتى الغشاء القاعدي.**

- 1- غشاء الطبل
- 2- عظيماات السمع
- 3- غشاء النافذة البيضية
- 4- اللمف الخارجي في المجرى الدهليزي
- 5- غشاء رايسنر
- 6- اللمف الداخلي في المجرى المتوسط
- 7- الغشاء القاعدي.

2- أرتب مناطق الحلزون حسب حساسيتها للتواترات الاهتزازات الصوتية من الأعلى إلى الأدنى؟

- المنطقة القريبة من ذروته حساسة للتواترات المنخفضة.
- بين المنطقة القريبة من الذروة والقاعدة تتوزع الحساسية للتواترات الوسطية.
- قاعدة الحلزون حساسة للتواترات المرتفعة (العالية).

ثالثاً- أكتب المصطلح الموافق لكل مما يأتي:

- 1- غشاء هلامي يلامس أهداب الخلايا الحسية في عضو كورتني. (الغشاء الساتر أو اللامس)
- 2- بنى بيضوية في القريبة والكيس تتجمع فيها مستقبلات التوازن. (اللطخات)

رابعاً - أحدد بدقة مكان وجود كل مما يأتي:

- 1- الخلايا التي تشكل محاورها ألياف العصب القوقعي : في العقدة الحلزونية.
- 2- الخلايا الحساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الشاقولية للجسم : في لطخة الكيس.
- 3- مستقبلات التوازن التي تستجيب للحركات الدورانية للرأس : في القنوات الهلالية.

خامساً:**أقارن بين : القناة الطبلية و القناة الدهليزية من حيث: الموقع – النافذة التي تصل كل منهما مع الأذن الوسطى**

القناة الطبلية	القناة الدهليزية	الموقع
تحت الرف العظمي والغشاء القاعدي	فوق الرف العظمي وغشاء رايسنر	
النافذة المدورة	النافذة البيضية	النافذة المتصلة معها

الدرس (5): المستقبلات الضوئية (1)



*

العين

العين:

بنية معقدة تحتوي على: **المستقبلات الضوئية** التي تسهم في توليد إحساس بصري يُعتمد عليه أكثر من أي إحساس آخر في تكوين المعلومات – وتذكرها.

فالعين تمكنا من (وظيفتها) :

- التمييز بين الضوء والظلام من حولنا،
- وتكوين صورة مرئية تفصيلية للأجسام بأبعادها - وألوانها - وأشكالها.

- 1- اكتب المصطلح: بنية معقدة تحتوي على المستقبلات الضوئية التي تسهم في توليد إحساس بصري.
- 2- لماذا يعتمد الإنسان على عينه؟
- 3- ما هو أكثر عضو يعتمد عليه في تكوين المعلومات وتذكرها؟
- 4- اذكر وظيفة العين.

جدار كرة العين

الأحظ الشكل الآتي لمقطع سهمي في عين يسرى:

- أرتب طبقات جدار كرة العين من الخارج إلى الداخل.
- أرتب الأوساط الشفافة من الأمام إلى الخلف.

بنية جدار كرة العين:


- 1- الطبقة الصلبة
- 2- الطبقة المشيمية
- 3- طبقة الشبكية: وتتكون من: وريقة خارجية صباغية - وريقة داخلية عصبية

1. الصلبة:

(موقعها): الطبقة الخارجية لجدار كرة العين إذ:

- تتحدب قليلاً من الأمام
- وتشف
- وتصبح خالية من الأوعية الدموية

(بالنتيجة): مشكلة القرنية الشفافة.




وظيفتها: هي الطبقة المقاومة + تشكل القرنية الشفافة

2. المشيمية:

(موقعها): الطبقة الوسطى لجدار كرة العين
تتكون من:

نسيج ضام يحوي:
خلايا صباغية وغني بالأوعية الدموية

(وظيفتها): تغذي الخلايا البصرية
يشكل قسمها الأمامي: القزحية والجسم الهدبي.




القزحية والجسم الهدبي

كل منهما يحوي:

أليافاً عضلية ملساء (دائرية) و(شعاعية)
عملها: لا إرادي، يخضع لتأثير الجهاز العصبي الإعاشي.

*



ألياف دائرية	ألياف شعاعية	الألياف في القزحية
نظير الودي	الودي	تتقلص تحت تأثير القسم
تتضيق الحدقة	تتوسع الحدقة	تأثير تقلصها على الحدقة في منتصف القزحية

ألياف ودية بعد العقدة ← نور أدرينالين ← ألياف شعاعية
في القزحية ← تتقلص ← تتوسع الحدقة

ألياف نظيرة ودية بعد العقدة ← أستيل كولين ← ألياف
دائرية في القزحية ← تتقلص ← تتضيق الحدقة

3. الشبكية:

(موقعها): الطبقة الداخلية لجدار كرة العين
نمیز فيها وريقتين رئيسيتين هما:


- الوريقة الخارجية الصباغية
- الوريقة الداخلية العصبية

الأوساط الشفافة من الأمام إلى الخلف:

- 1- القرنية
- 2- الخلط المائي
- 3- العدسة (الجسم البلوري)
- 4- الخلط الزجاجي

- 1- رتب طبقات جدار كرة العين من الخارج إلى الداخل.
- 2- رتب الأوساط الشفافة من الأمام إلى الخلف في كرة العين.
- 3- مم تتألف شبكية العين؟
- 4- حدد موقع: الطبقة الصلبة في العين.
- 5- حدد موقع: الطبقة المشيمية في العين.
- 6- حدد موقع: طبقة الشبكية في العين.
- 7- اذكر وظيفة الطبقة الصلبة – الطبقة المشيمية.
- 8- مم تتألف الطبقة المشيمية في جدار كرة العين؟
- 9- اذكر وظيفة مشيمية العين.
- 10- ماذا تشكل الطبقة المشيمية من الأمام؟
- 11- ماذا ينتج: عن تحذب الصلبة قليلاً من الأمام وشفوفيتها وخلوها من الأوعية الدموية؟
- 12- فسر: تشكل القرنية في الصلبة.
- 13- مم تتألف القرنية والجسم الهدبي؟ وكيف يعملان؟ وما الجهاز المسؤول عنهما؟
- 14- ما نوعا الألياف العصبية في القرنية؟ وما القسم الإعاشي المسؤول عن نقل كل منها؟ وما تأثير نقل كل منها على الحدقة؟

ضعيف



*

بنية الشبكية


نميز في الشبكية وريقتين رئيسيتين هما:

1- الوريقة الخارجية الصباغية:

(وظيفةها:)

أ- **تحتوي:** صباغ الميلانين الذي (وظيفةه:)
يمتص الفائض من الأشعة الضوئية التي تجتاز الخلايا
البصرية ويمنع انعكاسها (بالنتيجة:)
مما يسهم في وضوح الرؤية.

ب- **تخزن كميات كبيرة من الفيتامين A (وظيفةه:)**
ضروري لتكوين الأصبغة البصرية.



2- الوريقة الداخلية العصبية:

ثلاث طبقات خلوية، بينها طبقتان من المشابك،
مرتبة من الخارج إلى الداخل:

1- **الطبقة الخارجية:** تحتوي على الخلايا البصرية
العصي والمخاريط، وهي: عصبونات ثنائية
القطب.

2- **طبقة المشابك العصبية الخارجية:**

3- **الطبقة الوسطى:** تحوي أنماطاً خلوية عدة:
(عصبونات ثنائية القطب - خلايا أفقية- خلايا
مقرنية).

4- **طبقة المشابك العصبية الداخلية:**

5- **الطبقة الداخلية:**

تحتوي عصبونات عقدية متعددة الأقطاب
(وظيفةها:)
تشكل محاورها ألياف العصب
البصري

الخلايا الأفقية (وظيفةها:)

تؤمن اتصالات شبكية أفقية بين الخلايا البصرية
والعصبونات ثنائية
القطب في طبقة المشابك الخارجية،

الخلايا المقرنية (وظيفةها:)

تساعد في تكامل السيالات العصبية البصرية الواردة
من: الخلايا البصرية
إلى: الخلايا العقدية
قبل أن تغادر الشبكية إلى الفص القفوي للمخ.

1- ما هي بنية شبكية العين؟

2- اذكر وظيفة الوريقة الخارجية الصباغية لشبكية العين.


3- اذكر وظيفة صباغ الميلانين في العين.

4- حدد موقع صباغ الميلانين في العين.

- 5- ماذا ينتج عن: امتصاص الميلانين الفائض من الأشعة الضوئية التي تجتاز الخلايا البصرية ومنع انعكاسها؟
- 6- حدد موقع: الفيتامين A في العين.
- 7- اذكر وظيفة: الفيتامين A في الوريقة الخارجية لشبكية العين.
- 8- رتب طبقات الوريقة العصبية للشبكية من الخارج نحو الداخل.
- 9- ماذا تحوي الطبقة الخارجية للوريقة العصبية للشبكية؟
- 10- ماذا تحوي الطبقة الوسطى للوريقة العصبية للشبكية؟
- 11- ماذا تحوي الطبقة الداخلية للوريقة العصبية للشبكية؟
- 12- حدد موقع العصي والمخاريط.
- 13- ما نوع العصي والمخاريط من حيث الشكل؟
- 14- حدد موقع العصبونات العقدية في العين.
- 15- اذكر وظيفة العصبونات العقدية في الطبقة الداخلية للوريقة العصبية للشبكية.
- 16- حدد موقع الخلايا الأفقية – الخلايا المقرنية في العين.
- 17- اذكر وظيفة الخلايا الأفقية – الخلايا المقرنية في الطبقة الوسطى للوريقة العصبية للشبكية.

حازم ضعيف

*** (ارسم)

**العصي والمخاريط**

ألاحظ المخطط الآتي، وأقارن أوجه التشابه والاختلاف بين

العصي والمخاريط:

العصية والمخروط

تتشابه: بنيوياً

إذ يتألف كل منهما من:

قطعة خارجية - قطعة داخلية - نواة - جسيم مشبكي

وتختلفان بـ:

شكل القطعة الخارجية - ووظيفياً

البنية:

تحتوي على: أقراص .		1- القطعة الخارجية
الأصبغة البصرية توجد في أغشية أقراص القطعة الخارجية شكل القطعة الخارجية		
في المخاريط: مخروطي	في العصي: عصوي	
تحتوي على: جسيمات كوندرية وظيفتها الجسيمات الكوندرية: تؤمن الطاقة اللازمة لعمل الخلية البصرية		2- القطعة الداخلية
		3- النواة
(وظيفته): يؤمن الاتصال المشبكي بين الخلية البصرية والعصبونات ثنائية القطب		4- الجسيم المشبكي

1- قارن أوجه التشابه والاختلاف بين العصي والمخاريط.

2- ما هي بنية كل من العصية والمخروط؟

3- مم تتألف القطعة الخارجية لدى كل من العصي والمخاريط؟


4- قارن بين العصي والمخاريط من حيث الشكل القطعة الخارجية.

5- مم تتألف القطعة الداخلية لدى كل من العصي والمخاريط؟

6- حدد موقع الأصبغة البصرية في العصي والمخاريط.

7- اذكر وظيفة:

(الجسيمات الكوندرية في العصي والمخاريط - الجسيم المشبكي في العصي والمخاريط).



صبغ الرودوبسين
(في أغشية أقراص القطعة الخارجية للعضية)

العصي والمخاريط

ألاحظ المخطط الآتي، وأقرن أوجه التشابه والاختلاف بين

العصي والمخاريط:

العصية والمخروط

تتشابه: بنيوياً

إذ يتألف كل منهما من:

قطعة خارجية - قطعة داخلية - نواة - جسيم مشبكي

وتختلفان بـ:

شكل القطعة الخارجية - ووظيفياً

أوجه الاختلاف بحسب الجدول:

المخروط	العصية	
		
مخروطي	عصوي	شكل القطعة الخارجية
ثلاثة أنواع من الأصبغة الحساسة للضوء القوي	صبغ الرودوبسين	نوع الصبغ (في أغشية أقراص القطعة الخارجية)
1- الريتانال 2- الفوتوبسين	1- الريتانال 2- السكوتوبسين	تركيب الصبغ
الإضاءة القوية	الإضاءة الضعيفة	شروط تفكك الصبغ
مسؤولة عن الرؤية في الإضاءة القوية	مسؤولة عن الرؤية في الإضاءة الضعيفة	الوظيفة
تتمكن من تمييز الألوان	تعجز عن تمييز الألوان	تمييز الألوان
تتمكن من تمييز الألوان: لأن المخاريط تحتوي على: ثلاثة أنواع من الأصبغة المختلفة الحساسة لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة	تعجز عن تمييز الألوان: لأن العصي تحتوي على: صبغ الرودوبسين فهي متساوية الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة	التفسير

صبغ الرودوبسين:

(وظيفته: حساس للضوء الضعيف)
(آلية تفعيله: يتفكك في الضوء الضعيف (فبالنتيجة: يصبح فعالاً)

الأصبغة الثلاثة في المخاريط:

(وظيفتها: حساسة للضوء القوي)
(آلية تفعيلها: تتفكك في الضوء القوي (فبالنتيجة: تصبح فعالة)

التركيب الكيميائي:

الريتانال: جذر أدهيد فيتامين A

السكرتوبسين: جذر بروتين

الفوتوبسين: جذر بروتين

1- قارن أوجه التشابه والاختلاف بين العصي والمخاريط.

2- قارن بين العصي والمخاريط من حيث:
(شكل القطعة الخارجية - نوع الصبغ - تركيب الصبغ - شروط تفكك الصبغ - الوظيفة تمييز الألوان مع التفسير).

3- اذكر وظيفة صبغ الرودوبسين.

4- حدد موقع صبغ الرودوبسين.

ج - في أغشية أقراص القطعة الخارجية للعصي

5- اذكر وظيفة الأصبغة الثلاثة في المخاريط.

6- كيف يتفكك صبغ الرودوبسين؟

7- كيف تتفكك الأصبغة الثلاثة في المخاريط؟

8- ماذا ينتج عن تفكك صبغ الرودوبسين بالضوء الضعيف؟


9- ماذا ينتج عن تفكك الأصبغة الثلاثة في المخاريط بالضوء القوي؟

10- كيف يتفكك كل من صبغ الرودوبسين - والأصبغة الثلاثة في أغشية أقراص القطعة الخارجية للعصي والمخاريط؟

11- ما هو التركيب الكيميائي لـ: (الريتانال -

السكرتوبسين - الفوتوبسين)؟

توزع الخلايا البصرية في الشبكية



كيف تتوزع الخلايا البصرية في الشبكية؟
تتوزع الخلايا البصرية (العصي والمخاريط) بـ شكل غير متجانس في الشبكية؛ مما يؤدي إلى: اختلاف حدة الإبصار في مناطق الشبكية المختلفة (فسر):
بسبب خلال اختلاف نوع - وعدد الخلايا البصرية التي تقابل ليفاً عصبياً واحداً من ألياف العصب البصري في مناطق الشبكية المختلفة.

وفق الجدول التالي:

الرسم**	عدد الخلايا البصرية التي تقابل ليفاً بصرياً واحداً	الخلايا البصرية	المنطقة على الشبكية
	يتقابل كل مخروط مع ليف واحد	مخاريط فقط	الحفرة المركزية (النقرة)
	العديد من العصي والمخاريط تقابل ليف واحد من ألياف العصب البصري	تغزر المخاريط وتقل العصي	اللطقة الصفراء
	العديد من العصي والمخاريط تقابل ليف واحد من ألياف العصب البصري	تغزر العصي وتقل المخاريط	الشبكية المحيطية
	تتقابل كل 200 عصية مع ليف واحد	عصي فقط	الشبكية الأكثر محيطية
	لا يوجد	خالية من العصي والمخاريط	النقطة العمياء (القرص البصري)

أفسر:

حدة الإبصار العالية في الحفرة المركزية (النقرة).

لأنها تحوي مخاريط فقط، وكل مخروط يتقابل مع ليف واحد من ألياف العصب البصري.

أفسر:**حدة الإبصار المنخفضة في الشبكية الأكثر محيطية.**

لأنها تحوي عصي فقط، وكل 200 عصبية تقابل ليف واحد من ألياف العصب البصري.

- 1- كيف تتوزع الخلايا البصرية في الشبكية؟
- 2- ماذا ينتج عن: توزع الخلايا البصرية في الشبكية بشكل غير متجانس؟
- 3- فسر: اختلاف حدة الإبصار في مناطق الشبكية المختلفة.
- 4- قارن بين:
- 5- (الحفيرة المركزية (النقرة) - اللطخة الصفراء - الشبكية المحيطية - الشبكية الأكثر محيطية - النقطة العمياء (القرص البصري)).
- 6- من حيث: نوع الخلايا البصرية فيه - وعدد الخلايا البصرية التي تقابل ليفاً بصرياً واحداً.
- 7- أفسر حدة الإبصار العالية في الحفيرة المركزية (النقرة).
- 8- أفسر حدة الإبصار المنخفضة في الشبكية الأكثر محيطية.
- 9- ماذا ينتج عن: وجود مخاريط فقط في الحفيرة المركزية وتقابل كل مخروط مع ليف واحد من ألياف العصب البصري؟
- 10- ماذا ينتج عن: وجود عصي فقط في الشبكية الأكثر محيطية وتقابل كل 200 عصبية مع ليف واحد من ألياف العصب البصري؟

حازم ضعيف

التقويم النهائي**أولاً: أكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:**

1. باحة على الشبكية مقابل الحدقة تكثر فيها المخاريط وتقل العصي.
2. منخفض صغير في مركز اللطخة الصفراء تحوي مخاريط فقط.
3. منطقة خروج ألياف العصب البصري من الشبكية ينعدم فيها الإبصار.

ثانياً: أقرن بين:

- 1- الحفيرة المركزية والمنطقة الأكثر محيطية في الشبكية من حيث: حدة الإبصار - الخلايا البصرية في كل منهما - عدد الخلايا البصرية التي تقابل ليفاً بصرياً واحداً.
- 2- أصبغة العصي وأصبغة المخاريط من حيث: الجذر البروتيني.

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. تعد العصي والمخاريط (الخلايا البصرية) مستقبلات أولية.
2. ينعدم الإبصار في منطقة النقطة العمياء.
3. العصي مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة الضعيفة.
4. المخاريط قادرة على تمييز الألوان أما العصي فلا تميز الألوان.
5. المخاريط مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة القوية.

رابعاً: ما طبقات الوريقة العصبية في الشبكية من الخارج إلى الداخل.**خامساً: ما وظيفة كل مما يأتي:**

- الخلايا المقرنية - الخلايا الأفقية - الجسم المشبكي -
الصبغ الأسود الموجود في الوريقة الصبغية الخارجية من الشبكية

حل التقويم النهائي

أولاً- أكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:

- أ- باحة على الشبكية مقابل الحدقة تغزر فيها المخاريط و تقل العصي (اللطخة الصفراء)
- ب- منخفض صغير في مركز اللطخة الصفراء تحوي مخاريط فقط (الحفيرة المركزية)
- ج- منطقة خروج ألياف العصب البصري من الشبكية ينعدم فيها الإبصار (النقطة العمياء)

ثانياً- أقرن بين الحفيرة المركزية والمنطقة الأكثر محيطية من الشبكية من حيث:

وجه المقارنة	الحفيرة المركزية (النقرة)	المنطقة الأكثر محيطية في الشبكية
حدة الإبصار	عالية	منخفضة
الخلايا البصرية	مخاريط فقط	عصي فقط
عدد الخلايا التي تقابل ليفاً بصرياً واحداً	كل مخروط يتقابل مع ليف	كل 200 عصبية تتقابل مع ليف

الجذر البروتيني في أصبغة العصي	الجذر البروتيني في أصبغة المخاريط
السكرتوبسين	الفوتوبسين

ثالثاً- أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- 1- تعد العصي و المخاريط (الخلايا البصرية) مستقبلات أولية. (لأنها من منشأ عصبي)
- 2- ينعدم الإبصار في منطقة القرص البصري أو النقطة العمياء. (خلوها من العصي و المخاريط)
- 3- العصبية مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة الضعيفة. (لأن صباغ الرودوبسين يتفكك في الضوء الضعيف فيصبح فعالاً.)

4- المخاريط قادرة على تمييز الألوان أما العصي فلا تمييز الألوان. (تتمكن المخاريط من تمييز الألوان لأن الأنواع الثلاثة من أصبغة المخاريط مختلفة الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة، بينما تعجز العصي عن تمييز الألوان لأنها تحتوي على صباغ الرودوبسين فقط فهي متساوية الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.)

- 5- المخاريط مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة القوية. (لأن أصبغتها تتفكك في الضوء القوي فتصبح فعالة.)

رابعاً- ما طبقات الوريقة العصبية في الشبكية من الخارج إلى الداخل؟
الوريقة العصبية:

- تتألف من ثلاث طبقات خلوية بينها طبقتين من المشابك العصبية مرتبة من الخارج إلى الداخل:
- 1- الطبقة الخارجية: تحتوي على الخلايا البصرية العصبي و المخاريط وهي عصبونات ثنائية القطب.
 - 2- طبقة المشابك العصبية الخارجية.
 - 3- الطبقة الوسطى: تحوي أنماطاً خلوية عدة (عصبونات ثنائية القطب ،خلايا أفقية ،خلايا مقرنية).

- 4- طبقة المشابك العصبية الداخلية.
5- الطبقة الداخلية: تحوي عصبونات عقدية متعددة الأقطاب تشكل محاورها ألياف العصب البصري.

خامساً- ما وظيفة كل مما يلي:

الخلايا المقرنية:

تساعد في تكامل السيالات العصبية الواردة من الخلايا البصرية إلى الخلايا العقدية قبل مغادرتها من الشبكية إلى الفص القفوي.

الخلايا الأفقية:

تؤمن اتصالات شبكية أفقية بين الخلايا البصرية والعصبونات ثنائية القطب في طبقة المشابك العصبية الخارجية.

الجسيم المشبكي:

يؤمن الاتصال المشبكي بين العصبية و العصبون ثنائي القطب.


الصبغ الأسود الموجود في الوريقة الخارجية الصبغية من الشبكية:

- 1- يخزن كميات كبيرة من فيتامين A الضروري لتركيب الأصبغة البصرية.
- 2- ويمتص الفائض من الأشعة الضوئية التي تجتاز الخلايا البصرية، ويمنع انعكاسها، مما يسهم في وضوح الرؤية.

حازم ضعيف

الدرس(6): المستقبلات الضوئية (2)

مقدمة



*

ماذا لو خلت الخلايا البصرية من الأصبغة؟
تتعدم قدرتها على الاستقبال الضوئي

الخلايا البصرية (وظيفتها):
تكيفت لاستقبال: المنبهات الضوئية (وظيفة المنبه الضوئي):
التي تفكك الأصبغة البصرية في الخلايا البصرية.

سندرس فيما يلي آلية عمل العصية في كل من:

- حالة الظلام (الراحة)
- حالة الضوء الضعيف (العمل)

- 1- ما كان ليحدث لو خلت الخلايا البصرية من الأصبغة؟
- 2- اذكر وظيفة الخلايا البصرية.
- 3- اذكر وظيفة المنبهات الضوئية.

العصية في حالة الظلام (الراحة)

من خلال الأشكال الآتية، أتعرف آلية عمل العصية
وأجيب عن الأسئلة التي تلي الأشكال:
في حالة الظلام (الراحة):

بوابات قنوات الصوديوم في غشاء القطعة
الخارجية
تكون مفتوحة
بسبب ارتباط المركب cGMP بها.



تدخل Na^+
إلى: القطعة الخارجية
عن طريق: قنواتها الميوية.

تخرج Na^+
من: القطعة الداخلية
بعمل: مضخات الصوديوم والبوتاسيوم.



يكون استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعصية
 -40 mV
وليس -70 mV كما هو الحال في المستقبلات
الأخرى.


في الظلام (راحة)

تكون بوابات قنوات الصوديوم
مفتوحة بسبب ارتباط المركب
cGMP بها.



2

يكون استقطاب
غشاء القطعة
الخارجية للعصية
 -40 mV وليس
 -70 mV كما
هو الحال في
المستقبلات
الأخرى.



تدخل Na^+ إلى القطعة
الخارجية عن طريق
قنواتها الميوية.

1

تخرج Na^+ من القطعة
الداخلية بعمل مضخات
الصوديوم والبوتاسيوم.

3

تحرر النواقل العصبية
المثبثة (غلوتامات).



تحرير النواقل
العصبية المثبثة
للعصبون ثنائي
القطب

العصبون العنقي
في حالة الراحة

<p>8- ماذا ينتج عن:</p>	<p>↓</p>
<p>- بقاء قنوات الصوديوم مفتوحة في غشاء القطعة الخارجية للعصية؟</p>	<p>تحرر النواقل العصبية المثبطة (الغلوتامات) من العصية</p>
<p>- خروج شوارد الصوديوم من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم ودخولها إلى القطعة الخارجية عبر قنواتها؟</p>	<p>للعصبون ثنائي القطب</p>
<p>- زوال الاستقطاب الجزئي -40 mV في غشاء القطعة الخارجية؟</p>	<p>↓</p>
<p>- تثبيط العصبون ثنائي القطب؟</p>	<p>العصبون العقدي في حالة الراحة</p>
<p>9- فسر:</p>	<p>- ما قيمة الاستقطاب في غشاء القطعة الخارجية للعصية في الظلام؟ ولماذا؟</p>
<p>- يكون العصبون العقدي في حالة الراحة في الظلام؟</p>	<p>40 mV - لأن شوارد الصوديوم التي تخرج من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم وتدخل إلى القطعة الخارجية عبر قنواتها.</p>
<p>- يكون استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعصية -40 mV وليس -70 mV كما هو الحال في المستقبلات الأخرى.</p>	<p>- ما سبب تثبيط النقل في العصبون ثنائي القطب في حالة الراحة؟</p>
<p>- تدخل شوارد الصوديوم إلى داخل القطعة الخارجية للعصية عبر قنواتها.</p>	<p>لأن الجسيم المشبكي في العصية يحرر الناقل العصبي المثبط (غلوتامات) في أثناء الراحة .</p>
<p>1- لماذا تكون قنوات الصوديوم مفتوحة في غشاء القطعة الخارجية للعصية في أثناء الظلام؟</p>	<p>1- لماذا تكون قنوات الصوديوم مفتوحة في غشاء القطعة الخارجية للعصية في أثناء الظلام؟</p>
<p>2- كيف تدخل شوارد الصوديوم إلى داخل القطعة الخارجية؟</p>	<p>2- كيف تدخل شوارد الصوديوم إلى داخل القطعة الخارجية؟</p>
<p>3- كيف تخرج شوارد الصوديوم إلى خارج القطعة الداخلية؟</p>	<p>3- كيف تخرج شوارد الصوديوم إلى خارج القطعة الداخلية؟</p>
<p>4- ما قيمة الاستقطاب في غشاء القطعة الخارجية للعصية في الظلام؟ ولماذا؟</p>	<p>4- ما قيمة الاستقطاب في غشاء القطعة الخارجية للعصية في الظلام؟ ولماذا؟</p>
<p>5- ما قيمة استقطاب الغشاء في معظم المستقبلات؟</p>	<p>5- ما قيمة استقطاب الغشاء في معظم المستقبلات؟</p>
<p>6- ما هو الناقل الكيميائي بين العصية والعصبونات ثنائية القطب؟ وما نوعه؟ وما نوع كيون العمل المتشكل في العصبون ثنائي القطب عند ارتباطه مع هذا الناقل؟</p>	<p>6- ما هو الناقل الكيميائي بين العصية والعصبونات ثنائية القطب؟ وما نوعه؟ وما نوع كيون العمل المتشكل في العصبون ثنائي القطب عند ارتباطه مع هذا الناقل؟</p>



العصية في حالة الضوء الضعيف (العمل)

في حالة الضوء الضعيف (العمل):

الضوء الضعيف
↓
يفكك صباغ الرودوبسين
↓
يصبح الرودوبسين فعالاً
↓
فينشط مركب ترانسديوسين
↓
ينشط أنزيم فوسفودي استيراز
↓
تحويل المركب cGMP إلى GMP
↓
فتغلق بوابات قنوات الصوديوم
↓
يتوقف دخول Na^+ إلى القطعة الخارجية للعصية.
ويستمر خروج Na^+ من القطعة الداخلية
بعمل مضخات الصوديوم والپوتاسيوم.
↓
فرط استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعصية -70 mV
↓
توقف تحرير النواقل العصبية المثبطة
↓
توليد حالة تنبيه في العصبونات ثنائية القطب
↓

في الضوء الضعيف

يصبح الرودوبسين فعالاً فينشط مركب ترانسديوسين الذي ينشط أنزيم فوسفودي استيراز الذي يحول بدوره المركب cGMP إلى GMP فتغلق بوابات قنوات الصوديوم.



1 يتوقف دخول Na^+ إلى القطعة الخارجية.

2 يستمر خروج Na^+ من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والپوتاسيوم.

3 يتوقف تحرير النواقل العصبية (غلوتامات).

يحدث فرط استقطاب في غشاء القطعة الخارجية للعصية إذ يصبح -70mV

يؤدي توقف تحرير الناقل العصبي المثبط إلى توليد حالة تنبيه في العصبونات ثنائية القطب، تثير كمون عمل في العصبونات العقدية الذي ينتقل على شكل سيالة عصبية عبر ألياف العصب البصري إلى مركز الإبصار في القشرة المخية.

تنبيه العصبون العقدي (أي تثير كمون عمل في العصبونات العقدية)



ينتقل كمون العمل على شكل سيالة عصبية عبر ألياف العصب البصري إلى مركز الإبصار في القشرة المخية

لماذا تغلق قنوات الصوديوم في غشاء القطعة الخارجية للعصية في الضوء الضعيف؟

يصبح الرودوبسين فعالاً فينشيط مركب ترانسديوسين الذي ينشط أنظيم فوسفودي استيراز فيتحول المركب cGMP إلى GMP فتغلق بوابات قنوات الصوديوم.

2- متى ينشط مركب ترانسديوسين ؟
عندما يفعل الرودوبسين بالضوء الضعيف

3- ما دور أنظيم فوسفودي استيراز؟
تحويل المركب cGMP إلى GMP

4- ما سبب فرط استقطاب غشاء القطعة
الخارجية للعصية في الضوء الضعيف؟
بسبب توقف دخول Na^+ إلى القطعة
الخارجية للعصية واستمرار خروجها من
القطعة الداخلية
بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم.

5- بم تختلف آلية عمل المستقبلات
الضوئية عن آلية عمل باقي المستقبلات؟
إن كمون المستقبل الذي يتشكل في الخلايا
البصرية ينتج عن فرط الاستقطاب وليس
عن زوال الاستقطاب كبقية المستقبلات
الحسية

- 1- كيف يتفعل صباغ الرودوبسين في أغشية أقراص القطعة الخارجية للعصية؟
- 2- ماذا ينتج عن:
 - تفعل صباغ الرودوبسين.
 - تنشيط مركب ترانسديوسين.
 - تنشيط أنظيم فوسفو دي إسترز.
 - تحويل المركب cGMP إلى GMP في العصية.
 - إغلاق بوابات قنوات الصوديوم في غشاء القطعة الخارجية لعصية.
 - فرط استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعصية -70 mV
 - توقف تحرير النواقل العصبية المثبطة من العصية.
 - توليد حالة تنبيه في العصبونات ثنائية القطب في الوريقة العصبية لشبكية العين.
 - تنبيه العصبون العقدي في الوريقة العصبية لشبكية العين.
- 3- السؤال السابق من الأسفل للأعلى يصبح فسر.

الرؤية اللونية

ادرس المخطط الآتي الذي يوضح العلاقة

بين: طول الموجة الضوئية

و: النسبة المئوية لامتماصها من قبل أنواع المخاريط

والشكل المجاور له، ثم أكمل الجدول:

تختلف حساسية المخاريط لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة

(السبب:)

في شبكية العين ثلاثة أنواع من المخاريط

تختلف أصبغتها عن بعضها ب: نوع

الفوتوبسين.

يتم الإحساس برؤية لون معين:

(أين: في القشرة المخية)

بعد: وصول السيالات العصبية

الناجمة عن تنبيه:

- نوع واحد من المخاريط.

- أو نوعين منها.


- أو أنواع المخاريط الثلاثة

بنسب متفاوتة.


يتولد الإحساس برؤية اللون الأبيض:

عند:

تنبيه أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية



**



اللون	النسبة المئوية لامتماص		
	مخاريط الأزرق	مخاريط الأخضر	مخاريط الأحمر
نيلي	97	0	0
أخضر	36	67	31
أصفر	0	83	83
برتقالي	0	42	99
الأبيض	X	X	X


- 1- فسر: تختلف حساسية المخاريط لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.
- 2- ما الجزء المشترك وما الجزء المختلف بين الأصبغة الثلاثة للمخاريط؟
- ج- الجزء المشترك: الريتانال
الجزء المختلف: الفوتوبسين
- 3- حدد موقع الإحساس برؤية لون معين.
- 4- كيف يتم الإحساس برؤية لون معين؟
- 5- ماذا ينتج عن تنبيه نوع واحد أو نوعين أو أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متفاوتة؟
- 6- كيف يتولد الإحساس برؤية اللون الأبيض؟
- 7- ماذا ينتج عن تنبيه أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية؟

عمى الألوان

حالة طبيعية:

تمثل الصورة 1 رؤية طبيعية للألوان
بينما تمثل الصورة 2 رؤية لونية لشخص لديه مشكلة إبصارية،
أحاول أن أتعرف تلك المشكلة:

عمى اللون الأحمر و عمى اللون الأخضر (مرض دالتون)



اسم المرض	معلومات عن المرض	إصابة الذكور والإناث	تفسير إصابة الذكور والإناث
عمى اللون الأحمر والأخضر	هو (مرض دالتون)	الذكور < إناث (يصيب الذكور أكثر من الإناث)	1- لأن أليل المرض متنحي 2- وهذا الأليل محمول على الصبغي الجنسي X وليس له مقابل على الصبغي الجنسي Y الشرح: إصابة الذكر تتطلب أليلاً واحداً متنحياً وإصابة الأنثى تتطلب أليلين متنحيين على الشفع الصبغي الجنسي وهذا أقل احتمالاً
ضعف الأزرق	حالة وراثية نادرة	الذكور = الإناث	نتيجة عن مورثة متنحية على أحد أشعاع الصبغيات الجسمية

- 1- قارن بين الذكور والإناث من حيث الإصابة بعمى اللون الأحمر والأخضر.
- 2- فسر يصاب الذكور أكثر من الإناث بعمى اللون الأحمر والأخضر.
- 3- فسر تساوي نسبة الإصابة بين الذكور والإناث بضعف الأزرق.
- 4- اكتب المصطلح: حالة وراثية نادرة ناتجة عن مورثة متنحية على أحد أشعاع الصبغيات الجسمية.

تشكل الخيال على الشبكية

ألاحظ وأستنتج صفات خيال الجسم المرئي على الشبكية:

يتشكل على الشبكية خيال:

- 1- مصغر عن الصورة الأساسية للجسم المرئي
- 2- مقلوب رأساً على عقب.
- 3- معكوس من اليسار إلى اليمين.


(فسر:)

لأن عدسة العين محدبة الوجهين فإن القوة الكاسرة لها تجعل خيال الصورة مقلوباً رأساً على عقب ومعكوساً من اليسار إلى اليمين.

1- ما هي صفات الخيال المتشكل على الشبكية؟

2- فسر: يكون الخيال المتشكل على الجسم مقلوباً رأساً على عقب ومعكوساً من اليمين إلى اليسار.

3- قارن بين الجسم المرئي وبين خيال الجسم من حيث الحجم.




ضعيف

المطابقة


1- عند ابتعاد الجسم عن العين

المشكلة (☹️) يتوضع الخيال أمام الشبكية (رؤية غير واضحة)



صورة *

حل المشكلة (😊) إرجاع الخيال حتى ينطبق على الشبكية (تصبح الرؤية واضحة)



صورة *

خطوات المطابقة في هذه الحالة

تسترخي

الألياف الدائرية في العضلة الهدبية

يزداد توترها

الأربطة المعلقة

يتناقص

تحدب العدسة

تنقص

القوة الكاسرة

يكبر

البعد المحرقى


إرجاع الخيال حتى ينطبق على الشبكية (تصبح الرؤية واضحة)

النتيجة

المطابقة


2- عند اقتراب الجسم من العين

المشكلة (⊖) يتوضع الخيال خلف الشبكية (رؤية غير واضحة)



صورة *

حل المشكلة (⊕) تقدم الخيال حتى ينطبق على الشبكية (تصبح الرؤية واضحة)



صورة *

خطوات المطابقة في هذه الحالة

تتقلص

الألياف الدائرية في العضلة الهدبية

يتناقص توترها

الأربطة المعلقة

يزداد

تحدب العدسة

تزداد

القوة الكاسرة

يصغر

البعد المحرقى

تقدم الخيال حتى ينطبق على الشبكية (تصبح الرؤية واضحة)

النتيجة

دور المخ في الرؤية

المجال (الحقل) البصري :

مجموع النقاط التي يمكن رؤيتها
بـ: عين واحدة ثابتة
في: لحظة زمنية معينة،

ويشكل: مخروطاً في الفراغ
ذروته: عند العين،
وقاعدته: بعيداً عنها.

دور المخ:

يتشكل للجسم الواحد:

خيالان على منطقتين متناظرتين من الشبكيّتين
يصلان عبر:

المسالك البصرية

إلى: المخ

الذي يقوم بـ: دمج الخيالين معاً
(بالنتيجة):

مما يؤمن الرؤية المجسمة (وهي):
رؤية صورة واحدة للجسم بأبعاده الثلاثة.

1- ما أهمية انطباع الحقلين البصريين على منطقتين
متناظرتين من الشبكيّتين؟
يؤمن الرؤية المجسمة

2- ما دور المخ في رؤية صورة واحدة للخيالين المنطبعين
على الشبكيّتين؟
يقوم المخ بدمج الخيالين معاً

1- ماذا أسمى مجموع النقاط المرئية في كل عين؟

2- عرف الحقل البصري.


3- كيف يكون شكل الحقل البصري؟ وحدد موقع ذروته وقاعدته.

4- ما أهمية انطباع الحقلين البصريين على منطقتين متناظرتين من الشبكيّتين؟

5- ما دور المخ في رؤية صورة واحدة للخيالين المنطبعين على الشبكيّتين؟

6- ماذا ينتج عن دمج الخيالين المتشككين على الشبكيّتين؟

7- ماذا تسمى رؤية صورة واحدة للجسم بأبعاده الثلاثة؟



بعض الأمراض العينية

سندرس عن الأمراض العينية التالية:

- 1- اللابورية
- 2- الساد (الماء الأبيض)
- 3- اعتلال الشبكية السكري.
- 4- انفصال الشبكية.

1- لا يوجد أسئلة.. أتمنى لك التوفيق والسعادة 😊

حازم ضعيف

اللابؤية (حرج البصر) (أستيجماتيزم)

حالة اللابؤية

= حرج البصر = أستيجماتيزم
يتوضع:جزء من الخيال على الشبكية
وجزاء أمام الشبكية
وجزاء خلف الشبكية.




السبب:

ثخانة القرنية تكون غير متجانسة

ويتم تصحيح الرؤية:

- باستخدام عدسات طبية أسطوانية.
- أو بمعالجة القرنية المصابة بالليزك.

- 1- أين يتوضع الخيال بالنسبة للشبكية في حرج البصر؟
- 2- كيف يتم تصحيح حرج البصر؟
- 3- فسر: الإصابة باللابؤية.
- 4- ماذا ينتج عن: عدم تجانس القرنية.

اللابؤية
(حرج البصر = أستيجماتيزم)التصحيح بالعدسة
(عدسات طبية أسطوانية)التصحيح بالليزك
معالجة القرنية المصابة بالليزك

الساد (الماء الأبيض)**الساد (الماء الأبيض)**

تصبح عدسة العين معتمة
نتيجة: لتخثر الألياف البروتينية فيها
وتصيب هذه الحالة: عدداً كبيراً من المسنين


وتعالج:

بإستئصال العدسة، وزرع عدسة صناعية.

- 1- كيف تكون العدسة في مرض الساد؟
- 2- فسر: تصبح عدسة العين معتمة في مرض الساد.
- 3- ماذا ينتج عن: تخثر الألياف البروتينية في العدسة (الجسم البلوري)؟
- 4- من هم الأكثر عرضة للإصابة بالماء الأبيض؟
- 5- كيف يعالج الساد؟



**





*

اعتلال الشبكية السكري**اعتلال الشبكية السكري :****الآلية المرضية:****نتيجة:** الداء السكري ←

تنمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط ←
 لتمتد إلى المسافة بين وريقتي الشبكية ويتسرب الدم منها ←
 مما يسبب: تضرر الخلايا البصرية - وتناقصاً تدريجياً في
 حدة الرؤية.

تعالج الحالة:

بالليزر؛ (فسر:) لسد الأوعية الدموية وإيقاف تدفق الدم منها.

عين
سليمةاعتلال
الشبكية
السكري

تنمو الأوعية الدموية
الصغيرة في الشبكية
بشكل مفرط
لتمتد إلى المسافة بين
وريقتي الشبكية ويتسرب
الدم منها
مما يسبب تضرر
الخلايا البصرية
وتناقصاً تدريجياً في
حدة الرؤية

1- ما هي الآلية المرضية لاعتلال الشبكية السكري؟

2- ماذا ينتج عن:

- نمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط؟

- امتداد الأوعية الدموية الصغيرة إلى المسافة بين وريقتي الشبكية وتسرب الدم منها؟

3- فسر: تضرر الخلايا البصرية والتناقص التدريجي في حدة الرؤية في اعتلال الشبكية السكري.

ج- نتيجة: نمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط

لتمتد إلى المسافة بين وريقتي الشبكية وتسرب الدم منها.

4- كيف يعالج اعتلال الشبكية السكري؟

5- فسر: يعالج اعتلال الشبكية السكري بالليزر.

انفصال الشبكية


انفصال الشبكية:

نتيجة:

- الرض القوي المفاجئ،
 - أو نقص كمية الخلط الزجاجي
- يحدث: فقدان ارتباط وريقتي الشبكية ببعضهما
(بالنتيجة): مما يسبب العمى.

العلاج:

إعادة ارتباط وريقتي الشبكية بسرعة،
ويمكن ذلك:
بواسطة الإشعاعات الليزرية.



- 1- ما أسباب انفصال الشبكية؟
- 2- ماذا ينتج عن: الرض القوي المفاجئ، أو نقص كمية الخلط الزجاجي في كرة العين؟
- ج- فقدان ارتباط وريقتي الشبكية ببعضهما مما يسبب العمى.
- 3- فسر: فقدان ارتباط وريقتي الشبكية ببعضهما و الإصابة بالعمى.
- 4- كيف يعالج انفصال الشبكية؟
- 5- ماذا ينتج عن: إعادة ارتباط وريقتي الشبكية المنفصلتين بسرعة بواسطة الإشعاعات الليزرية؟
- ج- علاج انفصال الشبكية.

ضعيف

تلخيص أمراض العين:

مكان الإصابة	سبب المرض	العلاج	أخرى
اللابورية	القرنية	- باستخدام عدسات طبية أسطوانية. - أو بمعالجة القرنية المصابة بالليزر.	يتوضع: جزء من الخيال على الشبكية وجزء أمام الشبكية وجزء خلف الشبكية
الساد (الماء الأبيض)	العدسة (الجسم البلوري)	لتخثر الألياف البروتينية في العدسة	تصيب هذه الحالة: عدداً كبيراً من المسنين
اعتلال الشبكية السكري	الشبكية	تنمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط لتمتد إلى المسافة بين وريقتي الشبكية ويتسرب الدم منها مما يسبب تضرر الخلايا البصرية وتناقصاً تدريجياً في حدة الرؤية	بالليزر؛ لسد الأوعية الدموية وإيقاف تدفق الدم منها
انفصال الشبكية	الشبكية	نتيجة: الرض القوي المفاجئ، أو نقص كمية الخلط الزجاجي يحدث: فقدان ارتباط وريقتي الشبكية ببعضهما مما يسبب العمى	إعادة ارتباط وريقتي الشبكية بسرعة، ويمكن ذلك: بواسطة الإشعاعات الليزرية

التقويم النهائي**أولاً: أختار الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:****1. يتوّد الإحساس باللون الأبيض عند تنبيه:**

- أ- نوع واحد من المخاريط. ب- نوعين من المخاريط.
ج- أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية. د- أنواع المخاريط الثلاثة بنسب مختلفة.

2. اقتراب الجسم المرئي من العين يسبب:

- أ- نقص القوة الكاسرة. ب- زيادة تحدب الجسم البلوري
ج- زيادة البعد المحرق. د- استرخاء الألياف العضلية الدائرية في الجسم الهدبي.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. تبقى قنوات الصوديوم مفتوحة في غشاء القطعة الخارجية للعصية في أثناء الراحة (الظلام)
2. يصبح الجسم البلوري غير نفوذ للضوء عند الإصابة بالساد.
3. يتشكل للجسم المرئي خيال مقلوب ومعكوس على الشبكية.
4. تختلف حساسية أنواع المخاريط لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.

ثالثاً: أضع كلمة (صح) في نهاية كل عبارة تتوافق مع توقف تحرير النواقل العصبية المثبطة من العصية:

- أ- ارتباط مركب cGMP بقنوات الصوديوم.
ب- نشاط أنزيم فوسفو دي استيراز.
ج- استقطاب غشاء القطعة الخارجية -40mv
د- توقف دخول شوارد Na^+ إلى القطعة الخارجية

ضعيف

حل التقويم النهائي

أولاً - اختار الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

- 1- تولد الإحساس باللون الأبيض عند تنبيهه: ج - أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية
2- عندما يقترب الجسم المرئي من العين يسبب: ب- يزداد تحذب الجسم البلوري

ثانياً - أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- 1- تبقى قنوات الصوديوم مفتوحة في غشاء القطعة الخارجية للعصية في أثناء الراحة (الظلام).
(بسبب ارتباط مركب cGMP بها)
2- تصبح عدسة الجسم البلوري غير نفوذة للضوء عند الإصابة بالساد.
(بسبب تخثر الألياف البروتينية في الجسم البلوري).
3- يتشكل للجسم المرئي خيلاً مقلوباً ومعكوساً على الشبكية.
(بسبب القوة الكاسرة للجسم البلوي هو عدسة محدبة الوجهين).
4- تختلف حساسية أنواع المخاريط لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.
(لاختلاف نوع الفوتوبسين في أصبغة المخاريط ؛ إذ يوجد ثلاثة أنواع منه).

ثالثاً - أضع كلمة صح في نهاية كل عبارة تتوافق مع توقف تحرير النواقل العصبية المثبطة من العصية:

- أ - ارتباط مركب cGMP بقنوات الصوديوم.
ب- نشاط أنزيم فوسفو دي استراز.
ج- استقطاب غشاء القطعة الخارجية -mv40
د- توقف دخول شوارد Na^+ إلى القطعة الخارجية

(صح)

(صح)

لمزيد من الشروحات والنماذج والأسئلة المؤتمتة يرجى الانضمام إلى قناة
المدرس على التلغرام:

علوم بكالوريا مع د.حازم ضعيف

<https://t.me/science12hazem>




قسم التنسيق الهرموني



الدرس(1): التنسيق الهرموني (الحائي) عند الإنسان

مقدمة	
	<p>تتواصل خلايا الكائن الحي مع بعضها (كيف): عن طريق: إشارات (رسائل) كيميائية، ترسل من: بعض الخلايا لترتبط مع: مستقبلات بروتينية في الخلايا الهدف وظيفة الخلايا الهدف: تستجيب بطريقة نوعية ومبرمجة</p>
	<p>1- كيف تتواصل خلايا الكائن الحي مع بعضها؟ 2- أين ترتبط الإشارات (الرسائل) الكيميائية ضمن الخلية الهدف؟ 3- اذكر وظيفة الخلية الهدف للرسائل الكيميائية.</p>

طرائق الإشارات بين خلوية						
صورة *	مثال	وظيفة الإشارة	الهدف	الطريق	الإشارة المرسلة	الإشارة
	هرمونات: الغدة الدرقية		إلى الخلايا الهدف	تنتقل عن طريق: الدم واللمف	الجزينات المرسلة	إشارة صماوية
	هرمونات: - الغاسترين - الأنسولين - الغلوكاغون		تؤثر في: الخلايا القريبة جداً من مصدر الإشارة		الجزينات المرسلة	إشارة نظيرة صماوية
	ناقل: الأسيتيل كولين	لتحفز استجابات في الخلايا الهدف	تؤثر في: الخلايا المجاورة (عصبونات - عضلات - غدد)	من خلال: مشابك	النواتل العصبية	إشارة مشبكية
	هرمون: الإستروجين	لتحفز استجابة بها	ترتبط مع: مستقبلات: على الخلية ذاتها - أو خلايا من النوع ذاته		الرسائل المفرزة من الخلية	إشارة ذاتية
	هرمونات: - النورأدرينالين - الأوكسيتوسين - ADH	لتحفز استجابات في الخلايا الهدف في أي مكان من الجسم	نحو الخلايا الهدف	تنتشر إلى: مجرى الدم	الهرمونات العصبية	إشارة عصبية صماوية

 <p>النمل الآسيوي</p>	<p>تواصل: النمل الآسيوي عبر: الفيرمونات</p>		<p>إلى كائن آخر</p>	<p>تنتقل بواسطة: البيئة</p>	<p>الفيرمونات: مواد كيميائية تفرز من كائن وتنتقل بواسطة البيئة لتؤثر في كائن آخر</p>	<p>إشارات فيرمونية</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--	---------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

الأسئلة عن فقرة: طرائق الإشارات بين خلوية:

- 1- قارن بين:
الإشارة المشبكية – الإشارة نظيرة الصماوية – الإشارة الذاتية – الإشارة العصبية الصماوية – الإشارة الصماوية من حيث:
الهدف – والمثال عن كل منها
- 2- ما هو طريق انتقال كل من: الإشارة المشبكية – الإشارة العصبية الصماوية – الإشارة الصماوية.
- 3- عرف الفيرمونات. وكيف تنتقل إلى الكائن الآخر؟ واذكر مثلاً عنها.
- 4- ما نوع كل من الإشارات التالية: (هرمونات الدرقية – الإستروجين – الأستيل كولين – الأنسولين – الأوكسيتوسين – تواصل النمل الآسيوي – النورأدرينالين – الغاسترين – الهرمون المضاد للإبالة – الغلوكاغون).

أنواع الغدد في الجسم

يوجد ثلاثة أنواع من الغدد في الجسم:

1. غدد خارجية الإفراز مثل: الغدة العرقية.
2. غدد داخلية الإفراز (الغدد الصم) مثل: الدرقية.
3. غدد مختلطة مثل: البنكرياس – الخصية – المبيض.


- 1- عدد أنواع الغدد في الجسم. مع مثال لكل نوع.
- 2- ما نوع كل من الغدد التالية: (البنكرياس – الغدة العرقية – الخصية – الغدة الدرقية – المبيض).

يوجد ثلاث أنواع من الغدد في الجسم ماهي ؟ مع الأمثلة .


2- غدد داخلية الإفراز (الغدد الصم)
كالغدة الدرقية



1- غدد خارجية الإفراز
كالغدد العرقية



كالبنكرياس
والخصيتين و المبيضين



3- غدد مختلطة

التنسيق العصبي - والتنسيق الهرموني**التشابه بين التنسيق العصبي والتنسيق الهرموني:**

- يتشارك الجهازان العصبي والهرموني في التحكم بوظائف الجسم المختلفة والمحافظة على الاستتباب.

- يتشارك الجهازان العصبي والهرموني في العديد من الرسائل الكيميائية:

فالأدرينالين والنورأدرينالين

يعدان من الهرمونات عندما:

يتم تحريرهما إلى مجرى الدم، وذلك من: لب الكظر.

ويعدان من النواقل العصبية عندما:

يتم تحريرهما في المشابك.

الفروق بين عمل كل من التنسيق العصبي والهرموني:

التنسيق الهرموني	التنسيق العصبي	
بطيء	سريع	السرعة
طويل الأمد	قصير الأمد	مدة التأثير
مواد كيميائية (هرمونات) تنتقل عن طريق: الدم - واللمف	نواقل كيميائية تسبب: تشكيل سيالات عصبية	الإشارة

1- ما هي أوجه التشابه بين التنسيق العصبي والتنسيق الهرموني؟

2- متى يعد الأدرينالين والنورأدرينالين هرمونات؟

3- متى يعد الأدرينالين والنورأدرينالين نواقل عصبية؟

4- هل تعتبر الأدرينالين والنورأدرينالين من لب الكظر هرمونات أم نواقل عصبية؟

5- هل يعتبر النورأدرينالين والأستيل كولين في


الجملتين الودية ونظيرة الودية هرمونات أم نواقل

عصبية؟


6- قارن بين التنسيق الهرموني والتنسيق العصبي من

حيث:

السرعة - مدة التأثير - الإشارة.



مواد كيميائية (هرمونات)
تنتقل عن طريق: الدم - واللمف



التنسيق العصبي

نواقل كيميائية
تسبب:

تشكيل سيالات عصبية

انتقال الهرمونات من: الغدد الصم إلى: الأنسجة الهدف

كيف تنتقل الهرمونات من الغدد الصم إلى الأنسجة الهدف؟

تنتقل الهرمونات عبر الدم واللمف، ونميز نوعين من الهرمونات:**1- الهرمونات المنحلة في الدم:**

تنتقل في الدم مرتبطة مع: بروتينات ناقلة.

إذ يرتبط 90 % من الهرمونات

مع: بروتينات بلازما الدم بشكل: معقد

ويمثل: الشكل غير الفعال للهرمون

المعقد: ينتج عن: ارتباط هرمون + بروتين ناقل**من البروتينات الناقلة:** الألبومينات - والغلوبولينات

(فسر:) أهمية الارتباط بين الهرمونات والبروتينات الناقلة:

- يعد مخزناً للهرمون في الدم، ينفك عند الحاجة.
- لا تستطيع الهرمونات ذات الطبيعة الدسمة (ستيروئيدات) الانتقال في الدم إلا بارتباطها مع بروتين ناقل.


2- الهرمونات المنحلة في الماء:

تنتقل منحلة في المصورة (البلازما).

10% من الهرمونات يبقى حراً

وظيفة الهرمون المنحل في الماء:

يمثل: الشكل الفعال و يؤثر في الأنسجة الهدف.



هرمونات مرتبطة	هرمونات حرة	
90% من الهرمونات	10% من الهرمونات	النسبة
يمثل: الشكل غير الفعال للهرمون	يمثل: الشكل الفعال للهرمون ويؤثر في الأنسجة الهدف	الوظيفة
الهرمونات المنحلة في الدم (ذات الطبيعة الدسمة) (الستيروئيدات)	الهرمونات المنحلة بالماء	تشمل
هرمون + بروتين ناقل = معقد	هرمون	البنية

1- قارن بين الهرمونات الحرة والهرمونات المرتبطة من حيث: نسبتها - الوظيفة - الهرمونات التي تشملها - البنية

2- ماذا ينتج عن ارتباط الهرمون مع بروتين ناقل؟

3- فسر: أهمية الارتباط بين الهرمونات والبروتينات الناقلة.

4- متى يكون الهرمون فعالاً ومتى يكون غير فعال؟

الخلايا الغذائية الصماوية المبعثرة أو المجتمعة


يوجد العديد من:

- الخلايا الغذائية الصماوية المبعثرة
- أو الخلايا الغذائية الصماوية المجتمعة

تقع: في أماكن متفرقة من الجسم مثل:

- الوطاء
- مخاطية المعدة
- الأمعاء
- النسيج الكبدي
- النسيج الكلوي
- النسيج القلبي

1- حدد موقع الخلايا الغذائية الصماوية المبعثرة والمجتمعة.



**

أهم الغدد الصم عند الإنسان

ستقتصر دراستنا على عمل الغدد الصم


وظيفة الغدد الصم:


تقوم بإفراز الهرمونات (الإشارات الصماوية) وتلقي بها في الدم مباشرة.

سندرس فيما يلي الغدد التالية:

- 1- الغدة النخامية
- 2- الغدة الدرقية
- 3- قشر الكظر
- 4- لب الكظر
- 5- الغدة الصنوبرية

- 1- اذكر وظيفة الغدد الصم.
- 2- اذكر 5 أمثلة عن الغدد الصم.





الغدة النخامية

ألاحظ الشكل المجاور وأستنتج موقع وأقسام الغدة النخامية.

الغدة النخامية

تقع: على الوجه السفلي للدماغ وترتبط بالوطاء
حجمها: بحجم حبة البازلاء
وزنها: من 1- 0,5 غرام لدى البالغين

كيف ترتبط الغدة النخامية بالوطاء؟
بوساطة: السويقة النخامية

- تعد الغدة النخامية أهم الغدد الصم (فسر):
لأنها تسيطر على عمل معظم الغدد الصم الأخرى.

ماذا يحدث للغدة النخامية إذا فقدت الاتصال بالوطاء؟
تفقد النخامة وظائفها لفقدانها الارتباط العصبي والارتباط
الدموي مع الوطاء

ما قسما الغدة النخامية؟


- 1- نخامة أمامية غدية (فص أمامي غدي).
- 2- نخامة خلفية عصبية (فص خلفي عصبي).

- 1- حدد موقع الغدة النخامية.
- 2- كم يبلغ حجم ووزن الغدة النخامية؟
- 3- كيف ترتبط الغدة النخامية بالوطاء؟
- 4- فسر: تعد الغدة النخامية أهم الغدد الصم.
- 5- ماذا ينتج عن: فقدان اتصال الغدة النخامية بالوطاء؟
- 6- ما قسما الغدة النخامية؟

1- نخامة أمامية غدية (فص أمامي غدي)**النخامة الأمامية:****وظيفتها:**

تفرز مجموعة من الهرمونات:

- يسيطر بعض هذه الهرمونات على عمل الغدد الصم الأخرى.
- ويؤثر بعضها الآخر في أنسجة مختلفة من الجسم.

الهرمونات المفرزة من النخامة الأمامية الغدية:

وظيفة الهرمون	ترميز الأحرف (للاطلاع فقط)	الهرمون
ينظم نمو: - العظام - والأنسجة الأخرى.	G rowth H ormone	GH هرمون النمو
ينشط: خلايا الجلد لإنتاج: الميلانين	M elanocyte S timulating H ormone	MSH
ينشط: الغدة الثديية لإنتاج: الحليب	P ROLACTIN	PRL
ينشط: قشرة الكظر لإفراز: هرموناتها	A dreno- C ortico- T ropic H ormone	ACTH
ينشط: الغدة الدرقية لإفراز: هرموناتها	T hyroid S timulating H ormone	TSH
ينشطان: الغدة الجنسية لإفراز: هرموناتها	F ollicle S timulating H ormone	FSH
	L uteinizing H ormone	LH

الطبيعة الكيميائية لهرمونات النخامة السابقة:
بروتينية

موقع مستقبل الهرمونات السابقة:

في الغشاء الخلوي أو على سطحه (لأنها هرمونات بروتينية).

سندرس من الجدول السابق هرمون النمو فقط في الفقرة التالية.

1- اذكر وظيفة النخامة الأمامية (الفص الأمامي للغدة النخامية).

2- عدد الهرمونات المفرزة من النخامة الأمامية.

3- اذكر وظيفة: هرمون النمو – PRL – MSH – LH – FSH – TSH – ACTH

4- ما هي الطبيعة الكيميائية للهرمونات المفرزة من النخامة الأمامية (هرمون النمو – PRL – MSH – LH – FSH – TSH – ACTH) وأين تقع مستقبلاتها؟

	- هرمون النمو GH
<p style="text-align: center;">هرمون النمو GH</p> <p>الكبد</p> <p>تحرير عوامل النمو (السوماتوميدين) IGF-1</p> <p>تحفز بشكل مباشر نمو العظام والغضاريف</p> <p>نسيج ضامة - وظهرية</p> <p>يحفزها على: الانقسام - والتمايز</p>	<p>هرمون النمو GH</p> <p><u>تعريفه:</u> هرمون يفرز من النخامة الأمامية ويؤثر في معظم الأنسجة والأعضاء.</p> <p><u>وظيفته:</u> ينظم نمو:</p> <ul style="list-style-type: none"> - العظام - والأنسجة الأخرى. <p><u>أهم تأثيراته:</u></p> <p>1- في الكبد يؤدي إلى: تحرير عوامل النمو (السوماتوميدين)</p> <p><u>وظيفة عوامل النمو (السوماتوميدين):</u></p> <p>تدور في الدم وتحفز بشكل مباشر نمو: الغضاريف - والعظام.</p>
	<p>2- <u>يحفز:</u> النسيج الضامة - والظهارية على: الانقسام - والتمايز.</p> <p>1- عرف هرمون النمو.</p> <p>2- اذكر وظيفة هرمون النمو.</p> <p>3- اذكر تأثيرات هرمون النمو.</p> <p>4- ماذا ينتج عن: تأثير هرمون النمو على الكبد؟</p> <p>5- ماذا ينتج عن: تأثير هرمون النمو على النسيج الضامة والظهارية؟</p> <p>6- اذكر وظيفة وظيفة عوامل النمو (السوماتوميدين).</p>

نتائج نقص أو زيادة إفراز هرمون GH

سندرس الحالات التالية:

- 1- نقص إفراز هرمون النمو لدى الأطفال
- 2- زيادة إفراز هرمون النمو لدى الأطفال
- 3- زيادة الإفراز لدى الشباب 18 – 20 سنة



ما هي صفات القزم؟

يكون طول القزم أقل من 1.2 متر
و يتمتع بقوى عقلية طبيعية . و لا يبدي أي تشوّه في البنية

*

1- نقص إفراز هرمون النمو لدى الأطفال

نقص إفراز هرمون النمو لدى الأطفال (ينتج عنه):
القزامة

صفات الطفل المصاب بالقزامة:

- طول القزم أقل من 1.2 متر
- ويتمتع بقوى عقلية طبيعية
- ولا يبدي أي تشوّه في البنية.

1- ماذا ينتج عن: نقص إفراز هرمون النمو لدى الأطفال؟

2- فسر: الإصابة بالقزامة.

3- ما صفات القزامة الناجمة عن نقص هرمون النمو؟

**



روبرت وادلو بين عائلته
في سن 22 بلغ طوله 270 سم

العملقة

2- زيادة إفراز هرمون النمو لدى الأطفال

زيادة إفراز هرمون النمو لدى الأطفال (ينتج عنه):
العملقة

مثال:

أصيب روبرت وادلو بالعملقة حيث
بلغ طوله: 270 سم في سن: 22 سنة.

1- ماذا ينتج عن: زيادة إفراز هرمون النمو لدى الأطفال؟

2- فسر: الإصابة بالعملقة.

3- زيادة إفراز هرمون النمو لدى الشباب 18 – 20 سنة

زيادة الإفراز لدى الشباب 18 – 20 سنة (ينتج عنه):

نمو العظام التي لا تزال تستجيب لهرمون النمو كعظام الوجه واليدين والقدمين.

(بالنتيجة): يؤدي إلى تضخم عظام الوجه واليدين والقدمين بشكل غير متناسق (فسر): حيث تنمو العظام عرضاً أكثر من نموها طولاً.



ماذا ينتج عن زيادة إفراز هرمون

النمو GH لدى الشباب / 18-20 سنة ؟

نمو العظام التي لا تزال تستجيب لهرمون النمو كعظام الوجه واليدين والقدمين ، مؤدية إلى تضخمها بشكل غير متناسق

1- ماذا ينتج عن: زيادة إفراز هرمون النمو لدى الشباب بسن 18 – 20 سنة؟

2- فسر: يؤدي زيادة إفراز هرمون النمو لدى الشباب إلى تضخم عظام الوجه واليدين والقدمين بشكل غير متناسق.

2- نخامة خلفية عصبية (فص خلفي عصبي)

النخامة الخلفية (النخامة العصبية)

تحتوي على:

محاوير لعصبونات توجد أجسامها في الوطاء
تفرز أجسام هذه الخلايا:
هرمونات مثل:

- الهرمون المضاد للإبالة ADH
- الأوكسيتوسين OXT

تنتقل هذه الهرمونات عبر: المحاووير إلى: النخامة الخلفية

وظيفة النخامة الخلفية:


تخزن هرمونات تفرزها عصبونات توجد أجسامها في الوطاء وتنتقل عبر محاوير هذه الخلايا إلى النخامة الخلفية ليتم تحريرها عند الحاجة في الأوعية الدموية.

أو:

تخزن وتحرر هرمونات تفرزها خلايا عصبية أجسامها توجد في الوطاء.

حدد موقع إفراز ADH – OXT :

خلايا عصبية أجسامها توجد في الوطاء.



لماذا تعد هذه الهرمونات (OXT – ADH) (المتحررة من النخامة الخلفية) هرمونات عصبية؟ لأنها تفرز من خلايا عصبية أجسامها توجد في الوطاء.

ملاحظة: بما أن ADH – OXT هرمونات وطائية فإنها هرمونات بروتينية.

3- ماذا تحوي النخامة الخلفية؟

4- اذكر وظيفة النخامة الخلفية.

5- ما هي الهرمونات التي تُفرز من الوطاء وتنتقل إلى النخامة الخلفية؟

6- ما هي الهرمونات التي تُخترن وتُحرر من قبل النخامة الخلفية؟

7- حدد موقع إفراز الـ ADH – هرمون OXT.

8- لماذا تعد هذه الهرمونات (OXT – ADH) (المتحررة من النخامة الخلفية) هرمونات عصبية؟

ح
ضعيف

أ- الهرمون المانع لإدرار البول ADH

ألاحظ الشكل الآتي الذي يمثل آلية إعادة امتصاص الماء في الأنبوب البولي لدى الإنسان وأجيب عن الأسئلة الآتية:

1- يعاد امتصاص الماء

(أين:) في القسم النازل من عروة هانلة إلى الدم (فسر:).
لأن غشاء القسم النازل من عروة هانلة نفوذ للماء فقط.

2- يعاد امتصاص الشوارد المفيدة

(أين:) في القسم الصاعد من عروة هانلة إلى الدم (فسر:).
لأن غشاء القسم الصاعد من عروة هانلة نفوذ للشوارد فقط.

الهرمون المضاد للإبالة ADH

يؤثر في: نهاية الأنابيب البولية في الكلية

وظيفة الهرمون المضاد للإبالة ADH:

- ينشط نهاية الأنابيب الكلوية على إعادة امتصاص معظم الماء المرتشح داخل الأنبوب البولي إلى الدم.

- يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم (فسر:)

لأنه يفرز استجابة لحالات انخفاض ضغط الدم،
فيعمل قابضاً للأوعية الدموية
(بالنتيجة:) مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

نقص إفراز الهرمون المضاد للإبالة ADH

عن الحد الطبيعي (الفيزيولوجي):

يؤدي إلى:

زيادة كمية الماء المطروحة مع البول
(سكري كاذب).

في أي منطقة من الأنبوب البولي يؤثر هرمون الـ ADH؟
يؤثر هرمون الـ ADH في نهاية الأنابيب البولية في الكلية.


لماذا يكون البول مركزاً عند الحيوانات الصحراوية؟

لأن الـ ADH يفرز عندها بشكل كبير (فسر:)

لتقليل كمية الماء المطروح مع البول

كونها تعيش في بيئة قليلة الماء،

(فبالنتيجة:) يكون البول عندها مركزاً.



بول مركز

- 1- أين تتم إعادة امتصاص الماء ضمن الأنبوب الكلوي؟
- 2- أين تتم إعادة امتصاص الشوارد المفيدة ضمن الأنبوب الكلوي؟
- 3- فسر: يعاد امتصاص الماء في القسم النازل من عروة هانلة إلى الدم.
- 4- فسر: يعاد امتصاص الشوارد المفيدة في القسم الصاعد من عروة هانلة إلى الدم.
- 5- حدد موقع إفراز الهرمون المضاد للإبالة ADH.
- 6- حدد موقع تأثير الهرمون المضاد للإبالة ADH = في أي منطقة من الأنبوب البولي يؤثر هرمون الـ ADH؟
- 7- فسر: يؤدي الهرمون المضاد للإبالة ADH إلى ارتفاع ضغط الدم.
- 8- ماذا ينتج عن: تقبض الأوعية الدموية بتأثير ADH؟
- 9- ماذا ينتج عن: نقص إفراز الهرمون المضاد للإبالة ADH عن الحد الطبيعي (الفيزيولوجي)؟
- 10- فسر الإصابة بالسكري الكاذب.
- 11- فسر: الـ ADH يفرز عند الحيوانات الصحراوية بشكل كبير.
- 12- فسر: يكون البول مركزاً عند الحيوانات الصحراوية؟
- 13- ماذا ينتج عن قلة كمية الماء المطروح في البول لدى الحيوانات الصحراوية؟

ضعيف


ب- هرمون الأوكسيتوسين OXT**تأثيره لدى الأنثى:**

- 1- مسؤول عن تقلص عضلات الرحم الملساء في أثناء الولادة.
- 2- كما يساعد في عودة الرحم الى حجمه الطبيعي بعد الولادة.
- 3- ويعمل على إفراغ الحليب من ثدي الأم المرضع. (فسر:)
عن طريق تقلص العضلات الملساء المحيطة بالجيوب المفرزة للحليب في الثدي.

تأثيره لدى الذكر:

- يسبب تقلص العضلات الملساء في: الأسهر - والبروستات (بالنتيجة: يسبب دفع السائل المنوي في الأسهر – والقذف).

- 1- اذكر وظيفة هرمون الأوكسيتوسين لدى الأنثى.
- 2- اذكر وظيفة هرمون الأوكسيتوسين لدى الذكر.
- 3- فسر: يعمل هرمون الأوكسيتوسين على إفراغ الحليب من ثدي الأم المرضع.
- 4- ماذا ينتج عن تقلص العضلات الملساء المحيطة بالجيوب المفرزة للحليب في الثدي؟
- 5- ماذا ينتج عن تقلص العضلات الملساء في الأسهر والبروستات؟

**تأثيره لدى الذكر:**

- يسبب تقلص العضلات الملساء في: الأسهر - والبروستات (بالنتيجة: يسبب دفع السائل المنوي في الأسهر – والقذف).

تأثيره لدى الأنثى:

- مسؤول عن تقلص عضلات الرحم الملساء في أثناء الولادة.
- كما يساعد في عودة الرحم الى حجمه الطبيعي بعد الولادة.
- ويعمل على إفراغ الحليب من ثدي الأم المرضع.

التقويم النهائي**أولاً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:****1. في الإشارة نظيرة الصماوية:**

- أ- ترتبط الإشارة المفرزة من الخلية بمستقبلات على الخلية نفسها.
 ب- تنتشر الهرمونات العصبية الى مجرى الدم وتحفز استجابات في الخلايا الهدف في أي مكان من الجسم.
 ج- تنتقل الجزيئات عن طريق الدم واللمف الى الخلايا المستهدفة.
 د- تؤثر الجزيئات الإشارية في الخلايا القريبة جداً من مصدر الإشارة.

2. تعد إحدى هذه الغدد مختلطة:

- أ- الغدة العرقية.
 ب- الغدة الدرقية.
 ج- الغدة اللعابية.
 د- البنكرياس.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لما يأتي:

1. زيادة إفراز هرمون النمو لدى البالغين يسبب تضخماً غير متناسق في عظام الوجه والأطراف.
 2. تكون غالبية الهرمونات المفرزة من الغدة الصم مرتبطة ببروتينات بلازما الدم.
 3. نقص الـ ADH يسبب الإصابة بالسكري الكاذب.
 4. يحقق ارتباط الوطاء بالنخامة الخلفية اتصالاً عصبياً.
 5. للكبد دور في نمو الغضاريف والعظام.

ثالثاً: أقرن بين:

1. هرمون النمو وهرمون الأوكسيتوسين من حيث:
 نوع الإشارة بين الخلوية.
 2. النخامة الأمامية والنخامة الخلفية من حيث:
 نوع الارتباط مع الوطاء - مصدر هرمونات كل منهما

حل التقويم النهائي**أولاً- اختار الإجابة الصحيحة:**

1-في الإشارة نظيرة الصماوية:

د- تؤثر الجزيئات الإشارية في الخلايا القريبة جداً من مصدر الإشارة.

2-أحد هذه الغدد مختلطة: د- البنكرياس.

ثانياً- أعطي تفسيراً علمياً لما يأتي:

1- لأن عظام الأطراف تنمو عرضاً أكثر من نموها طولاً، كونها ما زالت تستجيب لهرمون النمو.

2- لتشكيل مخزن احتياطي للهرمون في الدم يتفكك عند الحاجة،

كما أن الهرمونات الستيرويدية لا تستطيع الانتقال إلا بارتباطها مع بروتين ناقل.

3- لأن معظم الماء الذي يشربه المريض لا يعاد امتصاصه في نهاية الأنابيب البولية (النفرونات).

4- لأن الخلايا العصبية في الوطاء تفرز هرون الأوكسيتوسين، والهرمون المانع لإدرار البول وتنتقل هذه الهرمونات بوساطة محاويز هذه الخلايا إلى الفص الخلفي للغدة النخامية.

5- لأن الكبد يحرر عوامل النمو (السوماتوميدين) والتي تحفز بشكل مباشر نمو الغضاريف والعظام.

ثالثاً:**أقارن بين:****النور أدرينالين - وهرمون النمو - والأوكسيتوسين من حيث: نوع الإشارة الخلوية**

وجه المقارنة	النور أدرينالين	هرمون النمو	الأوكسيتوسين
الإشارة	صماوية	صماوية	عصبية صماوية

النخامة الأمامية والنخامة الخلفية من حيث:**نوع الارتباط مع الوطاء - مصدر هرمونات كل منهما**

وجه المقارنة	النخامة الأمامية	النخامة الخلفية
نوع الارتباط مع الوطاء	ارتباط دموي	ارتباط عصبي
مصدر هرمونات كل منهما	الخلايا المفترزة فيها	الخلايا العصبية المفترزة في الوطاء

الدرس (2): دراسة بعض الغدد الصم وآلية تأثير الهرمونات

الغدة الدرقية

تشريحيًا:

تعد الغدة الدرقية: أكبر الغدد الصم عند الانسان
تزن: 34 غرام وسطيًا.
تقع: في العنق أمام الرغامى وأسفل الحنجرة
تتألف من:
فصين أيمن وأيسر يصل بينهما برزخ.

البرزخ يقع بين: الفصين الأيمن والأيسر للغدة الدرقية.

مجهرياً:

الغدة الدرقية

تتكون مجهرياً من: عدد كبير من الحويصلات

بنية حويصلات الغدة الدرقية:

- مغلقة
- ومبطنة بطبقة واحدة من خلايا ظهارية مفرزة،
- تحتوي على مادة غروية

الخلايا الظهارية المفرزة:

الموقع: تبطن الحويصلات الدرقية

الوظيفة:

- تفرز مادة غروية
- تفرز الهرمونات الدرقية T3 – T4

المادة الغروية في الحويصلات الدرقية:

تتكون من: الغلوبولين الدرقي

الغلوبولين الدرقي:


يتألف من: بروتين سكري مرتبط مع ذرات اليود
وظيفته: يعد أساساً لهرمونات الدرقية.

يوجد هناك خلايا C

الموقع: مجاورة للحويصلات الدرقية

فسر: تمتلك الغدة الدرقية تروية دموية غزيرة جداً.


لتسهيل عملية التبادل بين خلاياها والدم.



الغدة الدرقية

(تشريحيًا)


*** (رسم)



مقطع مجهري في الدرقية

(مجهرياً)

- 1- أكبر الغدد الصم عند الإنسان هي
- 2- كم يبلغ وزن الغدة الدرقية؟
- 3- حدد موقع: الغدة الدرقية.
- 4- ما هي البنية التشريحية للغدة الدرقية؟
- 5- حدد موقع: برزخ الغدة الدرقية.
- 6- ما هي البنية المجهرية (النسيجية) للغدة الدرقية؟
- 7- ما هي بنية الحويصل الدرقي؟
- 8- حدد موقع الخلايا الظهارية المفرزة للغدة الدرقية.
- 9- اذكر وظيفة الخلايا الظهارية المفرزة للغدة الدرقية.
- 10- حدد موقع الخلايا C
- 11- مم يتألف الغلوبولين الدرقي؟
- 12- اذكر وظيفة الغلوبولين الدرقي.
- 13- فسر: تمتلك الغدة الدرقية تزوية دموية غزيرة جداً.



تضخم الغدة الدرقية نتيجة نقص اليود

هرمونات الغدة الدرقية

الخلايا الظهارية المفرزة

(وظيفتها):

تفرز:

المادة الغروية

وتفرز هرموني:

- التيروكسين T4

- ثلاثي يود التيرونين T3

وذلك تحت تنظيم:

- الهرمون النخامي TSH

- والهرمون الوطني TRH

الخلايا C

الموقع: مجاورة للحويصلات الدرقية

(وظيفتها):

تفرز: هرمون الكالسيبتونين CT

وظيفة هرمون الكالسيبتونين:

يقوم مع الباراثورمون المفرز من جارات الدرق بتنظيم مستوى الكالسيوم في الدم ويكون عملهما متعاكساً.

مصادر الحصول على اليود:

1- تعد الكائنات البحرية المصدر الأساسي لليود.

2- يضاف اليود لمالح الطعام.

ما تأثير نقص اليود في الغذاء على الدرقية؟

نقص اليود ←

نقص تركيب الهرمونات الدرقية ←

في حال استمرار النخامة الأمامية بإفراز TSH ←

تزيد الدرقية من إفراز المادة الغروية

والتي تتجمع في حويصلات الغدة (فسر:)

لعدم وجود اليود

← فيزداد حجم الحويصلات (مرض تضخم الغدة

الدرقية).

1- اذكر وظيفة الخلايا الظهارية المفرزة للغدة الدرقية.

2- حدد موقع إفراز (هرمون T3 – هرمون T4 – المادة الغروية (الغلوبولين الدرقي)).

3- ما هي الهرمونات التي تتحكم بمسئويات الهرمونات الدرقية T3 و T4؟

4- حدد موقع الخلايا C.

5- اذكر وظيفة الخلايا C.

6- اذكر وظيفة هرمون الكالسيتونين.

7- كيف يتم تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم؟

8- ما هي مصادر الحصول على اليود؟

9- ماذا ينتج عن: نقص اليود في الغذاء على الدرقية؟

10- ماذا ينتج عن استمرار النخامة الأمامية بإفراز

TSH في حال عدم وجود اليود؟

11- فسر تضخم الغدة الدرقي في حال نقص اليود؟

وظائف الهرمونات الدرقية

التيروكسين T4 والتيرونين T3 :

الوظيفة:

تقوم الهرمونات T3 و T4 بتنشيط: المورثات لتركيب كم أكبر من البروتينات

هذه البروتينات المركبة تحت تأثير الهرمونات الدرقية على نوعين:

1- بروتينات بنائية:

وظيفتها:

تستخدم لبناء الخلايا في عملية النمو وخاصة:

الجملة العصبية في المرحلة الجنينية - ومرحلة الطفولة.

2- بروتينات وظيفية (أنظيمات):

وظيفتها:

- تنشط تفاعلات الاستقلاب

- بالإضافة إلى زيادة عدد الجسيمات الكوندرية (وبالنتيجة: زيادة إنتاج ATP - والحرارة.

1- اذكر وظيفة الهرمونات الدرقية.

2- ما أنواع البروتينات التي تركيبها الهرمونات الدرقية.

3- اذكر وظيفة البروتينات البنائية التي تتركب بتأثير الهرمونات الدرقية.

4- اذكر وظيفة البروتينات الوظيفية (الأنظيمات) التي تتركب بتأثير الهرمونات الدرقية.

5- ماذا ينتج عن: تنشيط تفاعلات الاستقلاب بالإضافة إلى زيادة عدد الجسيمات الكوندرية تحت تأثير الهرمونات الدرقية؟


6- فسر: زيادة إنتاج ATP والحرارة بتأثير الهرمونات الدرقية.

ماذا ينتج عن خلل إفراز الدرقية لهرموني T4 و T3

1- نقص إفراز هرموني T3 و T4 في مرحلة الطفولة.

2- نقص إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين.

3- زيادة إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين.



<p style="text-align: right;">*</p>  <p style="text-align: center;">نقص إفراز هرموني T3 و T4 في مرحلة الطفولة</p>	<p style="text-align: center;">نقص إفراز هرموني T3 و T4 في مرحلة الطفولة</p> <p style="text-align: center;">نقص إفراز هرموني T3 و T4 في مرحلة الطفولة: (ينتج عنه):</p> <ul style="list-style-type: none"> - تأخر في النمو الجسدي - وتخلف عقلي، - وقماءة في الشكل. <p>1- ماذا ينتج عن: نقص إفراز هرموني T3 و T4 في مرحلة الطفولة؟</p> <p>2- فسر الإصابة بتأخر في النمو الجسدي وتخلف عقلي، وقماءة في الشكل.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: right;">*</p>  <p style="text-align: center;">نقص إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين</p>	<p style="text-align: center;">نقص إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين</p> <p style="text-align: center;">نقص إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين: يؤدي إلى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - زيادة الوزن - والخمول - وحساسية مفرطة تجاه البرد <p>1- ماذا ينتج عن: نقص إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين؟</p> <p>2- فسر: الإصابة بزيادة الوزن والخمول وحساسية مفرطة تجاه البرد.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">*</p>  <p style="text-align: center;">زيادة إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين</p>	<p style="text-align: center;">*</p> <p>زيادة إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين تؤدي إلى: الإصابة بمرض غريفز</p> <p>أهم أعراض مرض غريفز:</p> <ul style="list-style-type: none"> - نقصان الوزن - وجحوظ العينين (فسر): <p>بسبب حدوث الوذمة الالتهابية في الأنسجة خلف كرة العين.</p> <p>1- ماذا ينتج عن: زيادة إفراز هرموني T3 و T4 لدى البالغين؟</p> <p>2- فسر: الإصابة بداء غريفز.</p> <p>3- ما هي أعراض داء غريفز؟</p> <p>4- فسر: جحوظ العينين في مرض غريفز.</p>
<p style="text-align: center;">*</p> 	

الغدد جارات الدرق

جارات الدرق

تقع: على الوجه الخلفي لفصي الدرق
الوظيفة:



تفرز هرمون الباراثورمون PTH

وظيفة الباراثورمون:


يقوم مع الكالسيتونين المفرز من الدرقية بتنظيم مستوى الكالسيوم في الدم ويكون عملهما متعكساً.

مقارنة بين الكالسيتونين والباراثورمون:

الباراثورمون	الكالسيتونين	
موقع الإفراز	الغدد جارات الدرقية	الخلايا C في الغدة الدرقية
التأثير على نسيج العظام	زيادة إخراج الكالسيوم من العظام	يثبط إخراج الكالسيوم من العظام
التأثير في الأنابيب البولية	زيادة امتصاص الكالسيوم من البول وإعادتها إلى الدم	زيادة طرح الكالسيوم مع البول
النتيجة (التأثير على مستوى الكالسيوم في الدم)	زيادة مستوى الكالسيوم في الدم	نقص مستوى الكالسيوم في الدم



- 1- حدد موقع الغدد جارات الدرق.
- 2- اذكر وظيفة الغدد جارات الدرق.
- 3- اذكر وظيفة هرمون الباراثورمون.
- 4- ما طبيعة العلاقة بين الباراثورمون والكالسيتونين؟
- 5- كيف يتم تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم؟
- 6- قارن بين هرموني الباراثورمون من حيث: (موقع الإفراز - التأثير على نسيج العظام - التأثير في الأنابيب البولية - التأثير على مستوى الكالسيوم بالدم).
- 7- ماذا ينتج عن زيادة إخراج الكالسيوم من العظام وزيادة امتصاص الكالسيوم من البول وإعادتها إلى الدم تحت تأثير الباراثورمون؟
- 8- ماذا ينتج عن تثبيط إخراج الكالسيوم من العظام وزيادة طرح الكالسيوم مع البول تحت تأثير الكالسيتونين؟



غدة الكظر

يمتلك الإنسان:

غدتين كظريتين

تزن كل منها: ٤ غرامات

وتقع كل منهما:

فوق القطب العلوي للكلية الموافقة.

غدة الكظر

تتألف من:

قسمين متميزين

هما:

- لب الكظر
 - وقشرة الكظر
- وتحاط بمحفظة ليفية

وظيفة المحفظ الليفية:

تفصل غدة الكظر عن النسيج المجاورة.

ما الهرمونات التي تفرزها كل من الغدتين الكظريتين؟

1. قشرة الكظر

تفرز: الألدوسترون - الكورتيزول - الهرمونات الجنسية.

وظيفة الألدوسترون:

يزيد من إعادة امتصاص Na^+

وطرح K^+ في:

منطقة الالتفاف البعيد والقناة الجامعة.

(هرمونات ستيروئيدية يقع مستقبلها داخل الهيولى).

2. لب الكظر

تفرز: الأدرينالين - النورأدرينالين - قليل من الدوبامين.

(هرمونات أمينية يقع مستقبلها في الغشاء الخلوي).

- 1- كم عدد الغدد الكظرية في جسم الإنسان؟
- 2- كم يبلغ وزن كل من الغدتين الكظريتين؟
- 3- حدد موقع كل من الغدتين الكظريتين.
- 4- ما هي بنية الغدة الكظرية؟
- 5- اذكر وظيفة المحفظة الليفية للغدة الكظرية.
- 6- فسر: تفصل غدة الكظر عن النسيج المجاورة.
- 7- ما الهرمونات التي تفرزها قشرة كل من الغدتين الكظريتين؟
- 8- ما الهرمونات التي يفرزها لب كل من الغدتين الكظريتين؟

الغدة الصنوبرية**الغدة الصنوبرية:**



تقع: أمام الحديبات التوعمية الأربع في الدماغ،
وظيفةها: تفرز هرمون الميلاتونين .

وظيفة هرمون الميلاتونين:

- 1- يقوم بتفتيح البشرة (فسر):
إذ يعاكس بعمله عمل هرمون MSH.
- 2- تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. (فسر):
يزداد إفراز الغدة للميلاتونين في الظلام ويقل بوجود الضوء (فبالنتيجة):
مما يضبط الدورة الإيقاعية اليومية للجسم.
من مثل: دورات النوم والاستيقاظ.

- 3- يساعد الميلاتونين في تنظيم الدورات التكاثرية في بعض الأنواع الحيوانية التي تتميز بوجود فصول تكاثر محددة.

- 1- حدد موقع الغدة الصنوبرية.
- 2- اذكر وظيفة الغدة الصنوبرية.
- 3- اذكر وظيفة هرمون الميلاتونين.
- 4- فسر: يقوم الميلاتونين بتفتيح البشرة.
- 5- ما طبيعة العلاقة بين هرموني الميلاتونين و MSH و حدد موقع إفراز كل منهما.
- 6- فسر: للميلاتونين دور بتنظيم الساعة البيولوجية للجسم.
- 7- ماذا ينتج عن: ازدياد إفراز الغدة للميلاتونين في الظلام وقلته بوجود الضوء؟
- 8- ما هو الهرمون المسؤول عن تنظيم الدورات التكاثرية في بعض الأنواع الحيوانية التي تتميز بوجود فصول تكاثر محددة؟

**الغدة الصنوبرية**



*

كيف تقوم الهرمونات بتنظيم الوظائف الحيوية في الجسم؟

كيف تقوم الهرمونات بتنظيم الوظائف الحيوية في الجسم؟

تفرز الهرمونات من الغدد الصم التي تلقي بها في الوسط الداخلي (الدم - واللمف).

وتنتقل بوساطته

إلى: أعضاء الجسم وخلاياه كلها

إلا أن الهرمونات لا تؤثر إلا في:

الخلايا الهدف للهرمون التي تمتلك مستقبلات بروتينية

نوعية. (فسر:)

لأن المستقبلات البروتينية تتعرف على الهرمون دون غيره.

وظيفة المستقبلات البروتينية النوعية للهرمون:

تتعرف على الهرمون دون غيره.

ارتباط الهرمون بمستقبله النوعي

يؤدي إلى:

تفعيل سلسلة من التفاعلات ضمن الخلية

(بالنتيجة:)

تؤدي كمية ضئيلة من الهرمون إلى فعل خلوي كبير جداً.

(فسر:)

لأن ارتباط الهرمون بمستقبله النوعي

يؤدي إلى تفعيل سلسلة من التفاعلات ضمن الخلية.

1- كيف تقوم الهرمونات بتنظيم الوظائف الحيوية في الجسم؟

2- فسر: الهرمونات لا تؤثر إلا في الخلايا الهدف

للهرمون التي تمتلك مستقبلات بروتينية نوعية.

3- اذكر وظيفة المستقبلات البروتينية النوعية

للهرمون.

4- ماذا ينتج عن: ارتباط الهرمون بمستقبله النوعي؟

5- فسر: تؤدي كمية ضئيلة من الهرمون إلى فعل

خلوي كبير جداً.

تصنيف الهرمونات

تصنف الهرمونات حسب طبيعتها الكيميائية وموقع مستقبلها في الخلية الهدف إلى:

1. الهرمونات البروتينية والبيبتيدية:

مستقبلاتها توجد في: الغشاء الخلوي أو على سطحه
مثل:

هرمونات الوطاء - والغدة النخامية - وجزر لانغرهانس (الأنسولين - الغلوكاغون)

فسر:

لا تستطيع الهرمونات البروتينية والبيبتيدية عبور غشاء الخلية بسبب أوزانها الجزيئية الكبيرة

2. الهرمونات الستيروئيدية:

مستقبلاتها توجد: داخل الهيولى

مثل: مستقبلات الهرمونات الجنسية - وقشرة الكظر.

فسر:

تستطيع الهرمونات الستيروئيدية عبور غشاء الخلية لأن طبيعتها الكيميائية تسمح لها بعبور الغشاء

3. الهرمونات الأمينية:

أ- هرمونات الدرقية T3 و T4

مستقبلاتها توجد:

- داخل النواة

- وفي الجسيم الكوندي.

ب- الأدرينالين - والنور أدرينالين - والدوبامين

(هرمونات لب الكظر)

هرمونات أمينية

لكن مستقبلها النوعي يوجد:

في الغشاء الهيولي

1- عدد أنواع الهرمونات حسب طبيعتها الكيميائية وموقع مستقبلها في الخلية الهدف.

2- حدد موقع مستقبلات الهرمونات البروتينية.

3- حدد موقع مستقبلات هرمونات (GH - TSH -

PRL - MSH - ACTH - LH - FSH - ADH

- OXT - الأنسولين - الغلوكاغون).



- 4- فسر: لا تستطيع الهرمونات البروتينية والبيبتيدية عبور غشاء الخلية.
- 5- حدد موقع مستقبلات الهرمونات الستيروئيدية.
- 6- حدد موقع مستقبلات هرمونات (تستوسترون – بروجسترون – الإستروجينات – الألدوستيرون – الكورتيزول).
- 7- فسر: تستطيع الهرمونات الستيروئيدية عبور غشاء الخلية؟
- 8- حدد موقع مستقبلات الهرمونات الدرقية (T4 - T3).
- 9- حدد موقع مستقبلات هرمونات لب الكظر (الأدرينالين – النورأدرينالين – الدوبامين).
- 10- ما هي الهرمونات التي يقع مستقبلها في الغشاء الخلوي أو على سطحه؟
- 11- ما هي الهرمونات التي يقع مستقبلها داخل الهيولى؟
- 12- ما هي الهرمونات التي يقع مستقبلها داخل النواة؟
- 13- ما هي الهرمونات التي يقع مستقبلها داخل النواة؟

آلية تأثير الهرمونات

سندرس فيما يلي آلية تأثير:

1- الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية:

تضم:

- أ- الهرمونات البروتينية والبيبتيدية
- ب- بعض الهرمونات الأمينية: هرمونات لب الكظر (الأدرينالين – والنورأدرينالين – والدوبامين).

2- الهرمونات ذات المستقبلات داخل خلوية:

تضم:

- أ- الهرمونات التي يقع مستقبلها في هيولى الخلية الهدف: وهي الهرمونات الستيروئيدية مثل: الهرمونات الجنسية – هرمونات قشرة الكظر


ب- الهرمونات التي يوجد مستقبلها في النواة:

وهي الهرمونات الأمينية: مثل هرمونات الدرقية T3 – T4

1- آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية

يتضمن عمل هذه الهرمونات مرحلتين:

- رسول أول (الهرمون)
- ورسول ثاني (cAMP)
- يصل بينهما البروتين G

**آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية****يتم ذلك وفق المراحل الآتية:**

1- ينتقل الهرمون المفرز من الغدة (رسول أول) بواسطة: الدم واللمف ليصل: الى الخلايا الهدف.

مستقبلات هذه الهرمونات توجد: في الغشاء الخلوي أو على سطحه

2- يرتبط الهرمون بـ: السطح الخارجي للمستقبل مما يؤدي إلى:

تنشيط عمل البروتين G

البروتين G هو: بروتين مرتبط مع GTP

3- البروتين G (وظيفته):

يقوم بـ: تنشيط أنظيم الأدينيل سيكلاز

الأدينيل سيكلاز (وظيفته):

يقوم بـ: بتحويل ATP إلى cAMP (رسول ثاني).

cAMP (وظيفته):

يقوم بـ: العديد من التأثيرات مثل:

تنشيط أنظيم تفاعل

مما يؤدي إلى:

حدوث الأثر الهرموني المطلوب (الاستجابة الخلوية).

1- رتب المراحل التالية من عمل الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية:

بروتين G – رسول 2 – رسول 1

2- رتب بدقة مراحل عمل الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية.

3- حدد الرسول الأول – الرسول الثاني في مراحل عمل المستقبلات ذات المستقبلات الغشائية.

4- عرف البروتين G.

5- ماذا ينتج عن ارتباط الهرمون بالسطح الخارجي للمستقبل الموجود في الغشاء أو على سطحه؟

6- اذكر وظيفة بروتين G.

7- اذكر وظيفة أنظيم أدينيل سيكلاز.

8- اذكر وظيفة الأدينوزين أحادي الفوسفات الحلقي cAMP.

2- آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية (الهرمونات الستيرويدية)

يتم ذلك وفق المراحل الآتية:

1- تجتاز الهرمونات الستيرويدية:

الغشاء الهولي للخلية الهدف (فسر):

لأن طبيعتها الكيميائية تسمح لها بعبور الغشاء

2- الهرمونات الستيرويدية

ترتبط مع: المستقبل البروتيني في: هولي الخلية الهدف

(بالنتيجة): فيتشكل معقد (هرمون - مستقبل).

3- ينتقل المعقد

من: الهولي

إلى: النواة.

4- المعقد (وظيفة):

يرتبط في مكان محدد على DNA ويقوم بتفعيل مورثات

محددة مسؤولة عن تنشيط نسخ RNA مرسل وتركيب

بروتينات جديدة (أنظمية - بنائية).

تسبب البروتينات الأنظمية والبنائية:

تنشيط أو تثبيط وظيفة خلوية ما

مما يؤدي إلى: حدوث الأثر الهرموني (الاستجابة).

وكمثال عنها:

الهرمون الجنسي الذكري (التستوسترون)

يحفز: إنتاج أنظيمات وبروتينات بنائية

في: الألياف العضلية الهيكلية

(فبالنتيجة): مما يؤدي إلى زيادة حجم وقوة العضلات

1- فسر: تجتاز الهرمونات الستيرويدية الغشاء

الهولي للخلية الهدف.

2- رتب بدقة مراحل عمل الهرمونات الستيرويدية.

3- ماذا ينتج عن ارتباط الهرمون الستيرويدي مع

المستقبل البروتيني في الهولي؟

4- أين يتشكل معقد (هرمون ستيرويدي - مستقبل


بروتيني) وأين ينتقل هذا المعقد؟

5- اذكر وظيفة معقد (هرمون ستيرويدي - مستقبل

بروتيني) ضمن النواة.

6- اذكر وظيفة البروتينات الأنظمية والبنائية التي

يقوم الهرمون الستيرويدي بتحفيز إنتاجها.



آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية (الهرمونات الستيرويدية)

3- آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية (الهرمونات الدرقية)

إن تنشيط التفاعلات الاستقلابية بواسطة التيروكسين والتيرونين يتطلب (فسر):

- زيادة إنتاج الأنزيمات الاستقلابية
- وزيادة إنتاج ATP

وإن فعالية التيرونين = نحو أربعة أضعاف فعالية التيروكسين.

ويتم ذلك وفق المراحل الآتية:

1- تجتاز هرمونات الدرقية T3-T4: الغشاء الهولي للخلية الهدف

ويتحول معظم التيروكسين إلى: تيرونين (أين؟) في هولي الخلية الهدف.

2- تنتقل معظم الهرمونات

إلى: النواة

لترتبط مع: مستقبلات في نواة الخلية الهدف. (بالنتيجة: فيتشكل معقد (هرمون - مستقبل)).

3- المعقد (هرمون - مستقبل) (وظيفته):


يرتبط مع DNA ويقوم بتنشيط مورثات محددة مسؤولة عن تنشيط نسخ RNA مرسال وتركيب بروتينات أنظمية استقلابية جديدة.

البروتينات الأنظمية (وظيفتها):

تتوسط تفاعلات استقلابية لزيادة النشاط الاستقلابي مما يؤدي إلى: زيادة النشاط الاستقلابي

4- يرتبط المتبقي من الهرمونات

مع: مستقبلات موجودة في الجسم الكوندي (فبالنتيجة: يسرع ذلك إنتاج الـ ATP مما يؤدي إلى: زيادة النشاط الاستقلابي



آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية (الهرمونات الدرقية)

- 1- فسر: يتم تنشيط التفاعلات الاستقلابية بواسطة التيروكسين والتيرونين؟
- 2- قارن بين التيروكسين والتيرونين من حيث الفعالية.
- 3- رتب بدقة مراحل عمل الهرمونات الدرقية.
- 4- حدد موقع تحول التيروكسين إلى تيرونين.
- 5- حدد موقع مستقبلات الهرمونات الدرقية.
- 6- ماذا ينتج عن ارتباط الهرمونات الدرقية مع مستقبلاتها في النواة؟
- 7- اذكر وظيفة معقد (هرمون درقي – مستقبل بروتيني).
- 8- اذكر وظيفة البروتينات الأنظمية الاستقلابية التي يتم تركيبها بإشراف الهرمونات الدرقية.
- 9- ماذا ينتج عن ارتباط الهرمونات الدرقية مع مستقبلاتها في الجسيمات الكوندرية؟
- 10- ماذا ينتج عن زيادة إنتاج ال ATP؟

حازم ضعيف

التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي

1. أحد هذه الهرمونات يدخل اليود في تركيبها:

أ- الكالسيتونين. ب- التيروتوكسين. ج- هرمون النمو. د- البرولاكتين.

2. أختار الترتيب المناسب لتسلسل العمل مما يأتي:

أ- رسول أول - رسول ثاني - بروتين G.

ب- رسول أول - بروتين G - رسول ثاني.

ج- بروتين G - رسول أول - رسول ثاني.

د- رسول ثاني - بروتين G - رسول أول.

ثانياً: أحدد موقع مستقبل كل من الهرمونات الآتية:

التيرونين - الألدوسترون - هرمون النمو - البرولاكتين.

ثالثاً: أفسر علمياً كلاً مما يأتي:

أ- تتميز الهرمونات بتأثيرات خلوية نوعية.

ب- تجتاز الهرمونات الستيرويدية الغشاء الهولي للخلية الهدف.

رابعاً: أكتب وظيفة واحدة لكل مما يأتي:

cAMP - البروتين G - الميلاتونين - الكالسيتونين.

خامساً: أصنّف الهرمونات الآتية حسب طبيعتها الكيميائية:

النورأدرينالين ADH - - أوكسيتوسين - التستوسترون

حل التقويم النهائي**أولاً- اختار الاجابة الصحيحة:**

- 1- أحد هذه الهرمونات يدخل اليود في تركيبها: **ب- التيروكسين.**
- 2- اختر الترتيب المناسب لتسلسل العمل: **ب- رسول أول - بروتين G – رسول ثاني.**

ثانياً- حدد موقع مستقبل كل من الهرمونات الآتية:

التيرونيين (في النواة)
 الألدوسترون (في الهيولى)
 هرمون النمو (في الغشاء الهيولي)
 البرولاكتين (في الغشاء الهيولي).

ثالثاً- أفسر علمياً كل مما يأتي:

أ- تتميز الهرمونات بتأثيرات خلوية نوعية.
 (لأن الخلايا الهدف للهرمون تمتلك مستقبلات بروتينية نوعية تتعرف على الهرمون دون غيره.)

ب- تجتاز الهرمونات الستيروئيدية الغشاء الهيولي للخلية الهدف.
 (لأن طبيعتها الكيميائية تسمح لها بعبور الغشاء الهيولي ذو الطبيعة الدسمة.)

رابعاً- اكتب وظيفة واحدة لكل مما يأتي:

cAMP: تنشيط أنظم تفاعلي يؤدي إلى حدوث الأثر الهرموني.
البروتين G: ينشط أنظم الأدينيل سيكلاز الذي يقوم بتحويل ATP إلى cAMP
الميلاتونين: يقوم بفتيح البشرة و ينظم الساعة البيولوجية للجسم كدورات النوم والاستيقاظ ذات الإيقاع اليومي.
الألدوسترون: يزيد من إعادة امتصاص Na^+ وطرح K^+ في منطقة الالتفاف البعيد والقناة الجامعة.

خامساً - أصنف الهرمونات الآتية حسب طبيعتها الكيميائية:

النور أدرينالين: أمينية
 بروتينية: ADH
 أوكسيتوسين: بروتينية
 التستوسترون: ستيروئيدية

الدرس (3): آليات السيطرة على إفراز الغدد الصم**مقدمة**

إن درجة تأثير الهرمون تعتمد بشكل أساسي على: كميته في الدم، وإن كمية الهرمون تُحدد حسب: حاجة الجسم لـ:

- تنفيذ الوظائف المختلفة
- والمحافظة على اتزان الوسط الداخلي للجسم.

ولذلك توجد حاجة لتنظيم إفراز الهرمونات من الغدد الصم، ويتم ذلك بطرائق عدة أهمها:


- 1- التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية.
- 2- التنظيم المباشر.

1- على ماذا تعتمد درجة تأثير الهرمون بشكل أساسي؟

2- كيف تحدد كمية الهرمون في الجسم؟

3- ما هي طرائق تنظيم الهرمونات من الغدد الصم؟

ضعيف



*

1- التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية

التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية:

يتصل الوطاء مع الغدة النخامية

بواسطة: السويقة النخامية

وظيفة السويقة النخامية:

تصل بين الوطاء والغدة النخامية عبر نوعين من الاتصال:

اتصال عصبى – واتصال دموي.

نوعا الاتصال بين الوطاء والغدة النخامية:

1- اتصال عصبى

يبين: الوطاء والنخامة الخلفية (فسر):

حيث تفرز أجسام العصبونات الموجودة في الوطاء

هرموني (OXT – ADH) وتنتقل عبر محوار العصبون

إلى النخامة الخلفية؛ إذ تتحرر من الأزرار عند الحاجة.

2- اتصال دموي

يبين: الوطاء والنخامة الأمامية (فسر):

عن طريق عوامل الإطلاق

وظيفة عوامل الإطلاق: تؤمن الاتصال الدموي بين الوطاء

والنخامة الأمامية.

يتم التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية عبر آليتين:

1- التلقيم الراجع الإيجابي

2- التلقيم الراجع السلبي

1- اذكر وظيفة السويقة النخامية.

2- كيف يتصل الوطاء مع النخامة الأمامية؟

3- ما هما نوعا الاتصال بين الوطاء والغدة النخامية؟

4- ما طبيعة الاتصال بين الوطاء والنخامة الأمامية؟

5- ما طبيعة الاتصال بين الوطاء والنخامة الخلفية؟

6- فسر: الاتصال عصبى بين الوطاء والنخامة


الخلفية.

7- فسر الاتصال دموي بين الوطاء والنخامة الأمامية.

8- ما هما آليتا تنظيم الهرمونات بواسطة الوطاء


والنخامة الأمامية؟


9- اذكر وظيفة عوامل الإطلاق المطلقة من الوطاء.



1- التنظيم بوساطة الوطاء والنخامة الأمامية

ب- التلقيح الراجع السلبي	أ- التلقيح الراجع الإيجابي	
<p>زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما فوق المستوى الطبيعي تؤدي إلى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تثبيط الوطاء - وتثبيط النخامة الأمامية <p>(فبالنتيجة:)</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقلل من إفراز العوامل المطلقة، - وتقلل من إفراز الهرمون المنبه للغدة <p>(فبالنتيجة:)</p> <p>فيقل إفراز الغدة لهرموناتها.</p>	<p>زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما تؤدي إلى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - زيادة إفراز أحد عوامل الوطاء - وزيادة إفراز هرمون النخامة الأمامية 	الآلية
<p>وبالعكس فإن نقصان كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما تحت المستوى الطبيعي تؤدي إلى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تنبيه الوطاء - وتنبيه النخامة الأمامية <p>(فبالنتيجة:)</p> <ul style="list-style-type: none"> - تزيد من إفراز العوامل المطلقة، - وتزيد من إفراز الهرمون المنبه للغدة <p>(فبالنتيجة:)</p> <p>فيزداد إفراز الغدة لهرموناتها.</p>	<p>(فبالنتيجة:)</p> <p>يتم زيادة إفراز هذه الغدة للهرمون في المرحلة الأخيرة.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - ضروري للاتزان الداخلي (الاستتباب). - ويميل نحو الحالة الطبيعية. <p>توجد معظم الهرمونات بتركيز: صغيرة جداً. يحتفظ كل هرمون بمستوى ثابت في الدم (الحد الطبيعي أو الفيزيولوجي) رغم التقلبات في تراكيزها في الدم استجابة للمحرضات المختلفة (فسر): يتم ذلك بوساطة التلقيح الراجع السلبي</p>	<ul style="list-style-type: none"> - يبتعد عن الاتزان الداخلي. - ويفاقم التغيير. 	الوظيفة





صورة

نشاط: تنظيم عمل الغدة الدرقية

1- ما تأثير الوطاء على الغدة الدرقية؟

يفرز الوطاء هرمون TRH

هرمون TRH:

موقع إفرازه: من الوطاء

ينتقل بواسطة: الأوعية الدموية

إلى: النخامة الأمامية

(فبالنتيجة: تفرز النخامة الأمامية هرمون TSH

هرمون TSH:

موقع إفرازه: من النخامة الأمامية

وظيفته:

ينتقل بواسطة: الدم

ليؤثر في: الغدة الدرقية فتفرز هرموني T3 و T4.

2- ماذا ينتج عن زيادة مستوى هرموني الـ T4

و T3؟

ارتفاع مستوى الهرمونين T3 و T4 عن المستوى

الطبيعي

ينتج عنه:



- يؤثر ذلك في الوطاء فيقلل من إفراز TRH

- يؤثر في النخامة الأمامية فتقلل من إفراز TSH

فينتج عن ذلك: العودة الى وضع التوازن.

المسار	مثال
المنبه	مص الرضيع ثدي الأم
عصبون حسي	
الوطاء (عبر خلية عصبية مفرزة)	
النخامة الخلفية	
إفراز هرمون عصبي في الدم	الأوكسيتوسين
خلايا الهدف	العضلات الملساء في الثدي
	إفراغ الحليب

المسار

<p>3- ما نوع التلقيم الراجع في هذه الحالة؟ وما أهميته؟ تلقيم راجع سلبي، لتحقيق التوازن الداخلي أو الاستتباب.</p>	<p>إفراز الحليب ← الاستجابة ←</p>	
<p>التلقيم الراجع السلبي</p>  <p>التركيز الزمن</p>	<p>التلقيم الراجع الإيجابي</p>  <p>التركيز الزمن</p>	

الأسئلة عن فقرة التلقيم الراجع الإيجابي والسلبي:

- 1- ما هما آليتا تنظيم الهرمونات بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية؟
- 2- ماذا ينتج عن زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما فوق المستوى الطبيعي في التلقيم الراجع السلبي؟
- 3- ماذا ينتج عن تثبيط الوطاء في التلقيم الراجع السلبي؟
- 4- ماذا ينتج عن تثبيط النخامة الأمامية في التلقيم الراجع السلبي؟
- 5- ماذا ينتج عن زيادة إفراز العوامل المطلقة من الوطاء وزيادة إفراز الهرمون المنبه للغدة من النخامة الأمامية؟
- 6- (نفس الأسئلة السابقة بالعكس زيادة بدلاً من نقصان ونقصان بدلاً من زيادة)
- 7- حدد موقع إفراز هرمون TRH.
- 8- اذكر وظيفة هرمون TRH.
- 9- حدد موقع إفراز هرمون TSH.
- 10- اذكر وظيفة هرمون TSH.
- 11- ما تأثير الوطاء على الغدة الدرقية؟
- 12- ماذا ينتج عن زيادة مستوى هرموني الـ T3 و T4؟
- 13- ما نوع التلقيم الراجع في حالة تنظيم مستوى الهرمونات الدرقية؟ وما أهميته؟
- 14- ماذا ينتج عن زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما؟
- 15- اذكر وظيفة التلقيم الراجع الإيجابي.
- 16- ما تأثير زيادة إفراز الحليب لدى الأم المرضع؟ ج- تنبيه الوطاء لإفراز المزيد من الأوكسيتوسين.
- 17- أين تقع الخلايا الهدف للأوكسيتوسين في الثدي؟
- 18- ما هو النوع الكيميائي لهرمون الأوكسيتوسين؟ وأين يقع مستقبله؟ (سؤال من الدرس السابق)

2- التنظيم الهرموني المباشر

(فسر:) يتم ضبط مستوى مادة ما في الدم ضمن حدود معينة من خلال:

تأثير ثنائيات هرمونية متعاكسة.

مثال:

ضبط مستوى سكر العنب (الغلوكوز) المنحل في الدم ضمن الحد الطبيعي.

الحد الطبيعي للغلوكوز في الدم:

(70 - 100 ملغ / 100 مل من الدم)

ويتم ذلك بتأثير:

- هرمون الأنسولين


- وهرمون الغلوكاغون

الأنسولين والغلوكاغون يفرزان من:

من جزر لانغرهانس في البنكرياس

وظيفتهما:

ضبط مستوى سكر العنب (الغلوكوز) المنحل في الدم ضمن الحد الطبيعي.



1- فسر يتم ضبط مستوى مادة ما في الدم ضمن حدود معينة.

2- كم يبلغ الحد الطبيعي لمستوى سكر العنب (الغلوكوز) المنحل في الدم؟ (انتبه للوحدات (٥))

3- فسر/كيف يتم ضبط مستوى الغلوكوز المنحل في الدم؟

4- حدد موقع إفراز كل من هرموني الأنسولين والغلوكاغون.

5- اذكر وظيفة هرموني الأنسولين والغلوكاغون.

6- ما النوع الكيميائي للأنسولين والغلوكاغون؟ وأين تقع مستقبلات كل منهما؟

(سؤال من الدرس السابق)

7- ما هو نوع الإشارة التي في تأثير كل من الأنسولين والغلوكاغون على مستوى الغلوكوز في الدم؟

ج6- إشارة صماوية

8- ما هو نوع الإشارة في تأثير الأنسولين على إفراز الغلوكاغون ضمن جزر لانغرهانس؟

ج7- إشارة نظيرة صماوية

السؤال 7 و 8 الغاية منهما توضيح فكرة عمل الأنسولين والغلوكاغون التي لم يتم شرحها كما يجب في الكتاب.

التقويم النهائي**أولاً : أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:**

1. أحد هذه الثنائيات الهرمونية لا تعمل بشكل متعكس:
 أ- (الأنسولين - الجلوكاغون).
 ب- (الكالسيتونين - الباراثورمون).
 ج- (الميلاتونين - MSH)
 د- (التيرونين - TSH)


2. يتم المحافظة على الحد الفيزيولوجي للهرمون في الدم بواسطة آلية التلقيم:

- أ- الراجع.
 ب- الراجع الإيجابي.
 ج- الراجع السلبي.
 د- (ب+ج).

ثانياً : إن آلية إفراز الغدة الدرقية يتم بثلاث مراحل متسلسلة في: الوطاء، والغدة النخامية، والدرقية:
 وضح ماذا يفرز في كل منها، وماذا ينتج عن زيادة مستوى T₃ و T₄ في الدم فوق الحد الطبيعي؟

ثالثاً: ألاحظ المخطط الآتي، ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:

- 1- ما تأثير زيادة إفراز الحليب لدى الأم المرضع؟
- 2- ما نوع التلقيم الراجع في هذه الحالة؟
- 3- أين يقع المستقبل النوعي لهرمون الأوكسيتوسين؟



المسار العصبي الصماوي البسيط (تلقيم راجع إيجابي)

حل التقويم النهائي**أولاً- أختار الإجابة الصحيحة.**

- 1- أحد هذه الثنائيات الهرمونية لا تعمل بشكل متعاكس: **د- (التيرونين TSH).**
- 2- يتم المحافظة على الحد الفيزيولوجي للهرمون في الدم بواسطة آلية: **ج- التلقيح الراجع السلبي.**

ثانياً- إن آلية إفراز الغدة الدرقية يتم بثلاث مراحل متسلسلة في الوطاء والنخامية و الدرقية:
وضح ماذا يفرز في كل منها وماذا ينتج عن زيادة مستوى T3 و T4 في الدم فوق الحد الفيزيولوجي؟

- 1- يفرز الوطاء هرمون TRH الذي ينتقل بواسطة الأوعية الدموية الى النخامة الأمامية.
 - 2- تفرز النخامة الأمامية هرمون TSH الذي ينتقل بواسطة الدم ليؤثر في الغدة الدرقية.
 - 3- تفرز الغدة الدرقية هرموني T3 و T4.
- وعند ارتفاع مستوى الهرمونين T3 و T4 عن المستوى الطبيعي يؤثر ذلك في الوطاء فيقلل من إفراز TRH ويؤثر في النخامة الأمامية فتقلل من إفراز TSH فينتج عن ذلك العودة الى وضع التوازن.

ثالثاً: ألاحظ المخطط الآتي، ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:

- 1- ما تأثير زيادة إفراز الحليب لدى الأم المرضع؟


تنبيه الوطاء لإفراز المزيد من الأوكسيتوسين

- 2- ما نوع التلقيح الراجع في هذه الحالة؟

تلقيح راجع إيجابي

- 3- أين يقع المستقبل النوعي لهرمون الأوكسيتوسين؟

في الغشاء الهولي للخلية الهدف أو على سطحه.



المسار العصبي الصماوي البسيط (تلقيح راجع إيجابي)

الدرس (4): التنسيق الكيميائي لدى النبات

مقدمة

ألاحظ أن:

شجر التفاح:

- يزهر في: شهر آذار (3)
 - الثمار تنضج في: شهر آب (8)
 - الأوراق تتساقط في: الشتاء (12)
- وهكذا بشكل دائم من كل عام.

كيف يتم ضبط هذه العمليات؟

يتم تنظيم العمليات الفيزيولوجية للنبات مثل:

- النمو
- والانجذابات
- وعملية الإزهار
- وتثبيط النمو


من خلال تأثير:

- عوامل خارجية: (الضوء - الحرارة - الجاذبية الأرضية).
- عوامل داخلية: (المورثات - مواد التنسيق النباتية).

- 1- حدد وقت إزهار - ووقت نضج الثمار - ووقت تساقط الأوراق لدى شجر التفاح من السنة.
- 2- اذكر 4 من العمليات الفيزيولوجية لدى النبات.
- 3- ما هما نوعا العوامل التي تنظم العمليات الفيزيولوجية للنبات؟ مع أمثلة لكل منها.



*



*

	مواد التنسيق النباتية
<p style="text-align: center;">مواد التنسيق النباتية</p>	<p>مواد التنسيق النباتية هي:</p> <p>مركبات عضوية تنتجها: بعض الأنسجة النباتية بتراكيز: ضئيلة جداً وتنتقل إلى: أماكن أخرى غالباً، لتقوم بتأثيرات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فيزيولوجية (وظيفية) - ومورفولوجية (شكلية). <p>أهم مواد التنسيق النباتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأوكسينات - الجبرلينات - السايبتوكينينات - حمض الأبسيسيك - الإيثيلين
	<p>1- اكتب المصطلح: مركبات عضوية تنتجها بعض الأنسجة النباتية بتراكيز ضئيلة جداً وتنتقل إلى أماكن أخرى غالباً لتقوم بتأثيرات فيزيولوجية (وظيفية) ومورفولوجية (شكلية).</p> <p>2- ما هما نوعا التأثيرات لمواد التنسيق النباتية؟</p> <p>3- ما معنى تأثيرات فيزيولوجية؟ وما معنى تأثيرات مورفولوجية؟</p> <p>4- عدد 5 أمثلة عن مواد التنسيق الكيميائية.</p>

بعض المصطلحات الهامة**البادرة:**

هي نبات ذاتي التغذية
ينتج عن إنتاش البذرة

وقد أجرى العلماء التجارب على:
بادرات نباتات الفصيلة النجيلية (فسر):
لسهولة العمل
أمثلة عن نباتات الفصيلة النجيلية:
(القمح- الشعير – الشوفان)



**

الكوليوبتيل:

غمد مسدود الذروة


(الموقع): يحيط بالورقة الأولى لنباتات الفصيلة النجيلية.



*

الآغار:

مادة: جيلاتينية سكرية (محلول مائي).
تستخرج من: أحد الطحالب البحرية.



*

1- اكتب المصطلح: نبات ذاتي التغذية ينتج عن إنتاش البذرة.

2- ماذا ينتج عن: إنتاش البذرة.

3- كيف تحصل البادرة على غذائها؟


4- فسر: أجرى العلماء التجارب على بادرات نباتات الفصيلة النجيلية.

5- إلى أي فصيلة نباتية ينتمي: القمح – الشعير – الشوفان؟

6- عدد 3 أمثلة عن نباتات الفصيلة النجيلية.

7- اكتب المصطلح: غمد مسدود الذروة يحيط بالورقة الأولى لنباتات الفصيلة النجيلية.

- 8- حدد موقع الكوليوبتيل.
 9- اكتب المصطلح: مادة جيلاتينية سكرية (محلول مائي) تستخرج من أحد الطحالب البحرية.
 10- من أين يستخرج الأغار؟
 11- ما هو التركيب الكيميائي لمادة الأغار؟



**

ظاهرة الانجذاب الضوئي

ألاحظ الصور السابقة:
 أحدد جهة نمو السوق، ماذا أسمى هذه الظاهرة؟
 وما تفسيرها؟

(معلومات مكررة لذا قمت بدمجها مع فقرة الانجذاب الضوئي التي ستمر بعد قليل).

تسمى هذه الظاهرة:

الانجذاب الضوئي

وهي: نمو السوق بجهة الضوء

ساعدت التجارب التي قام بها كل من داروين وجونسون -
 وفنت لتفسير هذه الظاهرة في اكتشاف:
 الأوكسينات.

1- عرف الانجذاب الضوئي.

2- من هم العلماء الذين درسوا ظاهرة الانجذاب

الضوئي؟

3- ما الذي اكتشفه العلماء خلال دراستهم لظاهرة

الانجذاب الضوئي؟


*

التجارب على النباتات


لدراسة ظاهرة الانجذاب الضوئي قام العلماء بإجراء العديد من التجارب، وسندرس فيما يلي التجارب التالية:

1- تجربتين قام بهما العلماء (داروين وجونسون).


2- تجربة العالم فنت.



داروين الابن



داروين الأب



بيتر جونسون







فريتس فنت

1- ما هي التجارب التي تم القيام بها لدراسة ظاهرة الانجذاب الضوئي؟

حازم ضعيف

تجربتا (داروين وجونسون)

تجربة (داروين وجونسون):1

<p>انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء.</p> 	***	✓	انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء	يؤدي إلى:	1- تعريض الكوليوبتيل للضوء
<p>قطع الذروة يؤدي إلى عدم انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء.</p> 	***	✗	عدم انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء	يؤدي إلى:	2- قطع ذروة الكوليوبتيل
<p>تغطية الذروة بمادة غير نفوذة للضوء تؤدي إلى عدم انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء.</p> 	***	✗	عدم انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء	يؤدي إلى:	3- تغطية الذروة بمادة غير نفوذة للضوء
<p>تغطية قاعدة الكوليوبتيل بمادة غير نفوذة للضوء لا تؤثر في انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء.</p> 	***	✓	انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء (لا تؤثر في انجذاب الكوليوبتيل باتجاه الضوء)	يؤدي إلى:	4- تغطية قاعدة الكوليوبتيل بمادة غير نفوذة للضوء

- عند تعريض البادرة لضوء جانبي أي جهة تنمو أكثر، الجهة المضاءة أم الجهة المظلمة؟
الجهة المظلمة تنمو أكثر من الجهة المضاءة.
- أي البادرات لم تستجب و تنمو باتجاه الضوء في تجارب العالم داروين وجونسون؟
النباتات التي قطعت ذروتها، والنباتات التي غطيت ذروتها بمادة غير نفوذة للضوء.
- ما الشروط الواجب توافرها لحدوث استجابة النبات بالنمو باتجاه الضوء ؟
 - 1- وجود ذروة النبات
 - 2- وسلامة هذه الذروة
 - 3- وتعرضها لضوء جانبي
- ما أهمية وجود بادرة نبات كتجربة شاهدة؟
لمقارنتها مع البادرات الأخرى في التجربة.

- 1- عند تعريض البادرة لضوء جانبي أي جهة تنمو أكثر، الجهة المضاءة أم الجهة المظلمة؟
- 2- أي البادرات لم تستجب و تنمو باتجاه الضوء في تجارب العالم داروين وجونسون؟
- 3- أي البادرات استجابت ونمت باتجاه الضوء في تجارب العالم داروين وجونسون؟
- 4- في تجارب داروين وجونسون، ماذا ينتج عن:
 - تعريض الكوليوبتيل للضوء؟
 - قطع ذروة الكوليوبتيل؟
 - تغطية الذروة بمادة غير نفوذة للضوء؟
 - تغطية قاعدة الكوليوبتيل بمادة غير نفوذة للضوء؟
- 5- ما الشروط الواجب توافرها لحدوث استجابة النبات بالنمو باتجاه الضوء؟
- 6- فسر أهمية وجود بادرة نبات كتجربة شاهدة في تجربة داروين وجونسون؟

تجربتا (داروين وجونسون)

تجربة (داروين وجونسون) 2:

	***	✓	<p>عبور الإشارة الكيميائية من الذروة إلى الكوليوبتيل عبر الأغار (الجيلاتين)</p>	<p>يؤدي إلى:</p>	<p>1- فصل قمة الكوليوبتيل عن الكوليوبتيل بـ: الأغار (الجيلاتين)</p>
	***	✗	<p>عدم عبور الإشارة الكيميائية عبر صفيحة الميكا</p>	<p>يؤدي إلى:</p>	<p>2- فصل قمة الكوليوبتيل عن الكوليوبتيل بـ: صفيحة من الميكا</p>

في التجربة السابقة:

الإشارة الكيميائية (العامل المحرض على النمو) المتكونة في القمة النامية تنفذ إلى الأسفل خلال: مواد معينة، كالجيلاتين (الأغار)؛ لتسرع من نمو الكوليوبتيل؛ فيستجيب النبات للضوء، ولا تستطيع الإشارة النفاذ من خلال: مواد أخرى كالميكا، لذا لم تحدث استجابة النبات للضوء

استنتج داروين وجونسون:

تستجيب بادرة النبات للضوء عند وصوله إلى قمته النامية (فسر): نتيجة لتكون إشارة في القمة النامية.

- 1- ما هي المواد التي تنفذ منها الإشارة الكيميائية؟ ما هي المواد التي لا تستطيع الإشارة النفاذ من خلالها؟
- 2- في تجارب داروين وجونسون، ماذا ينتج عن:
 - فصل قمة الكوليوبتيل عن الكوليوبتيل بالأغار (الجيلاتين)؟
 - فصل قمة الكوليوبتيل عن الكوليوبتيل بصفيحة من الميكا؟
- 3- ماذا استنتج داروين وجونسون من تجاربهما على النبات؟
- 4- فسر: تستجيب بادرة النبات للضوء عند وصوله إلى قمته النامية.

2- تجربة فنت

أ- تثبيت قطعة الآغار المحتوية على الإشارة المستخلصة من القمة النامية أدى إلى: استعادة النبات قدرته على النمو. وبذلك توصل العالم فنت إلى أن الإشارة عبارة عن: مادة كيميائية أطلق عليها اسم: **أوكسين Auxin** وهي: كلمة يونانية تعني: الاستطالة أو الزيادة.

ب- تثبيت قطعة آغار محتوية على الأوكسين على إحدى جانبي الساق العليا أدى إلى: ازدياد سرعة نموها مقارنة بالجانب الآخر من الساق. **وفق المراحل التالية:**

- 1- قطع قمة الكوليوبتيل.
- 2- عزل الأوكسين (لعامل المحرض للنمو) على قطعة آغار.
- 3- وضع قطعة الآغار على قمة الكوليوبتيل مقطوع الذروة بشكل جانبي.
- 4- نما الكوليوبتيل بشكل مائل. (فسر:)

تنمو الخلايا وتستطيل في الطرف الذي يحوي الأوكسين بشكل أسرع من الطرف الآخر.

استنتج العالم فنت:

- 1- تنمو الخلايا وتستطيل في الطرف الذي يحوي الأوكسين بشكل أسرع من الطرف الآخر.

2- أن الأوكسين



يتشكل في: القمة

وينتقل إلى: المنطقة التي تليها

بتأثير: عاملي الجاذبية الأرضية - والانتشار،


ويسبب: نموها واستطالتها.

- ما اسم المادة الموجودة في القمة النامية والمسؤولة عن الانجذاب الضوئي؟ الأوكسين.



- كيف وصل العامل المحرض على النمو الى ساق النبات الذي قطعت قمته؟
بتأثير الجاذبية الأرضية والانتشار.
- ما نوع الخلايا الموجودة في المنطقة النامية؟
خلايا ميرستيمية (جنينية).
- 1- في تجربة العالم فنت ماذا نتج عن:
 - تثبيت قطعة الأغار المحتوية على الإشارة المستخلصة من القمة النامية؟
 - تثبيت قطعة آغار محتوية على الأوكسين على إحدى جانبي الساق العليا؟
- 2- ما هو الأصل اللغوي لكلمة أوكسين؟ وماذا تعني؟
- 3- ما اسم المادة الموجودة في القمة النامية والمسؤولة عن الانجذاب الضوئي؟
- 4- كيف وصل العامل المحرض على النمو إلى ساق النبات الذي قُطعت قمته؟
- 5- ما نوع الخلايا الموجودة في المنطقة النامية؟
- 6- ما الخطوات التي قام بها العالم فنت؟
- 7- ما النتائج التي توصل إليها فنت؟

ضعيف

الأوكسينات:**الأوكسينات**

هي: حموض عضوية ذات وزن جزيئي مرتفع تنتج بكميات قليلة، وتنشط النمو في النبات.

مثال:

حمض الخل الأندولي IAA
أهم هذه الأوكسينات

يتركب الأوكسين في: (أين؟)

- 1- القمم النامية ذات الخلايا الميرستيمية (الجينية):
- للساق والأوراق بشكل رئيس.
- وفي قمم الجذور بكميات أقل.

- 2- رشيم البذرة
- 3- الأوراق الفتية

وظائف الأوكسينات:

- 1- تنشيط نمو خلايا النبات وتمايزها واستطالتها.
- 2- سيادة القمة النامية (السيطرة القمية للبرعم الانتهائي).
- 3- الانجذابات: الانجذاب الضوئي - والانجذاب الأرضي.
- 4- تنشيط تكوين الجذور العرضية على العقل النباتية.
- 5- تنشيط تحول المبيض إلى ثمرة.
- 6- زيادة طول السلاميات (المسافات بين الأزهار) لدى العنب.

كيف تنتقل الأوكسينات في النبات؟ ولماذا لا تتراكم ضمنه؟


انتقال الأوكسينات في النبات: انتقال قطبي (فسر):

حدد مكان إنتاج الأوكسينات.

البرعم الانتهائي (القمة)

كيف تنتقل الأوكسينات في النبات؟

أو

علل يُعرف انتقال الأوكسينات
في النبات بالانتقال القطبي.لأن الأوكسينات تنتقل داخل النبات
في اتجاه واحد من القمة إلى القاعدة.

القاعدة

*

لأن انتقال الأوكسينات يكون في اتجاه واحد داخل
النبات
من: القمة إلى: القاعدة.

لا تتراكم الأوكسينات ضمن النبات (فسر):
لأن الأوكسينات تتحلل بطريقتين:
هدم ضوئي – هدم أنظمي

1. هدم ضوئي:

يتفكك الأوكسين داخل الخلايا

بـ: تأثير الضوء

إلى: مركبات

وظيفة هذه المركبات الناتجة عن الهدم الضوئي:

بعضها مثبّط للنمو.

2. هدم أنظمي:

تحتوي معظم أنسجة النباتات على:

الأنظيمات المؤكسدة للأوكسينات

وظيفة الأنظيمات المؤكسدة للأوكسينات:

تقوم بأكسدة الأوكسينات لتحقيق الهدم الأنظمي لها.

ويزداد الهدم الأنظمي بـ:

1- تقدم عمر النسيج

2- ازدياد معدل النمو

نوع العلاقة بين: (معدل النمو - وتركيز الأنظيم

المؤكسد للأوكسينات)

علاقة عكسية

- 1- اكتب المصطلح: حموض عضوية ذات وزن زبني مرتفع تنتج بكميات قليلة، وتنشط النمو في النبات.
- 2- أعط مثالاً عن أحد الأوكسينات.
- 3- ضمن أي مركبات يعتبر حمض الخل الإندولي؟
- 4- حدد موقع تركيب الأوكسينات في النبات.
- 5- قارن بين معدل تركيب الأوكسين في كل من قمم الساق – وقمم الجذور.
- 6- اذكر وظائف الأوكسينات.
- 7- فسر: انتقال الأوكسينات في النبات هو انتقال قطبي.
- 8- فسر: لا تتراكم الأوكسينات ضمن النبات.
- 9- ما هي طرائق تحلل الأوكسينات في النبات؟
- 10- قارن بين العامل المخرب في كل من الهدم الضوئي والهدم الأنظمي.
- 11- اذكر وظيفة المركبات الناتجة عن الهدم الضوئي.
- 12- اذكر وظيفة الأنظيمات المؤكسدة للأوكسينات.
- 13- كيف يزداد الهدم الأنظمي؟
- 14- ما نوع العلاقة بين: (معدل النمو - وتركيز الأنظيم المؤكسد للأوكسينات)؟

تأثير التراكيز المختلفة للأوكسينات



لكل نسيج نباتي تركيز أمثل من الأوكسين للنمو:

1- فالتركيز المناسب لنمو الساق
تثبط: نمو الجذور والبراعم.2- التراكيز المناسبة لنمو البراعم
تثبط: نمو الجذور الساق.3- التراكيز المناسبة لنمو الجذور
تثبط: نمو البراعم والساق.

ويعتمد معدل نمو واستطالة خلايا النبات على عاملين:

4- التركيز المناسب للأوكسين.

5- نوع النسيج النباتي المتأثر.



الجذر	الساق	
أقل	أكثر	معدل تركيب الأوكسين
10^{-10} مول/ل	10^{-5} مول/ل	تركيز الأوكسين الأمثل للنمو
مثبط نمو	منشط نمو	تأثير التراكيز المرتفعة للأوكسين

1- ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو واستطالة خلايا الساق في المخطط (أ)؟

تزداد سرعة النمو والاستطالة حتى حد معين 10^{-5} ثم يتراجع معدل النمو بزيادة التركيز.

2- ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو واستطالة خلايا الجذر في المخطط (أ)؟

تزداد سرعة النمو والاستطالة حتى حد معين 10^{-10} ثم يتراجع معدل النمو بزيادة التركيز.

3- ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو واستطالة خلايا البراعم في المخطط (أ)؟

تزداد سرعة النمو والاستطالة حتى حد معين 10^{-4} ثم يتراجع معدل النمو بزيادة التركيز.

2- أحدد التركيز الأمثل لنمو كل من الساق والجذر والبراعم في المخطط (ب)؟

السوق: 10^{-5} مول/ل

البراعم: 10^{-4} مول/ل

الجذر: 10^{-10} مول/ل

3- ما تأثير التركيز الأمثل لنمو البراعم على نمو الساق والجذور؟

التراكيز المناسبة لنمو البراعم تثبط نمو الجذور الساق.

1- ماذا ينتج عن تعرض الجذور والبراعم لتركيز الأوكسينات المناسب لنمو السوق؟

2- ما هي العوامل التي يعتمد عليها معدل نمو واستطالة خلايا النبات؟

3- قارن بين الساق – والجذر من حيث:

معدل تركيب الأوكسين – تركيز الأوكسين الأمثل للنمو – تأثير التراكيز المرتفعة للأوكسين.

4- ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو واستطالة خلايا الساق في المخطط (أ)؟

5- ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو واستطالة خلايا الجذر في المخطط (أ)؟


6- ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو واستطالة خلايا البراعم في المخطط (أ)؟

7- أحدد التركيز الأمثل لنمو كل من الساق والجذر والبراعم في المخطط (ب)؟

8- ما تأثير التركيز الأمثل لنمو البراعم على نمو الساق والجذور؟

آلية عمل الأوكسينات

الاحظ الصورة الآتية، وأتبع مراحل استطالة خلية نباتية بتأثير الأوكسينات:



استطالة الخلية النباتية بتأثير الأوكسينات

1- يصل الأوكسين إلى الخلية الهدف.

2- تنشط الأوكسينات مضخات البروتون.

مضخات البروتون:

تقع في الغشاء السيتوبلازمي للخلية النباتية

وظيفةها: تعمل على ضخ البروتونات من السيتوبلازما إلى الجدار الخلوي.

3- ينتج عن ذلك: انخفاض درجة pH في الجدار الخلوي (وسط حمضي).

4- الوسط الحمضي للجدار (ينتج عنه):

ينشط الوسط الحمضي بروتين وتدي (شكل إسفين)

وظيفة البروتين الوتدي:

يعمل على فصل عديدات السكر عن ألياف السيللوز.

5- (بالنتيجة): تصبح عديدات السكر معرضة لتأثير أنظيم مفكك

يعمل على: تقطيع السكريات المتعددة، الرابطة بين ألياف السيللوز

(وظيفة الأنظيم المفكك ↑)

وظيفة هذه السكريات المتعددة في الجدار:
تربط بين ألياف السيللوز
(بالنتيجة): تزداد مرونة الجدار الخلوي.

6- يدخل الماء إلى داخل الخلية (فسر):
بتأثير الحلول

(بالنتيجة): تستطيل الخلية بتأثير الضغط الانتباجي

7- تصبح استطالة الخلية غير قابلة للعكس (فسر): نتيجة ترسب:

- ألياف سيللوز
- مواد جدارية جديدة

وظيفة ألياف السيللوز المترسبة والمواد الجدارية الجديدة:
تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس.

- 1- رتب بدقة مراحل استطالة خلية نباتية بتأثير الأوكسينات.
 - 2- حدد موقع مضخات البروتون في الخلية النباتية.
 - 3- اذكر وظيفة مضخات البروتون في الخلية النباتية.
 - 4- ماذا ينتج عن ضخ البروتونات من السيتوبلازم إلى الجدار الخلوي بتأثير مضخات البروتون في الخلية النباتية؟
 - 5- ماذا ينتج عن الوسط الحمضي في الجدار الخلوي؟
 - 6- اذكر وظيفة البروتين الوتدي في الجدار الخلوي؟
 - 7- ماذا ينتج عن: فصل عديدات السكر عن ألياف السيللوز في الجدار الخلوي؟
 - 8- اذكر وظيفة الأنظيم المفكك في الجدار الخلوي.
 - 9- اذكر وظيفة السكريات المتعددة في الجدار الخلوي.
 - 10- ماذا ينتج عن: تقطيع السكريات المتعددة، الرابطة بين ألياف السيللوز بتأثير الأنظيم المفكك.
- ج- تزداد مرونة الجدار الخلوي
- 11- فسر: تزداد مرونة الجدار الخلوي بتأثير الأوكسين.
 - ج- بسبب تقطيع السكريات المتعددة، الرابطة بين ألياف السيللوز بتأثير الأنظيم المفكك.
 - 12- فسر: دخول الماء إلى داخل الخلية النباتية.
 - 13- ماذا ينتج عن: دخول الماء إلى داخل الخلية النباتية بتأثير الحلول بعد زيادة مرونة الجدار؟
 - 14- فسر: تصبح استطالة الخلية بتأثير الأوكسين غير قابلة للعكس.
 - 15- اذكر وظيفة ألياف السيللوز المترسبة والمواد الجدارية الجديدة التي تم تركيبها بتأثير الأوكسين.

* حدد مكان إنتاج الأوكسينات.	وظائف الأوكسينات وظائف الأوكسينات:
<p>2 - القمم النامية</p>  <p>1 - رشيم البذرة Seed embryo</p>  <p>3 - الأوراق الفتية</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1- تنشيط نمو خلايا النبات وتمايزها واستطالتها. 2- سيادة القمة النامية (السيطرة القمية للبرعم الانتهائي). 3- الانجذابات: الانجذاب الضوئي - والانجذاب الأرضي. 4- تنشيط تكوين الجذور العرضية على العقل النباتية. 5- تنشيط تحول المبيض إلى ثمرة. 6- زيادة طول السلاميات (المسافات بين الأزهار) لدى العنب. <p>أماكن إنتاج الأوكسينات:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- القمم النامية 2- رشيم البذرة 3- الأوراق الفتية <p>سندرس فيما يلي الوظائف 2 - 3 - 4 - 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- اذكر وظائف الأوكسينات. 2- حدد مواقع إنتاج الأوكسينات في النبات.

* سيادة القمة النامية تشبيط نمو البراعم الجانبية	دور الأوكسينات في سيادة القمة النامية (السيطرة القمية للبرعم الانتهائي) يحدث تثبيط نمو في الفروع الجانبية (فسر):
 <p>و عند قطع القمة النامية تبدأ البراعم الجانبية بالنمو وتكوين الفروع الجانبية</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1- لأن التركيز الملائم لنمو الفرع أقل من التركيز الملائم لنمو الساق . 2- تركيز الأوكسين في الفرع يكون مرتفعاً (فسر): لأنه يحوي جزءين: 6- جزءاً منتجاً في الفرع 7- وجزءاً منتجاً في قمة الساق ونزل للأسفل بتأثير الجاذبية الأرضية. (بالنتيجة:) مما يسمح بالنمو الرأسي للنبات <ol style="list-style-type: none"> 1- فسر: يحدث تثبيط نمو في الفروع الجانبية. 2- فسر: تركيز الأوكسين في الفرع يكون مرتفعاً. 3- ماذا ينتج عن: تثبيط النمو في الفروع الجانبية للنبات؟

الانجذاب الأرضي

أقوم بتنشيت بادرة نبات نامية في وضع أفقي لمدة يومين أو ثلاثة، فألاحظ حدوث الانجذاب الأرضي.

الانجذاب الأرضي هو:

انحناء طرف الساق نحو الأعلى، وانحناء طرف الجذر نحو الأسفل، ما سبب ذلك؟

تنتقل الأكسينات للأسفل بتأثير الجاذبية الأرضية (فسر): لأنها ذات وزن جزيئي مرتفع. بالعودة إلى الأشكال البيانية لتأثير تركيز الأوكسين على نمو النسيج النباتية لكل من الساق والجذر:

بادرة موضوعة أفقياً

الساق	الجذر
1- تجمع الأوكسين بتركيز مرتفع في: <u>الجهة السفلية للساق</u> بتأثير: <u>الجاذبية الأرضية</u>	1- تجمع الأوكسين بتركيز مرتفع في: <u>الجهة السفلية للجذر</u> بتأثير: <u>الجاذبية الأرضية</u>
2- تنمو الجهة السفلية ذات التركيز المرتفع للأوكسين أكثر من الجهة العلوية (فسر):	2- تنمو الجهة العلوية ذات التركيز المنخفض للأوكسين أكثر من الجهة السفلية (فسر):
لأن التركيز المرتفع للأوكسين في <u>الساق</u> منشط نمو	لأن التركيز المرتفع للأوكسين في <u>الجذر</u> مثبط نمو
3- <u>بالنتيجة:</u> ينمو <u>الساق</u> نحو الأعلى أي: انجذاب أرضي سالب	3- <u>بالنتيجة:</u> ينمو <u>الجذر</u> نحو الأسفل أي: انجذاب أرضي موجب

الانجذاب الضوئي

إن تعريض ساق نبات أو كوليوبتيل إلى ضوء جانبي لأيام عدة يؤدي إلى:

نمو الساق باتجاه الضوء (فسر):


نتيجة لزيادة تركيز الأوكسين في الجانب المظلل مقارنة بالجانب المضاء، فيكون نمو واستطالة الخلايا في الطرف المظلل أكثر من نمو واستطالة الخلايا في الطرف المضاء، أي يحدث نمو متفاوت.

(فسر): اختلاف تركيز الأوكسين بين الطرف المضاء والطرف المظلل:

لأن الأوكسينات في الطرف المضاء تتخرب بفعل الضوء، وينتج عن ذلك التخريب مركبات تعوق النمو.

تلخيص الانجذاب الضوئي:

إن تعريض ساق نبات أو كوليوبتيل إلى ضوء جانبي لأيام عدة
↓
تخرب الأوكسينات في الطرف المضاء بفعل الضوء، وينتج عن ذلك التخريب مركبات تعوق النمو
↓
زيادة تركيز الأوكسين في الجانب المظلل مقارنة بالجانب المضاء
↓
نمو واستطالة الخلايا في الطرف المظلل أكثر من نمو واستطالة الخلايا في الطرف المضاء، أي يحدث نمو متفاوت
↓
نمو الساق باتجاه الضوء (الانجذاب الضوئي)



- 1- اكتب المصطلح: انحناء طرف الساق نحو الأعلى، وانحناء طرف الجذر نحو الأسفل.
- 2- ماذا ينتج عن: تعريض ساق نبات أو كوليبيتيل إلى ضوء جانبي لأيام عدة؟
- 3- فسر: نمو ساق النبات باتجاه الضوء (الانجذاب الضوئي).
- 4- فسر: اختلاف تركيز الأوكسين بين الطرف المضاء والطرف المظلل.
- 5- فسر: تنتقل الأوكسينات للأسفل بتأثير الجاذبية الأرضية.
- 6- رتب مراحل حدوث الانجذاب الأرضي.

- 7- أين يكون الانجذاب الأرضي سالباً وما جهته؟ وأين يكون موجباً وما جهته؟
- 8- فسر: تجمع الأوكسين بتركيز مرتفع في الجهة السفلية لكل من الساق والجذر.
- 9- فسر: تنمو الجهة السفلية ذات التركيز المرتفع للأوكسين أكثر من الجهة العلوية في الساق.
- 1- فسر: تنمو الجهة العلوية ذات التركيز المنخفض للأوكسين أكثر من الجهة السفلية في الجذر.
- 2- ماذا ينتج عن: نمو الجهة السفلية ذات التركيز المرتفع للأوكسين أكثر من الجهة العلوية في الساق؟
- 3- ماذا ينتج عن: نمو الجهة العلوية ذات التركيز المنخفض للأوكسين أكثر من الجهة السفلية في الجذر؟
- 4- فسر: ينمو الساق نحو الأعلى في الانجذاب الأرضي أي انجذاب أرضي سالب.
- 5- فسر: ينمو الجذر نحو الأسفل في الانجذاب الأرضي أي انجذاب أرضي موجب.



دور الأوكسينات في تكون الجذور العرضية

وجود براعم ساقية على العقل النباتية (ينتج عنه/وظيفته):
ينشط تكوين الجذور العرضية في قواعد هذه العقل النباتية.
(فسر):
بسبب انتقال الأوكسين من البراعم إلى الأجزاء السفلى لهذه العقل.

فسر: تغمس قواعد العقل النباتية لاسيما صعبة التجذير بمحلول منخفض التركيز للأوكسين.
لتنشيط تكوين الجذور العرضية في قواعدها

- 1- ماذا ينتج عن/ ما وظيفة وجود براعم ساقية على العقل النباتية؟
- 2- فسر: ينشط وجود البراعم الساقية على العقل النباتية تكوين الجذور العرضية في قواعد هذه العقل النباتية.

- 3- فسر: تغمس قواعد العقل النباتية لاسيما صعبة التجذير بمحلول منخفض التركيز للأوكسين.
4- ما هي مادة التنسيق الكيميائي التي نشط تكوين الجذور العرضية في قواعد العقل النباتية؟

دور الأوكسينات في تكوين ثمار بلا بذور



لدى معظم النباتات:

عملية الإخصاب (ينتج عنها):
تشكل البذور الفتية التي تنتج الأوكسينات؛
(فبالنتيجة): مما ينشط تحول المبيض إلى ثمرة.

لدى بعض النباتات:

يحدث ما يسمى: التكون البكري

التكون البكري:

هو: تحول المبيض إلى ثمرة دون تشكل بذور.
المسؤول عنه: الأوكسينات.

نوعا التكون البكري:

- تكون بكري طبيعي:

تشكل الثمار بدون بذور في بعض الأنواع بشكل طبيعي. (فسر):
لأن مبايض أزهارها غير الملقحة تحوي كميات كافية من الأوكسين لتشكل الثمرة
أمثلة:
الموز – والأناناس – والعنب.

- تكون بكري صناعي:


رش الأزهار غير الملقحة بالأوكسينات،
(فبالنتيجة): مما يؤدي إلى تكون بكري للثمرة
(ثمار بلا بذور)
أمثلة:
البندورة –
والفريز المزروعة في البيوت البلاستيكية.

تكون بكري طبيعي:

- الموز
- العنب
- الأناناس





تكون بكري صناعي:
- البندورة - الفريز



- 1- ماذا ينتج عن عملية الإخصاب لدى النباتات؟
- 2- ماذا ينتج عن: تشكل البذور الفتية التي تنتج الأوكسينات لدى النبات؟
- 3- اكتب المصطلح: تحول المبيض إلى ثمرة دون تشكل بذور.
- 4- ما المواد المسؤولة عن حدوث التكون البكري؟
- 5- ما نوعا التكون البكري؟

- 6- اكتب المصطلح: تشكل الثمار بدون بذور في بعض الأنواع بشكل طبيعي.
 7- اكتب المصطلح: رش الأزهار غير الملقحة بالأوكسينات، مما يؤدي إلى تكون بكري للثمرة.
 8- فسر: تشكل الثمار بدون بذور في بعض الأنواع بشكل طبيعي (موز – أناناس – عنب)؟
 9- أعط 3 أمثلة عن التكون البكري الطبيعي، ومثاليين عن التكون البكري الصناعي.

* دور الأوكسينات في زيادة طول السلاميات	
<p>السلاميات (المسافات بين الأزهار)</p> 	<p>إن رش أزهار العنب بالأوكسينات: (ينتج عنه): زيادة طول السلاميات، مما يسمح بنمو الثمار بشكل أكبر.</p> <p>السلاميات هي: المسافات بين الأزهار.</p>
<p>زيادة طول السلاميات</p> <p>نتيجة رش أزهار العنب بالأوكسينات مما يسمح بنمو الثمار بشكل أكبر</p> 	<p>1- ماذا ينتج عن رش أزهار العنب بالأوكسينات؟ 2- كيف يمكن زيادة طول السلاميات، في نبات العنب مما يسمح بنمو الثمار بشكل أكبر؟ 3- اكتب المصطلح: المسافات بين أزهار نبات العنب.</p>

الجبريلينات:**الجبريلينات**

من مواد التسيق النباتية الجبريلينات،
وظائف الجبريلينات:


- 1- تنشيط إنتاج البذور
- 2- تنشيط استطالة الساق ونمو الأوراق
- 3- تنشيط نمو الثمار
- 4- تنشيط عمليات الإزهار
- 5- التريبع

أماكن إنتاج الجبريلينات:

- 1- البراعم الورقية
- 2- الأوراق الفتية
- 3- القمم النامية
- 4- الجذور بكميات ضئيلة

في ما يلي سندرس الوظائف 4 – 5

- 1- اذكر وظائف الجبريلينات.
- 2- حدد أماكن إنتاج الجبريلينات في النبات.

حدد مكان إنتاج الجبريلينات.

3 - في الجذور بكميات قليلة

دور الجبريلينات في عملية الإزهار**الجبريلينات**


تنشط: عملية الإزهار،
وتصنع في: البراعم الورقية،
وتنتقل إلى: البراعم الزهرية
(فبالنتيجة: تتفتح البراعم الزهرية إلى أزهار).

التريبع:

تعرض: بعض النباتات المعمرة
لـ: درجات الحرارة المنخفضة +4 درجة
لمدة: 2 – 3 أسابيع
(ينتج عنه: دفع معظم النباتات للإزهار؛ (فسر:)
بسبب ازدياد معدل الجبريلينات.

كيف يمكن تنشيط عملية الإزهار؟

رش النباتات غير الخاضعة للتريبع بالجبريلينات.



- 1- ماذا ينتج عن: انتقال الجبريلينات المصنوعة في البراعم الورقية إلى البراعم الزهرية؟
- 2- اكتب المصطلح: تعرّض بعض النباتات المعمرة لدرجات الحرارة المنخفضة +4 درجة لمدة 2 – 3 أسابيع ومن ثم إزهار معظم النباتات.
- 3- ماذا ينتج عن: تعرّض بعض النباتات المعمرة لدرجات الحرارة المنخفضة +4 درجة لمدة 2 – 3 أسابيع؟
- 4- فسر: إزهار معظم النباتات بعملية التربيع.
- 5- كيف يمكن تنشيط عملية الإزهار في النباتات؟

هرمون الإيتلين:

هرمون الإيتلين

وظائف هرمون (غاز) الإيتلين:

- 1- تسريع نضج الثمار وتساقطها
- 2- تساقط الأوراق الهرمة

ينتج هرمون (غاز) الإيتلين من:

- 3- الثمار الناضجة
- 4- الأوراق الهرمة
- 5- جميع الخلايا الحية النباتية عموماً


- 1- اذكر وظائف هرمون (غاز) الإيتلين لدى النبات.
- 2- حدد مواقع إنتاج هرمون (غاز) الإيتلين لدى النبات.

ما هي الوظائف الأساسية للإيتلين Ethylene؟

- 1 - تسريع نضج الثمار و تساقطها.



2 - تساقط الأوراق الهرمة



دور هرمون الإيثيلين في نضج الثمار:**تأثير هرمون الإيثيلين في نضج الثمار:**

1- هو غاز له القدرة على الانتشار خلال المسافات بين الخلايا للنبات.

2- تزداد كمية هرمون الإيثيلين المنتج كلما ازدادت الثمار نضجاً.

3- ماذا ينتج عن تعرض النباتات لتيار هوائي أو تعرضها لغاز CO2 لمثبط لهرمون الإيثيلين؟ (يتأخر نضج ثمارها)

4- عند شرائك للموز غير الناضج كيف تسرع عملية النضج في المنزل؟

نضع معه ثمار ناضجة تنتج الإيثيلين فينضج.

1- اكتب المصطلح: غاز له القدرة على الانتشار خلال المسافات بين الخلايا للنبات.

2- ما تأثير ازدياد نضج الثمار على كمية هرمون الإيثيلين المنتج؟

3- ماذا ينتج عن تعرض النباتات لتيار هوائي أو تعرضها لغاز CO2 لمثبط لهرمون الإيثيلين؟

4- كيف تسرع عملية نضج الثمار (كالموز) في المنزل؟

الإيثيلين
C₂H₄الإيثيلين
C₂H₄

متى تزداد كمية هرمون الإيثيلين المنتج؟
كلما ازدادت الثمار نضجاً.

جدول بأهم مواد التنسيق النباتية		
مادة التنسيق النباتي	الوظيفة الأساسية	أماكن إنتاجها
الأوكسينات	1- تنشيط نمو خلايا النبات وتمايزها واستطالتها. 2- سيادة القمة النامية (السيطرة القمية للبرعم الانتهازي). 3- الانجذابات: الانجذاب الضوئي - والانجذاب الأرضي. 4- تنشيط تكوين الجذور العرضية على العقل النباتية. 5- تنشيط تحول المبيض إلى ثمرة. 6- زيادة طول السلاميات (المسافات بين الأزهار) لدى العنب.	1- القمم النامية 2- رشيم البذرة 3- الأوراق الفتية
الجبريلينات	1- تنشيط إنباتش البذور 2- تنشيط استطالة الساق ونمو الأوراق 3- تنشيط نمو الثمار 4- تنشيط عمليات الإزهار 5- التربيع	1- البراعم الورقية 2- الأوراق الفتية 3- القمم النامية 4- الجذور بكميات ضئيلة
الإيتلين	1- تسريع نضج الثمار وتساقطها 2- تساقط الأوراق الهرمة	1- الثمار الناضجة 2- الأوراق الهرمة 3- جميع الخلايا الحية النباتية عموماً.
السايتوكينينات	1- تنشيط انقسام الخلايا والنمو والتمايز 2- تأخير الشيخوخة	- الجذور
حمض الأبسيسيك	1- تثبيط نمو البراعم والبذور 2- إغلاق المسام خلال الجفاف	1- الأوراق 2- السوق

التقويم النهائي

أولاً: ما المقصود بكل مما يأتي: الأوكسينات - التربيع.

ثانياً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. إحدى مواد التنسيق النباتية الآتية مسؤولة عن عملية الإزهار:

أ- الأوكسينات. ب- الجبريلينات. ج- حمض الأبسيسيك. د - الإيتلين.

2. إحدى هذه المواد مسؤولة عن إنبات البذور:

أ- الأوكسينات. ب- الجبريلينات. ج- حمض الأبسيسيك. د- الإيتلين.

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

أ- الجذور الموضوعة أفقياً تنمو نحو الأسفل.

ب- استطالة الخلايا النباتية بتأثير الأوكسينات غير قابلة للعكس.

ج- لا تحوي ثمار الموز بذوراً.

د- يختلف تركيز الأوكسين على طرفي الكوليوبتيل المعرض لضوء جانبي.

ضعيف

حل التقويم النهائي

أولاً- ما المقصود بكل مما يأتي:

الأوكسينات: حموض عضوية ذات وزن جزيئي مرتفع تنشط النمو في النبات ، ويعد أندول حمض الخل أهم هذه الأوكسينات.

-التربيع: تعرض بعض النباتات المعمرة لدرجات الحرارة المنخفضة 4 + درجة لمدة 2-3 أسابيع تدفع معظم النباتات للإزهار بسبب ازدياد معدل الجبريلينات.

ثانياً- أختار الاجابة الصحيحة:

1- احدى هذه الهرمونات مسؤول عن عملية الإزهار:

ب- الجبريلينات.

2- أحد هذه المواد مسؤول عن إنتاش البذور:

ب- الجبريلينات.

ثالثاً- أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

أ- الجذور الموضوعة أفقياً تنمو نحو الأسفل.

(تتجمع الأوكسينات بتركيز مرتفع في الجزء السفلي للساق بتأثير الجاذبية الأرضية والتراكيز العالية مثبطة نمو في الجذر فينمو الجزء العلوي أكثر من السفلي.)

ب- استطالة الخلايا النباتية بتأثير الأوكسينات غير قابلة للعكس.


(تترسب ألياف سيللوز ومواد جدارية جديدة تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس.)

ج- ثمار الموز لا تحوي بذوراً.

(لأن مبايض أزهارها غير الملقحة تحوي كميات كافية من الأوكسين لتشكل الثمرة.)

د- يختلف تركيز الأوكسين بين طرفي كوليوبتيل المعرض لضوء جانبي.

(تتخرب الأوكسينات في الطرف المضاء بفعل الضوء وينتج مركبات مثبطة للنمو.)



أسئلة الوحدة الأولى

أولاً : أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. يكون كمون الغشاء ثابتاً في الخلية:
أ- الدبقية ب- العصبية ج- العضلية د- البيضية الثانوية
2. يتحرر الناقل العصبي غلوتامات في الفالق المشبكي ليرتبط بمستقبلات نوعية تؤدي إلى فتح:
أ- قنوات التسريب البروتينية ب- قنوات التيوب الكيمائية
ج- قنوات التيوب الفولطية د- مضخة الصوديوم والبوتاسيوم
3. ينتهي العصب العاشر المجهول إلى عضلة هيكلية، ويحرر ناقلاً عصبياً يرتبط بمستقبلات نوعية تؤدي إلى فتح قنوات:
أ- شوارد الهيدروجين ب- شوارد الصوديوم ج- شوارد البوتاسيوم د- شوارد الكلور
4. يؤدي تحرير الأسيتيل كولين إلى تشكيل IPSP في:
أ- عضلة العضد ب- عضلة الساق ج- عضلة القلب د- العضلة رباعية الرؤوس
5. تقوم المادة P بنقل حس الألم للدماغ، وتعمل الأنكيفالينات بشكل معاكس لها، أي تخفف حس الألم، وذلك يتم لأنها تقوم ب:
أ- الارتباط بمستقبلات المادة P في الغشاء بعد المشبكي.
ب- تعيق دخول شوارد الكالسيوم عبر الغشاء قبل المشبكي.
ج- تفتح قنوات شوارد الصوديوم في الغشاء بعد المشبكي.
د- تغلق قنوات شوارد الصوديوم في الغشاء قبل المشبكي.

6. ألاحظ الرسم البياني المجاور،


وأجيب عن الأسئلة:

أ- يحدث زوال للاستقطاب في :

B .2	A .1
E .4	D .3

ب- في المرحلة X يحدث:

1. فرط للاستقطاب، ويؤدي المنبه الثاني إلى بلوغ كمون الغشاء حد العتبة.
2. إزالة استقطاب، ويؤدي المنبه الثاني إلى بلوغ كمون الغشاء حد العتبة.
3. عودة لاستقطاب الراحة؛ لأن المنبه الثاني دون عتوي.
4. إزالة استقطاب، ولا يبلغ كمون الغشاء حد العتبة.



ج- يكون استقطاب غشاء الليف في المرحلة D في حالة:
1- فرط استقطاب 2- عودة استقطاب 3- إزالة استقطاب 4- استقطاب الراحة

د- يبلغ كمون الغشاء حد العتبة:

B.2	A.1
E.4	D.3

7. أحد هذه الهرمونات النباتية مسؤول عن نضج الثمار:

أ- الأوكسينات ب- الجبريلينات ج- حمض الأوبسيسيك د- الإيتلين

8. ما العبارة التي لا تناسب المستقبلات الحسية؟

أ- النوعية ب- عصبونات متعددة الأقطاب ج- التكيف الحسي د- محول بيولوجي

9. يشكل فرط الاستقطاب كمون المستقبل في الخلايا الحسية:

أ- الصوتية ب- الذوقية ج- الضوئية د- الشمية

10. توجد العصبونات متعددة القطبية في:

أ- العقدة الحلزونية ب- البطانة الشمية ج- العقدة الشوكية د- القرون الأمامية للنخاع الشوكي

11. خلايا حسية تحرر ناقلاً عصبياً مثبطاً في حالة الراحة:

أ- البصرية ب- الصوتية ج- الذوقية د- الشمية

12. سائل شفاف له قوام الماء يملأ الحجرة الأمامية لكرة العين:

أ- الشريان الشبكي ب- الخلط المائي ج- الخلط الزجاجي د- الأوعية البلغمية

ثانياً: ينتهي أحد الأعصاب الحوضية إلى المثانة، و المطلوب:

1. ما تأثير تنبيهه على المثانة؟ وما اسم الناقل العصبي المتحرر في نهايته؟

2. ما الأقية الشاردية التي تفتح في الغشاء بعد المشبكي؟ وما الكمون بعد المشبكي المتشكل؟

ثالثاً: في الشبكية نوعان من الخلايا البصرية هما: العصي والمخاريط.

1. أي منهما يتنبه بالضوء الضعيف؟

2. بماذا تختلف أصبغة المخاريط عن بعضها؟ ماذا ينتج عن تنبيه أنواعها الثلاثة بنسب متساوية؟

3. ما اسم المنطقة على الشبكية التي تحوي مخاريط فقط؟ ولماذا تكون حدة الإبصار فيها عالية؟

4. ما أهمية الفيتامين A للخلايا البصرية؟

رابعاً: ماذا ينتج من كل مما يأتي:

1. نقص إفراز ADH.

2. انسداد ثقبى لوشكا وثقب ماجندي.

3. قطع الألياف العصبية الواردة إلى التشكيل الشبكي والمهادين.

4. زيادة قيمة كمون المستقبل في الخلية الحسية.

5. تنبيه تفرعات النهايات العصبية الحرة في بشرة الجلد بمنبهات تسبب أذية في النسيج الضامة.
6. تقلص العضلة الشادة الركابية.

خامساً: أذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي:

الميلاتونين - السايٲوكينينات - التشكيل الشبكي - باحة بروكا.

سادساً: أفسر علمياً كلاً مما يأتي:

1. لا تستجيب الخلية لمنبهات جديدة في زمن الاستعصاء المطلق.
2. تحديد وظائف مناطق معينة من الدماغ باستخدام التصوير الرنيني المغناطيسي.
3. يبقى حسّ الألم بالرغم من تخريب الباحات الحسية الجسمية في نصفي الكرة المخية.
4. لا يحيط غمد النخاعين بالمحوار في المناطق الآتية:
القطعة الأولية - اختناقات رانفييه - نهاية المحوار.
5. يسبب انثناء أهداب الخلية الحسية السمعية زوال استقطاب غشائها.

سابعاً: أقرن بين كل مما يأتي:

1. الذاكرة القصيرة الأمد والطويلة الأمد من حيث: نوع ومكان تشكل المشابك.
2. حس اللمس الدقيق، وحس السخونة من حيث: مكان تصالب أليافها، والمستقبل الحسي لكل منها في الجلد.
3. باحة فيرنكه، وباحة الفراسة من حيث: الموقع والوظيفة.
4. القناة الدهليزية والقناة القوقعية في الحلزون من حيث: الموقع - اللمف الذي يملأ كل منهما.
5. العصي والمخاريط من حيث: الوظيفة - تمييز الألوان.

ثامناً: دراسة حالة:

1. أعلم أن غاز السارين مثبّط لا تنافسي لأنظيم الكولين أستيراز، كيف أفسر موت الشخص اختناقاً عند استنشاق هذا الغاز؟
2. أعلم أن عملية الإدمان من الظواهر السلبية التي تحدث من التعاطي المستمر للتبغ، مما يعطي للمدخن إحساساً مؤقتاً بالسعادة.
أ- لماذا نشعر بالقلق والاكتئاب عند محاولة الإقلاع عنه؟
ب- أقدم بعض النصائح التي تحت المدمنين على الإقلاع عن التدخين.

3. رجع هشام من المدرسة جائعاً، وعندما دخل باب منزله شم رائحة طعام شهية قادمة من المطبخ؛ فشعر بزيادة في إفراز اللعاب في فمه. المطلوب:
- أ- ماذا أسمى هذا الفعل المنعكس؟ ولماذا؟
- ب- أرتب عناصر هذه القوس الانعكاسية.
- ج ما أهمية هذا الفعل في عملية الهضم؟

حازم ضعيف

حل أسئلة الوحدة الأولى

أولاً : أختار الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- 1-يكون كمن الغشاء ثابتاً في :أ- الخلايا الدبقية
- 2-يتحرر الناقل العصبي غلوتامات في الفالق المشبكي ليرتبط بمستقبلات نوعية تؤدي غالباً إلى فتح :ب- قنوات التبريب الكيميائية.
- 3-ينتهي العصب العاشر المجهول إلى عضلة هيكلية ويحرر ناقل عصبي يرتبط بمستقبلات نوعية تؤدي إلى فتح قنوات :ب- شوارد الصوديوم
- 4-يؤدي تحرير الاستيل كولين إلى تشكيل IPSP في :ج- عضلة القلب
- 5-تقوم المادة (P) (بنقل حس الألم للدماغ ، وتعمل الأنكيفالينات بشكل معاكس لها أي تخفف حس الألم وذلك يتم من خلال الإنكيفالينات إذ تقوم بـ:
 - ت- تعيق دخول شوارد الكالسيوم عبر الغشاء قبل المشبكي.

6-ألاحظ الرسم البياني المجاور، وأجيب عن الأسئلة:

- أ- يحدث زوال للاستقطاب في: 2- B
- ب- في المرحلة X يحدث: 4- إزالة استقطاب ، ولا يبلغ كمن الغشاء حد العتبة.
- ج- يكون استقطاب غشاء الليف في المرحلة D في حالة: 1- فرط استقطاب
- د- يبلغ كمن الغشاء حد العتبة عند: 4- E

- 7-أحد الهرمونات الآتية مسؤول عن نضج الثمار: د- الإيتلين.
- 8-ما العبارة التي لا تناسب المستقبلات الحسية: ب- عصبونات متعددة القطبية.
- 9-يشكل فرط الاستقطاب كمن المستقبل في الخلايا الحسية: ج- الضوئية.
- 10-عصبونات متعددة القطبية توجد في: د- القرون الأمامية للنخاع الشوكي.
- 11-خلايا حسية تحرر ناقلاً عصبياً مثبطاً في حالة الراحة: أ- البصرية.
- 12-تحصل القرنية الشفافة على غذائها من: ب - الخلط المائي.

ثانياً- ينتهي أحد الأعصاب الحوضية إلى المثانة ، و المطلوب:

- 1-تقلص المثانة - الأستيل كولين.
- 2-أفنية التبريب الكيميائية لشوارد الصوديوم. كمن بعد مشبكي تنبيه.

ثالثاً - في الشبكية نوعان من الخلايا البصرية هما العصي والمخاريط.

- 1-العصي تتنبه بالضوء الضعيف.
- 2-تختلف أصبغة المخاريط بنوع الحموض الأمينية الداخلة في تركيب الفوتوبسين وبالتالي تختلف حساسيتها لأطوال الموجات الضوئية، ينتج الإحساس برؤية اللون الأبيض.
- 3-الحفيرة المركزية أو النقرة، وذلك لأنها تحوي مخاريط فقط ويتقابل المخروط الواحد مع ليف واحد من ألياف العصب البصري.
- 4-الفيتامين A ضروري لتشكيل جذر أدهيد الفيتامين A (الريتينال) الذي يدخل بتركيب الأصبغة الضوئية.

رابعاً – ماذا ينتج من كل مما يأتي:

- 1-نقص إفراز ADH: السكري الكاذب، أو تزداد كمية الماء التي يطرحها الجسم مع البول.
- 2-انسداد ثقبى لوشكا وثقب ماجندي:
- استسقاء دماغي أو تراكم السائل الدماغي الشوكي في بطينات الدماغ وزيادة حجمها.
- 3-قطع الألياف العصبية الواردة من التشكيل الشبكي والمهادين:
- توقف الشعور بالألم أو السبات الدائم.
- 4-زيادة قيمة الكمون المستقبل في الخلية الحسية: زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها وزيادة شدة الإحساس.
- 5-تنبيه تفرعات النهايات العصبية الحرة في بشرة الجلد بمنبهات تسبب أذية في النسيج الضامة: حس الألم
- 6-تقلص العضلة الشادة الركابية:
- تسحب الصفيحة الركابية نحو الخارج وتخفيف حركة الركاب على غشاء النافذة البيضية.

خامساً – أذكر وظيفة واحدة لكل هرمون مما يأتي:

- الميلاتونين:
- تفتيح البشرة أو تنظيم الساعة البيولوجية أو يساعد في تنظيم الدورات التكاثرية في بعض الأنواع الحيوانية.
- السايتوكينينات: تأخير الشيخوخة أو تنشيط انقسام الخلايا النباتية والنمو والتمايز.
- خلايا الدبق قليلة الاستطالات: تشكل غمد النخاعين حول محاور الخلايا العصبية في المادة البيضاء.
- التشكيل الشبكي: مركز الشعور بالألم – ويعتقد أن له دوراً في النوم واليقظة.
- باحة بروكا:
- تتلقى الفكر من باحة فيرنكه وتقوم بتحويلها إلى كلمات – أو النطق والتصويت – أو إنشاء الكلمات وتلفظها.

سادساً – أفسر علمياً كلاً مما يأتي:

- 1- بسبب عدم فتح قنوات الصوديوم من جديد إلا بعد العودة إلى كمون الراحة.
- 2-لأنه ضمن هذا التصوير يتم وضع المريض في حقل مغناطيسي كبير، ويتم الكشف عن نشاط الدماغ في منطقة معينة من خلال التغيرات في تراكيز الأكسجين في تلك المنطقة.
- 3-تتوضع مراكز الشعور بالألم في التشكيل الشبكي لجذع الدماغ والمهاد، بينما يقتصر دور القشرة المخية (الباحات الحسية الجسمية) على تحديد مكان و صفة الألم.
- 4-في القطعة الأولية: لإطلاق كمونات العمل – في اختناقات رانفيه لانتقال التيارات المحلية وكمونات العمل – في نهاية المحوار: لنقل السيالة إلى العصبونات التالية.
- 5-بسبب فتح قنوات البوتاسيوم وانتشار شوارد البوتاسيوم إلى الداخل.

سابعاً – أقرن بين كل مما يأتي:

-1

وجه المقارنة	الذاكرة قصيرة الأمد	الذاكرة طويلة الأمد
نوع المشابك	مؤقتة	دائمة
مكان تشكل المشابك	الحصين	قشرة المخ.

-2

وجه المقارنة	حس اللمس الدقيق	حس الحرارة
مكان التصالب	البصلة السيسائية	النخاع الشوكي
المستقبل الحسي	جسيمات مايسنر .	جسيمات روفيني.

-3

وجه المقارنة	باحة فيرنكا	باحة الفراسة
الموقع	في الناحية الوحشية لنصف الكرة المخية اليسرى؛ وسط باحة الترابط الجدارية القوية الصدغية.	تقابل باحة فيرنكه في نصف الكرة اليمنى
الوظيفة	تتلقى السيالات العصبية من جميع الباحات الحسية وتقوم بتحليلها وإدراكها، وترسل سيالات عصبية نحو الباحات المحركة إذا كان الأمر يتطلب إنجازا حركيا. وهي مسؤولة عن الإدراك اللغوي.	تميز تعبير الوجه وإدراك معاني الموسيقى والفن والرياضة

4- القناة الدهليزية و القناة الطبلية في الحلزون من حيث : الموقع- النافذة التي تتصل عبرها بالأذن الوسطى.

وجه المقارنة	القناة الدهليزية	القناة الطبلية
الموقع	فوق الرف العظمي وغشاء رايسنر	تحت الرف العظمي والغشاء القاعدي
النافذة	البيضية	المدورة
اللمف الذي يملؤها	خارجي	داخلي

5- العصي والمخاريط من حيث : الوظيفة – تمييز الألوان.

وجه المقارنة	العصي	المخاريط
الوظيفة	مسؤولة عن الرؤية في الإضاءة الضعيفة	مسؤولة عن الرؤية في الإضاءة القوية
تمييز الألوان	لا تميز الألوان	تمييز الألوان

ثامناً- دراسة حالة:

1-يستمر تأثير الأستيل كولين المنبه لعضلة الحجاب الحاجز، مما يؤدي لتشنجها نتيجة التقلص المستمر، فنتوقف عملية التنفس.

-2

أ- لأن النيكوتين يزيد من إفراز الدوبامين الذي يعطي إحساسا بالسعادة، ويؤدي الانقطاع لتناقص إفراز الدوبامين مما يعطي الاحساس المعاكس.

ب-

ب- يمكننا الافلاع عن التدخين وبشكل تدريجي مما يسمح للجسم التأقلم مع الوضع الجديد وبالتالي عودة الدوبامين لوضعه الطبيعي و بالتالي التخلص من الإدمان.

تاسعا- رجع هشام من المدرسة جائعاً، وعندما دخل باب منزله شم رائحة طعام شهية قادمة من المطبخ، فشعر بزيادة في إفراز اللعاب في فمه. المطلوب:

أ- منعكس شرطي، لأن حدوثه مرتبط بوجود منبه ثانوي(شرطي).

ب- الأنف – عصبون جابذ (حسي) – القشرة المخية – البصلة السيسانية – عصبون نابذ(مفرز) – الغدد اللعابية وإفراز اللعاب.

ج- زيادة معدل إفراز العصارات الهاضمة.