

موانع الاستعمال Contraindications	دواعي الاستعمال Indications	الاسم العلمي أو المكونات Scientific Name or Active Substances	الاسماء التجارية Trade Names
لا ينصح في معالجة داء القوباء السطحي الحاد وجدري البقر ومعظم الأمراض الفيروسية الأخرى ، لا يستعمل لفترة طويلة .	لمعالجة أمراض العين الالتهابية كالتهاب الملتحمة الجفني والبصلي ، التهاب القرنية ، والقسم الأمامي من الكرة العينية .	<i>Dexamethasone sodium ph.+ Benzalkonium chloride</i>	ايبديكس Apidex
لا ينصح باستعمالها في معالجة الاخماج العينية الفيحية الحادة ، وداء القوباء السطحي الحاد ، وجدري البقر ومعظم الأمراض الفيروسية الأخرى للقرنية والملتحمة .	علاج الالتهابات التي تستجيب للستيرويدات والأعراض التحسسية غير الخمجية الخفيفة المتوسطة للجفن والملتحمة البصلية والقسم الأمامي للعين والقرنية .	<i>Prednisolone acetate + Benzalkonium chloride</i>	ايبكورت Apicort
الربو القصبي ، بطء القلب الجيبي ، الصدمة القلبية ، لا ينصح للحوامل وكذلك الأطفال	في خفض الضغط الداخلي للعين ، وفي الجلوكوما المزمنة والجلوكوما الثانوي.	<i>Timolol maleate</i>	ايبمول Apimol تيمولير Timolyre
في حالة وجود ثقب في طبلة الأذن ، للحوامل إلا للضرورة ، ويعطى بحذر للمرضعات ، لا يستعمل أكثر من ١٠ أيام .	التهاب الأذن الوسطى ، التسكين الفوري للألم وتخفيف الالتهاب في المراحل الاحتقانية ، وكعلاج مساعد مع المضادات الحيوية	<i>Phenazone + Procaine HCL</i>	أتوكائين Otocain
يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي أو كبدية ، المرضى المسنين ، عدم انتظام ضربات القلب البطيئة ، لا يعطى الأطفال والإرضاع الحمل فئة (C)	ارتفاع ضغط الدم الذبحة الصدرية .	<i>Nifedipine</i>	ادلان <u>Adalat</u>
يستعمل بحذر للمرضى الذين لديهم خلل في وظائف الكبد ، يستعمل بحذر في الرضاعة الحمل فئة (B)	عدوى الجهاز التنفسي ، السعال الديكي ، الالتهاب الرئوي ، الدفتريا ، الاميبيا المعوية ، التهاب الجلد ، التهاب الجهاز البولي والتناسلي .	<i>Erythromycin</i>	اريثرومايسين Erythromycin
لا يستعمل في حالات القصور الكبدية الحاد ، يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب الأذن الوسطى ، التهابات الجلد ، الكلاميديا	<i>Azithromycin</i>	ازيثرومايسين Azithromycin أزي ونس Azi-once
في حال حدوث حساسية مع المسكنات الأخرى ، اضطرابات النزف أو الصفائح ، يعطى بحذر في القرحة ، أمراض الكلى الشديدة أو كبدية حاد ، في الحمل لا يستعمل ابتداء من الشهر السادس للحمل ولا يستعمل أثناء فترة الإرضاع .	التهاب المفاصل الروماتيزم ، هشاشة العظام ، ألم خفيف إلى معتدل ، الحمى .	<i>Acetylsalicylic acid Lysine</i>	اسبجك Aspegic

حساسية مع المسكنات الأخرى ، اضطرابات النزف أو الصفائح ، يعطى بحذر في القرحة ، أمراض الكلى الشديدة أو كيدي حاد ، الحمل فئة D خلال الأشهر الثلاثة الأولى	التهاب المفاصل الروماتيزم ، هشاشة العظام ، ألم خفيف إلى معتدل ، حمى ، الوقاية من الذبحة الصدرية .	<i>Acetylsalicylic acid</i>	أسبرين Aspirin
لا يعطى في حالة عدم انتظام ضربات القلب غير المنضبط ، فرط الدرقية ، الحمل فئة C .	على المدى الطويل مراقبة انسداد مجرى الهواء الناجم عن انعكاس أو الربو المزمن .	<i>Theophylline + Ephedrine</i>	اسماسام Asmasam
لا يعطى في حالات أمراض الكبد النشطة ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع .	ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط .	<i>Atrovastatin</i>	افاس Avas
يستعمل بعد الاستشارة في الحالات : الأمراض القلبية ، ارتفاع ضغط الدم ، أمراض درقية ، سكري ، تضخم البروستات ، الحمل والإرضاع	لتسكين الألم الصدغي وأعراض البرد والرشح ، لتخفيف الآلام ، في حالات الاحتقان الأنفي ، الصداع ، التهاب الحلق ، السعال ، خافض حرارة .	<i>Paracetamol + Dextromethorphan + Pseudoephedrine HCL</i>	أكت-3 Act-3
تناول مع مهدئات الجملة العصبية ، يستعمل بحذر عند المرضى المصابين باختلال في وظيفة المثانة وفشل شديد في وظائف الكبد والكلى ، يعطى أثناء الحمل والإرضاع للضرورة فقط .	لنزلات البرد والأنفلونزا ، التهاب الجيوب الأنفية ، مزيل للاحتقان ، التهاب الأذن ، التهاب الأنف الموسمي .	<i>Pseudoephedrin HCL + Triprolidine HCL</i>	اكتفيد Actifed
تجنب استعماله للأطفال اقل من سنتين بسبب خطر حدوث تحفيز للقلب والجهاز العصبي	موسع للقصبات الهوائية ومقشع	<i>Theophyllin + Glyceryl guacolate</i>	اكسدیل Exidil
لا يعطى للمرضى المصابين بانتانات وحيدات النوى ، يعطى بحذر في حالات القصور الكبدي والكلي وفي الإرضاع (الحمل فئة B)	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات .	<i>Ampicillin + Cloxacillin</i>	امبي كلوكس Ampiclox
يعطى بحذر في اختلال كبدي حاد ، المرضى المسنين ، تضيق الأبهر الحمل فئة C .	في إدارة ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية .	<i>Amlodipine</i>	املونك Amlong اماداي Amaday لوفرال Lofral
يستخدم بحذر عند المرضى المصابين باضطراب شديد في الوظيفة الكبدية ، تعديل الجرعة في حالات الفشل الكلوي المتوسط إلى الشديد ، وفي الإرضاع الحمل فئة B .	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات .	<i>Amoxicillin</i>	اموكسيل Amoxyl

Amikacin	اميكاسين Amikacin	علاج الالتهابات الجرام سلبية خطيرة العصوي والالتهابات التي تسببها العنقوديات عند موانع بنسليينات أو غيرها من المخدرات أقل سمية	تجنبها في المرضى الذين يعانون من التعصب، في حديثي الولادة، يعطى بحذر ضعف السمع، والأطفال الخدج، السمنة المرضى./ الرضاعة، والرضع وحديثي الولادة (لم يثبت سلامة) الحمل فئة C .
Diphenoxylate HCL + Atropin sulphate	انترستوب Enterostop لوموتيل Lomotil	مضاد للإسهال .	الذين يعانون من أمراض الكبد الحادة، الإسهال المرتبطة بالتهاب القولون الغشائي الكاذب، الأطفال دون سنتين، الحمل فئة C .
Nitroglycerin	انجيسيد Angised	الألم الصدري الحاد الناجم عن الذبحة الصدرية، احتشاء القلب .	انخفاض الضغط الشديد، فقر الدم الشديد، ارتفاع الضغط داخل القحف بسبب الرض أو النزف الدماغي، الحمل والإرضاع .
Losartan potassium + Hydrochlorothiazide	انجيزار H Angizaar –H	علاج ارتفاع ضغط الدم .	لا يعطى للأشخاص الذين لديهم احتباس البول، لا يعطى للحوامل والمرضعات
Indomethacin	اندوسيد Indocid	التهاب المفاصل الروماتيزم، التهاب المفاصل النقرسي، هشاشة العظام التهاب الفقار المقسط، مسكن للآلام	لا يعطى في حالة القرحة، التهاب المستقيم، يعطى بحذر للمرضى المسنين، الإرضاع والحمل
Propranolol	انديرال Inderal	ارتفاع ضغط الدم، اضطراب نظم القلب، تسرع ضربات القلب، اعتلال العضلة القلبية، الاحتشاء	لا يجوز الاستعمال في حالات الصدمة القلبية، انسداد المجاري التنفسية، حصار قلبي، تباطؤ ضربات القلب لا يستعمل في الحمل والإرضاع
Tobramycin + Dexamethasone	اوبتيدكس ت Optidex T	لمعالجة حالات العين المستجيبة للاستيرويدات والتي تتطلب في نفس الوقت المعالجة الوقائية بالمضادات الحيوية، لمعالجة حالات التهاب الملتحمة	التهاب القرنية السطحي القوباء البسيط، إصابة العين الناتجة من البكتريا الفطرية، الجلوكوما (الماء الأزرق) لا ينصح في الحمل والرضاعة .
Ketorolac tromethamine + Benzalkonium chloride + Edetate disodium + Octoxynol + Sodium chloride	اوبتيلار Optilar	يستعمل للإزالة المؤقتة للحكة العينية الناجمة عن التحسسي الموسمي للملتحمة، لعلاج التهاب التالي للعمليات عند المرضى الذين أجريت لهم عملية استخراج الساد .	لا يعطى للذين لديهم حساسية من مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية، لا ينصح للحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال دون ١٢ سنة .
Xylometazoline HCL + Benzalkonium chloride + Sodium phosphate + Sodium chloride + Methylhydroxypropylcellulos	أوتريفين Otrivin	مزيل احتقان الأنف، للمساعدة في تصريف الإفرازات الأنفية، إزالة احتقان الغشاء المخاطي للبلعوم، تسهيل تنظير الأنف	بعد التداخلات الجراحية، لا يستعمل أثناء الحمل، يستعمل تحت إشراف طبي أثناء الإرضاع، لا يستعمل على مدى فترات طويلة .

التهاب القرنية الظهاري الحثي الحاد ، الأمراض الفطرية لمكونات العين التصنيف بالنسبة للحمل النمط . C	الحالات الالتهابية المستجيبة للستيروئيدات في الملتحمة الجفنية والبصلية ، والقرنية ، والقسم الأمامي لكرة العين	<i>Dexamethasone sodium phosphate</i>	أوفتاديكس Ophtradex
لا تستعمل بعد أربعة أسابيع من فتحها	معالجة التهاب ملتحمة العين المتهيجة والملتحمة التحسسية (نزلة العين الربيعية)	<i>Antazoline sulphate + Naphazoline nitrate + Benzothionum chloride</i>	اوفتازولين Ophthazolin
في حالات الجلوكوما ، والالتهاب الفيروسي أو الطفيلي للعين ، وجود تقرب في طبلة الأذن .	تستعمل في حالات الحساسية والالتهاب في العين والأذن والأنف .	<i>Betamethasone sod. + Neomycin sulphate + Thiomersal</i>	اوفتاميزون N Ophtamesone-N
يعطى بحذر في حالات القصور الكبدية والكليوي وفي الإرضاع الحمل فئة . B	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات .	<i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>	اوكمنتين Augmentin اموكسيكلاف Amoxiclave
يعطى بحذر في اختلال كلوي ، المسنين تضخم البروستات ، الجلوكوما ، الأطفال دون ١٨ سنة الحمل فئة . C	إدارة الاضطرابات الذهنية بما في ذلك الهوس والنوبات الحادة المرتبطة ، الهوس الاكتئابي ، علاج الفصام .	<i>Olanzapine</i>	اولان Olan
تعديل الجرعة عند المرضى المصابين بقصور كلوي ، لا ينصح لحديثي الولادة والرضع اقل من ٦ أشهر الحمل فئة . B	التهاب البلعوم ، التهاب اللوزتين ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب الجلد والأنسجة الرخوة .	<i>Cefdinir</i>	أومني Omni
في حالات الذبحة الصدرية العرضية التي تظهر في سياق بعض الأمراض كعرض لنقص الأوكسجين مثل فقر الدم . النزيف الدماغي ، الجلوكوما ، يجب الحذر عند الاستعمال خلال فترة الإرضاع ، لا يستعمل خلال الحمل إلا للضرورة القصوى .	في معالجة الذبحة الصدرية وللوقاية منها ، وفي معالجة القصور القلبي .	<i>Isosorbid dinitrate</i>	ايزورديل Isordil
يستخدم بحذر في حالات تضخم البروستات واحتباس البول وانسداد الاثني عشر وأمراض الكبد والفشل الكليوي وفي الصرع ، في الحمل والإرضاع يستعمل للضرورة القصوى	مضاد للسعال ، طارد للبلغم مضاد للحساسية .	<i>Diphenhydramine HCL + Ammonium Chloride</i>	ايزيلين Isilin
يجب ضبط الجرعة بدقة لمرضى الاعتلال الكلوي ، الحمل فئة C الفترة الأولى من الحمل وفئة D الفترة الثانية والثالثة من الحمل	فرط ضغط الدم الأساس والخبيث معالجة قصور القلب ألاحتقاني .	<i>Enalapril</i>	اينابريل Enapril

التهاب القرنية ، وامرض فيروسية أخرى للقرنية والملتحمة ، إصابة العين بالمتقطرات ، داء فطريات مكونات العين ، في الحمل والإرضاع للضرورة	في حالات التهاب العين ، وفي حالات التهاب العينية المزمن وجروح القرنية الناتجة عن حروق كيميائية أو اختراق أجسام غريبة .	<i>Dexamethasone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate</i>	ب.ن.د P.N.D
يعطى بحذر للمرضى المصابين بأمراض القلب ، الكبد ، الاضطرابات النفسية ، القرحة المعدية ، لا يعطى للحوامل .	الاضطرابات الغذائية المترافقة مع ارتفاع بروتاكتين الدم ، العناية والعقم عند الرجال ، متلازمة المبيض متعدد الكيسات ، الطمث ، ألم واحتقان الثدي ، لمعالجة داء باركنسون .	<i>Bromocriptin</i>	بارلوديل Parlodel رونالين Ronalin
لا يستعمل بحالة فطريات الجلد .	يستعمل للحساسية والالتهابات الجلدية .	<i>Betamethasone + Neomycin</i>	بتنوسام N Betnosam-N
تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول ، يعطى بحذر لأمراض الكبد / مرض كلوي سوء التغذية ، الحمل الفئة (B)	مسكن للألام خافض للحرارة	<i>Acetaminophen</i>	براسيتول paracetol
يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة الحمل فئة C)	تستخدم في طائفة واسعة من الأمراض / التهابي ، الحساسية ، الأورام ، حالات الربو .	<i>Prednisolone</i>	بردنزولون Prednisolone
لا يستعمل للحوامل والمرضعات .	أعراض تضخم البروستات الحميد ، ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المعتدل	<i>Terazosin hydrochloride</i>	بروستانور Prosta-nor
لا يعطى مع المسكنات الأخرى ، حالات القرحة ، الحمل الفئة B ، في الثلث الأول	مسكن للألام ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام ، خفض الحمى .	<i>Ibuprofen</i>	بروفين Brufen
لا يستعمل خلال الحمل والإرضاع .	البواسير الشرجية والحكة والألم والحرق المرافقة لها .	<i>Cinchocaine HCL + Hydrocortisone</i>	بروكتوسيديل Proctosedyl
لا يوجد / أمن للحوامل والرضع والأطفال وكبار السن	الحكة المصحوبة ببغم ، حساسية الصدر ، التهاب الجهاز التنفسي السفلي	<i>Lobelia Tinct. + Scilla Tinct. + Liquorice Ext. + Stramonium Tinct.</i>	برونكيوم Broncho
لا يعطى لحديثي الولادة والخدج ، لا يستخدم لدى الأمهات المرضعات ، الجلوكوما ، القرحة الهضمية ، تضخم البروستات انسداد عنق المثانة ، يعطى بحذر في الربو المزمن ، ضغط العين المرتفع ، فرط نشاط الدرق ، المرض القلب الوعائي ، ارتفاع الضغط الشرياني ، يعطى أثناء الحمل للضرورة فقط .	التهاب الأنف التحسسي الموسمي ، التهاب الملتحمة التحسسي ، لتحسس الجلدي ، الحكة الجلدية ، يستعمل كفاتح للشهية .	<i>Cyproheptadine</i>	برياكتين Periactin

لا يعطى في الجلوكوما ، تسرع القلب ، ضخامة البروستات واحتباس البول ، الوهن العضلي الوخيم ، يعطى بحذر خلال الإرضاع والحمل خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل .	تشنجات الجهاز الهضمي ، تشنجات الاقنية الصفراوية ، تشنجات الجهاز البولي ، عسر الطمث ، الاقفاء بعد العمل الجراحي	<i>Hyoscine-n-butyl bromide</i>	بسكوبان Buscopan انتي سبازمين Anti spasmen
القصور الكلوي أو الكبدي ، فقر الدم الانحلالي .	السعال بكافة أنواعه ، الأنفلونزا ونزلات البرد الراشحة ، الحالات التحسسية التي تصيب الجهاز التنفسي ، التهاب البلعوم والقصبات والجيوب .	<i>Diphenhydramine + Phenylephrine HCL + Ammonium chloride + Tolu Balsam</i>	بكتومكس Pectomex
سعال ربوي ، قصور تنفسي ، الجلوكوما ، انحباس بول بسبب اضطرابات بولية بروتينية ، لا يعطى خلال الإرضاع ، لا يعطى في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل .	لمعالجة السعال الجاف .	<i>Dextromethorphan HBr + Guaifenesin + Mepyramine maleate</i>	بكتوميدي pectomed
يعطى بحذر في مرض السكري ، قد يغير الاستجابة للأنسولين ، الأطفال ، والمرضى ، المسنين ، الحمل الفئة (B	مضاد للقيء ، علاج ركود المعدة بعد الجراحة والسكري .	<i>Metoclopramide HCL</i>	بلاسيل Mecludin
لا يعطى في حالات القرحة الهضمية ، نزف داخل القحف ، الإرضاع يعطى بحذر في الحمل وللأطفال .	مضاد لتجلط الدم ، الحد من تصلب الشرايين ، السكتة الدماغية .	<i>Clopidogrel</i>	بلافكس Plavix
يستخدم بحذر عند المرضى المصابين باضطراب شديد في الوظيفة الكبدية ، تعديل الجرعة في حالات الفشل الكلوي المتوسط إلى الشديد ، وفي الإرضاع (الحمل فئة . B	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات	<i>Amoxicillin + Cloxacillin</i>	بلموكلوكس Pulmoclox
الإمساك ، يعطى بحذر لمرضى الربو ، الأطفال أقل من سنتين	معالجة السعال ، مضاد للحساسية ومهدئ	<i>Glyceryl Guaiacolate + Chlorpheniramine + Phenylephrine + Codeine phosphate + Vitamin C</i>	بلموكودين Pulmocodin
لا يستعمل عند حديثي الولادة والخدج ، الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية ، المرضى ذوي ارتفاع ضغط دم شديد ، يستعمل في الحمل للحاجة فقط في الأشهر الستة الأولى من الحمل لا يجوز في الأشهر الثلاثة الأخيرة ، يجب اخذ الحذر للمرضعة .	مضاد للحساسية ، معالجة السعال المترافقة باضطرابات تحسسية ، مضاد احتقان .	<i>Dexochlorphenaramine</i>	بولارامين polaramine
لا يستعمل في : الأمراض الفطرية ، الفيروسية ، بعض حالات الجلوكوما ، التهاب القرنية المتشعب . يعطى بعد الاستشارة في الحمل .	التهابات الجرثومية الحادة للعين ، التراخوما ، التهاب الملتحمة الشامل ، التهاب القزحية والصلبة ، التهاب الجفن ، كلاميديا ، الإصابات العينية .	<i>Oxytetracycline + Hydrocortisone acetate + Polymixin-b-sulphate</i>	بولي كورت Polycort

لا يوصف للمرضى الذين يعانون منقصور شديد في وظيفة الكلينتين ، ولا يوصف في التهاب الأمعاء أو قرحة الأمعاء وقرحة المعدة ، لا يستعمل عند الإرضاع . الحمل فئة C))	لتخفيف الألم البسيط أو المتوسط الشدة وحالات الصداع .	Mefenamic acid	بونستان Ponestan ميفين Mefen
أمراض القناة الهضمية الانسدادية .	المغص المعوي والمعدني ، تقلص فتحتي البواب والفؤاد بالمعدة ، القيء .	Pipenzolate methylbromide + Phenobarbital	بيبي تال Baby tal
لا يوجد .	مضاد تشنج ، طارد للرياح ، مهدئ .	Diphenhydramine + Belladonna Tincture + Cardamon Tincture	بيبي- كالم Bebe- calme
لا يوجد .	المغص عند الأطفال والغازات والنفخة وعسر الهضم .	Simethicone	بيبي كون Baby cone
التهاب الجلد حول الفم ، الإصابة الجرثومية لقشرة الرأس ، الإصابة الجلدية الفيروسية ، يستعمل بحذر في الإرضاع ، لا يستعمل في الحمل .	لمعالجة الصدفية والإصابات الجلدية المتقرنة .	Betamethasone + Salicylic acid	بيتا ساليك Beta-salic
القرحة المعدية العفجية ، يحذر إعطاء هذا الدواء عند مرضى الربو والحوامل	المعالجة العرضية للدوار ألدھليزي ، لمعالجة داء منبير (دوار ،طنين ، غثيان)	Betahistine dichlorhydrate	بيتاسيرك Bitasirc رابستين Rabestine
يعطى بحذر في حال وجود الجلوكوما ، احتباس بولي ، لا يستعمل أثناء الحمل والإرضاع	لمعالجة الوقائية للصداع الوعائي المنشأ المتكرر بما فيه الشقيقة والصداع النصفي ذو المنشأ العصبي.	Pizotifen	بيزوفين Pizofen
لا يستعمل عند المرضى المصابين بصدمة قلبية ، إحصار أذيني بطيني ، بطء قلبي واضح ، الحذر عند الإغطاء للأمهات المرضعات (الحمل فئة C)	للتحكم بارتفاع التوتر الشرياني ، لخفض ضغط الدم.	Bisoprolol	بيزوكور Bizocor
في حالة القصور الكبدى او الكلوي ، يجب استشارة الطبيب للحوامل والمرضعات .	الآلام وإزالة التشنجات وتخفيض الحرارة ، الصداع . ألم الأسنان ، ألم عسر الطمث	Dextropropoxyphen + Paracetamol	بين استوب Pain stop دولو استوب Dolo stop
لا يستعمل عند وجود إصابات جلدية (جروح أو التهاب) . لا يستعمل عند الحمل أو المرضع أو الأطفال دون سن الثانية عشر إلا باستشارة الطبيب.	لمعالجة حب الشباب .	Benzoyl Peroxide	بينوكسيد جل Ben-oxide
يعطى بحذر للذين يعانون من أمراض القلب والسكري والجلوكوما والمسنين ، (الحمل فئة C)	موسع للشعب الهوائية عند نوبات الربو والأمراض الأخرى .	Salbutamol	بيوتادين Butadiene فنتولين Ventolin
يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد والكلى ، احتباس البول ، تضخم البروستات ، انخفاض ضغط الدم ، داء السكري ، لا يعطى في الجفاف الأطفال دون ١٢ سنة ، (الحمل فئة C)	مدرر للبول ، إزالة السوائل الزائدة في الجسم ، وفي حالات زيادة السوائل واحتباسها في الجسم ، يستخدم أيضاً لعلاج ارتفاع ضغط الدم .	Bumetanide	بيورنيكس Burinex

يعطى بحذر في اختلال كلوي أو كبدي الوهن المرضي الحمل فئة (D)	الوقاية من التهاب الشعب الهوائية المزمن من التفاقم ، التهاب اللثة ، علاج السيلان .	<i>Tetracycline</i>	تتراسايكلين Tetracycline
الحساسية لأحد مكوناتها ، في حالة الحمل ، الإصابة بجذري الماء أو السل وجود الدوخة أو مشاكل سمعية ، عند وجود ثقب في طبلة الأذن .	التهاب الأذن الخارجية والقناة السمعية بسبب جرثومي أو فطري ، تخفيف الحكة ، الحرقه ، الحساسية	<i>Triamcinolon Acetonide + Neomycin sulfat + Gramicidin + Nystatin</i>	تري - أوتيك Tri - Otic
يعطى بحذر في الجلوكوما ، تضخم البروستات ، فشل القلب الحاد ، يعطى بحذر أيضاً في الحمل والإرضاع .	مضاد للحساسية	<i>Clemastin</i>	تفاجيل Tavagyl
تحدث حساسية مع مضادات الاكتئاب الأخرى ، الجلوكوما ، المسنين ، تضخم البروستات ، (الحمل فئة (C)	مهدي ، وفي حالات سلس البولي ، اتقاء الأوعية الدموية والصداع .	<i>Imipramine HCL</i>	تفرانيل Tofranil
يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي ، المرضى المسنين ، وفي الحمل والإرضاع .	علاج قرحة الاثني عشر وقرحة المعدة ، العلاج والوقاية من حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضية والحامض في المعدة ، الوقاية والعلاج من التوتر الناجم عن النزيف في الجهاز الهضمي العلوي	<i>Cimetidine</i>	تكاميت Tagamet
يعطى بحذر في حالات أمراض القلب ، أمراض الكبد ، المسنين ، تضخم البروستات الحمل فئة (C)	علاج الصرع ، بعض آلام الأعصاب ، الصداع النصفي .	<i>Carbamazepine</i>	تكريتول Tegretol
تناذر جيبى ، قصور بطيني أيسر ، حصار أذيني بطيني ، لا يوصف للحامل أو المرضع أو الأطفال .	العلاج الوقائي لهجمات خناق الصدر خاصة عند الجهد ، معالجة ارتفاع التوتر الشرياني الأساسي	<i>Diltiazem</i>	تلديا Tildia
الامسك ، يعطى بحذر لمرضى الربو.	مضاد للسعال عند الاطفال	<i>Glyceryl guaiacolate + Chlorphenarmine maleat + Phenylephrine HCL</i>	توسليت Tussilet
الامسك ، يعطى بحذر لمرضى الربو ، الاطفال اقل من سنتين .	مهدي للسعال الجاف ، موسع للشعب الهوائية ، مضاد للحساسية	<i>Chlorpheniarmine maleat + Phenylephrine HCL + Ephedrine HCL + Codeine phosphate</i>	توسيرام Tussiram توسيفان Tussivan
لا يستعمل في حالة الحمل والإرضاع.	معالجة السعال الجاف والارجي .	<i>Dextromethorphan HBr + Oxomemazine HCl + Sodium Benzoate</i>	توكسيل Toxil
في الحمل والإرضاع يجب استشارة الطبيب ، لا تستعمل هذا الدواء مع أدوية أخرى تحتوي براسيتول .	مسكن للسعال و مضاد للاحتقان ومضاد تحسس ومسكن الأم وخافض للحرارة .	<i>Paracetamol + Chlorpheniramine + Dextromethorphan HBr + Pseudo-Ephedrine HCl</i>	تولين D Tullin-D
وجود عدسات لاصقة ، يجب استشارة الطبيب للحوامل والمرضعات قبل الاستعمال .	التخفيف المؤقت من الحرقه والتهيج الناجم عن جفاف العين ، الوقاية من حدوث تهيج آخر	<i>Glycerin + Hypromellose + Polyethylene glycol</i>	تيرموند Tearmond

مرض في الجهاز التنفسي مثل الربو ، أمراض معينة في القلب ، اضطرابات كلوية شديدة ، لا يجوز الاستعمال أثناء الحمل والإرضاع وللأطفال .	لخفض الضغط المرتفع في العين ومعالجة الزرق	<i>Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate</i>	تيمودور Timodor
لا يعطى في وذمة رئوية ، صدمة قلبية ، بطء القلب أو إحصار القلب ، يعطى بحذر في اختلال كبدي أو كلوي والمسنين ومرض رئوي وداء السكري (الحمل والإرضاع والأطفال لا يعطى)	لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، لتخفيف آلام الذبحة الصدرية ويستخدم لتنظيم ضربات القلب وللرجفة .	<i>Atenolol</i>	تينورمين Tenormin
لا يستعمل بحالة ارتفاع عمل الغدة الدرقية ، أمراض القلب ، وبحالة الحمل فلا بد من تغيير الجرعة لأنه تزداد الحاجة لهورمونات الغدة الدرقية	يستخدم لمرضى انخفاض عمل الغدة الدرقية والأورام الحميدة لهذه الغدة ، ويستخدم بحالة الأورام السرطانية للغدة الدرقية بعد خضوع المريض للجراحة .	<i>Levothyroxine sodium</i>	ثايروكسين Thyroxin
لا يعطى في حالات الالتهاب الحاد في البنكرياس ، تخفيض الجرعة لدى المصابين في قصور وظائف الكلى ، الحمل والإرضاع للضرورة القصوى.	لعلاج آلام الاعتلال العصبي لدى البالغين ، كعلاج منفرد أو إضافي في الصرع .	<i>Gabapentin</i>	جابا تركس Gabatrex
لا يعطى في داء ترسب الأصبغة الدموية الأولية ، فقر الدم الانحلالي وفقر الدم الأخرى لا ترجع إلى نقص الحديد ، يستخدم بحذر في القرحة الهضمية ، التهاب القولون التقرحي أو التهاب الأمعاء الإقليمية (يمكن أن تتفاقم الحالة) ، استخدام العشوائى المزمن (قد يؤدي إلى زيادة تركيز الحديد) ، المرضى المسنين ، الأطفال ، الرضاعة ، الحمل فئة B	في حالات فقر الدم	<i>Iron – sorbitol</i>	جكتوفير Jectofer انفيرون Inferon
في حالة القصور الكبدي او الكلوي ، لا يعطى للحوامل .	علاج داء السكري	<i>Glimepiride</i>	جليماكس Glemax
لا يوجد / آمن للحوامل والرضع والأطفال وكبار السن	لمعالجة السعال .	<i>Guava leaves + Tilia Flowers + Fennel oil</i>	جوافلكس Guaflex
لا يستعمل للأطفال دون ٤ سنوات ، لا ينصح باستعمالها للحوامل والمرضعات إلا لضرورة ملحة.	علاج الاضطرابات البصرية ذات الطبيعة التحسسية ، وفي حالات التحسس الناتجة عن استعمال العدسات.	<i>Sodium Cromoglycate</i>	دادكروم Dadcrome
ينصح بإيقاف الإرضاع أثناء اخذ العلاج ، يعطى للحوامل .	نقص البروجيستيرون مثل : آلام الطمث ، داء البطانة الرحمية ، انقطاع الطمث الثانوي ، عدم انتظام الدورة ، العقم ، الإجهاض المتكرر المصحوب بنقص البروجيستيرون .	<i>Dydrogesterone</i>	دافستون Duphaston

اختلال كبدي أو كلوي ، الوهن المرضي ، الحمل أو الرضاعة (وإن لم يثبت سلامة ، تم استخدامها بدون ضرر أثناء فترة الحمل	علاج أشكال مختلفة من الاكتئاب ، الوسواس القهري ، اكتئاب المسنين	Fluoxetine	داونيكس Dawnex
في حالة القصور الكيدي او الكلوي ، لا يعطى للحوامل	علاج داء السكري	Glibenclamide	داونيل Daonil
الحمل خاصة الأشهر الثلاثة الأولى والمرضع .	للالتهابات الفطرية المهبيلية البسيطة والقوية	Fluconazole + Azithromycin + Secnidazole	دايزل كيت Dazel kit
يراعى تخفيض الجرعة في كبار السن والمرضى بقصور في وظائف الكبد ، لا يعطى أثناء الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى وكذلك خلال الرضاعة والأطفال اقل من سنتين .	علاج عدوى الاميبا في الأمعاء والأنسجة الأخرى وفي خارج الأمعاء وإصابات طفيلية أخرى .	Diloxanide furoate + Metronidazole – Benzoyl	دايلوزول Dilozole
انسداد في الجهاز الهضمي ، وهن الأمعاء ، التهاب القولون ، الأمراض القلبية الوعائية ، الجلوكوما ، تجنب إعطاء الدواء للحوامل والمرضعات .	كمضاد تشنج للعضلات الملساء ، السلس البولوي ، التبول اللاإرادي عند الأطفال ، اضطراب أو عسرة البول .	Oxybutynin chloride	دربتاسير Drepettasir ديتروسبام Ditrospam
التهابات الجلد الفيروسية والبكتيرية ، جذري الماء ، الزهري ، تدرن الجلد ، حب الشباب ، يستعمل بحذر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وكذلك الإرضاع .	التهابات الناتجة عن أمراض حساسية الجلد ، والحكة الجلدية ، الحرق ، الألم .	Clobetazol propionate in Anhydrous paraffin	درمودين Dermodin
يعتبر مادة سامة لا يجوز تقريبه على العينين او الفم .	يستعمل لحساسية الجلد ، لدغة الحشرات .	Calamine + Glycerine + Camphor	درموكال Dermocal
لا يعطى للأطفال اقل من ٦ سنوات .	اضطرابات القولون التشنجية ، آلام الأمعاء المرتبطة بأعراض القولون ، تهيج القولون .	Mebeverin HCL	دسبتالين Duspatalin
قصور كلوي حاد ، انحباس البول ، فرط بوتاسيوم الدم ، الحمل فئة (C)	علاج ارتفاع ضغط الدم ، تشمع الكبد ، إدارة فشل القلب الاحتقاني .	Spironolactone	الدكتون Aldoctone
اضطرابات نفسية ، اضطرابات حادة للدورة الدموية الشريانية ، ذبحة قلبية ، اختلال وظيفة الكلى أو غسل الكلى ، أثناء الحمل والإرضاع يفضل استشارة الطبيبة .	لدى النساء: اضطراب حاد للعادة الشهرية ، العقم ، سيلان الحليب خارج الفترات الطبيعية للإرضاع . لدى الرجال : تضخم الثدي والعجز الجنسي . علاج مرض باركنسون .	Micronised Acid Lisuride + Micronised Tartaric acid + Micronised Sodium Calcium + Lactose + Magnesium Stearate + Microcrystalline Cellulose	دوبرجين Dopergin
لا يعطى في حالة قلة تجمع الصفائح الدموية . أمراض الكبد ، خلال الحمل .	يعطى لتقليل الدهون في الدم ، يمنع تجمع الدم الصفائح	Clopidogrel Bisulfate + Atrovastatin + Aspirin	دوسبين A Dospin-A
لا يعطى في حالات ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ، يعطى بحذر في الاختلال الكلوي ، (الحمل فئة . B)	يستعمل لعلاج عدم الاتزان في هرمون البرولاكتين عندما تزيد كمية البرولاكتين في الدم .	Cabergoline	دوستنكس Dostinex

يعطى بحذر في اختلال كلوي أو كبدي الوهن المرضي (الحمل فئة D)	علاج حب الشباب ، علاج الجمره الخبيثة ، علاج السيلان .	<i>Doxycycline</i>	دوكسيدار Doxydar
يستعمل بحذر بحالة أمراض الكبد والدم ، الحامل والمرضع	يستخدم بحالة التشنجات العضلية القوية التي قد تصحبها حمى ، خافض حرارة	<i>Diclofenac + Chlorzoxazone + Paracetamol</i>	دولوزوكس Dolozox
يعطى بحذر للمرضى المسنين (الحمل فئة B)	علاج ارتفاع ضغط الدم .	<i>Methyldopa</i>	الدوميت Aldomet
يجب اخذ الحذر عند المرضى المصابين بقصور كبدي معتدل أو شديد أن لا يزيد الجرعة اليومية عن 8 ملغم (الحمل فئة B)	للوقاية والعلاج من الغثيان الذي تسببه المواد الكيميائية ، للوقاية والعلاج من الغثيان والاقياء بعد التداخلات الجراحية	<i>Ondansetron HCL</i>	دي - فوميت De-vomit
يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة (الحمل فئة C)	تستخدم في طائفة واسعة من الأمراض / التهابي ، الحساسية ، الأورام ، وحالات الربو .	<i>Methylprednisolone</i>	ديبوميديول Depo-medrol
يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة (الحمل فئة C)	في طائفة واسعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك : التهابي ، الربو ، الحساسية ، الدموية ، الأورام .	<i>Dexamethasone</i>	ديكادرون Decadron دكسون Dexon
لا يوجد .	لمعالجة انتفاخ البطن ، لطرده الغازات والهواء من القناة الهضمية .	<i>Dimethicone</i>	ديميكون Dimicone
وجود عدوى جرثومية فطرية أو فيروسية في الفم أو البلعوم . لا يستعمل عند المصابين بالسل ، القرحة ، داء السكري ، أثناء الحمل إلا بعد استشارة الطبيب .	مضاد للالتهاب ، الحكه ، الحساسية ، تقرحات الفم الناتجة عن الرضوض أو الجروح .	<i>Triamcinolone Acetonide</i>	دينتي كورت Denti-cort
يجب اخذ الحذر مع المرضى المصابين بقصور حاد في وظائف الكبد ، لا يعطى للحوامل والمرضعات	علاج قرحة الاثني عشر والمعدة ، علاج التهاب المريء الارتجاعي ، التهاب وقرحة الجهاز الهضمي .	<i>Rabeprazole</i>	رابيزول Rabazole
لا يستعمل في نوبات الربو الحادة ، الإرضاع ، يستعمل بحذر في أمراض الكبد ، المسنين ، الحمل فئة B	مضاد للحساسية .	<i>Diphenhydramine HCL</i>	الريمين Allermine
عدم الاستعمال في حالات المغص الشديد وحصر البول ، لا يستعمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل .	لعلاج المغص الكلوي ، وعلاج الالتهاب المرافق للحصى الكلوي ، ويساعد على تذويب وطرده الحصى .	<i>Pinene + Camphene + Borneol + Anethol + Fenchone + Cineol + Olive oil</i>	رواتينكس Rowatinex

يستعمل بحذر عند المرضى المصابين بأمراض كبدية أو قصور كبدية ، اضطراب في نظم القلب .	التهاب القصبات ، ذات الرئة ، التهاب الحنجرة ، التهاب الجيوب ، التهاب اللثة ، التهاب البلعوم ، التهاب الأذن الوسطى ، داء المقوسات ، الوقاية من داء المقوسات الخلقي أثناء الحمل .	<i>Spiramycin</i>	روفاسين Rovacin
في حالات الجلوكوما ، وتضخم البروستات .	آلام تقلصات القناة الهضمية وزيادة حركتها ، التهاب المعدة ، التهاب الأمعاء والقولون ، القرحة الهضمية ، آلام تقلصات الصفراء ، تقلص المجرى البولي ، التهاب البنكرياس	<i>Prifinium bromide + Paracetamol</i>	ريبال Riabal
لا يستخدم مع أي علاج جلدي آخر ، لا يطبق على الأغشية المخاطية والجروح ، لا يستخدم أثناء الحمل .	كمادة مضادة لتقرن الجلد ، لمعالجة حب الشباب ، وفي إزالة تجاعيد الوجه والكلف والحزاز المسطح وحالات الاكزيما .	<i>Tretinoin</i>	ريتن A Retin A ريتينويد Retinoid
يعطى بحذر في حالات قصور بوظائف الكبد أو الكلى ، وفي أمراض القلب والأوعية الدموية ، الصرع ، خلال الحمل والإرضاع للضرورة القصوى.	علاج الفصام والاضطرابات العقلية الأخرى .	<i>Risperidone</i>	ريسدال Risdal
يعطى بحذر للأمراض الكبد ، الرضاعة ، (الحمل فئة .) C	إدارة السل النشط (بالاشتراك مع عوامل أخرى) ، القضاء على ناقل لمرض التهاب السحايا .	<i>Rifampicin</i>	ريفادين Rifadin
يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي ، المرضى المسنين ، وفي الحمل والإرضاع .	قرحة الاثنى عشر ، فرط إفراز المعدة ، القرحة المعوية الحميدة ، عسر الهضم ، فرط الحموضة .	<i>Ranitidine</i>	زنتاك Zantac
يستخدم بحذر أثناء الإرضاع ، وفي حالات اضطرابات وظيفة الكبد ، لا يستخدم أثناء الحمل .	طارد للديدان ، علاج مرض الاكياس المائية و إصابة الدماغ بيرقات الديدان الشريطية .	<i>Albendazole</i>	زنتال Zental
لا يعطى في حالات القصور التنفسي الحادة ، لا يعطى في الحمل والإرضاع يعطى بحذر في القصور الكبدية أو الكلوي	حالات القلق ، حالات الاكتئاب ، اضطرابات ناتجة عن الخوف ، علاج رعاش الحركة الأساسي .	<i>Alprazolam</i>	زولام Zolam
الربو الشعبي ، مرض انسداد الرئة ، بطن القلب ، قصور القلب . الصدمة القلبية ، لا ينصح في الحمل والرضاعة	لخفض الضغط المرتفع داخل العين للمرضى الذين يعانون من الجلوكوما مفتوحة الزاوية	<i>Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate</i>	زولامول Xolamol

اضطراب في وظيفة الكلية والكبد ، يستعمل للضرورة أثناء الحمل والإرضاع .	معالجة ارتفاع حمض البول ، اعتلال الكلية اليوراتي ، داء الليشمانيات ، داء الملوك .	<i>Allopurinol</i>	زيلوريك Zyluric هيبوريك Hypuric اللوريك Aluric
لا يعطى خلال الحمل والإرضاع .	علاج سرطان الثدي بعد الجراحة والأشعة ، معالجة مرافقة لسرطان الثدي المتقدم .	<i>Tamoxifen citrate</i>	زيموبليكس Zymoplex
القصور الكلوي أو الكبدي ، يعطى بحذر للمصابين بضخامة البروستات ، صعوبة بالتبول .	السعال بكافة أنواعه ، الحالات التحسسية التي تصيب الجهاز التنفسي و مقشع .	<i>Diphenhydramine HCL + Ammonium chloride + Sodium Citrate + Menthol</i>	ساملين Samilin
يحظر لمن لديهم اضطرابات في الأوعية الدموية المحيطية ، داء القلب التاجي ، فرط ضغط الدم ، الحمل والإرضاع ، حالات قصور الكبد والكلية	لمعالجة الشقيقة الحادة كما يستعمل لمعالجة أنواع أخرى من الصداع .	<i>Ergotamine tartrate + Caffeine</i>	ساندو ميغرين Sandu Migrain آسيا ميغرين Asia Migrain
يجب تجنب اعطاء عدد كبير من القطرات وخاصة الاطفال اقل من سنة.	في حالات المغص والتقلصات عند الأطفال	<i>Piperizolate methyl bromide + Phenobarbitone</i>	سباستال Spastal
يستعمل بحذر في حالة الصرع ، الوهن العضلي . لا يستعمل في حالات : الطفل في طور النمو ، الحمل والإرضاع .	التهاب البروستات ، التهاب العظام والمفاصل والجلد ، التهابات المجاري البولية .	<i>Ciprofloxacin</i>	سيرودار Ciprodar
لا ينصح بإعطائه للحوامل بدون استشارة الطبيب ، عند المصابين بهبوط التوتر الشرياني .	معالجة اضطرابات الدورانية الدماغية اضطرابات التوازن ، معالجة الشقيقة.	<i>Cinnarizine</i>	ستاجيرون Stugeron
يجب تجنبه في حالة المرضى الذين يعانون من تضخم البروستات .	حالات تهيج القولون	<i>Isoprampamide + Trifluoperazine</i>	ستلابيد Stelabid
لا يعطى في أمراض الكبد ، أمراض القلب والأوعية الدموية ، الجلوكوما ، يعطى ، بحذر في داء السكري ، أمراض الجهاز التنفسي ، تضخم البروستات ، أورام الجهاز العصبي المركزي ، صرع ، انسداد معوي ، (الحمل فئة . C)	علاج الذهان الحاد والمزمن ، مساعد في إدارة القلق .	<i>Trifluoperazine HCL</i>	ستلازين Iralzine
يجب إنقاص الجرعة للمرضى المصابين بخلل كلوي شديد ، يجب اخذ الحذر عند استعماله لحديثي الولادة المصابين باليرقان ، يجب اخذ الحذر عند استعماله للنساء الحوامل والمرضعات ، يجب عدم الاستعمال مع المحاليل المحتوية على الكالسيوم حيث يتسبب ذلك في حدوث آثار جانبية مميتة .	التهابات الجهاز التنفسي ، التهابات الجلد ، التهابات المسالك البولية ، داء السيلان ، تسمم الدم الجرثومي ، التهابات أغشية البطن ، التهابات العظم والمفاصل ، التهاب السحايا .	<i>Ceftriaxone</i>	سفترايكون Ceftriaxone
يعطى بحذر في قرحة المعدة ، ينصح بعدم استعماله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، أما خلال الإرضاع للضرورة فقط .	مقشع ومذيب للإفرازات ، تخفيف الأعراض المصاحبة للالتهابات القصبية الشعبية	<i>Bromhexin HCL</i>	سلفودين Solvedin

لا يعطى للأطفال ، يعطى اقل جرعة واقصر وقت في الحالات الآتية : أصحاب الأمراض المزمنة ، الإجهاد (الجراحة ، التهابات) ، (في الحمل) لم يثبت سلامة).	في طائفة واسعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك : التهابي ، الحساسية ، الدموية ، الأورام ، اضطرابات المناعة الذاتية	<i>Betamethason</i>	سليستون Celestone
لا يعطى في أمراض الكبد أو الارتفاع غير المبرر لإنزيمات الكبد ، لا يعطى للنساء الحوامل والمرضعات .	ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط ، ارتفاع الدهون في الدم .	<i>Simvastatin</i>	سمفور Simvor سيمفاتين Simvatin
يحظر استعمال في الأشهر الأخيرة للحمل ، يجب اخذ الحذر عند الإرضاع ، كذلك يستخدم بحذر في المرضى المصابين باحتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم والقصور القلبي	عسر الطمث ، حالات الألم المفاجئة ، حالات الالتهاب الخمجي ، ألم الأسنان ، حالات الألم والحرارة المترافقة مع الالتهاب	<i>Paracetamol + Diclofenac Potassium</i>	سوبر جيسيك Super gesic
يجب تعديل الجرعة لدى مرضى اعتلال الوظيفة الكلوية ، يجب مراقبة المرضى الخاضعين للديال باهتمام ، (الحمل فئة B)	التهاب البلعوم ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب ، التهاب القصبات ، التهاب الأذن الوسطى ، التهابات المجاري البولية	<i>Cefixime</i>	سوبراكس Suprax
انخفاض نسبة البوتاسيوم أو الصوديوم في الدم ، القصور الكلوي أو الكبدي أو قصور الغدة الدرقية ، توخي الحذر أثناء الحمل والإرضاع	الجلوكوما ، علاج ثانوي لبعض نوبات الصرع ، علاج مساعد في حالات الاوديما الناتجة عن هبوط القلب الاحتقاني أو عن بعض الأدوية	<i>Acetazolamide</i>	سيدامكس Cidamex
لا يعطى للحوامل .	علاج السعال الجاف والمعدن والتهيج.	<i>Diphenhydramine HCL + Sodium Citrate + Codeine phosphate + Menthol</i>	سيدو بكت sedo-pect
يستخدم بحذر عند مرضى السكري ، والإرضاع ، يستخدم بأمان عند الحمل	أعراض تخفيف من السعال التي تسببها فيروسات طفيفة ، التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، السعال المزمن	<i>Dextromethorphan HBr</i>	سيديلار Sedilar
يستعمل بأمان	يستعمل للجروح والحروق والتقرحات الجلدية .	<i>Cetimid</i>	سيلافكس Celavex
لا يعطى للمرضى المصابين بالربو أو الارتكاس التحسسي ، لا يعطى للمرضى المصابين سابقا بقرحة أو نزف هضمي ، لا يعطى للأطفال دون سن ١٨ سنة ، كما لا ينصح للمرضعات ولا يعطى للحوامل وخاصة الأشهر الأخيرة من الحمل .	لتخفيف أعراض وعلامات الالتهاب العظمي المفصلي .	<i>Celecoxib</i>	سيليكس Celex
لا يعطى في الجلوكوما ، إصابة بأفات جلدية ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع .	لمعالجة أعراض داء باركنسون .	<i>Carbidopa + Levodopa</i>	سينامت Sinemet

يعطى بحذر في أمراض الجهاز التنفسي ، في الحمل والإرضاع ، أمراض القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، الغدة الدرقية ، داء السكر ، القرحة انسداد الأمعاء .	مسكن للألام العضلي / المفاصل الصداع / الأسنان ، التشنج العضلي.	Paracetamol + Tramadol + Diclofenac	سيودافيد بلص Sudafed plus
لا يعطى في حالات مرض كبدى شديد ، البورفيريا ، يعطى للحوامل للضرورة فقط	لعلاج جميع أشكال الصرع .	Valproate sodium	فالوبين Depaken ديباكين
يعطى بحذر للمرضى الذين لديهم خلل في وظائف الكبد ، اختلال كلوي حاد المسنين أو المرضى بالوهن والأطفال (الحمل فئة . D)	مهدئ حالات الهستريا والتشنج ، ارتخاء العضلات ، القلق .	Diazepam	فالسيوم Valium
عدم انتظام ضربات القلب غير المنضبط ، فرط الدرقية . يعطى بحذر للمرضى المسنين فوق ٦٠ سنة ، (الحمل فئة C)	حالات ضيق التنفس والربو انسداد مجرى الهواء التاجم عن انعكاس أو الربو المزمن .	Aminophylline	فايلوكونتين Phyllocontin
يستعمل بحذر كبير عند المرضى المصابين باضطرابات دموية أو أمراض فعالة في الجملة العصبية ، لا يعطى في الحمل والإرضاع .	داء الأميبة المعوي والكبدى ، إسهال ، وفي الإصابة بالجراثيم اللاهوائية ، داء الجيراديات .	Metronidazole	فلاجيل Flagyl
لا يعطى في حالة القرحة ، ولا يعطى في الإرضاع ، يعطى بحذر في أمراض القلب ، الاختلال الكلوي ، الحمل والأطفال لم تثبت السلامة	حالات متعددة التي تتطلب تأثير مضاد للالتهابات/أو تأثير مسكن ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام	Piroxicam	فلدين Feldene
لا يستعمل لمعالجة التهابات القرنية الناجمة عن الهربز سمبلكس السطحي ، تدرن العين ، لا ينصح في الحمل .	معالجة التهابات الجفن وبصلة الملتحمة وقرنية العين الجزء الأمامي من الكرة .	Sodium cromoglicate + Fluorometholone	فلوكا Fluca
يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد أو الكلى ، لا يعطى للأطفال وخلال الإرضاع والحمل .	معالجة العدوى الفطرية التي تسببها الكائنات الحساسة ، بما في ذلك : الفم والبلعوم أو المريء ، المبيضات ، التهابات المسالك البولية ، التهاب الصفاق ، التهاب السحايا المستخفيات الوقاية من داء المبيضات .	Fluconazole	فلوكس Forcan فوركان
لا يستعمل للرضع في الأشهر الأولى من الولادة ، الخدج ، لا يستعمل أثناء الحمل .	لمعالجة الحروق والتقرحات الجلدية .	Silvers Sulphadiazine	فلوميزين Hmazzin
لا يستعمل للرضع دون شهر واحد ، لا ينصح خلال الحمل والإرضاع .	التهابات الأمعاء والاسهال الجرثومي أو الطفيلية .	Furazolidone	فورادون Furadon
لا يعطى في حالات قصور الكلوي ، الحمل والإرضاع .	العلاج والوقاية من مرض هشاشة العظام في النساء بعد سن اليأس ، علاج ترقق العظام لدى الرجال ، علاج مرض باجيت للعظام .	Alendronate	فوزماكس Oste اوستي

يستعمل في الحمل والإرضاع للضرورة فقط .	الالتهابات الجلدية ، تطهير البثور الجرثومية وفي حالات الإصابة بالدمل والحروق والجروح .	<i>Fusidate Sodium</i>	فوسين Fucidin
لا يعطى مع المسكنات الأخرى ، بما فيها الأسبرين ، حالات القرحة ، الحمل الفئة B ، في الثلث الأول	مسكن للألام وخافض للحرارة والتهاب المفاصل والنقرس ، هشاشة العظام	<i>Diclofenac Sod.</i>	فولتارين Voltaren
يستعمل بأمان لكن يجب تجنب فرط الجرعة	لتكوين الحمض النووي ومضاد للأنيميا الخبيثة	<i>Cyanocobalamine</i>	فيتامين B12 Vitamin B12
يستعمل بأمان لكن يجب تجنب فرط الجرعة	يساعد الجسم على استعمال الأحماض الامينية التي تعتبر قوالب بناء البروتينات	<i>Pyridoxine</i>	فيتامين B6 Vitamin B6
لا يوجد .	مرهم جلدي مطهر للقروح والجروح والحروق	<i>Povidone Iodine</i>	فيدون Vidone
(الحمل فئة . B)	علاج الالتهاب الفيروسي	<i>Acyclovir</i>	فيراميد Zovirax
لا يستعمل في حالات الدرن الحاد ، قرحة المعدة والاثني عشر ومرض السكر وترقق العظام .	الربو الشعبي ، الارتكازيا ، حالات الحساسية الأخرى ، الحمى الروماتيزمية الحادة .	<i>Dexamethasone + Chlorpheniramine</i>	فينادون Phenadone
اخذ الحذر عند الاستعمال لدى المرضى الذين يعانون من اضطراب في وظائف الكلية ، فرط بوتاسيوم الدم كذلك الذين يعانون من تضيق في الشريان الابهر ، يستخدم عند الأطفال في حال عدم جدوى الطرق الأخرى الخافضة للضغط الحمل فئة . C	علاج لارتفاع ضغط الدم ، معالجة قصور القلب الأحتقاني .	<i>Captopril</i>	كابوتين Capoten
أثناء الحمل يستعمل فقط للضرورة القصوى وحسب الاحتياج .	طارد للديدان.	<i>Levamisole</i>	كاتركس Katrex
لا يستعمل للحوامل والمرضعات .	أعراض تضخم البروستات الحميد ، ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المعتدل.	<i>Doxazosin mesylate</i>	كاردوسير Cardosyr
لا يعطى في الرجفان البطيني الليفي ، يعطى بحذر في قصور وظائف الكلى ، وحالات خلل الغدة الدرقية . يعطى في الحمل والإرضاع للضرورة القصوى.	حالات فشل القلب و الرجفان الأذيني الليفي	<i>Digoxin</i>	كارديكسين Cardixin
لا يعطى في حالات الصدمة القلبية ، ببطء كبير في نبضات القلب ، عجز في وظيفة الكبد ، الانحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية والثالثة ، الأطفال دون ١٨ سنة ، (الحمل فئة . C)	يستخدم في فرط ضغط الدم ، الذبحة الصدرية ، قصور عضلة القلب المزمن	<i>Carvedilol</i>	كارفيرييس Carvipress
لا يوجد .	الانتفاخ ، المغص الناتج عن الانتفاخ بسبب الغازات ، طارد للغازات	<i>Cinnamon oil + Caraway oil + Fennel oil</i>	كارمينكس Carminex

لا يستعمل في حالات القصور الكلوي الشديد ، الرضع وحديثي الولادة (الحمل فئة . C)	المعالجة العرضية لفرط الحموضة ، المعالجة العرضية لعسر الهضم وحرقة الفؤاد .	<i>Mg. trisilicate + Al. hydroxide gel</i>	كاستروجيل Gastrogel انتي أسيد anti acid
يجب اخذ الحذر في حالة أمراض الكبد لا يعطى في الحمل والإرضاع والأطفال دون ١٨ سنة إلا للضرورة القصوى .	التهابات المعدة والاثني عشر والقرحة والحرقة .	<i>Omeprazole</i>	كاسك Gasec اوميرازول Omeprazole
آلام حادة في البطن لسبب غير معروف وخصوصا عندما يرتبط مع حمى ، الأطفال اقل من ٣ سنوات (الحمل فئة . C)	مضاد للإسهال .	<i>Kaolin + Pectin</i>	كاو - بكتين Kao- pectin بكتوكال Pectokal
تجنبها في المرضى الذين يعانون من التعصب ، في حديثي الولادة ، يعطى بحذر ضعف السمع ، والأطفال الخدج ، السمنة المرضى . / الرضاعة ، والرضع وحديثي الولادة (لم يثبت سلامة) (الحمل فئة . C)	علاج الالتهابات الجرام سلبية خطيرة العصوي والالتهابات التي تسببها العنقوديات عند موانع بنسليبات أو غيرها من المخدرات أقل سمية	<i>Gentamycin</i>	كراميسين Garamycin جندين Genidin
لا يستعمل في الحالات الجلدية الالتهابية الحادة .	مضاد للحكة (كافة أنواع الحكة) ، وفي الجرب .	<i>Crotamiton</i>	كروتاميتون Crotamiton
بالنسبة للحمل فئة B ، يجب توخي الحذر عند الإعطاء للام المرضعة .	التهاب المسالك البولية / التهاب الجلد / التهاب الحلق واللوزتين .	<i>Cefadroxil</i>	كفديل Kefdil
في حالة الفشل الكلوي يجب أن تحدد الجرعة بدقة ، (الحمل فئة . B)	التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب الأنفية ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب المسالك البولية والتناسلية ، التهاب البروستات ، التهاب الجلد والأنسجة .	<i>Cephalexin</i>	كفلكس Keflex
يعطى بحذر لدى المرضى المصابين بأمراض في الجهاز الهضمي ، في الحمل والإرضاع للضرورة فقط .	التهابات الجهاز التنفسي السفلي ، الالتهابات البولية والتناسلية ، الالتهابات النسائية ، تجرثم الدم ، التهابات الجلد والأنسجة ، التهابات داخل البطن ، التهابات العظم والمفاصل ، السحايا .	<i>Cefotaxime</i>	كلافوران Claforan
أمراض الكبد ، سرطان البطانة الرحمية ، الكيسات المبيضية الحمل والإرضاع .	في معالجة العقم الناجم عن غياب الإباضة أو خلل الإباضة .	<i>Clomiphen Citrate</i>	كلاميد Clomid كلوميدين Clomidine
يجب عدم الاستخدام في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ما لم يرى الطبيب ضرورة لذلك .	مضاد ومبيد فطري واسع الطيف وقاتل للوحيدات المشعرة .	<i>Clotrimazole</i>	كلوتريمازول Clotrimazole كاندي مازول Candi mazol
لا يستعمل في حالات القصور الكلوي أو الكبدية ، وحدث جفاف ، قصور القلب ، ولا يستعمل أثناء الحمل .	علاج داء السكر ، وكعلاج مساعد لمرضى داء السكري المعتمدين على الأنسولين .	<i>Metformine</i>	كلوكوفج Glucophage

قصور رئوي حاد ، تثبيط تنفسي ، تجنب الاستعمال أثناء الحمل والإرضاع .	يستعمل لكل أنواع الصرع والنوبات الصرعية التي تحدث للرضع والأطفال والبالغين	<i>Clonazepam</i>	كلونا – ريل Clona – ril
لا يستعمل في الحالات : تدرن الجلد ، الإصابات الجلدية الإفرنجية ، والإخماج الفيروسي في الجلد ، يستعمل أثناء الحمل والإرضاع للضرورة فقط.	لمعالجة الالتهابات الجلدية والفطرية والحكة والتحسس الجلدي .	<i>Betamethasone + Gentamicin + Clioquinol + Tolnaftate</i>	كوادريديم Quadriderm بولي ديرم Polyderm تتراديرم Tetraderm
لا يعطى في فرط الغدة الدرقية ، بطء القلب ، يجب إخبار طبيب التخدير في حال استعمال هذا العلاج قبل العملية الجراحية ، لا يعطى بعد الشهر الرابع من الحمل .	للوقاية من بعض أنواع الاضطرابات في نظم القلب ومعالجتها .	<i>Amiodarone HCL</i>	كوردارون Cordarone
وجود إصابة بالشرابين الإكليلية ، فرط نشاط الغدة الدرقية ، الجلوكوما ، تضخم البروستات ، انسداد المثانة ، الأطفال أقل من ١٢ سنة ، الحمل والإرضاع .	إزالة الاحتقان الأنفي والحساسية ، وقف سيلان الأنف والأعراض المرافقة ، احتقان الأغشية المخاطية ، احتقان الجيوب والمساعدة على فتحها .	<i>Chlorpheniramine maleate + D-pseudoephedrine HCL</i>	كولد – أيد Cold – Aid
عدم الإعطاء للمرضى المصابين بأمراض كلوية أو كبدية إلا بعد استشارة الطبيب .	تخفيف أعراض احتقان وسيلان الأنف والعطس والآلام الخفيفة والصداع والحمى التي يسببها الرشح العادي وحمى القش والتحسسات الأنفية	<i>Paracetamol + Pseudo-Ephedrine + Chlorpheniramine maleate + Vitamine C</i>	كولدين Coldin
لا يعطى للحوامل والمرضعات إلا للضرورة ، كما يتوجب الانتباه إلى عدد الصفحات الدموية عند المرضى الذين يتعاطون بنفس الوقت المواد المضادة للسكري .	الربو القصبي ، التهاب القصبات التحسسي ، أعراض الربو المترافقة مع حمى الطلع .	<i>Ketotiphen</i>	كيتوتيفين Ketotiphen
يجب اخذ الحذر لدى المصابين بقصور كلوي أو كبدي أو الصرع .	التشنج والمغص المعدي المعوي ، الاقياء والغثيان	<i>Scopolamine methonitrate</i>	كيميدال Kimidal
ينصح بعدم الاستعمال عند وجود إصابات فطرية أو حمى راشحة أو أفات جرثومية في الفم والحلق .	معجون لمعالجة تقرحات الفم .	<i>Triamciolone Acetonide</i>	كينالوغ Kenalog
الجلوكوما ، خطر الاحتباس البولي ، أمراض القلب والشرابين ، أمراض الكبد ، يستخدم بحذر في مرض السكري ، أمراض الجهاز التنفسي تضخم البروستات ، أورام الجهاز العصبي المركزي ، صرع ، انسداد معوي ، في الحمل أو الإرضاع : لم تثبت السلامة	يستعمل في بعض اضطرابات المزاج ، الفواق العنيد ، الغثيان والقيء .	<i>Chlorpromazine HCL</i>	لارجكتيل Largactil

يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد ، داء السكري ، الأطفال دون ١٨ سنة ، الحمل فئة (C)	مدر للبول عند ارتفاع ضغط الدم .	<i>Furosemide</i>	لازكس Lasix
مرضى الغالاكتوزيما ، حالات الانسداد المعوي ، عدم تحمل لاكتولوز ، يستعمل بأمان خلال الحمل .	لمعالجة الإمساك ، مرضى اعتلال الدماغ الكبدى .	<i>Lactulose</i>	لاكتولاك Lactolac
لا يعطى في حالات وجود ألم بطني حاد ، التهاب زائدة ، نزف شرجي ، التهاب المعدة والأمعاء ، انسداد معوي الحمل فئة (B)	لمعالجة الإمساك .	<i>Bisacodyl</i>	لاكسدل Laxadyl بسكوديل Bisacodyl
يجب اخذ الحذر في حالة أمراض الكبد لا يعطى في الحمل والإرضاع والأطفال دون ١٨ سنة إلا للضرورة القصوى .	التهابات المعدة والاثني عشر والقرحة والحرقة .	<i>Lansoprazole</i>	لانسيد Lancid
لا يوجد .	ترطيب أغشية الأنف الجافة في حالة التهاب الجيوب الأنفية ، تعرض للجفاف واستخدام الأوكسجين .	<i>Sodium chloride + Sodium bicarbonate</i>	لايس Lyse
يعطى بحذر في الجلوكوما ، ارتفاع ضغط الدم الوهن العضلي ، التهاب القولون التقرحي ، أمراض الكبد والكلى والرئوي ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع .	يمنع تقلصات عضلات جدار الأمعاء ، تخفيف من إنتاج حمض المعدة .	<i>Chlordiazepoxide + Clinidium bromide</i>	لبراكس Librax
الانتفاخ البطني ، داء الأمعاء الالتهابي الحاد ، لا ينصح للرضع ، التهاب القولون المرافق للمضادات الحيوية .	مضاد للإسهال .	<i>Loperamide HCL</i>	لوبرمايد Loperamide
يعطى بحذر في الحمل والإرضاع .	شراب مخفف للسعال و مقشع ومذيب للإفرازات .	<i>Dried ivy leaf extract + Potassium sorbate</i>	ليبلاب Liblab
لا يعطى في حالات الصدمة القلبية ، قصور القلب ، حصار القلب ، بطء القلب الجيبي ، يعطى بحذر للحوامل والمرضعات وتحت إشراف الطبيب .	الذبحة الصدرية ، ارتفاع الضغط الشرياني ، للوقاية من الشقيقة ، وكعلاج مساعد في فرط نشاط الغدة الدرقية .	<i>Metoprolol</i>	لوبريس Lopress
لا يعطى للأشخاص الذين لديهم احتباس البول ، لا يعطى للحوامل والمرضعات	معالجة ارتفاع الضغط الحاد .	<i>Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide</i>	لوتيد Lotid
لا يعطى للحوامل ، من باب الاحتياط لا يعطى أثناء الإرضاع وفي حالة القصور الكبدى والكلى .	التهاب الأنف التحسسي ، التهاب الملتحمة ، الاضطرابات التحسسية الجلدية .	<i>Loratadine</i>	لوراتادين Loratadine لورتين Lortin
يعطى بحذر لمرضى القصور الكبدى والكلوى ، بالنسبة للإرضاع يجب إيقاف العلاج أو الإرضاع حسب أهمية العلاج للام ، لا يعطى للحوامل وخاصة بعد الأشهر الثلاثة الأولى .	علاج ارتفاع التوتر الشرياني (علاج ضغط الدم) يستعمل لوحده أو بالمشاركة مع خافضات الضغط الأخرى .	<i>Losartan potassium</i>	لوزارتان Losartan
التهاب القرنية الناتج من هربز سميلكس ، التهاب الملتحمة والقرنية : فاكسينا ، فارسيل / التهابات الفطرية .	لعلاج التهابات ملتحمة العين والقرنية الجزء الأمامى من العين .	<i>Ofloxacin + Prednisolone acetate + Tetrahydrozolin HCL</i>	لوكسترا Loxtr

يعطى بحذر في المرضى الذين يعانون من الصرع ، المسنين ، مرضى اختلال كلوي ، والرضاعة ، والأطفال (الحمل فئة . C)	معالجة التشنج ، علاج التشنج الشديد الناشئة في الحبل الشوكي ، إدارة الألم في التهاب العصب الثالث .	<i>Baclofen</i>	ليورسال Lioresal
لا يوجد .	تخفيف آلام المغص ، تخفيف الحموضة والنفخة عند الأطفال .	<i>Dill seed oil + Sodium bicarbonate</i>	ماء غريب Gripe Water
ينقص الاموكسيسيلين من فعالية مانعات الحمل الفموية . (الحمل فئة . B)	التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب الأنفية ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب المسالك البولية والتناسلية ، التهاب البروستات ، التهاب الجلد والأنسجة ، خراجات داخل البطن ، خراج الرئة .	<i>Amoxicillin + Flucloxacillin</i>	ماكسبين Maxipen
يجب الحذر عند الإغطاء للام المرضعة ، لا ينصح باستعماله للمرأة الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى .	لعلاج التهابات الفطرية وكذلك الالتهاب الثانوي الناتج عن البكتريا .	<i>Miconazole Nitrate</i>	مايكوهيل Mycosheal
لا يعطى في الجلوكوما ، انحباس البول ، الوهن العضلي ، لا يعطى للأطفال دون ١٠ سنة ، يعطى بحذر للمرضى الذين يعانون من خفقان القلب ، يعطى بحذر في الحمل والإرضاع .	الآلام الخفيفة والمتوسطة كحالات اضطراب العضلات ، آلام أسفل الظهر ، انزلاق الغضروف ، آلام المفاصل ، الصداع ، آلام عسر الطمث .	<i>Orphenadrine citrate + Paracetamol</i>	مايوجيسك Myogesic كاناجيسك Kanagesic
الفشل الكلوي أو الكبدي الشديد ، البرفيرية الحادة ، الرضع بعمر أقل من شهرين ، الحمل ، يستعمل بحذر عند المرضى الكهول .	إصابات السبيل البولي ، التهاب القصبات المزمن ، التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال ، الإسهال .	<i>Trimethoprim + Sulfamethoxazole</i>	مثيريم Methoprim
لا يجوز الاستعمال في اضطراب الوظيفة الكبدية والكلوية ، ولا يجوز أثناء الحمل .	في حالات النزوف النسائية ، الوقاية من النزف الرحمي بعد الولادة	<i>Methyl ergometrine</i>	مثرجين Methergin اركوت Ergot
لا يستعمل في القرحة الهضمية ، القصور الكبدي الحاد والقصور الكلوي الشديد ، الأطفال والمراهقين دون ١٥ سنة ، وكذلك أثناء الحمل والإرضاع .	لعلاج أعراض الالتهابات الرئوية ، لعلاج أعراض الالتهاب العظمي المؤلم (داء المفاصل ، الداء المفصلي التنكسي)	<i>Meloxicam</i>	موبك Mobic
نزف المعدة والأمعاء ، انسداد أو ثقب في الجهاز الهضمي ، ينصح باستشارة الطبيب أثناء الحمل ، لا يستخدم أثناء الإرضاع .	معالجة أعراض الغثيان والقيء وحالات عسر الهضم .	<i>Domperidone</i>	موتالون Motilium موتيليوم Dompy دومبي
خلل في وظائف الكلى ، ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم ، في حالات تعاطي أدوية تحتوي على البوتاسيوم ، لا يعطى في الحمل والإرضاع	مدر للبول في حال ارتفاع ضغط الدم ، في حالات تليف الكبد المصحوب باستسقاء .	<i>Amiloride Hydrochloride + Hydrochlorothiazide</i>	موديوريتك Moduretic

لا يعطى لمرضى القصور الكبدي او الكلوي ، لا يعطى خلال الحمل ، يعطى بحذر اثناء الارضاع وكذلك لكبار السن	معالجة امراض القولون القرحية الحادة والوقاية من الاندفاعات النزفية المتطورة بدءاً من القولون حتى الشرج	Mesalazine	ميزا كول Mesacol
لا يعطى في حالات القرحة ، يعطى بحذر في حالات امراض القلب الوعائية والكلية والكبدية والحمل والرضاعة أو الأطفال اقل من ٢ سنة.	مسكن الم ، للحمى ، عسر الطمث ، التهاب المفاصل الروماتزم ، هشاشة العظام .	Naproxen	نابروكس Naprox
الاستعمال المطول لهذه القطرات يؤدي الى احداث اذى كبير للاغشية المخاطية مما يؤدي الى انسداد الانف .	يعطى في حالة انسداد الانف	Naphthazoline nit. + Phenylephrine HCL + Chlorbutol	نازوفرين Nazophrine
لا يعطى للرضع دون الثلاثة أشهر ، والحوامل ، وخلال الإرضاع ، يعطى بحذر للمرضى المصابين بقصور في وظائف الكلية أو الكبد .	معالجة التهابات الجهاز البولي السفلي ، معالجة الزحار العصوي ، إسهال	Nalidixic acid	نكرام Nigram
يعطى بحذر في الاعتلال الكلوي والكبدى الشديدين ، الصرع واضطرابات الجملة العصبية المركزية وعند كبار السن ، لا يستعمل عند الأطفال والمرضعات الحوامل	التهابات الكلية والمجاري البولية ، التهابات الجهاز الهضمي الاسهالات ، السيلان ، التهاب الصفاق	Norfloxacin	نورفلوكس Norflox
يستخدم بحذر عند مرضى الربو أو الجلوكوما أو توسع غدة البروستات ، لا ينصح للأطفال دون ١٢ سنة ، الحمل فئة (B)	الدوخة والاقياء الناتج عن الحمل .	Meclozine HCL + Vitamin B6	نوفادوكس Novadoxe
لا يعطى في : قرحة المعدة. يعطى بحذر في الربو ، أمراض المعدة ، فشل الكبد والكلية ، أمراض القلب عجز القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، الحمل خاصة الأشهر الثلاثة الأخيرة .	مسكن للآلام وخافض للحرارة	Paracetamol + Ibuprofen + Caffeine	نوفافين Novafen نو بين No pain
يعطى بحذر لمرضى السكري الحمل فئة (B)	الأمراض المسببة بالفطور الخميرية ، داء المبيضات الذي يصيب الأغشية المخاطية ، يستعمل لمنع تطور داء المبيضات خلال المعالجة الطويلة بالمضادات الحيوية	Nystatin	نيستاتين Nystatin
لا يستعمل عند وجود التهابات فيروسية موضعية أو جهازية ، لا يستعمل خلال الحمل ، يعطى بحذر للأم المرضعة .	مضاد جرثومي ، مضاد فطري مضاد للالتهابات واسع الطيف .	Triamcinolone acetone + Gramicidin + Neomycin + Nystatin	نيستاغرام Nystagram نستاكورت Nystacort

يعطى بحذر في القصور الكبدي أو الكلوي أو القصور التنفسي . لا يعطى في فقدان الوعي ، فرط التوتر داخل القحف ، الأطفال ، الصرع ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	مسكن مركزي قوي يستعمل لتسكين الألام المتوسطة أو الشديدة	<i>Tramadol HCL</i>	نيودول Neodol
لا يعطى في حالة انسداد الشريان التاجي ، احتشاء العضلة القلبية ، يمكن استعماله للحوامل .	لعلاج ارتفاع ضغط الدم	<i>Amlodipine + Lisinopril</i>	هيبيريل A Hipril – A
لا يستعمل في نوبات الربو الحادة ، الإرضاع ، يستعمل بحذر في أمراض الكبد ،المسنين ، الحمل فئة B	مضاد للحساسية .	<i>Chlorpheniramine</i>	هستادين Histadin
مضاد استنطاب في التثبيط الشديد والسمي للجملة العصبية المركزية ، داء باركنسون ، يعطى للضرورة القصوى في الحمل ، يجب تجنب الإرضاع عند اخذ العلاج ، يعطى بحذر للمصابين باضطرابات قلبية وعائية	الاضطرابات النفسية ، علاج مشاكل السلوك الشديدة عند الأطفال مفرطي الحركة ، اضطرابات التقلصات اللاإرادية	<i>Haloperidol</i>	هيايدول Hayadol
ضخامة البروستات ، الزرق مغلق الزاوية ، قرحة المعدة والاثني عشري ، الأمراض القلبية والكلى الحادة الانتانات الفيروسية كالحماق وشلل الأطفال ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع ، لا يعطى مع الاندوسيد والأسبرين ، لا يعطى للأطفال دون سنتين ، يعطى بحذر في حالة الصرع.	التهاب الأنف التحسسي بأنواعه ، التحسس لغبار الطلع وحمى الكلى ، الإصابات الجلدية الأرجية مثل الاكزيما ، التهاب الملتحة التحسسي .	<i>Dexamethasone + Dexchlorpheniramine + Ascorbic Acid (Vit .C)</i>	هيانيل Hayanil
يعطى خلال الحمل والإرضاع للضرورة فقط .	الأمراض الناشئة عن اضطراب ايض الكالسيوم ، لين العظام ، الكساح ، نقص الكالسيوم عند الأطفال حديثي الولادة ، سوء امتصاص الكالسيوم في حالات الكساح .	<i>Alfacalcidol</i>	ون – ألفا One – Alpha
لا يعطى خلال الحمل والإرضاع إلا للضرورة .	معالجة أعراض التهاب الأنف التحسسي الفصلي وتشتمل على : (العطاس ، سيلان الأنف ، حكة في الأنف وباطن الفم والحنجرة ، تدمع واحمرار العين) ، المعالجة العرضية للحكة الناجمة عن الشري الجلدي المزمن .	<i>Fexofendine HCL</i>	البرجي - ستوب Allergy-stop

لا يستعمل في حب الشباب ، وردية الوجه ، التهابات ما حول الفم ، يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	حالات الالتهابات الجلدية والحكة مثل الصدفية والتهابات سطحية .	Mometasone Furoate	اليكا Elica
يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	في حالات الالتهابات الجلدية والحكة المصاحبة بعدوى فطرية .	Mometasone Furoate + Miconazole Nitrate	اليكا M- Elica M
لا يستعمل في حب الشباب ، وردية الوجه ، الحكة الشرجية ، لا يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	لمعالجة المناطق الجلدية مفرطة التقرن مثل الاكزيما المزمنة ، الحزاز البسيط ، الطفح الجلدي والصدفية .	Mometasone Furoate + Salicylic acid	اليكا سال Elica sal
خلل وظائف الكلى ، التهاب الكبد الشديدي ، لا يستعمل في الحمل إلا للضرورة .	لإزالة الألم والشعور بالحرقان والأعراض الأخرى التي تنشأ عن تهيج الغشاء المخاطي للجزء السفلي من الجهاز البولي المتسبب عن العدوى بالميكروبات	Phenazopyridine HCL	يوريسبت Urisept
يعطى بحذر في حالات القصور الكلوي أو الكبدية ، الحمل فئة C في الأشهر الثلاثة الأولى وفئة D في الأشهر الأخيرة للحمل	في معالجة ارتفاع الضغط الشرياني يستخدم بمفرده أو مع خافضات أخرى	Valsartan	يونيفان Univan دايوفان Diovan

ملاحظات :

(١) تقسم الفئات بالنسبة للحمل كما مبين في الجدول التالي :

الفئة A	الفئة B	الفئة C	الفئة D
امن للحمل	في حالة الفائدة أكثر من الضرر	في الحالات الضرورية فقط	لا يستعمل أبداً

(٢) هناك شركات متنوعة بالنسبة للأسماء التجارية ولكن المذكورة هنا هي الأكثر شيوعاً .

(٣) الحساسية لأي نوع من العلاج يكون سبباً لمنع الاستعمال .

(٤) المحتويات : (٢٣٠) علاج .