

2021

مكتبة الأمل



# علم الأحياء

بكالوريا 2021

إعداد الأستاذ

نضال أوجة

تجدوها حصريا في مكتبة الأمل مع  
إمكانية الشحن للمحافظات

التواصل عبر الواتس اب والتلغرام  
على الرقم

0959458194

مكتبة الأمل

طبعة 2021

## الوحدة الأولى

### أولاً ، التنسيق العصبي

#### الدرس الأول ، الجهاز العصبي

- كيف أو فسر تتحرك الأهداب جميعها سوياً بانتظام لدى البارامسيوم ؟ أو كيف تتكون الشبكة العصبية لدى البارامسيوم ؟
- إن كل هذب يتصل بحبيبة قاعدية مغمورة في السيتوبلازم (المادة الحية) وتتصل هذه الحبيبات مع الليبفات العصبية لتكون شبكة عصبية. ماذا نتوقع أن ينتج عن تلف بعض الليبفات العصبية لدى البارامسيوم ؟ تتوقف حركة الأهداب المتصلة بها.
- ماذا ينتج عن اتصال الحبيبات القاعدية مع الليبفات العصبية لدى البارامسيوم ؟ تتكون شبكة عصبية.
- فسر نكمش هيدرية الماء العذب بأكملها عند اللمس المفاجئ للوامسها أو مم يتكون الجهاز العصبي لديها ؟
- الجهاز العصبي يتكون من شبكة من خلايا عصبية أولية توصل السيادة العصبية في كل الاتجاهات وتتوضع في قاعدة كل من الطبقتين الخارجية والداخلية على جانبي الهلماة المتوسطة لجدار جسم الهيدرية.
- حدد بدقة موقع شبكة الخلايا العصبية الأولية لدى هيدرية الماء العذب وما دورها ؟ تتوضع في قاعدة كل من الطبقتين الخارجية والداخلية على جانبي الهلماة المتوسطة لجدار جسم الهيدرية. توصل السيادة العصبية في كل الاتجاهات.
- فسر انجذاب دودة الأرض نحو الغذاء والرطوبة أو مم يتألف جهازها العصبي ؟
- يعود ذلك لتعقد نسبي في جهازها العصبي الذي يتكون من حبل عصبي بطني وعقد وأعصاب.
- فسر يعد الجهاز العصبي لدى دودة الأرض أكثر تطوراً من الجهاز العصبي لدى هيدرية الماء العذب ؟ لأن دودة الأرض تمتلك جهاز عصبي معقد نسبياً مكون من حبل عصبي بطني وعقد وأعصاب بينما نجد في الهيدرية شبكة من الخلايا العصبية الأولية على جانبي الهلماة المتوسطة .

- كيف أو فسر تمكنت الحشرات من التكيف مع البيئات المختلفة ؟ أو مم يتكون الجهاز العصبي عند الحشرات ؟
- تمتلك الحشرات جهاز عصبي مركزي معقداً نسبياً يتكون من حبل عصبي بطني وعقد عصبية وأعصاب وجهاز عصبي حشوي.
- متى يزداد الجهاز العصبي تعقيداً ؟ وأين يصل إلى أقصى درجات التعقيد ؟ يزداد الجهاز العصبي تعقيداً (كلما ارتقينا في سلم التطور ليصل إلى أقصى درجات التعقيد والكفاءة لدى الإنسان).

مم يتكون الجهاز العصبي لدى الإنسان تشریحياً ؟

الجهاز العصبي المركزي الذي يتكون من :


أ- الدماغ

ب- النخاع الشوكي

ج- الجهاز العصبي المحيطي (الطرفي) الذي يتكون من :

أ- أعصاب

ب- عقد عصبية



#### ثانياً ، الجهاز العصبي المركزي

- ما المقصود بالسكتة الدماغية ؟ حالة تحدث نتيجة عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ كحالة طبية طارئة تبدأ فيها خلايا الدماغ بالموت بعد بضع دقائق من عدم وصول الأكسجين.
- هناك نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية ما هما ؟
- السكتة الدماغية التي تحدث بسبب الجلطات الدموية وتشكل 87% من الحالات .
  - السكتة الدماغية التي تحدث بسبب النزيف في الدماغ أو حوله .
- ما أعراض السكتة الدماغية ؟ الخدر المفاجئ وعدم القدرة على تحريك الوجه أو الذراع أو الساق . الارتباك ومشاكل التحدث والرؤية والدوخة صعوبة في المشي وفقدان التوازن . الصداع المفاجئ والشديد ومشاكل في التنفس وفقدان الوعي .
- ما أسباب أو ما أهم العوامل المؤدية لحدوث السكتة الدماغية ؟
- السمنة .
  - ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم .
  - نقص في النشاط البدني والتغذية السيئة والتدخين

من أين تأتي أغلب إصابات الجهاز العصبي لدى الإنسان ؟

أغلب إصاباته تأتي من الأجهزة الأخرى وهذا يساعدنا على فهم العلاقات بين أجهزة الجسم المختلفة.

متى ينشأ الجهاز العصبي لدى الإنسان وعن ماذا ينشأ ؟

ينشأ خلال الأسبوع الثالث من الحياة الجنينية من الوريقة الجنينية الخارجية .

أسمي الوريقة التي يتطور منها النسيج العصبي ؟ الوريقة الجنينية الخارجية.

أصف كيفية تشكل أو ما المقصود باللوحة العصبية ؟


تزداد كثافة الوريقة الجنينية الخارجية على طول الوجه الظهري الأوسط للجنين لتشكل لوحة عصبية.



- أرتب مراحل تشكل كل من الأنبوب العصبي والعرف العصبي بدءاً من اللويحة العصبية؟
- تشكل في اللويحة العصبية طبتان جانبيتان مفصولتان بميزابية عصبية.
- تبرز الطبتان وتلتحمان مع بعضهما في الوسط وتتحول الميزابية العصبية إلى أنبوب عصبي.
- ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية. يتشكل العرف العصبي من انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقة الجنينية الخارجية وتوضعها فوق الأنبوب العصبي.
- ماذا ينتج من انفصال مجموعة من الخلايا العصبية عن الوريقة الجنينية الخارجية؟ يتشكل العرف العصبي.
- حدد بدقة موقع خلايا العرف العصبي؟ وما دورها؟ تتوضع فوق الأنبوب العصبي. دورها تشكل العقد العصبية.
- متى انفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية؟ وماذا يظهر به من الأمام؟ وكيف يتشكل النخاع الشوكي؟
- ينفصل في نهاية الأسبوع الرابع من الحمل. يظهر في الأنبوب العصبي من الأمام ثلاث حويصلات.
- يتشكل النخاع الشوكي من القسم المتبقي من الأنبوب العصبي.
- ماذا تشكل الحويصلات التي ظهرت في بداية الأنبوب العصبي؟ أو ما دورها؟ 1- دماغ أمامي 2- دماغ متوسط 3- دماغ خلفي.
- كيف تطورت بنية الدماغ في الفقاريات؟

بنية الدماغ تتعقد تدريجياً كلما ارتقينا في سلم تطور الفقاريات وعند الثدييات نما الدماغ وتخصصت أقسامه وتعددت مراكزه ووظائفه. كم تبلغ كتلة الدماغ عند الإنسان البالغ، وما كمية الأكسجين التي يستهلكها، وما هو الغذاء الرئيس لخلايا الدماغ؟

تبلغ نحو 1400 غرام ويستهلك نحو 20% تقريبا من الأكسجين الذي يصل للجسم ويعد الجلوكوز الغذاء الرئيس لخلايا الدماغ.



- مم يتكون الدماغ لدى الإنسان؟
- المخ: وهو القسم الأكبر حجماً. الدماغ البيني (المهادي) والذي يضم:
- أ- المهادان ب- الوطاء ج- جذع الدماغ والذي يضم: أ- الدماغ المتوسط ب- الحنك الحلقية (جسر فارول) ج- البصلة السيسائية.
- د- المخيخ: الذي يقع خلف البصلة السيسائية والحنك الحلقية.
- ما التراكيب التي تحمي الدماغ؟ 1- عظام القحف 2- السحايا 3- السائل الدماغي الشوكي 4- الحاجز الدماغي الدموي.
- ما أقسام السائل الدماغي الشوكي؟ وأين يوجد كل قسم؟ وما أهميته؟
- أقسامه الخارجي والداخلي.
- يوجد الخارجي منه في الحيز تحت العنكبوتي الذي يقع: (بين الغشاء العنكبوتي وغشاء الأم الخنون) الداخلي في قناة السيساء وبطينات الدماغ.

لما أهميته: يشكل وسادة مائية تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي وتحميها من الصدمات أو تحمي المراكز العصبية من الانضغاط.

ما المقصود بالحاجز الدماغي الدموي أو ما أهميته؟ يمنع وصول المواد الخطرة التي قد تأتي مع الدم إلى الدماغ وينظم البيئة الداخلية لخلايا الدماغ.



- رتب أقسام الوجه الظهري للدماغ من الأمام إلى الخلف
- 1- المخ 2- المخيخ 3- البصلة السيسائية.
- أولاً: المخ أكبر أقسام الدماغ

أفسر اتساع سطح القشرة الرمادية (السنجابية) للمخ؟ لوجود الكثير من التلافيف والشقوق فيها.

- ما دور الشق الأمامي الخلفي: يقسم المخ إلى نصفي كرة مخية.
- ما الشقوق الثلاثة والفصوص الأربعة في قشرة كل نصف كرة مخية؟
- الشقوق: رولاند و سيلفيوس (الوحشي) والقائم (الخلفي).
- الفصوص: الجبهي والجداري والصدغي والقفوي.

ثانياً: المخيخ - مم يتألف المخيخ؟

يتألف من نصفي كرة مخيخية وفص متوسط دودي الشكل (فسر تسميته بالدودي) لوجود أثلام عرضية عليه.

ثالثاً: البصلة السيسائية - شكلها مخروطي ولونها أبيض.

رتب أقسام الوجه البطني للدماغ من الخلف إلى الأمام؟

- 1- البصلة السيسائية: تقع بين الحنك الحلقية في الأعلى والنخاع الشوكي في الأسفل.
- 2- الحنك الحلقية (جسر فارول): تبارز مستعرض يقع أمام البصلة السيسائية لونه أبيض.
- 3- السويقتين المخيختين: امتدادان بشكل حرف (V) لونهما أبيض يقعان إلى الأمام من الحنك الحلقية (جسر فارول) وتسمى المنطقة الموجودة في مكان تباعدهما الوطاء.
- 4- الوطاء: ترتبط به الغدة النخامية (تقع الغدة النخامية على الوجه السفلي للدماغ وترتبط بالوطاء).

- العصيين المصريين : مكان نصالهما أمام الوطاء
- الفص الشهي : امتداد بشكل لسان يقع أمام وأسفل كل نصف كرة مخية.
- مم يتألف الدماغ المتوسط ؟ يتألف من السويقتين المخيتين والحدبات التوءمية الأربع.
- ما وظيفة الجسم الثفني ومثلث المخ ( القبو ) ؟ وأين يقع كل منهما ؟
- وظائفهما : يصلان بين نصفي الكرة المخية. الجسم الثفني : جسر من مادة بيضاء يقع في قاع الشق الأمامي الخلفي . مثلث المخ : جسر أبيض تحت الجسم الثفني.
- ماذا يضم الدماغ البيني ( المهادي ) ؟
- المهادان : كتلتين عصبيتين كبيرتين شكلهما بيضوي يتكونان من مادة رمادية يقع بينهما البطين الثالث.
- الوطاء : يشكل أرضية البطين الثالث.



حدد موقع كل من الغدة الصنوبرية والبطينين الجانبيين والجسم المخطط ؟

- الغدة الصنوبرية : أمام الحدبات التوءمية الأربع.
- البطينين الجانبيين : في كل نصف كرة مخية بطينا جاتبيا واحدا
- الجسم المخطط : كتلة رمادية توجد في قاعدة كل بطين جانبي.
- حدد بدقة موقع قناة سيلفيوس وما دورها ؟ تصل البطين الثالث مع البطين الرابع.
- ما القناة التي يتصل بها البطين الرابع من الأسفل ؟ قناة السيساء.
- ما وظيفة وموقع فرجتي مونرو ؟ تصلان البطين الثالث مع البطينين الجانبيين.
- ما دور ثقب ما جندي وثقبا لوشكا ؟

ينفتح البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتي عبر ثلاثة ثقوب (ثقب ما جندي، وثقبا لوشكا) يمر منها السائل الدماغي الشوكي.

- أين يقع ثقب ما جندي ، وثقبا لوشكا ؟ بين البطين الرابع والحيز تحت العنكبوتي.
- ماذا ينتج لو حدث انسداد في إحدى القنوات التي تصل بين بطينات الدماغ ؟ تراكم السائل الدماغي الشوكي في بطينات الدماغ فيزداد حجمها وتضغط على الدماغ
- ما المقصود بالاستسقاء الدماغي ؟ وما أسبابه ؟

الاستسقاء الدماغي: تراكم السائل الدماغي الشوكي في بطينات الدماغ فيزداد حجمها وتضغط على الدماغ وقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أنسجة الدماغ وزيادة سرعة في حجم الرأس يتبعه تخلف عقلي لدى الرضيع.

- الأسباب: 1- انسداد جزئي يمنع التدفق الطبيعي للسائل الدماغي الشوكي المتجدد بين بطينات الدماغ.
- 2- فرط إنتاج السائل الدماغي الشوكي بمعدل أسرع مما يمكن امتصاصه.

ما وظيفة وموقع الدماغ البيني ( المهادي ) ؟ يشكل الدماغ البيني صلة وصل بين نصفي الكرة المخية وجذع الدماغ. مم يتألف جذع الدماغ محددًا موقع كل قسم ؟



- 1- الدماغ المتوسط : يقع بين الدماغ البيني من الأعلى والحدبة الحلقية من الأسفل.
- 2- الحدبة الحلقية ( جسر فارول ) : تقع بين الدماغ المتوسط من الأعلى والبصلة السيسانية من الأسفل.
- 3- البصلة السيسانية : تقع بين الحدبة الحلقية من الأعلى والنخاع الشوكي من الأسفل.

أين تقع المادة الرمادية والمادة البيضاء في كل من المخ والمخيخ ؟ وكيف تتوزع المادة البيضاء في المخيخ ؟

المادة البيضاء مركزية والمادة الرمادية محيطية. تتوزع المادة البيضاء في المخيخ بشكل تفصينات شجرية.

أسمي بطينات الدماغ وأحدد موقع كل منها ، والسائل الدماغي الشوكي الذي يملؤها؟

- البطينين الجانبيين : في كل نصف كرة مخية بطين جانبي . البطين الثالث : بين المهادين.
- البطين الرابع : بين البصلة السيسانية والحدبة الحلقية والمخيخ.

جميعها تملأ بالسائل الدماغي الشوكي الداخلي.

أين يسكن النخاع الشوكي؟ يسكن داخل القناة الفقرية.

ما البنية العصبية التي تتصل بها نهاية العلوية؟ البصلة السيسانية.

ما المقصود بالنخاع الشوكي؟ حبل عصبي أبيض أسطواني الشكل عليه انتفاخان رقبتي وقطني يمتد حتى مستوى الفقرة القطنية الثانية.

ماذا ينتج عندما يستدق النخاع الشوكي في نهايته السفلية ؟ مشكلاً المخروط النخاعي .

ماذا تحتوي القناة الفقرية بعد الفقرة القطنية الثانية ؟

بعد الفقرة القطنية الثانية فإن القناة الفقرية لا تحوي بداخلها إلا على السحايا

والسائل الدماغي الشوكي ومجموعة أعصاب تشكل ذيل الفرس.

أسمي الرباط الضام الذي يثبت النهاية السفلية للنخاع الشوكي بنهاية القناة الفقرية؟ الخيط الانتهائي.





- حدد بدقة موقع الأزرار ، وما دورها؟ في التفرعات الانتهازية للمحاور، دورها: تُخزن فيها النواقل الكيميائية العصبية.
- ما المقصود بالأزرار الانتهازية : هي انتفاخات في نهاية تفرعات المحاور يخزن بداخلها النواقل الكيميائية العصبية.
- كيف تتواصل نهايات المحاور مع خلايا عصبية أخرى أو مع خلايا مستجيبة كإلخايا الغدية أو العضلية؟ عبر المشابك.

3- الاستطالات الهيولية


- فسر الاستطالات الهيولية كثيرة العدد ؟ لتحقق أكبر قدر من امكانية الالتقاء بالعصبونات الأخرى
- ما اتجاه نقل السايلا العصبية في كل من الاستطالات الهيولية والمحوار؟
- اتجاه نقل السايلا العصبية في الاستطالات الهيولية باتجاه جسم الخلية، وفي المحوار بعيداً عن جسم الخلية.
- فسر يعد النقل مستقطباً في الخلية العصبية؟
- لأنه يتم بجهة واحدة من الاستطالات الهيولية نحو جسم الخلية ثم إلى المحوار الذي ينقلها بعيداً عن جسم الخلية.
- قارن بين المحوار والاستطالات الهيولية من حيث العدد والقطر والوظيفة ووجود جسيمات نيسل ؟
- أ- القطر : المحوار ثابت على امتداده ، الاستطالات الهيولية تستدق بالابتعاد عن جسم الخلية.
- ب- الوظيفة : المحوار ينقل السايلا العصبية بعيداً عن جسم الخلية ، الاستطالات الهيولية استقبال المعلومات الواردة ونقلها نحو جسم الخلية.
- ج- العدد : المحوار مفرد دوماً وأحياناً معدوم ، الاستطالات الهيولية يختلف باختلاف العصبونات.
- د- وجود جسيمات نيسل : المحوار تنعدم ، الاستطالات الهيولية توجد.
- ما التراكيب الخاصة بالخلية العصبية موضحاً كل منها؟

التراكيب الخاصة هي:

- جسيمات نيسل : تجمعات من الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية الخشنة، والريبوزومات الحرة التي تحوي الـRNA، ولها دور في تركيب بروتينات الخلية، وتوجد في جسم الخلية والاستطالات الهيولية ، وتنعدم في المحوار. ( م م تتكون جسيمات نيسل ؟ وماذا تحوي ؟ وما دورها ؟ وأين توجد الليبفات العصبية: تشكيلات خيطية دقيقة توجد في جميع أقسام العصبون، تتوضع بشكل متوازٍ في المحوار، من نواقل العصبية وكيف تتوضع في المحوار
- كيف تصنف الخلايا العصبية ( العصبونات ) ؟ تصنف بطريقتين تبعاً لشكلها وتبعاً لوظيفتها.



- عدد أنواع الخلايا العصبية (العصبونات) من الناحية الشكلية وأين يوجد كل نوع؟
- أحادية القطب : توجد في العقد الشوكية. ثنائية القطب : توجد في شبكية العين والبطانة الشمية. متعددة القطبية :
- أ. تأخذ شكلاً هرمياً : في قشرة المخ وخلايا بوركنج في القشرة المخيخية.
- ب - تأخذ شكلاً نجمياً في القرون الأمامية للنخاع الشوكي.
- عديمة المحوار : توجد داخل الدماغ وفي بعض أعضاء الحواس.
- قارن بين العصبون أحادي القطب وثنائي القطب ومتعدد القطبية وعديم المحوار من حيث عدد الاستطالات الهيولية التي تخرج من جسم الخلية :
- أ- أحادي القطب : استطالة واحدة . ب- ثنائي القطب : استطالتين.
- ج- متعدد القطبية : استطالات عديدة . د- عديم المحوار : استطالات عديدة وجود المحوار :
- أ. أحادي القطب : محور مفرد . ب- ثنائي القطب : محور مفرد . ج- متعدد القطبية : محور مفرد . د- عديم المحوار : ليس له محوار.



- عدد أنواع الخلايا العصبية (العصبونات) من الناحية الوظيفية وأين يوجد كل منها؟
- أ. جابذة (حسية) : توجد في العقد الشوكية.
- ب. نابذة (محركة أو مفرزة) : توجد في القرون الأمامية للنخاع الشوكي وقشرة المخ.
- ج. موصلة (بينية) : توجد في المراكز العصبية.
- قارن بين عصبونات العقد الشوكية وعصبونات القرون الأمامية للنخاع الشوكي من الناحية عصبونات العقد الشوكية : - الشكل : أحادي القطب - الوظيفة : حسية (جابذة) عصبونات القرون الأمامية للنخاع الشوكي : - الشكل : متعددة القطبية نجمية - الوظيفة : نابذة (محركة أو مفرزة).
- قارن بين عصبونات القشرة المخية من الناحيتين الشكلية والوظيفية ؟
- من الناحية الشكلية : عصبونات متعددة القطبية هرمية
- من الناحية الوظيفية : عصبونات نابذة (محركة أو مفرزة).



- ما المقصود بالليف العصبي ؟ هو محور أو استطالة هيولية طويلة قد يحاط بأغمداد.
- عدد أو صنف الألياف العصبية تبعاً لنوع الغمد الخاص وأحدد مكان كل منها؟
- الألياف العصبية تصنف إلى : الألياف ذات النخاعين : تقسم إلى :
- أ - ألياف مغمدة بالنخاعين فقط : توجد في المادة البيضاء والعصب البصري.
- ب- ألياف مغمدة بالنخاعين وغمد شوان : توجد في معظم الأعصاب مثل العصب الوركي.

2 - الألياف عديمة النخاعين : تقسم إلى :

- ألياف عارية لاتحاط بأي غمد : توجد في المادة الرمادية للمراكز العصبية.
- ب- ألياف مجردة من النخاعين تحاط بغمد شوان فقط : توجد في العصب الشمي.
- ما المقصود بغمد النخاعين ؟ ومم يتركب ؟ بماذا يحيط ؟ كيف تكون لخائته ؟ وماذا تدعى الاختناقات الموجودة عليه ؟ وماذا يخرج منها ؟

غمد أبيض لامع يكسب المادة البيضاء لونها يتركب من مادة دهنية فوسفورية تسمى السفينغومييلين يحيط بالليف العصبي، لخائته منتظمة إذ يتقطع على مسافات متساوية باختناقات رانفبيه التي تحدد قطعاً بين حلقتية بطول (1) مم. وتخرج من اختناقات رانفبيه الفروع الجانبية للمحاور.  
 ما المقصود باختناقات رانفبيه: انقطاعات حلقتية يبديها غمد النخاعين على مسافات متساوية على طول الليف العصبي، تحدد عليه قطعاً بين حلقتية بطول (1) مم ، وقد تخرج منها الفروع الجانبية للمحاور...

ما وظيفة غمد النخاعين أو لفر أهمية غمد النخاعين بالنسبة للألياف العصبية المعتمدة به؟ يمزل الألياف العصبية كهربائياً ويزيد من سرعة السيالة العصبية.  
 أين يتشكل غمد النخاعين ويبدأ من أي خلايا ؟ في الجهاز العصبي المركزي يبدأ من خلايا الدبق قليلة الاستطالات . في الجهاز العصبي المحيطي من خلايا شوان.  
 فسر لا يحيط غمد النخاعين بكامل الليف العصبي ؟ لأنه يتقطع على أبعاد متساوية مشكلا اختناقات رانفبيه والتي تسمح بانتقال السيالة العصبية على طول الليف العصبي

ما المقصود بغمد شوان ؟ غمد هبولى وقيق شفاف يحوي نوى عديدة ، نواة في كل قطعة بين حلقتية، يبقى وحده في اختناقات رانفبيه وله دور في مساعدة الألياف العصبية المحيطية على التجدد بعد انقطاعها.

ما دور غمد شوان ، ولماذا يعد بمثابة خلايا ؟ دوره : مساعدة الألياف العصبية المحيطية على التجدد بعد انقطاعها.  
 يعد بمثابة خلايا : لأنه يحوي نوى عديدة، نواة واحدة في كل قطعة بين حلقتية.

ما المقصود بالأعصاب: حبال بيض لامعة اللون مختلفة الأطوال والأقطار ، تتألف من تجمع حزم من ألياف عصبية...  
 ثانياً : خلايا الدبق العصبي

توجد خلايا الدبق العصبي في كل من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي ما الخلايا التي يحتويها كل منهما وما دور كل منها؟  
 1- الجهاز العصبي المحيطي يحتوي :

أ- خلايا شوان : تشكل غمد النخاعين حول بعض الألياف العصبية وتساهم في تجدها بعد تعرضها للأذية.

ب- الخلايا التابعة ( الساتلة ) : تحيط بأجسام العصبونات في العقد العصبية الكبيرة تقوم بدعم العصبونات وتغذيتها.  
 2- الجهاز العصبي المركزي يحتوي :

أ- خلايا الدبق الصغيرة : خلايا مناعية تقوم بلعمة العصبونات التالفة والخلايا الغريبة.

ب- خلايا الدبق قليلة الاستطالات : تشكل غمد النخاعين حول محاور الخلايا العصبية في المادة البيضاء.

ج- الخلايا الدبقية النجمية : تسهم في تشكيل الحاجز الدمائي الدموي وتعمل على تنظيم التوازن الشاردي حول العصبونات وتقوم بتغذيتها وإعادة امتصاص النواقل العصبية.

د- خلايا البطانة العصبية : تبطن قناة السيساء ويطينات الدماغ وتغطي سطوح الضفائر المشيمية وتفرز السائل الدماغي الشوكي.

ما المقصود بالضفيرة المشيمية ؟ طبقات دقيقة من الأم الحنون تبرز في بطينات الدماغ الأربعة غنية بالأوعية الدموية تغطيها خلايا البطانة العصبية.


ما المقصود بالحاجز الدمائي الدموي؟ أو مم يتألف وما دوره؟

يتألف من النهايات المتوسعة لبعض استطالات الخلايا الدبقية النجمية (البوابق الوعائية) والأوعية الدموية المرتبطة بها.

ويحمي الدماغ من المواد الخطرة التي قد تأتي مع الدم.

ما المقصود بالبوابق الوعائية ؟ النهايات المتوسعة لبعض استطالات الخلايا الدبقية النجمية .

فسر عدم وصول المواد الخطرة ( البلسلين ) إلى الدماغ ؟ بسبب وجود الحاجز الدمائي الدموي .



## الدرس الثالث، الجهاز العصبي المحيطي 3

- تتعرض حياتنا لكثير من التغيرات ، ففترة نعيش حالة من الهدوء والراحة وتارة نتناوبنا حالة من التوتر والقلق ما الجهاز المسؤول عن تلك المتغيرات ؟ الجهاز العصبي المحيطي الذي يتألف من عقد عصبية وأعصاب.
- ما قسما الجهاز العصبي المحيطي من حيث الوظيفة ؟ يقسم وظيفياً إلى قسمين : جسمي إرادي وذاتي لإرادي .
- ما المقصود بالعقد العصبية وما أنواعها وما الخلايا الدبقية التي تدخل في بنيتها ؟
- العقد العصبية : بنى تحوي تجمعات أجسام عصبونات وخلايا دبقية تنشأ من العرف العصبي مدعومة بنسيج ضام تعمل كمحطة استقبال وإرسال للدفعات العصبية. ( ماذا تحوي العقد العصبية ، ومن أين تنشأ، وما وظيفتها ).
- أنواع العقد العصبية : عقد قحفية على الأعصاب القحفية ( الدماغية). عقد شوكية على الجذر الخلفي الحسي للعصب الشوكي. ( حدد موقع العقد الشوكية ). عقد ذاتية ( مستقلة لإرادية ) وهي نوعان : عقد ودية ونظيرة ودية.
- الخلايا الدبقية التي تدخل في بنيتها : الخلايا التابعة ( الساتلة ).
- تصنف الأعصاب بطريقتين حسب منشأها ووظيفتها ما أنواعها حسب منشأها وحسب وظيفتها ، وما عددها ؟
- أنواع الأعصاب بحسب المنشأ : أعصاب دماغية عددها ( 12 ) شفع. أعصاب شوكية عددها ( 31 ) شفع.
- أنواع الأعصاب بحسب وظيفتها : أعصاب حسية ، أعصاب حركية ، أعصاب مختلطة.
- يتألف العصب الشوكي من اتحاد جذرين ما هما ، وما وظيفة كل جذر ، وكيف نميز بينهما ؟
- ١- جذر خلفي حسي : ( وظيفته ) تمر فيه السوائل العصبية الحسية القادمة من المستقبلات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي.
- ٢- جذر أمامي محرك : ( وظيفته ) تمر فيه محاور الخلايا العصبية المحركة، التي تنقل السيالات المحركة من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات والغدد . كيف نميز بين جذري العصب الشوكي : الجذر الخلفي حسي يحمل عقد شوكية أما الجذر الأمامي محرك لا يحمل عقد شوكية.
- ما أقسام الجهاز العصبي الذاتي ؟
- القسم الودي . القسم نظير الودي.
- مم يتألف كل من القسم الودي ونظير الودي ؟ يتألف القسم الودي من : مراكز عصبية ودية وعقد ودية وأعصاب ودية.
- يتألف القسم نظير الودي من : مراكز عصبية نظيرة ودية وعقد نظيرة ودية وأعصاب نظيرة ودية.
- قارن بين تأثير كل من القسم الودي ونظير الودي على الحدقة والقصبات والمثانة والقلب والكبد واللعاب والبنكرياس والمعي الدقيق والغدة الدرقية والمعدة والجهاز الهضمي ؟

من حيث	الودي	نظير الودي
حدقة العين	تقلص العضلات الشعاعية للزحزية ( توسع الحدقة ) .	تقلص العضلات الدائرية للزحزية ( تضيق الحدقة )
القصبات	توسع القصبات	تضيق القصبات
المثانة	استرخاء المثانة	تقلص المثانة.
ضربات القلب	يسرع ضربات القلب	يبطئ ضربات القلب
الكبد	تحرر الغلوكوز	تخزين الغلوكوز
إفراز اللعاب	تثبيط إفراز اللعاب	زيادة إفرازه
البنكرياس	تثبيط	تنشيط إفراز
حركة الأمعاء	يبطئ حركة الأمعاء	يسرع حركتها
المعدة	يبطئ حركة المعدة	يزيد حركة المعدة
الجهاز الهضمي	نقص نشاطه وإفرازاته	زيادة نشاطه وإفرازاته
الغدة الدرقية	*****	زيادة إفرازها

يقسم الجهاز العصبي الذاتي وظيفياً إلى قسم ودي وقسم نظير الودي قارن بينهما من حيث موقع كل من المراكز العصبية والأعصاب والعقد العصبية والوظيفة ؟

من حيث	القسم الودي	القسم نظير الودي
المراكز العصبية	في القرون الجانبية للنخاع الشوكي في المنطقتين الظهرية والقطنية وفي الوطاء	في جذع الدماغ والمنطقة العجزية للنخاع الشوكي وفي الوطاء
العقد العصبية	سلسلتان على جانبي العمود الفقري و لب الكظر	قرب الأحشاء أو في جدارها
الأعصاب	تخرج من العقد الودية إلى مختلف الأعضاء الداخلية	تخرج من جذع الدماغ كالعصب ( المجهول ) ومن المنطقة العجزية للنخاع الشوكي كالأعصاب الحوضية
الوظيفة	يعد الجسم لمواجهة الخطر وتهيئته للأنشطة الفورية	يعمل على إعادة الجسم إلى حالة الراحة والهدوء



- مم يتكون المسلك العصبي الودي ؟ وكيف ترتبط فيه معظم العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور ؟
- يتكون المسلك العصبي الودي من وجود عصبون نابذ قبل العقدة ، يخرج ليفه من الجهاز العصبي المركزي ( من القرن الجانبي للنخاع الشوكي ) ويشكل مشبكا في العقدة الودية مع عصبون حركي يقع جسمه في العقدة الودية وينتهي ليفه العصبي إلى العضو المستجيب .
- ترتبط معظم العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور بفرعين : ( فرع واصل أبيض وفرع واصل رمادي ) .
- ( ما وظيفة الفرعين الواصلين الأبيض والرمادي ) ؟ ترتبط معظم العقد الودية مع العصب الشوكي المجاور بواسطة .
- قارن بين القسم الودي والقسم نظير الودي من حيث / طول الألياف قبل العقدة والألياف بعد العقدة / نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية في العقدة الذاتية وبين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة ؟
- 1- القسم الودي : - نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة : النور أدرينالين .
- نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية في العقدة الذاتية : الأستيل كولين .
- طول الألياف قبل العقدة : قصير . - طول الألياف بعد العقدة : طويل .
- 2- القسم نظير الودي : - نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية والخلايا المستجيبة : الأستيل كولين .
- نوع الناقل العصبي في المشابك بين الخلايا العصبية في العقدة الذاتية : الأستيل كولين .
- طول الألياف قبل العقدة : طويل . - طول الألياف بعد العقدة : قصير .
- قارن بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز العصبي الجسدي من حيث / عدد العصبونات الصادرة عن كل منهما إلى الخلايا المستجيبة / موقع جسم كل عصبون ؟

- 1- الجهاز العصبي الذاتي : - عدد العصبونات الصادرة عنه إلى الخلايا المستجيبة : عصبونان .
- موقع جسم العصبون : - الأول : يقع جسمه في المركز العصبي الذاتي - الثاني : يقع جسمه في العقدة الذاتية .
- 2- الجهاز العصبي الجسدي : - عدد العصبونات الصادرة عنه إلى الخلايا المستجيبة : عصبون واحد .
- موقع جسم العصبون : يقع جسمه في القرن الأمامي للنخاع الشوكي .
- فسّر الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي وطويلة في القسم نظير الودي ؟ الألياف قبل العقدة قصيرة في القسم الودي لأن العقد الودية سلسلتان تقعان على جانبي العمود الفقري (قريبة من المراكز العصبية) والألياف قبل العقدة طويلة في القسم نظير الودي لأن العقد نظيرة الودية تقع قرب الأحشاء في جذرائها (بعيدة عن المراكز العصبية) .
- فسّر يعطى المرضى في أثناء نوبة الربو النور أدرينالين ؟ من أجل توسيع الطرق الهوائية التنفسية .
- ما العضو الذي لا يزيد بعصبونات من القسمين الودي ونظير الودي معا ؟
- ( لب الكظر : يزود بعصبونات من القسم الودي) . بالإعتماد على الشكل صفحة 27 من الكتاب
- تتم السيطرة على استجابتي ظروف الضغط النفسي والغضب عن طريق ؟ ( القسم الودي ) .
- لا يمكن السيطرة عليه بالفكر الواعية ( الجهاز العصبي الذاتي ) .
- بينما تجلس بهدوء لتقرأ هذه الجملة يكون جزء الجهاز العصبي الأكثر نشاطا هو ( العصبي نظير الودي ) .
- الناقل الكيميائي بين العصبون قبل العقدة والعصبون بعد العقدة هو ؟ ( الأستيل كولين ) .
- تحرر جميع النهايات العصبية للقسم الودي الناقل العصبي ؟ ( النورأدرينالين ) .
- تحرر جميع النهايات العصبية للقسم نظير الودي الناقل العصبي ؟ ( الأستيل كولين ) .
- أصف ما يحدث لكل عضو من الأعضاء الأتية ، إذا طلب مني الوقوف لإلقاء محاضرة لم أعد لها :
- القلب : تسرع معدل ضرباته . - الأمعاء : تثبيط . - الغدد العابية : تثبيط إفراز . - خدقة العين : توسع .


### الدرس الرابع : اخصاوص الأعصاب

- ماذا ينتج من تلبيه العصب الوركي لضفدع شوكي ؟ تتقلص العضلة الساقية البطنية .
- ما خواص الأعصاب ؟ 1- قابلية التلبه . 2- نقل التلبه .
- إذا أترنا في العصب الوركي للضفدع بسلسلة من التنبهات الكهربائية المتساوية من حيث مدة تأثيرها ، والمتدرجة من حيث تزايد شدتها ، ماذا نلاحظ ؟ نلاحظ أن التنبهات الضعيفة لا تقوى على توليد دفعة عصبية ( سيالة ) ، بدليل عدم ظهور تقلص للعضلة الساقية البطنية . ( يسمى المنبه دون عتبوي ) .
- متى يسمى المنبه عتبوي ومتى يسمى دون عتبوي ؟
- يسمى المنبه عتبوي : عندما تكون الشدة تكفي لتوليد الدفعة العصبية والتقلص العضلي .
- يسمى المنبه دون عتبوي : عندما لا تقوى التنبهات الضعيف على توليد دفعة عصبية ( سيالة ) ، بدليل عدم ظهور تقلص للعضلة الساقية البطنية
- ما المقصود بالشدة الحدية : هي الشدة التي تكفي لتوليد الدفعة العصبية ، والتقلص العضلي ، خلال زمن تأثير معين .
- عند تثبيت الشدة وتغيير الزمن ، ماذا نلاحظ ؟ وعند زيادة الزمن تدريجيا إلى ماذا نتوصل ؟
- نلاحظ أن الأزمنة القصيرة لا تتشكل عندها الدفعة العصبية . - بزيادة الزمن تدريجيا نصل إلى زمن يكفي لتوليد الدفعة العصبية
- ما لمقصود بالزمن المعقد :
- هو الزمن اللازم لحدوث التلبه في نسيج ما إذا كانت شدة المنبه تساوي العتبة الدنيا أو تزيد ودونه تصبح تلك الشدة غير فعالة .

- ما المقصود بالمنبه ؟ وإلى ماذا تصنف المنبهات حسب طبيعتها ؟ وأيهما الأفضل ؟  
 المنبه : هو كل تبدل في الوسط الداخلي أو الخارجي ، يكون تأثيره كافياً لإزاحة المادة الحية من حالة استتبابها السابقة إلى حالة جديدة .  
 تصنف المنبهات حسب طبيعتها إلى : آلية - حرارية - إشعاعية - كيميائية - كهربائية .  
 تعد المنبهات الكهربائية أفضل المنبهات حسب طبيعتها وأكثرها استخداماً في التجارب المخبرية ؟  
 سهولة الحصول عليها واستخداماتها . إمكانية التحكم في شدتها وزمن تأثيرها أقلها ضرراً على الخلية  
 لاحظ الجدول الآتي الذي يوضح النتائج التجريبية التي تم الحصول عليها من دراسة العلاقة بين الشدة الحدية والزمن المفيد وأجيب عن الأسئلة الآتية :


رسم	0.09	0.10	0.10	0.1	0.2	0.4%	0.6%	1.0	1.5	2.1%	3	4	5
شدة (ms)	180	175	170	112	94	65.5	55	47	40	37	35	34	34
شدة (ms)	180	175	170	112	94	65.5	55	47	40	37	35	34	34
الدرجة	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

- ما قيمة الشدة التي لا يحدث من دونها التنبيه مهما طال الزمن ؟ 35 ميلي فولط .  
 ما قيمة الزمن الذي لا يحدث من دونه التنبيه مهما زادت الشدة ؟ 0.10ms  
 ما العلاقة بين الشدة والزمن ؟ علاقة عكسية بزيادة الشدة يتناقص الزمن  
 ما المقصود بكل من : العتبة الدنيا ( الربوباز ) و زمن الاستنفاد و العلاقة العكسية ؟  
 - العتبة الدنيا ( الربوباز ) : هي شدة محددة لا يحدث من دونها أي تنبيه مهما طال زمن التأثير  
 - زمن الاستنفاد : هو زمن محدد لا يحدث دونه أي تنبيه مهما ارتفعت شدة المنبه .  
 - العلاقة العكسية : عند زيادة شدة التنبيه يتناقص زمن التأثير .  
 لاحظ المنحنى البياني الآتي ، والذي يمثل العلاقة بين الشدة والزمن ، وأجيب عن الأسئلة ::  
 1- ما الزمن الأقصر الذي لا يزال الربوباز فعالاً عنده ؟ الزمن المفيد الأساسي .  
 2- ما الزمن اللازم لحدوث التنبيه في النسيج ، إذا بلغت شدة المنبه ضعف الربوباز ؟ الكروناكسي  
 3- استنتج العلاقة بين قيمتي الربوباز والكروناكسي في نسيج ما وقابلية هذا النسيج للتنبيه .  
 تزداد قابلية التنبيه بتناقص قيمتي الربوباز والكروناكسي .  
 4- في أي من النقاط ( أ - ب - ج ) يكون المنبه فعالاً عندها ؟ ولماذا ؟  
 ( أ - ب ) يكون المنبه فعالاً : المنبه في النقطة ( أ ) فعالاً لأن النقطة ( أ ) تقع في منطقة التنبيه الفعالة فوق المنحنى  
 والنقطة ( ب ) لأنها تقع على منحنى العتبات .  
 في النقطة ( ج ) يكون المنبه غير فعال : لأنها تقع في منطقة التنبيه غير الفعالة تحت المنحنى والمنبه دون عتبي



- لماذا اقترح العالم لابيك معيار الكروناكسي ؟ وبماذا تسمح قيمته ؟ وعلى ماذا تدل عندما تكون مرتفعة في نسيج ما ؟  
 اقترح العالم لابيك معيار الكروناكسي لإبراز دور الزمن في مفهوم قابلية التنبيه . تسمح قيمته بمقارنة سرعة قابلية التنبيه في الأنسجة المختلفة . تدل قيمته المرتفعة في نسيج ما على بطء في قابلية تنبه هذا النسيج . ( وبعكس )  
 فسر لعناصر القوس الانعكاسية النخاعية الكروناكسي نفسه ؟ لأن لها وظيفة واحدة متكاملة .  
 ما المقصود بكل من : منحنى العتبات و الزمن المفيد الأساسي و الكروناكسي ؟  
 - منحنى العتبات : فرع من قطع زائد ، يفصل بين منطقة التنبيهات الفعالة فوقه ومنطقة التنبيهات غير الفعالة تحته .  
 - الزمن المفيد الأساسي : هو الزمن الأقصر الذي لا يزال عنده الربوباز فعالاً .  
 - الكروناكسي : الزمن المفيد اللازم لحدوث التنبيه في نسيج ما عندما نستخدم تياراً شدته ضعفاً للربوباز .  
 فسر ملامسة جسم ساخن بسرعة لا تجعلنا نشعر بسخونته ؟  
 لأن زمن التنبيه أقل من زمن الاستنفاد .

20°C	شدة التنبيه (ms)	2	2	3	4	5	10
رسم شدة - الزمن (ms)	6	5	4	3	2	1.5	1.2
10°C	شدة التنبيه (ms)	3	3	3	3	3	3
رسم شدة - الزمن (ms)	50	9	4	2.5	2.1	2	2



- عند دراسة تنبيه عصبين وركبين لضفدع : الأول في درجة الحرارة ( 20 ) درجة مئوية ، والثاني في الدرجة ( 10 ) درجة مئوية . حصلنا على النتائج الآتية : والمطلوب :  
 1- مثل هذه النتائج في رسم بياني واحد مستخدماً ورقاً ميليمترياً .  
 2- حدد قيم الربوباز والكروناكسي في التجريبتين على الرسم .  
 - في التجربة الأولى عند درجة الحرارة ( 20 c ) : الربوباز ( 2 ) والكروناكسي ( 1.5 ) .  
 - في التجربة الثانية عند درجة الحرارة ( 10 c ) : الربوباز ( 3 ) والكروناكسي ( 2.3 ) .  
 3- ما العصب الأكثر قابلية للتنبيه ؟ ولماذا ؟ ماذا تستنتج ؟  
 - العصب الأول هو الأكثر قابلية للتنبيه لأن قيم الكروناكسي والربوباز أخفض .  
 - نستنتج أن : قابلية التنبيه تزداد بارتفاع درجة الحرارة



## الدرس الخامس : الظواهر الكهربائية في الخلايا الحية

- ما المقصود بكمون الغشاء ؟ تبدي جميع الخلايا الحية عبر أغشيتها فرقا في الكمون ، يعرف باسم كمون الغشاء .
- في أي الخلايا يكون كمون الغشاء ثابتا ، مع ذكر مثال ؟ في الخلايا غير القابلة للتنبه ( خلايا الدبق العصبي ) .
- في أي الخلايا يكون كمون الغشاء متغيرا ، مع ذكر مثال ؟
- في الخلايا القابلة للتنبه ( الخلايا العصبية والحسية والعظلية والغدية والخلية البيضية الثانوية ) .
- ما المقصود بقنوات التسرب البروتينية ؟
- قنوات بروتينية توجد ( في غشاء الليف ) ، تكون مفتوحة باستمرار ، وتحدد حركة الشوارد عبرها حسب ( ممال ( تدرج ) التراكيز ) .
- أولا : كمون الراحة :
- ما المقصود بكمون الراحة ؟ هو الفرق في الكمون في أثناء الراحة بين السطح الخارجي لغشاء الليف الذي يحمل شحنات موجبة والسطح الداخلي له الذي يحمل شحنة سالبة ويقدر بنحو ( -70 mv ) .
- علام تشير الإشارة السالبة لكمون الراحة ؟ هي اصطلاح إلى نوع الشحنة داخل الليف .
- ما نوع الشحنة داخل العصبون وخارجه في أثناء كمون الراحة ؟ وما مقدار فرق الكمون بين داخل العصبون وخارجه ؟
- داخل العصبون سالبة وخارجه موجبة . ( - 70 ميلي فولط ) .
- أحدد جهة انتقال شوارد الصوديوم وشوارد البوتاسيوم عبر قنوات التسرب البروتينية في الغشاء في أثناء الراحة ؟ وأفسر السبب ؟
- الصوديوم نحو داخل الليف : لأن تركيزها في الخارج أعلى من الداخل .. البوتاسيوم نحو خارج الليف : لأن تركيزها في الداخل أعلى من الخارج .
- ما تركيز الشوارد على السطح الداخلي والسطح الخارجي للعصبون ؟
- تركيز الشرسبات العضوية ( A<sup>-</sup> ) وشوارد البوتاسيوم : في الداخل أعلى من الخارج .
- تركيز شوارد الصوديوم وشوارد الكور : في الخارج أعلى من الداخل .
- كيف تقوم مضخة الصوديوم والبوتاسيوم بعملها عبر الغشاء ؟ تنقل كل مضخة ثلاث شوارد صوديوم نحو الخارج مقابل استعادة شاردتي بوتاسيوم نحو الداخل ويتم ذلك بصرف طاقة ATP بعملية النقل النشط .
- ما العوامل التي تسهم في جعل غشاء الليف مستقطبا في حالة الراحة ؟
- أ- النفاذية الاصطفائية العالية لغشاء الليف لشوارد البوتاسيوم ، وقلة نفاذيته لشوارد الصوديوم .
- ب- وجود مواد عضوية كبيرة الحجم مشحونة بشحنة سالبة ( A<sup>-</sup> ) داخل الليف لا تستطيع النفاذ عبر الغشاء .
- ج- مضخات الصوديوم والبوتاسيوم الموجودة في الغشاء .
- فسر النفاذية الاصطفائية العالية لغشاء الليف لشوارد البوتاسيوم وقلة نفاذيته لشوارد الصوديوم في أثناء الراحة أو تسمح النفاذية الاصطفائية لغشاء الليف بخروج شوارد البوتاسيوم بنسبة أكبر من دخول شوارد الصوديوم ؟
- لأن عدد قنوات التسرب البروتينية الخاصة بشوارد البوتاسيوم في الغشاء يزيد على عدد القنوات الخاصة بشوارد الصوديوم .
- فسر لا تستطيع الشرسبات العضوية النفاذ عبر غشاء الليف ؟ لأنها كبيرة الحجم .
- فسر يعد غشاء الليف مستقطبا كهربائيا في أثناء الراحة ؟ لأنه يفصل بين نوعين من الشحنات موجبة في الخارج وسالبة في الداخل .
- ما سبب أو فسر ظاهرة كمون الراحة ؟ يعود إلى فروق في التراكيز الشاردية على جانبي غشاء الليف ، لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم والكور والشرسبات ( مواد عضوية كبيرة الحجم مشحونة بشحنة سالبة ) وشوارد أخرى .
- ما الشاردة الأكثر تأثيراً في نشوء كمون الراحة ؟ شاردة البوتاسيوم .

ثانيا : كمون العمل

- هل تكمن قدرة الخلايا العصبية على تشكيل كمون الراحة والحفاظ عليه فقط ؟ وضح ذلك... لا تكمن قدرة الخلايا العصبية على تشكيل كمون الراحة والحفاظ عليه فقط ، وإنما في إحداث الاضطراب المفاجئ والمؤقت لكمون الراحة استجابة للمنبهات .
- نلاحظ نوعين من التغيرات عند تنبيه غشاء الليف ما هما ؟ 1- حد عتبة التنبيه 2- كمونات العمل .

أحد العتبة ، ألاحظ الشكل ، وأجيب عن الأسئلة الآتية .

1- أحدد المنبهات العتبية ودون العتبية...

المنبهات العتبية : ( ٤ - ٥ - ٦ ) - المنبهات دون العتبية ( ١ - ٢ - ٣ ) .


٢- لماذا لا يستطيع المنبه ( ٢ ) توليد كمون عمل ؟ لأن كمون الغشاء لا يصل لحد العتبة .

٣- ماذا أسمي الكمونات التي تثيرها المنبهات ( ١ - ٢ - ٣ ) ؟ كمونات تحت عتبية

٤- ماهي قيمة التغير في الكمون اللازمة للوصول إلى حد العتبة ؟ نحو ( ١٥ ) ميلي فولط .


إلى ماذا يؤدي تنبيه الليف العصبي بشدة كافية ؟ ولماذا ؟ - زوال جزئي للاستقطاب .

- نتيجة دخول شوارد الصوديوم إلى داخل الليف بكميات قليلة جداً في البدء .



- متى يكون المنبه قادرا على إطلاق كمون العمل ، ومتى لا يستطيع إطلاقه ؟ يؤدي تنبيه الليف العصبي بشدة كافية إلى زوال جزئي للاستقطاب ، نتيجة دخول شوارد الصوديوم إلى داخل الليف بكميات قليلة جداً في البدء ، وهكذا يزول الاستقطاب تدريجيا للوصول إلى حد العتبة اللازمة لإطلاق كمون عمل.. إذا كانت شدة المنبه لا تكفي للوصول إلى حد العتبة ، فلا ينشأ كمون العمل .

فسر ببقى العصبون في حالة راحة رغم وصول منبهات عدة إليه ؟ لأنها تكون غير قادرة على إيصال كمون الغشاء إلى حد العتبة.  
فسر تكون قابلية التنبه في الألياف الشخينة أكبر منها في الألياف صغيرة القطر ؟ لأنه تبلغ قيمة التنفير في الكمون للوصول إلى حد العتبة في الألياف العصبية الشخينة بحدود ( 65 - ) ميلي فولت وفي الألياف صغيرة القطر تبلغ ( 55 - ) ميلي فولت تقريباً.



- ألاحظ الشكل الآتي الذي يوضح تسجيل كمون العمل أحادي الطور ، وأجيب عن الأسئلة :
- 1- أين أضع كلا من مسري راسم الاهتزاز المهبطي ؟ مسرى داخل الليف ومسرى خارج الليف.
  - 2- ماذا أ شاهد على شاشة راسم الاهتزاز ؟ موجة مؤنفة وحيدة الطور تسمى : ( الشوكة الكمونية ).
- ما المقصود بالشوكة الكمونية أو كيف يقاس كمون العمل وكيف يظهر على شاشة الراسم ؟  
عند وضع أحد مسري راسم الاهتزاز المهبطي على السطح الخارجي للليف والأخر على السطح الداخلي ، وباستخدام منه عتوي ، يظهر على الشاشة مجموعة من التبدلات في الكمون بشكل موجة مؤنفة وحيدة الطور تسمى : الشوكة الكمونية .

ثالثاً : الشوكة الكمونية ( كمون العمل أحادي الطور )

ألاحظ الشكل الآتي الذي يوضح الشوكة الكمونية ، وأجيب عن الأسئلة :

ما التبدلات في استقطاب الغشاء بدءاً من لحظة الوصول إلى حد العتبة ؟  
التبدلات في استقطاب الغشاء :

- حد العتبة - إزالة الاستقطاب - عودة الاستقطاب - فرط الاستقطاب-الراحة
- ما قنوات التيوب الفولطية التي تفتح في كل من مرحلتي إزالة وعودة الاستقطاب وفي أي مرحلة تنشط مضخة الصوديوم والبوتاسيوم ؟
- في إزالة الاستقطاب تفتح قنوات شوارد الصوديوم.
- في مرحلة عودة الاستقطاب تفتح قنوات شوارد البوتاسيوم.
- تنشط مضخة الصوديوم والبوتاسيوم في مرحلة فرط الاستقطاب.
- فسر لا نستجيب الخلية العصبية للمنبهات في زمن الاستعصاء المطلق ؟ بسبب عدم فتح قنوات الصوديوم من جديد إلا بعد العودة إلى كمون الراحة.
- فسر نستجيب الخلية العصبية للمنبهات القوية في زمن الاستعصاء النسبي ؟ يسبب : أ. بقاء قنوات الصوديوم مغلقة .

ب- وفرط الاستقطاب الناتج عن تدفق شوارد البوتاسيوم إلى خارج الخلية بكميات كبيرة مما يجعل تنبيه الليف العصبي يحتاج لمنبه قوي.  
فسر إزالة استقطاب الغشاء بعد وصوله لحد العتبة ؟

- يسبب فتح قنوات التيوب الفولطية للصوديوم وتدفق شوارد الصوديوم نحو الداخل ليصل كمون الغشاء إلى (30+) .  
فسر عودة استقطاب الغشاء بعد إزالته ؟ لأن أقتية الصوديوم تغلق وتفتح قنوات التيوب الفولطية الخاصة بالبوتاسيوم وتتدفق شوارد البوتاسيوم خارج الخلية وتبدأ عودة الاستقطاب.  
فسر عودة استقطاب الغشاء لوضع الراحة ؟ لأن أقتية الصوديوم والبوتاسيوم تغلق وتنشط مضخة الصوديوم والبوتاسيوم.  
ما دور مضخات الصوديوم والبوتاسيوم في أثناء كمون العمل ؟  
ليس لها دور في تغيير كمون العمل بل الحفاظ على تركيز الشوارد على جانبي الغشاء.  
ما الشاردة الأكثر تأثيراً في حدوث كمون العمل ؟ الصوديوم.  
يؤدي تدفق شوارد البوتاسيوم نحو خارج العصبون في نهاية كمون العمل إلى ؟ ( فرط استقطاب )  
ما المقصود بقنوات التيوب الكمونية ( الفولطية ) ؟

قنوات بروتينية توجد ( في غشاء الليف ) تفتح وتغلق حسب فرق الكمون على جانبي الغشاء.

حساسية لتبدلات الاستقطاب في غشاء الخلية وتؤدي لإزالة وإعادة الاستقطاب ؟ ( قنوات التيوب الفولطية )

- ما المقصود بمبدأ الكل أو اللاشيء ؟ إن منبهاً في عتبه الدنيا يسبب أقصى استجابة يستطيعها الليف الواحد ولا تزداد شدة الاستجابة بزيادة شدة المنبه فوق تلك العتبة ويفسر ذلك كون الاستجابة تعتمد على الطاقة المخزنة في الليف لا على طاقة المنبه.
- فسر ينطبق مبدأ الكل أو اللاشيء على الليف العصبي ولا ينطبق على العصب ؟ لأن الاستجابة تعتمد على الطاقة المخزنة في الليف لا على طاقة المنبه وفي العصب تزداد الاستجابة بزيادة عدد الألياف العصبية المنبهة

رابعاً : كمون العمل ثنائي الطور

ألاحظ الشكل المجاور الذي يوضح طريقة تسجيل كمون العمل لثنائي الطور ، وأجيب عن الأسئلة :

1- أين يتم وضع مسري التسجيل لرسم الاهتزاز المهبطي ( الأوسيلوسكوب ) ؟

في نقطتين متباعنتين من السطح الخارجي للليف العصبي المنبه

2- كيف نقرأ انحراف إبرة المقياس في ( A ) ؟ لاختلاف الشحنة بين ( أ ) و ( ب ) .

3- ما هي حالة استقطاب الغشاء في ( B ) ؟ زوال الاستقطاب.


4- كيف نقرأ شكل الموجة بالاتجاه لعماكس في ( C ) ؟ بسبب انعكاس الشحنة بين النقطتين ( أ ) و ( ب ) .



- 5- ماهي حالة استقطاب الغشاء في ( D ) ؟ استقطاب الراحة.
- 6- كيف يقاس كمون العمل ثنائي الطور ؟ يتم وضع مسربي التسجيل لرأس الاهتزاز المهبطي ( الأوسيلوسكوب ) في نقطتين متباعدتين من السطح الخارجي للليف العصبي المنبه
- 7- ماذا تمثل الموجة الأولى والموجة الثانية في كمون العمل ثنائي الطور ؟
- الموجة الأولى : حالة إزالة الاستقطاب لغشاء الليف . - الموجة الثانية : حالة إعادة الاستقطاب.
- 8- ما أهمية كمون العمل ثنائي الطور ؟ له استخدامات طبية مهمة ، كالتخطيط الكهربائي للقلب والعضلات والدماغ.

## مقارنات

- القيمة النهائية لكمون الراحة والعمل ؟ - كمون الراحة :  $-70\text{ mv}$  . - كمون العمل :  $+30\text{ mv}$  .
- قيمة حد العتبة في الألياف الشوكية وصغيرة القطر ؟ - النخينة بحدود :  $-65$  . - صغيرة القطر : تبلغ  $-55$  .
- الشاردة الأكثر تأثيراً في حدوث كمون الراحة والعمل ؟ - كمون الراحة : البوتاسيوم . - كمون العمل : الصوديوم .
- النفاذية الاصطفالية لغشاء الليف في كمون الراحة لشوارد البوتاسيوم والصوديوم ؟ - البوتاسيوم : عالية . - الصوديوم : قليلة .
- كمون الراحة من حيث جهة انتقال شوارد الصوديوم والبوتاسيوم عبر قنوات التسرب البروتينية في الغشاء ؟
- الصوديوم : نحو داخل الليف . - البوتاسيوم : نحو خارج الليف .
- كمون الغشاء في كل من الخلايا (الغير القابلة للتنبه) مثل الدبقية، والخلايا (القابلة للتنبه) مثل العصبية ؟
- في الخلايا الدبقية : كمون الغشاء ثابتاً . - في الخلايا العصبية : كمون الغشاء متغيراً .



- الشكل الآتي يمثل الشوكة الكيونية ( كمون العمل ) والمطلوب :
- أحدد التبدلات في استقطاب الغشاء المقابلة للأرقام في كل مرحلة.
  - 1- كمون الراحة 2- إزالة استقطاب 3- عودة استقطاب 4- فرط استقطاب.
  - 2- ما التبدلات التي تحدث في استقطاب الغشاء في ( س ) ؟
  - انخفاض في الاستقطاب تدريجياً للوصول لحد العتبة اللازمة لإطلاق كمون العمل.
  - 3- ما القنوات الشاردية التي تفتح وتغلق في ( ص ) ؟ تغلق قنوات التبوب الفولطية للصوديوم وتفتح قنوات التبوب الفولطية للبوتاسيوم.

## الدرس السادس: النقل في الاعصاب

- يشبه انتقال كمون العمل حركة الجمهور في مدرج كبير ، وهم يصنعون موجة ، وضح وجه الشبه ؟
- الأشخاص عندما يقفون ( إزالة استقطاب ) ، ويرفون أيديهم ( ذروة كمون العمل ) ، ثم يجلسون ثانية ( إعادة استقطاب ) ، ثم تنتقل الموجة مع محيط المدرج لكن الأشخاص يبقون في أماكنهم .
- أولاً : انتقال كمون العمل في الألياف العصبية المجردة من غمد النخاعين...
- ما آلية أو ما مراحل انتقال السيالة العصبية أو كمون العمل في الألياف العصبية المجردة من غمد النخاعين :
- 1- يتم إزالة الاستقطاب في القطعة الأولية ( 1 ) فسر : نتيجة تدفق شوارد الصوديوم نحو الداخل ( ماذا ينتج ) تجعل شحنة السطح الداخلي موجبة مقارنة مع الشحنة السالبة للسطح الخارجي ويتشكل كمون عمل ..
  - 2- فتتشكل تيارات موضعية (محلية) قادمة من المناطق المجاورة نحو المنطقة المنبهة خارج الليف وبالعكس داخله ( ماذا ينتج ) مما يؤدي لإزالة تدريجية للاستقطاب في المنطقة المجاورة .
  - 3- فينتقل كمون العمل نحو المنطقة المجاورة بينما تبدأ القطعة الأولية بإعادة الاستقطاب ثم تعود إلى مرحلة كمون الراحة بعد أن تمر بزمन الاستعصاء . 4- وهكذا تكرر العملية بالآلية نفسها ليصل كمون العمل إلى نهاية المحوار (الأزرار) في النقل الوظيفي .
- ما المقصود بالقطعة الأولية من المحوار ؟
- هي منطقة غشائية متخصصة من المحوار يتم فيها إطلاق كمونات العمل، ويعود ذلك لإحتوائها على كثافة عالية من قنوات التبوب الفولطية ، بينما يكون عدد هذه القنوات قليل في جسم الخلية والإستطالات الهيولية القصيرة ، مما يمنع تشكل كمونات العمل فيها غالباً.
- ما وظيفة القطعة الأولية من المحوار ؟ هي منطقة غشائية متخصصة من المحوار يتم فيها إطلاق كمونات العمل.
- فسر تعد القطعة الأولية من المحوار مكاناً لانطلاق كمونات العمل ؟ يعود ذلك لإحتوائها على كثافة عالية من قنوات التبوب الفولطية.
- فسر لا يتشكل كمونات العمل غالباً في جسم الخلية والإستطالات الهيولية ؟ لأن عدد قنوات التبوب الفولطية فيها يكون قليل .
- قارن بين كثافة قنوات التبوب الفولطية في القطعة الأولية من المحوار وجسم الخلية ( أو الإستطالات الهيولية ) ؟
- في القطعة الأولية من المحوار : عالية . - في جسم الخلية ( أو الإستطالات الهيولية ) : قليلة .
- ثانياً : انتقال كمونات العمل في الألياف المغمدة بالنخاعين

- لاحظ الشكل الآتي الذي يوضح انتقال التنبيه في الألياف المغمدة بالنخاعين ، وأجيب عن الأسئلة :
- ✓ أين توجد قنوات التيوب الفولطية للصدويوم ؟ ما أهمية ذلك ؟
- توجد في اختناقات رانفقيه . أهمية ذلك : لتسمح بانتقال كمونات العمل .
- ✓ ماذا أسمي عملية انتقال كمونات العمل من اختناق رانفقيه إلى آخر ؟
- النقل القفزي أو الولااب .



- ✓ أيهما أسرع النقل في الألياف المجردة من النخاعين أو الألياف المغمدة ؟ ولماذا ؟
- النقل أسرع في الألياف العصبية المغمدة بالنخاعين ، بسبب النقل القفزي
- ✓ يفسر النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين بالآلية ذاتها لدى الألياف المجردة ، مع اختلاف ما هو ؟
- الاختلاف يتعلق بمكان نشوء كمونات العمل ، الذي يقتصر على اختناقات رانفقيه في الألياف المغمدة بالنخاعين .
- ✓ حدد بدقة موقع نشوء كمونات العمل في الألياف المغمدة بالنخاعين ؟ يقتصر على اختناقات رانفقيه .
- ✓ فسر يقتصر نشوء كمونات العمل أو التيارات المحلية في الألياف المغمدة بالنخاعين على اختناقات رانفقيه ؟
- لأن قنوات التيوب الفولطية للصدويوم يقتصر وجودها على اختناقات رانفقيه

- ✓ قارن بين انتقال كمونات العمل في الألياف المغمدة بالنخاعين والألياف المجردة من النخاعين ؟
- في الألياف المغمدة بالنخاعين : ينتقل كمونات العمل من اختناق رانفقيه إلى آخر قافرا فوق قطع غمد النخاعين ، وهذا ما يسمى : النقل القفزي .
- في الألياف المجردة من النخاعين : يتم النقل من المنطقة المنبهة إلى المنطقة المجاورة مباشرة .

- ✓ فسر النقل في الألياف المغمدة بالنخاعين يوفر ويقلل كميات كبيرة من الطاقة التي تلزم لعمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم ؟
- كون الضخ يحدث في اختناقات رانفقيه فقط .

- ✓ متى تزداد سرعة السبالة العصبية في الألياف العصبية ؟ بوجود غمد النخاعين و بزيادة قطر الليف العصبي .
- ثالثاً : انتقال السيالة العصبية من عصبون لآخر
- كيف تتشكل المشابك العصبية ؟

ينتقل كمونات العمل على طول المحوار ليصل إلى نهاية تفرعاته ، هذه الفروع قد تشكل نقاط تواصل مع خلية عصبية أو عضلية أو غدية تسمى هذه النقاط بالمشابك العصبية .

• ما أنواع المشابك العصبية ؟ كيميائية وكهربائية .

• هم يتألف المشبك الكيميائي ، وأين يقع ؟ يتألف من الغشاء قبل المشبكي والفاق المشبكي والغشاء بعد المشبكي .

توجد المشابك الكيميائية بين نهاية محوار (الزر النهائي) لعصبون أول واستطالة هيولية أو جسم خلية أو محوار لعصبون ثانٍ .

• أين توجد الحويصلات المشبكية ، وما دورها ؟ تحتوي نهاية المحوار على تفرعات انتهائية تنتهي بأزرار تحتوي حويصلات مشبكية ، التي تخزن فيها النواقل الكيميائية العصبية .

• بماذا يتميز الغشاء قبل المشبكي والغشاء بعد المشبكي ؟

• يتميز الغشاء قبل المشبكي : ببنية مناسبة لتعاس الحويصلات المشبكية وتحرير الناقل الكيميائي العصبي في الفالق المشبكي .

• يتميز الغشاء بعد المشبكي : بوجود مستقبلات نوعية للنواقل الكيميائية العصبية التي ترتبط معها قنوات تيوب كيميائية للشوارد المختلفة .

• ما المقصود بقنوات التيوب الكيميائية ؟ هي قنوات بروتينية توجد ( في الغشاء بعد المشبكي ) ، ترتبط معها مستقبلات نوعية

للنواقل الكيميائية العصبية التي تتحكم بمرور الشوارد المختلفة عبرها .

• حدد بدقة موقع المستقبلات النوعية للنواقل الكيميائية العصبية ؟ ترتبط مع قنوات التيوب الكيميائية في الغشاء بعد المشبكي .

• رابعاً : آلية النقل في المشبك الكيميائي

• ما مراحل أو ما آلية النقل في المشبك الكيميائي بالترتيب ؟

• تحرير النواقل الكيميائية العصبية في الفالق المشبكي وارتباطها بالمستقبلات .

• توليد الكمونات بعد المشبكية • تجمع (تراكم) الكمونات بعد مشبكية .

• لاحظ الشكل الآتي وأنتبع مراحل النقل في المشبك الكيميائي ، ثم أجيب عن الأسئلة التالية :

• لماذا ينتج من وصول كمونات العمل للغشاء قبل المشبكي إزالة استقطاب في الغشاء .

• أين توجد قنوات التيوب الفولطية لشوارد الكالسيوم ؟ في الغشاء قبل المشبكي .

✓ ما دور شوارد الكالسيوم في النقل المشبكي ؟

تسبب اندماج الحويصلات المشبكية مع الغشاء قبل المشبكي محررة الناقل الكيميائي في الفالق المشبكي .

✓ كيف يتم تحرير النواقل الكيميائية العصبية في الفالق المشبكي وارتباطها بالمستقبلات ؟

• يؤدي وصول كمونات العمل إلى الزر إلى ( ماذا ينتج ) إزالة الاستقطاب في الغشاء قبل المشبكي .

• تسبب إزالة الاستقطاب إلى ( ماذا ينتج ) فتح قنوات التيوب الفولطية لشوارد الكالسيوم فتتدفق هذه الشوارد نحو الداخل .

• يؤدي ارتفاع تركيز الكالسيوم ( ماذا ينتج ) إلى اندماج الحويصلات المشبكية مع الغشاء قبل المشبكي وتحرير الناقل الكيميائي في الفالق المشبكي .

• ينتشر الناقل الكيميائي في منطقة الفالق المشبكي ليرتبط بمستقبل نوعي على قنوات

التيوب الكيميائية الموجودة في الغشاء بعد المشبكي ( ماذا ينتج ) مما يؤدي لفتحها ومرور الشوارد النوعية عبرها .



- قارن بين سبب فتح قنوات التيوب الفولطية لشوارد الكالسيوم وقنوات التيوب الكيميائية أثناء النقل المشبكي ؟
- قنوات التيوب الفولطية لشوارد الكالسيوم : بسبب إزالة استقطاب في الغشاء قبل المشبكي.
  - قنوات التيوب الكيميائية : ينتشر الناقل الكيميائي في منطقة الفالق المشبكي ليرتبط بمستقبل نوعي على قنوات التيوب الكيميائية الموجودة في الغشاء بعد المشبكي مما يؤدي لفتحها.
  - كيف يتم توليد الكمونات بعد مشبكية ، وما أنواعها ، وكيف يتحدد هذا النوع ؟ - يؤدي ارتباط الناقل الكيميائي بمستقبلات نوعية موجودة على أقبية التيوب الكيميائية في الغشاء بعد المشبكي ( ماذا ينتج ) إلى توليد كمونات بعد مشبكية .
  - بعضها تنبهي وبعضها تثبيطي .
  - ويتحدد نوع الكمون بعد المشبكي المتشكل بنوع الناقل الكيميائي وطبيعة المستقبلات النوعية ، لذلك يمكن أن يكون الناقل منبهاً أو مثبطاً .
  - فسر يمكن أن يكون الناقل منبهاً في بعض المشابك ، ومثبطاً في مشابك أخرى ؟ لأنه يتحدد نوع الكمون بعد المشبكي المتشكل بنوع الناقل الكيميائي وطبيعة المستقبلات النوعية .

وجه المقارنة	مشابك التنبه	مشابك التثبيط
النواقل الكيميائية العصبية	الغلوتامات والأستيل كولين في معظم حالاتهما.	حمض غاما أمينو بوتيريك ، والغلوسين .
أقبية التيوب الكيميائية التي يرتبط بها الناقل.	لشوارد السوديوم أو لشوارد الكالسيوم اللذان تنتشران إلى الداخل.	لشوارد الكلور التي تنتشر إلى الداخل ، أو لشوارد السوناسيوم التي تنتشر إلى الخارج .
التبدل في الاستقطاب للغشاء بعد المشبكي.	إزالة استقطاب متدرجة لأن كمون الغشاء يتجه نحو حد العتبة	فرط استقطاب
الكمون المتشكل وسبب تسميته.	كمون بعد مشبكي تنبهي ( EPSP ) ، لأنه يوجه كمون الغشاء إلى حد العتبة.	كمون بعد مشبكي تثبيطي ( IPSP ) ، لأنه بعد كمون الغشاء عن حد العتبة.
شكل المنحنى على شاشة الأسيوسكوب.	موجة للأعلى	موجة للأسفل

قارن بين مشابك التنبه ومشابك التثبيط ؟

- أين يتم تجميع أو تراكم الكمونات بعد مشبكية؟ ولماذا ؟ تتجمع كمونات بعد مشبكية من نهايات قبل مشبكية عدة ، أو من نهاية قبل مشبكية واحدة . - لتطلق كمون عمل في الغشاء بعد المشبكي.
- عدد خواص المشبك الكيميائي موضحا كل منها ؟ أو فسر الإبطاء والقبطية من خواص المشبك الكيميائي
- 1- الإبطاء : تنخفض سرعة السيادة عند مرورها بالمشبك الكيميائي ، ( فسر ) بسبب الزمن اللازم لتحرر الناقل الكيميائي وانتشاره في الفالق المشبكي والزمن اللازم لتثبته على المستقبلات وتشكيل كمون بعد مشبكي .
  - 2- القبطية: تجتاز حالة التنبه المشبك باتجاه واحد من الغشاء قبل المشبكي إلى الغشاء بعد المشبكي .
  - 3- عمله كمحول للطاقة : يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية وبالعكس.
- أين تتشكل النواقل الكيميائية العصبية ، وكيف يكون تأثيرها في المشبك ، وماهي طرق إزالتها ؟
- تتشكل إما في جسم الخلية ، أو في الزر النهائي مباشرة بفعل أنظيمات نوعية . يكون تأثيرها مؤقتا في المشبك ( فسر ) بسبب زوالها بعد أن تؤدي دورها .
- تم إزالتها إما بحلمتها بأنظيمات نوعية أو بإعادة امتصاصها من الغشاء قبل المشبكي وخلايا الدبق أو بانتشارها خارج الفالق المشبكي .
- ما وظيفة أنظيم الكولين أستيراز ؟ يحلله أنظيم الأستيل كولين إلى كولين وحمض الخل .
- عدد بعض أنواع النواقل الكيميائية العصبية موضحا كل منها ؟
- 1- الأستيل كولين : يفرز من الجهاز العصبي ، له تأثير منبه في العضلات الهيكلية ، ويبطئ حركة عضلة القلب ، وله دور مهم في الذاكرة . ( حدد موقع إفراز الأستيل كولين وما دوره )
  - 2- الغلوتامات : يفرز من المسالك الحسية والقشرة المعية ، له تأثير منبه غالباً . ( حدد موقع إفراز الغلوتامات وما دوره )
  - 3- الدوبامين : يفرز من المادة السوداء لجذع الدماغ ، وبكميات قليلة من لب الكظر ، له تأثير مثبط ، ومنشط في الحالات النفسية والعصبية ، يزداد تأثيره بوجود النيكوتين والمواد المخدرة كالكوكالين . ( حدد موقع إفراز الدوبامين وما دوره ومتى يزداد تأثيره )
  - 4- المادة p : ببتيد مكون من ( 11 ) حمض أميني تفرز من مسالك حس الألم في النخاع الشوكي ، لها تأثير منبه وناقل للألم . ( حدد موقع إفراز المادة p وما دورها ومما تتكون ) .
- ما المقصود بالبوتوكس ؟ سم بروتيني مستخرج من بعض الجراثيم يستخدم في عمليات التجميل لإزالة تجاعيد الوجه ومن ثم إرتخاء العضلات عن طريق تثبيط تأثير الأستيل كولين .
- ماذا ينتج من تأثير البوتوكس المستخدم في عمليات التجميل على الأستيل كولين ؟ يثبط الأستيل كولين ومن ثم إرتخاء العضلات .
- ما آلية التحكم بالألم ؟ كيف ندرك حس الألم : ترسل مستقبلات حس الألم السيالات الأكمية إلى النخاع الشوكي ، حيث يتم تحرير المادة ( p ) في مسالك حس الألم لتصل إلى الدماغ ، فنندرك حس الألم .
- كيف يقوم الدماغ بمنع وصول السيالات الأكمية إليه : ويقوم الدماغ بإفراز التكيفالينات والأندورفينات التي تثبط تحرير المادة ( p ) من خلال منع دخول شوارد الكالسيوم من الغشاء قبل المشبكي ، ومن ثم منع وصول السيالات الأكمية إلى الدماغ .

حدد موقع إفراز الأكتيفالينات والتدورفينات وما دورهما؟  
 من الدماغ. تتببط تأثير المادة (p) من خلال منع تحرير شوارد الكالسيوم في الغشاء قبل المشبكي ، وبالتالي منع وصول السيالات الألمية إلى الدماغ  
 قارن بين المشبك الكهربائي والمشبك الكيميائي ؟

وجه المقارنة	المشبك الكهربائي	المشبك الكيميائي
المكونات	سنتان عشائرتان متناظرتان لغاتيا متصورتان بفصلها فائق ضيق ، مترتضان بواسطة قنوات بروتينية.	غشاء قبل مشبكي. فائق مشبكي. غشاء بعد مشبكي.
وجود الناقل الكيميائي	لا يحتاج	يحتاج
جهة نقل السيالة	متماهي منعاكس	بالحاه واحد من الغشاء قبل المشبكي إلى الغشاء بعد المشبكي
السرعة	أكثر سرعة لا يتسع للإبطاء	أقل سرعة
مكان تواجدها في الجسم	من الألياف العصبية للمعضو الواحد كالمعضلة الفنية وعضلات الأحتشاء.	بين نهاية محور (الزر النهائي) لعصبون أول واستطالة هيولية أو جسم خلية لو محور لعصبون ثاني

يؤدي ارتباط الناقل الكيميائي الغلوتامات بمستقبلاته في الغشاء بعد المشبكي إلى ؟ دخول شوارد الصوديوم. قنوات تفتح وتغلق نتيجة تبدل في كيون ( استقطاب ) الغشاء ؟ قنوات التبويب الفولطية

### الدروس السابع ، وظائف الجهاز العصبي المركزي 1.

الذي يحدث في دماغك عندما تقوم بحل مسألة رياضية أو تستمع إلى الموسيقي ؟ لقد كانت الإجابة عن هذا السؤال غير ممكنة لوقت طويل . ومع ذلك ، بدأ العلماء باكتشاف الآليات الخلوية التي تكمن وراء التفكير والعواطف ، وهذا بفضل التكنولوجيا الجديدة الرائعة.

اعتمد العلماء في تحديد وظائف الدماغ على تقنيات مختلفة أهمها ( التصوير الرئبي المغناطيسي ) كيف يتم هذا التصوير ؟ يتم وضع المريض في حقل مغناطيسي كبير، ويتم الكشف عن نشاط الدماغ في منطقة معينة من خلال التغيرات في تراكيز الأوكسجين في تلك المنطقة قام الباحثون بسمح نشاط الدماغ في أثناء استماع الأشخاص لموسيقا بصفتها بالمفرحة أو المحزنة.

فسر تحديد وظائف مناطق معينة من الدماغ باستخدام التصوير الرئبي المغناطيسي ؟ لأنه ضمن هذا التصوير يتم وضع المريض في حقل مغناطيسي كبير ويتم الكشف عن نشاط الدماغ في منطقة معينة من خلال التغيرات في تراكيز الأكسجين في تلك المنطقة.

ما الأماكن المسؤولة عن إدراك أحاسيس الشعور بالحزن والشعور بالفرح ؟

الشعور بالحزن ( الموسيقا المحزنة ) : اللوزة . الشعور بالفرح ( الموسيقا المفرحة ) : النواة المتكئة ( من النوى القاعدية ) .

يقسم الجهاز العصبي المركزي إلى ثلاث مستويات وظيفية ما هي ؟

مستوى الدماغ السفلي : الدماغ المهادي ، وجذع الدماغ والمخيخ . مستوى النخاع الشوكي .

كيف تقوم القشرة المخية بوظائفها بدءا من تلقي باحاتها الحسية السيالات العصبية حتى تصل هذه السيالات إلى المنفذات (ما وظائف قشرة المخ )

1- تتلقى الباحات القشرية الحسية السيالات العصبية الواردة من المستقبلات الحسية ،

2- تقوم الباحات الترابطية بتفسير المعطيات الحسية الواردة ومعالجتها ومقارنتها بالمعلومات السابقة ثم تعطي الاستجابة ،

3- بينما تصدر الباحات الحركية السيالات نحو المنفذات .

ما المناطق الوظيفية ( الباحات ) الثلاث الرئيسية في القشرة المخية ؟

الباحات الحسية . الباحات الحركية . الباحات الترابطية .

تصنف الباحات الحسية في القشرة المخية إلى ثلاث باحات ماهي وما أقسام كل منها :

الباحات الحسية الجسمية \* الباحات الحسية البصرية \* الباحات الحسية السمعية

وتقسم كل منها إلى باحتين أولية وثانوية.

تقسم الباحات الحسية الجسمية إلى أولية وثانوية أين تقع كل منها ؟ الأولى : تقع خلف شق رولاندو في الفص الجداري.

الثانوية : تقع خلف الباحة الحسية الجسمية الأولية.

فسر استقبال الباحة الحسية الجسمية الأولية السيالات الحسية من قطاع جسي محدد من الجانب المعاكس من الجسم ؟ بسبب التصالب الحسي الجسبي

ماذا ينتج من الاستئصال الواسع للباحات الحسية الجسمية الأولية في نصفي الكرة المخية ؟ ( الخدر ) .

ماذا ينتج من تخريب في الباحة الحسية الجسمية الأولية اليسرى ؟

خدر في الجانب الأيمن من الجسم أو فقدان الحس في الجانب الأيمن من الجسم.





تتصل بالدم

- ما وظيفة الباحات الحسية الجسمية الثانوية ؟ يتم فيها الإدراك الحسي الجسمي.
- حدد بدقة موقع الإدراك الحسي الجسمي ؟ في الباحات الحسية الجسمية الثانوية.
- ماذا ينتج من إصابة المريض بأذية في الباحات الحسية الجسمية الثانوية ؟ لا يعاني من الخدر ، ولكنه يصاب بالعمه اللمسي .
- ما المقصود بالعمه اللمسي ؟ أي يصبح المصاب بتخريب في الباحة الحسية الجسمية الثانوية عاجزا عن تحديد ماهية ما يلمس.
- ما المقصود بالتشكيل الشبكي أو أين توجد عصبونات التشكيل الشبكي ، وما دورها ، وماذا ينتج من تخريبها ؟ شبكة منتشرة من العصبونات الموجودة (في الدماغ المتوسط والحلبة الحلقية) ، يعتقد بأن له دورا في النوم واليقظة ويؤدي تخريبها إلى السبات دائم.
- حدد بدقة موقع مراكز الشعور بالألم ؟ ( تتوضع في التشكيل الشبكي وفي المهاد).
- أين يتم تحديد مكان الألم وصفته ؟ في القشرة المخية (في الباحات الحسية الجسمية) .
- ما وظيفة الباحات الحسية الجسمية ؟ يتم فيها تحديد مكان الألم وصفته.

فسر ببقية حس الألم بالرغم من تخريب الباحة الحسية الجسمية في نصفي الكرة المخية ؟ لأن مراكز الشعور بالألم تتوضع في التشكيل الشبكي لجذع الدماغ والمهاد ، بينما يقتصر دور القشرة المخية ( الباحات الحسية الجسمية) على تحديد مكان وصفة الألم.

- أين تقع الباحات البصرية ، وما أقسامها ؟ في الفصين القفويين ، أقسامها : أولية وثانوية.
- ما الألياف العصبية التي تصل إلى الباحات البصرية الأولية ، وما دورها ؟
- تصل إليها الألياف العصبية البصرية القادمة من الشبكيين ، بعد أن تتصالب أمام الوطاء تتصالبا جزئيا .
- دور الباحة البصرية الأولية : يتم فيها الإحساس البصري.

ما دور الباحات البصرية الثانوية ؟ تحليل شكل الأجسام المرئية وحركتها وألوانها (الإدراك البصري) .

- أين توجد الباحات السمعية ، وما أقسامها ؟ توجد في الفصين الصدغيين ، أقسامها أولية وثانوية.
- ما الألياف العصبية التي تصل إلى الباحات السمعية الأولية ، وما دورها ؟ تصل الألياف العصبية السمعية إلى الباحتين السمعيتين الأوليتين بعد أن تتصالب العصب القوقعي جزئيا في جذع الدماغ . دورها : يتم فيها الإحساس السمعي.

ماذا ينتج من التخريب لثاني الجانب للباحات السمعية الأولية ؟ فقدان السمع.

ما دور الباحات السمعية الثانوية ؟ تعمل على إدراك الأصوات المسموعة. ( الإدراك السمعي )

تقسم الباحات المحركة إلى باحتين أولية وثانوية ، أين تقع كل منهما ، وما دورهما ؟

الباحات المحركة الأولية : تقع أمام شق رولانديو مباشرة في الفص الجبهي ، الدور : تشرف كل باحة أولية على تعصيب عضلات الجانب المعاكس من الجسم ( فسر ) بسبب التصالب الحركي .

الباحات المحركة الثانوية : تقع أمام الباحة المحركة الأولية ، الدور : تقوم بتنسيق التقلصات العضلية ، وتوجيهها نحو حركة هادفة.

ماذا ينتج من تخريب الباحة المحركة الأولية ؟ ( خسارة كبيرة في الفعاليات الحركية للجسم )

تصنف الباحات الترابطية إلى ثلاث باحات رئيسية ماهي وما الباحات التي توجد في كل منها ؟

1- الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية توجد فيها باحتين :

أ- باحة فيرنكه ب- باحة الفراسة ( تمييز تعابير الوجه )

2- باحة الترابط أمام الجبهية توجد فيها باحة بروكه 3- باحة الترابط الحافية.

أين تقع الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية ، وما دورها ؟

الموقع : تشغل مناطق جميع الفصوص الثلاثة (الجداري ، القفوي ، الصدغي) عدا تلك التي تشغلها الباحات الحسية .

الدور : تعمل على إدراك معاني السيالات العصبية القادمة من الباحات الحسية الثانوية المجاورة .

أين تقع باحة فيرنكه ( باحة الإدراك اللفوي ) ، وما دورها ، وماذا ينتج من تخريبها ؟ الموقع : في الناحية الوحشية لنصف الكرة المخية اليسرى وسط باحة الترابط الجدارية القفوية الصدغية . الدور : تتلقى السيالات العصبية من جميع الباحات الحسية وتقوم بتحليلها وإدراكها ، وترسل سيالات عصبية نحو الباحات المحركة إذا كان الأمر يتطلب إنجازا حركيا وهي مسؤولة عن الإدراك اللفوي .

ينتج من تخريبها : حيرة فيرنكه أو عدم إدراك معاني الكلمات المقروءة والمسموعة .

أين تقع باحة الفراسة ( تمييز تعابير الوجه ) ، وما دورها ؟

الموقع : تقابل باحة فيرنكه في نصف الكرة المخية اليمنى . الدور : إدراك معاني الموسيقى والفن والرسم والرياضة.

أين تقع باحة الترابط أمام الجبهية ، وما دورها ؟ الموقع : تقع أمام الباحات الحركية في نصفي الكرة المخية.

الدور : تتلقى السيالات من الباحات الحسية والحركية والترابطية الأخرى ومن المهاد ، وتجمع المعلومات وتقوم باتخاذ القرار المناسب لإنجاز مجموعة من الحركات المتتالية الهادفة ، كما تعد مركز التحكم بالفعاليات الأخلاقية والقيم الاجتماعية.

أين توجد باحة بروكه ، وما دورها ، وماذا ينتج من تخريبها ؟

توجد : في الباحة الترابطية أمام الجبهية . دورها : تتلقى الفكر من باحة فيرنكه وتقوم بتحويلها إلى كلمات ( أي النطق والتصويت ) .

تخريبها يؤدي إلى : الحبسة الحركية أو العجز عن إنشاء الكلمات وتلفظها.

أين تقع باحة الترابط الحافية ، وما دورها ؟ الموقع : تقع في الناحية السفلية للفصين الجبهيين وإلى الأمام من الفصين الصدغيين

الدور : لها علاقة بسلوك الشخص وانفعالاته ودوافعه نحو عملية التعلم.

حدد بدقة موقع كل مما يأتي :

- تصاب العصبين البصريين : أمام الوطاء . مركز الإحساس البصري : في الباحة الحسية البصرية الأولية.
- مركز الإدراك الحسي البصري : في الباحة الحسية البصرية الثانوية . تصالب العصب القوقي ( السمي ) : في جذع الدماغ
- مركز الإحساس السمي : في الباحة الحسية السمعية الأولية . مركز الإدراك الحسي السمي : في الباحة الحسية السمعية الثانوية.
- مركز الإدراك اللغوي : في باحة فيرنكه في الباحات الترابطية الجدارية القفوية
- إدراك معاني الموسيقى والفن والرسم والرياضة : بالجهة المقابلة لباحة فيرنكه في نصف الكرة المخية اليمنى .
- مركز التحكم بالفعاليات الأخلاقية والقيم الاجتماعية : في باحة الترابط أمام الجبهية.

## الدرس الثامن ، وظائف الجهاز العصبي المركزي 2 :

أرتب العصبونات التي تشكل المسلك الناقل لحس الحرارة أو اللمس الخشن أو الألم ؟ وأين يحدث التصالب الحسي ؟

عصبون جسمه يقع في العقدة الشوكية . عصبون جسمه يقع في النخاع الشوكي . عصبون جسمه في المهاد . يحدث التصالب الحسي : في النخاع الشوكي .

أرتب العصبونات التي تشكل المسلك الناقل لحس اللمس الدقيق أو الإهتزاز أو الحس العميق ؟ وأين يحدث التصالب الحسي ؟

عصبون جسمه يقع في العقدة الشوكية . عصبون جسمه يقع في البصلة السيسالية إلى أين ينتهي كل من مسلك هذه الإحساسات الحرارة واللمس الخشن والألم واللمس الدقيق والإهتزاز والحس العميق ؟ إلى الباحة الحسية الجسمية الأولية

أين يقع جسم العصبون الثاني في مسلك حس اللمس الدقيق أو الإهتزاز أو الحس العميق ؟ في البصلة السيسالية .

أين يقع جسم العصبون الثاني في مسلك حس اللمس الخشن أو الألم أو الحرارة ؟ في النخاع الشوكي .

ما الحبال التي تعبرها الألياف الحسية الصاعدة في النخاع الشوكي ؟ جميع الحبال ( الخلفيان والجانبان والأماميان ) .

قارن بين حس اللمس الدقيق وحس الحرارة من حيث : مكان تصالب أليافها ، والمستقبل الحسي لكل منها في الجلد ؟

حس اللمس الدقيق : مكان تصالب أليافها ( البصلة السيسالية ) المستقبل الحسي لكل منها في الجلد ( جسيمات مايسنر ) .

حس الحرارة : مكان تصالب أليافها ( النخاع الشوكي ) المستقبل الحسي لكل منها في الجلد ( جسيمات روفيني ) .

من أين تستقبل القشرة المخية السيالات العصبية الحسية ؟ من مستقبلات الحس الخارجي مثل : ( اللمس والحرارة والألم )

ما وظيفة الحس العميق ؟ مسؤول عن إدراك حركة العضلات والمفاصل .

وضوح المسلك الذي تعبره الألياف الحسية ؟ تعبر جميع الحبال في النخاع الشوكي . وتتصالب من الجانب الأيسر من الجسم . لتصل إلى

التصالب الأيمن من الكرة المخية وبالعكس . بعضها يتصالب بشكل تام كالألياف اللمسية . بعضها يتصالب بشكل جزئي كالعصبين البصريين .

ما أنواع تصالب الألياف الحسية مع ذكر مثال ؟ تام : الألياف اللمسية . جزئي : التصالب البصري .

ما دور المخ في الحركات ؟ تصدر القشرة المخية الأوامر الحركية بعد مرحلة نشاط مخي يحدث في الباحات الترابطية .

ما العصبونات التي يصدر عنها السبيل القشري النخاعي ؟ وفي أية باحة توجد هذه العصبونات ؟ العصبونات الهرمية وهي توجد في الباحات المحركة .

يتألف السبيل القشري النخاعي من مسلكين ، أين يتصالب كل منهما ، وأين ينتهيان ؟ في البصلة السيسالية و النخاع الشوكي . ينتهيان في سويات من القرون الأمامية للنخاع الشوكي .

ما دور العصبونات النجمية في القرون الأمامية للنخاع الشوكي ؟ عصبونات محركة ( فسر ) لأنها توصل السيالة المحركة عبر محاورها إلى العضلات المستجيبة .

مم يصدر السبيل القشري النخاعي ؟ وماذا يشكل في أثناء نزوله ؟ يصدر السبيل القشري النخاعي عن العصبونات الهرمية في قشرة المخ . يشكل في أثناء نزوله :



1- في أثناء نزوله يشكل السويقتين المخيتين في الدماغ المتوسط . ( ما وظيفة السبيل القشري النخاعي في الدماغ المتوسط ) .

2- ثم يشكل الأهرامات في البصلة السيسالية . ( ما وظيفة السبيل القشري النخاعي في البصلة السيسالية ) .

3- ثم يتابع نزوله عبر الحبلين الأماميين والحبلين الجانبيين للنخاع الشوكي .

4- لتصل أليافه إلى مستويات من القرون الأمامية للنخاع الشوكي لتشكل مشابك مع العصبونات النجمية التي توصل السيالة المحركة عبر محاورها إلى العضلات المستجيبة .

ما أهمية وجود مشبك واحد فقط على طول السبيل القشري النخاعي ؟ يكسب الحركات السرعة والمهارة .



يقوم المخ بدوره في التعلم والذاكرة وفق اليتين ما هما: ١- المرونة العصبية أو التكيف العصبي. ٢- الذاكرة والتعلم.

ما عدد العصبونات في المخ؟ وما عدد المشابك التي تربط بينها؟

يحتوي المخ ( ١٠٠ ) مليار عصبون تقريبا ، يربط بينها نحو تريليون مشبك في كل ( ١ ) سم<sup>٣</sup>.

ما المقصود بالمرونة العصبية ( التكيف العصبي ) وكيف يمكن تغيير سعة الجهاز العصبي؟

يمكن تعديل الارتباطات ( المشابك ) بين العصبونات ، من ثم تغيير سعة الجهاز العصبي كاستجابة لنشاط تلك العصبونات، أي تقوى الارتباطات بين العصبونات أو تضعف حسب درجة النشاط بينها ، وهذا ما يعرف : بالمرونة العصبية وهي أساسية في تشكيل الذكريات.

يتم تنظيم الذاكرة في دماغنا على ثلاث مراحل ماهي بالترتيب:

١- الذاكرة الحسية ٢- الذاكرة قصيرة الأمد ٣- الذاكرة طويلة الأمد.

ما المقصود بالذاكرة الحسية؟ أو ماذا تسجل الذاكرة الحسية ، وما مدتها ، اذكر مثال؟ تسجل الانطباعات التي تستقبلها الحواس .

- وتستمر أجزاء من الثانية . كما هو الحال عند النظر لجسم ما ، ومن ثم نغلق عيوننا فنلاحظ بقاء الانطباع لمدة قصيرة جداً.

ما المقصود بالذاكرة قصيرة الأمد؟ أو كم تستمر ، وما مصيرها ، اذكر مثال؟ تستمر حتى 20 ثانية أو أكثر.

- يمكن أن تزول أو تتحول إلى ذاكرة طويلة الأمد . كما هو الحال عندما نحفظ رقم هاتف ما ثم ننساه بعد أن نستخدمه لمرة واحدة.

ما المقصود بالذاكرة طويلة الأمد؟ أو كم تستمر ، وما سعتها ، اذكر مثال؟ تستمر لمدة طويلة جداً.

- وسعتها غير محدودة. وتبقى راسخة مدى الحياة وتقاوم الضمور والاضمحلال بدرجة عالية .

- مثالها : تذكر عنوان منزلك القديم أو قيادة دراجة.

قارن بين الذاكرة قصيرة الأمد والذاكرة طويلة الأمد من حيث نوع ومكان تشكل المشابك؟

- الذاكرة قصيرة الأمد : نوع المشبك ( مشابك مؤقتة ) مكان تشكل المشبك : ( الحصين ) .

- الذاكرة طويلة الأمد : نوع المشبك ( مشابك دائمة ) مكان تشكل المشابك ( قشرة المخ ) .

ما الأساس البيولوجي لتشكل عمليتي التعلم والذاكرة؟ وأين تنشأ الذاكرتين قصيرة وطويلة الأمد؟ وما نوع المشابك المتشكلة في كليهما؟ ومتى يحدث ذلك؟

تعد المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات . تنشأ عند المشابك . في أثناء الذاكرة قصيرة الأمد تتشكل مشابك مؤقتة في تلفيف الحصين ، أما في الذاكرة طويلة الأمد تتحول إلى مشابك دائمة في القشرة المخية . يعتقد أن ذلك يحدث في أثناء النوم.

فسر تعد المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات؟ لأن الذاكرتين الطويلة الأمد والقصيرة الأمد تنشأ عند المشابك ، إذ تتشكل مشابك مؤقتة في تلفيف الحصين في أثناء الذاكرة القصيرة الأمد وتتحوّل إلى مشابك دائمة في القشرة المخية في الذاكرة طويلة الأمد .

فسر أهمية النوم في تشكيل الذكريات؟

لأن تحول الروابط المؤقتة في الحصين ( ذاكرة قصيرة الأمد ) إلى روابط دائمة في قشرة المخ ( ذاكرة طويلة الأمد ) ، يحدث في أثناء النوم.

ما المقصود بتلفيف الحصين؟ وما دوره؟ وماذا ينتج من ضرر فيه؟ تلفيف الحصين : جزء متطاوّل من مادة سنجابية نهايته الأمامية متضخمة

( ويمتد في أرضية البطنين الجانبي لكل من نصفي الكرة المخية ) . ( موقع تلفيف الحصين ) .

دوره : يعد ضرورياً لتخزين الذكريات الجديدة طويلة الأمد ولكن ليس للاحتفاظ بها.

- الأشخاص الذين يعانون من ضرر في تلفيف الحصين لا يستطيعون تشكيل ذكريات جديدة دائمة ،

وربما من الأحداث التي جرت قبل إصابتهم.



### الدرس التاسع ، وظائف الجهاز العصبي المركزي

يشمل الدماغ البيني ( المهادي ) المهادين والوطاء ما دور كل منهما؟

١- المهاد : له دور أساسي في تنظيم القدرات القشرية الحسية ( فسر ) وذلك بتحديد وتسهيل وتنظيم السبيلات العصبية الصاعدة إليها .

٢- الوطاء : له دور أساسي في تنظيم حرارة الجسم - فعالية الجهاز الهضمي - يتحكم بالجهاز العصبي الذاتي - يحوي مراكز الشعور بالعطش والجوع والخوف - يتحكم بالنخامة الأمامية .

ما وظيفة عوامل الإطلاق ومن أين تفرز؟ تفرز من الوطاء ، ويتحكم الوطاء من خلالها بالنخامة الأمامية.

حدد بدقة موقع كل من المراكز العصبية الآتية : تنظيم حرارة الجسم - فعالية الجهاز الهضمي - التحكم بالجهاز العصبي الذاتي - مراكز الشعور بالعطش والجوع والخوف - التحكم بالنخامة الأمامية؟ الوطاء.

ما المقصود بالنوى القاعدية؟ أو ما دورها ، وأين تقع ، اذكر مثال؟

- الدور : بنى عصبية حركية ، تعمل بالتعاون مع القشرة المخية المحركة

والمخيخ ( فسر ) للتحكم بالحركات المعقدة .

- الموقع : تقع في مستوى الدماغ البيني إلى الجانب الوحشي لكل مهاد وفي عمق

المادة البيضاء . مثال : منها الجسمان المخططان



ما المقصود بالجسمان المخططان أو ما وظائفهما؟ ١- مرحلة لمرور الحزم المحركة النازلة من القشرة المخية إلى المراكز

العصبية في الدماغ المتوسط. ٢- ضرورياً لحفظ توازن الجسم والحركات التلقائية ( السير ، الكلام ، الكتابة ) .

٣- مم يتألف جذع الدماغ؟ ١- الدماغ المتوسط : الذي يتألف من الحديبات التوهمية الأربع والسويقتين المخيتين .

٢- الحديبة الحلقية ( جسر فارول ) . ٣- البصلة السيالية .

يضم الدماغ المتوسط الحديبات التوعمية الأربع والسويقتين المخيتين ما دورهما ؟  
الحديبات التوعمية الأربع : مركز تنظيم المنعكسات السمعية ( دوران الرأس نحو الصوت ) والبصرية ( دوران كرقي العين نحو الضوء .  
السويقتين المخيتين : تتكون من مادة بيضاء تشكل طريقاً للسيالات المحركة الصادرة عن الدماغ .  
حدد بدقة موقع مركز تنظيم المنعكسات السمعية والبصرية أو دوران الرأس نحو الصوت أو دوران كرقي العين نحو الضوء ؟  
الحديبات التوعمية الأربع .

تضم الحديبة الحلقية ( جسر فارول ) مادة رمادية ومادة بيضاء ما دور كل منها ؟  
المادة الرمادية : مركز عصبي انعكاسي يعمل بالتعاون مع مراكز في البصلة السيسالية للسيطرة على معدل التنفس وعمقه .  
المادة البيضاء : طريق لنقل السيالة العصبية بين المخ والمخيخ .  
حدد بدقة موقع المركز العصبي المسيطر على معدل التنفس وعمقه ؟ المادة الرمادية للحديبة الحلقية بالتعاون مع مراكز في البصلة السيسالية  
فسر المادة الرمادية للحديبة الحلقية مركز عصبي انعكاسي ؟  
لأنه يعمل بالتعاون مع مراكز في البصلة السيسالية للسيطرة على معدل التنفس وعمقه .

تضم البصلة السيسالية مادة رمادية ومادة بيضاء ما دور كل منها ؟  
المادة الرمادية : مركز عصبي انعكاسي لتنظيم الفعاليات الذاتية مثل : حركة القلب والتنفس والبلع والسعال والضغط الدموي .  
المادة البيضاء : طريق لنقل السيالة العصبية الحسية الصاعدة والمحركة الصادرة عن الدماغ .  
فسر المادة الرمادية للبصلة السيسالية مركز عصبي انعكاسي ؟ لأنها تنظم الفعاليات الذاتية .  
حدد بدقة موقع منعكسات حركة القلب والبلع والسعال والضغط الدموي والتنفس وإفراز اللعاب و تنظيم الفعاليات الذاتية ؟  
المادة الرمادية للبصلة السيسالية .

ما وظائف المخيخ ، وكيف يؤمن توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون ؟  
وظائف المخيخ : أ- يؤمن توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون . ب- ضبط الفعاليات العضلية السريعة انعكاسياً مثل : السباحة وقيادة الدراجة  
يؤمن توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون : خلايا بوركنج في المخيخ تتلقى السيالات العصبية الحركية القادمة من القشرة المخية المحركة  
وتقوم بمقارنتها مع السيالات العصبية القادمة إليها من المستقبلات الحسية، ثم تعمل على تكامل المعلومات ، وتحدث فعالية عضلية تؤدي إلى  
حركة دقيقة مما يؤمن توازن الجسم في أثناء الحركة والسكون .

حدد بدقة موقع خلايا بوركنج وضبط الفعاليات العضلية السريعة انعكاسياً مثل : السباحة وقيادة الدراجة؟ المخيخ .  
ما وظائف النخاع الشوكي بمادته الرمادية والبيضاء ؟ المادة الرمادية : يشكل مركزاً عصبياً انعكاسياً لمنعكسات التعرق والمشي اللاشعوري  
والأخمصية ( انقباض أصابع القدم استجابة لدغدغة أخمص القدم .  
المادة البيضاء : طريقاً لنقل السيالة العصبية الحسية الصاعدة والحركية الصادرة عن الدماغ .  
حدد بدقة موقع منعكسات التعرق والأخمصى والمشي اللاشعوري ؟ المادة الرمادية للنخاع الشوكي .

### المدرس العاشر : الفعل المنعكس

أحببت ابنتي الطفل الصغير الذي وضعته حديثاً ، ولكن ما أثار حيرتها هو قدرة الصغير على الرضاعة منذ اليوم الأول لولادته ،  
ولم تستطع تفسير ذلك ، وعندما سألت مدرّسة العلوم عن السبب ، أجابتها ؟ بأنه فعل انعكاسي .

ما الفعل الانعكاسي ؟ وكيف يحدث ، وأين يقع مركزه العصبي ؟  
الفعل الانعكاسي : هو استجابة سريعة تلقائية من الجسم لإرادية ( فسر ) لأنه حدث من دون تدخل قشرة المخ  
يقع المركز العصبي له في النخاع الشوكي أو البصلة السيسالية .

الأحظ الشكل الآتي ، الذي يمثل ضفدعاً شوكتياً بعد تنبيهه بحمض الخل . وأجيب عن الأسئلة :

1- ما المقصود بالضفدع الشوكي ؟ هو ضفدع خرب دماغه وبقي نخاعه الشوكي سليماً .

2- هل استجابة الضفدع إرادية ؟ ولماذا ؟ لا ، لأنها حدثت دون تدخل قشرة المخ .

3- ما المركز العصبي الذي أشرف على هذا الفعل ؟ النخاع الشوكي .

الأحظ الشكل الذي يوضح الأقواس الانعكاسية الشوكية وحيدة المشبك وثنائية المشبك وأجيب على الأسئلة :

1- ما عناصر القوس الانعكاسية وحيدة المشبك وثنائية المشبك وأنها لا يحوي عصبونات بينية ؟

وحيدة المشبك : عصبون جابذ حسي - عصبون نابذ محرك .

ثنائية المشبك : عصبون جابذ حسي - عصبون بيني ( موصل ) - عصبون نابذ محرك .



لا يحوي عصبونات بينية : القوس الإنعكاسي وحيدة المشبك .

2- قارن بين سرعة السيالة في كل من القوسين وحيدة المشبك وثنائية المشبك ؟

القوس وحيدة المشبك أسرع لوجود مشبك واحد .

3- ما عدد العصبونات البينية المتوقعة في قوس يحتوي أكثر من مشبكين ؟ أكثر من عصبون بيني .

ما المقصود بالقوس الانعكاسية ؟



القوس الإنعكاسية : هي مجموعة العصبونات التي تشكل مسار السيالة العصبية في أثناء حدوث الفعل المنعكس.  
عدد أنواع الأقواس الانعكاسية مقارنا بينها من حيث عدد العصبونات البينية والسرعة ؟

القوس	وحنيدة المشبك	ثنائية المشبك	عديدة المشبك
عند العصبونات البينية	لا يوجد	عصبون بيني واحد	أكثر من عصبون بيني
السرعة	أكثر سرعة	أقل سرعة	الأقل

- ما مراحل حدوث المنعكس الداغصي ؟ وما المركز العصبي المسؤول عنه ؟ وما أهميته طبيا ؟
- 1- النقر على وتر العضلة رباعية الرؤوس . (ماذا ينتج)
  - 2- تلتقط المستقبلات الحسية في العضلة رباعية الرؤوس التنبهات وترسلها عبر العصبون الحسي إلى النخاع الشوكي.
  - 3- يقوم العصبون الحركي بنقل الأوامر الحركية للعضلة رباعية الرؤوس ، بعد معالجة المعلومات في النخاع الشوكي .
  - 4- يقوم العصبون البيني بتثبيط انتقال السيالة عن طريق تشكيل (IPSP) في العصبون الحركي.
  - 5- ما وظيفة العصبون البيني في المنعكس الداغصي
  - 6- يتم تثبيط تقلص عضلة الأوتار المأبضية لتعكس بعملها العضلة الرباعية الرؤوس فتندفع الساق نحو الأمام.
  - 7- ماذا ينتج من تثبيط تقلص عضلة الأوتار المأبضية : تعاكس بعملها العضلة رباعية الرؤوس فتندفع الساق نحو الأمام
  - 8- المركز العصبي : العادة الرمادية للنخاع الشوكي.. أهميته طبيا: يستخدم للتأكد من سلامة النخاع الشوكي والأعصاب الشوكية.
  - 9- ما وظيفة المنعكس الداغصي

ما ميزات الفعل المنعكس ؟

- 1- غرضي هادف ( فسر ) لإبعاد الأذى عن جسم الكائن الحي غالباً.
- 2- يتمتع بالرتابة ( علل أو عرف ) لأنه يستجيب بالصورة ذاتها تحت تأثير المنبه ذاته.
- 3- عرضة للتعب ( فسر ) بسبب نفاذ النواقل العصبية في الغشاء قبل المشبكي ( فسر ) نتيجة الاستعمال الزائد لها من دون وجود آليات سريعة لتعويضها. ( ماذا ينتج من نفاذ النواقل العصبية من الغشاء قبل المشبكي : تصبح المنعكسات عرضة للتعب )
- 4- تترافق المنعكسات أحيانا بإحساسات شعورية ( فسر ) لأن قسماً من السيالات الحسية يصل إلى قشرة المخ.

ألاحظ الشكل المجاور الذي يوضح تجربة العالم الروسي إيفان بافلوف ، وأجب عن الأسئلة الآتية :

- 1- ماذا ينتج عن تقديم منبه أولي ( اللحم المجفف ) للكلب في ( ١ ) ؟
- 2- ماذا أسمي هذه الاستجابة ؟ ولماذا ؟

يتم إفراز اللعاب ، استجابة انعكاسية ، لأنها تحدث دون تدخل القشرة المخية ( منعكس فطري غريزي ) .

- 2- ما نوع المنبه في الفعل المنعكس الغريزي ؟ وما هي عناصره ؟

نوع المنبه : أولي ( طبيعي ) عناصره: نهايات حسية في اللسان) عصبون حسي جابذ ( مركز عصبي في البصلة السيسالية ) عصبون مفرز ( نابذ ) ) غدد لعابية وإفراز اللعاب.

لماذا لم يستطع المنبه الثانوي ( الجرس ) أن يثير الاستجابة ( إفراز اللعاب في المرحلة ( ٢ ) ؟ لأنه منبه صناعي محايد.

ماذا ينتج عن تلازم المنبهين الثانوي والأولي مرات عدة ؟ وكيف أفسر النتيجة ؟

يصبح المنبه الثانوي وحده قادراً على إثارة السلوك أو الاستجابة التي يثيرها المنبه الأولي ، لأن المخ كون رابطة بين المنبه الثانوي ( الشرطي ) والاستجابة.

فسر للمخ علاقة بالمنعكس الشرطي ؟ لأن المخ كوّن رابطة بين المنبه الشرطي ( الثانوي ) والاستجابة.

ما نوع المنبه في الفعل المنعكس الشرطي ؟ وماهي عناصره حسب تجربة بافلوف على الكلب ؟

نوع المنبه : ثانوي ( صناعي ) . عناصره : صوت الجرس ( الأذن ) القشرة المخية ( البصلة السيسالية ) الغدد اللعابية وإفراز اللعاب.

ما المقصود بالفعل المنعكس الشرطي ؟

هو تقديم منبه ثانوي محايد ( الجرس ) مع منبه أولي طبيعي ( اللحم ) مرات عدة ، يصبح المنبه الثانوي وحده قادراً على إثارة السلوك والاستجابة التي يثيرها المنبه الأولي عادة ، وهو نمط من السلوك المتعلم ( تمت إعادة تجربة بافلوف باستخدام مثيرات مختلفة بصيرة - سمعية - شمعية ) .

ما أهمية تجربة بافلوف ؟ خرجت تجربة بافلوف بقوانين فسرت جوانب كثيرة من عملية التعلم ، وتكوين العادات عند الإنسان والحيوان.

تدرس الحادي عشر: بعض أمراض الجهاز العصبي

عدد بعض أمراض الجهاز العصبي ؟

1- داء باركنسون ( الشلل الرعاشي ) . 2- مرض الزهايمر ( الخرف المبكر ) .

3- مرض الشقيقة ( الصداع الوعائي ) . 4- التصلب اللويحي المتعدد . 5- الصرع .

أولاً: - داء باركنسون ( الشلل الرعاشي )

ما المقصود بداء باركنسون أو في أي عمر يصيب داء باركنسون الإنسان؟ مرض يصيب المتقدمين في العمر نتيجة تلف الخلايا العصبية في المادة السوداء مع التقدم في العمر أو بسبب نقص بعض المركبات الكيميائية أو لسبب وراثي.  
 ما الأعراض الرئيسية الثلاثة التي يتصف بها داء باركنسون؟ تصلب في العضلات . ارتعاش ايقاعي في اليدين . صعوبة في الحركة .

تفرز خلايا المادة السوداء لجذع الدماغ الناقل العصبي الدوبامين إلى الجسم المخطط وهو مثبت لعصبونات الجسمين المخططين وهناك عصبونات في القشرة المخية تحرر الأستيل كولين إلى الجسم المخطط وهو منبه للجهاز العصبي المركزي ، فموت العصبونات في المادة السوداء يؤدي إلى نقص الدوبامين وزيادة فعالية الجسمين المخططين ، وتقلصات مستمرة في معظم العضلات الهيكلية للجسم .  
 ماذا ينتج من تأثير الناقل العصبي الدوبامين على الجسمين المخططين ؟ يثبط عصبونات الجسمين المخططين .  
 ماذا ينتج من تأثير الناقل العصبي الأستيل كولين على الجهاز العصبي المركزي ؟ ينبه الجهاز العصبي المركزي .  
 ما وظيفة خلايا المادة السوداء لجذع الدماغ ؟ تفرز الناقل العصبي الدوبامين .  
 ماذا ينتج عن موت الخلايا العصبية في المادة السوداء لجذع الدماغ أو تلفها أو نقص بعض المركبات الكيميائية؟ الإصابة بداء باركنسون .  
 ما علاج مرض داء باركنسون ؟

يعالج بإعطاء المصاب طليعة الدوبامين الذي يتحول في الدماغ إلى دوبامين لأن الدوبامين لا يمر من خلال الحاجز الدماغي الدموي .  
 فسر يعالج داء باركنسون بإعطاء المصاب طليعة الدوبامين الذي يتحول في الدماغ إلى دوبامين ؟ لأن الدوبامين لا يمر من خلال الحاجز الدماغي الدموي .  
 ما المقصود بالمادة السوداء ؟ خلايا عصبية كبيرة ( تقع في الدماغ المتوسط ) سيتوبلاسماها غنية بالميلانين تفرز الدوبامين الذي ينتقل عبر محاورها إلى الجسم المخطط .

ثانياً : مرض الزهايمر ( الخرف المبكر ) :  
 ما المقصود بمرض الزهايمر ؟ هو مرض يصيب بعض المتقدمين في العمر بنحو سن الستين غالباً ( شيخوخة مبكرة للدماغ) .  
 ما أعراض مرض الزهايمر ؟ يعاني المصاب صعوبة في تذكر الأحداث القريبة لصبح مرتباً كبير النسيان ريثما يحدث فقدان تام للذاكرة في المراحل المتأخرة .  
 ما هي آلية حدوث مرض الزهايمر ؟ هو مرض وراثي نتيجة تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني ( الأميلويد ) حول العصبونات في القشرة المخية والحصين ، مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على التواصل مع العصبونات الأخرى وضمورها ثم موتها .

ماذا ينتج من ترسب لويحات بروتين بيتا النشواني ( الأميلويد ) حول عصبونات في القشرة المخية أو ضمور عصبونات القشرة المخية وفقدانها القدرة على التواصل مع العصبونات الأخرى وموتها؟ مرض الزهايمر .  
 فسر موت الخلايا العصبية في المخ في حالة الإصابة بالزهايمر ؟ نتيجة تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني حولها .  
 فقدان العصبونات في القشرة المخية والحصين القدرة على التواصل مع العصبونات الأخرى وضمورها ثم موتها ؟  
 نتيجة تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني حول عصبونات في القشرة المخية والحصين .  
 حدد موقع تراكم لويحات بيتا النشواني ؟ حول عصبونات في القشرة المخية والحصين .

ثالثاً : مرض الشقيقة ( الصداع الوعائي )  
 ما المقصود بمرض الشقيقة أو ما سببه ، وماذا ينتج عنه ، وكيف يثار ؟ توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي يؤدي إلى تنبيه النهايات العصبية في هذا الشريان ، ينتج عنها ( صداع وحيد الجانب ) ، ويثار بعوامل بيئية أو نفسية محددة .  
 فسر الإصابة بمرض الشقيقة ؟ بسبب توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي يؤدي إلى تنبيه النهايات العصبية في هذا الشريان .  
 ماذا ينتج من توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي ؟ مرض الشقيقة .

رابعاً : التصلب اللويحي المتعدد  
 ما المقصود بمرض التصلب اللويحي المتعدد أو متى يظهر ، وماسببه ومما تنتج أعراضه ، وماهي أعراضه ؟  
 يظهر المرض بين سن ( ٢٠ - ٤٠ ) هو تنكس عصبي .  
 سببه فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطالات ، وتفككها إلى صفائح متصلبة نتيجة مرض مناعي ذاتي .  
 تنتج الأعراض : من زوال غمد النخاعين في مناطق متعددة من المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي .  
 الأعراض : يحس المريض بصدمة كهربائية عند تحريك العنق .

ماذا ينتج من فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطالات ؟ الإصابة بمرض التصلب اللويحي المتعدد .  
 ماذا ينتج من زوال غمد النخاعين في مناطق متعددة من المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي ؟ الإصابة بمرض التصلب اللويحي المتعدد .  
 فسر يحس مريض التصلب اللويحي المتعدد بصدمة كهربائية عند تحريك العنق ؟  
 بسبب زوال غمد النخاعين في مناطق متعددة من المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي .

خامساً : الصرع  
 ما المقصود بالصرع ؟ أو عن ماذا ينجم مرض الصرع وما أعراضه ؟ اختلال ناجم عن نوبات من النشاط الكهربائي الدماغي المشوش ، ( الأعراض) يصحبها حركات تشنجية لا إرادية والسقوط أرضاً وفقدان الوعي بضع دقائق .  
 فسر فقدان الوعي والسقوط أرضاً في حالة الصرع ؟ بسبب حركات تشنجية لا إرادية ناجمة عن نوبات من النشاط الكهربائي الدماغي المشوش .  
 ماذا ينتج عن نوبات من النشاط الكهربائي الدماغي المشوش ؟ مرض الصرع .

## المستقبلات الحسية

### الدرس الأول : مفهوم المستقبلات الحسية

ما التغيرات التي يجب على الكائن الحي أن يتفاعل معها لاستمرار حياته ؟ التغيرات التي تطرأ على كل من بيئته الخارجية ووسطه الداخلي.  
من أين تتلقى المستقبلات الحسية التنبيهات ، إلى ماذا تحولها ، وما دور المراكز العصبية المختصة ؟  
تتلقى التنبيهات من الوسطين الداخلي والخارجي . تحولها إلى سيالات عصبية تنتقل عبر الأعصاب إلى المراكز العصبية المختصة.  
المراكز العصبية المختصة : تعالج المعلومات الواردة إليها بهدف تحقيق الاستجابة الملائمة.

- عدد المستقبلات الحسية ، ومدورها ، مع ذكر مركزها العصبي المختص ؟
- اللسان : التذوق ( الفص الجداري )
- العين : الإبصار ( الفص القفوي )
- الجلد : اللمس ( الفص الجداري )
- الأنف : الشم ( الفص الصدغي )
- الأذن : السمع ( الفص الصدغي )

حدد نوع طاقة المنبه التي تستجيب لها كل من المستقبلات الحسية ؟

المستقبلات الأولية والحرارية : الجلد . المستقبلات الكيميائية : اللسان ، الأنف . مستقبلات الأمواج الصوتية : الأذن . مستقبلات الأمواج الضوئية : العين.  
تعد المستقبلات الحسية محولات بيولوجية نوعية فسر ذلك ؟

لأنها تحول طاقة المنبه إلى سيالات عصبية تولد إحساساً خاصاً في المركز العصبي .

تتميز المستقبلات الحسية بالنوعية فسر ذلك ؟ لأن كل نوع منها تكيف لاستقبال منبه نوعي خاص .

تصنف المستقبلات الحسية بحسب المنشأ إلى نوعين ماهما ؟

المستقبلات الأولية : خلايا عصبية جاذبة أداة الحس فيها

نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين .

المستقبلات الثانوية : خلايا حسية مهدبة من منشأ غير عصبي تكيفت

لاستقبال التنبيه ، ونقل الاستجابة الناتجة إلى الاستطالة الهيولية لعصبون حسي ( جابذ ) عبر مشبك يوجد بينهما .

قارن بين المستقبلات الأولية و المستقبلات الثانوية من حيث المنشأ وأداة الحس ووجود المشبك واذكر مثال عن كلا منهما ؟

المنشأ : الأولية ( من منشأ عصبي ) الثانوية ( من منشأ غير عصبي ) .

أداة الحس : الأولية ( نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين ) الثانوية ( أهداب الخلية الحسية ) .

وجود المشبك : الأولية ( لا يوجد ) الثانوية ( يوجد ) .

مثال : الأولية ( المستقبلات الشمية ) الثانوية ( المستقبلات الذوقية ) .

ما مفهوم المستقبلات الحسية ؟ خلايا حسية تخصصت لاستقبال المنبهات الداخلية أو الخارجية ، وتحويل طاقتها إلى كمونات عمل تنتقل على شكل سيالة عصبية إلى المراكز العصبية المختصة .

رتب مراحل عمل المستقبل الحسي ( الخلية الحسية ) ؟ منبه نوعي كاف (

1- الاستقبال : فتح أو إغلاق القنوات الشاردية في غشاء الخلية الحسية .

2- التحويل الحسي : تتغير نفاذية الغشاء للشوارد ( ماذا ينتج ) مما يؤدي إلى تبدل استقطاب غشاء الخلية الحسية ، يسمى هذا التبدل كمون المستقبل .

3- النقل : تزداد قيمة كمون المستقبل إلى الحد الذي يكفي ( ماذا ينتج ) لإثارة كمونات عمل تنتقل بشكل سيالات عصبية إلى المركز العصبي .

4- الإدراك الحسي : يقوم المركز العصبي بمعالجة المعلومات الواردة مولدا إدراكا حسيا للمنبه .

من خلال المخطط الآتي استنتج العلاقة بين شدة المنبه وشدة الإحساس :

فسر تزداد شدة الإحساس بزيادة شدة التنبيه ؟ بسبب

1- زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها كمون المستقبل .

2- وزيادة عدد الخلايا الحسية المنبهة .

أين ينشأ كمون المستقبل ، وماذا ينتج عن زيادة قيمته ؟

ينشأ في غشاء الخلية الحسية . ينتج زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها .



### الدرس الثاني : المستقبلات الحسية في الجلد

فسر سبب الحس الشعوري المتولد في قشرة المخ عندما لمس جسم ما وأحدد طبيعته ( ساخن ، بارد ، ناعم ، خشن ) ؟

بسبب وجود مستقبلات حسية ( آلية ، حرارية ، ألم ) في الجلد .

إلى ماذا تصنف المستقبلات الحسية في الجلد ؟ مستقبلات آلية ، ومستقبلات حرارية ، ومستقبلات الألم .

## قارن بين المستقبلات الحسية من حيث الدور ومكان وجودها ؟

مستقبلات	دورها	مكان وجودها
حسيت مارتينور	مستقبلات لمس التدفق	في المنعطف السطحية من أدمة الجلد، وتتركز في رواس الأصابع، والشفتان، وأربعة اليدين.
حسيت باسني	مستقبلات اللمس... <b>الاصعق والاهتزاز</b>	في المنعطف السطحية من أدمة الجلد.
حسيت رومانيس	مستقبلات بعدد هبة التنبيه لها الدور في حس اللمس <b>سبحونه</b> وله دور مستقبل تحفظ	في أدمة اليدين والقدمين.
حسيت كراوس	مستقبلات للبرودة	في أدمة اليدين والقدمين.
مخس ماركول	مستقبلات لمس <b>اللمس</b> ، يتنبه باللمس الحسية على سطح الجلد. والتي تفر من أسفل هذا السطح	تلامس السطح الداخلي لطبقة المودة في بشرة الجلد، إذ تشع نهايات الاستقبلات النهائية لخلايا حسية حسية وتغوصها خلايا صرغ.
نهايات عصبية حرة مجردة من الشغافين	مستقبلات لمس والحرارة و <b>الألم</b> تشع بعمق الانتعاش	في <b>عشيرة</b> الجلد. في <b>حدر</b> الشعراء.

### تصنف المستقبلات الآلية والحرارية في الجلد حسب بنيتها إلى مستقبلات محفظية ومستقبلات غير محفظية وضح كل منها ؟

مستقبلات محفظية : يتكون المستقبل المحفظي من نهاية عصبية مجردة من النخاعين ، تحيط بها محفظة تأخذ شكلا ملائما للاستجابة المثل بحسب طبيعة المنبه ، وتتميز بعتبة تنبيه منخفضة. ( مم يتكون وبماذا يتميز )

مستقبلات غير محفظية : تفرعات لنهايات عصبية حرة مجردة من غمد النخاعين ، وتتميز بعتبة تنبيه مرتفعة ، تستجيب للمنبهات المختلفة التي تبلغ شدتها حدا يسبب أذية في النسج ، فتولد حس الألم . ( مم يتكون ، وبماذا يتميز ، وإلى ماذا تستجيب )

### فسر لمستقبلات الألم دور مهم في حماية الجسم من الأذى ؟

لأنها تستجيب للمنبهات التي تبلغ شدتها حدا يسبب أذية في النسج ، فيتولد حس الألم.

فسر عندما أمسك قطعة من الجليد بيدي ، فأشعر بالبرودة أولا ، ثم بالألم بعد مدة زمنية ؟

لأن جسيمات كراوس تتميز بعتبة تنبيه منخفضة ، بينما تتميز مستقبلات الألم بعتبة تنبيه مرتفعة.

### فسر يستخدم التخدير الموضعي في بعض العمليات الجراحية البسيطة ؟

لأنه يستهدف النهايات العصبية الحرة في بشرة الجلد المسؤولة عن استقبال حس الألم ،

حيث يعطل المخدر انفتاح قنوات الصوديوم فلا تتشكل كمونات عمل في المنطقة المخدرة.

فسر توصف الحساسية الجلدية بأنها نقطية ؟ لأن المستقبلات الحسية تتوزع بشكل غير متجانس في الجلد

فسر أكثر مناطق الجسم حساسية للبرودة أسفل القدمين ؟ بسبب غزارة جسيمات كراوس فيها.

مم يتألف جسيم باشيني ؟ وارسم شكلا تخطيطيا له موضعا المسميات المناسبة ؟

يتألف جسيم باشيني من :

استطالة هيولية لثخينة مغمدة بالنخاعين نهايتها الطرفية مجردة من الغمد.

محفظة تتألف من خلايا ضامة تشكل صفائح ،

ويوجد في سوية المحفظة اختناق رانقيبه واحدة على الأقل.

فسر السرعة العالية للسيلة العصبية الناتجة عن تنبيه جسيم باشيني ؟ لأن الليف العصبي الذي يدخل إلى المحفظة لثخين ومغمدة بالنخاعين.

فسر جسيم باشيني مستقبل أولي ؟ لأنه من منشأ عصبي.

ماوظيفة الخلايا الضامة لجسيم باشيني ؟ تشكل صفائح.

حدد موقع العقدة الرانقيه لجسيم باشيني ؟ في سوية المحفظة.

### قارن بين المستقبلات المحفظية والمستقبلات غير المحفظية من حيث المكونات وعتبة تنبيهها والاستجابة ؟

المستقبلات المحفظية : المكونات أو أداة الحس : نهاية عصبية مجردة من غمد النخاعين / عتبة التنبيه : منخفضة / الاستجابة : تحيط

بها محفظة تأخذ شكلا ملائما للاستجابة المثل بحسب طبيعة المنبه.

المستقبلات غير المحفظية : المكونات أو أداة الحس : تفرعات لنهايات عصبية حرة مجردة من غمد النخاعين / عتبة التنبيه : مرتفعة /

الاستجابة : تستجيب للمنبهات المختلفة التي تبلغ شدتها حدا يسبب أذية في النسج ، فتولد حس الألم.

عدد المستقبلات الحسية التي لها علاقة في الحرارة ؟ نهايات عصبية حرة في البشرة ، جسيم كراوس ، جسيم روفيني.

## الدرس الثالث المستقبلات الكيمائية الشم والتذوق


### أولا المستقبلات الشمية :

ما الشروط الواجب توافرها حتى أميز رائحة زهرة ؟ وكيف اتجنب شم رائحة كريهة ؟

أقوم بعملية الاستنشاق لدخول المادة الغازية ذات التركيز المناسب وتنحل في مخاطية الأنف

أجنب استنشاق الهواء أو استخدم ملطفا للجو.





أدرس الشكل الآتي الذي يمثل بنية المستقبل الشمي ، وأجيب عن الأسئلة :  
 ١- أين توجد الخلايا الحسية الشمية ( شولتز ) ؟ وما نوعا الخلايا التي توجد إلى جوارها ؟  
 في البطانة الشمية في الحفيرة الأنفية.

٢- خلايا داعمة و خلايا جذعية ( قاعدية ) . ( حدد موقع الخلايا الداعمة  
 والخلايا الجذعية : إلى جوار الخلايا الحسية الشمية في البطانة الشمية )  
 ٣- أين توجد الخلايا التاجية ؟ وماذا تشكل محاورها ؟

٤- توجد في الفص الشمي . تشكل محاورها ألياف العصب الشمي.  
 ( الخلايا التاجية : خلايا عصبية توجد في الفص الشمي ، وتشكل أليافها العصب الشمي )

٥- قارن بين الخلايا التاجية و خلايا شولتز من حيث الشكل ؟ الخلايا التاجية عصبونات متعددة الأقطاب أما خلايا شولتز عصبونات ثنائية القطب.

٦- أين توجد غدد بومان ؟ وما أهميتها ؟ تنتشر بين الخلايا الحسية الشمية أو في البطانة الشمية.

٧- أهميتها : تفرز المادة المخاطية . ( غدد بومان : غدد مخاطية تنتشر بين الخلايا الحسية الشمية ، تفرز المادة المخاطية )

٨- فسر المستقبلات الشمية ( خلايا شولتز ) مستقبلات أولية ؟ لأنها من منشأ عصبي.

٩- ما المقصود بخلايا شولتز ، وبماذا تنتهي استطالاتها الهيولية ، وأين تنغرس أهدابها ، وأين ينتهي محوارها ، وماذا يشكل في الكبيبة ؟

١٠- دورها : خلايا حسية شميه ) ، عددها نحو ( ١٠ - ٢٠ ) مليون خلية . لكل خلية استطالة هيولية تنتهي بتفصنات تسمى بروزات هدية أو أهداب.

تنغرس في المادة المخاطية التي تفرزها غدد بومان . ينتهي محوارها في الفص الشمي.

ويشكل مشابك مع الاستطالات الهيولية للخلايا التاجية ضمن بنية تسمى : الكبيبة

( ما المقصود بالكبيبة : بنية ( تقع في الفص الشمي ) تتصل فيها ألياف الخلايا الحسية الشمية مع الخلايا التاجية عبر المشابك ) .

١١- فسر تعوض الخلايا الحسية الشمية باستمرار ؟ لأن عمر الخلايا الحسية الشمية قصير.

١٢- مادور الخلايا القاعدية الموجودة إلى جوار الخلايا الحسية الشمية في البطانة الشمية ؟ تعوض الخلايا الحسية الشمية باستمرار.

١٣- مآلية الاستقبال الشمي ؟ تؤمن عملية الاستنشاق مرور المادة الغازية أو البخارية ذات التركيز المناسب في الحفيرة الأنفية ، فتتحل في السائل

المخاطي ، وتنبه أهداب الخلية الحسية الشمية .

١٤- مآراحل عمل مستقبل الخلية الحسية الشمية ؟ ( ينتج ) عن ارتباط جزيئات المادة الكيميائية بالمستقبلات في أغشية الأهداب ( تنشيط

بروتين G ) الذي ينشط أنزيم أدينيل سيكلاز ( مادوره ) الذي يحول المركب ( ATP ) إلى أدينوزين أحادي الفوسفات الحلقي ( cAMP ) .

( كيف ينشط أنزيم أدينيل سيكلاز ، ومادوره ) - تفتح قنوات الصوديوم في الغشاء ( فسر ) نتيجة ارتباط مركب ( cAMP ) بها ( ماذا ينتج ) وتدخل

شوارد الصوديوم إلى الخلية ( ماذا ينتج ) مما يسبب زوال استقطاب الغشاء وتشكيل كمون المستقبل.

١٥- إثارة كمون عمل ( حدد موقع ) في محوار الخلية الحسية الشمية ينتقل عبر المشابك إلى الخلية التاجية فتتكون سيالة عصبية تنتقل عبر ألياف

العصب الشمي إلى مراكز الإحساس الشمي . ( أين تتم إثارة كمون العمل : في محوار الخلية الحسية الشمية ، ومادور العصب الشمي : ينقل السيالة

العصبية الشمية إلى مراكز الإحساس الشمي في المخ )

١٦- ما المقصود بالحجب الشمي ؟ وبماذا يستفاد منه ؟ عندما تؤثر مادتان منحلتان في البطانة الشمية ، فإن المادة الأشد تأثيرا توقف الإحساس

الشمي للمادة الأخرى . يستفاد منه في صناعة ملطقات الجو.

١٧- فسر ضرورة الاستنشاق للإحساس الشمي بالرائحة ؟ لأن الاستنشاق يشكل مجرى هوائي يؤمن وصول المادة ذات الرائحة إلى البطانة الشمية.

ثانيا : المستقبلات الذوقية

١٨- أتنا : عندما أتناول أنواع الأطعمة المختلفة أتمكن من تمييز مذاق كل منها المطلوب :

١٩- ما الخلايا الحسية التي استقبلت التذوق ؟ أين توجد ؟ خلايا حسية ذوقية . تتوضع في بني تسمى البراعم الذوقية.

٢٠- أين توجد البراعم الذوقية ؟ ضمن بروزات على السطح العلوي للسان تسمى : ( الحليمات اللسانية ) كما يوجد براعم ذوقية خارج الحليمات في

البلعوم . ( الحليمات اللسانية : بروزات على السطح العلوي للسان توجد ضمنها البراعم الذوقية )

٢١- فسر تعدد الخلايا الحسية الذوقية من المستقبلات الثانوية ؟ لأنها من منشأ غير عصبي.

٢٢- فسر تعوض الخلايا القاعدية الخلايا الذوقية باستمرار ؟ لأن عمر الخلايا الحسية الذوقية قصير ( ١٠ ) أيام فقط .

٢٣- كيف تعوض الخلايا القاعدية الخلايا الذوقية ؟ تنقسم الخلايا القاعدية في البرعم الذوقي ، ( ماذا ينتج ) فتعطي خلايا انتقالية ( مادورها ) تقوم

بدورها كخلايا استنادية قبل أن تتحول إلى خلايا حسية ذوقية . ( الخلايا الانتقالية : خلايا ( في البرعم الذوقي ) تتشأن من الخلايا القاعدية ، تتحول إلى خلايا حسية ذوقية )

٢٤- مم يتألف البرعم الذوقي ؟ وماعدد الخلايا الحسية الذوقية التي يحتويها ؟

٢٥- الخلايا الحسية الذوقية - خلايا استنادية - خلايا قاعدية . ( ٤٠ إلى ١٠٠ ) .

٢٦- عند تذوق رشفة من عصير الليمون المحلى بالسكر يؤدي إلى زوال استقطاب في غشاء

في غشاء الخلية الحسية ، ماالعوامل المسببة لذلك ؟

٢٧- دخول شوارد الهيدروجين الحمضية عبر الغشاء ، وارتباط جزيئات السكر بالمستقبل في غشاء الخلية الحسية.



فسر الوطاء ينظم توازن الماء في الجسم ؟ لأن عند شرب الماء تتنبه مستقبلات ذوقية في البلعوم ، ( ماذا ينتج ) وترسل السيالات العصبية إلى الوطاء الذي ينظم توازن الماء في الجسم عن طريق إفراز الحافزة المضادة للإبالة. ( توجد المستقبلات الذوقية للماء في البلعوم )

مآلية عمل المستقبلات الذوقية عند تناول كل من ( الطعام الحلو والمر ) و ( الطعام المالح والحامض ) ؟

مستقبلات الحلو والمر : ترتبط المادة ذات الطعم الحلو أو المر بمستقبل نوعي في الغشاء ( ماذا ينتج ) مما يؤدي إلى تنشيط بروتين G مرتبط بالمستقبل .

يسبب زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية الذوقية . يحفز زوال الاستقطاب الخلية الحسية الذوقية على تحرير النواقل العصبية الكيميائية وإثارة كيون عمل في بدايات الأعصاب القحفية الذوقية التي ترسلها إلى المركز العصبي المختص .

العصبية الكيميائية وإثارة كيون عمل في بدايات الأعصاب القحفية الذوقية التي ترسلها إلى المركز العصبي المختص . ينقل السيالة ( تقع مستقبلات المادة ذات الطعم الحلو والمر : في أغشية أهداب الخلية الحسية الذوقية / ما وظيفة العصب القحفي الذوقي : ينقل السيالة العصبية الذوقية إلى المركز العصبي المختص بالتذوق في المخ / أين تتم إثارة كيون العمل في الخلية الذوقية : في بدايات الأعصاب القحفية الذوقية )

( الطعام المالح والحامض ) : إن انتشار شوارد الصوديوم للمحاليل الملحية أو شوارد الهيدروجين للمحاليل الحمضية إلى داخل الخلية الحسية الذوقية ( ماذا ينتج ) يؤدي إلى زوال استقطاب غشاؤها . يحفز زوال الاستقطاب الخلية الحسية الذوقية على تحرير النواقل العصبية الكيميائية وإثارة كيون عمل في بدايات الأعصاب القحفية الذوقية التي ترسلها إلى المركز العصبي المختص .

ما المقصود بالنكهة ؟ يؤدي اجتماع الإحساس الشمي مع الإحساس الذوقي لمادة ما إلى ما يسمى ( النكهة ) .

ماذا ينتج من ارتباط جزيء الفلوكوز بمستقبله في أغشية أهداب الخلية الحسية الذوقية ؟ تنشيط بروتين G .

تستخدم مواد كيميائية صناعية مثل السكرين والأسبارتام كبديل عن السكر لدى مرضى السكري ، مآلية عمل تلك المواد في إثارة الإحساس بالطعم الحلو لدى هؤلاء المرضى ؟ ترتبط المادة بمستقبل نوعي في الغشاء مما ينشط البروتين (G) المرتبط بالمستقبل مما يسبب إزالة استقطاب غشاء الخلية الحسية الذوقية ، ويحفز زوال الاستقطاب على تحرير النواقل العصبية الكيميائية وإثارة كيون عمل في بدايات الأعصاب القحفية الذوقية التي ترسلها إلى المركز العصبي المختص .

## ورقة عمل

### أحد عن الأسئلة الآتية :

تناولت الأطعمة الآتية ( ليمون ، قطعة حلوى ، شوكولا داكنة خالية من السكر حفنة من الموالح ) .

صنف المواد السابقة من حيث سرعة استجابة المستقبلات الذوقية لها .

تكون استجابة المستقبلات الحسية للمواد الآتية ( الحموض (ليمون) - شوكولا داكنة خالية من السكر ) أسرع من استجابتها للمواد التي تولد إحساساً بالطعم الحلو (قطعة حلوى) أو الموالح (حفنة من الموالح) .

لماذا تختلف استجابة المستقبلات لهذه الأطعمة وما الأهمية الصحية في ذلك ؟

لأن ذلك يفيد في الحماية ، فالمواد ذات الطعم المر على الأغلب مواد ذات خصائص سمية ، والمواد الحمضية تسبب أذية للخلايا الحسية الذوقية .

### المدرس الرابع ، المستقبلات الصوتية ومستقبلات التوازن



كيف تتولد المنبهات الصوتية؟ وكيف تنتقل؟ وماذا تنبه؟ وما دور الأذن؟ وما مجال نواتر الأصوات المسموعة؟

تتولد المنبهات الصوتية عن تخلخل الضغط في الهواء نتيجة اهتزاز الأجسام وتنتقل عبر الأوساط المادية لتتمكن من تنبيه المستقبلات الصوتية في الأذن التي تشكل عضوا حسيا امتلك تكييفا عاليا لاستقبال تلك المنبهات .

التي تقع ضمن مجال التواترات بين (20 - 20000) هرتز/ثانية "هرتز".

للأذن ثلاثة أقسام ماهي؟ 1- خارجية 2- وسطى 3- داخلية.

مم تتألف الأذن الخارجية؟ 1- الصيوان 2- القناة السمعية الخارجية 3- غشاء الطبل.

مم تتألف الأذن الوسطى؟

1- تجويف في الأعلى يدعى العلية تتوضع فيها عظيمات السمع الثلاث وهي المطرقة والسندان والركاب. عدد عظيمات السمع، وأين تقع: في الأذن الوسطى

2- تجويف في الأسفل يدعى الردهة التي تتصل مع البلعوم عن طريق قناة لحمية تدعى نفير أوستاش. ما دور قناة نفير أوستاش وأين تقع: تصل الردهة مع البلعوم

مم تتألف الأذن الداخلية وأين يسكن التيه الغشائي؟ من تيهها عظيميا يسكن ضمنه تيه غشائي.

يسكن التيه الغشائي: ضمن التيه العظمي

ما المقصود بالتيه العظمي أو مم يتكون التيه العظمي؟ محفظة عظمية مكونة من مجموعة قنوات وأجواف (محفورة في العظم الصدغي).

ما المقصود بالتيه الغشائي أو مم يتكون التيه الغشائي وبماذا يملأ؟ يتكون من قنوات وأجواف غشائية، يملؤها اللmf الداخلي.

ما الذي يفصل بين التيهين الغشائي والعظمي؟ وبأي سائل يملأ؟

يفصل بين التيه العظمي والتيه الغشائي حيز يملؤه اللmf الخارجي.

مم يتألف التيه عظيميا كان أم غشائيا؟ 1- الدهليز الذي يتألف من: القربة والكيس.

2- ثلاث قنوات هلالية متعامدة. 3- القوقعة (الحلزون).

مم يتأكل من اللmf الداخلي والخارجي في الأذن الداخلية؟ ينشأ من ارتشاح مصورة الدم.

ماذا ينتج من ارتشاح مصورة الدم: اللmf الداخلي واللmf الخارجي

حدد المواقع التي يملؤها كل من اللmf الخارجي واللmf الداخلي؟

1- اللmf الخارجي: داخل القناة الطبلية - داخل القناة الدهليزية - في الحيز بين التيه العظمي والتيه الغشائي.

2- اللmf الداخلي: داخل الأمبولات - داخل التيه الغشائي - داخل القناة القوقعية.

ما المقصود بالحلزون (القوقعة)، وبوساطة ماذا يقسم إلى ثلاث قنوات؟ للحلزون شكل مخروط ملتف حول محور عظمي بمقدار دورتين

ولثلاثة أرباع الدورة، يقسم بوساطة رف عظمي وغشائين (القاعدي ورايسنر) إلى ثلاث قنوات.

ألاحظ الشكل الآتي الذي يوضح بنية الحلزون (القوقعة) وأجب:

1- ما القنوات الثلاث في القوقعة؟ القناة الدهليزية - القناة الطبلية - القناة القوقعية.

2- ما السائل الذي يملأ كل منها؟ القناة الدهليزية والقناة الطبلية يملؤها اللmf الخارجي.

3- القناة القوقعية يملؤها اللmf الداخلي.

4- ما القناة التي تقع فوق الرف العظمي وغشاء رايسنر؟ القناة الدهليزية.

5- ما القناة التي تقع تحت الرف العظمي والغشاء القاعدي؟ القناة الطبلية.

6- أين تتوضع القناة القوقعية؟ وما العضو الموجود فيها؟

7- تتوضع بين غشاء رايسنر والغشاء القاعدي. العضو الموجود فيها: عضو كورتي.

8- حدد موقع كل من غشاء رايسنر والغشاء القاعدي؟

9- غشاء رايسنر: بين القناة الدهليزية والقناة القوقعية. الغشاء القاعدي: بين القناة القوقعية والقناة الطبلية.

ألاحظ الشكل الذي يوضح بنية عضو كورتي وأجب:

1- أين يوجد عضو كورتي؟ وما دوره؟ يوجد داخل القناة القوقعية، ويرتبط بالغشاء القاعدي

2- دوره: يعد المستقبل الصوتي داخل القناة القوقعية.

3- مم يتألف عضو كورتي؟ خلايا قضيبيية الشكل تسمى خلايا كورتي تشكل نفق كورتي.

4- ما وظيفة خلايا كورتي (تشكل نفق كورتي)

5- خلايا حسية مهدبة من منشأ غير عصبي تلامس أهدابها غشاء هلامي يسمى الغشاء الساتر أما قواعدها فتشكل مشابك مع الاستطلاات

الهيولية لعصبونات ثنائية القطب توجد أجسامها في العقدة الحلزونية.

6- فسر الخلايا الحسية المهذبة لعضو كورتي مستقبلات لائوية: لأنها من منشأ غير عصبي

7- ما المقصود بالغشاء الساتر: غشاء هلامي يلامس أهداب الخلايا الحسية المهذبة في عضو كورتي

8- حدد موقع الخلايا التي تشكل محاورها ألياف العصب القوقعي: في العقدة الحلزونية (خلايا داعمة).

الاستقبال الصوتي والإحساس السمي

تنتقل الأمواج الصوتية إلى الأذن الداخلية بطرائق عدة ماهي؟ وما أهمها؟

1- عبر نفير أوستاش إلى الأذن الوسطى. 2- عظام الرأس. 3- الطريق الطبيعي والذي يعد الطريق الأهم.

رتب مسار الاهتزازات بدءا من غشاء الطبل وحتى الغشاء القاعدي أو ما مراحل انتقال الأمواج الصوتية في الطريق الطبيعي بالترتيب؟

1- يهتز غشاء الطبل.

2- تنتقل عظيمات السمع الاهتزازات إلى النافذة البيضية.

3- يهتز غشاء النافذة البيضية.

4- يهتز اللmf الخارجي في القناة الدهليزية.

5- يهتز غشاء رايسنر.

6- تنتقل الاهتزازات إلى اللmf الداخلي في القناة القوقعية.

7- اهتزاز الغشاء القاعدي بشكل موجي.

ما دور كل من عظيماات السمع وغشاء رايسنر؟ عظيماات السمع تنقل الاهتزازات الصوتية من غشاء الطبل إلى غشاء النافذة البيضية.  
غشاء رايسنر: ينقل الاهتزازات الصوتية من اللمف الخارجي في القناة الدهليزية إلى اللمف الداخلي في القناة القوقعية.  
ما أهمية اندفاع غشاء النافذة المدورة نحو الأذن الوسطى؟ امتصاص الضغط المتولد على غشاء النافذة البيضية.  
ما آلية عمل الخلية الحسية السمعية؟

يؤدي اهتزاز الغشاء القاعدي إلى: (تبدل العلاقة للمسية بين أهداب الخلايا الحسية والغشاء السائر فتتثنى الأهداب) ماذا ينتج:  
تفتح بوابات قنوات البوتاسيوم وتنتشر شوارد البوتاسيوم إلى الداخل مسببة (ماذا ينتج) زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية وتشكيل كمون المستقبل (ماذا ينتج) يحفز ذلك تحرير النواقل العصبية في المشبك بعد دخول شوارد البوتاسيوم (ماذا ينتج) مما يؤدي إلى نشوء كمونات عمل في ألياف العصب القوقعي الذي ينقلها على شكل سيالات عصبية إلى مركز السمع في القشرة المخية.  
فسر زوال استقطاب غشاء الخلية الحسية السمعية، وتشكيل كمون المستقبل: لأن عند تبدل العلاقة للمسية بين أهداب الخلايا الحسية والغشاء السائر تنثنى الأهداب فتفتح بوابات قنوات البوتاسيوم وتنتشر شوارد البوتاسيوم إلى الداخل  
حدد موقع تشكل كمون العمل في الخلية الحسية السمعية: في ألياف العصب القوقعي مادوره: ينقل كمون العمل على شكل سيالة عصبية إلى مركز السمع في القشرة المخية

فسر تشكل كمون عمل في ألياف العصب القوقعي: بسبب تحرير النواقل العصبية في المشبك

كيف يكون تراكيز شوارد الصوديوم والبوتاسيوم في كل من اللمف الداخلي والخارجي؟ وماذا يسبب؟

اللمف الداخلي: يحوي تراكيز مرتفعة من شوارد البوتاسيوم وتراكيز منخفضة من شوارد الصوديوم.

اللمف الخارجي: يحوي تراكيز منخفضة من شوارد البوتاسيوم وتراكيز مرتفعة من شوارد الصوديوم.

وهذا ما يسبب انتشار شوارد البوتاسيوم إلى الداخل لدى فتح قنواتها في أهداب الخلية الحسية السمعية.

فسر انتشار شوارد البوتاسيوم إلى الداخل لدى فتح قنواتها في أهداب الخلية الحسية السمعية: لأن اللمف الداخلي يحوي تراكيز مرتفعة من شوارد البوتاسيوم، وتراكيز منخفضة من شوارد الصوديوم بخلاف اللمف الخارجي

حدد موقع قنوات شوارد البوتاسيوم في الخلية الحسية السمعية: في أهدابها

أدرس الشكل الذي يوضح الأقسام الوظيفية للاستقبال الصوتي في الأذن، وأجب عن الأسئلة:



١- سمّ البنى الموضحة بالأرقام من ١ إلى ١٠: ١ غشاء الطبل ٢ المطرقة ٣ السندان ٤ الركاب ٥ غشاء النافذة البيضية ٦ القناة الدهليزية ٧ القناة القوقعية ٨ القناة الطبلية ٩ الكوة القوقعية ١٠ النافذة المدورة.

٢- أكمل الفراغات بما يناسبها من عبارات صحيحة:

قاعدة الحلزون حساسة للتوترات (المرتفعة أو العالية) والمنطقة القريبة من ذروته حساسة للتوترات (المنخفضة) بينما تتوزع الحساسية للتوترات الوسطية بين (القاعدة) والمنطقة (القريبة من الذروة).

تتصل القناة الدهليزية بالنافذة (البيضية) وتتصل القناة الطبلية بالنافذة (المدورة) عند قاعدة الحلزون بينما تتصل القناة الدهليزية بالقناة الطبلية عبر (الكوة القوقعية) الموجودة عند ذروة الحلزون.

ما وظيفة كل من قاعدة الحلزون (حساسة للتوترات العالية) والمنطقة القريبة من ذروة الحلزون: (حساسة للتوترات المنخفضة) المسافة ما بين قاعدة الحلزون والمنطقة القريبة من ذروته: (حساسة للتوترات الوسطية) الكوة القوقعية: (تصل القناة الدهليزية بالقناة الطبلية)

حدد موقع: الحساسية للتوترات العالية (في قاعدة الحلزون) الحساسية للتوترات المنخفضة (في المنطقة القريبة من ذروة الحلزون)

الحساسية للتوترات الوسطية (بين قاعدة الحلزون والمنطقة القريبة من ذروته) اتصال القناة الطبلية بالنافذة المدورة: (عند قاعدة الحلزون)

رتب مناطق الحلزون حسب حساسيتها لتوترات الاهتزازات الصوتية من الأعلى إلى الأدنى؟

١- قاعدة الحلزون حساسة للتوترات العالية. ٢- حساسية التوترات الوسطية تتوزع على المسافة بين المنطقة القريبة من الذروة والقاعدة.

٣- المنطقة القريبة من الذروة حساسة للتوترات المنخفضة

ماذا تسبب الأصوات مرتفعة الشدة؟ تسبب أذيات متفاوتة الخطورة في الأذن الداخلية.

يوجد في الأذن الوسطى عضلتان صغيرتان ما هما؟ وبماذا يرتبط كل منهما؟

العضلة الشادة الطبلية التي ترتبط بالمطرقة. العضلة الشادة الركابية التي تتصل بالركاب.

ما وظيفة العضلتان الشادتان الطبلية والركابية معا، وكل منهما على حدا؟ معا: حماية الأذن الداخلية من الأصوات عالية الشدة.

العضلة الشادة الطبلية: تسحب المطرقة نحو الداخل. العضلة الشادة الركابية: تسحب الصفيحة الركابية نحو الخارج.

ما آلية عمل العضلتان الشادتان الطبلية والركابية لحماية الأذن الداخلية من الأصوات عالية الشدة؟

- 1- تقلص العضلة الشادة الطبلية ( ماذا ينتج ) فتسحب المطرقة نحو الداخل مما يؤدي إلى شد غشاء الطبل فتتخفف قدرته على الاهتزاز. 2- وفي الوقت ذاته تقلص العضلة الشادة الركابية ( ماذا ينتج ) فتسحب الصفيحة الركابية نحو الخارج مما يؤدي إلى تخفيف حركة الركاب على غشاء النافذة البيضية. 3- نتيجة تقلص العضلتين معا ( ماذا ينتج ) تتقارب سلسلة عظيماات السمع مما يخفف من قدرتها على نقل الاهتزازات من غشاء الطبل إلى غشاء النافذة البيضية.

## مستقبلات التوازن

- لماذا يقوم الجسم بفعاليات عضلية متناسقة في أثناء الحركات الدورانية المختلفة؟ نتيجة تنبه مستقبلات التوازن الموجودة في القنوات الهلالية ما سبب إحساسنا بحركة المصعد نحو الأعلى أو الأسفل؟ أو انطلاق السيارة بنا؟ أو تغيير مسار طريقها؟
- نتيجة تنبه مستقبلات التوازن الحركي والساكن في القربة والكيبس من يزود الجسم بإحساس التوازن الساكن والحركي؟ مستقبلات التوازن في القربة والكيبس.
- تتجمع الخلايا الحسية المهدبة في القربة والكيبس ضمن بنى بيضوية ماهي؟ اللطخات.
- ما دور اللطخة الموجودة في القربة؟ حساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الأفقية.
- ما دور اللطخة الموجودة في الكيبس؟ حساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الشاقولية.
- من يستجيب إلى الحركات الدورانية للرأس؟ مستقبلات التوازن الموجودة في الأمبولة.
- اشرح آلية عمل مستقبلات التوازن الموجودة في الأمبولة عند الحركة الدورانية للرأس؟
- تنبه الخلايا الحسية المهدبة في الأمبولات نتيجة حركة اللف الداخلي فيها بينما تصبح غير نشطة عندما يكون الجسم ساكنا وتنتقل السيالات العصبية الناتجة عن تنبيه مستقبلات التوازن عبر العصب الدهليزي إلى مراكز التوازن في الدماغ.
- ماذا ينتج من حركة اللف الداخلي في الأمبولات؟ تنبه الخلايا الحسية المهدبة في الأمبولات فتستجيب مستقبلات التوازن الموجودة في الأمبولة ووظيفة العصب الدهليزي: ينقل السيالة العصبية الناتجة عن تنبيه مستقبلات التوازن إلى مراكز التوازن في الدماغ
- حدد موقع كل من:

الخلايا الحساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الأفقية للجسم ( في اللطخة الموجودة في القربة )

الخلايا الحساسة للتغيرات الناتجة عن الحركة الشاقولية للجسم ( في اللطخة الموجودة في الكيبس )

مستقبلات التوازن التي تستجيب للحركات الدورانية للرأس: ( في القنوات الهلالية )

الخلايا الحسية المهدبة في القربة والكيبس ( في اللطخات ) ( في القربة والكيبس )

الخلايا الحسية المهدبة في القنوات الهلالية ( في الأمبولات )

عدد أنواع الصمم أو ما الأمراض التي تصيب الأذن وما أسبابها؟

- 1- الصمم التوصيلي: يظهر لدى بعض الأفراد لاسيما كبار السن درجات من فقدان السمع ( أسبابه ) نتيجة تناقص في مرونة غشاء الطبل أو المفاصل بين عظيماات السمع، أو غشاء النافذة البيضية.

ماذا ينتج من تناقص في مرونة غشاء الطبل أو المفاصل بين عظيماات السمع، أو غشاء النافذة البيضية: صمم توصيلي

- 2- الصمم العصبي: ينتج عن أذيات ضمن المستقبل الصوتي في الحلزون أو في العصب القوعي أو المراكز العصبية.
- عندما تتحرك السيارة انطلاقا من موقفها يتولد لدي إحساس بالسرعة المتزايدة نتيجة لتنبه المستقبلات الحسية في: القربة.


يزول الاستقطاب في الخلية الحسية السمعية بسبب: دخول  $K^+$ .

قارن بين القناة الطبلية والقناة الدهليزية من حيث النافذة التي تصل كلا منهما مع الأذن الوسطى؟

القناة الطبلية: النافذة المدورة. القناة الدهليزية: النافذة البيضية.

## الدرس الخامس: المستقبلات الضوئية 1

- العين: بنية معقدة تحتوي على ( المستقبلات الضوئية ) التي تسهم في توليد إحساس بصري يعتمد عليه أكثر من أي إحساس آخر في تكوين المعلومات وتذكرها، فهي تمكننا من التمييز بين الضوء والظلام من حولنا، وتكوين صورة مرئية تفصيلية عن أبعادها وألوانها وأشكالها. ( أين توجد المستقبلات الضوئية، وما دورها )



أرتب طبقات جدار كرة العين من الخارج إلى الداخل ؟  
 أرتب الأوساط الشفافة من الأمام إلى الخلف ؟  
 القرنية الشفافة • الخلط المائي • العدسة ( الجسم البلوري ) • الخلط الزجاجي •  
 بنية جدار كرة العين :  
 أولاً : الصلبة

ما المقصود بالصلبة ؟ الطبقة الخارجية المقاومة إذ تتحذب قليلا من الأمام وتشف وتصبح خالية من الأوعية الدموية مشكلة القرنية الشفافة.  
 حدد موقع الصلبة : الطبقة الخارجية في جدار كرة العين ، **ما دورها** : الطبقة الخارجية في جدار كرة العين المقاومة ، **كيف تشكل القرنية الشفافة** : تتحذب قليلا من الأمام وتشف وتصبح خالية من الأوعية الدموية مشكلة القرنية الشفافة ( مم تتكون المشيمية ؟ وماذا يشكل قسمها الأمامي ؟ الطبقة الوسطى تتكون من نسيج ضام يحوي خلايا صباغية وغني بالأوعية الدموية تغذي الخلايا البصرية ، يشكل قسمها الأمامي القزحية والجسم الهدبي .  
 حدد موقع المشيمية : الطبقة الوسطى في جدار كرة العين بين الصلبة والشبكية ، **ما دورها** : تغذي الخلايا البصرية ( العصي والمخاريط ) **فسر** : لأنها غنية بالأوعية الدموية )

ما نوع الألياف في القزحية والجسم الهدبي ، وهل يخضع عملها لإرادة الإنسان ؟ وما الجهاز العصبي الذي تخضع لتأثيره ؟  
 تحوي أليافا عضلية ملساء ( دائرية ) و ( شعاعية ) . عملها لا إرادي . ( فسر ) يخضع لتأثير الجهاز العصبي الإعاشي .  
 حدد موقع القزحية والجسم الهدبي : في القسم الأمامي من المشيمية )  
 ما الألياف العضلية التي تنقل في القزحية بالتأثير الودي ؟ وما تأثير ذلك على فتحة الحدقة في منتصف القزحية ؟  
 الشعاعية . تأثير ذلك على فتحة الحدقة : تتوسع الحدقة .

نميز في الشبكية وريقتين رئيسيتين ما هما ؟ الوريقة الخارجية الصباغية . الوريقة الداخلية العصبية .  
 تخزن الوريقة الصباغية الخارجية كميات كبيرة من فيتامين A ما دوره ؟ ضروري لتركيب الأصبغة البصرية .  
 حدد موقع اختزان فيتامين A في العين : في الوريقة الصباغية الخارجية من الشبكية  
 تحوي الوريقة الخارجية الصباغية في الشبكية صباغ الميلانين ما دوره ؟

يمتص الفائض من الأشعة الضوئية التي تجتاز الخلايا البصرية ويمنع انعكاسها مما يسهم في وضوح الرؤية .  
 حدد موقع صباغ الميلانين : في الوريقة الصباغية الخارجية من الشبكية ، **فسر** يسهم صباغ الميلانين في وضوح الرؤية : لأنه يمتص الفائض من الأشعة الضوئية التي تجتاز الخلايا البصرية ويمنع انعكاسها مما يسهم في وضوح الرؤية .

تتألف الوريقة العصبية الداخلية للشبكية من ثلاث طبقات خلوية ومن طبقتين من المشابك ترتبها من الخارج إلى الداخل ؟  
 الطبقة الخارجية : ( ماذا تحتوي ) على الخلايا البصرية العصبي والمخاريط ، وهي عصبونات ثنائية القطب .  
 أين توجد الخلايا البصرية العصبي والمخاريط : في الطبقة الخارجية من الوريقة الداخلية العصبية من الشبكية ، وما نوعها من حيث الشكل : عصبونات ثنائية القطب )

طبقة المشابك العصبية الخارجية . ( أين تقع : بين الطبقة الخارجية والطبقة الوسطى للوريقة الداخلية العصبية للشبكية )  
 الطبقة الوسطى : ( ماذا تحوي ) تحوي أنماطا خلوية عدة : عصبونات ثنائية القطب ، خلايا أفقية ، خلايا مقترنية .  
 حدد موقع كل من الخلايا الأفقية و الخلايا المقترنية : في الطبقة الوسطى من الوريقة الداخلية العصبية من الشبكية )

طبقة المشابك العصبية الداخلية . ( أين تقع : بين الطبقة الوسطى والطبقة الداخلية للوريقة الداخلية العصبية للشبكية )  
 الطبقة الداخلية : ( ماذا تحوي ) تحوي عصبونات عقدية متعددة الأقطاب تشكل محاورها ألياف العصب البصري .  
 أين تقع العصبونات العقدية وما دورها : تقع في الطبقة الداخلية من الوريقة الداخلية العصبية من الشبكية ، **دورها** : تشكل محاورها ألياف العصب البصري )

ما أهمية الخلايا الأفقية والمقترنية الموجودتان في الطبقة الوسطى من الوريقة الداخلية العصبية من الشبكية ؟

الخلايا الأفقية : تؤمن اتصالات شبكية أفقية بين الخلايا البصرية والعصبونات ثنائية القطب في طبقة المشابك الخارجية .  
 الخلايا المقترنية : تساعد في تكامل السيالات العصبية البصرية الواردة من الخلايا البصرية إلى الخلايا العقدية قبل أن تغادر الشبكية إلى الفص القفوي للمخ .  
 أنعم النظر في الشكل الآتي ، وأقارن بين نوعي الخلايا البصرية من حيث البنية :



- الخلايا البصرية العصي والمخاريط كلاهما يتألف من أربع مكونات مرتبة من الخارج إلى الداخل :
- 1- القطعة الخارجية : ( ماذا تحتوي ) تحتوي على أقرص توجد في أغشيتها الأصبغة البصرية ( الرودوبسين ) .
  - 2- القطعة الداخلية : ( ماذا تحتوي ) تحتوي على جسيمات كوندرية تؤمن الطاقة اللازمة لعمل الخلية البصرية.
  - 3- النواة .
  - 4- الجسم المشبي : ( ما دوره ) يؤمن الاتصال المشبي بين الخلية البصرية والعصبونات ثنائية القطب.
- ما نوعا الخلايا البصرية ؟ العصي والمخاريط.
- ما الصباغ الموجود في العصي ؟ وما دوره ؟ وما يتألف ؟ صباغ الرودوبسين . حساس للضوء الضعيف . يتألف من : أ- الريتينال ( جذر الدهيد الفيتامين A ) . ب- السكوتوبسين ( جذر بروتيني )
- فسر : العصي مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة الضعيفة ؟ لأن صباغ الرودوبسين يتفكك في الضوء الضعيف فيصبح فعالا .
- فسر : تعجز العصي عن تمييز الألوان ؟ لأنها تحتوي على صباغ الرودوبسين فقط فهي متساوية الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة .
- ما عدد الأصبغة التي تحويها المخاريط ؟ وما دورها ؟ ومم يتألف كل منها ؟
- تحوي ثلاثة أنماط من المخاريط لكل منها نوع من الأصبغة . حساسة للضوء القوي . يتألف كل منها من : 1- الريتينال ( جذر الدهيد الفيتامين A ) . 2- الفوتوبسين ( جذر بروتيني ) .
- فسر المخاريط مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة القوية ؟ لأن أصبغتها تتفكك بالضوء القوي فتصبح فعالة .
- المخاريط قادرة على تمييز الألوان ؟ لأن أنواع أصبغة المخاريط الثلاثة مختلفة الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة .
- تعد الخلايا البصرية ( العصي والمخاريط ) مستقبلات أولية ؟ لأنها من منشأ عصبي .
- كيف تتوزع الخلايا البصرية ( العصي والمخاريط ) في الشبكية ؟
- التوزع غير متجانس للخلايا البصرية ( العصي والمخاريط ) في الشبكية ( ماذا ينتج ) مما يؤدي إلى اختلاف حدة الإبصار في مناطق الشبكية المختلفة .
- فسر اختلاف حدة الإبصار في مناطق الشبكية المختلفة . لأن الخلايا البصرية تتوزع بشكل غير متجانس في الشبكية توجد في الشبكية مناطق مميزة من حيث بنيتها ودورها ما هي ؟
- 1- اللطخة الصفراء : ( الموقع : باحة على الشبكية مقابل فتحة العين ) ، تكثر فيها المخاريط ، وتقل العصي .
  - 2- الحفيرة المركزية ( النقرة ) : ( الموقع : منخفض صغير في مركز اللطخة الصفراء ) ، تحوي مخاريط فقط ، تكون فيها حدة الإبصار عالية .
- فسر حدة الإبصار العالية في الحفيرة المركزية ( النقرة ) : لأنها تحوي مخاريط فقط ، وكل مخروط يتقابل مع ليف عصبي واحد من ألياف العصب البصري .
- 3- الشبكية المحيطية : منطقة على الشبكية تفرز فيها العصي وتقل المخاريط .
  - 4- الشبكية الأكثر محيطية : منطقة على الشبكية تحوي عصيا فقط ، لذا تكون فيها حدة الإبصار منخفضة .
- فسر حدة الإبصار المنخفضة في الشبكية الأكثر محيطية .
- لأنها تحوي عصيا فقط ، وكل ( 200 ) عصبية تتقابل مع ليف عصبي واحد من ألياف العصب البصري (
- النقطة العمياء : ( الموقع : منطقة خروج ألياف العصب البصري ) ، خالية من العصي والمخاريط ، لذا تكون غير حساسة للضوء .
- فسر ينعدم الإبصار في منطقة النقطة العمياء : لخلوها من العصي والمخاريط (
- قارن بين المناطق الموجودة على الشبكية من حيث توزع الخلايا البصرية وعدد الخلايا البصرية التي تقابل ليفا بصريا واحدا ؟
- | المناطق على الشبكية        | الخلايا العصبية                  | عدد الخلايا العصبية التي تقابل ليفا بصريا واحدا          |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| العمرة المركزية ( النقرة ) | مخروط فقط                        | تقابل كل مخروط مع ليف واحد                               |
| الطخة الصفراء              | تفرز المخاريط وتقل العصي         | الليف من عصب ومخروط تقابل ليف واحد من ألياف العصب البصري |
| الشبكية المحيطية           | تفرز العصي وتقل المخاريط         | الليف من عصب ومخروط تقابل ليف واحد من ألياف العصب البصري |
| المنطقة الأكثر محيطية      | عصب فقط خالية من العصي والمخاريط | تقابل كل 200 عصبية مع ليف واحد لا يوجد                   |
- قارن بين أصبغة العصي وأصبغة المخاريط من حيث : الجذر البروتيني ؟
- الجذر البروتيني في أصبغة العصي هو السكوتوبسين . الجذر البروتيني في أصبغة المخاريط هو الفوتوبسين .
- قارن بين العصي والمخاريط من حيث :
- شكل القطعة الخارجية : العصي ( عصوي ) المخاريط ( مخروطي )
  - الوظيفة : العصي ( مسؤولة عن الرؤية في الإضاءة الضعيفة ) المخاريط ( مسؤولة عن الرؤية في الإضاءة القوية )
  - نوع الصباغ : العصي ( صباغ الرودوبسين ) المخاريط ( ثلاثة أنواع من الأصبغة الحساسة للضوء القوي ) .
  - تركيب الصباغ : العصي ( ريتينال وسكوتوبسين ) المخاريط ( ريتينال وفوتوبسين )
  - شروط تفكك الصباغ : العصي ( في الإضاءة الضعيفة ) المخاريط ( في الإضاءة القوية )

مكان انعدامها في الشبكية : العصي ( في الحفيرة المركزية والنقطة العمياء ) المخاريط ( في الشبكية الأخرى )  
 قارن بين الحفيرة المركزية و الشبكية الأكثر محيطية من حيث ؟  
 حدة الإبصار : الحفيرة المركزية ( عالية ) الشبكية الأكثر محيطية ( منخفضة ) .  
 "خلايا البصرة في كل منهما : الحفيرة المركزية ( مخاريط فقط ) الشبكية الأكثر محيطية ( عصي فقط ) ."

## الدرس السادس : المستقبلات الضوئية 2

ماذا لو خلت الخلايا البصرية ( العصي والمخاريط ) من الأصبغة ؟ تنعدم قدرتها على الاستقبال الضوئي .  
 فسر تكيفت الخلايا البصرية لاستقبال المنبهات الضوئية ؟ لأن المنبهات الضوئية تفكك الأصبغة البصرية فيها .  
 رتب آلية عمل العصية في حالة الظلام (الراحة) ؟ تكون بوابات قنوات الصوديوم مفتوحة ( فسر ) بسبب ارتباط مركب cGMP بها .  
 تدخل شوارد الصوديوم إلى القطعة الخارجية للعصية عن طريق قنواتها المبهوية ، وتخرج شوارد الصوديوم من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم .

يكون استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعصية (-mv40) وليس (-mv 70) كما هو الحال في المستقبلات الأخرى .  
 تحرر الناقل العصبي (غلوتامات) المثبطة للعصبون لثاني القطب . يصبح العصبون العقدي في حالة راحة .  
 لماذا تكون قنوات الصوديوم مفتوحة في غشاء القطعة الخارجية للعصية في أثناء الظلام؟ بسبب ارتباط مركب cGMP بها .  
 ما قيمة الاستقطاب في غشاء القطعة الخارجية للعصية في الظلام؟ ولماذا؟  
 قيمة الاستقطاب في غشاء القطعة الخارجية للعصية في الظلام هو (-mv40)

لماذا : لأن شوارد الصوديوم التي تخرج من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم تدخل إلى القطعة الخارجية عبر قنواتها  
 ما سبب أو فسر تثبيط النقل في العصبون لثاني القطب في حالة الراحة ؟ تحرير الناقل العصبي المثبط  
 ما تأثير الناقل العصبي الغلوتامات على العصبونات ثنائية القطب أثناء الظلام : يثبط العصبونات ثنائية القطب  
 رتب آلية عمل العصية في حالة (الضوء الضعيف) ؟

عند سقوط الضوء الضعيف على العصية ( ماذا ينتج ) يصبح صباغ الرودوبسين فعالاً . ( ماذا ينتج ) :

فينشط مركب ترانسديوسين ( ماذا ينتج ) الذي ينشط أنظيم فوسفودي استيراز ( ما دوره ) الذي يحول المركب cGMP إلى GMP فتغلق بوابات قنوات الصوديوم .

فيتوقف دخول الصوديوم إلى القطعة الخارجية ويستمر خروج الصوديوم من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم .  
 ماذا ينتج من غلق بوابات قنوات الصوديوم : يتوقف دخول الصوديوم إلى القطعة الخارجية ويستمر خروج الصوديوم من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم ( ماذا ينتج ) :

يحدث فرط استقطاب في غشاء القطعة الخارجية للعصية إذ يصبح (-70mv) ماذا ينتج :

يتوقف تحرير الناقل العصبي المثبط ( غلوتامات ) .

يؤدي توقف تحرير الناقل العصبي المثبط ( ماذا ينتج ) إلى توليد حالة تثبيبه في العصبونات ثنائية القطب ، تثير كمون عمل في العصبونات العقدية الذي ينتقل على شكل سيالة عصبية عبر ألياف العصب البصري إلى مركز الإبصار في القشرة المخية .

ما وظيفة ألياف العصب البصري : ينقل كمون العمل على شكل سيالة عصبية إلى مركز الإبصار في القشرة المخية / حدد موقع كمون العمل في حالة الضوء الضعيف : في العصبونات العقدية (

لماذا تغلق قنوات الصوديوم في غشاء القطعة الخارجية للعصية في الضوء الضعيف ؟

لأنه في حالة الضوء الضعيف يصبح صباغ الرودوبسين فعالاً فينشط مركب ترانسديوسين الذي ينشط أنظيم فوسفودي استيراز الذي يحول المركب (cGMP) إلى ( GMP ) فتغلق بوابات قنوات الصوديوم .


متى ينشط مركب ترانسديوسين؟ وما دور أنظيم فوسفودي استيراز ؟ ينشط : عندما يُفكّل الرودوبسين بالضوء الضعيف .  
 دور أنظيم فوسفودي استيراز : تحويل المركب cGMP إلى GMP .

ما سبب فرط استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعصية في الضوء الضعيف ؟

بسبب توقف دخول شوارد الصوديوم إلى القطعة الخارجية للعصية واستمرار خروجها من القطعة الداخلية بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم .  
 فسر تختلف آلية عمل المستقبلات الضوئية عن آلية عمل باقي المستقبلات ؟

لأن كمون المستقبل الذي يتشكل في الخلايا البصرية ينتج عن فرط الاستقطاب وليس عن زوال الاستقطاب كبقية المستقبلات الحسية .  
 أدرس المخطط الآتي يوضح العلاقة بين طول الموجة الضوئية والنسبة المئوية لامتصاصها من قبل أنواع المخاريط والشكل المجاور له ،

ثم أكمل الجدول :



النوع	النسبة المئوية للامتصاص		
	مخاريط الأزرق	مخاريط الأخضر	مخاريط الأحمر
بنفسج	97	0	0
أخضر	35	67	41
أصفر	0	63	83
برتقالي	0	42	99



في شبكية العين ثلاثة أنواع من المخاريط ، بماذا تختلف أصبغتها عن بعضها ؟  
تختلف أصبغتها عن بعضها بنوع الفوتوبسين ( ماذا ينتج ) ، مما يسبب اختلاف حساسيتها لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.  
فسر تختلف حساسية أنواع المخاريط لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة : لوجود ثلاثة أنواع من المخاريط تختلف أصبغتها عن بعضها بنوع الفوتوبسين .

كيف يتم الإحساس برؤية لون معين في القشرة المخية ؟  
بعد وصول السيالات العصبية الناتجة عن تنبيه نوع واحد من المخاريط أو نوعين منها أو أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متفاوتة .  
ماذا ينتج من تنبيه نوع واحد من المخاريط أو نوعين منها أو أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متفاوتة : يتم الإحساس برؤية لون معين ( ما اللون الذي يتولد عن تنبيه أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية ؟ اللون الأبيض .  
كيف يتولد الإحساس برؤية اللون الأبيض : عند تنبيه المخاريط الثلاثة بنسب متساوية )  
عدد عيوب الرؤية اللونية ؟


1- عمى اللون الأحمر ( مرض دالتون ) وعمى اللون الأخضر : يصيب الذكور أكثر من الإناث ( فسر ) لأن مورثة المرض متنحية محمولة على الصبغي الجنسي ( X ) وليس لها مقابل على الصبغي ( Y ) .  
حدد موقع مورثة عمى اللون الأحمر وعمى اللون الأخضر : محمولة على الصبغي الجنسي ( X ) وليس لها مقابل على الصبغي ( Y ) .  
2- مرض ضعف الأزرق : حالة وراثية نادرة ناتجة عن مورثة متنحية على أحد الصبغيات الجسمية .  
حدد موقع مورثة مرض ضعف الأزرق : على أحد الصبغيات الجسمية )  
ما صفات خيال الجسم المرئي على الشبكية ؟ وكيف يدرك الدماغ ذلك ؟ وما دور عدسة العين ؟  
يتشكل على الشبكية خيال مقلوب مصغر عن الصورة الأساسية للجسم المرئي ، وبما أن عدسة العين مُحذبة الوجهين فإن القوة الكاسرة لها تجعل خيال الصورة مقلوبا رأسا على عقب ومعكوسا من اليسار إلى اليمين .  
فسر يتشكل للجسم المرئي خيال مقلوب ومعكوس على الشبكية : لأن الجسم البلوري عدسة محدبة الوجهين  
فسر تقوم عدسة العين بالدور الرئيس في مطابقة الخيال على الشبكية : إذ يتغير تحدبها، وبالتالي قوة كسرها للضوء عندما يقترب الجسم المرئي من العين أو يبتعد عنها.

رتب التبدلات التي تطرأ على العين عندما تصبح مسافة الجسم المرئي أقل من (6) متر من العين حتى نقطة الكذب ؟  
عند اقتراب الجسم من العين ماذا ينتج : 1- تنقلص الألياف الدائرية في العضلة الهدبية  
2- ينقص توتر الأربطة المعلقة 3- يزداد تحدب العدسة 4- تزداد القوة الكاسرة للعدسة  
رتب التبدلات التي تطرأ على العين عندما تصبح مسافة الجسم المرئي أكثر من (6) متر من العين ؟  
عند ابتعاد الجسم من العين ماذا ينتج : 1- تسترخي الألياف الدائرية في العضلة الهدبية 2- يزداد توتر الأربطة المعلقة  
3- يقل تحدب العدسة 4- تنقص القوة الكاسرة للعدسة 5- يكبر البعد المحرق.

ما المقصود بالبعد المحرق ؟ المسافة بين مركز العدسة ونقطة تجمع الأشعة المنكسرة ( المحرق )  
أين يتوضع الخيال بالنسبة للشبكية في حالة اللابؤرية ؟ وكيف يتم التصحيح ؟  
يتوضع : جزء من الخيال على الشبكية وجزء أمام الشبكية وجزء خلف الشبكية  
ويتم تصحيح الرؤية : باستخدام عدسات طبية اسطوانية أو بمعالجة القرنية المصابة بالليزك .  
ماذا أسمي مجموع النقاط المرئية في كل عين ؟ الحقل البصري أو المجال البصري .  
ما أهمية انطباع الحقلين البصريين على منطقتين متناظرتين من الشبكيتين ؟  
يؤمن الرؤية المجسمة .

ما دور المخ في رؤية صورة واحدة للخيالين المنطبعين على الشبكيتين ؟ يقوم المخ بدمج الخيالين معا .  
ما المقصود بالمجال ( الحقل ) البصري ؟  
مجموع النقاط التي يمكن رؤيتها بعين واحدة ثابتة في لحظة زمنية ، ويشكل مخروطا في الفراغ ذروته عند العين ، وقاعدته بعيدا عنها.  
ما المقصود بالرؤية المجسمة ؟ يتشكل للجسم الواحد خيالن على منطقتين متناظرتين من الشبكيتين ، يصلان عبر المسالك البصرية إلى المخ ، الذي يقوم بدمجهما معا ، مما يؤمن رؤية صورة واحدة للجسم بأبعاده الثلاثة.

ما سبب إصابة عدد كبير من المسنين بمرض الساد ( الماء الأبيض ) ؟ وكيف يعالج أو ما المقصود بمرض الساد ؟- تصبح عدسة العين مُعتمة ( فسر ) نتيجة لتخثر الألياف البروتينية في العدسة - وتصيب هذه الحالة عددا كبيرا من المسنين وتعالج باستئصال العدسة وزرع عدسة صناعية .  
ماذا ينتج من تخثر الألياف البروتينية ضمن الجسم البلوري : مرض الساد  
ما سبب الإصابة بمرض اعتلال الشبكية السكري وماذا يسبب ؟ وكيف تعالج أو ما المقصود به ؟  
تنمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط ، لتمتد إلى المسافة بين وريقتها، ويتسرب الدم منها .  
مم يسبب تضرر الخلايا البصرية ، وتناقصا تدريجيا في حدة الرؤية.



متى يدعى الهرمون  
بالألبومينات والفا  
أين توجد في  
الجسم مثل  
أين تقع  
تقع  
وم  
ما

- تعالج الحالة بالليزر، (فسر) لسد تلك الأوعية الدموية وإيقاف تدفق الدم منها.
- ماذا ينتج من نمو الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية بشكل مفرط، لتمتد إلى المسافة بين وريقتيها، وتسرب الدم منها: اعتلال الشبكية السكرية.
- ما سبب انفصال الشبكية؟ وماذا يسبب؟ وكيف يعالج أو ما المقصود به؟
- السبب: فقدان ارتباط وريقتي الشبكية ببعضهما (فسر) نتيجة الرض القوي المفاجئ أو نقص كمية الخلط الزجاجي - مما يسبب العمى وفي هذه الحالة لابد من إعادة الارتباط بسرعة ويمكن ذلك بواسطة الإشعاعات لليزرية.
- ماذا ينتج من فقدان ارتباط وريقتي الشبكية ببعضهما أو الرض القوي المفاجئ أو نقص كمية الخلط الزجاجي: انفصال الشبكية

## الفصل الثالث: الدرس الأول

### الدرس الأول: التنسيق الهرموني الحائي عند الإنسان

- كيف تتواصل خلايا الكائن الحي مع بعضها؟
- عن طريق إشارات (رسائل) كيميائية، ترسل من بعضها لترتبط مع مستقبلات بروتينية في الخلايا الهدف التي تستجيب بطريقة نوعية وبمبرجة.
- ما طرائق الإشارات بين خلوية؟
- إشارة صماوية (عرف أو فسر تعد هرمونات (الغدة الدرقية) إشارة صماوية: تنتقل الجزيئات المرسله عن طريق الدم واللمف إلى الخلايا الهدف (هرمونات الغدة الدرقية).
- إشارة نظير صماوية (عرف أو فسر يعد هرمون الانسولين والغلوكاغون إشارة نظير صماوية): تؤثر الجزيئات المرسله في الخلايا القريبة جداً من مصدر الإشارة (هرمون الانسولين والغلوكاغون).
- إشارة مشبكية (عرف أو فسر يعد الناقل العصبي (الاستيل كولين) إشارة مشبكية): تؤثر النواقل العصبية في الخلايا المجاورة من خلال مشابك لتحفز استجابات في الخلايا الهدف (عصبونات - عضلات - غدد) كالاستيل كولين.
- إشارة ذاتية (عرف أو فسر يعد هرمون الأستروجين إشارة ذاتية): ترتبط الرسائل المفرزة من الخلية مع مستقبلات على الخلية ذاتها أو خلايا من النوع ذاته لتحفز استجابة بها مثل (الأستروجين).
- إشارة عصبية صماوية (عرف أو فسر يعد الناقل العصبي الأوكسيتوسين - ADH إشارة عصبية صماوية): تنتشر الهرمونات العصبية إلى مجرى الدم وتحفز استجابات في الخلايا الهدف في أي مكان من الجسم (الأوكسيتوسين - ADH).
- إشارات فيرمونية (فيرمونات): مواد كيميائية تفرز من كائن وتنتقل بواسطة البيئة لتؤثر في كائن آخر.
- ما العلاقة بين الجهاز العصبي والغدد الصم؟
- تتشارك الغدد الصم مع الجهاز العصبي في التحكم بوظائف الجسم المختلفة والمحافظة على الاستتباب مع وجود فروق بين عمل كل منها.
- ما أنواع التنسيق؟ تنسيق عصبي، تنسيق هرموني.
- قارن بين التنسيق العصبي والتنسيق الهرموني من حيث السرعة ومدة التأثير والإشارة (الرسالة)؟

وجه المقارنة	التنسيق العصبي	التنسيق الهرموني
السرعة ومدة التأثير	سريع قصير الأمد	بطيء وطويل الأمد
الإشارة	نواقل كيميائية محددة تشكل رسائل عصبية	مواد كيميائية (هرمونات) تنتقل عن طريق الدم واللمف

- بماذا يتشارك الجهازان العصبي والهرموني؟ يتشارك الجهازان العصبي والهرموني في العديد من الرسائل الكيميائية فالأدرينالين والنورأدرينالين يعدان من الهرمونات عندما يتم تحريرهما إلى مجرى الدم ويعدان من النواقل عصبية عندما يتم تحريرهما في المشابك.
- فسر الأدرينالين والنورأدرينالين يعدان من النواقل عصبية ومن الهرمونات: يعدان هرمونات عندما يتم تحريرهما إلى مجرى الدم ويعدان نواقل عصبية عندما يتم تحريرهما في المشابك.
- عدد أنواع الغدد في الجسم؟
- غدد خارجية الإفراز (الغدة العرقية) - غدد داخلية الإفراز أو الغدد الصم (الدرقية) - غدة مختلطة (البنكرياس).
- ما المقصود أو ما وظيفة الغدد الصم؟ تقوم بإفراز الهرمونات (الإشارات الصماوية) وتلقي بها في الدم مباشرة.
- كيف تنتقل الهرمونات من الغدد الصم إلى الأتسجة الهدف؟
- الهرمونات المنحلة في الماء تنتقل منحلّة في المصورة. الهرمونات المنحلّة في الدم.
- يرتبط 90% من الهرمونات مع بروتينات بلازما الدم كالألبومينات والغلوبيولينات بشكل معقد ويمثل الشكل غير الفعال للهرمون.
- فسر أو ما أهمية الشكل الغير الفعال (المعقد) للهرمون أو فسر تكون غالبية الهرمونات المفرزة من الغدد الصم مرتبطة مع بروتينات بلازما الدم؟
- لتشكيل مخزوناً احتياطياً للهرمون في الدم، يتفكك عند الحاجة.
- لا تستطيع الهرمونات ذات الطبيعة الدسمة (ستيروئيدات) الانتقال إلا بارتباطها مع بروتين ناقل.
- 10% من الهرمونات يبقى حراً ويمثل الشكل الفعال الذي يؤثر في الأتسجة الهدف.

- متى يدعى الهرمون غير فعال (المعقد)؟ ومتى يدعى الهرمون فعال؟ الهرمون غير فعال : عندما ترتبط الهرمونات مع بروتينات بلازما الدم كالألبومينات والغلوبيولينات بشكل معقد. الهرمون فعال: عندما يبقى الهرمون حراً أو غير مرتبط مع بروتين بلازما الدم.
- أين توجد الخلايا الغدية الصماوية المبعثرة أو المجتمعة؟ يوجد العديد من الخلايا الغدية الصماوية المبعثرة أو المجتمعة في أماكن متفرقة من الجسم مثل الوطاء ومخاطية المعدة والأمعاء وفي النسيج الكبدى والكلى والقلب .
- أين تقع الغدة النخامية؟ وكيف ترتبط بالوطاء؟ وما حجمها؟ وكم يبلغ وزنها لدى البالغين؟ ولماذا تعد أهم الغدد الصم؟
- تقع الغدة النخامية على الوجه السفلي للدماغ وترتبط بالوطاء. ترتبط بالوطاء بوساطة السويقة النخامية
- وهي بحجم حبة البازلاء ووزنها من ( 0.5 - 1 ) غرام لدى البالغين . تعد أهم الغدد الصم : لأنها تسيطر على عمل معظم الغدد الصم الأخرى .
- ماذا يحدث للغدة النخامية إذا فقدت الاتصال بالوطاء؟ تفقد النخامة وظائفها ( فسر ) لفقدانها الارتباط العصبي والدموي مع الوطاء.
- ما قسما الغدة النخامية؟ 1- نخامة أمامية غدية (فص أمامي غدي) . 2- نخامة خلفية عصبية (فص خلفي عصبي).



- ما دور النخامة الأمامية؟ وما الهرمونات التي تفرزها؟ وما دورها؟
- دورها : تفرز مجموعة من الهرمونات يسيطر بعضها على عمل الغدد الصم الأخرى ويؤثر بعضها الآخر في أنسجة مختلفة من الجسم.
- الهرمونات التي تفرزها ودورها :

1- هرمون النمو GH عند : ينظم نمو العظام والانسجة الأخرى.

2- هرمون MSH : ينشط خلايا الجلد لإنتاج الميلانين.

3- هرمون البرولاكتين : ينشط إنتاج الحليب في الغدة الثديية .

4- هرمون ACTH : ينشط قشرة الكظر لإفراز هرموناتها.

5- هرمون TSH : ينشط الدرقية لإفراز هرموناتها. 6- هرموني FSH و LH : ينشطان الغدد الجنسية لإفراز هرموناتها .

يؤثر هرمون النمو (GH) في معظم الأنسجة والأعضاء ما أهم تأثيراته؟

- 1- في الكبد : يؤدي إلى تحرير عوامل النمو (السوماتوميدين ما دورها ) : التي تدور في الدم وتحفز بشكل مباشر نمو الغضاريف والعظام.
- ( فسر للكبد دور في نمو الغضاريف والعظام : لأن الكبد يحرر عوامل النمو (السوماتوميدين) والتي تحفز بشكل مباشر نمو الغضاريف والعظام )
- 2- في النسيج الضامة والظهارية : يحفزها على الانقسام والتمايز . ( ماوظيفة هرمون النمو في النسيج الضامة والظهارية )

ماذا ينتج من نقص إفراز هرمون النمو (GH) لدى الأطفال؟

القزامة ( ماصفاتها ) يكون طول القزم أقل من 1.2 متر ، ويتمتع بقوى عقلية طبيعية ولا يبدي أي تشوه في البنية.

ماذا ينتج من زيادة إفراز هرمون النمو (GH) لدى الأطفال؟ العنقة.

- ماذا ينتج من زيادة إفراز هرمون النمو (GH) لدى الشباب ( 20 - 18 ) سنة؟ تسبب نمو العظام التي لاتزال تستجيب لهرمون النمو كعظام الوجه واليدين والقدمين مؤدية إلى تضخمها بشكل غير متناسق حيث تنمو العظام عرضاً أكثر من نموها طولاً. ( فسر زيادة إفراز هرمون النمو لدى البالغين يسبب تضخماً غير متناسق في عظام الأطراف : لأن عظام الأطراف تنمو عرضاً أكثر من نموها طولاً)

ماذا تحتوي النخامة الخلفية أو ما المقصود بها؟ وما الهرمونات التي تفرزها؟

تحتوي النخامة الخلفية (النخامة العصبية) على محاويز لعصبونات توجد أجسامها في الوطاء وتفرز أجسام هذه الخلايا هرمونات تنتقل عبر المحاويز إلى النخامة الخلفية فتخزن هناك ليمت تحريرها عند الحاجة في الأوعية الدموية.

تفرز النخامة الخلفية : الهرمون المانع لإدرار البول ADH و هرمون الأوكسيتوسين OXT .

فسر تعد هرمونات النخامة الخلفية أو ( الأوكسيتوسين والحالة المضادة للإبالة)هرمونات عصبية؟

لأنها تفرز من خلايا عصبية أجسامها توجد في الوطاء ومحاويز الخلايا العصبية تنقلها إلى النخامة العصبية.

- فسر يحقق ارتباط الوطاء بالنخامة الخلفية اتصالاً عصبياً؟ لأن النخامة الخلفية تحتوي على محاويز لعصبونات توجد أجسامها في الوطاء وتفرز أجسام العصبونات هرمونات تنتقل عبر محاويزها إلى النخامة الخلفية.

أين يؤثر الهرمون المانع لإدرار البول (ADH)؟ وماذا ينتج عن نقص إفرازه؟ - يؤثر في نهاية الأتابيب البولية في الكلية .

نقص إفرازه عن الحد الطبيعي يؤدي إلى زيادة كمية الماء المطروح مع البول وهذا ما يسمى بالسكري الكاذب.

فسر نقص هرمون ADH يسبب الإصابة بالسكري الكاذب : لأن معظم الماء الذي يشربه المريض لا يعاد امتصاصه في نهاية الأتابيب البولية ( النفرونات ) )

- الأحظ الشكل الآتي الذي يمثل آلية إعادة امتصاص الماء في الأتبوب البولي لدى الإنسان وأجيب عن الأسئلة :
- 1- يعاد امتصاص الماء في القسم النازل من عروة هانله إلى الدم ( فسر ) : لأن الغشاء (نفوذ للماء فقط) .
- 2- يعاد امتصاص الشوارد المفيدة في القسم الصاعد من عروة هانله إلى الدم ( فسر )
- لأن الغشاء (نفوذ للشوارد فقط).
- 3- في أي منطقة من الأتبوب البولي يؤثر هرمون ADH؟ يؤثر في نهاية الأتابيب البولية في الكلية.
- 4- لماذا يفرز (ADH) عن الحيوانات الصحراوية بشكل كبير؟
- لتقليل كمية الماء المطروح مع البول كونها تعيش في بيئة قليلة الماء
- ما وظائف هرمون ADH؟




يؤثر ADH في نهاية الأثابيب البولية في الكلية إذ ينشطها على إعادة امتصاص معظم الماء المرشح داخل الأثبوب البولي إلى الدم.

- فسر يسهم هرمون ADH في ضبط تركيز الماء في سوائل الجسم
- يفرز كذلك استجابة لحالات انخفاض ضغط الدم فيعمل قابضاً للأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط.
- فسر لهرمون ADH دور في رفع ضغط الدم : لأنه يعمل قابضاً للأوعية الدموية استجابة لحالات انخفاض ضغط الدم
- ما تأثير أو ما وظائف هرمون الأوكسيتوسين OXT ؟
- تأثيره لدى الأنثى :

- مسؤول عن تقلص عضلات الرحم الملساء في أثناء الولادة . كما يساعد في عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة
- يعمل على إفراغ الحليب من ثدي الأم المرضع ( فسر ) عن طريق تقلص العضلات الملساء المحيطة بالجيوب المفرزة للحليب في الثدي.
- تأثيره لدى الذكر : يسبب تقلص العضلات الملساء في الأسهر والبروستات مسبباً دفع السائل المنوي في الأسهر والقذف.
- فسر يسبب هرمون الأوكسيتوسين (OXT) على دفع السائل المنوي في الأسهر والقذف : لأنه يعمل على تقلص العضلات الملساء في الأسهر والبروستات
- حدد موقع إفراز هرمونات (ADH أو OXT) ومكان تحررها ؟
- تفرز من : عصبونات تقع أجسامها الوطاء وتنتهي محاورها في النخامة الخلفية مكان تحررها : من النخامة الخلفية
- قارن بين النخامة الأمامية والنخامة الخلفية من حيث :
- نوع الارتباط مع الوطاء : النخامة الأمامية ( دموي ) النخامة الخلفية ( عصبي ) .
- مصدر هرمونات كل منهما : النخامة الأمامية ( الخلايا المفرزة فيها ) النخامة الخلفية ( الخلايا العصبية المفرزة في الوطاء ) .

**قارن بين هرمون النمو والأوكسيتوسين من حيث نوع الإشارة الخلوية**

**الدرس الثاني ، دراسة بعض الغدد الصم وآلية تأثير الهرمونات**



- الغدة الدرقية : تعد أكبر الغدد الصم لدى الإنسان وتزن 24 غرام وسطياً ،
- وتقع في العنق أمام الرغامى وأسفل الحنجرة ، تتألف من فصين أيمن وأيسر يصل بينهما برزخ.
- ما حجم الغدة الدرقية ، وما وظيفتها ، وأين تقع ، ومما تتألف
- ما وظيفة أو حدد موقع برزخ الغدة الدرقية ؟ يصل بين فصي الغدة الدرقية الأيمن والأيسر .
- مم تتكون الغدة الدرقية مجهرياً ؟ تتكون الغدة الدرقية مجهرياً من عدد كبير من الحويصلات المغلقة والمبطنة بطبقة واحدة من خلايا ظهارية مفرزة ، تفرز مادة غروية وتتكون من بروتين سكري مرتبط مع ذرات اليود يسمى الغلوبولين الدرقي الذي يعد أساساً لهرمونات الدرقية .
- حدد موقع الخلايا المفرزة للمادة الغروية في الغدة الدرقية ؟ من الخلايا الظهارية المبطنة للحويصلات الكروية المغلقة
- ما وظيفة الخلايا الظهارية المبطنة للحويصلات الكروية المغلقة ؟ تفرز مادة غروية .
- مم تتكون المادة الغروية المفرزة من الخلايا الظهارية المبطنة للحويصلات الكروية المغلقة في الغدة الدرقية ؟ تتكون من بروتين سكري مرتبط مع ذرات اليود الذي يعد أساساً لهرمونات الدرقية .
- ما المقصود بالغلوبولين الدرقي ، وما دوره ؟

- بروتين سكري مرتبط مع ذرات اليود يسمى الغلوبولين الدرقي الذي يعد أساساً لهرمونات الدرقية ) .
- فسر تمتلك الغدة الدرقية تروية دموية غزيرة جداً ما أهمية ذلك ؟ لتسهيل عملية التبادل بين خلاياها والدم .
- ما الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية ؟ أو ما نوع الخلايا في الغدة الدرقية وما دورها ؟
- هرموني التيروكسين T4 وثلاثي يود التيرونين T3 يفرزان من ( الخلايا الظهارية في الغدة الدرقية ) .
- هرمون الكالسيتونين (CT) المفرز من (الخلايا C في الغدة الدرقية ) .

ماذا ينتج من ارتباط البروتين السكري مع ذرات اليود ، وما تأثير نقص اليود في الغذاء على الدرقية أو في حال استمرار النخامة الأمامية بإفراز TSH

- ماذا ينتج ؟ الغلوبولين الدرقي .
- تزيد الغدة الدرقية من إفراز المادة الغروية والتي تتجمع في حويصلات الغدة لعدم وجود اليود فيزداد حجمها (مرض تضخم الغدة الدرقية) .
- فسر تزيد الغدة الدرقية من إفراز المادة الغروية في حويصلاتها المغلقة ؟ فسر تتجمع المادة الغروية في حويصلاتها المغلقة ؟
- بسبب استمرار النخامة الأمامية بإفراز هرمون TSH . لعدم وجود اليود .
- ما المقصود بمرض تضخم الغدة الدرقية أو ما سبب زيادة حجم الغدة الدرقية ؟
- يسبب استمرار النخامة الأمامية بإفراز هرمون TSH ، تزيد الغدة الدرقية من إفراز المادة الغروية والتي تتجمع في حويصلات الغدة ، لعدم وجود اليود .
- ما المصدر الأساسي لليود ، وإلى ماذا يضاف ؟ المصدر الأساسي الكائنات البحرية ، يضاف لملاح الطعام .
- ما الوظائف الفيزيولوجية للتيروكسين والتيرونين ؟ تقوم الهرمونات T4 و T3 بتنشيط المورثات ( فسر ) لتركيب كم أكبر من البروتينات .
- تصنف هرمونات T4 و T3 من حيث وظائفها الفيزيولوجية إلى نوعان ما هما وما دورهما ؟
- بنائية : تستخدم لبناء الخلايا في عملية النمو وخاصة الجملة العصبية في المرحلة الجنينية ومرحلة الطفولة .
- وظيفية (أنظمة) : تلتقط تفاعلات الاستقلاب بالإضافة إلى زيادة عدد الجسيمات الكوندرية وبالتالي زيادة إنتاج ATP والحرارة .
- ماذا ينتج عن خلل إفراز الدرقية لهرموني T4 و T3 :

- 1- نقص الإفراز : **أ. في مرحلة الطفولة** : تأخر في النمو الجسدي وتخلف عقلي وقماءة في الشكل .  
**ب. فسر تأخر في النمو الجسدي وتخلف عقلي وقماءة في الشكل في مرحلة الطفولة** : بسبب نقص إفراز الغدة الدرقية لهرموني T4 و T3 .  
**ج. لدى البالغين** : يؤدي إلى زيادة الوزن والخمول وحساسية مفرطة تجاه البرد .  
**د. فسر زيادة الوزن والخمول وحساسية مفرطة تجاه البرد لدى البالغين** : بسبب نقص إفراز الغدة الدرقية لهرموني T4 و T3 .
- 2- زيادة الإفراز لدى البالغين : تؤدي إلى الإصابة بمرض غريفز وأهم أعراضه نقصان الوزن وجحوظ العينين بسبب حدوث الوذمة الالتهابية في الأنسجة خلف كرة العين .


- فسر الإصابة بمرض غريفز : بسبب زيادة إفراز الغدة الدرقية لهرموني T4 و T3 لدى البالغين
- فسر من أعراض مرض غريفز نقصان الوزن وجحوظ العينين : بسبب حدوث الوذمة الالتهابية في الأنسجة خلف كرة العين
- أين تقع الغدد جارات الدرق وما دورها ؟ تقع على الوجه الخلفي لفصي الدرقية . تفرز هرمون الباراثورمون (PTH) .
- من يفرز هرمون الباراثورمون (PTH) ، وما دوره ؟ تفرزه : الغدد جارات الدرق . دوره : يقوم مع الكالسيوتونين المفرز من الدرقية بتنظيم مستوى الكالسيوم في الدم ويكون عملهما متعاكسا .
- قارن بين هرمون الكالسيوتونين وهرمون الباراثورمون :

هرمون	نوع الهرمون	وجه العنق
هرمون الكالسيوتونين	الغدد جارات الدرقية	لغدة الترخر خلف سرج
هرمون الباراثورمون	رغدة جارات الكالسيوم من الغدة	تختر خلف سرج مسج الغدة
هرمون الكالسيوتونين مع الهرمون	رغدة جارات الكالسيوم مع الهرمون	تختر خلف سرج من الأنسجة الالتهابية

- ما المقصود بغدة الكظر ، وأين تقع ؟ يمتلك الإنسان غدتان كظريتان تزن كل منها 4 غرامات (تقع فوق القطب العلوي للكلية الموافقة )
- تتألف غدة الكظر من قسمين متميزين ما هما ؟ لب الكظر . قشرة الكظر وتحاط بمحفظة ليفية تفصلها عن النسيج المجاورة .
- ما وظيفة المحفظة الليفية المحيطة بغدة الكظر : تفصل الغدة الكظرية عن النسيج المجاورة
- ما الهرمونات التي يفرزها كل من قشرة الكظر ولب الكظر ؟ قشرة الكظر تفرز هرمونات : الألدوسترون-الكورتيزول-الهرمونات الجنسية . لب الكظر تفرز هرمونات : الأدرينالين - النورأدرينالين - قليل من الدوبامين .
- حدد موقع إفراز كل من : 1- الألدوسترون-الكورتيزول-الهرمونات الجنسية : ( قشرة الكظر ) .
- 2- الأدرينالين - النورأدرينالين - قليل من الدوبامين : ( لب الكظر ) .
- الغدة الصنوبرية : أين تقع : أمام الحداث التوءمية الأربعة في الدماغ .
- ما دورها أو ماذا تفرز : تفرز الغدة الصنوبرية هرمون الميلاتونين - حدد موقع إفراز هرمون الميلاتونين : الغدة الصنوبرية .
- ما أدوار هرمون الميلاتونين ؟
- 1- يقوم بتفتيح البشرة ( فسر ) إذ يعاكس بعمله عمل هرمون MSH . تنظيم الساعة البيولوجية للجسم .
- كيف يعمل هرمون الميلاتونين لتنظيم الساعة البيولوجية للجسم : يزداد إفراز الغدة الصنوبرية للميلاتونين في الظلام ويقل بوجود الضوء ( ماذا ينتج ) مما يضبط الدورة الإيقاعية اليومية للجسم من مثل دورات النوم والاستيقاظ .
- 2- يساعد الميلاتونين في تنظيم الدورات التكاثرية في بعض الأنواع الحيوانية التي تتميز بوجود فصول تكاثر محددة .
- كيف تقوم الهرمونات بتنظيم الوظائف الحيوية في الجسم أو ما آليات عمل الهرمونات وتأثير الهرمونات المفرزة من الغدد الصم في الخلايا التي تمتلك مستقبلات نوعية لهذه الهرمونات . يؤدي ارتباط الهرمون بمستقبله النوعي ( ماذا ينتج ) إلى تفعيل سلسلة من التفاعلات ضمن الخلية بحيث تؤدي كمية ضئيلة من الهرمون ( ماذا ينتج ) إلى فعل خلوي كبير جدا .
- كيف تصنف الهرمونات ؟ حسب طبيعتها الكيميائية وموقع مستقبلها في الخلية الهدف .
- تصنف الهرمونات حسب طبيعتها الكيميائية وموقع مستقبلها في الخلية الهدف إلى :
  - 1- الهرمونات البروتينية والبيبتيدية : توجد مستقبلاتها في الغشاء الخلوي أو على سطحه من مثل هرمونات الوطاء والغدة النخامية وجزر لانغرهانس . لماذا لا تستطيع عبور الغشاء ؟ بسبب أوزانها الجزيئية الكبيرة .
  - 2- الهرمونات الستيرويدية : توجد مستقبلاتها داخل الهيولى من مثل مستقبلات الهرمونات الجنسية وقشرة الكظر . لماذا تستطيع عبور الغشاء ؟ لأن طبيعتها الكيميائية تسمح لها بعبور الغشاء
  - 3- الهرمونات الأمينية : توجد مستقبلات هرمونات الدرقية الأمينية T3 و T4 داخل النواة مرتبطة بتسلسلات خاصة من DNA .
- عدد الهرمونات ذو الطبيعة الكيميائية البروتينية ( البيبتيدية ) ، مع ذكر موقع مستقبلها في الخلية الهدف ؟
- 1- الهرمونات التي تفرز أو تحرر من الغدة النخامية : LH - FSH - PRL - GH - TSH - MSH - ACTH - OXT - ADH
- 2- الهرمونات المفرزة من الوطاء : GNRH - TRH
- 3- الهرمونات المفرزة من جزر لانغرهانس في البنكرياس : الفلوكاغون - الأتسولين
- جميع هذه الهرمونات يقع مستقبلها النوعي في الخلية الهدف ( في الغشاء الخلوي للخلية الهدف أو على سطح الغشاء الخلوي للخلية الهدف )
- عدد الهرمونات ذو الطبيعة الكيميائية الستيرويدية ، مع ذكر موقع مستقبلها في الخلية الهدف ؟
- 1- الهرمونات المفرزة من قشرة الكظر : الكورتيزول - الألدوستيرون .

الهرمونات الجنسية : الإستروجينات - الإستروجين - الأسترايول - البروجسترون - التستوسترون - الدايدروتستوسترون - الأندروستيبيون  
 جميع هذه الهرمونات يقع مستقبلها النوعي في الخلية الهدف ( في هيولى الخلية الهدف ) .  
 عدد الهرمونات ذو الطبيعة الكيميائية الأمينية ، مع ذكر موقع مستقبلها في الخلية الهدف ؟  
 هرمونات الدرقية : T3 - T4 مستقبلها النوعي في الخلية الهدف ( في نواة الخلية الهدف ) .  
 ما الطبيعة الكيميائية لهرموني الأدرينالين والنورأدرينالين والدوبامين ؟ وأين يقع مستقبلها النوعي في الخلية الهدف ؟  
 هرمونات أمينية ، في الغشاء الهبولي للخلية الهدف .

يتضمن عمل الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية مرحلتين ما هما ، وماذا يصل بينهما ؟ رسول أول ورسول ثاني يصل بينهما البروتين G .  
 ما آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية ؟



ينقل الهرمون المفرز من الغدة (رسول أول) بواسطة الدم واللمف ليصل إلى الخلايا الهدف أين يقع مستقبله النوعي ؟ ( في الغشاء الهبولي )  
 يرتبط الهرمون بالسطح الخارجي للمستقبل ( ماذا ينتج )

مما يؤدي إلى تنشيط عمل البروتين G (بروتين مرتبط مع GTP) .

يقوم البروتين G بتنشيط أنظييم الأدينيل سيكلاز الذي يقوم بتحويل ATP إلى cAMP (رسول ثاني) .

يقوم cAMP بالعديد من التأثيرات منها تنشيط أنظييم تفاعل يؤدي إلى حدوث الأثر الهرموني المطلوب (الاستجابة الخلوية) .

على من يطلق تسمية الرسول الأول والرسول الثاني ؟

الرسول الأول : الهرمون المفرز من الغدة . الرسول الثاني : cAMP .

ما وظيفة كل من البروتين G وأنظييم الأدينيل سيكلاز و cAMP ؟ البروتين G : يقوم البروتين G بتنشيط أنظييم الأدينيل سيكلاز .  
 أنظييم الأدينيل سيكلاز : يقوم بتحويل ATP إلى cAMP (رسول ثاني) .

مركب cAMP : يقوم بالعديد من التأثيرات منها تنشيط أنظييم تفاعل يؤدي إلى حدوث الأثر الهرموني المطلوب .  
 فسر تمييز الهرمونات بتأثيرات خلوية نوعية ؟

لأن الخلايا الهدف للهرمون تمتلك مستقبلات بروتينية نوعية تتعرف على الهرمون دون غيره .  
 ماذا تضم الهرمونات ذات المستقبلات داخل خلوية ؟

تضم الهرمونات الستيرويدية التي يقع مستقبلها في هيولى الخلية الهدف .  
 هرمونات الدرقية T3-T4 التي يوجد مستقبلها في النواة .

ما مراحل آلية تأثير الهرمونات الستيرويدية في الخلية الهدف بالترتيب ؟  
 تجتاز الهرمونات الستيرويدية الغشاء الهبولي للخلية الهدف .

ترتبط مع المستقبل البروتيني في الهبولي فيتشكل معقد (هرمون-مستقبل) .  
 ينتقل المعقد من الهبولي إلى النواة .

يقوم بتفعيل مورثات محددة مسؤولة عن تركيب بروتينات جديدة (أنظييمية-بنائية) تسبب حدوث الأثر الهرموني (الاستجابة) .  
 ما وظيفة المعقد الستيرويدي أو ماوظيفة الهرمون الستيرويدي - المستقبل في النواة : يقوم بتفعيل مورثات محددة مسؤولة عن تركيب بروتينات



جديدة (أنظييمية-بنائية) تسبب حدوث الأثر الهرموني (الاستجابة) .  
 وكمثال عنها : يحفز الهرمون الجنسي الذكرى (التستوسترون) إنتاج أنظيمات وبروتينات

بنائية في ألياف الهيكل العضلي مما يؤدي إلى زيادة حجم وقوة العضلات .

فسر الهرمونات الذكرية ( التستوسترون ) له دور في زيادة حجم وقوة العضلات ؟  
 لأنه يحفز إنتاج أنظيمات وبروتينات بنائية في ألياف الهيكل العضلي مما يؤدي إلى زيادة حجم وقوة العضلات .

ب- الهرمونات الدرقية:

ماذا يتطلب تنشيط التفاعلات الاستقلابية بواسطة التيروكسين والتبرونين ؟ - زيادة إنتاج الأنظيمات الاستقلابية . - زيادة إنتاج ATP .  
 رتب مراحل تأثير الهرمونات الدرقية (T3-T4) في الخلية الهدف ؟ - تجتاز هرمونات الدرقية (T3-T4) الغشاء الهبولي للخلية

الهدف ويتحول معظم التيروكسين إلى تبرونين ( فسر ) لأن فعالية التبرونين نحو أربعة أضعاف فعالية التيروكسين .  
 تنتقل معظم الهرمونات إلى النواة لترتبط مع مستقبلات فيها .

يؤدي ذلك إلى تنشيط مورثات محددة مسؤولة عن تركيب أنظيمات استقلابية جديدة .  
 يرتبط المتبقي من الهرمونات مع مستقبلات موجودة في الجسم الكونديري فيسر ذلك إنتاج ال ATP .

ما وظيفة أو ماذا ينتج من ( المعقد الدرقي T3-T4 + مستقبل في النواة ) ؟  
 يؤدي إلى تنشيط مورثات محددة مسؤولة عن تركيب أنظيمات استقلابية جديدة .

ما وظيفة أو ماذا ينتج من ( المعقد الدرقي T3-T4 + مستقبل في الجسم الكونديري ) : يسرع إنتاج ال ATP .  
 ما الهرمونات التي يدخل اليود في تركيبها ؟ T3 - T4 .

### الدرس الثالث : آليات السيطرة على إفراز الغدد الصم

على ماذا تعتمد درجة تأثير الهرمون بشكل أساسي ؟ وكيف تتحدد كميته ؟ إن درجة تأثير الهرمون تعتمد بشكل أساسي على كميته في الدم . تحدد الكمية حسب حاجة الجسم لتنفيذ الوظائف المختلفة والمحافظة على اتزان الوسط الداخلي للجسم .



لتنظيم إفراز الهرمونات من الغدد الصم طرائق عدة ما أهمها ؟

التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية . التنظيم المباشر .

أولاً : التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية ...

كيف يتصل الوطاء مع الغدة النخامية ؟ بواسطة السويقة النخامية .

حدد موقع ووظيفة السويقة النخامية : تصل الوطاء مع الغدة النخامية

تؤمن السويقة النخامية نوعين من الاتصال بين الوطاء والغدة النخامية ما هما :

1- اتصال عصبي بين الوطاء والنخامة الخلفية : حيث تفرز أجسام العصبونات الموجودة في الوطاء هرموني (OXT-ADH) ، وتنتقل عبر محوار العصبون إلى النخامة الخلفية ، إذ تتحرر من الأضرار عند الحاجة . (فسر تومن السويقة النخامية اتصال عصبي بين الوطاء والنخامة الأمامية)

2- اتصال دموي بين الوطاء والنخامة الأمامية : عن طريق هرمونات الإطلاق . (فسر تومن السويقة النخامية اتصال دموي بين الوطاء والنخامة الأمامية)

ما وظيفة عوامل الإطلاق ؟ تؤمن السويقة النخامية عن طريقها عوامل الإطلاق اتصال دموي بين الوطاء والنخامة الأمامية

ما المقصود بالتلقيح الراجع الإيجابي ؟ زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما تؤدي إلى زيادة إفراز أحد هرمونات الوطاء

وهرمون النخامة الأمامية من ثم زيادة إفراز هذه الغدة للهرمون في المرحلة الأخيرة .

ما المقصود بالتلقيح الراجع السلبي ؟ زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما فوق المستوى الطبيعي تؤدي إلى تثبيط الوطاء

والنخامة الأمامية فتقلل من إفراز العوامل المطلقة والهرمون المثبه للغدة فيقل إفراز الغدة لهرموناتا وبالعكس .

ما علاقة التلقيح الراجع السلبي والتلقيح الراجع الإيجابي بالاتزان الداخلي ؟ إن التلقيح الراجع السلبي ضروري للاتزان الداخلي

ويعمل نحو الحالة الطبيعية . بينما التلقيح الراجع الإيجابي يتعد عن الاتزان الداخلي ويقاوم التغيير .

ما تركيز معظم الهرمونات في الدم ؟ وكيف يحتفظ كل هرمون بمستواه ثابتاً في الدم بالرغم من التقلبات في تركيزه في الدم استجابة للمحرضات

المختلفة ؟ - توجد معظم الهرمونات بتركيز صغيرة جداً . ورغم التقلبات في تراكيزها في الدم استجابة للمحرضات المختلفة فإن كل هرمون

يحتفظ بمستوى ثابت في الدم (الحد الطبيعي أو الفيزيولوجي) ويتم ذلك بواسطة (التلقيح الراجع السلبي) .

كيف يتم ضبط مستوى سكر العنب (الغلوكوز) المنحل في الدم عن الحد الطبيعي (110-70 ملغ/100 مل من الدم) ؟

يتم ذلك بتأثير هرمون الأتسولين وهرمون الغلوكاغون المفرزان من جزر لانغرهانس في البنكرياس .

حدد موقع إفراز هرمون الأتسولين وهرمون الغلوكاغون : من جزر لانغرهانس في البنكرياس

حدد موقع جزر لانغرهانس : في البنكرياس

ما وظيفة هرموني الغلوكاغون والأتسولين : ضبط مستوى سكر العنب (الغلوكوز) المنحل في الدم عن الحد الطبيعي .

ثانياً : التنظيم الهرموني المباشر

ما المقصود بالتنظيم الهرموني المباشر ؟ يتم ضبط مستوى مادة ما في الدم ضمن حدود معينة من خلال تأثير لثاليات هرمونية متعاكسة .

كيف يتم ضبط مستوى مادة ما في الدم ضمن حدود معينة

الأحظ الشكل المجاور ، ثم أجب :

1- ما تأثير الوطاء على الغدة الدرقية؟ يفرز الوطاء هرمون ( TRH ) الذي ينتقل بواسطة الأوعية الدموية إلى

النخامة الأمامية هرمون ( TSH ) الذي ينتقل بواسطة الدم ليؤثر في الغدة الدرقية فتفرز هرموني ( T3 و T4 )

2- ماذا ينتج من زيادة مستوى هرموني T3 و T4؟ ارتفاع مستوى الهرمونين ( T3 و T4 )

عن المستوى الطبيعي ، يؤثر في الوطاء ، فيقلل من إفراز ( TRH ) ويؤثر في النخامة الأمامية ،

فتقلل من إفراز ( TSH ) ، فينتج عن ذلك العودة إلى وضع التوازن .

3- ما نوع التلقيح الراجع في هذه الحالة ؟ وما أهميته؟ تلقيح راجع سلبي ،تحقيق التوازن الداخلي أو الاستتباب .

عدد اللثاليات الهرمونية التي تعمل بشكل متعكس ؟

1- ( الأتسولين و الغلوكاغون ) 2 ( الكالستونين و البارالورمون ) 3- ( الميلاتونين و MSH ) .


ما وظيفة التلقيح الراجع السلبي ؟ 1- يحافظ على الحد الفيزيولوجي للهرمون في الدم . 2- ضروري للاتزان الداخلي .

إن آلية إفراز الغدة الدرقية يتم بثلاث مراحل متسلسلة في : الوطاء ، الغدة النخامية ، الغدة الدرقية والمطلوب :

1- وضح ماذا يفرز في كل منها ؟ ( الوطاء ) : يفرز هرمون ( TRH ) الذي ينتقل بواسطة الأوعية الدموية إلى النخامة الأمامية .

( النخامة الأمامية ) : تفرز هرمون ( TSH ) الذي ينتقل بواسطة الدم ليؤثر في الغدة الدرقية . ( الغدة الدرقية ) : تفرز هرموني ( T3 و T4 ) .


2- ماذا ينتج عن زيادة مستوى T3 و T4 في الدم فوق الحد الطبيعي ؟ ارتفاع مستوى الهرمونين ( T3 و T4 ) عن المستوى الطبيعي ، يؤثر في الوطاء ، فيقلل من إفراز ( TRH ) ويؤثر في النخامة الأمامية ، فتقلل من إفراز ( TSH ) ، فينتج عن ذلك العودة إلى وضع التوازن .



- سؤال : ألاحظ المخطط الآتي ثم أجيب عن الأسئلة الآتية : (مخطط ص 111 من الكتاب)
1. ما تأثير زيادة إفراغ الحليب لدى الأم المرضع؟ تتببه الوطاء الذي يزيد من إفراز هرمون OXT مما يؤدي الى زيادة تقلص العضلات المساء لي الثدي وبالتالي زيادة افراغ الحليب
  2. مانوع التلقيح الراجع في هذه الحالة ؟ تلقيح راجع ايجاي
  3. اين يقع المستقبل النوعي لهرمون الاوكسيتوسين : في الغشاء الخلوي أو على سطحه

### الدرس الرابع ، التنسيق الكيميائي لدى النبات

- ألاحظ أن شجر التفاح يزهر في ( شهر آذار ) ، وتنضج ثماره في ( شهر آب ) ، وتتساقط أوراقه ( في الشتاء ) كيف يتم ضبط هذه العمليات؟ إن تنظيم العمليات الفيزيولوجية للنبات كالنمو ، والانجذابات ، وعملية الإزهار ، وتثبيت النمو تخضع لتأثير:
- عوامل خارجية ( الضوء - الحرارة - الجاذبية الأرضية ) . عوامل داخلية ( المورثات - مواد التنسيق النباتية ) .
  - ما المقصود بالبادرة ؟ تنضج البذرة لتعطي نباتا ذاتي التغذية يسمى بادرة .
  - فسر أجرى العلماء التجارب على بادرات نباتات الفصيلة النجيلية مثل: (القمح-الشعير-الشوفان) ؟ لسهولة العمل.
  - ما المقصود بمواد التنسيق النباتية ؟ مركبات عضوية تنتجها بعض الأسجدة النباتية بتركيز ضئيلة جدا وتنتقل إلى أماكن أخرى غالبا لتقوم بتأثيرات فيزيولوجية (وظيفية) . ومورفولوجية ( شكلية ) .
  - ما وظيفة مواد التنسيق النباتية ؟ تقوم بتأثيرات فيزيولوجية (وظيفية) . ومورفولوجية ( شكلية ) .
  - عدد أهم مواد التنسيق النباتية ؟ الأوكسينات - الجبرلينات - السايبتوكينينات - حمض الأبسيسك - الإثيلين .
  - ما المقصود بالكوليبوتيل ؟ غمد مسدود الذروة ( يحيط بالورقة الأولى لنباتات الفصيلة النجيلية ) .
  - أين يقع الكوليبوتيل ؟ يحيط بالورقة لنباتات الفصيلة النجيلية .
  - ما المقصود بالآغار ؟ مادة جيلاتينية - سكرية تستخرج من أحد الطحالب البحرية (محلول مائي) .
  - أحدد جهة نمو السوق في بادرة معرضة للضوء من جانب واحد ؟ ماذا أسمى هذه الظاهرة ؟ وما تفسيرها؟
  - نمت السوق بجهة الضوء . تسمى : الانجذاب الضوئي .
  - تفسر : بأن الخلايا تنمو وتستطيل في الطرف المظلل أكثر من نموها واستطالتها في الطرف المضاء لأن تركيز العامل المحرض للنمو في الطرف المظلل أكثر مما هو عليه في الطرف المضاء .
  - بماذا ساعدت التجارب التي قام بها كل من داروين وجونسون وفنت لتفسير ظاهرة الانجذاب الضوئي ؟ في اكتشاف الأوكسينات .
  - أنعم النظر في التجريبتين اللتين أجريتا على بادرات إحدى النباتات النجيلية ، وأجيب عن الأسئلة الآتية :



- 1- عند تعريض البادرة لضوء جانبي أية جهة تنمو أكثر ، الجهة المضاء أم الجهة المظلمة ؟  
الجهة المظلمة تنمو أكثر من الجهة المضاء .
- 2- أي البادرات لم تنم باتجاه الضوء في تجارب العالم داروين وجونسون؟  
النباتات التي قطعت ذروتها ، والنباتات التي غطيت ذروتها بمادة غير نفوذة للضوء .
- 3- ما الشروط الواجب توافرها لحدوث الاستجابة؟  
وجود ذروة النبات وسلامتها ، وتعرضها لضوء جانبي .
- 4- ما أهمية وجود بادرة النبات كتجربة شاهدة؟  
لمقارنتها مع البادرات الأخرى في التجربة .
- من خلال التجربة ، وضح متى تستطيع الإشارة الكيميائية النفاذ وما نتيجة نفاذها ، ومتى لا تستطيع الإشارة الكيميائية النفاذ وما نتيجة عدم نفاذها ؟  
تنفذ الإشارة الكيميائية (العامل المحرض على النمو) المتكونة في القمة النامية إلى الأسفل خلال مواد معينة كالجلائين (الآغار) لتسرع من نمو الساق فيستجيب النبات للضوء . لا تستطيع الإشارة النفاذ من خلال مواد أخرى كالميكا لذا لم تحدث استجابة النبات للضوء .
- فسر تستجيب بادرة النبات للضوء عند وصوله إلى قمته النامية ؟ نتيجة لتكون إشارة في القمة النامية .
- ألاحظ الشكل الآتي الذي يمثل تجربة العالم فنت ، وأجيب عن الأسئلة :

  - 1- ما اسم المادة الموجودة في القمة النامية والمسؤولة عن الانجذاب الضوئي؟ الأوكسين .
  - 2- كيف وصل العامل المحرض على النمو إلى ساق النبات الذي قطعت قمته؟  
بتأثير الجاذبية الأرضية والانتثار .
  - 3- ما نوع الخلايا الموجودة في المنطقة النامية؟ خلايا ميرستيمية
  - حدد موقع الخلايا الميرستيمية : في المنطقة النامية .
  - 4- ما الخطوات التي قام بها العالم فنت؟ وما النتائج التي توصل إليها؟  
قطع قمة الكوليبوتيل . عزل الأوكسين على قطعة آغار .



• وضع قطعة الآغار على قمة الكوليوبتيل مقطوع الذروة بشكل جانبي . • نما الكوليوبتيل بشكل مائل .

• **النتيجة :** تنمو الخلايا وتستطيل في الطرف التي يحوي الأوكسين بشكل أسرع من الطرف الآخر .

س- متى استعاد النبات قدرته على النمو ؟ بعد تثبيت قطعة الآغار المحتوية على الإشارة المستخلصة من القمة النامية وبذلك توصل العالم فنت إلى أن الإشارة عبارة عن مادة كيميائية أطلق عليها اسم أوكسين Auxin وهي كلمة يونانية تعني الاستطالة أو الزيادة .

ث- عند قيام العالم فنت بتثبيت قطعة آغار محتوية على الأوكسين على إحدى جانبي الساق العليا زادت سرعة نموها مقارنة بالجانب الآخر من الساق لماذا ؟ لأن الأوكسين يتشكل في القمة وينتقل إلى المنطقة التي تليها بتأثير عاملي الجاذبية الأرضية والانتشار ويسبب نموها واستطالتها .

• ما المقصود بالأوكسينات ؟ وأين تتركب ؟ وما دورها ؟ الأوكسينات : حموض عضوية ذات وزن جزيئي مرتفع ، تنتج بكميات قليلة ، وتنشط النمو في النبات . وبعد حمض الخل الأتدولي ( IAA ) أهم هذه الأوكسينات .

• يتركب الأوكسين في القمة النامية ذات الخلايا المبرستيمية (الجينية) للساق والأوراق بشكل

رئيس ، وفي قمة الجذور بكميات أقل . دور الأوكسينات : 1- تقوم بدور مهم في نمو خلايا النبات وتمايزها

2- مسؤولة عن السيطرة القمية للبرعم الانتهائي والانجذابات الضوئية والأرضية .

• ألاحظ الأشكال البيانية الآتية ، وأجيب عن الأسئلة الآتية :

1- ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو خلايا الساق واستطالتها في الشكل البياني ( أ ) ؟ صفحة 114  
تزداد سرعة النمو والاستطالة حتى حد معين ( $10^{-5}$ ) ثم يتراجع معدل النمو بزيادة التركيز .

2- أحدد التركيز الأمثل لنمو كل من الساق والجذر والبراعم في الشكل البياني ( ب ) ؟ صفحة 114

الساق :  $10^{-5}$  . الجذر :  $10^{-10}$  . البراعم :  $10^{-4}$  .

3- ما تأثير التركيز الأمثل لنمو الساق على نمو البراعم والجذور ؟ التراكيز المناسبة لنمو الساق تثبط نمو الجذور والبراعم .

• **نتيجة :** لكل نسيج نباتي تركيز أمثل من الأوكسين للنمو ( مثال ) فالتركيز المناسب لنمو الساق تثبط نمو الجذور والبراعم

• يعتمد معدل نمو واستطالة خلايا النبات على عاملين ما هما ؟ 1- التركيز المناسب للأوكسين . 2- نوع النسيج النباتي المتأثر .

• رتب مراحل استطالة خلية نباتية بتأثير الأوكسينات ؟

1- عندما يصل الأوكسين إلى الخلية الهدف ( ماذا ينتج ) تنشيط الأوكسينات مضخات البروتون في الغشاء سيتوبلازمي للخلية ، ( أين تقع مضخات البروتون وما وظيفتها ) فتعمل هذه المضخات على ضخ البروتونات من السيتوبلازم إلى الجدار الخلوي . ( ماذا ينتج ) :

2- ينتج عن ذلك انخفاض درجة ( PH ) في الجدار الخلوي (وسط حمضي) .

3- الوسط الحمضي للجدار ( ماذا ينتج ) ينشط بروتين وندي ( شكل إسفين ) ( ما وظيفته ) يعمل على فصل ألياف السيللوز عن عديدات السكر .

4- تصبح عديدات السكر معرضة لتأثير أنظييم مفكك ( ما وظيفته ) يعمل على تقطيع السكريات المتعددة الرابطة بين ألياف السيللوز ( ماذا ينتج ) فتزداد مرونة الجدار الخلوي . ( ماذا ينتج ) :

• يدخل الماء إلى داخل الخلية بتأثير الحلول ، وتستطيل الخلية بتأثير الضغط الانتباجي ، وترسب ألياف سيللوز ومواد جدارية جديدة ، تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس .

• بتأثير ماذا يدخل الماء إلى الخلية النباتية : بتأثير الحلول / كيف تستطيل : بتأثير الضغط الانتباجي / وماذا يترسب : ألياف سيللوز ومواد جدارية جديدة • وماذا ينتج من هذا الترسب : تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس (

• فسر استطالة الخلايا النباتية بتأثير الأوكسينات غير قابلة للعكس ؟

بسبب ترسب ألياف سيللوز ومواد جدارية جديدة تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس .

• كيف تنتقل الأوكسينات في النبات ؟ ولماذا لا تترامك ضمنه ؟

• تنتقل الأوكسينات في اتجاه واحد داخل النبات من القمة إلى القاعدة وهذا ما يعرف ( بالانتقال القطبي ) .

• فسر أو ما المقصود بالانتقال القطبي للأوكسينات (

• لماذا لا تترامك ضمنه : لأن الأوكسينات تتحلل بطريقتين ما هما :

1- هدم ضوئي ( ما المقصود به ) : يتفكك الأوكسين داخل الخلايا بتأثير الضوء إلى مركبات بعضها مثبط للنمو .

• ماذا ينتج من الهدم الضوئي للأوكسينات .

2- هدم أنظييم ( ما المقصود به ) : تحتوي معظم أنسجة النباتات على الأنظيمات المؤكسدة للأوكسينات .

• ويزداد الهدم الأنظييمي بتقدم عمر النسيج ، كما أن هناك علاقة عكسية بين معدل النمو وتركيز الأنظييم .

• ما نوع الأنظيمات التي توجد في معظم الأنسجة النباتية : الأنظيمات المؤكسدة للأوكسينات / متى يزداد الهدم الأنظييمي : بتقدم عمر النسيج / ما العلاقة بين معدل النمو وتركيز الأنظييم : علاقة عكسية ) . • دور الأوكسين في الانجذابات :

• **أولا :** الانجذاب الضوئي :

• فسر نموت النبات المزروع في المنزل باتجاه مصدر الضوء ؟

• لأن النمو والاستطالة في الطرف المظلل أكثر من نمو واستطالة الخلايا في الطرف المضاء ، أي يحدث نمو متفاوت .

• ماذا ينتج من تغير تركيز الأوكسين بين طرفي قمة الكوليوبتيل ؟ ينمو الجانب المظلل أكثر من نمو الجانب المضاء .

• فسر إن تعريض ساق نبات او كوليوبتيل إلى ضوء جانبي لأيام عدة يؤدي ( ماذا ينتج ) إلى نمو الساق باتجاه الضوء ؟

• نتيجة لزيادة تركيز الأوكسين في الجانب المظلل مقارنة بالجانب المضاء فينمو الجانب المظلل أكثر من نمو الجانب المضاء .

- خلايا جنينية أخذت من قمة برعم هواني ، أو قمة جذر .
- توضع في أنابيب اختبار تحوي مواد مغذية ، فتتقسم خيطياً لتعطي ( ماذا ينتج ) كتلة خلوية غير متميزة .
- تجزا الكتلة الخلوية غير المتميزة ، وتوزع على أنابيب في وسط مغذ ، لتعطي نباتات جديدة مطابقة للأصل .
- ما تأثير الكولشيسين المستخدم ؟ وضاعف الصيغة الصبغية للخلايا
- لماذا عولجت الخلايا المتميزة أنظيمياً ؟ لإزالة جدارها الخلوي ، مع احتفاظها بنشاطها الحيوي . ( الانقسام )
- من أين نحصل على الخلايا غير المتميزة ؟ من قمة البراعم الهوائية بشكل رئيسي أو قمة الجذور
- ما سبب تسمية النباتات نباتات الانابيب ؟ لأنها نمت في أوساط مركبة معينة وداخل الأوعية الزجاجية وضمن المخبر .

### نقل النوى والاستنساخ :


- هل سمعت عن الاستنساخ ؟ ما هو مفهوم الاستنساخ ؟ وما هي ألياته ؟ نعم ، هو الحصول على كائنات حية أو أعضاء أو أنسجة من خلال نقل النوى .
- ما الإيجابيات والسلبيات لعملية الاستنساخ لدى الحيوانات في رأيك ؟
- الإيجابيات : الحصول على حيوانات عالية الجودة وتقديم خدمات صحية مهمة للإنسان
- السلبيات : عدم معرفة نتائجها على المدى البعيد فالحيوانات المحورة وراثياً قد تسبب اختلال في التوازن البيئي ، والجانب الأخلاقي لاسيما في حال استنساخ أجنة بشرية .

### أولاً : استنساخ الأبقار عالية الجودة :

- ما مراحل استنساخ الأبقار عالية الجودة بالترتيب ؟
- تعزل نوى المصفى في مرحلة 32 خلية قبل التمايز من أبقار عالية الجودة .
- تؤخذ بويضات من أبقار عادية وتزرع نواتها .
- تحقن النوى المعزولة من خلايا المصفى في البويضات منزوعة النوى .
- توضع البويض في أنابيب زجاجية تحوي أوساطاً مغذية ، فتتقسم كل منها معطية مصفى .
- تدرع التويئات في أرحام أبقار حاضنة ، فتتم معطية أبقار عالية الجودة .
- ما مصدر النواة عند استنساخ الأبقار عالية الجودة ؟ من خلايا المصفى في مرحلة 32 خلية .
- فسر الكائن الناتج في عمليات الاستنساخ يشابه الكائن مصدر النواة دائماً ؟ لأن النواة تحمل التعليمات الوراثية المسؤولة عن ظهور الصفات كاملة .
- ثانياً : استنساخ النعجة دولي :

### ألاحظ الشكل المجاور ، وأتبع مراحل استنساخ النعجة دولي ، ثم أجيب عن الأسئلة الآتية :

- كيف يتم إنتاج النعجة دولي ؟
- 1- تؤخذ خلية متميزة n2 من ضرع نعجة ( أ ) .
- تؤخذ بويضة غير ملقحة 1n من نعجة ( ب ) وتزرع نواتها .
- توضع نواة خلية الضرع في البويضة المنزوعة النواة وتعرضها لصدمة كهربائية لدمج النواة مع البويضة .
- تنقسم البويضة 2n وتعطي تويئة تحقن المصفى في رحم النعجة ( ج ) فتعطي النعجة دولي .
- أعدد الصيغة الصبغية ( 1n , 2n ) لكل من خلايا الضرع والبويضة ؟
- الصيغة الصبغية لخلايا الضرع 2n الصيغة الصبغية لخلايا البويضة 1n
- ما العامل الذي سبب اندماج نواة خلية الضرع مع البويضة عديمة النواة ؟ صدمة كهربائية .
- لماذا ( أو فسر ) آثار استنساخ النعجة دولي ضجة عالمية ؟ لأن النواة أخذت من خلية الضرع المتميزة n2 .
- ما الفائدة المتوقعة من مثل هذه التجارب ( الاستنساخ ) ؟
- الحصول على نباتات وحيوانات عالية الجودة .
- تقديم خدمات طبية مهمة للإنسان .



### الخلايا الجذعية :

- ما هي أهم المشاكل التي تواجه عملية زراعة الأعضاء ؟ مصدر العضو المزروع . رفض الجسم له .
- ما الأعضاء التي يعد الاستنساخ البشري حل مغرٍ لزراعتها ؟ الأعضاء التي تحمل معقد التوافق النسيجي الأعظمي MHC ذاته .
- هل تعلم : الاستنساخ البشري أمر مرفوض أخلاقياً ، وممنوع قانوناً في كل دول العالم
- ما أهم ميزات الخلايا الجذعية ؟ التجديد الذاتي والاستمرارية : أي يجب أن تعطي بانقسامها خليتين : ( الأولى ) خلية جذعية (والأخرى ) خلية ستدخل في مرحلة التمايز . أو تكون خلية أصل لمجموعة من الخلايا المتميزة .
- ماذا ينتج من الانقسام الخلوي للخلية الجذعية ؟ خلية أرومية و خلية جذعية .
- ماذا ينتج من انقسام الخلية الأرومية ؟ خلية دموية ، خلية عصبية ، خلية كبدية .
- متى تستطيع خلية أرومية من نقي العظم التمايز إلى أنماط خلوية عدة ؟ عندما تعالج مخبرياً .
- ما هي الأنماط الرئيسية للخلايا الجذعية ؟ أو رتب الخلايا الجذعية وفق تسلسل ظهورها الزمني ؟
- 1- خلايا جذعية كاملة الإمكانيات مثل خلايا التويئة ، إذ أنها تعطي أي نوع من الخلايا (فسر) لأنها تستطيع التعبير عن مورثاتها كاملة .
- حدد موقع الحصول على خلايا جذعية كاملة الإمكانيات : من خلايا التويئة
- فسر تعد خلايا التويئة كاملة الامكان : لأنها تعطي أي نوع من الخلايا ، فهي تستطيع التعبير عن مورثاتها كاملة (
- 2- الخلايا الجذعية متعددة الإمكانيات مثل الخلايا الجنينية : خلايا الكتلة الخلوية الداخلية للكيسة الأرومية إذ تم تثبيط بعض مورثاتها . لها القدرة على إعطاء أي نوع من الخلايا الجنينية ما عدا خلايا المشيماء .

قارن بين مواد التنسيق النباتية من حيث : الوظيفة الأساسية ، أماكن إنتاجها ؟


مادة التنسيق	الوظيفة الأساسية	أماكن إنتاجها
الأكسينات	• تنشيط استطالة الخلايا النباتية. • سداة القمة النامية (السيطرة القمة لتزرع الإنبات). • الانتداب الصوتي والإزهار.	• رشم القمة. • القمم النامية. • الأوراق الفتية.
السايتوكينينات	• تنشيط انقسام الخلايا ونمو الساق. • تأخير الشيخوخة.	• الجنور.
الجبرلينات	• تنشيط امتداد الجنور. • تنشيط استطالة الساق ونمو الأوراق. • تنشيط هطبات الإزهار ونمو الساق.	• الأوراق الفتية. • القمم النامية. • الجنور بكسفات صلبة.
حمض الأبسيسيك	• تنشيط نمو البراعم والجنور. • إغلاق المسام خلال الجفاف.	• الأوراق. • السوق.
الابتنين	• تسريع نضج الثمار ونسقلها. • نضج الأوراق الهرمة.	• الثمار الناضجة. • الأوراق الهرمة. • جميع الخلايا النضجة حتماً.

## الوحدة الأولى

### حل أسئلة تقويم ..؟

أولاً، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي

- 1- يكون كمون الغشاء ثابتاً في الخلية : الدقيقة.
- 2- يتحرر الناقل العصبي غلوتامات في الفالق المشبكي ليرتبط بمستقبلات نوعية تؤدي إلى فتح : قنوات التبوب الكيمائية.
- 3- ينتهي العصب العاشر المجهول إلى عضلة هيكلية ، ويحرر ناقلاً عصبياً يرتبط بمستقبلات نوعية تؤدي إلى فتح قنوات : شوارد الصوديوم .
- 4- يؤدي تحرير الاستيل كولين إلى تشكيل IPSP في : عضلة القلب .
- 5- تقوم المادة ( P ) بنقل حس الألم للدماغ وتعمل الأكتيفالينات بشكل معاكس لها أي تخفف حس الألم وذلك يتم من خلال الأكتيفالينات إذ تقوم ب : تعيق دخول شوارد الكالسيوم عبر الغشاء قبل المشبكي.
- 6- ألاحظ الرسم البياني المجاور وأجيب عن الأسئلة :  
 أ- يحدث زوال للاستقطاب في : B  
 ب- في المرحلة ( X ) يحدث : إزالة استقطاب ولا يبلغ كمون الغشاء حد العتبة .  
 ج- يكون استقطاب غشاء الليف في المرحلة ( D ) في حالة : فرط استقطاب.  
 د- يبلغ كمون الغشاء حد العتبة عند : E.  
 هـ- أحد هذه الهرمونات النباتية مسؤول عن نضج الثمار : الإبتلين.
- 7- ما العبارة التي لا تناسب المستقبلات الحسية : عصبونات متعددة الأقطاب .
- 8- يشكل فرط الاستقطاب كمون المستقبل في الخلايا الحسية : الضولية.
- 9- خلايا حسية تحرر ناقلاً عصبياً مشبباً في حالة الراحة : البصرية .
- 10- تحصل القرنية الشفافة على غذائها من : الخلط المائي




ثانياً، ينتهي أحد الأعصاب الحوضية إلى المثانة والمثالب،

- 1- ما تأثير تنبيهه على المثانة ؟ وما اسم الناقل العصبي المتحرر في نهايته؟
  - 2- أثر تنبيهه على المثانة : تقلص المثانة . الناقل العصبي المتحرر : الأستيل كولين.
  - 3- ما الأقنية الشاردية التي تفتح في الغشاء بعد المشبكي ؟ وما الكمون بعد المشبكي المتشكل ؟
  - 4- الأقنية الشاردية التي تفتح هي أقنية شوارد الصوديوم . الكمون المتشكل هو كمون بعد مشبكي تنبيهي.
- ثالثاً، هي الشبكية نوعان من الخلايا البصرية هما ، العصبي والمخاريط .
- 1- أي منهما يتنبه بالضوء الضعيف ؟ العصبي يتنبه بالضوء الضعيف .
  - 2- بماذا تختلف أصبغة المخاريط عن بعضها ؟ ماذا ينتج عن تنبيه أنواعها الثلاثة بنسب متساوية ؟
  - 3- تختلف أصبغة المخاريط عن بعضها : بنوع الحموض الأمينية الداخلة في تركيب الفوتوبسين بالتالي تختلف حساسيتها لأطوال الموجات الضولية .

مأعراض الإصابة بفيروس كورونا وكيف تتم الوقاية منه : أعراضه ارتفاع حرارة وسعال جاف و ضيق التنفس وسيلان مخاط من الأنف والتهام شديد.  
 الوقاية : غسل اليدين جيداً بالماء والصابون وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وتجنب لمس العينين والأنف والفم في حال ملامسة اليد لسطح ما  
 اختيار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- تتصف الفيروسات بمجموعة من الصفات التي تميزها ، إحدى العبارات الآتية لاتصف الفيروسات بدقة : خالياً من الأنظمة.
- 2- تتكون الفيروسات من عدد من البنى التي تتشابه بين جميع الأنواع الفيروسية ، وقد يختص بعضها ببنى لا توجد لدى غيرها من الفيروسات ، إحدى الأوصاف الطمعية الآتية صحيحة في الفيروسات :تساعد بروتينات غلاف الفيروس على الارتباط بسطح الخلية المضيفة .
- 3- بعد فيروس اكل الجراثيم من أشهر الفيروسات ، وأكثرها دراسة من الباحثين إن كان من حيث البنية أو دورة التكاثر ، إحدى العبارات العلمية الآتية لاتعد صحيحة فيما يخص فيروس اكل الجراثيم : بنمذج RNA الفيروسي مع المادة الوراثية للخلية المضيفة في دورة الاندماج.
- 4- يوضح الشكل المجاور بنية فيروس الإيبز ، أي الترتيبات الآتية يوافق الأرقام المحددة على الشكل :  
 ب- غلاف ذو طبيعة لسمية - كابسيد - RNA - أنظيم.




## الدرس الثاني : التكاثر عند الأحياء

ما الوظيفة الحيوية التي تنتج أفراد جديدة لدى الكائنات الحية ؟ وما أثر ذلك على أعداد الجماعة ؟  
 التكاثر . - تؤدي إلى الزيادة العددية في أفراد الجماعة ، وتحفظها من الانقراض .  
 ما الذي سيحدث لو توقف إنتاج أفراد جديدة تماماً ؟ سيقل عددها وقد تنقرض .  
 عدد أنماط التكاثر عند الأحياء ، موضحة كل منها؟

- 1- التكاثر الجنسي : عروس نكوية (n1) + عروس أنثوية (n1) = بيضة ملقحة (n2) فرد جديد. أو إنتاج أفراد جديدة بدءاً من بيضة ملقحة ، وهذه الأفراد تختلف عن الأبوين ببعض الصفات. أو تنتج الخليتين العروسيين من فرد واحد (خنثي) أو من فردين نكر وأنثى من نوع واحد وتختلف الأفراد الجديدة عن الأبوين ببعض الصفات .  
 2- التكاثر اللاجنسي : يتم فيه إعطاء فرد جديدة مطابقة للأصل من فرد واحد من دون إنتاج أعراس . أو تقسم الخلية الأصل إلى خليتين تتطابقان بالأصل عن مورثات الأصل أو ( لأن لها نفس التعليمات الوراثية ).  
 3- التكاثر البكري : فيه تتطور الخلايا الجنسية الأنثوية ( البيوض) التي ينتجها المبيض من دون الإقاح معطية أفراد جديدة .  
 فسر لا بعد التكاثر البكري تكاثراً جنسياً رغم أنه يتضمن إنتاج أعراس : لأنه يحدث دون الإقاح ، أي أن البيوض لا تتلقح وبالتالي ليس تكاثر جنسي (قارن بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي من حيث :  
 إنتاج الأعراس : التكاثر الجنسي ( تنتج خليتين عروسيين ) التكاثر اللاجنسي ( يتم دون إنتاج أعراس ) .  
 الأفراد الناتجة : التكاثر الجنسي ( تختلف عن أبويها ببعض الصفات الوراثية ) التكاثر اللاجنسي ( مطابقة للأصل ) .  
 عدد الأفراد عند التكاثر : التكاثر الجنسي ( إما فرد واحد خنثي أو من فردين نكر وأنثى من نوع واحد ) التكاثر اللاجنسي ( فرد واحد ) .  
 ما المقصود بالتكاثر ؟ وما الخطوات التي تتضمنها عملية التكاثر ؟ التكاثر : عملية حيوية تحفظ النوع من الانقراض وتؤمن له الزيادة العددية بما يتناسب مع الوسط المحيط . تتضمن عملية التكاثر نسخ المادة الوراثية ، ونقل المعلومات الوراثية من جيل إلى جيل بماذا يبدأ التكاثر لدى كثرات الخلايا ؟ بخلية واحدة.

يبدأ التكاثر لدى كثرات الخلايا بخلية واحدة فكيف أصبحت هذه الخلية كائناً بالغاً عبد الخلايا ؟ أو عند مراحل النمو بالترتيب ؟  
 زيادة عدد الخلايا : عن طريق الإنقسام الخيطي . زيادة حجم الخلايا : عن طريق تركيب المادة الحية .  
 التمايز الخلوي : التخصص الشكلي والوظيفي للخلايا لتشكيل النسيج والأعضاء المختلفة .  
 ما المقصود بالنمو ؟ هو زيادة في كتلة المادة الحية عن طريق تركيب المواد التي تتكون منها ، ولا سيما البروتينات .  
 أرتب مراحل النمو الآتية لكائن حي كثير الخلايا ؟

بيضة ملقحة ، انقسامات خيطية ، زيادة عدد الخلايا ، تركيب البروتين ، زيادة حجم الخلايا ، تمايز الخلايا .  
 فسر زيادة كتلة المادة الحية في أثناء عملية النمو ؟ بسبب تركيب المواد التي تتركب منها المادة الحية ولا سيما البروتينات .  
 كيف يُتمُّ الكائنات الحية دورة حياتها ( الفطريات والنباتات ) ؟ من خلال التكاثر والنمو .



بم يبدأ كل من الجيلين البوغي والعروسي ؟  
 الجيل العروسي : يبدأ بالإنقسام المنصف وتكوين الأعراس (n1) .  
 الجيل البوغي : يبدأ بالإقاح وتكون البيضة الملقحة (n2) .  
 ما الصيغة الصبغية لكل منهما؟ العروسي : (n1) . البوغي : (n2) .  
 ما نوع الإنقسام التي تنتج عنه ؟ أ- الأبوغ الجنسية: انقسام منصف ب- الأعراس : انقسام خيطي .  
 التكاثر اللاجنسي .  
 هل تمتلك جميع الأحياء تكاثراً لاجنسياً ؟ ما أنماط التكاثر اللاجنسي لدى الأحياء مع ذكر مثال ؟ لا .

مردوداتنا في ضوء هذا

المردودات هي ردودنا على ما نقرأه في النص، وهي تعبر عن آرائنا وأفكارنا الشخصية. يمكن أن تكون ردودا إيجابية أو سلبية، وتعتمد على فهمنا للنص وقيمتنا له. يجب أن تكون ردودنا واضحة وموجزة، وأن نذكر الأدلة التي تدعم آراءنا من النص.


# أفعالنا

أفعالنا هي ردودنا على ما نقرأه في النص، وهي تعبر عن آرائنا وأفكارنا الشخصية. يمكن أن تكون ردودا إيجابية أو سلبية، وتعتمد على فهمنا للنص وقيمتنا له. يجب أن تكون ردودنا واضحة وموجزة، وأن نذكر الأدلة التي تدعم آراءنا من النص.

## الوحدة الثانية

### الدرس الأول ، تكاثر الفيروسات

- أين تنتشر الفيروسات ؟ وكم يقدر عدد وحدات فيروس أكل الجراثيم في العالم المائي ؟ وكم تبلغ كتلته مقارنة مع كتلة البشر مجتمعين ؟  
تنتشر الفيروسات بأعداد هائلة في كل مكان حتى في طبقات الغلاف الجوي العليا . ( مثلأ فيروس أكل الجراثيم ) .  
يقدر عدد وحداته في العالم المائي ما يقارب  $10^{30}$  وحدة فيروسية .  
تبلغ كتلة أكلات الجراثيم مجتمعة مليار طن ، أي نحو ثلاثة أضعاف كتلة البشر مجتمعين .  
الاحظ الأشكال الآتية للفيروسات ، وأجيب عن الأسئلة الآتية :



- 1- ما المقصود بالفيروسات ؟ فيروس **virus** كلمة لاتينية تعني : السم - تعد بنى لا خلوية لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني ، مجبرة على التطفل الداخلي ، لخلوها من الأنظمة الاستقلابية ، وهي تسبب عدداً كبيراً من الأمراض ، وتؤدي إلى ظهور صفات جديدة للكائنات المضيفة .
- 2- ما البنى المشتركة بين مختلف الأنواع الفيروسية ؟ غلاف بروتيني ( محفظة ) - مادة وراثية ( RNA أو DNA ) .
- 3- ما المادة الوراثية لكل من الفيروسات الآتية : أكل الجراثيم : DNA . الفيروس الخدي : DNA . فيروس الإنفلونزا : RNA . فيروس فسيفساء التبغ : RNA .

ملاحظة : كل الفيروسات في بحثنا مادتها الوراثية RNA ماعداً فيروس أكل الجراثيم والفيروس الفدي DNA .

- 4- فسر الفيروسات لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني ؟ لأنها بنى لا خلوية .
- 5- فسر الفيروسات مجبرة على التطفل الداخلي ؟ لخلوها من الأنظمة الاستقلابية .
- 6- مم يتكون الفيروس ؟  
محفظة بروتينية (كابسيد) مكون من : وحدات بروتينية ، و يحاط بغلاف من طبيعة دسمة تخترقه بروتينات الغلاف في الفيروسات المغلفة .  
الللب الحاوي مادة وراثية ( DNA أو RNA ) : يحتوي الفيروس على أحد الحمضين النويين فقط ، بينما في الخلايا الحية نجد كلا الحمضين معاً .
- 7- كيف تصنف الفيروسات ؟ تصنف الفيروسات تبعاً لـ :  
لنوع مادتها الوراثية DNA أو RNA . بناءً على أسس أخرى كشكل الفيروس ، أو نوع الكائن المضيف ، أو طريقة الانتقال .
- 8- فسر الفيروسات طفيليات نوعية ؟ لأن كل نوع من الفيروسات يتطفل على نوع محدد من الخلايا ، إذ تمتلك نقاط استقبال نوعية له .
- 9- كيف يتعرف الفيروس على الخلية المضيفة ؟ عن طريق نقاط استقبال نوعية موجودة على سطحها .
- 10- فسر يسيطر الفيروس على الخلية المضيفة ؟ لتصنع نسخاً فيروسية عنه .
- 11- ما العلاقة بين الفيروسات والتقانة الحيوية أو ما استخدامات الفيروسات في التقانة الحيوية ؟  
تستخدم التقانة الحيوية للإفادة من بعض الفيروسات في المجالات الزراعية و الاقتصادية و الطبية .  
تستخدم الفيروسات ناقلاً لبعض المورثات المرغوبة في الهندسة الوراثية .  
تستخدم الفيروسات في مكافحة الحويبة ( فسر ) : إذ تقضي بعض أنواع الفيروسات على أنواع معينة من الحشرات أو التبتات غير المرغوب بها .  
الإفادة في علاج الأمراض مثلأ : علاج مرض النقص المناعي المختلط الشديد SCID ، وإنتاج اللقاحات .

أولاً : فيروس أكل الجراثيم :

ما المساران اللذان تمر بهما دورة التكاثر لدى الفيروس أكل الجراثيم ؟ - دورة التحلل . - دورة الاندماج .

أرتب مراحل دورة التحلل لدى أكل الجراثيم ؟ وبين سبب تسمية دورة التحلل بهذا الاسم ؟

المراحل : الالتصاق - الحقن - التضاعف - التجميع - الانفجار والتحرر .

سبب التسمية : لأنه يتم تحلل جدار الخلية الجرثومية وانفجارها لتحرر منها فيروسات جديدة في نهاية دورة التحلل .

في أي المراحل من دورة الاندماج يتضاعف DNA الفيروس ؟ كلما تكاثرت الخلية الجرثومية بالانشطار الثنائي .

ما الخلية المضيفة لفيروس أكل الجراثيم ؟ جرثومة العصية القولونية .

حدد موقع نقاط الاستقبال النوعية لفيروس أكل الجراثيم ؟ على جدار جرثومة العصية القولونية .

وضح دورة الاندماج ؟ يندمج DNA الفيروس مع DNA الموجود في صبغي الخلية المضيفة .


يتضاعف DNA الفيروس كلما تكاثرت الخلية .

في ظروف معينة يمكن أن يفصل DNA الفيروس عن DNA الخلية ويتابع التضاعف ضمن دورة التحلل .

وضح دورة التحلل ؟

الالتصاق : ترتبط خيوط الذيل بنقاط استقبال نوعية موجودة على جدار الخلية .

- ١- الحقن : يتقلص غمد الذئيل المحيط بالمحور المجوف ( ماذا ينتج ) مما يمكن نهاية المحور من الدخول إلى الخلية الجرثومية حلقاً المادة الوراثية ، ويبقى الغلاف البروتيني خارجاً .
- ٢- التضاعف : يتم تفكيك DNA الخلية ويتضاعف DNA الفيروس على حسابها ، كما يتم تركيب بروتينات الغلاف والذئيل و أنظيـم الليـوزيم .
- ٣- التجميع : يتم تجميع مكونات الفيروس وتكوين فيروسات جديدة
- ٤- الانفجار و التحرر : يتحرر نحو 100 إلى 200 فيروساً جديداً بعد تحلل جدار الخلية الجرثومية .
- ٥- حدد موقع القصد الذئلي للفيروس أكل الجراثيم و أنظيـم الليـوزيم ؟
- ٦- القصد الذئلي للفيروس أكل الجراثيم : يحيط بالمحور المجوف للفيروس . أنظيـم الليـوزيم : في الصليحة القاعدية للفيروس أكل الجراثيم
- ٧- ما وظيفة أو ما أهمية أنظيـم الليـوزيم ؟
- ٨- يساعد أنظيـم الليـوزيم الموجود في الصليحة القاعدية لأكل الجراثيم في مرحلة الحقن ( فسر ) إذ يمكن نهاية المحور من دخول الخلية الجرثومية .
- ٩- يحل جدار الخلية الجرثومية في مرحلة الانفجار و التحرر .
- ١٠- ثانياً : فيروس الإيدز :



أنق في الشكل الذي يوضح بنية فيروس الإيدز ، وأجب عن الأسئلة التي تلي الشكل :

- ١- ما المادة الوراثية لفيروس الإيدز ؟ جزيئان منفصلان من RNA .
- ٢- كم غلظاً بروتينياً للفيروس ؟ المحلظة أو الكاسيد . - غلاف بروتيني يحيط بالكاسيد .
- ٣- ما طبيعة الغلاف الخارجي ؟ من طبيعة سمسة تخترقه بروتينات الغلاف .
- ٤- أرتب مكونات الفيروس من الخارج إلى الداخل ؟
- ١- غلاف خارجي مضاعف ذو طبيعة سمسة تخترقه بروتينات الغلاف .
- ٢- يليه غلاف بروتيني يحيط باللب المكون من غلاف بروتيني ( كاسيد ) . في وسطه جزيئان منفصلان من ال RNA .
- ٣- حدد موقع الجزيئان المنفصلان من ال RNA : في وسط الكاسيد
- ٤- ويجوار كل منهما أنظيـم النسخ التعاكسي .
- ٥- حدد موقع أنظيـم النسخ التعاكسي : بجوار الجزيئان المنفصلان من ال RNA في وسط الكاسيد لدى فيروس الإيدز
- ٦- هل تعلم : يعد فيروس الإيدز مثالا عن الفيروسات الارتجاعية ( النسخ التعاكسي ) التي تحتوي على RNA كمادة وراثية
- ٧- ما الخلية المضيفة للفيروس الإيدز ؟ للمفيمات التلقية .
- ٨- حدد موقع نقاط الاستقبال البروتينية للفيروس الإيدز ؟ على سطح المفيمات التالية .
- ٩- رتب مراحل تكاثر فيروس الإيدز ؟
- ١- يتعرف فيروس الإيدز للمفيمات النائية ( كيف) : بوساطة مستقبلات بروتينية نوعية موجودة على سطحها .
- ٢- يندمج غلاف الفيروس مع غشاء الخلية المضيفة ، و تنفك بروتينات الكاسيد ( ماذا ينتج ) : محررة بروتينات الفيروس و ال RNA .
- ٣- يقوم أنظيـم النسخ التعاكسي : بنسخ سلسلة DNA الفيروسي بدءاً من RNA الفيروسي . ما وظيفة أنظيـم النسخ التعاكسي
- ٤- أ- تضاعف سلسلة DNA الفيروسي . ب- يندمج خيط ال DNA الفيروسي مع DNA الخلية المضيفة .
- ٥- أ- يتم انتساخ ال RNA الفيروسي عن DNA الفيروسي .
- ب- يتم تركيب بروتينات الفيروس وأنظيـم النسخ التعاكسي بوساطة mRNA الفعال . ما وظيفة mRNA الفعال
- ج- تنقل حويصلات من الشبكة الهيولية الداخلية الخشنة بروتينات الغلاف الخارجي للفيروس إلى الغشاء الهولي للخلية .
- ٦- ما وظيفة حويصلات الشبكة الهيولية الداخلية الخشنة للفيروس الإيدز
- ٧- يتم تجميع الوحدات البروتينية للكاسيد حول جزيئتي RNA ، وأنظيـم النسخ التعاكسي .
- ٨- يغادر الفيروس الجديد مع الغلاف البروتيني الخلية بطريقة التبرعم . كيف يتحرر فيروس الإيدز من الخلية المضيفة
- ٩- قارن بين طريقة تحرر كل من فيروس الإيدز وفيروس أكل الجراثيم ؟
- ١٠- يتحرر فيروس الإيدز بطريقة التبرعم . أما فيروس أكل الجراثيم فيتحرر مباشرة بعد تحلل جدار الخلية الجرثومية بتأثير أنظيـم الليـوزيم .
- ١١- ما الخلايا التي يهاجمها فيروس الإيدز ؟ وماذا ينتج عن ذلك ؟
- ١٢- يهاجم الخلايا النائية المساعدة ( المفيمات النائية ) ( ينتج من ذلك ) حلها ، فتتغلل آليات الاستجابة المناعية .
- ١٣- بعد مرض الإيدز ومرض الرشح من الأمراض الفيروسية الشائعة التي تتعرض لها أجسامنا ، قارن بينها من حيث : العامل الممرض ، الأعراض ، طرائق العدوى ؟
- ١٤- الإيدز ( الكريب ) : العامل الممرض : فيروس . - الأعراض : ارتفاع حرارة الجسم و الإحساس بالقشعريرة وآلام في العضلات والشعور بالوهن ، وسعال جاف و التهاب رئوي . - طرائق العدوى : السعال والعطس والتماس المباشر مع المفرزات الأنفية للجهاز التنفسي للمصاب .
- ١٥- الزكام ( الرشح ) : - العامل الممرض : عدة أنواع فيروسية أهمها الفيروس الأنفي . - الأعراض : سيلان الأنف و التهاب الحلق . - طرائق العدوى : السعال والعطس والتماس المباشر مع المفرزات الأنفية للجهاز التنفسي للمصاب .
- ١٦- ما المقصود بفيروس كورونا ( COVID-19 ) : من الفيروسات المقلدة يحتوي على سلسلة من ال RNA يتسبب بمرض المتلازمة التنفسية الحادة ومدة حضنة الفيروس حوالي 14 يوم .

ينتج عن تنبيه الأتواع الثلاثة من المخاريط بنسب متساوية الإحساس برؤية اللون الأبيض.  
ما اسم المنطقة على الشبكية التي تحوي مخاريط فقط؟ ولماذا تكون حدة الإبصار فيها عالية؟ الحفيرة المركزية أو النقرة.  
تكون حدة الإبصار فيها عالية: لأنها تحوي مخاريط فقط ويتقابل المخروط الواحد مع ليف واحد من ألياف العصب البصري.  
ما أهمية الفيتامين (A) للخلايا البصرية؟ يشكل جذر أدهيد الفيتامين A (الريتينال) الضروري لتركييب الأصبغة الضوئية.  
رابعاً، ماذا ينتج من كل مما يأتي.

نقص إفراز ADH: السكري الكاذب أو تزداد كمية الماء التي يطرحها الجسم مع البول.  
انسداد ثقبى لوشكا وثقب ما جندي: استسقاء دماغي.

قطع الألياف العصبية الواردة من التشكيل الشبكي والمهادين: السبات الدائم.

زيادة قيمة كيون المستقبل في الخلية الحسية: زيادة عدد كمونات العمل وزيادة شدة الإحساس.

تنبيه تفرعات النهايات العصبية الحرة في بشرة الجلد بمنبهات تسبب أذية في النسيج الضامة: حس الألم.

تقلص العضلة الشادة الركابية: تسحب الصفيحة الركابية نحو الخارج وتخفيف حركة الركاب على غشاء الناظفة البيضية.

خامساً، اختار وظيفة واحد لكل هرمون مما يأتي

الميلاتونين: تفتيح البشرة أو تنظيم الساعة البيولوجية.

السايتوكينينات: تأخير الشيخوخة أو تنشيط انقسام الخلايا والنمو والتمايز.

خلايا الدبق قليلة الاستطالات: تشكل غمد النخاعين حول محاور الخلايا العصبية في المادة البيضاء

سادساً، أفسر علمياً كل مما يأتي.

لا تستجيب الخلية لمنبهات جديدة في زمن الاستعفاء المطلق.

بسبب بقاء قنوات الصوديوم مغلقة وفرط الاستقطاب الناتج عن تدفق شوارد البوتاسيوم إلى خارج الخلية بكميات كبيرة.

تحديد وظائف مناطق معينة من الدماغ باستخدام التصوير الرنيني المغناطيسي: لأنه ضمن هذا التصوير يتم وضع المريض في حقل مغناطيسي كبير ويتم الكشف عن نشاط الدماغ في منطقة معينة من خلال التغيرات في تراكيز الأوكسجين في تلك المنطقة.

يبقى حس الألم بالرغم من تخريب البحوث الحسية الجسمية في نصفي الكرة المخية. لأن مراكز الشعور بالألم تتوضع في التشكيل الشبكي لجذع الدماغ والمهاد بينما يقتصر دور القشرة المخية (الباحات الحسية الجسمية) على تحديد مكان وصفة الألم.

لا يحيط غمد النخاعين بالمحوار في القطعة الأولية: للشوء كمونات عمل.

لا يحيط غمد النخاعين بالمحوار في اختناقات رائقبيه: لانتقال التيارات المحلية وكمون العمل.

لا يحيط غمد النخاعين في نهاية المحوار: لنقل السائلة إلى العصبونات التالية.

يسبب انثناء أهداب الخلية الحسية السمعية زوال استقطاب غشائها: بسبب فتح قنوات البوتاسيوم وانتشار شوارد البوتاسيوم إلى الداخل.

سابعاً، قارن بين كل مما يأتي.

الذاكرة القصيرة الأمد والذاكرة طويلة الأمد من حيث:

نوع المشابك: الذاكرة القصيرة الأمد (مؤقتة) الذاكرة طويلة الأمد (دائمة).

مكان تشكل المشابك: الذاكرة القصيرة الأمد (الحصين) الذاكرة طويلة الأمد (قشرة المخ).

حس اللمس الدقيق وحس الحرارة من حيث:

مكان تصالب أليافها: حس اللمس الدقيق (البصلة السيسالية) حس الحرارة (النخاع الشوكي).

المستقبل الحسي لكل منهما في الجلد: حس اللمس الدقيق (جسيمات مايسنر) حس الحرارة (جسيمات روفيني).

ثامناً، دراسة حالة.

أ- أعلم أن غاز السارين مشبط لا تنافسي لأنظيم الكولين أستيراز، كيف أفسر موت الشخص اختناقاً عند استنشاق هذا الغاز؟

يستمر تأثير الأستيل كولين المنبه لعضلة الحجاب الحاجز مما يؤدي لتشنجها نتيجة التقلص المستمر فتتوقف عملية التنفس.

أعلم أن عملية الإدمان من الظواهر السلبية التي تحدث من التعاطي المستمر للتبغ مما يعطي للمدخن إحساساً مؤقتاً بالسعادة.

أ- لماذا نشعر بالقلق والاكتئاب عند محاولة الإقلاع عنه: لأن النيكوتين يزيد من إفراز الدوبامين الذي يعطي إحساساً بالسعادة ويؤدي الانقطاع لتناقص إفراز الدوبامين مما يعطي الإحساس المعاكس.

ب- أقدم بعض النصائح التي تحث المدمنين على الإقلاع عن التدخين: يمكننا الإقلاع عن التدخين وبشكل تدريجي يسمح للجسم

التأقلم مع الوضع الجديد وبالتالي عودة الدوبامين لوضعه الطبيعي وبالتالي التخلص من الإدمان.

رجع هشام من المدرسة جالماً وعندما دخل باب منزله شم رائحة طعام شهية قادمة من المطبخ فشعر بزيادة في إفراز اللعاب في

فمه المطلوب: أ- ماذا أسمى هذا الفعل المنعكس ولماذا؟ منعكس شرطي. لأن حدوثه مرتبط بوجود منبه ثانوي (شرطي) يعمل

المخ على ربطه مع الاستجابة.

ب- أرتب عناصر هذه القوس الانعكاسية؟ الأنف - عصبون (حسي) - جابد - القشرة المخية - البصلة السيسالية - عصبون نابذ مفرز -

الغدد اللعابية وإفراز اللعاب. ج- ما أهمية هذا الفعل في عملية الهضم؟ زيادة الشهية وزيادة إفراز العصارات الهاضمة



- أنماط التكاثر اللاجنسي :

- 1- الانتشار الثنائي : البرامسيوم ( وحيد الخلية ) والجراثيم. - التبرعم أو البرعمة : هيدرية الماء العذب و نبات الكالاشو وهو نبات زهري . 3- أجزاء من الجهاز الإعاشي ( عند النباتات الزهرية ) ومنه : أ- الجنور الدرنية : الأضاليا . ب- الساق الدرنية : البطاطا .
- 4- التبوغ : فطر عفن الخبز . - التجزؤ والتجديد : البلاتريا والهيدرية .

متى يتم التكاثر اللاجنسي لدى الأحياء ؟ في الشروط المناسبة .

فسر تضاعف المادة الوراثية شرط لازم لبدء عملية الانتشار الثنائي ؟

لتتوزع المادة الوراثية على الخليتان الناتجتان.

التكاثر البكري.

أولاً: برغوث الماء :

أين يتم حضن البيوض حتى تفلح لدى برغوث الماء ؟ في الجيب الحاضن .

ما الصيغة الصبغية للبيض البكري وفي أي الفصول يتم إنتاجه؟

الصيغة الصبغية ( n2 ) ، يتم إنتاجه في فصل الربيع والصيف ( الحرارة العالية ) .

ماذا تعطي أنثى برغوث الماء في فصل الربيع والصيف ( الحرارة العالية ) ؟

تعطي بيوضاً غير ملقحة ( n2 ) تتطور داخل الجيب الحاضن معطية إنثاً فقط .

ماذا ينتج من البيوض غير الملقحة ( n2 ) لدى أنثى برغوث الماء في فصل الربيع والصيف ( الحرارة العالية ) : إنثاً فقط )

تعطي أنثى برغوث الماء في بداية الخريف ( بدء انخفاض الحرارة ) ، نوعين من البيوض غير الملقحة ( البكرية ) ما هي؟

1- بيوض n1 تتطور بكرياً لتعطي ذكوراً . 2- بيوض n2 تتطور بكرياً لتعطي إنثاً .

ماذا ينتج من البيوض غير الملقحة البكرية ( n2 ) و ( n1 ) لدى أنثى برغوث الماء في بداية الخريف ( بدء انخفاض الحرارة ) : ( n1 ) نكور ، ( n2 ) إنث )

فسر تنتج الذكور والإناث الخريفية أعماراً n1 ؟ من أجل التكاثر الجنسي .

فأرن بين بيض الصيف البكري n2 و بيض الخريف البكري n1 لدى أنثى برغوث الماء من حيث :

ماذا ينتج عن كل منهما : الصيف البكري n2 ( إنث ) بيض الخريف البكري n1 ( نكور )

فأرن بين نوعي البيض الخريفي البكري لدى أنثى برغوث الماء من حيث :- الصيغة الصبغية : بيوض غير ملقحة n1 / بيوض غير

ملقحة n2 . - ماذا ينتج منها : بيوض غير ملقحة n1 ( نكور ) بيوض غير ملقحة n2 ( إنث ) .

فسر تكون الصيغة الصبغية للبيوض غير ملقحة n2 ؟ بسبب عدم انفصال الصبغات في طور الهجرة من الانقسام المنصف .

ثانياً : النحل :

كم نوع من البيوض تعطي ملكة النحل ؟ وماذا سيعطي كل نوع بنموه ؟

1- بيوض بكري غير ملقح (n1) يتطور إلى ذكور . 2- بيوض ملقح (n2) ناتج عن تكاثر جنسي يتطور إلى إناث عاملات أو ملكات حسب التغذية .

فأرن بين نوعي البيوض التي تضعها ملكة النحل من حيث :

1- الصيغة الصبغية : بيوض بكري غير ملقحة ( n1 ) بيوض ملقحة ( n2 ) .

2- ماذا ستعطي كل منهما : بيوض بكري غير ملقحة ( نكور ) بيوض ملقحة ( إناث عاملات أو ملكات حسب التغذية ) .

الدرس الثالث ، التقانات الحيوية في التكاثر الخلوي الجذبية

يوجد لدى مزارع شجرة عنب ذات نوعية ممتازة وأراد أن يزرع مستقلاً كاملاً من الشجرة نفسها .

كيف يمكن الحصول على عدد كبير من الشتلات المطابقة لهذه الشجرة ؟ بطريقة نباتات الأنابيب بثلاث حالات :

1- خلايا عروسية 2- خلايا متميزة 3- خلايا غير متميزة

كيف نحصل على نباتات مطابقة للأصل بأعداد كافية ؟ بطريقة نباتات الأنابيب بحالات ثلاث بدءاً من :

1- خلايا عروسية 2- خلايا متميزة 3- خلايا غير متميزة

عدد بعض العمليات التي تعطي نباتات مطابقة للأصل ولكن بأعداد محدودة : التلقيح ، التطعيم ، الترقيد .

ما مراحل الحصول على خلايا مطابقة للأصل بدءاً من خلايا عروسية n1 (حبة طلع فتية n1) ؟

1- توضع حبة طلع فتية n1 في وسط صناعي مغذ يحوي مواد نمو معينة ( ماذا ينتج ) فتقسم خيطياً لتعطي كتلة خلوية غير متميزة .

2- تعالج الكتلة الخلوية بالكولشيسين ( ماذا ينتج ) فتضاعف الصيغة الصبغية لخلاياها . - فسر تعالج الكتلة الخلوية بالكولشيسين أوما وظيلة الكولشيسين

3- تجزأ الكتلة الخلوية غير المتميزة ، وتوزع على أنابيب في وسط مغذ ( ماذا ينتج ) لتعطي نباتات جديدة مطابقة للأصل .

ما مراحل الحصول على نباتات مطابقة للأصل بدءاً من خلايا متميزة n2 ؟

1- تعزل خلية متميزة n2 و يفضل أن تكون برانشيمية ( فسر ) لسهولة إعانتها إلى الحياة الجنينية .

2- تعالج أنظيمياً ( فسر ) لإزالة الجدار الخلوي مع احتفاظها بنشاطها الحيوي ( الانقسام )

3- تزرع في أنابيب زجاجية تحوي أوساطاً مغذية ومواد نمو فتعطي بتفصلها ( ماذا ينتج ) كتلة خلوية غير متميزة .

4- تجزأ الكتلة الخلوية غير المتميزة ، وتوزع على أنابيب في وسط مغذ ( ماذا ينتج ) لتعطي نباتات جديدة مطابقة للأصل .

ما مراحل الحصول على نباتات مطابقة للأصل بدءاً من خلايا غير متميزة ؟

فسر اختلاف تركيز الاوكسين بين الطرف المضاء والطرف المظلل ؟  
بأن الأوكسينات في الطرف المضاء تتخرب بفعل الضوء وينتج عن ذلك مركبات تعوق النمو.  
ماذا ينتج من تخرب الأوكسينات بفعل الضوء ؟ مركبات تعوق النمو.  
ثانياً : الانجذاب الأرضي :

أقوم بتثبيت بادرة نبات نامية في وضع أفقي لمدة يومين أو ثلاثة ماذا تلاحظ ؟  
انحناء طرف الساق نحو الأعلى وانحناء طرف الجذر نحو الأسفل ما سبب ذلك ؟  
فسر الساق الموضوعه أفقياً تنمو نحو الأعلى ؟ لأن الأوكسينات تتجمع بتركيز مرتفع في الجهة السفلية للساق بتأثير الجاذبية الأرضية ، والتركيز المرتفع للأوكسين في الساق منشط نمو فتنمو الجهة السفلية ذات التركيز المرتفع أكثر من الجهة العلوية .  
فسر الجذور الموضوعه أفقياً تنمو نحو الأسفل ؟ لأن الأوكسينات تتجمع بتركيز مرتفع في الجهة السفلية للجذر بتأثير الجاذبية الأرضية ، والتركيز المرتفع للأوكسين في الجذر مثبط نمو فتنمو الجهة العلوية ذات التركيز المنخفض أكثر من الجهة السفلية .  
بتأثير ماذا تنتقل الأوكسينات إلى الأسفل ولماذا ؟ بتأثير الجاذبية الأرضية . لماذا : لأن الأوكسينات ذات وزن جزيئي مرتفع .  
أستنتج الانجذاب الأرضي للساق والجذر لبادرة موضوعة أفقياً؟ ينمو الساق نحو الأعلى أي انجذاب أرضي سالب ، بينما الجذر نحو الأسفل أي انجذاب أرضي موجب .

### دور مواد التنسيق النباتية في بعض العمليات الحيوية :

- ما تأثير مواد التنسيق النباتية في عملية الإزهار :
- تنشط الجبرلينات عملية الإزهار ، وتصنع في البراعم الورقية ، وتنتقل إلى البراعم الزهرية التي تتفتح إلى أزهار.
- ماذا تنشط الجبرلينات : تنشط الجبرلينات عملية الإزهار / وأين تصنع : تصنع في البراعم الورقية وإلى أين تنتقل : تنتقل إلى البراعم الزهرية التي تتفتح إلى أزهار )
- التربيع ( مالمقصود به ) : إن تعرض بعض النباتات المعمرة لدرجات الحرارة المنخفضة ( 4+ ) درجة لمدة 2-3 أسابيع تدفع معظم النباتات للإزهار ( فسر ) بسبب ازدياد معدل الجبرلينات.
- كيف يمكن تنشيط عملية الإزهار؟ يتم تنشيطها عند رش النباتات غير الخاضعة للتربيع بالجبرلينات.
- ما تأثير مواد التنسيق النباتية في نضج الثمار؟ إن هرمون الإيثيلين المسؤول عن نضج الثمار ينتج في جميع الخلايا الحية للنبات وهو غاز له القدرة على الانتشار خلال المسافات بين الخلايا للنبات وتزداد كمية الهرمون المنتج كلما ازدادت الثمار نضجا.
- ما دور هرمون الإيثيلين : مسؤول عن نضج الثمار / أين ينتج : في جميع الخلايا الحية للنبات / أين ينتشر في النبات : هو غاز له القدرة على الانتشار خلال المسافات بين الخلايا للنبات متى تزداد كميته : كلما ازدادت الثمار نضجا
- ماذا ينتج عن تعرض النباتات لتيار هوائي ، أو تعرضها لغاز CO2 المشبط لهرمون الإيثيلين؟ يتأخر نضج ثمارها .
- عند شرائك الموز غير الناضج كيف تسرع عملية النضج في المنزل؟ نضع معه ثمار ناضجة تنتج الإيثيلين فينضج .
- ما دور مواد التنسيق النباتية في تكون الجذور العرضية؟ إن وجود براعم ساقية على العقل النباتية ( ماذا ينتج ) ينشط تكوين الجذور العرضية في قواعدها ( فسر ) بسبب انتقال الأوكسين من البراعم إلى الأجزاء السفلى لهذه العقل.
- فسر تغمس قواعد العقل النباتية لاسيما صعبة التجذير بمحلول منخفض التركيز للأوكسين؟ لتنشيط تكوين الجذور العرضية في قواعدها .
- ما دور مواد التنسيق النباتية في تكوين ثمار بلا بذور ؟
- تؤدي عملية الإخصاب إلى تشكل البذور الفتية التي تنتج الأكسينات ( ماذا ينتج ) مما ينشط تحول المبيض إلى ثمرة .
- وفي بعض الأنواع تتشكل الثمار بدون بذور بشكل طبيعي كالموز والأناناس والعنب (تكون بكري طبيعي)
- فسر : لأن مبايض أزهارها تحوي كميات كافية من الأوكسين لتشكل الثمرة.
- فسر ثمار الموز والأناناس والعنب لا تحوي بذورا أو تكون بكري طبيعي : لأن مبايض أزهارها تحوي كميات كافية من الأوكسين لتشكل الثمرة )
- عند رش الأزهار غير الملقحة بالأوكسينات ( ماذا ينتج ) يؤدي إلى تكون بكري للثمرة (ثمار بلا بذور ) كالبندورة والفريز المزروعة في البيوت البلاستيكية (تكون بكري صناعي).
- فسر ثمار البندورة والفريز لا تحوي بذورا أو تكون بكري صناعي : بسبب رش أزهارها غير الملقحة بالأوكسينات مما يؤدي إلى تكون بكري للثمرة )
- تكون بكري صناعي .
- إن رش أزهار العنب بالأوكسينات ( ماذا ينتج ) يزيد طول السلاميات (المسافات بين الأزهار) مما يسمح بنمو الثمار بشكل أكبر.
- فسر تنمو ثمار العنب بشكل أكبر عند رشها بالأوكسينات : لأن رش أزهار العنب بالأوكسينات يزيد طول السلاميات مما يسمح بنمو الثمار بشكل أكبر )

- حدد موقع الحصول على الخلايا الجذعية متعددة الإمكانات : الخلايا الجنينية أو خلايا الكتلة الخلوية الناقلة للكيسة الأرومية
- ما الشرط اللازم لتعطي الخلايا الجذعية متعددة الإمكانات أي نوع من الخلايا الجنينية ماعدا خلايا المشيمة : إذ تم تثبيط بعض مورثاتها
- 3- الخلايا الجذعية محدودة الإمكانات (الأرومية) عند البالغ : مثل الخلايا الموجودة في لب السن ونقي العظم .
- من أين نحصل على الخلايا الجذعية محدودة الإمكانات (الأرومية) عند البالغ : من الخلايا الموجودة في لب السن ونقي العظم .
- فسر لاستطيع الخلايا الأرومية إعطاء إلا عدد محدد من الخلايا : لأنها من الخلايا الجذعية محدودة الإمكانات عند البالغ
- ماهي أهم استخدامات الخلايا الجذعية ؟**
- 1- تم استخدام علاجات الخلايا الجذعية للبالغين بنجاح لسنوات عديدة لعلاج سرطان الدم وسرطان العظام من خلال زرع نقي العظم .
- 2- تتم حالياً تجارب على الخلايا الجذعية لكي تعطي نوعاً محدداً من النسيج لعلاج الأمراض المستعصية مثل الزهايمر ، أمراض القلب .
- فسر الخلايا الجذعية للبالغ أكثر فائدة علاجية من الخلايا الجذعية الجنينية ؟**
- لأن خطر الرفض غير موجود لدى الحصول على الخلايا الجذعية البالغة من الشخص ليعاد زرعها في جسمه بعد معالجتها ( الطعم الذاتي ) ، بعكس خلاياها الجذعية الجنينية التي أخذت منه في وقت سابق ، لأن معقد التوافق النسيجي الأعظمي يتغير خلال مراحل نمو الفرد .

## ورقة عمل



- أبحث أكثر عن تطور أبحاث الخلايا الجذعية في الجمهورية العربية السورية واستخداماتها الطبية .
- تطورت أبحاث الخلايا الجذعية في الجمهورية العربية السورية حيث أحدث فيها الهيئة العامة للبحث العلمي والتدريب وأحد أهم اهتماماتها هو إجراء البحوث عن الخلايا الجذعية.
- ولأهمية الخلايا الجذعية خصص مشفى الأسد الجامعي بنك حيوي للاحتفاظ بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري للمواليد الجدد.
- وأهم الاستخدامات الطبية لها : أ- معالجة بعض حالات العمى . ب- إمكانية استئصال نسيج وأعضاء بدءاً منها . ج- تعد حقلًا للمعالجة الوراثية.
- ضع كلمة صح في نهاية العبارة الصحيحة في كل مما يأتي :
- 1- في تقانة نباتات الأنابيب :
- 1- يتم إنتاج نباتات مطابقة للأصل . صح
- 2- يكون الإنتاج بأعداد كبيرة . صح
- 3- يستخدم الكولشيسين مع الخلايا البرانشيمية لإزالة الجدار الخلوي . غلط
- إنتاج نباتات الأنابيب بدءاً من الخلايا الجنينية أقل كلفة من باقي أنواع الخلايا . صح
- تستخدم الأنظمة مع الخلايا الجنينية لإزالة الجدار الخلوي . غلط
- 2- في تجارب استئصال الحيوانات :
- 1- لا يمكن الاستئصال عن ذكور الحيوان في تجارب الاستئصال . غلط
- 2- يكون الكائن الناتج مطابقاً للكائن مصدر النواة . صح
- 3- يلزم لاستئصال 64 بقرة عالية الجودة ثلاث بويضات ملقحة . غلط
- 3- الخلايا الجذعية :
- 1- من أهم ميزات الخلايا الجذعية التجديد الذاتي . صح
- 2- الخلايا الجذعية متعددة الإمكانات تحوي مورثات مثبطة أكثر من الخلايا الأرومية . غلط
- 3- الخلايا الجذعية كاملة الإمكانات تستطيع التعبير عن جميع مورثاتها . صح
- تعد الخلايا الجذعية للبالغ أفضل من الخلايا الجذعية الجنينية لعلاج الأمراض . صح
- ترتيب الخلايا الجذعية وفق تسلسل ظهورها الزمني كما يلي : محدودة الإمكانات - خلايا كاملة الإمكان - متعددة الإمكان . غلط


## المدرس الرابع : التكاثر لدى الجراثيم والضرطريات

- اصيب زميلي بذات الرنة أخبره الطبيب أن الالتهاب الجرثومي انتشر بسرعة داخل الرنتين بعد النقاظه العدوى من شخص مريض .
- وتساءل كيف زادت كمية الجراثيم التي دخلت إلى الرنتين مع الشهيق إلى كمية هائلة انتشرت في معظم الرنتين خلال يومين فقط ؟
- ذلك بسبب تكاثر الجراثيم بعملية الانشطار الثنائي الذي يؤدي إلى الزيادة العددية السريعة للجراثيم .
- تتكاثر الجراثيم بطريقتين ما هما ؟ 1- الانشطار الثنائي 2- الاقتران
- أولاً : الانشطار الثنائي :**
- إلى ماذا يؤدي الانشطار الثنائي ؟ يؤدي إلى الزيادة العددية السريعة للجراثيم .
- ماذا يحوي الجسم الوسيط ؟ يحوي أنظيومات تضاعف DNA ويعطي الخيوط البروتينية .
- ما وظيفة الجسم الوسيط ؟ يقوم بدور مهم في تضاعف ال DNA و انلصاله إلى خيطين .
- له دور في تركيب الغلاف الخلوي الجديد وذلك عند انخماص غلاف الخلية المنشطرة . 3- ويعطي الخيوط البروتينية
- ما وجه التماثل بين الخلايا الناتجة والخلية الأصل في الانشطار الثنائي؟ ولماذا ؟ الأفراد الناتجة مطابقة للأصل ، لأن لها المادة الوراثية ذاتها للخلية الأصل
- ما وظيفة الخيوط البروتينية لدى الجراثيم ؟ لها دور في هجرة الصبغين إلى طرفي الخلية في أثناء انخماصها من المنتصف .
- فسر للجسيم الوسيط دور مهم في عملية الانشطار الثنائي ؟ لأنه يحتوي على أنظيومات تضاعف ال DNA ويعطي الخيوط البروتينية التي لها دور في هجرة الصبغين إلى طرفي الخلية في أثناء انخماصها من المنتصف .
- فسر تعد عملية الانشطار الثنائي نوع من التكاثر اللاجنسي ؟ لعدم تشكل الأعراس وعدم حدوث إقحاح والأفراد الناتجة مطابقة للأصل .
- كيف تنشأ السلالات الجديدة لدى الجراثيم ؟ بتكاثرها جنسياً في الظروف البيئية غير المناسبة .
- ثانياً : الاقتران**
- كيف نميز بين الخلية الماتحة والخلية المتقبلة من خلال المحتوى ؟
- 1- الخلية الماتحة: تحوي صبغى جرثومي و DNA حلقي يدعى بلاسميد الإخصاب.

فسر سبب تسميها  
ما المقصود بـ  
نباتات وعاء  
عدد أنواع  
ما المقصود  
فسر  
ما

- 1- تنقسم كل حبة طلع فتية  $n1$  انقساماً خيطياً فتعطي خليتين هما ( ماذا ينتج ) : الخلية الإعاشية  $n1$  (الخلية الإباتية) . الخلية التوالدية  $n1$  .
- 2- بتضاعف غلاف كل حبة إلى غلافين : غلاف داخلي رقيق سللوزي : يمتد فيما بعد ليشكل طبقة مستمرة مع جدار الأنبوب الطلي في أثناء إنتاش حبة الطلع. بماذا يتميز الغلاف الداخلي الرقيق السللوزي لحبة الطلع الناضجة أو ماذا ينتج عنه أو ما دوره ..
- غلاف خارجي ثخين متقشر : ذو تربيئات نوعية وفجوات صغيرة تملأ عادة بمواد غليكوبروتينية. بماذا يتميز الغلاف الخارجي للثخين المتقشر
- ما وظيفة المواد الغليكوبروتينية التي تملأ فتحات الإنتاش الموجودة في الغلاف الخارجي لحبة الطلع الناضجة ؟
- لها دور مهم للتوافق مع مفرزات الميسم الذي يستقبلها .

- بماذا يمثل النبات العروسي الذكر في مغلقات البذور وما صوته الصبغية؟ بحبة الطلع الناضجة ،  $n1$  .
- بماذا تختلف حبات الطلع عن بعضها؟ تختلف بالشكل والحجم والتربيئات النوعية لغلافها الخارجي ، ولذلك لها أهمية تصنيفية.
- فسر لحبات الطلع أهمية تصنيفية : لأنها تختلف بالشكل والحجم والتربيئات النوعية لغلافها الخارجي (
- ماذا يوجد على سطح حبات الطلع؟ أو ما المقصود بفتحات الإنتاش ؟فتحات صغيرة تسمى فتحات الإنتاش ( دورها ) يخرج منها الأنبوب الطلي .
- حدد موقع فتحات الإنتاش : على سطح حبات الطلع الناضجة (



- ارسم البذيرة الناضجة وأحدد البنى التي توجد فيها ولا توجد في البذيرة الفتية ...
- مم تتكون البذيرة الناضجة في مغلقات البذور ؟ لحافتان خارجية وداخلية : تتركان فتحة تدعى الكوة.
- النوسيل  $n2$  : النسيج المغذي الأساسي في البذيرة ، الكيس الرشيبي : يضم ثماني نوى  $n1$  تشكل خلايا ،
- في القطب القريب من الكوة العروس الأنثوية ( البويضة الكروية ) ، وعلى جانبها خليتان مساعدتان ،
- وفي القطب المقابل للكوة ثلاث خلايا قطبية ، وفي مركز الكيس الرشيبي نواتا الكيس الرشيبي  $n1$  لكل منهما.
- ما الخلايا الموجودة في الكيس الرشيبي وأين يقع : في نوسيل البذيرة الناضجة (
- الحبل السري : يصل البذيرة بجدار المبيض في منطقة تسمى المشيمة . كما يدعى : مكان اتصال البذيرة بالحبل السري التقير أو السرة .
- ماذا يضم الكيس الرشيبي وماذا يمثل ؟ يضم ثماني نوى  $n1$  . يمثل النبات العروسي المؤنث.
- ماذا تشكل النوى الثمانية؟ تشكل خلايا .

- حدد موقع العروس الأنثوية في مغلقات البذور ؟ داخل الكيس الرشيبي في القطب القريب من كوة البذيرة الناضجة بين الخليتين المساعدتين .
- حدد موقع الخلايا الثلاثة القطبية؟ داخل الكيس الرشيبي في القطب المقابل من كوة البذيرة الناضجة .
- حدد موقع الخليتان المساعدتان ؟ داخل الكيس الرشيبي على جانبي العروس الأنثوية في البذيرة الناضجة .
- حدد موقع نواتا الكيس الرشيبي؟ في مركز الكيس الرشيبي في البذيرة الناضجة .
- ما وظيفة الحبل السري أو ما دوره ؟ يصل البذيرة بجدار المبيض في منطقة تدعى المشيمة .
- حدد موقع التقير أو ما دوره؟ مكان اتصال البذيرة بالحبل السري .
- ماذا تدعى منطقة اتصال الحبل السري بجدار المبيض ؟ المشيمة .

- ما مراحل تشكل الكيس الرشيبي؟ خلية أم للأبواغ الكبيرة  $n2$  ( خلية أم للكيس الرشيبي ) ( أين تقع ) في نوسيل البذيرة الفتية .
- يطرأ عليها انقسام منصف ( ماذا ينتج ) فتعطي أربع أبواغ كبيرة  $n1$  تتلاشى ثلاث وتبقى واحدة ( ماذا تعطي ) تكبر وتشكل خلية الكيس الرشيبي  $n1$  .
- يطرأ على نواة خلية الكيس الرشيبي  $n1$  ثلاث انقسامات خيطية متتالية ( ماذا ينتج ) معطية ثمان نوى  $n1$  تشكل محتوى الكيس الرشيبي .
- صنف أشكال البذيرات في المغلقات؟

- 1- البذيرة المستقيمة : الحبل السري قصير الكوة والتقير على استقامة واحدة
- مثال: (الجوز والقراص) ما المقصود بالبذيرة المستقيمة أو فسر بذيرة الجوز والقراص مستقيمة ...
- 2- البذيرة المنحنية : الحبل السري قصير اقتربت الكوة من التقير
- مثال: (الفاصولياء والقرنفل) ما المقصود بالبذيرة المنحنية أو فسر بذيرة الفاصولياء والقرنفل منحنية.
- 3- البذيرة المقنوبة : الحبل السري طويل والتحمت به اللحافة الخارجية اقتربت الكوة كثيراً من التقير الظاهري.

- مثال : ( الورد والخروع ) ما المقصود بالبذيرة المقنوبة أو فسر بذيرة الورد والخروع مقنوبة .
- عدد مراحل الإلقاح في مغلقات البذور ؟ التأيير : إنتاش حبة الطلع على الميسم . الإخصاب المضاعف .
- ما المقصود بالتأيير ، وما أنواعه؟ هو انتقال حبات الطلع الناضجة من المأبر إلى الميسم ،أنواعه: تأيير ذاتي - تأيير تصالبي (غير ذاتي).
- ما خطورة الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية على النبات؟ المبيدات الحشرية لا تميز بين الكائنات الضارة والتافعة وتؤدي إلى موت الحشرات النافعة التي لها دور في تأيير الأزهار بالإضافة إلى تأثيرها على كافة العمليات الحيوية في النبات .
- ينطلب نجاح التأيير شرطين ما هما؟ التلامس بين حبات الطلع و سطح الميسم . التوافق بين مفرزات الميسم مع المواد الغليكوبروتينية في غلاف حبة الطلع .
- فسر عدم إنتاش حبة الطلع من نوع معين على ميسم أزهار نوع آخر؟ بسبب عدم التوافق بين مفرزات الميسم مع المواد الغليكوبروتينية في غلاف حبة الطلع .
- بماذا تختلف حبات الطلع المنقولة بالهواء عن تلك المنقولة بالحشرات؟ التي تنقل بالهواء تكون جافة أما التي تنقلها الحشرات فهي لزجة وسريعة الالتصاق.
- ماهي أسباب التأيير الخاطئ؟ اختلاف موعد نضج الأعضاء التكاثرية في الزهرة الخنثوية، فبعضها مبكر النكورة كما في ( الشوندر السكري والجزر ) وبعضها مبكر الأثونة كما في ( الأفوكادو ) . فسر عدم إمكانية حدوث التأيير الذاتي أو ( التأيير الخاطئ ) في أزهار نبات الشوندر السكري و الجزر والأفوكادو : بسبب اختلاف موعد نضج الأعضاء التكاثرية في الزهرة الخنثوية (
- الأزهار منفصلة الجنس . اختلاف أطوال الأسدية والإقلام في الزهرة كما في زهرة ( الهرجالية ) .

- فسر سبب تسمية مغلفات البذور بهذه التسمية؟ لأن المبيض عندها معلق والبذرات بداخله .
- ما المقصود بعاريات البذور أو ما صفتها ؟
- نباتات وعقاية معمرة منها ما يكون بشكل أشجار أو شجيرات . من أشهر عاريات البذور الراقية نبات الأرز والمرو والشوح والصنوبر .
- عدد أنواع الصنوبر ، ومن أطلق تسمية الصنوبر الحلبي؟ الحلبي - الحراجي - الثمري بروتيا . - عالم النبات الأسكتلندي فيليب ميلر عام 1768 .
- ما المقصود بالصنوبر؟ شجرة كبيرة الحجم معمرة ، متخشبة ، عطرية ، أوراقها إبرية ، وتكون دائمة الخضرة ، ولها فواند بيضية وغذائية.
- فسر تعد نباتات الصنوبر دائمة الخضرة ؟ لأن أوراقها لا تسقط دفعة واحدة .
- ما الجبل المسبب في الصنوبر وبماذا يتمثل؟ الجبل البوغى هو المسبب بشكل شبه تام ، يمثله النبات الأخضر الإعاشي .
- كيف يتم التكاثر الجنسي لدى نبات الصنوبر؟ يتم عن طريق تشكيل البذور ضمن أعضاء تكاثرية بشكل مخاريط لذا سميت بالمخروطيات.
- فسر تسمية نبات الصنوبر بالمخروطيات؟ لأن التكاثر الجنسي لدى نبات الصنوبر يتم عن طريق تشكيل البذور ضمن أعضاء تكاثرية بشكل مخاريط
- فسر بعد الصنوبر نبات منفصل الجنس أحادي المسكن؟
- لوجود المخاريط المنكرة بقواعد الفروع الفتية والمخاريط المؤنثة في نهاية الفروع الفتية للنبات نفسه.
- قارن بين المخاريط المؤنثة والمخاريط المنكرة من حيث: (اللون - الحجم - العدد - مكان ظهورها على النبات - توضعها على النبات)



وجه المقارنة	المخاريط المؤنثة	المخاريط المنكرة
اللون	يتدرج اللون حسب عمر المخروط من الأخضر إلى البني الداكن عند النضج	أصفر أو برتقالي عند النضج.
الحجم	كبير	صغير
العدد	قليل	كثير
الموقع	بنهاية الفروع الفتية	بقواعد الفروع الفتية
توضعها على النبات	بشكل مفرد أو مزدوج	بشكل متعدد أو متجمع
عدد الأزهار الأنثوية	أزهار عديدة	زهرة واحدة

#### أولاً : المخروط المنكر

- ما لون كل من المخروط المنكر الفتى والناضج؟ المخروط الفتى أصفر والناضج برتقالي .
- مم يتألف المخروط المنكر ؟
- من محور مركزي يتوضع حوله عدد من الأسدية بشكل لولبي وفي قاعدته قنابة واحدة.
- كيف يتوضع الأسدية في المخروط المنكر ؟ بشكل لولبي.
- أين توجد الأكياس الطلعية أو المنبر في الصنوبر؟ وماذا يشكل داخلها؟
- على الوجه السفلي لكل حرسفة في المخروط المنكر يمثلان المنبر ، يشكل داخلها حبات طلع ناضجة انطلاقاً من خلايا أم لحبات الطلع n2.
- ماذا يوجد في قاعدة كل مخروط منكر؟ قنابة واحدة في قاعدته .
- فسر بعد المخروط المنكر زهرة واحدة ؟ لوجود قنابة واحدة في قاعدته.
- مم تتكون السداة في المخروط المنكر ؟ من حرسفة على وجهها السفلي كيمسح طلعين يمثلان المنبر.
- حدد موقع الخلايا الأم لحبات الطلع n2 في الصنوبر؟ في الأكياس الطلعية الفتية في المخروط المنكر .
- ما مراحل تشكل حبات الطلع في الصنوبر؟ خلايا أم لحبات الطلع n2 في الأكياس الطلعية الفتية.
- بطراً على كل منها انقسام منصف . ينتج عن كل منها أربع حبات طلع فتية n1 . تتمايز إلى حبات طلع ناضجة
- مم تتكون حبة الطلع الناضجة في الصنوبر؟ وارسم شكلاً لها وضع عليه المسميات ؟
- غلاف خارجي ثخين متشعب . غلاف داخلي رقيق سيلوزي . كيمسح هوانيين . خلية توالدية n1.
- خلية إعاشية n1 ( خلية الأنبوب الطلي ) . خليتين مساعدين n1 .
- بماذا يتمثل النبات العروسي المنكر في الصنوبر وما صيفته الصبغية؟ يتمثل بحبة الطلع الناضجة ، n1 .

#### ثانياً : المخروط المؤنث

- مم يتألف المخروط المؤنث الفتى؟ من محور مركزي يرتكز عليه بشكل لولبي عدد من الأزهار الأنثوية.
- مم تتألف الأزهار الأنثوية؟ من حرسفة تمثل خباءً مفتوحاً وعلى سطحها الطوي بذيرتان عاريتان وأسفل كل حرسفة قنابة.
- حدد موقع القنابة في المخروط المؤنث والبذيرتان العاريتان في الصنوبر ( البذيرة الفتية )؟
- أسفل كل حرسفة قنابة . على السطح الطوي لحراشف المخروط المؤنث الفتى .
- فسر بعد المخروط المؤنث مجموعة أزهار؟ لأنه يتألف من محور مركزي يرتكز عليه عدد من الحراشف ، وتتألف كل زهرة أنثوية من حرسفة على وجهها الطوي بذيرتان عاريتان وأسفلها قنابة
- كيف تتحول البذيرة الفتية إلى بذيرة ناضجة أو ما التغيرات التي تطرأ على البذيرة الفتية في أثناء تحولها إلى بذيرة ناضجة؟
- بذيرة فتية تحوي بداخلها خلية أم للأبواغ الكبيرة n2 في وسط النوسيل
- بطراً على الخلية الأم للأبواغ الكبيرة n2 انقسام منصف
- وينتج أربع أبواغ n1 تتلاشى ثلاث وتبقى واحدة تنقسم خيطياً لتعطي نسيج الإندوسبرم n1.



بذيرة ناضجة بداخلها إندوسبرم وأرحام n1.

حدد موقع الخلية الأم للأبواغ الكبيرة n2 ؟ في وسط نوسيل البذيرة الفتية.

م تتألف البذيرة الفتية في الصنوبر ؟ وكيف يتشكل نسيج الإندوسبرم ؟

تتألف من لحافة تحيط بنسيج مغذ يدعى : النوسيل n2 . حدد موقع النوسيل داخل البذيرة الفتية

بداخله خلية أم للأبواغ الكبيرة n2 . تنقسم انقسام منصف ( ماذا ينتج ) فينتج أربع خلايا n1 تدعى الأبواغ الكبيرة .

تتلاشى ثلاث منها وتبقى واحدة . البعيدة عن الكوة تنقسم انقسامات خيطية عديدة ( ماذا ينتج ) تعطي نسيج مغذ يدعى : الإندوسبرم .

حدد موقع الإندوسبرم : داخل البذيرة الفتية والناضجة في الصنوبر

فسر تدخل البذيرة حالة سبات حتى ربيع السنة التالية؟ لتتشكل الأرحام .

ماذا ينتج من تمايز بعض خلايا الإندوسبرم n1 ؟ الأرحام

م يتألف الرحم في الصنوبر ؟ من عنق وبطن في داخله عروس أنثوية n1 . حدد موقع العروس الأنثوية في الصنوبر؟ في بطن الرحم.

بعاداً يتمثل النبات العروسي المونث في الصنوبر ، وما صيغته الصبغية؟ بالإندوسبرم والأرحام ، n1 .

كيف تتشكل البذور والثمار في الصنوبر ؟ بعملية الإلقاح .

ما مراحل الإلقاح في الصنوبر؟ التايير ، إنتاش حبة الطلع ، الإخصاب .

ما المقصود بالتايير لدى الصنوبر ؟ انتقال حبات الطلع الناضجة من الأكياس الطلعية المتفتحة في المخروط المذكر بوساطة الرياح ، إذ تتمكنها

الأكياس الهوائية من الطيران إلى كوى البذيرات الفتية الموجودة في المخروط المؤنث الفتى .

ما وظيفة الكيسان الهوائيان ؟ تمكننا حبة الطلع الناضجة من الطيران بسهولة في الهواء من الأكياس الطلعية المتفتحة في المخروط المذكر إلى كوى

البذيرات الفتية الموجودة في المخروط المؤنث الفتى .

ما وظيفة الكوة ؟ تفرز مادة لاصقة تعمل على لصق حبات الطلع .

ماذا يفرز سطح النوسيل؟ قطرة اللقاح ( دورها ) تسحب حبات الطلع إلى الحجرة الطلعية.

ثانياً : إنتاش حبة الطلع :

الأحظ الشكل المجاور ، وأجيب عن الأسئلة الآتية :

1- ما النسيج الذي تلامسه حبة الطلع بعد اجتيازها الكوة ووصولها للحجرة الطلعية؟ تلامس سطح النوسيل في البذيرة الفتية .

2- م ينشأ الأنبوب الطلعي في الصنوبر؟ وأين يفرس؟ من نمو الخلية الإعاشية في حبة الطلع الناضجة، يفرس في نسيج النوسيل .

3- لماذا يتوقف نمو الأنبوب الطلعي لمدة عام بعد اختراقه لنسيج النوسيل في البذيرة الفتية ؟ حتى تتضح البذيرة وتتشكل الأرحام

4- ماذا ينتج عن انقسام نواة الخلية التوالدية في الصنوبر؟ نطفتين نباتيتين n1 .

5- إلى أين يصل الأنبوب الطلعي بعد أن يستأنف نموه في الربيع التالي ؟ يصل إلى عنق الرحم .

ثالثاً : الإخصاب

ما نوع الإخصاب في الصنوبر ؟ وكيف يحدث ؟ إخصاب مفرد .

تتمزق نهاية الأنبوب الطلعي عندما تلامس نهايته عنق الرحم وتحرر منه نواة الخلية الإعاشية والنطفان في بطن الرحم فالنطفة الأولى تتحد مع

البويضة الكروية n1 مشكلة البيضة الملقحة n2 أما النطفة الثانية ونواة الخلية الإعاشية تتلاشيان

أين توجد النطفان النباتيتان في الصنوبر ، وما مصيرهما في بطن الرحم ؟ في نهاية الأنبوب الطلعي .

النطفة الأولى تتحد مع البويضة الكروية n1 مشكلة البيضة الملقحة n2 أما النطفة الثانية ونواة الخلية الإعاشية تتلاشيان

ما منشأ النطفة النباتية ؟ من انقسام الخلية التوالدية في الأنبوب الطلعي انقسام خيطي

ما مراحل تشكل البذرة في الصنوبر؟ تشكل الرشيم ، تتحول لحافة البذيرة إلى غلاف متخشب مجنح للبذرة .

ما منشأ الغلاف المتخشب المجنح : من لحافة البذيرة

يهضم الإندوسبرم النوسيل ويحتل مكانه كما يتضخم نتيجة تراكم المدخرات الغذائية (نشاء ، بروتينات ، زيوت ) في خلاياه.

فسر يزول النوسيل أثناء تشكل البذور في الصنوبر؟ لأن الإندوسبرم بهضمه ويحتل مكانه.

فسر تضخم الإندوسبرم بعد هضمه النوسيل ؟ نتيجة تراكم المدخرات الغذائية في خلاياه.

أين يحدث الإخصاب في الصنوبر ؟ وإلى ماذا تتطور البيضة الملقحة ؟ ومم جنين يبقى في البذرة الناضجة ؟

- يحدث الإخصاب في الصنوبر في ( كل الأرحام ) . تتطور البيضة الملقحة إلى (جنين) . يبقى في البذرة الناضجة جنين واحد .

ما مراحل تشكل الرشيم في بذرة الصنوبر ؟

1- بيضة ملقحة n2 في بطن الرحم .

أين توجد البيضة الملقحة في الصنوبر : في بطن الرحم

2- ينتج عنها 16 خلية n2 تتوضع في أربع طبقات في كل طبقة أربع خلايا .

ماذا ينتج عن الانقسامات الأربعة على البيضة الملقحة

3- يتسارع نمو أحد الطلائع الرشيمية بالاتقسامات الخيطية ويتميز إلى رشيم نهائي في وسط الإندوسبرم وتزول باقي الطلائع الرشيمية .

ماذا ينتج من تمايز الطلعية الرشيمية : رشيم نهائي

حدد موقع الرشيم النهائي أو الجنين في الصنوبر؟ في وسط الإندوسبرم داخل البذرة الناضجة.



- ما عدد الانقسامات الخيطية المتتالية التي تطرأ على الببضة الملقحة؟ وماذا ينتج عنها؟
- أربع انقسامات خيطية متتالية ، ينتج عنها 16 خلية  $n2$  تتوضع في أربع طبقات في كل طبقة أربع خلايا كم رسم نهائي يتشكل؟ رسم نهائي واحد فقط
- رتب الطبقات الناتجة عن الانقسامات الخيطية الأربعة التي تطرأ على الببضة الملقحة  $n2$  أثناء تشكل الرسيم من الأعلى إلى الأسفل؟ وأين تقع كل طبقة؟
- الطبقة العلوية تدعى الطبقة المفتوحة. ( تقع أعلى الطبقة الوردية ) .
- والتي تليها تدعى الطبقة الوردية . ( تقع بين الطبقة المفتوحة من الأعلى وطبقة المعلقات من الأسفل )
- الطبقة الثالثة تدعى طبقة حوامل الأجنة ( المعلقات ) . ( تقع بين الطبقة الوردية من الأعلى وطبقة الطلائع الرسيمية من الأسفل )
- الطبقة السفلى هي طبقة الطلائع الرسيمية . ( تقع أسفل طبقة المعلقات ) .
- مم يتألف الرسيم النهائي في الصنوبر؟ من جذير وسويقة وعجز وقلقت عددها من (6 إلى 12).
- فسر دخول بذرة الصنوبر في حياة بطينة بعد تشكلها؟ لأن البذرة تفلد الجزء الأكبر من الماء الموجود فيها .
- مم تتكون الثمرة ؟ من حرشلة تحمل في أعلاها بذرتين مجنحتين عاريتين .
- حدد موقع البذرتين المجنحتين العاريتين ؟ في أعلى حراشف المخروط المونث الناضج المتفتح .
- ماذا يمثل المخروط المونث الناضج المتفتح؟ مجموعة من الثمار تدعى ثلحة الصنوبر .
- ماذا ينتج من تباعد حراشف المخروط الناضج المتفتح ؟ تنطلق البذور المجنحة في الهواء ، ثم تستقر في التربة .

### إنتاش البذور :

• ما نوع إنتاش بذور الصنوبر ؟

• هوائي ( فوق أرضي ) .

• فسر بعد إنتاش بذرة الصنوبر هوائياً؟

• لأن السويقة تتطاول فوق التربة مغطية المحور تحت الملقات الذي يحمل الملقات فوق التربة

• مم يتغذى رسيم الصنوبر في أثناء الإنتاش؟ يتغذى على المخزرات الغذائية الموجودة في الإندوسيرم .

• ما وظيفة الإندوسيرم : يغذي الرسيم في أثناء الإنتاش )

• ما مصير أجزاء رسيم الصنوبر بعد إنتاش البذرة ؟ - الجذير : يغطي جذر . - ما وظيفة الجذير

• السويقة : تتطاول فوق التربة مغطية المحور تحت الملقات ( ما دورها ) الذي يرفع الملقات فوق التربة. - ما منشأ المحور تحت الملقات : من تطاول السويقة )

• العجز : ينمو مغطياً المحور فوق الملقات ( ما دورها ) الذي يحمل الأوراق . - ما منشأ المحور فوق الملقات : من نمو العجز

• لدينا الشكل المجاور والمطلوب :

• 1- ماذا يمثل هذا الشكل ؟ بذيرة ناضجة

• 2- ضع المسميات الموافقة للأرقام المحددة على الشكل .

• 1- لحافة 2- نطفة 3- رحم 4- نوسيل  $n2$  5- إندوسيرم  $n1$  .

• 3- ما مصير البنية رقم 4 بعد حدوث الإخصاب؟ يستهلكها الإندوسيرم ويحل محلها

### المدرس السادس : التكاثر الجنسي عند النباتات البذرية الزهرية: مغلفات البذور

• تانيا: مغلفات البذور.

• هل تعلم : اعتاد القدماء على إنجاز طقوس التلقيح الصناعي للنباتات من دون أن يعرفوا مراحل

عملية التكاثر الجنسي بدقة التي تلي عملية تغير الأزهار المؤنثة بالأزهار المنكرة ( التابير )

• بماذا يتمثل الجهاز التكاثري في نباتات مغلفات البذور؟ الزهرة.

• أرسم شكلاً للمبر الفتى والناضج ، وأرسم شكلاً لحبة الطلع الناضجة وضع عليهما المسميات المناسبة ؟

• ما عدد الأكياس الطلعية في المنبر الفتى؟ أربعة أكياس .

• أين توجد الخلية الأم لحبات الطلع  $n2$  في مغلفات البذور ؟ في الأكياس الطلعية الفتية .

• ما نوع الانقسام الذي يطرأ على الخلية الأم لحبات الطلع  $n2$  في مغلفات البذور ؟ وماذا ينتج عنه؟

• انقسام منصف ، ينتج عنه أربع حبات طلع فتية  $n1$  .

• ماذا نتوقع نتيجة عدم وجود خلايا أم لحبات الطلع في الأكياس الطلعية؟

• أتوقع عدم تشكل حبات طلع وبالتالي تشكل أسدية عقيمة ، وعدم حدوث عملية التابير .

• ماذا ينتج عن انفتاح كل كيسيين طلعيين على بعضهما؟ تشكيل مسكن طلعي .

• كيف يتشكل المسكن الطلعي؟ عن طريق انفتاح كل كيسيين طلعيين على بعضهما .

• ما وظيفة الطبقة الألية ؟ وأين تقع ؟ وظيفتها : يفتح المنبر عند النضج بتأثيرها . تقع : في جدار الكيس الطلعي .

• على ماذا تتغذى الخلايا الأم لحبات الطلع  $n2$  في مغلفات البذور؟ من السائل المغذي الناتج عن تهلم الطبقات المغذية ( في جدار الكيس الطلعي .

• ماذا ينتج من تهلم الطبقات المغذية وأين تقع ؟ تقع في جدار الكيس الطلعي . ينتج من تهلمها : سائل مغذي ، يغذي الخلايا الأم لحبات الطلع  $n2$  .

• كيف تتمايز حبة الطلع الفتية إلى حبة طلع ناضجة في مغلفات البذور ؟



الخلية المتقبلة: تمتلك صبغى جرثومي ولا تحوي بلاسמיד الإخصاب .  
 ما وظيفة القناة المتشكلة بين الخليتين الجرثوميتين ( قناة الإقتران ) ؟ بعبارة من خلالها جزء من بلاسמיד الإخصاب من الخلية الماتحة إلى الخلية المتقبلة .  
 حدد موقع قناة الإقتران لدى الجراثيم ؟ بين الخلية الماتحة والخلية المتقبلة .  
 كيف يتم التزاوج بين الخلية الماتحة والخلية المتقبلة ؟ التزاوج بين خليتين جرثوميتين بحيث تتفصل أحد سلسلتي DNA بلاسמיד الإخصاب وتتضاعف أثناء عبورها قناة الإقتران إلى الخلية المتقبلة وتتضاعف السلسلة المتبقية منه داخل الخلية الماتحة ( ماذا ينتج ) مما يؤدي لظهور تركيب وراثي جديد في الخلية المتقبلة ، ومن ثم ظهور سلالة جرثومية جديدة .  
 ما المقصود ببلا سמיד الإخصاب ؟ DNA خلقي بحث على تشكل قناة الإقتران .  
 حدد موقع بلا سמיד الإخصاب . وما دوره ؟  
 الموقع : في الخلية الجرثومية الماتحة . الدور : بحث على تشكل قناة الإقتران بين الخليتين الجرثوميتين الماتحة والمتقبلة .  
 فسر بعد عملية الإقتران تصبح الخلية المتقبلة خلية ماتحة ؟ لأنها أخذت بلاسמיד الإخصاب

### تكاثر فطر العفن الأسود :

ما مراحل التكاثر الجنسي لدى فطر العفن ؟  
 يتجاور خيط فطري ( - ) مع خيط فطري ( + ) ، طليعة الكيس العروسي تحوي هيولى ونوى  $n1$  ، تتحول طليعة الكيس العروسي إلى كيس عروسي بعد تشكل حاجز عرضي يفصلها عن باقي الخيط ( اندماج الكيسين العروسين ( الإلفاح ) ) تندمج كل نواة  $n1$  مع نواة  $(+)$   $n1$  ( اندماج نووي ) بيضة ملقحة عديدة النوى  $n2$  محاطة بغلاف ثخين أسود اللون ( عندما تحسن الظروف البيئية بطراً على النوى  $n2$  انقسام منصف وتنش ) تعطي بانثاشها حامل كيس بوغي يطوه كيس بوغي بداخله أبواغ جنسية  $n1$  ناتجة عن انقسام منصف ( تنتش الأبواغ معطية خيوط فطرية ( + ) وأخرى ( - ) .  
 ما مراحل التكاثر اللاجنسي لدى فطر العفن ؟ خيط فطري من نوع واحد ( ينمو له حامل كيس بوغي يطوه كيس بوغي بداخله أبواغ  $n1$  تنتج من انقسام خيطي ( تنتش الأبواغ ) خيط فطري من نوع واحد .  
 في التكاثر اللاجنسي : حدد نوع الانقسام الذي يعطي الأبواغ ؟ وماذا ينتج عن انثاشها ؟  
 نوع الانقسام : انقسام خيطي . ينتج عن انثاشها : خيوط فطرية جديدة .  
 ماذا تحتوي طليعة الكيس العروسي ؟ هيولى ونوى عديدة  $n1$  .  
 ماذا ينتج عن اندماج نوى أحد الكيسين العروسين مع نوى الكيس المقابل ؟ تشكل بيضة ملقحة عديدة النوى  $n2$  محاطة بغلاف ثخين أسود اللون .  
 فسر تستطيع البيضة الملقحة لدى فطر العفن مقاومة الظروف غير المناسبة ؟  
 لأنها تحاط بغلاف ثخين أسود اللون مقاوم للظروف البيئية غير المناسبة  
 ماذا بطراً على البيضة الملقحة عند تحسن الظروف ؟ انقسام منصف ، ثم تنتش معطية حامل كيس بوغي .  
 متى يتكاثر فطر العفن الأسود لا جنسياً ؟ وماذا تعطي الأبواغ المنتشة ؟ في الظروف المناسبة معطياً أبواغاً ، تنتش لتعطي خيوط فطرية جديدة .  
 متى يتكاثر فطر العفن جنسياً وماذا يتشكل ؟ وماذا تعطي بانثاشها ؟  
 في الظروف غير المناسبة ، تشكل بيضة ملقحة عديدة النوى  $n2$  ، لا تثبت أن تنتش بتحسن الظروف معطية حامل الكيس البوغي الذي يعطي أبواغاً جنسية فسر تتابع الخيوط الفطرية الناتجة عن انثاش الأبواغ الجنسية تكاثره بالأبواغ ؟ بسبب تحسن الظروف البيئية .  
 قارن بين نوعي الأبواغ في كل من التكاثر الجنسي واللاجنسي لدى فطر العفن الخبز من حيث :  
 ظرف الوسط الذي تتشكل فيه : الجنسي ( غير المناسبة ) اللاجنسي ( المناسبة ) .  
 نوع الانقسام الذي تنتج عنه : الجنسي ( منصف ) اللاجنسي ( خيطي )  
 صيغتها الصيغية : الجنسي (  $n1$  ) اللاجنسي (  $n1$  ) .  
 ناتج انثاشها : الجنسي ( خيوط فطرية ( + ) وأخرى ( - ) ) اللاجنسي ( خيوط فطرية من نوع واحد )  
 وضع كلمة صح في نهاية العبارة الصحيحة في كل مما يأتي :

- 1- الجراثيم : في الاضطراب الثاني للجراثيم الأفراد الناتجة مطابقة للأصل وراثياً . صح
- يمكن للخلية الجرثومية الدخول في عملية الاضطراب الثاني بغيب الجسم الوسيط . غلط
- للخيوط البروتينية دور في هجرة الصبغيين إلى طرفي الخلية في أثناء انقسامها من المنتصف . صح
- عملية الإقتران لدى الجراثيم تؤدي إلى تشكل نمط وراثي جديد لكلا الخليتين المشتركتين في الإقتران . غلط
- بلا سמיד الإخصاب له الدور الأساسي في عملية الإقتران الجرثومي . صح
- 2- فطر عفن الخبز : الفطر الذي يشاهد على قطعة الخبز الرطبة يتكاثر لاجنسياً . صح

عندما تجف قطعة الخبز يتكاثر الفطر الموجود عليها جنسياً . صح - يحوي الكيس العروسي أبواغاً عديدة  $n1$  . غلط  
 يكون الخيطان المتزاوجان في التكاثر الجنسي من النمط الوراثي نفسه . غلط - للبيضة الملقحة غلاف أسود ثخين . صح

### درس الخامس : التكاثر الجنسي عند النباتات البذرية الزهرية

أولاً : عاريات البذور

هل تعلم : أن غابات السنوبر تشكل نحو ١٩% من مجموع غابات الجمهورية العربية السورية وتنتشر في معظم المناطق .  
 انتشرت معظم هذه النباتات الزهرية ( البذرية ) منذ نحو ٣٥٠ مليون سنة ، وقسمها معظم علماء التصنيف إلى شعبتين ما هما ، مع ذكر أمثلة ؟  
 شعبة عاريات البذور : ( السنوبر - الأرز - السرو - العرعر ) . شعبة مغلفات البذور : ( القمح - الكرز - الفصولياء - القمح )  
 فسر سبب تسمية عاريات البذور بهذه التسمية ؟ لأن المبيض عندها ملقوح والبذرات عارية .



- ♦ فسر عدم إمكانية حدوث التأيير الذاتي أو ( التأيير خلطي ) في أزهار الهرجابية : بسبب اختلاف أطوال الأسدية والألقام في الزهرة ( حالات عدم التوافق الذاتي وحالات العقم النكري لعدم إتمام حبات الطلع أو فشل تفتح المنبر طبيعياً .
- ♦ فسر حدوث حالات عقم نكري أو حالات عدم التوافق الذاتي في أزهار بعض النباتات ؟ لعدم إتمام نمو حبات الطلع أو فشل تفتح المنبر طبيعياً . كيف يحدث انتشار حبة الطلع على الميسم؟
- ♦ تنتش حبة الطلع بتحريض كيميائي من الميسم ، إذ تنمو لها أنبوب طلعي انطلاقاً من الخلية الإعاشية والغلاف الداخلي لحبة الطلع .
- ♦ ما منشأ الأنبوب الطلعي في مغلفات البذور : من الخلية الإعاشية والغلاف الداخلي لحبة الطلع
- ♦ تقوم نواة الخلية الإعاشية بتوجيه نمو الأنبوب الطلعي والمحافظة على حيويته حتى يصل إلى كوة البذيرة . ♦ ما وظيفة نواة الخلية الإعاشية في أثناء ذلك تنقسم نواة الخلية التوالدية انقساماً خيطياً معطية نطفتين نباتيتين n1 . ♦ ماذا ينتج من انقسام نواة الخلية التوالدية
- ♦ فسر إنتاش حبة الطلع على الميسم؟ بسبب التحريض الكيميائي من الميسم .
- ♦ ماذا ينتج من إنتاش حبة الطلع على الميسم؟ أنبوب طلعي .
- ♦ حدد موقع النطفتين النباتيتين عند حدوث الإخصاب؟ في الأنبوب الطلعي .
- ♦ ما مراحل الإخصاب المضاعف؟ - تنتج نطفتين نباتيتين كل منها n1 من انقسام الخلية التوالدية في حبة الطلع .
- ♦ بعد وصول الأنبوب الطلعي إلى كوة البذيرة ( ماذا ينتج ) تتهلم نهايته وتزول نواة الخلية الإعاشية وتدخل النطفتان النباتيتان إلى داخل الكيس الرشيمي . ♦ تتحد النطفة النباتية مع البويضة الكروية ( ماذا ينتج ) وتتج البويضة الأصلية n2 . تتحد النطفة النباتية الثانية مع النواة الثانوية (النتيجة عن اندماج نواتا الكيس الرشيمي) فتنتج البويضة الإضافية n3 .
- ♦ ما منشأ النطفتين النباتيتين ؟ من انقسام الخلية التوالدية في حبة الطلع .
- ♦ ماذا ينتج بعد وصول الأنبوب الطلعي إلى كوة البذيرة ؟ تتهلم نهايته وتزول نواة الخلية الإعاشية وتدخل النطفتان النباتيتان إلى داخل الكيس الرشيمي ..

- ♦ حدد المكان الذي يدخل منه الأنبوب الطلعي إلى البذيرة ؟ كوة البذيرة .
- ♦ ما مصير نواة الخلية الإعاشية بعد وصول الأنبوب الطلعي إلى كوة البذيرة ؟ تزول .
- ♦ أكمل معادلتى الإخصاب المضاعف أو فسر بعد الإخصاب مضاعف في مغلفات البذور ؟
- ♦ نطفة نباتية n1 + بويضة كروية n1 = بويضة أصلية n2 . - نطفة نباتية n1 + نواة ثانوية n2 = بويضة إضافية n3 .
- ♦ ما مصير الخليتان المساعدتان والخلايا القطبية بعد الإخصاب ؟ تزول .
- ♦ ما مصير أو ما وظيفة كل من البويضة الأصلية n2 و البويضة الإضافية n3 ؟
- ♦ البويضة الأصلية n2 : تنمو لتعطي الجنين ( الرشم ) . - البويضة الإضافية n3 : تنمو لتعطي نسيج السويداء .
- ♦ تقسم نباتات مغلفات البذور إلى صنفين ما هما ؟

- 1- صنف أحاديات الفلقة : مثل القمح والشعير . 2- صنف ثنائيات الفلقة : مثل الفول والبلزلاء والفاصولياء والكستناء .
- ♦ ما مراحل تحول البذيرة إلى بذرة ؟ - تكون الرشم . 3- تحول البويضة الإضافية إلى سويداء .
- ♦ ما مراحل تشكل الرشم ؟ تنقسم البويضة الأصلية n2 انقساماً خيطياً ( ماذا ينتج ) تعطي خليتين كل منهما n2 ، خلية كبيرة من جهة الكوة و خلية صغيرة موجهة نحو مركز الكيس الرشيمي ( تنقسم الخلية الكبيرة معطية خيط خلوي يدعى المعلق ) تنمو الخلية الصغيرة معطية طليعة الرشم التي تتمايز إلى رشم نهائي مكون من جذير وسويقة وعجز أو برعم وفلقة أو فلقنتان .


- ♦ مم ينشأ كل من الرشم والمعلق ؟ ينشأ الرشم من نمو الخلية الصغيرة الناتجة عن انقسام البويضة الأصلية n2 .
- ♦ ينشأ المعلق من تقسم الخلية الكبيرة الناتجة عن انقسام البويضة الأصلية n2 .
- ♦ ما وظيفة الخلية الكبيرة من جهة الكوة ، و الخلية الصغيرة الموجهة نحو مركز الكيس الرشيمي؟
- ♦ تنقسم الخلية الكبيرة معطية خيط خلوي يدعى المعلق . تنمو الخلية الصغير معطية طليعة الرشم التي تتمايز إلى رشم نهائي .
- ♦ حدد أجزاء الرشم ومكان توضعها؟ جذير من جهة المعلق - سويقة ترتبط فيها فلقة أو فلقنتين - عجز (برعم) مقابل الجذير من الجهة المقابلة .
- ♦ فسر تعد بذرة الفاصولياء والفول عديمة السويداء ؟

لأن الرشم يقوم بمراحل تكونه الأخيرة بهضم السويداء فتصبح البذرة عديمة السويداء ، عندها تنمو الفلقنتان وتختزنان المخزرات الغذائية .

- ♦ فسر تعد بذرة الخروع والقمح والذرة ذات سويداء ؟ بسبب بقاء السويداء .
- ♦ رتب مراحل تحول البويضة الإضافية إلى سويداء ؟ - تنقسم نواة البويضة الإضافية 3n انقسامات خيطية عديدة ( ماذا ينتج ) إلى عدد كبير من النوى 3n ( ماذا يحيط بها ) يحيط بكل منها قسم من الهولسي ( أين تنتظم )
- ♦ تنتظم على السطح الداخلي لجدار الكيس الرشيمي ( ماذا يتشكل ) فتتشكل الطبقة الأولى من السويداء .

- ♦ يستمر الانقسام ( ماذا ينتج ) حتى يمتلئ الكيس الرشيمي غالباً بنسيج خاص
- ♦ غنى بالمخزرات الغذائية هو : السويداء .
- ♦ ما المقصود بالسويداء

- 3- قد يتوقف انقسام خلايا السويداء 3n عند حد معين ( ماذا ينتج ) فيبقى في وسط الكيس الرشيمي جوف فيه سائل حلو كما في بذرة جوز الهند .
- 4- قد يقوم الرشم في مراحل تكونه الأخيرة بهضم السويداء فتصبح البذرة عديمة السويداء وعندها تنمو الفلقنتان وتختزنان المخزرات الغذائية .
- 5- بينما في حالات أخرى تبقى السويداء وعندها تسمى البذور ذات سويداء كما في الخروع والقمح والذرة



فسر بذرة جوز الهند تحتوي على جوف فيه سائل حلو : لأن النقسام خلايا السويداء n3 توقف عند حد معين فيبقى في وسط الكيس الرشمي جوف له ستر  
**ما مصير اللحافتين ؟** تزول اللحافة الداخلية ، وتبقى الخارجية التي تلتفد ماءها ، وتتصلب متحولة إلى غلاف مفرد كغلاف بذرة الحمص .  
 فسر غلاف بذرة الحمص مفرد : لأن اللحافة الداخلية تزول ، وتبقى الخارجية التي تلتفد ماءها ، وتتصلب متحولة إلى غلاف مفرد  
 تزول اللحافة الداخلية وتتضاعف اللحافة الخارجية إلى غلافين : سطحي متخشب قلس ، وداخلي سللوزي لين كما في بذرة الخروع والمشمش .  
 فسر بذرة الخروع والمشمش ذات غلافين أو ذات غلاف مضاعف : لأن اللحافة الداخلية تزول وتبقى اللحافة الخارجية وتتضاعف إلى غلافين :  
 سطحي متخشب قلس ، وداخلي سللوزي لين ( قد يهضم التوسيل للحافتين معاً ، عندها تقوم الثمرة بتكوين غلاف كاذب للبذرة كما في حبة القمح  
 فسر بعد غلاف بذرة القمح كاذب : لأن التوسيل هضم اللحافتين معاً ، فقامت الثمرة بتكوين غلاف كاذب للبذرة  
**ما مصير التوسيل عند تشكل بذور المغلفات ؟** يزول التوسيل ( فسر ) لأن البيضة الأصلية والإضافية يهضماتهما في أثناء نموها .  
 من أين تستمد البيضة الأصلية والإضافية غذائهما أثناء نموها ؟ من التوسيل .  
**ما المقصود بالثمره المبيض زهري ناضج يشمل بذرة أو أكثر ( ما وظيفة الثمرة )** وتد عضواً متخصصاً في حماية البذور وتسهيل انتشارها .



متى تتحول البذورات إلى بذور ؟ بعد الإخصاب المضاعف .  
**ما دور الإخصاب المضاعف في تشكل الثمرة ؟** بعد الإخصاب محفزاً لنمو جدار المبيض وتضخمه وتحوله إلى ثمرة حقيقية مثل ( الكرز والمشمش والبرتقال ) .  
**ما المقصود بالثمره الحقيقية أو فسر تعد ثمرة الكرز والمشمش والبرتقال حقيقية ؟**  
 بعد الإخصاب محفزاً لنمو جدار المبيض وتضخمه وتحوله إلى ثمرة حقيقية مثل : ( الكرز - المشمش - البرتقال ) .  
**عرف الثمرة الكاذبة أو فسر تعد ثمرة التفاح والإجاص والرمان كاذبة ؟** عندما تشترك أجزاء زهرية ( كرسي الزهرة أو قواعد السبلات أو قواعد البتلات أو الأسدية ) مع المبيض في تشكيل الثمرة مثل : ( التفاح ، الإجاص ، الرمان ) تكون الثمرة كاذبة .  
**تصنيف الثمار : تقسم الثمار إلى :**

- 1- الثمرة البسيطة : تنشأ من زهرة واحدة تحتوي على خباء واحد كما في ( المشمش والكرز ) أو أخبية عدة ملتحمة كما في ( التفاح والبرتقال ) .  
 فسر تعد ثمرة المشمش والكرز بسيطة : لأنها تنشأ من زهرة واحدة تحتوي على خباء واحد  
 فسر تعد ثمرة التفاح والبرتقال بسيطة : لأنها تنشأ من زهرة واحدة تحتوي على أخبية عدة ملتحمة
- 2- الثمرة المركبة : تنشأ من أزهار عدة (تورة) تتحول كل زهرة فيها بعد إلقاها إلى ثميرة ( على الأغلب كاذبة ) كما في التوت والتين .  
 فسر تعد ثمرة التوت والتين مركبة أو على الأغلب كاذبة : لأنها تنشأ من أزهار عدة (تورة) تتحول كل زهرة فيها بعد إلقاها إلى ثميرة ( على الأغلب كاذبة )
- 3- الثمرة المتجمعة : تنشأ من أخبية عدة منفصلة لزهرة واحدة تتركز جميعها على كرسي الزهرة كما في ( الفريز ) .  
 فسر تعد ثمرة الفريز متجمعة : لأنها تنشأ من أخبية عدة منفصلة لزهرة واحدة تتركز جميعها على كرسي الزهرة (


**فسر أهمية تناول الفواكه الطازجة** لأنها تحتوي على مواد مغذية ولغائها بالفيتامينات ودورها في تعزيز مناعة الجسم .  
**ما المقصود بانتاش البذور** مجموعة المظاهر التي ينتقل فيها الرشم داخل البذرة الناضجة من حالة السبات إلى مرحلة الحياة النشطة وذلك عندما تكون الظروف البيئية ملائمة لهذا الانتقال .  
**يتضمن الإنتاش مرحلتين أساسيتين ما هما ؟** زيادة النشاط الاستقلابي . نمو الرشم لإعطاء جهاز إعلشي (جذر ، ساق ، أوراق) .  
**ما المظاهر التي يتجلى بها النشاط الاستقلابي في أثناء إنتاش البذور في المغلفات ؟**  
 زيادة نفاذية أغلفة البذرة للماء والأكسجين . زيادة الأوكسدة التنفسية ( فسر ) : بهدف تأمين الطاقة اللازمة لنمو الرشم .  
 فسر انتشار الحرارة من البذور المنتشة ؟ لأن قسم من الطاقة اللازمة لنمو الرشم لا يستفخم في النمو فينتشر بشكل حرارة .  
 هضم المخبرات الغذائية الموجودة في الفلقتين أو السويداء واستهلاكها من قبل الرشم .  
**ما أنواع الإنتاش في بذور المغلفات ؟** الإنتاش الهوائي : تتناول السويقة حاملة معها الفلقتين والعجز فوق التربة مثل : إنتاش عدد من النباتات من شقيقات اللقطة كالفاصولياء . فسر يكون إنتاش بذور الفاصولياء هوائي : لأن السويقة تتناول حاملة معها الفلقتين والعجز فوق التربة  
 الإنتاش الأرضي : لا تتناول السويقة ومن ثم لا تخرج اللقطة أو الفلقتان فوق التربة ، يميز هذا الإنتاش معظم أحبيبات اللقطة مثل : القمح وبعض من شقيقات اللقطة مثل : الكستناء والبقلاء والفلول . فسر يكون إنتاش بذور القمح أرضي : لأن السويقة لا تتناول ومن ثم لا تخرج اللقطة فوق التربة  
 فسر يكون إنتاش بذور الكستناء والبقلاء والفلول أرضي : لأن السويقة لا تتناول ومن ثم لا تخرج الفلقتان فوق التربة

## التقويم النهائي أولاً، اضع المصطلح العلمي لكل من العبارات الآتية.

- 1- مبيض زهري ناضج يحوي بذرة أو أكثر ويد عضواً متخصصاً لحماية البذور وتسهيل انتشارها. (الثمرة)
- 2- أحد أجزاء الزهرة ويد الجهاز التكاثري الأثوي فيها. (الملقطة).
- 3- طبقة في جدار الكيس الطلمي لها دور في تفتح المنبر عند التضج. (الطبقة الألية).
- 4- اختار الإجابات الصحيحة لكل من العبارات الآتية.
- 5- أحد النمج الأتية صبغته الصبغية n3 : السويداء
- 6- واحد مما يأتي لا يوجد في البذيرة الفتية: الكيس الرشمي
- 7- شجرة تحوي نمطاً واحداً من الأزهار المكونة من كأس وتويج وأسدية فقط هي تعود لتبات : منفصل الجنس وحيد المسكن .
- 8- تعد ثمرة التين : مركبة كاذبة .
- 9- ينشا الأبواب الطلمي من : كل من ب و ج .
- 10- أعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي . زوال التوسيل عند المغلفات ؟ لأن البيضة الأصلية والإضافية يهضماتهما أثناء نموها .
- 11- بعد غلاف حبة القمح كاذباً ؟ لأن التوسيل هضم اللحافتين معاً فقامت الثمرة بتكوين غلاف للبذرة .

- يكون إنتاش بذرة القول أرضياً ؟ لأن السويقة لا تتطاوّل ومن ثم لا تخرج اللقطن فوق التربة.  
 • عدم إمكانية حدوث تاير ذاتي في أزهار نبات الشونتر السكري؟ بسبب اختلاف موعد نضج الأعضاء التناسلية في الزهرة الخنثوية.  
 • تعد ثمرة الفريز متجمعة؟ لأنها تنشأ من أهبية عدة منفصلة لزهرة واحدة ترتكز جميعها على كرسى الزهرة.  
 رابعاً، مما تنشأ كل من التركيب الآتية:

النظمتان النباتيتان : من انقسام نواة الخلية التوالدية n1 خيطياً. الرشم : من نمو الخلية الصغيرة الناتجة عن انقسام البيضة الأصلية n2 .  
 الكيس الرشمي : من خلية الكيس الرشمي ومحتواه ينتج عن انقسام نواتها ثلاث انقسامات خيطية. النواة الثانوية: من انقسام نواتا الكيس الرشمي  
 خامساً، أحدد بلقمة مكان وجود كل مما يأتي. الخلية الأم للكيس الرشمي : في نوسيل البذيرة الفتية. البذيرة : داخل المبيض.  
 نواة الخلية الإعاشية في حبة الطلع المنتشة: في الأنبوب الطلمي. السرة (النقير): في مكان اتصال الحبل السري مع البذيرة. الأكياس الطلعية : في  
 المنبر الفتى .



سادساً، ألاحظ الشكل المجاور. وأجيب عن الأسئلة الآتية.

- 1- أكتب المسميات للأرقام على الشكل . 1- حبة طلع منتشة 2- أنبوب طلمي 3- مبيض 4- كيس رشمي 5- نظمتان  
 6- بويضة كروية 7- نواتا الكيس الرشمي 8- بيضة أصلية n2 9- بيضة إضافية n3 .  
 10- أرتب المراحل المجاورة حسب تسلسلها C . A ) B )  
 11- ما مصير كل من الرقم 8 و 9 . مصير 8 ( البيضة الأصلية n2 ) تحيط بنموها الجنين ( الرشم ) .  
 مصير 9 ( البيضة الإضافية n3 ) تحيط بنموها تسيج السويداء .  
 12- مم ينشأ الرقم 5 . النظمتان النباتيتان : من انقسام الخلية التوالدية انقساماً خيطياً .  
 ثامناً، ألاحظ الشكل المجاور الذي يمثل بذيرة مقلوبة. والمطلوب،  
 13- أكتب المسميات الموافقة للأرقام المحددة على الشكل .  
 1- نوسيل n2 2- كيس رشمي 3- لحافتان خارجية وداخلية 4- كوة  
 5- أنكر مثلاً عن بذيرة نباتية مقلوبة . الخروع والورد .

وجه المشقة	عرايت البذور (الصنوبر)	مغلفات البذور
بماذا يتمثل النبات العروسي المؤنث 1n	إندوسبرم و أرحام	الكيس الرشمي
بماذا يتمثل النبات العروسي المذكر 1n	حبة الطلع الناضجة	حبة الطلع الناضجة
عدد الخلايا في حبة الطلع الناضجة	4خلايا (1n) إعاشية - نوادية - خليتين مساعدتين	خليتين (1n) إعاشية - نوادية
وجود الكيسات الهوائية	يوجد	لا يوجد
موقع الخلية الأم لحبات الطلع 2n و نتج انقسامها	في الأكياس الطلعية الفتية ، 4 حبات طلع فتية 1n	في الأكياس الطلعية الفتية ، 4 حبات طلع فتية 1n
موقع الخلية الأم للأبواغ الكبيرة 2n و نتج انقسامها	في وسط نوسيل البذيرة الفتية ، أربع خلايا 1n	في نوسيل البذيرة الفتية ، أربع أبواغ كبيرة 1n
ماذا ينتج من الخلية المتبقية من انقسام الخلية الأم للأبواغ الكبيرة 2n موقع البذيرة	لتقسم خيطياً لتغطي تسيج الإندوسبرم 1n	تكبر و تشكل خلية الكيس الرشمي 1n
عدد لحافات البذيرة	على الوجه العلوي لحراشف المخروط المؤنث	في المبيض
موقع العروس الأثوي	لحافة واحدة	لحافتين خارجية و داخلية
النسج المغذية في البذيرة	داخل بطن الرحم	داخل الكيس الرشمي في التطب التريب من كوة البذيرة الناضجة بين الخليتين المساعدتين
موقع إنتاش حبة الطلع	نوسيل 2n - إندوسبرم 1n على سطح النوسيل	نوسيل 2n على الميسم
عدد اللقعات في الرشم	6 إلى 12	لقعة أو لققتان
مصدر تغذية الرشم	من المنخرات الغذائية الموجودة في الإندوسبرم	من المنخرات الغذائية الموجودة في النقتين أو السويداء
نوع الإخصاب	مفرد	مضاعف
منشأ الأنبوب الطلمي	من نمو الخلية الإعاشية في حبة الطلع الناضجة	من الخلية الإعاشية و الغلاف الداخلي لحبة الطلع
أنواع الإنتاش	هوائي	هوائي - أرضي
وجود السويداء	لا توجد	توجد
عدد المغلفات	4 مغلفات	مغلق واحد

## الدرس السابع : التكاثر الجنسي لدى الإنسان (منشأ جهاز التكاثر لدى الإنسان)

بعد زيادة إحدى السيدات وزوجها العيادة النسائية أخبرهما الطبيب بأنها حامل ، وكونها تحمل للمرة الأولى وفي أثناء عودتهما أبدت لزوجها رغبتها بكون جنينها ذكراً في حين أن زوجها تمنى أن يكون الجنين أنثى ، فهل بإمكان التفاتات العلمية الحالية التحكم بجنس المولود الناتج ؟  
نعم ، حيث تبين للباحثين أن النطفة التي تحمل الصبغي ( Y ) تكون أسرع من النطفة الحاملة للصبغي ( X ) ، لذلك يقوم بعض الأطباء بعزل حوالي 80 % من النطفاء بناءً على سرعتها ، مما يزيد في احتمالية تحديد جنس المولود .

ما دور المورثات في التشكل أو ما المقصود بمنظمات التعضي؟ تتحكم المورثات في تنامي الكائن الحي وتطوره وتسمى: منظمات التعضي .  
ما دور المورثات في تحديد جنس الجنين وكيف تتطور بداية المنسل الجنيني غير محددة الجنس في البداية إلى خصية أو مبيض ؟  
مراحل تمايز الخصيتين : عروس مفكرة ( 1n ) + Y عروس مؤنثة ( 1n ) X بيضة ملقحة ( 2n ) XY بداية منسل غير محدد الجنس ( توجد في الصبغي Y المورثة SRY التي تشرف على صنع بروتين خاص ينشط تحول بداية المنسل إلى خصية خلال الأسبوع 7 من الحمل ) خصية تفرز هرموني التستوسترون و الهرمون المشبط الموليوي AMH .  
مراحل تمايز المبيضين : عروس مفكرة ( 1n ) + X عروس مؤنثة ( 1n ) X بيضة ملقحة ( 2n ) XX بداية منسل غير محدد الجنس ( المورثة SRY غير موجودة في الصبغي X مبيض .

أين توجد المورثة SRY؟ في الصبغي Y .  
ما دور المورثة SRY؟ تشرف على صنع بروتين خاص ينشط تحول بداية المنسل إلى خصية خلال الأسبوع السابع من الحمل . أو ( ينشط تشكل الخصية ) .  
ما وظيفة الخصية ؟ تفرز هرموني التستوسترون و الهرمون المشبط الموليوي AMH .  
ما آلية التشكل وما تأثير إفراز هرموني التستوسترون و AMH على التطور لدى كلا الجنسين ؟  
الجنين الذكر XY : يتطور أنبوب وولف إلى أقية تناسلية ذكورية  
إفراز التستوسترون عند الذكر؟ يسبب نمو أنبوبي وولف . إفراز الAMH عند الذكر؟ يسبب ضمور أنبوبي مولر .  
الجنين أنثى XX : يتطور أنبوب مولر إلى أقية تناسلية أنثوية .  
غياب التستوسترون عند الأنثى؟ يسبب ضمور أنبوبي وولف . غياب الAMH عند الأنثى؟ يسبب نمو أنبوبي مولر .  
من أين تشق أعضاء التكاثر؟ من الوريقة الجنينية المتوسطة خلال الأسبوع السابع من الحمل .  
كيف تتشكل المناسل؟

تتشكل بداءات المناسل التي تتطور إلى مناسل (خصيتين لدى الذكر أو مبيضين لدى الأنثى) ويتشكل نوعان من الأتابيب : أنبوبا وولف وأنبوبا مولر .  
أكمل ما يأتي بالعبارات العلمية المناسبة:  
لدى الذكر : ينمو أنبوبا وولف إلى أقية تناسلية ذكورية بتأثير (التستوسترون) ويضمور أنبوبا مولر بتأثير (AMH) .  
لدى الأنثى : ينمو (أنبوبا مولر) إلى أقية تناسلية أنثوية بسبب غياب AMH ويضمور أنبوبا وولف بسبب غياب (التستوسترون) .

## حل التقييم النهائي

من أي الوريقات الجنينية تشق المناسل؟ ومتى يبدأ تشكلها؟ من الوريقة الجنينية المتوسطة، يبدأ تشكلها خلال الأسبوع السابع من الحمل .  
ماذا تتوقع جنس المولود الحامل للصبغيات الجنسية في الحالات الآتية : ( X - XXX - XXY ) ؟ ذكر ، X : أنثى - XXX : أنثى - XXY : ذكر .  
ماذا ينتج من : أ- إفراز هرمون التستوسترون لدى المضة الجنينية قبل تمايزها الجنسي؟ نمو أنبوبي وولف إلى أقية تناسلية ذكورية .  
ب- إفراز هرمون AMH لدى المضة الجنينية قبل تمايزها الجنسي؟ ضمور أنبوبي مولر .  
اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي :  
إن جنس الجنين الناتج من المضة التي تمتلك الشغ الصبغي الجنسي XY ذكر ويعود ذلك لأحد الخبرات العلمية الآتية: د- ( أ + ب ) .  
ما وظيفة كل من : الهرمون AMH - مورثة SRY - أنبوبي مولر لدى المضة الجنينية XX ؟ الهرمون AMH : يشبط نمو أنبوبي مولر .  
مورثة SRY : تشرف على صنع بروتين خاص ينشط تحول بداية المنسل إلى خصية . أنبوبي مولر لدى المضة الجنينية XX : يتموان إلى أقية تناسلية أنثوية .

## ورقة عمل

ترغب بعض الأسر في إنجاب الأبناء الذكور وبعضها الآخر في إنجاب الإناث: وبما أن الصبغي Y يعد مسؤولاً عن تحديد جنس الذكر ، والعروس المنكرة يمكن أن تحمل الصبغي Y أو الصبغي X ، فكيف يمكن التحكم بجنس الجنين ؟ وما النتائج المتوقعة في هذه الحالة ؟ - نعم ، حيث تبين للباحثين أن النطفة التي تحمل الصبغي ( Y ) تكون أسرع من النطفة الحاملة للصبغي ( X ) ، لذلك يقوم بعض الأطباء بعزل حوالي 80 % من النطفاء بناءً على سرعتها مما يزيد في احتمالية تحديد جنس المولود .



## الدرس الثامن : جهاز التكاثر الذكري

ما أقسام الجهاز التكاثري الذكري لدى الإنسان ؟  
الخصيتان .  
القنوات النقلة للنطف .  
الغدد الملحقة .  
أولاً : الخصيتان :  
هل تعلم : للخصية البنية ذاتها في الثدييات كافة .

أن هجرة الخصية خارج تجويف البطن أمر عام في معظم الثدييات باستثناء بعضها ماهي ؟ الفيلة والحياتان .

- 1- ما أقسام الخصية ؟ - غلاف الخصية : هو غمد ضام ليفي يحيط بها . - الحبل المنوي : يتكون لدى الإنسان من : ( الأسهر و الأوعية الدموية والمفاوية والأعصاب المرتبطة مع بعضها بنسيج ضام ) . - دم يتكون الحبل المنوي لدى الإنسان .
- 2- فصوص الخصية : تقسم حواجز لولبية الخصية إلى فصوص عددها نحو 250 فصاً . - ما وظيفة حواجز الخصية : تقسم الخصية إلى فصوص .
- 3- الأتابيب المنوية : يوجد داخل فصوص الخصية الأتابيب المنوية النقبلة التي تقوم بإنتاج النطاف ( الأعراس الذكرية )
- 4- حدد موقع الأتابيب المنوية : داخل فصوص الخصية ، وما دورها : إنتاج النطاف ، وكم يبلغ عدد هذه الأتابيب لدى الرجل في الخصية الواحدة : 800 أنبوب تقريباً )
- 5- شبكة الخصية ( هائر ) : تتشكل من تجمع الأتابيب المنوية ، لتصب في البربخ . - كيف تتشكل شبكة الخصية ، وأين تصب .
- 6- الخلايا البيئية ( ليدغ ) : توجد بين الأتابيب المنوية الخلايا البيئية ، التي تفرز هرمونات الأندروجينات ومنها التستوسترون .
- 7- حدد موقع الخلايا البيئية : بين الأتابيب المنوية في الخصية ، وما دورها : تفرز هرمونات الأندروجينات ( .
- 8- ما الخلايا الموجودة في جدار الأتابيب المنوية ؟ - خلايا حاضنة ( سرتولي ) - خلايا منوية منقسمة متحولة إلى نطاف .
- 9- اربط بين المسميات الواردة في الجدول ، والرقم المناسب على الشكل ...

الرقم	الاسم
3	وعاء دموي
7	نواة خلية
1	سرتولي
1	نطاف
4	خلايا بيئية
5	خلايا منوية
	منقسمة



الرقم	الاسم
5	غلاف الخصية
2	البربخ
1	الحبل المنوي
6	تجويف الصفن
7	الأسهر
3	شبكة هائر
4	الأتابيب المنوية



## ورقة عمل

لاحظت إحدى السيدات لدى مولودها أن الخصيتين غير موجودتين خارج البطن ، وعندما أخذته إلى الطبيب أخبرها بضرورة إجراء مداخلة جراحية لإخراجهما والمطلوب :

- 1- ما الدرجة المثلى لإنتاج النطاف ؟ 35 درجة مئوية .
- 2- ما ضرورة هجرة الخصيتين قبل الولادة إلى تجويف بطني ؟ كيس الصفن ؟ لتأمين درجة حرارة مناسبة لإنتاج النطاف أقل من درجة حرارة الجسم .
- 3- ماذا يحدث إذا لم يخضع المولود السابق للمداخلة الجراحية قبل مرحلة البلوغ الجنسي ؟ العقم أو عدم القدرة على إنتاج النطاف .
- 4- ما أهمية تنكس العضلات الملساء في جدار كيس الصفن في درجات الحرارة المنخفضة ، واسترخائها في درجات الحرارة المرتفعة ؟ - تنكس لتقريب الخصيتين من الجسم مما يؤمن الدرجة المناسبة لإنتاج النطاف . تسترخي لإبعاد الخصيتين عن الجسم وتأمين الحرارة المناسبة لإنتاج النطاف .
- 5- قصر الرجال الذين يستحمون بماء ساخن جداً بشكل دائم يكون عدد نطافهم في الغالب قليل ؟ لأن درجات الحرارة المرتفعة تعيق تشكل النطاف .
- 6- فسر تعدد الخصية عدة مضاعفة الإفراز ( داخلي و خارجي ) ؟ لأنها ذات إفراز داخلي فهي تفرز الهرمونات الجنسية الذكرية إلى الدم ، وذات إفراز خارجي فهي تنتج النطاف ( الأعراس الذكرية ) وتلقي بها في القنوات الناقلة للنطاف إلى الوسط الخارجي .
- 7- ما القناة التي يمر عبرها الحبل المنوي قبل الانتقال إلى كيس الصفن ؟ بجز الحبل المنوي عبر القناة الإربية ، لينتقل بعدها إلى كيس الصفن .
- 8- ما المقصود بالقناة الإربية ؟ طريق عبر البنية العضلية البطنية تتشكل عند هجرة الخصيتين .
- 9- متى تطلق القناة الإربية ؟ تطلق لدى الذكور البالغين .
- 10- ماذا ينتج من مرور الحبل المنوي في القناة الإربية لدى الذكور ؟ يحدث نفاذ ضغط في جدار البطن فقد تبرز أحياناً أنسجة أحشائية في هذه القناة وهذا ما يسمى بالفنتق الإربي .
- 11- فسر تعدد حالة الفتق الإربي شائعة لدى الذكور ؟ لأن الحبل المنوي يمر من القناة الإربية ، مما يخلق نفاذ ضغط في جدار البطن فقد تبرز أحياناً أنسجة أحشائية في هذه القناة .
- 12- فسر تعدد حالة الفتق الإربي نادرة لدى الإناث ؟ لأن القناة الإربية صغيرة جداً لدى الإناث .
- 13- ما المقصود بمرض دوالي الخصية ؟ مرض يحدث في الخصية نتيجة ركود جريان الدم في الأوردة المنوية داخل الحبل المنوي .
- 14- ماذا تضم القنوات الناقلة للنطاف ؟ البربخ : أنبوب رفيع ملتف تصب فيه شبكة هائر يبلغ طوله نحو 7 أمتار وبعد المستودع الرئيس للنطاف ، وتكتسب النطاف فيه القدرة على الحركة الذاتية عند اختلاطها بمفرزات الحويصلين المنويين . - ماذا يصب في البربخ ، وكم يبلغ طوله ، وما دوره ؟
- 15- الأسهر : أنبوب عضلي طوله نحو 45 سم يقوم بنقل النطاف إلى الإحليل ، وبماكته تخزين النطاف لمدة شهر تقريباً . - كم يبلغ طوله ، وما دوره ؟
- 16- الإحليل : قناة مشتركة بولية تناسلية توجد وسط القضيب الذكرية تفرز سائلاً مخاطياً يُضاف إلى النطاف .
- 17- أين يوجد الإحليل ، وما دوره ؟
- 18- عدد الغدة الملحقة بالجهاز التناسلي الذكرية ؟



- 1- الحويصلان المنويان ( الغدة المنوية ) : أين تقعان : ( خلف قاعدة المثانة ) ،
- 2- ما دورهما : وتعدان غداً إفرازية نشطة جداً تفرز نحو 60% من السائل المنوي ،
- 3- وتكون مفرازاتها كقوية تحتوى على :
- 4- تركيز مرتفع من الفركتوز ( سكر الفواكه ) : يتم استقلابه بسهولة من قبل النطاف . ( ما مصدر تغذية النطاف في الإبتداء التناسلية الذكرية )

البروستاتاغلائين : تحدث على تقلص العضلات الملساء في المجرى التكاثري الذكري ، وتقلص عضلات المجرى التكاثري الأنثوي في أثناء الإقتران (فسر) لتأمين وصول النطف إلى الرحم (استعمل البروستاتاغلائين في شرح الأبي) .  
 2- غدة البروستات : غدة عضلية ملساء ( أين تقع : تحيط بالجزء الأول من الإحليل ) ، تنتج غدة البروستات : - سائلأ حمضيا الى حد ما حليبيأ بشكل (20%30) من حجم السائل المنوي يخلف من لزوجة السائل المنوي ، ويحتوي على شوارد الكالسيوم (فسر) لتتسيط حركة النطف .  
 مركبات أخرى أهمها : بلاسمين منوي : بروتين مضاد للجراثيم يساعد على منع حدوث التهابات المجرى البولي التناسلي لدى الذكور .  
 فسر بسبب فصور إفراز البروستات التهابات في المجرى البولي التناسلي ؟  
 لأن البروستات تفرز بروتين مضاد للجراثيم ( بلاسمين منوي ) يساعد على منع حدوث التهابات المجرى البولي التناسلي لدى الذكور .  
 ماذا ينتج من فصور إفراز البروستات ؟ التهابات في المجرى البولي التناسلي لدى الذكر .  
 فسر تكون مفرزات الحويصلين المنويين والبروستات أساسية (قلوية) ، مما يسهم في تخفيف حموضة المهبل لدى الأنثى والبول المتبقي في الإحليل ل الذكر ؟ لأن النطف لا تصبح متحركة بشكل مثالي إلا عندما تصبح درجة الحموضة PH بين 6 - 6.5 .  
 غندا كوير ( البصيلتان الإحليلتان ) :

حدد موقع : تقعان قرب قاعدة القضيب الذكري الوظيفية : تفرزان مادة مخاطية أساسية ( ما دورها ) تخفف حموضة البول المتبقي في الإحليل .  
 متى تتضخم البروستات تلقائياً لدى معظم الرجال ؟ وكيف تحل هذه المشكلة ؟ وما السبب ؟ . تتضخم لدى معظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ويلجأ عادة إلى الجراحة لحل هذه المشكلة . قد يكون أحياناً سبب التضخم ورماً حميداً أو ورماً خبيثاً .  
 فسر ضرورة إجراء اختبارات فحص البروستات لدى الذكور بعد سن الخمسين ؟  
 لأن البروستات تتضخم تلقائياً لدى معظم الرجال بعد سن الخمسين وقد يكون سبب التضخم في بعض الأحيان ورماً حميداً أو خبيثاً .  
**الدرس التاسع ، تشكل النطف وأهميتها**  
 للخصية وظيفتين رئيسيتين ما هما ؟ تشكل النطف ، إفراز الهرمونات الجنسية الذكورية .  
 أولاً : تشكل النطف :

متى يبدأ تشكل النطف ؟ وهل يتوقف تشكلها ؟ و كم تستغرق العملية الكاملة لتشكيل النطف ؟  
 تتشكل بدءاً من سن البلوغ . يستمر تقريباً مدى الحياة . تستغرق العملية الكاملة لتشكيل النطف نحو 64 يوماً .  
 أين توجد الخلايا الجذعية المولدة لدى الذكر ( خلايا الظهارة المنشنة ) وما ناتج انقساماتها الخطية المتتالية ؟  
 توجد في القسم المحيطي من الأتابيب المنوية . ناتج انقسامها : تنقسم سلسلة انقسامات خطية مشكلة منسليات منوية n2 .  
 ما مراحل تحول المنسليات المنوية إلى نطف ؟  
 خلايا الظهارة المنشنة n2 ، منسلية منوية n2 ، خلية منوية أولية n2 ، خلية منوية ثانوية n1 ، منويات n1 ، نطف n1 على ما يطرأ الانقسام المنصف الأول والثاني ، وماذا ينتج عنهما ؟  
 يطرأ الانقسام المنصف الأول على الخلية المنوية الأولية n2 ينتج عنه خليتين ثانويتين ثانويتين كل منهما n1 .  
 يطرأ الانقسام المنصف الثاني على الخليتين المنويتين الثانويتين ينتج عنه 4 منويات n1 .  
 حدد بدقة موقع كل من : المنسلية منوية n2 و الخلية منوية أولية n2 و الخلية منوية ثانوية n1 و المنويات n1 في القسم المحيطي من الأتابيب المنوية .  
 كم عدد النطف المشكلة من مليون خلية منوية أولية ؟ 4 ملايين .  
 ما أهمية حدوث الانقسام المنصف الثاني ، مع العلم أن العدد الصبغي قد اختزل إلى النصف بعد حدوث الانقسام المنصف الأول ؟  
 لاختزال كمية ال DNA المتضاعفة في الطور البيني .  
 كيف تبقى المنويات الأربعة المشكلة من منسلية واحدة مترابطة ؟ من خلال جسور من السيوتوبلازما ،  
 متى تتفكك جسور السيوتوبلازما الرابطة بين المنسليات المنوية الأربعة ؟ في المراحل الأخيرة من نضج النطف .  
 كيف تتحول المنوية إلى نطفة ؟ أو ما مراحل تمايز المنويات إلى نطف بالترتيب ؟  
 يتحول جهاز غولجي إلى جسم طرفي يتوضع في مقدمة رأس النطفة .  
 تصطف الجسيمات الكوندرية حول بداية السوط في القطعة المتوسطة .  
 يظهر لها ذيل .  
 ما منشأ الجسم الطرفي ؟ من جهاز غولجي للمنوية  
 تتخلص المنوية من معظم هيولاها . وتفقد الناضجة العديد من العضيات الهيولية ، ما أهمية ذلك لوظيفة النطفة ؟ لتسهيل حركتها .  
 ما العضيات التي تزود النطفة بالطاقة الضرورية لأداء عملياتها الحيوية ؟ وأين تتوضع ؟ الجسيمات الكوندرية ، في القطعة المتوسطة للنطفة .  
 ما الأجزاء الرئيسية التي تتكون منها النطفة ؟ رأس - قطعة متوسطة - ذيل  
 ماذا تتوقع لو كانت حركة النطفة دائرية 180 درجة ؟ سبب ذلك العقم أو لا تستطيع النطفة الوصول إلى العروس الأنثوية .  
 مم يتكون ذيل النطفة ؟ من سوط مولف من أنبوبيت نقيفة تتشا من المركز البعيد وهو السوط الوحيد لدى خلايا الإنسان .  
 كيف تكون حركة النطفة ؟ ذاتية لولبية كحركة البرغي .  
 تحتاج المنويات التي تتمايز إلى نطف إلى دعم تطورها وتخزينها ، فما مصدر ذلك ؟ الخلايا الحاضنة ( سرتولي ) .  
 حدد موقع الخلايا الحاضنة ( سرتولي ) ؟ في جدار الأتابيب المنوي



1. **قارن بين شكل خلايا سرتولي في الأنابيب النشطة والخاملة ؟** . تبدو في الأنابيب المنوية النشطة متطاولة على شكل عمود سيتوبلاسمي يحمل نطفاً . في الأنابيب المنوية الخاملة ( خصية عقيمة أو ضامرة ) تكون صغيرة وغير متطاولة .
2. **تقوم الخلايا الحاضنة بوظائف عديدة ماهي ؟** . مصدر غذائي للمنويات التي تمتاز إلى نطف .
3. **تسهم في تشكيل الحاجز الدموي الخصوي ( وظيفه ) : الذي يمنع وصول مواد ضارة إلى الخصية ، ويمنع خلايا جهاز المناعة من مهاجمة النطف ( فسر ) : لأن غشاء النطفة يمتلك مولدات ضد خاصة لا توجد في أغشية الخلايا الجسمية الأخرى ، لذلك يتم التعرف إليها على أنها مواد غريبة .**
4. **بلعصة الهيولى المفلوذة من المنويات التي تمتاز إلى نطف .**
5. **ماذا نسمي السائل الذي تسبح فيه النطف ، ومما يتكون ؟** السائل المنوي ، يتكون من مفرزات الغدد الملحقة بجهاز التناسل الذكرى و 10% نطف .
6. **ما عدد النطف لدى الفكور البالغين الأسوياء ؟** ما بين ( 100 - 20 ) مليون نطفة / مل .
7. **متى يكون الذكر في حالة عقم فيزيولوجي غالباً ؟** إذا قل عدد النطف عن 20 مليون نطفة في / مل .
8. **ما كمية السائل المنوي ؟** نحو ( 2-5 ) مل عند القذف بعد راحة أيام عدة .
9. **ما عدد النطف الأعظمي لدى الذكر الخصب الطبيعي ؟**
10. **تقريباً 500 مليون نطفة لدى الذكر الخصب الطبيعي ويكون لديه على الأقل 60% من النطف طبيعية في مظهرها وحركتها .**
11. **ما درجة حموضة السائل المنوي PH ؟** نحو 7,5 .
12. **على ماذا يؤثر انخفاض درجة حموضة السائل المنوي ؟** يؤثر انخفاضها في العمر الأعظمي للنطف .
13. **ما عمر النطف في الطرق التناسلية الذكرية و الطرق التناسلية الأنثوية ؟**
14. **في الطرق التناسلية الذكرية أسابيع عدة ، و يتراوح في الأقتية التناسلية الأنثوية بين ( 24 - 48 ) ساعة .**
15. **يتوقف عمر النطف في الطرق التناسلية الأنثوية على عاملين ما هما ؟** يتأثر عمر النطف على مخزونها الغذائية ، ودرجة حموضة الأقتية التناسلية للأنثى .
16. **فسر العمر الأعظمي للنطف يتراوح في الأقتية التناسلية الأنثوية بين ( 24 - 48 ) ساعة فقط : لأن ذلك يتوقف على PH الأقتية التناسلية الأنثوية والمخزن الغذائي للنطفة (**
17. **ماذا تتوقع أن يحدث إذا انخفضت قيمة PH في أقتية الأنثى إلى 5 مثلاً بعد دخول النطف إليها ؟**
18. **عدم قدرة النطف على الحركة بشكل مثالي وقد تموت أو قد تحدث حالة من العقم .**
19. **ما العوامل التي تسبب اضطراباً في وظائف الخصية وتشكل النطف ؟ وما تأثيرها ؟**
20. **1- عوامل فيزيائية : الحرارة : تسبب تشكل منسليات منوية مشوهة ( عديدة النوى ) .**
21. **الأشعة : تؤثر في المنسليات والخلايا المنوية الأولية والثانوية ، وتكون المنويات في مرحلة التمايز أقل تتأثر ( فسر تؤثر الأشعة في الخلايا المنوية المنقسمة بشكل أكبر بكثير من المنويات : لأن المنويات تكون في مرحلة التمايز ) .**
22. **المواد الكيميائية : كالألدهيدات والأغوال والمخدرات وبعض الأدوية العصبية لها تأثير ( سام في الخصية ) .**
23. **عوامل غذائية : نقص فيتامين ( E , A ) ( مانا ينتج ) : بسبب قصوراً في تشكل النطف .**
24. **عوامل وعائية : نقص مرور الدم في الخصية ( مانا ينتج ) : يعوق تشكل النطف .**
25. **ما أهمية الرياضة وعدم ارتداء الملابس الضيقة لدى الذكور البالغين ؟**
26. **الرياضة تنشط الدوران الدموي مما ينشط إنتاج النطف . عدم ارتداء الملابس الضيقة يمنع ركود الدم في الأوعية الدموية .**
27. **عدم الهبوط الخصوي : ( ما المقصود ) : لا تتشكل النطف في الأنابيب المنوية إذا بقيت الخصيتان داخل تجويف البطن**
28. **فسر : لأن الدرجة المثلى لتشكيل النطف هي 35 درجة مئوية أي أقل بدرجتين من درجة حرارة الجسم الطبيعية ، في حين لا يتأثر إفراز التستوسترون من الخلايا البينية ويمكن إجراء مداخلة جراحية إذا شخصت الحالة في عمر مبكر ، وتعود النطف إلى التشكل . فسر لا تتأثر الصفات الجنسية الثانوية أو لا يتأثر إفراز التستوسترون بعدم الهبوط الخصوي : لأن الخلايا البينية في الخصية تقوم بإفراز هرمون التستوسترون (**
29. **ثانياً : إنتاج الهرمونات ( الحاثات ) الجنسية الذكرية :**
30. **ما الهرمونات التي تنتجها الخلايا البينية ( ليديج ) ؟** تنتج الهرمونات الستيرويدية تسمى الأندروجينات ، وهي : ( التستوسترون - الدايدروتستوسترون الأندروسينيديون ) وأهمها التستوسترون .
31. **فسر تكون الحمية الغذائية التي تمنع تناول النسم ذات تأثير سلبي على القدرة الإخصابية للذكور : لأن الهرمونات الجنسية الذكرية ذات طبيعة كيميائية ستيرويدية (**
32. **من أين تستق الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية ؟** من الكوليمسترون وتكون لها بنية متقاربة .
33. **ما كمية التستوسترون غير الفعال وأين يرتبط ؟ وإلى أين ينتقل الجزء الفعال ؟** يرتبط 98% من التستوسترون مع بروتينات الدم كاحتياطي أما الجزء الفعال فينتقل إلى هيولى الخلايا المستهدفة حيث مستقبله النوعي البروتيني .
34. **ما أهمية التستوسترون في المرحلة الجنينية وعند البلوغ ؟**
35. **1- في المرحلة الجنينية : ظهور الصفات الجنسية الأولية ( تشكل الأعضاء الجنسية للجنين ) . نمو أنابيب وولف . هجرة الخصيتين إلى كيس الصفن .**
36. **فسر : عدم هجرة الخصيتين لدى بعض الذكور في نهاية المرحلة الجنينية : بسبب عدم إفراز التستوسترون بكميات كافية في نهاية المرحلة الجنينية (**
37. **2- عند البلوغ : ظهور الصفات الجنسية الثانوية ( المميزة للذكر البالغ ) ماهي ؟** ظهور الشعر في مناطق عدة عند الجسم خشونة الصوت ضخامة العضلات وقوتها وزيادة حجم الأعضاء التناسلية وكيس الصفن . تنشيط تشكل النطف وزيادة عمر النطف المخزنة .

زيادة الكتلة العظمية والعظمية للذكور بنسبة تفوق مثلثتها لدى الإناث ب 50% (فسر) : لأن هرمون التستوسترون يحث على تركيب البروتينات وزيادة ترسب الكالسيوم في العظام . فسر ظهور الصفات الجنسية الثانوية عند الذكر في أثناء النضج الجنسي : بسبب زيادة إفراز الهرمونات الجنسية الذكرية (التستوسترون) . فسر بنشاط هرمون FSH تشكل النطاف بشكل غير مباشر من خلال تأثيره على خلايا سرتولي ؟ لأن خلايا سرتولي وحدها التي تمتلك في غشائها الهيولي المستقبل الغشائي لهذا الهرمون .

ما تأثير الوطاء والغدة النخامية في عمل الخصيتين ؟

1- يفرز الوطاء هرمون GnRH الهرمون المطلق لهرمونات المناسل ( ما وظيفة هرمون GnRH ) والذي يحرض النخامة الأمامية ، فتفرز هرموني : SH : المنبه للجريب ، LH الملون ( المصفر ) .

2- يوتران وبشكل مختلف على الخصيتين لدى الذكر والمبويضين لدى الأنثى ، ما تأثيرهما في الخصيتين ؟

هرمون FSH يحث الالتهاب المنوي في الخصية على تشكل النطاف بشكل غير مباشر . ما وظيفة هرمون FSH لدى الذكر

هرمون LH يحث الخلايا البيئية على إفراز التستوسترون ، والذي ينشط تشكل النطاف . ما وظيفة هرمون LH

3- تفرز خلايا سرتولي هرموناً بروتينياً يسمى : إنهيبيين ، ينشط إفراز FSH و GnRH ما الخلايا التي تفرز هرمون إنهيبيين وما تأثير هذا الهرمون على SH

ماذا ينتج من إفراز خلايا سرتولي للإنهيبيين : تلتزم راجع سلبى إذ ينشط الوطاء والنخامة الأمامية ويتوقف إفراز FSH وإنتاج النطاف (

4- وكذلك زيادة تركيز التستوسترون في الدم ( ماذا ينتج ) ينشط إفراز LH و GnRH ( تلتزم راجع سلبى ) .

## ورقة عمل



يلرز أندروجين DHEA من قشرة الكظر لدى الذكر والأنثى بكميات قليلة ، وهو منشط للحوية ، ويزيد القوة وكتلة العضلات ، وقد ركب منه دواء خارق لزيادة الحوية والقوة . والمطلوب : لماذا منع الاتحاد الأولمبي الرياضيين من استخدامه ؟ لقد تبين ارتباط المستويات العالية من الأندروجين لدى النساء بزيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض وزيادة الصفات الذكورية عندهن لأن أندروجين يتحول إلى تستوسترون كذلك تأثيراته السلبية على عضلة القلب

## الدرس العاشر : جهاز التكاثر الأنثوي

من اكتشف بروفات على سطح المبيض لدى الثدييات ، وماذا أطلق عليها وبماذا وصف البويضات ؟

الطبيب دوغراف 1672 ، أطلق عليها الجريبات ووصف البويضات بأنها تقع على سطح المبيض .

من اكتشف وجود العروس الأثوية داخل جريبات دوغراف ؟ العالم فون بير 1827 .

ما أقسام الجهاز التكاثري الأنثوي ؟ المبيضان ، القنوات الناقلتان للبيوض ، الرحم ، المهبل

أولاً : المبيضان لكل مبيض حجم لمرّة اللوز

ما هما المنطقتان الرئيسيتان اللتان يتألف منهما المبيض ؟ القشرة والللب

1- القشرة : (ماذا تحوي قشرة المبيض) ؟

العديد من التراكيب كيسية الشكل تسمى : الجريبات المبيضية .

ما المقصود بالجريبات المبيضية ، حدد موقع الجريبات المبيضية : في قشرة المبيض

خلايا جذعية تسمى خلايا الظهارة المنشنة n2 تنشأ منها المنسلات البيضية .

أين توجد خلايا الظهارة المنشنة n2 لدى الأنثى : في قشرة المبيض ، ما دورها : تنشأ منها المنسلات البيضية

2- اللب : نسج ضام غني بالأوعية الدموية .

من أين تدخل الأوعية الدموية إلى المبيض ؟ وما أهميتها ؟ تدخل من سرة المبيض وأهميتها هي تغذية المبيض .

ثانياً : القنوات الناقلتان للبيوض

ما الخلايا التي تبطن القنوات الناقلتان للبيوض وما دور كل منها ؟ وماذا يتشكل في بدايتها ؟ الخلايا المبطنة هي

تكون كل قناة مبطنة بخلايا ظهارية مهدبة ( دورها ) تسهم أهدابها في تحريك العروس الأثوية أو البيضة الملقحة باتجاه الرحم .

و خلايا غدبية ( دورها ) تفرز مادة مخاطية . ويتشكل في بداية القناة الناقلة للبيوض الصيوان (البوق) .

ما وظيفة أهداب الخلايا الظهارية المبطنة للقناة الناقلة للبيوض ؟ تسهم في تحريك العروس الأثوية باتجاه الرحم .

ما أهمية البوق في بداية القناة الناقلة للبيوض ، وأين يقع ؟ التقاط البويضات حين خروجها من المبيض . يقع في بداية القناة الناقلة للبيوض .

ما وظيفة الخلايا الغدية في القناة الناقلة للبيوض ؟ تفرز مادة مخاطية .

ما وظيفة الرباط المبيضي ؟ يثبت المبيض في مكانه . ما الوحدة الوظيفية في المبيض ؟ الجريب المبيضي .

ثالثاً : الرحم

ما المقصود بالرحم أو مما يتألف ؟ جوف عضلي يتألف من ثلاث طبقات : طبقة خارجية رقيقة .

طبقة وسطى عضلية ملساء (عضلة الرحم) كتلتها 90% من كتلة الرحم . طبقة داخلية مخاطية 10% من كتلة الرحم .

ما أهمية الكتلة الكبيرة لعضلة الرحم ؟ من أجل تأمين وحماية الحمل . وتتقلص أثناء الولادة ( ماذا ينتج ) لتسهيل خروج الجنين .

لماذا تكون بطانة الرحم الداخلية غنية بالأوعية الدموية والغدد المخاطية ؟ لتأمين متطلبات الجنين أثناء تشكله .

رابعاً : المهبل

ما المقصود بالمهبل ؟ أنبوب عضلي مبطن بغشاء مخاطي ويتصل بالرحم عن طريق عنق الرحم الضيق .





ما وظيفة عنق الرحم الضيق أو حدد موقعه ؟ يصل المهبل بالرحم .

ما أهمية المهبل أثناء الولادة أو ما وظيفته ؟ طريق لخروج الجنين في الولادة الطبيعية .

ما مراحل تطور الجريبات ؟ وكيف تتشكل البويضات داخلها ؟

أو قارن بين نوع الخلية الببضية الموجودة في الجريبات وصيفتها الصبغية ؟

الجريب الابتدائي ( الخلية الموجودة فيه ) منسلبة ببضية - ( صيفتها الصبغية ) n2 .

الجريب الأولي : ( الخلية الموجودة فيه ) خلية ببضية أولية ( صيفتها الصبغية ) n2 .

الجريب الثانوي : ( الخلية الموجودة فيه ) خلية ببضية أولية ( صيفتها الصبغية ) n2 .

الجريب الناضج : ( الخلية الموجودة فيه ) خلية ببضية ثانوية ( صيفتها الصبغية ) n1 .

لماذا تكون الصيغة الصبغية للخلية الموجودة في الجريب الثانوي n2 ، والخلية في الجريب الناضج صيفتها الصبغية n1 ؟

بسبب الانقسام المنصف الأول الذي يطرأ على الخلية الببضية الأولية في أثناء تحول الجريب الثانوي إلى ناضج

متى تتابع الخلية الببضية الثانوية الانقسام المنصف الثاني ؟ وماذا ينتج عنه ؟ إذا حدث إخصاب ، بويضة n1 كرة قطبية ثانية n1 .

خلال الانقسام المنصف تنوزع السيتوبلازما بشكل غير منتظم فما مصير الكريات القطبية قليلة السيتوبلازما ؟ وما صيفتها الصبغية ؟

نزول ، وصيفتها الصبغية n1 .

قارن بين كمية ال DNA في كل من البويضة والخلية الببضية الثانوية ؟ كمية ال DNA في البويضة نصف كميتها في الخلية الببضية الثانوية .

ما الخلايا الغدية الصماء الموجودة في الجريب ، وأين تشاهد بوضوح وما دورها ؟ أهمها الخلايا الحبيبية والخلايا القرابية . نشاهد بوضوح في الجريب الناضج .

وظيفة الخلايا الغدية الصماء ؟ تلتج الهرمونات الجنسية الأثوية ( الإستروجينات والبروجسترونات )

حدد موقع الخلايا الحبيبية والقرابية ؟ في الجريبات المبيضة .

فسر يعد الجريب الناضج غدة صماء ؟ لأنه يحوي خلايا جرابية (حبيبية وقرابية) تفرز الهرمونات الجنسية الأثوية وتلقي بها في الدم مباشرة .

فسر يعد المبيض غدة مضاعفة الوظيفة أو ما وظيفته ؟ لأنه يفرز الهرمونات الجنسية الأثوية إلى الدم وينتج الأعراس الأثوية و يلقى بها إلى الوسط الخارجي

إلى ماذا تنحل الجريبات الابتدائية والأولية التي لا تتطور وماذا تسمى هذه العملية ؟ تنحل إلى جريبات ناضجة وتسمى هذه العملية الرتق .

متى يبدأ تشكل الأعراس الأثوية ؟ ومتى يتوقف ؟ يبدأ عند سن البلوغ حتى سن اليأس .

اشرح آلية تشكل البويضات بدءاً من انقسام خلايا الظهارة المنسلة n2 منتهاً بجاذلة الإباضة ؟

في المرحلة الجنينية : يبدأ تشكل الأعراس الأثوية قبل ولادة الأثني إذ تنقسم خلايا الظهارة المنسلة انقسامات خيطية لتعطي منسليات ببضية

n2 تحيط بكل منها طبقة من الخلايا الجريبية مكونة جريباً ابتدائياً . وعندما تولد الأثني يكون في مبيضها 2 مليون من الجريبات الابتدائية تقريباً ،

ينضج منها حوالي 400 جريب فقط .

بعد البلوغ : تنمو المنسلية الببضية متحولة إلى خلية ببضية أولية n2 وتحاط بعدة طبقات من الخلايا الجريبية مكونة جريباً أولياً . تنمو عدة

جريبات أولية بشكل دوري منذ البلوغ (12 - 15) سنة تقريباً حتى سن اليأس (الضحي) . ويتحول واحد منها إلى جريب ثانوي بداخله خلية ببضية

أولية (n2) . تظهر بداخله أجوافاً جريبية وتتجمع هذه الأجواف مشكلة جوفاً جريبياً واحداً يملؤه سائل جريبي ويتحول هذا الجريب إلى جريب ناضج

بداخله خلية ببضية ثانوية n1 ، ثم يتمزق فتتحرر منه الخلية الببضية الثانوية n1 بجاذلة الإباضة .

كيف يعمل المبيضان ؟ بالتناوب غالباً وتنتج الخلية الببضية الثانوية .

ماذا يحيط بالخلية الببضية الثانوية n1 ؟ وما بنيتها ؟ يحيط بها خلايا جريبية ( تشكل الإكليل المشع )

بنيتها : الإكليل المشع يليه المنطقة الشفيفة ، ثم المجال حول الخلية الببضية الثانوية

ولها غشاء هيولي وتوجد في هيولاها المحيطة الحبيبات القشرية وضمن الهيولي نواة

الخلية الببضية الثانوية وقد توقف فيها الانقسام المنصف الثاني في الطور الاستوائي وصيفتها الصبغية n1 .

ما وظيفة الإكليل المشع ؟ يؤمن الحماية للخلية الببضية الثانوية من الالتصاق بأي مكان قبل وصولها إلى الرحم

ما مصدر الإكليل المشع ؟ من الخلايا الجريبية المحيطة بالخلية الببضية الثانوية في الجريب الناضج بعد تمزقه

ما منشأ الكرية القطبية الأولى الموجودة في المجال حول الخلية الببضية الثانوية ؟ من الانقسام المنصف الأول الذي يطرأ على الخلية الببضية الأو

في أي الأطوار يتوقف الانقسام المنصف الثاني في النواة ؟ في الطور الاستوائي من الانقسام المنصف الثاني

رتب المناطق التي على النطفة اجتيازها للوصول إلى نواة الخلية الببضية الثانوية ؟

الإكليل المشع - المنطقة الشفيفة - المجال حول الخلية الببضية الثانوية - الغشاء الهيولي - الهيولي - النواة .

فسر الصيغة الصبغية للخلية الببضية الثانوية n1 ؟ بسبب حدوث انقسام منصف أول على الخلية الببضية الأولية .

فسر يكون عمر الخلية الببضية الثانوية مطابقاً لعمر الأثني الصادرة عنها . لأن المنسلية الببضية تتشكل في المرحلة الجنينية .

## ورقة عمل



يحتوي المهبل على مجموعة من الجراثيم المقيمة ، وتكون غير ضارة عادة ، تلتج بيئة حمضية نتيجة نشاطها الاستقلالي تمنع نمو العديد من العوا


الممرضة . ما تأثير هذه البيئة الحمضية في النطاف ؟ تحد من حركتها وقد تقتلها .

كيف تتكيف النطاف مع هذه المشكلة لتحقيق مهمة الإلقاح الناجح ؟

تتكيف النطاف عن طريق تخفيض الحموضة بواسطة المفرزات القلوية للغدد الملحقة بجهاز التكاثر الذكري

قارن بين أقسام الجهاز التنكثري الذكري والأثنوي من حيث : انفصال المجري البولي التناسلي .  
 لدى الذكر مجرى مشترك أما لدى الأثنوي ينفصل المجري البولي عن المجري التناسلي .

## ورقة عمل



تظهر أحياناً أكياس مليئة بالسوائل في المبيض أو على سطحه تسمى : الكيسات المبيضية بالاستعانة بمصادر التعلم المتوفرة أو بطبيب مختص ابصر في : تأثيرها في تطور الجريبات : غالباً لا تكون ضارة ولكن قد تسبب عدم حدوث إباضة وعدم حدوث حمل - وقد تكون الكيسات موجودة خلال فترة الحمل وتزول بعد مدة ، وقد تنفجر وتسبب ضرراً الطريفة الطبية لإزالتها : لذا يعتمد على الجراحة لإزالتها (جراحة تنظيرية) .  
 اختار الإجابة الصحيحة مما يأتي :

أ- من خلال المخطط البياني المجاور يكون عمر الخلية البيضية الثانوية الناتجة من امرأة عمرها خمسون عاماً دخلت سن البلوغ في عمر ١٢ عاماً ؟ 50 سنة .  
 ب- في حال أعطيت هذه الأثنوي منشط إباضة بعد سن الخمسين فيحدث : لا يحدث إنتاج بويضات لأن مخزون المبيض قد نفذ .

## الدرس الحادي عشر ، الدور الجنسي والآليات الهرمونية المنظمة لها

لم نستطع إحدى الفتيات فهم التغيرات الجسدية التي بدت عليها في سن ( ١٢ ) عاماً ، فشعرت بالخجل من نموها الجسدي المتسارع ، وأنها مختلفة عن رفيقاتها ، فقررت الغياب عن المدرسة ، لكن والدتها أخبرتها بأنها أصبحت في مرحلة البلوغ ، وأنها حالة طبيعية فما مؤشرات البلوغ الجنسي لدى الأثنوي ؟ من بين أهم مؤشرات البلوغ الجنسي ظهور الدورة الجنسية هل يكون سن البلوغ الجنسي واحداً لدى جميع الإناث ؟ يطلق على سن البلوغ مرحلة المراهقة ، والتي تبدأ لدى الأثنوي عادة بين ( ١٢ - ١٥ ) سنة ما المقصود بالدورة الجنسية ؟ أو على ماذا تطرأ التبدلات في الدورة الجنسية ؟ ومتى تنكرر ؟ ومتى تبدأ ومتى تتوقف ؟ ولماذا ؟ وما الحادثة الأكثر وضوحاً في سن البلوغ ؟ مجموعة تبدلات دورية تطرأ على المبيض ومخاطبة الرحم . وتكرر كل 28 يوماً تقريباً .  
 وتبدأ في سن البلوغ ، وتتوقف في سن الإياس (الضهي) (50 - 45) سنة تقريباً . إذ يصبح المبيض غير نشط وظيفياً .  
 والحادثة الأكثر وضوحاً في مرحلة البلوغ هي بدء خروج دم الطمث ( الحيض) والذي يستمر من 5 - 7 أيام . (ما المقصود بالطمث) إلى ماذا تقسم الدورة الجنسية ؟ إلى دورتين مبيضية ورحمية .

أولاً : الدورة المبيضية

ما أطوار الدورة المبيضية ؟ أطوار الجريبي

الطور الأصفر

الطور الجريبي

بماذا يبدأ الطور الجريبي وما الهرمون المؤثر ؟ وكم جريب أولي يصل لمرحلة النضج وماذا يدعى ؟ وما المادة التي يفرزها ؟ يبدأ بنمو جريبات أولية عدة في أحد المبيضين غالباً بتأثير هرمون ال FSH المنبه للجريب . - واحد هذه الجريبات يتحول إلى جريب ثانوي ، ثم ناضج ، ويسمى : الجريب المسيطر ( فسر ) لأنه يفرز هرموناً مثبطاً لنمو بقية الجريبات التي بدأت بالنمو معه يسمى : الإنهيبين .  
 فسر ينمو الجريب الأولي المسيطر وحده متحولاً إلى جريب ناضج : لأنه يفرز هرمون الإنهيبين الذي يثبط نمو بقية الجريبات التي بدأت بالنمو معه) ما دور هرمون إنهيبين المفرز من الجريب المسيطر ( الناضج ) ؟ تثبط نمو بقية الجريبات الأولية التي بدأت بالنمو مع الجريب المسيطر .  
 ماذا ينتج عن تمزق الجريب الناضج والجزء الملامس له من قشرة المبيض في نهاية هذا الطور ؟ (الإباضة) .

الطور الأصفر

إلى ماذا تتحول بقايا الجريب الناضج المتمزق ؟ إلى جسم أصفر بتأثير هرمون LH .

يوجد الكوليسترول في الصباغ اللوتيني في الجسم الأصفر ما أهمية ذلك ؟

إن الهرمونات الجنسية الأثنوية المفرزة من الجسم الأصفر ذات طبيعة ستروليدية تشتق من الكوليسترول .

ثانياً : الدورة الرحمية

ما أطوار الدورة الرحمية ؟ الطور التنكثري و الطور الإفرازي .

بماذا تبدأ الدورة الرحمية ؟ تبدأ بحدوث الطمث الناتج عن تمزق بطانة الرحم وخروج خلايا الدم ، وأنسجة متخرية إلى الخارج ، ولا تتعرض خلايا المنطقة القاعدية في البطانة الرحمية للتخرب ( ماذا ينتج ) فتبدأ بالتكاثر وتجديد البطانة الرحمية ، وتزداد ثخانتها من جديد ، وتصبح غنية بالغدد المخاطية والأوعية الدموية والجليكوجين .

ماذا يحدث للبطانة الرحمية إذا لم يحدث القاح وحمل ؟ تتمزق أو تتخرب ويحدث الطمث .

أدقق جيداً في المخطط الآتي ، وأستنتج مراحل الدورة الجنسية وعلاقة هرمونات الوطاء والنخامة والمبيض بها ، ثم أجيب عن الأسئلة التالية :


١- يرتفع تركيز الهرمون المثبط إنهيبين في اليوم العاشر تقريباً من الدورة الجنسية ، كيف يؤثر ذلك في تركيز FSH ؟ وما نوع التلقيم الراجع في هذه الحالة ؟ يثبط إفراز FSH وينقص تركيزها ، ونوع التلقيم هو تلقيم راجع سلمي .

٢- ما الهرمونات النخامية التي تسهم في حدوث الإباضة في منتصف الدورة الجنسية عادة ؟ FSH و LH

٣- من أين يفرز الاستروجين ؟ من خلايا الجريب الناضج في الطور الجريبي ومن الجسم الأصفر في الطور الأصفر

٤- ما تأثير ازدياد تركيز البروجسترون بعد الإباضة وتشكل الجسم الأصفر في مخاطبة الرحم ،

ومن أين يفرز البروجسترون؟ تزداد ثخانتها ومفرزاتها ويفرز البروجسترون من الجسم الأصفر .



5- يصل تركيز هرمون الإستروجين حداً أعظماً في الأيام الثلاثة التي تسبق الإباضة ، ما نوع التلقيح الراجع على الوطاء والغدة النخامية في هذه الحالة ؟ وما دليل ذلك ؟  
نوع التلقيح راجع إيجابي والدليل هو زيادة تركيز LH و FSH و GnRH  
6- ما هي أدلة أن الأثنى غير حامل ؟

- 1- ضهور الجسم الأصفر
- 2- تمزق بطانة الرحم و حدوث الطمث
- 3- انخفاض درجة حرارة الأثنى في نهاية الطور الأصفري
- 4- عودة ارتفاع تركيز الهرمونات النخامية والوطاء

ما مدة الدورة الجنسية وما الأسباب المؤثرة عليها ؟  
مدتها الطبيعية هي 28 يوماً ويمكن أن تقل حتى عشرين يوماً أو تزيد حتى 45 يوماً ، لأسباب متعددة . والأسباب هي : الإجهاد ، الصدمات العاطفية القوية .

ما تأثير الإجهاد والصدمات العاطفية القوية على الدورة الجنسية : يمكن أن تقل حتى عشرين يوماً أو تزيد حتى 45 يوماً )  
ماذا ينتج عن إصابة الغدة النخامية بـورم عند المرأة ؟ غياب الدورة الجنسية .

فسر في سن ال 45 تقريباً تبدأ الدورة الجنسية بالاضطراب ؟ بسبب انخفاض تركيز الحاثات الجنسية مما يسبب ارتفاع في تركيز الحاثات النخامية ، مما يرافق ذلك اضطرابات نفسية في بعض الأحيان واضطرابات جسمية كالآلام العظام والمفاصل .

من أين يتم إنتاج الهرمونات الجنسية الأثنوية ؟ من الخلايا الغدية الصفاء كـالخلايا الحبيبية والقروبية في الجريب الناضج ، والتي تنتج الهرمونات الستيروئيدية الجنسية الأثنوية وأهم هذه الهرمونات الإسترايول والبروجسترون .

ما أهمية الإسترايول ومن أين يفرز ؟

- يفرز من : خلايا الجريب الناضج في الطور الجريبي . وإذا حدث حمل يستمر الجسم الأصفر بإفرازه حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل .  
ومن المشيمة بعد الشهر الثالث من الحمل حتى الولادة .

- وأهمية الإسترايول تكمن في مرحلتين : في المرحلة الجنينية ، وعند البلوغ لدى الأثنى .  
أ- في المرحلة الجنينية :

1- ظهور الصفات الجنسية الأولية (تشكل الأعضاء الجنسية للأثنى) . يسهم في تغذية الجنين (فسر) إذ يزيد من نمو غدد مخاطية الرحم .  
ب- في مرحلة البلوغ :

1- ظهور الصفات الجنسية الثانوية . 2- زيادة حجم المبيضين والرحم والمهبل .  
2- نمو العظام وتعظم غضاريف النمو بشكل أسرع من تأثير التستوسترون لدى الذكر .

فسر يتوقف النمو الطولي لدى الإناث في سن أقل من توقفه لدى الذكور :  
لأن الإسترايول يسبب نمو العظام وتعظم غضاريف النمو بشكل أسرع من تأثير التستوسترون لدى الذكر .

فسر ظهور صفات جنسية ثانوية عديدة لدى الأثنى في مرحلة البلوغ : بسبب إفراز الإستروجينات (الإسترايول) في مرحلة البلوغ .

من أين يفرز البروجسترون ( الهرمون المهيء للحمل ) ؟ وما هي أهم وظائفه ؟- يفرز من : 1- الجسم الأصفر في الطور الأصفري وإذا حدث حمل يستمر الجسم الأصفر بإفرازه حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل . 2- وإذا حدث حمل تقوم المشيمة بإفرازه بعد الشهر الثالث حتى الولادة .  
- وأهم وظائفه :

1- يتعاون مع الإستروجينات في تهيئة مخاطية الرحم للحمل ، وينقص من تواتر التقلصات الرحمية (فسر) لإعداد الرحم للحمل واستمراره .  
2- نمو فصيصات وأسناخ الثدي ، وإعدادها لإنتاج الحليب . 3- يزيد من عمليات الأكسدة التنفسية .

فسر ارتفاع حرارة جسم الأثنى في الطور الأصفري ؟ بسبب ارتفاع تركيز هرمون البروجسترون مما يزيد عمليات الأكسدة التنفسية .  
نلاحظ انخفاض تركيز FSH عند زيادة تركيز البروجسترون في دم المرأة .


ماذا يسمى هذا النوع من التلقيح ؟ وما تأثير ذلك على تطور الجريبات الجديدة ؟ نوع التلقيح سلبي ، وتأثيره يمنع تطور الجريبات الجديدة .  
فسر توقف الدورة الجنسية خلال الحمل . لأن ارتفاع تركيز البروجسترون يثبط إفراز هرمون FSH النخاعي فيمنع تطور جريبات جديدة .

فسر يستخدم البروجسترون في حبوب منع الحمل ؟ لأنه يثبط إفراز هرمون FSH النخاعي فيمنع تطور جريبات جديدة .  
فسر توقف تطور جريبات جديدة لدى الأثنى الحامل ؟

لأن ارتفاع تركيز البروجسترون يثبط إفراز هرمون FSH النخاعي .  
من خلال المخطط الآتي ، أجب عن الأسئلة الآتية :

1- يفرز الوطاء هرمون GnRH والذي يحرض النخامة الأمامية ؛  
فتفرز هرموني LH و FSH ما تأثيرهما في المبيضين لدى المرأة ؟ هرمون FSH يؤدي إلى تطور الجريبات و حدوث الإباضة . هرمون LH يؤدي إلى حدوث الإباضة وتشكل الجسم الأصفر .


2- ماذا ينتج عن زيادة تركيز هرموني الإسترايول والبروجسترون على كل من الوطاء والنخامة الأمامية ؟  
تلقيح راجع سلبي .



- 3- من وظائف البروجسترون إعداد الغدد الثديية لإنتاج الحليب ،  
 ما الهرمون النخامي الذي يحفزها على إنتاج الحليب ؟ وأين يقع مستقبله النوعي ؟ الهرمون هو البرولاكتين ويقع مستقبله في الغشاء الهبولي للخلية الهدف  
 • فسر حدوث اضطرابات جسمية ونفسية أحياناً لدى الانثى في سن الإباضة ؟  
 • بسبب انخفاض تركيز الهرمونات الجنسية مما يسبب ارتفاع تركيز الهرمونات النخامية مما يؤدي ذلك إلى اضطرابات نفسية في بعض الأحيان .  
 • ما وظيفة أنظيم الأروماتاز ؟ 70% من الإستراديول يتم تشكيله من النستوسترون بواسطة أنظيم الأروماتاز .  
 • هل تعلم : الإستراديول يوجد بكميات قليلة في خلايا النكور البالغين ، ويزداد إنتاجه لدى الرجال المتقدمين في السن .

### الدروس الثاني عشر ، التنامي الجيني - الإلقاح

- من اكتشف حادثة الإلقاح ؟ وماذا أثبت من خلالها ؟  
 اكتشف العالم هرتويغ حادثة الإلقاح، وأثبت أن نطفة الأب وبويضة الأم مسؤولتان معاً عن تشكل الجنين، وأن هذا التشكل لا يتم إلا بعد الإلقاح.  
 • ما مسلك النطف بعد دخولها الأقبية التناسلية الأنثوية ؟  
 بعد أن تدخل النطف إلى الأقبية التناسلية الأنثوية يعبر بعضها الرحم، وتصل ذروة نفيير فالوب في غضون ( نصف ساعة - ساعتين ) .  
 • ما العامل المساعد على وصول النطف إلى ذروة نفيير فالوب في غضون ( نصف ساعة - ساعتين ) ؟ بفضل تقلصات الرحم والقناة الناقلة للبيوض .  
 • من المسؤول عن تحريض التقلصات الرحمية والقناة الناقلة للبيوض ؟  
 يحرض هذه التقلصات : هرمون الأوكسيتوسين (OXT) في أثناء الجماع . مادة البروستاغلاندين المفرزة من الحويصلين المنويين .  
 • ما المدة التي تستطيع من خلالها النطف الإخصاب في الطرق التناسلية الأنثوية أو ما عمر النطف في الأقبية التناسلية الأنثوية ؟  
 تبقى النطف قادرة على الإخصاب لمدة ( 24 - 48 ساعة ) .  
 • ما المدة التي تحتفظ فيها الخلية البيضية الثانوية بحيويتها بعد خروجها من المبيض ؟ مدة (6-24) ساعة  
 • ما العاملان المساعدان على دخول الخلية البيضية الثانوية في القناة الناقلة للبيوض ؟ وجود ظهارة مهدبة للصبوان وتناثر من السائل الجريبي يخرج في أثناء الإباضة .  
 • ما وظيفة كل من الظهارة المهدبة للصبوان و السائل الجريبي الذي يخرج في أثناء الإباضة : تسهل دخول الخلية البيضية الثانوية في القناة الناقلة للبيوض  
 • أين تلتقي النطفة بالخلية البيضية الثانوية أو أين يتم إخصاب الخلية البيضية الثانوية ؟ في الثلث الأعلى من القناة الناقلة للبيوض (نفيير فالوب)  
 • ما عدد النطف ، وكم منها يصل إلى مكان الإخصاب ؟ 500 مليون نطفة تقريباً لا يصل إلى مكان الإخصاب في الثلث الأعلى من نفيير فالوب سوى 1000-3000 نطفة .  
 • رتب مراحل الإلقاح بدءاً من الإختراق وحتى تشكل البيضة الملقحة ؟  
 1- الإختراق 2- التعارف 3- الالتحام  
 • تشكل غشاء الإخصاب • دخول نواة النطفة  
 • تتابع الخلية البيضية الثانوية الانقسام المنصف الثاني معطية ( ماذا ينتج )  
 بويضة n1 وكرية قطبية ثانية n1 وتتشكل طليعة النواة الأنثوية .  
 • تتشكل طليعة النواة الذكرية وتتقابل مع طليعة النواة الأنثوية ( حدد موقع ) في مركز البويضة .  
 • حدوث الاندماج بين طليعتي النواة الذكرية والأنثوية حيث يزول الغشاءان النوويان لكليهما ويتقابل كل صبغي ذكري مع قرينه الأنثوي ( ماذا ينتج ) فتتشكل البيضة الملقحة n2 .  
 • كيف تخترق النطفة غشاء الخلية البيضية الثانوية؟ بواسطة الأنظيمات الحالة التي يحررها الجسم الطرفي .  
 • ما وظيفة الجسم الطرفي ؟ تحرير الأنظيمات الحالة التي تساعد النطفة على اختراق غشاء الخلية البيضية الثانوية .  
 • كيف يتم التعارف بين النطفة والخلية البيضية الثانوية؟  
 يتم عن طريق ارتباط خيط من الجسم الطرفي للنطفة مع مستقبلات نوعية في غشاء الخلية البيضية الثانوية .  
 • ماذا ينتج من التحام غشاء رأس النطفة بغشاء الخلية البيضية الثانوية؟ يطرأ على الخلية البيضية الثانوية نشاط فيزيولوجي .  
 • كيف يتشكل غشاء الإخصاب؟  
 نتيجة انفجار الحبيبات القشرية نحو الخارج في المجال حول الخلية البيضية الثانوية مما يسبب تلاشي الخلايا والنطفات المحيطة بها .  
 • ما دور غشاء الإخصاب؟ يسبب تلاشي الخلايا والنطفات المحيطة بالخلية البيضية الثانوية .  
 • ماذا ينتج من انفجار الحبيبات القشرية نحو الخارج في المجال حول الخلية البيضية الثانوية ؟ تشكل غشاء الإخصاب .  
 • لماذا لا تلتحق الخلية البيضية الثانوية إلا بنطفة النوع نفسه؟  
 وجود مستقبلات نوعية في غشاء الخلية البيضية الثانوية ترتبط مع خيط من الجسم الطرفي للنطفة .  
 • ما الذي يسبب تلاشي الخلايا والنطفات المحيطة بالخلية البيضية؟ غشاء الإخصاب .  
 • لا يتم الإخصاب إلا بنطفة واحدة لسببين ما هما:  
 • إزالة استقطاب غشاء الخلية البيضية الثانوية من 60 - إلى 20 + ( فسر ) نتيجة دخول شوارد الصوديوم / ، وقد أثبت ذلك تجريبياً ؛ فعند إزالة  
 • كمون غشاء الخلية البيضية الثانوية ( ماذا ينتج ) منع ذلك دخول أية نطفة إليها .  
 • التفاعل القشري ( ما المقصود أو ماذا يتضمن ) الذي يتضمن إخراج محتويات الحبيبات القشرية من الأنظيمات التي تسمى :



( البروتينات المشبعة النطاقية Zips ) والتي تقوم بإيقاف تنشيط مستقبلات النطاق في غشاء الخلية البيضية وجعل المنطقة الشفيفة قاسية؛ مما يمنع دخول أية نطفة أخرى. ما دور البروتينات المشبعة النطاقية : تقوم بإيقاف تنشيط مستقبلات النطاق في غشاء الخلية البيضية وجعل المنطقة الشفيفة قاسية؛ مما يمنع دخول أية نطفة أخرى ) .

ما التنظيمات التي يحررها الجسم العطر في للنطفة وما دورها؟

تنظيم الهياورونيداز : يفك الروابط بين الخلايا الجريبية . تنظيم الأكروسين : مفكك للبروتين .

ما أهمية وصول ( 1000 - 3000 ) نطفة إلى موقع الإخصاب مع العلم أن نطفة واحدة فقط تلحق الخلية البيضية الثانوية؟

لأن النطفة الواحدة لا تحوي أنظيمات كافية؛ فتقوم النطاق التي تصل إلى جوار الخلية البيضية الثانوية بإطلاق دفعات من الأنظيمات تفكك الإكليل المشع؛ مما يمكن نطفة واحدة من الوصول إلى الخلية البيضية الثانوية.

### الدرس الثالث عشر، التنامي الجنيني - التعشيش والحمل

يمكن تقسيم عملية الحمل إلى ثلاث مراحل متكاملة مدة كل منها ثلاثة أشهر ماهي بالترتيب؟

1- مرحلة التطور الجنيني المبكر : تبدأ بالانقسامات الخيطية ، وتنتهي بتشكيل المشيمة والحبل السري ، وتظهر خلالها بدايات جميع أجهزة الأعضاء الرئيسية . وماذا تبدأ مرحلة التطور الجنيني المبكر ، وماذا تنتهي ، وماذا يظهر خلالها .

2- تطور الأعضاء والأجهزة : وتنتهي نهاية الشهر السادس إذ يأخذ الجنين شكل إنسان مكتمل .

3- نمو سريع للجنين : فتصبح غالبية الأعضاء فعالة بشكل كامل ، وتنتهي بالولادة . ماذا يحل بالأعضاء في مرحلة النمو السريع للجنين ، وماذا تنتهي .

عدد مراحل التطور الجنيني المبكر بالترتيب؟

1- الانقسامات الخيطية . 2- الانفراس . 3- التعشيش . 4- تشكل الوريقات الجنينية .

5- تشكل الأغشية الملحقة للمضغة . 6- تشكل المشيمة . 7- الحبل السري .

متى تبدأ البيضة الملقحة بالانقسام الخيطي ، وماذا ينتج من هذا الانقسام؟

تبدأ البيضة الملقحة بالانقسام الخيطي مباشرة بعد الإخصاب . ينتج من ذلك : بعد نحو 30 ساعة تتشكل خليتان .

في أي يوم تتشكل التوتية؟ في اليوم الرابع من الإخصاب .

قارن بين حجم البيضة الملقحة ( الخلية الأولى ) وحجم التوتية؟ هل رافق الانقسامات الخيطية حتى مرحلة التوتية أي زيادة في الحجم؟

لهما الحجم ذاته . لا . فسر لا تكون التوتية أكبر حجماً من البيضة الملقحة؟ لأنه لا يرافق الانقسامات الخيطية للبيضة الملقحة أي زيادة في الحجم .

من أين تغذى الخلايا المنقسمة والتوتية؟ تتغذى من مدخرات الخلية البيضية الثانوية ومفرزات القناة الناقلة للبيوض .

إلى ماذا تتحول التوتية؟ إلى كيسة أرومية .

مم تتألف الكيسة الأرومية ، وما دور مكوناتها؟ خلايا الأرومة المغذية : تستعطي بعض أغشية الجنين ،

وتفرز أنظيمات ( ما دورها ) تفكك المنطقة الشفيفة ، كما تزود المضغة الجنينية بالمواد المغذية .

الكتلة الخلوية الداخلية : ستقوم بتشكيل المضغة ، وتشكيل بعض الأغشية الملحقة بالمضغة . جوف الأرومة .

ما مراحل الانفراس بالترتيب؟

1- وصول الكيسة الأرومية تجويف الرحم بعد زوال المنطقة الشفيفة . ( متى تصل الكيسة الأرومية تجويف الرحم : بعد زوال المنطقة الشفيفة )

2- تبدأ بعلامسة مخاطية الرحم من جهة الكتلة الخلوية الداخلية . ( من أين تلامس الكيسة الأرومية مخاطية الرحم : من جهة الكتلة الخلوية الداخلية )

3- تنقسم خلايا الأرومة المغذية ( ماذا ينتج ) معطية طبقات خلوية تختفي أغشيتها الهيولية من جهة بطانة الرحم ، وتلج الكيسة الأرومية داخل بطانة الرحم ( فسر ) من خلال إفرازها الهياورونيداز الذي يفكك البروتينات السكرية في بطانة الرحم . ( ما هي وظيفة الهياورونيداز أو فسر تحتوي خلايا الكيسة الأرومية على أنظيم الهياورونيداز : لأنه يفكك البروتينات السكرية في بطانة الرحم مما يسمح للكيسة الأرومية بالانفراس والتعشيش )

4- تنمو امتدادات الأرومة المغذية بشكل زغابات أرومية حول الشعيرات الدموية في بطانة الرحم ( ماذا ينتج ) فتتفكك جدران الشعيرات وينقل دم الأم إلى الفضوات التي فتحها الأرومة المغذية . ( حدد موقع الزغابات الأرومية : حول الشعيرات الدموية في بطانة الرحم )

5- ما المقصود بالحمل المهاجر ( خارج الرحم )؟ قد يحدث الانفراس في القناة الناقلة للبيوض أحياناً ولا ينتج عنه مضغة قادرة على الحياة ويمكن أن يشكل تهديداً لحياة الأم .

متى يبدأ التعشيش أو ما المقصود بالتعشيش؟ في اليوم 10 تصبح الكيسة الأرومية محاطة بكاملها بالمختلط الخلوي .

ما أهم التبدلات التي تطرأ على الكيسة الأرومية في أثناء التعشيش؟

1- تشكل الجوف الأمينوسي : ( على ماذا يحتوي؟ )

يحتوي على السائل الأمينوسي ( ما دوره ) الذي يدعم القرص الجنيني ، ويحميه من الصدمات .


2- أين يوجد السائل الأمينوسي وما دوره : يوجد في : الجوف الأمينوسي ، دوره : يدعم القرص الجنيني ، ويحميه من الصدمات .

3- تشكل الكيس المعوي : ( ما وظيفته؟ ) يعد مصدر الغذاء الأساسي للتنامي الأولي للقرص الجنيني ،

ويصبح مركزاً لإنتاج خلايا الدم وخاصة الخلايا المناعية خلال الأسابيع الأولى من الحمل .

متى تتشكل الوريقات الجنينية؟ بحلول اليوم 12 تقريباً تتشكل طبقة ثالثة بين طبقتي القرص

الجنيني الخارجية والداخلية ( ماذا ينتج ) لتشكل ثلاث وريقات مستقلة .




- حدد موقع الطبقة الجنينية الثالثة : بين طبقتي القرص الجنيني الخارجية والداخلية
- عدد الوريقات الجنينية وماذا تشكل كل منها ؟ الوريقة الخارجية : تشكل الجهاز العصبي .
- الوريقة الوسطى : الجهاز الهيكلي والعضلي والتناسلي . الوريقة الداخلية : السبيل الهضمي .
- إلى ماذا يتحول القرص الجنيني بعد تشكل الوريقات الجنينية ؟ إلى مضفة .
- متى تتشكل الأغشية الملحقة للمضفة ؟ في الأسبوع الثالث .



- عدد الأغشية الملحقة للمضفة ؟ الغشاء الأمينيوسي ( السلوي ) - غشاء الكيس المحي - غشاء الكوريون ( المشيماء ) .
- من أين ينشأ الغشاء الأمينيوسي (السلوي) ؟ ينشأ من هجرة بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الجوف الأمينيوسي
- ماذا ينتج من هجرة بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الجوف الأمينيوسي : الغشاء الأمينيوسي
- من أين ينشأ غشاء الكيس المحي ؟ ينشأ من هجرة بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الكيس المحي .
- ماذا ينتج من هجرة بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الكيس المحي : غشاء الكيس المحي
- من أين ينشأ غشاء الكوريون ( المشيماء ) وأين يقع ؟ ينشأ من نمو خلايا الأرومة المغذية ، ويحيط بالجوف الكوريوني .
- ماذا ينتج من نمو خلايا الأرومة المغذية : غشاء الكوريون (
- كيف تتشكل المشيمة ؟ تنمو الزغابات الكوريونية وتحيط بالمضفة بأكملها ولكنها تبدأ بالانفراس بشكل أكبر في منطقة محددة من بطانة الرحم وتستمر بالنمو والتفرع حتى تتشكل المشيمة .
- ماذا ينتج من نمو الزغابات الكوريونية وانفراسها في منطقة محددة من بطانة الرحم وتفرعها : تتشكل المشيمة
- يتعد الجنين عن المشيمة ويبقى متصلاً بها بوساطة ؟ الحبل السري .
- ما وظيفة الحبل السري ؟ يزود الجنين بالمواد التي تبقى على قيد الحياة ، ويخلصه من الفضلات .
- فسر نمو الجوف الأمينيوسي وتطوره وضمور الكيس المحي ؟ يحتوي الجوف الأمينيوسي على السائل الأمينيوسي الذي يدعم القرص الجنيني ويحميه من الصدمات ، ويحمي الجنين من الصدمات في مراحل لاحقة
- أما الكيس المحي فيصبح مركزاً لإنتاج خلايا الدم وخاصة الخلايا المناعية خلال الأسابيع الأولى من الحمل ثم تراجع أهميته
- كيف يتدفق الدم من الجنين إلى المشيمة ؟ يتدفق الدم من الجنين إلى الأم عبر شفع من الشرايين ويعود عبر وريد وحيد .
- لماذا يكون لون الدم في الوريد أحمر قاني ؟ لأنه يكون محمل بالأوكسجين .
- ما دور الزغابات الكوريونية للمشيمة ؟ يتم عبرها عملية مبادلات بين دم الأم ودم الجنين .
- لماذا تقوم المشيمة بدور جهاز تنفس وجهاز هضم وجهاز إخراج لدى الجنين ؟ أو ما وظيفة المشيمة أو ما أهمية المشيمة ؟
- لأنه تتم من خلالها المبادلات التنفسية بين دم الأم ودم الجنين ونقل المواد المغذية إلى الجنين وطرح فضلاته النيتروجينية .
- ما أهمية السطح الواسع للزغابات الكوريونية التابعة للمشيمة ؟ لتسهيل المبادلات بين دم الأم ودم الجنين .
- تحصل المضفة الجنينية على المناعة من الكيس المحي خلال الأسابيع الأولى من الحمل ، فما مصدر المناعة لاحقاً ؟ من الأضداد الموجودة في دم الأم
- كيف تجري المبادلات بين دم الأم ودم الجنين في المشيمة ؟ وفق مبدأ الانتشار والنقل الفعال .
- فسر يستطع هيموغلوبين الجنين من نزع الأوكسجين من هيموغلوبين الأم ؟
- لأن الهيموغلوبين الجنيني الخاص بالجنين ذا انجذاب أكبر للأوكسجين من هيموغلوبين الأم .
- فسر لا يتم الاختلاط بين دم الأم ودم الجنين ؟ لأن طبقات الزغابات الكوريونية تفصلهما عن بعضهما .
- ما وظيفة طبقات الزغابات الكوريونية ؟ تفصل بين دم الأم ودم الجنين .
- فسر المشيمة لها دور غدة صماء ؟ لأنها تنتج الإستروجينات والبروجسترونات منذ نهاية الشهر الثالث من الحمل وتلقي بها في الدم مباشرة .
- ما الهرمونات التي تنتجها المشيمة ؟ الإستروجينات والبروجسترونات والريلاكسين .
- من أين ينتج هرمون ال HCG ( الهرمون البشري المشيمي المنبه للفرد التناسلية ) وما دوره ؟
- تنتج خلايا الأرومة المغذية الخلوية خلال الانفراس ثم تنتج المشيماء .
- يقوم بعمل مشابه لهرمون LH ، إذ يحافظ على الجسم الأصفر ويدعم إفرازه لهرموني البروجسترون والإسترايول حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل
- متى يظهر هرمون HCG في دم الأم ؟ بعد الانفراس مباشرة .
- ما الهرمون الذي تشير اختبارات الحمل المنزلية إلى وجوده في الدم ؟ HCG .
- الألاحظ المخطط البياني الآتي يمثل تركيز الهرمونات الجنسية وال HCG وأجيب عن الأسئلة المجاورة :



- 1- ما الدليل على أن هذه المرأة حامل ؟ استمرار ارتفاع تركيز الهرمونات الجنسية الأنثوية في الدم - وكذلك إفراز HCG.
- 2- ماذا يحدث للجسم الأصفر إذا توقف إنتاج HCG في الأسبوع الثامن ؟ وما تأثير ذلك على الحمل ؟ يضمحل الجسم الأصفر . يتوقف إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية ويحدث الإجهاض .
- 3- متى يبدأ تراجع تركيز HCG ؟ لماذا براك ؟ بعد الأسبوع (12) أي بعد الشهر الثالث من الحمل . بسبب تشكل المشيمة التي تقوم بإفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية .
- 4- ما تأثير HCG على حدوث الإباضة ؟ ليس له تأثير .
- 5- ماذا ينتج من توقف إنتاج HCG في الشهر السابع من الحمل ؟



- لا يؤثر على الحمل لأن المشيمة تقوم بإفراز الهرمونات الجنسية الأثوية التي تؤمن استمرار الحمل.
- ما المقصود بهرمون الريلاكسين أو من أين يفرز وما دوره؟ هرمون بيتيدي تفرزه المشيمة والجسم الأصفر ، يزيد من مرونة الارتفاق العاني
- ماذا ينتج ؟ مما يسمح بتعمد الحوض وتوسيع عنق الرحم في أثناء الولادة .
- فسر تمدد الحوض وتوسيع عنق الرحم في أثناء الولادة : لأن هرمون الريلاكسين الذي تفرزه المشيمة والجسم الأصفر ، يزيد من مرونة الارتفاق العاني.
- متى تنتهي مرحلة التطور الجنيني المبكر ؟ في نهاية الشهر الثالث .
- متى تتشكل الأعضاء الأساسية للجنين ومتى يتميز جنس الجنين ؟ في الشهر الثالث .
- فسر ينمو الجنين بسرعة وتشعر الأم بحركة جنينها في الشهر الرابع ؟ بسبب تشكل الجهاز العصبي .
- فسر في نهاية الشهر السادس من الحمل يمكن أن يولد الطفل ويمتلك فرصة كبيرة في البقاء ؟ لأن غالبية الأجهزة في جسم الجنين تصبح جاهزة لأداء وظائفها.
- كم يبلغ وزن وطول الجنين في نهاية الشهر التاسع من الحمل ؟ -الوزن ( 3 - 4 ) كغ وسطياً . -الطول ( 50 ) سم تقريباً .
- هل تعلم : تصبح المهام الملقاة على عاتق الأم أكبر في نهاية الشهر التاسع : بسبب نمو الجنين في المرحلتين الثانية والثالثة
- تحدث تغيرات في أجهزة الأم تؤدي إلى زيادة في :

- 1- معدل التنفس والسعة الحياتية للرتين ، لماذا ؟ لمواجهة متطلبات الجنين التنفسية التي تزداد بنموه وزيادة حجمه .
- 2- حجم دم الأم ( فسر ) نتيجة تدفق الدم إلى المشيمة ، ولأن الجنين ينقص ضغط O2 ويزيد ضغط CO2 في الدم ، مما يحفز إنتاج هرمون الأيروثروبويتين ، فيزداد حجم الدم لدى الأم.

- ماذا ينتج عندما ينقص الجنين ضغط O2 ويزيد ضغط CO2 في الدم : يحفز إنتاج هرمون الأيروثروبويتين ، فيزداد حجم الدم لدى الأم.
- ماذا ينتج من إنتاج هرمون الأيروثروبويتين : يزداد حجم الدم لدى الأم



يكثر فصل على حجم الدم لدى الأم

- من خلال المخطط البياني المجاور أجب عن الأسئلة الآتية :
- 1- في أي أسبوع تبدأ زيادة حجم دم الأم ؟ في الأسبوع 20
- 2- ما حجم دم الأم في نهاية الحمل تقريباً ؟ 6 لتر تقريباً
- 3- لماذا تكون شهية النساء الحوامل للطعام عالية ؟ بسبب ازدياد المتطلبات الغذائية الضرورية لنمو الجنين .
- 4- فسر تحتاج النساء الحوامل إلى التبول بشكل مستمر ؟ لأن معدل الترشيح الكبيبي في الكلية يصبح 50 % .
- رتب مراحل التشكل الجنيني ؟

بيضة ملقحة - توتية - كيسة أرومية - قرص جنيني - المضفة .

### المرس الرابع عشر: الولادة والإرضاع

ما مراحل المخاض بالترتيب ؟

- 1- مرحلة الاتساع : توسع عنق الرحم ويبدأ الجنين بالتحرك نحوه بتأثير تقلصات الرحم التي تحدث بمعدل مرة كل حوالي نصف ساعة (مغص الولادة) ، ثم تشتد التقلصات فيتمزق الغشاء الأمينوسي ويخرج السائل الأمينوسي ( ماء الرأس ) وتستمر هذه المرحلة 8 ساعات تقريباً .
  - ما تأثير تقلصات الرحم في المخاض : بدء الجنين بالتحرك نحو عنق الرحم .
  - ما معدل التقلصات الرحمية ( مغص الولادة ) أثناء المخاض : مرة واحدة كل نحو نصف ساعة .
  - ماذا ينتج عندما تشتد الانقباضات الرحمية : يتمزق الغشاء الأمينوسي ويخرج السائل الأمينوسي .
  - ما مدة مرحلة الاتساع : تستمر هذه المرحلة 8 ساعات تقريباً .
- 2- مرحلة الإطلاق : تصل الانقباضات الرحمية ذروتها حتى خروج الجنين وحدث الولادة وتستمر هذه المرحلة بحدود ( ساعة - ساعتين) .
  - ماذا ينتج عندما تصل الانقباضات الرحمية ذروتها : خروج الجنين وحدث الولادة . ما مدة مرحلة الإطلاق : تستمر هذه المرحلة بحدود ( ساعة - ساعتين)
- 3- مرحلة خروج المشيمة : تسبب زيادة تقلصات الرحم إلى تمزق الروابط بين بطانة الرحم والمشيمة وخلال ساعة من الولادة يتم عادة طرح المشيمة وفقدان كمية من دم الأم ، ولكن يمكن تحمل ذلك دون صعوبة . لماذا ؟ بسبب ازدياد حجم دم الأم خلال مدة الحمل .
  - ماذا ينتج من زيادة تقلصات الرحم أثناء المخاض : تمزق الروابط بين بطانة الرحم والمشيمة .
  - ماذا يحدث خلال ساعة من الولادة : يتم عادة طرح المشيمة وفقدان كمية من دم الأم

فسر لا يؤثر خروج كمية من دم الأم مع المشيمة في أثناء الولادة ؟ لأن حجم دم الأم يزداد خلال الحمل نتيجة تدفق الدم إلى المشيمة .

عدد بعض مخاطر الولادة ، موضحاً كل منها؟

- 1- ولادات الخدج : تحدث في الشهرين السابع والثامن عادة، ويمتلك المولود فرصة للنجاة بوجود العناية ويموت المولود الذي يكون وزنه أقل من 1 كغ غالباً ( فسر ) لأن أجهزة التنفس والدوران والإطراح غير قادرة على تأمين بقائه .
- 2- ولادات مستعصية : إذا تعذر خروج الجنين في أثناء الولادة، أو كان الجنين مقعداً . ما العملية التي يلجأ الأطباء إليها عادة لإخراج الجنين ؟ الولادة القيصرية .
- لماذا تلجأ بعض السيدات إلى الولادة القيصرية ؟
- لأن بعض النساء ترغب في إجراء الولادة ضمن وقت محدد لأسباب تتعلق بظروف الحياة ، أو بسبب تعذر خروج الجنين في أثناء الولادة أو كان الجنين مقعداً

- 1- زيادة وزن الجنين ( ماذا ينتج ) تسهم في تمدد وتمزق بطانة الرحم.
- 2- تحرر الأوكسيتوسين OXT من النخامة الخلفية ( ماذا ينتج ) مما يزيد من تواتر التقلصات الرحمية.
- 3- إفراز البروستاغلاندين من المشيمة بتحريض من الأوكسيتوسين ( ماذا ينتج ) فتزداد التقلصات الرحمية.
- 4- إفراز البرولاكتين من المشيمة مادوره : تليين الارتفاق العاني مما يسهل عملية الولادة .
- إلى ماذا يستمع الطفل أثناء الإرضاع ، وماذا يؤمن له ؟
- يستمتع الطفل إلى ضربات قلب أمه في أثناء الرضاعة وكأنها عزف منفرد جميل في قاعة موسيقية هادئة ، مما يؤمن له الطمأنينة والنمو النفسي والجسمي السليم.
- لماذا تلجأ بعض السيدات إلى الرضاعة غير الطبيعية؟ ما رأيك في ذلك؟
- تلجأ إليها : في حال مرض الأم وعدم قدرتها على الإرضاع أو عدم إنتاج كمية كافية من الحليب أو وجود سبب عضوي يمنع الرضاعة.
- الرأي : لا ينصح بالرضاعة الصناعية لأنها تؤثر سلباً على صحة الطفل ( مناعته ) الجسدية والنفسية.
- بتأثير أي هرمونين خلال مرحلة الحمل تنمو الغدد الثديية لدى الأم ؟ بتأثير هرموني البروجسترون والإسترايول.
- ماذا يسمى الحليب المفرز بعد الولادة مباشرة ؟ اللبأ ( الصمغة ) .
- ما أهمية الحليب المفرز بعد الولادة مباشرة لللبأ ( الصمغة ) ؟
- يحوي على تراكيز عالية من الأضداد والتي تؤمن للرضيع مناعة ضد طيف واسع من الأمراض خلال الأشهر الأولى من عمره .
- ما هي مراحل منعكس افراغ الحليب لدى العرضع بالترتيب؟
- تحفيز مستقبلات اللمس : مص الرضيع حلمة الثدي ( ماذا ينتج ) ينشط مستقبلات حسية في الثدي.
- نقل السائلة العصبية : تتشكل سائلة عصبية تنتقل عبر النخاع الشوكي إلى الوطاء.
- إفراز OXT : يفرز الوطاء هرمون الأوكسيتوسين الذي ينتقل إلى النخامة الخلفية.
- تحرر OXT : ينتقل الأوكسيتوسين عبر الدم إلى العضلات الملساء المحيطة بجيوب الثدي .
- إفراغ الحليب : تنقل هذه العضلات بتأثير الأوكسيتوسين مما يسبب إفراغ الحليب.
- ما الهرمون الذي يسبب إنتاج الحليب؟ وما الهرمون الذي يسبب إفراغه؟ ومن أين ينتج كل منهما؟ إنتاج الحليب : هرمون البرولاكتين ويفرز من النخامة الأمامية. إفراغ الحليب: هرمون الأوكسيتوسين ( OXT ) ويفرز من خلايا عصبية في منطقة الوطاء.
- ماذا ينتج من زيادة تركيز هرمون البرولاكتين في الدم؟ يثبط إفراز GnRH مما يسبب توقف الدورة الجنسية لدى معظم الأمهات خلال مدة الإرضاء.
- فسر توقف الدورة الجنسية لدى معظم الأمهات خلال مدة الإرضاع ؟
- لأن زيادة تركيز البرولاكتين في الدم يثبط إفراز GnRH وبالتالي تثبيط إفراز FSH من قبل النخامة الأمامية ومنع تطور جريبات جديدة.
- ما السرطان الأكثر شيوعاً لدى الإناث ؟ سرطان الثدي .
- كيف يتم الكشف عن سرطان الثدي؟ وبماذا يفيد الكشف المبكر عنه؟
- يتم الكشف عنه عن طريق التصوير الشعاعي ويكون الكشف المبكر لهذا السرطان هو المفتاح الرئيس لإتخاذ الحياة.
- ما أهمية الرضاعة الطبيعية لدى الأنتى؟ لها دور في الوقاية من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات.

## ورقة عمل



- 1- يصاب بعض المواليد خلال الأيام الأولى من ولادتهم باليرقان الوليدي ( ما أعراضه ) فيبدو الجلد والطبقة الصلبة في العين بلون أصفر .
- 2- ما السبب العلمي الأكثر دقة لذلك: كبد المولود غير مهياً للعمل بصورة كافية عند الولادة؛ فيرتفع تركيز البليرويين في دمه.
- 3- ماذا ينتج من ارتفاع تركيز البليرويين في دم المولود حديثاً : الإصابة بمرض اليرقان الوليدي.
- 4- متى يصاب المولود باليرقان الوليدي : يصاب به: في الأيام الأولى بعد الولادة.

## ورقة عمل



- 1- يتعرض بعض المواليد لخطر نقص التأكسج في أثناء الولادة، والذي يمكن تحمله لمدة 10 دقائق وقد يسبب الاختناق والموت لاسيما لدى الخلدج.
- 2- ما الخطر الذي يتعرض له بعض المواليد في أثناء الولادة؟ وما مدة تحمله؟ وماذا يسبب؟ وما أسبابه؟
- 3- خطر نقص التأكسج يمكن تحمله لمدة 10 دقائق. يسبب الاختناق والموت لاسيما لدى الخلدج.
- 4- أسبابه : انضغاط الحبل السري . التخدير المفرط للأم . الانفصال المبكر للمشيمة . التقلص المفرط للرحم .
- 5- ماذا ينتج من انضغاط الحبل السري أو التخدير المفرط للأم أو الانفصال المبكر للمشيمة. أو التقلص المفرط للرحم : نقص التأكسج .

## الدرس الخامس عشر. الصحة الإنجابية وبعض الأمراض الجنسية

- 1- ما القسم من الصحة الذي يهتم بالأسرة وتنظيم الإنجاب؟ الصحة الإنجابية
- 2- ما المقصود بالصحة الإنجابية : هي الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في الأمور المتعلقة بوظائف الجهاز التناسل
- 3- ما أهمية الصحة الإنجابية؟
- 4- تمكن الصحة الإنجابية الأسرة من المعرفة السليمة للحياة الجنسية وتنظيم الإنجاب بما يضمن سلامة الأم والأطفال ورفاهية الأسرة.



- 1- الامتناع عن الاتصال الجنسي : مبدأ استخدامها : تجنب الاتصال الجنسي في فترة الإباضة ( ٤ أيام قبل الإباضة و ٤ بعدها ) ، وتنتج لدى الإناث ذوات الدورات المنتظمة . المخاطر : لا توجد مخاطر .
- 2- حبوب منع الحمل : مبدأ استخدامها : تحتوي الاستروجينات والبروجسترونات الصناعية ، تمنع الإباضة وتطور الجريبات ، وتجعل عنق الرحم خنياً ، مما يمنع دخول النطاف . المخاطر : قد تسبب كيسات مبيضية .
- 3- موانع حاجزية ( القلنسوة لدى الأنثى - الواقي لدى الذكر ) : مبدأ استخدامها : تمنع التقاء النطاف بالخلية الببضية . المخاطر : لا توجد مخاطر
- 4- مواد قاتلة للنطاف : مبدأ استخدامها : تحقن لدى الأنثى قبل الجماع بساعة وتقتل النطاف . المخاطر : لا توجد مخاطر .
- 5- التعقيم لدى الأنثى : مبدأ استخدامها : قطع لوريط القناة الناقلة للبيوض . المخاطر : ليس لها مخاطر سوى الجراحة ويستخدم حالياً الجراحة التنظيرية .
- 6- التعقيم لدى الذكر : مبدأ استخدامها : قطع الأسهر لدى الذكر . المخاطر : ليس لها مخاطر سوى الجراحة ويستخدم حالياً الجراحة التنظيرية .
- 7- اللولب : مبدأ استخدامها : قطعة بلاستيكية يلف حولها لولب نحاسي ينتهي بخيط ، تزرع داخل الرحم لمنع التعشيش . المخاطر : لا يستخدم عادة إلا من نساء سبق أن أنجبن ( فسر ) لأن استخدامه قبل الإنجاب قد يسبب العقم .

## ورقة عمل



- لدى أسرة خمسة أبناء وفي نهاية الحمل السادس أنجبت السيدة أربعة توالم ثلاثة منهم ذكور متشابهون في المظهر والرابعة أنثى وجميعهم بصحة جيدة
- 1- كيف حدث ذلك ؟ يحدث أحياناً ولادات مضاعفة : (تويمان - ثلاثة ل- أربعة توالم... الخ) وتكون التوالم متطابقة (حقيقية) ، أو غير متطابقة (غير حقيقية) .
  - 2- مم تنشأ التوالم الحقيقية ؟ وما سببها ؟ ولماذا يتشابه التركيب المورثي للتوالم ؟ - تنشأ التوالم الحقيقية : من بيضة ملقحة واحدة . سببها : إما انشطار الكيسة الأرومية في مرحلة مبكرة أو انقسام الكتلة الخلوية الداخلية قبل مرحلة الوريقات الجنينية . يتشابه التركيب المورثي للتوالم الحقيقية : لأنها تنشأ من بيضة ملقحة واحدة .
  - 3- مم تنشأ التوالم غير الحقيقية ؟ وما سببها ؟ وهل يكون للأجنة الناتجة الجنس نفسه ؟ - تنشأ من بيضتين مملقتين منفصلتين أو أكثر . سببها : الإباضات المضاعفة وتظهر غالباً لدى النساء اللواتي يتناولن منشطات إباضة.. هل يكون للأجنة الناتجة الجنس نفسه ؟ لا يشترط أن تكون من نفس الجنس .
  - 4- في أي الحالتين تصنف إنجاب الأسرة السابقة للتوالم الأربعة ؟ وما الاحتمال الذي تضعه كتفسير لهذه الحالة ؟ - يصنف إنجاب الأسرة السابقة للتوالم الأربعة : في كلا الحالتين . الاحتمال الذي تضعه كتفسير لهذه الحالة : ذكور من بيضة ملقحة واحدة (توالم حقيقية) أما الأنثى من بيضة ملقحة ثنائية (توعم غير حقيقي) .
  - 5- عدد بعض الحالات التي قد تحدث تشوهات خلقية في التوالم ؟ وكيف تعالج طبيياً ؟ مثل حالات الالتصاق في أجزاء مختلفة من الجسم ويلجأ طبيياً إلى فصل التوالم إذا كانت الالتصاقات محدودة .
  - 6- إلى ماذا تلجأ بعض الأسر إذا تعذر الإنجاب لدى الزوجين لمدة طويلة ؟ تلجأ بعض الأسر إلى الإنجاب بطريقة الإخصاب المساعد . تتبع المخطط الآتي ، واستنتج مراحل تقنية الإخصاب المساعد ، وأجيب عن الأسئلة المرافقة :
    - 1- ما مراحل تقنية الإخصاب المساعد : سحب البيوض (الخلية الببضية الثانوية) من مبيض الزوجة . وضع الخلية الببضية الثانوية مع نطاف الزوج في أنبوب ، إخصاب ، تشكل البيضة الملقحة . تزرع البيضة الملقحة داخل رحم الزوجة في مرحلة التوتية .
    - 2- تزداد فرصة ولادة التوالم في هذه التقانة لماذا برأيك ؟ لأنه يتم زراعة أكثر من مضفة جنينية عادة .
    - 3- متى يلجأ إلى هذه الطريقة ؟ يلجأ إليها في الحالات الآتية : انسداد القناتين الناقلتين للبيوض . قلة عدد نطاف الزوج أو ضعف حركتها . العقم لمدة طويلة من دون معرفة الأسباب .
    - 4- لماذا يعد المولود الناتج في هذه التقانة طفلاً شرعياً من الناحية الأخلاقية ؟ لأن النطفة من الأب والبيوضة من الأم والزراعة تمت في رحم الأم .



## ورقة عمل



- تم في الجمهورية العربية السورية اعتماد ورقة فحص طبي قبل الزواج كشرط لتسجيل الزواج في المحاكم الشرعية في سورية. والمطلوب :
- 1- لماذا يطلب هذا الفحص الطبي ؟ للتأكد من سلامة الشاب والشابة المقبلين على الزواج من أي عوامل مرضية يمكن أن تنتقل عبر الاتصال الجنسي أو أمراض وراثية تنتقل إلى الأولاد .
  - 2- ما أهم الاختبارات المطلوبة إجرائها ؟ تجري عيادات ما قبل الزواج في سورية الفحوص والاختبارات لتشخيص أمراض فقر الدم وتحديد نوع الهيموغلوبين في بعض الحالات للتعرف إلى فقر الدم المنجلي والتلاسيميا والأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي (الإيدز - السيلان - الزهري - التهاب الكبد الوبائي) وفحص الزمر الدموية وللتأكد من زمرة الزوجة إذا كانت تتطلب علاجاً ومتابعة معينة أثناء الحمل وبعد الولادة .
  - 3- ما المرض الأكثر أهمية في اختبارات فحص الزواج في رأيك ؟ ولماذا ؟ المرض الأكثر أهمية : الإيدز . لماذا : لأنه أكثر الأمراض خطورة إذ ينتقل فيروس الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي مع مصاب وينتقل من الأم إلى جنينها في أثناء الولادة ولا يمكن علاجه علماً أن الشخص قد يكون حاملاً للفيروس دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة .

## ورقة عمل



- إذا تمت زراعة خمس تويئات في تقانة الإخصاب المساعد وحدث التعشيش في جميعها . والمطلوب :
- 1- ما عدد المواليد المحتمل إنجابها ؟ خمسة مواليد على الأقل لأنه قد تحصل إنشطارات في التويئات المتشكلة ويتشكل توالم حقبية أحيانا
  - 2- ما الطريقة التي يلجأ إليها الأطباء لمنع حدوث ذلك؟ تتم إزالة عدد من المضع بعد حدوث الانفراس.
  - 3- تتعرض حياتنا الجنسية للعديد من الاضطرابات والمخاطر والأمراض عدد بعضاً من الأمراض الجنسية ، مبيناً العامل المسبب ، بعض الأعراض ، العدوى ، الوقاية :
- 1- السيلان ( التعقبة ) : العامل المسبب : جراثيم المكورات البنية . بعض الأعراض : صعوبة وألم في أثناء التبول مع قيح . العدوى : العلاقات الجنسية مع مصابين . الوقاية : تجنب العلاقات الجنسية غير الشرعية .
  - 2- الزهري ( السفلس ) : العامل المسبب : جراثيم اللولبية الشاحبة . بعض الأعراض : ندب في الأعضاء التناسلية . العدوى : العلاقات الجنسية مع مصابين و من الأم إلى جنينها . الوقاية : تجنب العلاقات الجنسية غير الشرعية و تجنب الحمل إذا كانت المرأة مصابة .
  - 3- المبيضات المهبلية : العامل المسبب : فطر الخميرة . بعض الأعراض : التهابات مهبلية وتقرحات يرافقها مفرزات بيضاء وحكة شديدة . العدوى : الاتصال الجنسي - التلامس المباشر . الوقاية : تجنب العلاقات الجنسية غير الشرعية و تطبيق معايير النظافة العامة والشخصية .
  - 4- الإيدز ( السيدا - العوز المناعي البشري المكتسب ) : العامل المسبب : فيروس الإيدز . بعض الأعراض : تضخم عقد لمفية - ارتفاع متكرر في الحد - تعرق غزير ليلاً - التهابات وإصابات في أجهزة الجسم المختلفة ( فسر ) نتيجة نقص المناعة فتظهر أمراض في كامل الجسم - يصاب الجلد بسرطان ساركوما كابوسي . العدوى : الاتصال الجنسي مع مصاب أو مصابة بنسبة أكثر من ٨٠ % - نقل الدم الملوث أو الحقن الملوثة وأدوات ثقب الجلد المتنوعة ( وشم ، حلاقة ، معالجة أسنان ) - من الأم إلى جنينها ( فسر ) لأن الفيروس ينتقل من دم الأم إلى جنينها عبر المشيمة في أثناء الحمل أو مباشرة في أثناء الولادة - نقل وزراعة الأعضاء . الوقاية : تجنب العلاقات الجنسية غير الشرعية - التحقق من خلو دم الأشخاص المتبرعين من الفيروس المسبب - عدم استخدام حقن أو فرشاة أسنان أو شفرات حلاقة أو أداة وشم مستخدمة من شخص آخر - تجنب الحمل إذا كانت المرأة مصابة ( فسر ) لأن الفيروس ينتقل من دم الأم إلى جنينها عبر المشيمة في أثناء الحمل أو مباشرة في أثناء الولادة - التحقق من أن الشخص المتبرع بالعضو المزروع لا يحمل الفيروس المسبب .

**هل تعلم :** يمكن علاج أمراض السيلان والزهري والمبيضات المهبلية بالمضادات الحيوية . أما في الإيدز فتتم معالجة الأمراض الناتجة عن انخفاض مناعة الجسم .

## الوحدة الثانية

## حل أسئلة تقويم ..?

أولاً : لديك المخطط الآتي يمثل العلاقة بين إفراز الهرمونات خلال دورة جنسية بحدوث الحمل ومن دونه والمطلوب :



١- يكون التلقيح الراجع إيجابياً بين أشغاع الهرمونات الآتية ما عدا : FSH والبروجسترون .

٢- بالنظر إلى المخطط تعد إحدى العبارات العلمية الآتية ليست صحيحة :

التلقيح الراجع سلمي بين الإسترايديول وال LH قبيل الإباضة .

٣- ما الأدلة على حدوث الحمل من خلال المخطط ؟

- زيادة تركيز الهرمونات الجنسية ( إسترايديول وبروجسترون )

- زيادة تركيز ( HCG ) - نمو الجسم الأصفر - وحدث الانفراس .

٤- ما هما الهرمونان اللذان يدعمان تطور الجسم الأصفر بعد حدوث الإلقاح ؟ وما الدليل على ذلك ؟

- الهرمونان : ( LH و HCG ) - الدليل على ذلك زيادة تركيز هذين الهرمونين .

٥- ماذا يحدث للأنثى العامل السابقة إذا توقف إنتاج HCG في اليوم ( 15 ) من عمر المضعفة ؟

ضمور الجسم الأصفر وتوقف إنتاج الهرمونات الجنسية وحدث الإجهاض .

ثانياً : اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي : البربخ : المستودع الرئيس للنطف . قطيرة اللقاح عند الصنوبر : تسحب حبات الطلع إلى الحجيرة الطلمية .

الإكليل المشع : حماية الخلية البيضية الثانوية من الالتصاق بأي مكان قبل وصولها الرحم .

الإندوسيرم في بذرة الصنوبر : تغذية الرشيم في أثناء الانتاش .

الجسيم المتوسط لدى الجراثيم : له الدور الأساس في عملية تضاعف المادة الوراثية ال DNA لأنه يحوي أنظيمات تضاعف ال DNA - يعطي الخيوط البروتينية التي تسهم في انتقال الصبغين الناتجين من تضاعف المادة الوراثية إلى طرفي الخلية المنشطرة .

٦- نواة الخلية الإعاشية عند مغلفات البذور : توجيه نمو الأنبوب الطلمي والمحافظة على حيويته حتى يصل إلى كوة البذيرة .

٧- ثالثاً : مم تنشأ كل من البنى الآتية : البيضة الأصلية : من اتحاد نطفة نباتية (n1) مع البويضة الكروية (n1) .

٨- البيضة الإضافية : من اتحاد نطفة نباتية (n1) مع النواة الثانوية (n2) . السويداء : من نمو البويضة الإضافية (n3) .


٩- غشاء الكوريون : من نمو الأرومة المغذية في الكيسة الأرومية . الغلاف المتخشب المجنح لبذرة الصنوبر : من لحافة البذيرة بعد الإخصاب .

١٠- الأرحام عند الصنوبر : من تمايز بعض خلايا الإندوسيرم .



- رابعاً : يمثل الشكل الآتي حادثة الإلقاح ومراحل التشكل الجنيني لدى الإنسان والمطلوب :
- 1- اذكر المسمى الموافق للأرقام المحددة على الشكل : 1- نطفة 2- خلية بيضية ثانوية 3- بيضة ملقحة
  - 4- مرحلة الخليتين 5- تويطة 6- الكيسة الأرومية 7- الوريقات الجنينية 8- المضة 9- الجنين
  - 2- حدد الصيغة الصبغية لخلايا كل من الأقسام السابقة : 1- نطفة n1 2- خلية بيضية ثانوية n1
  - 3- بيضة ملقحة n2 4- مرحلة الخليتين n2 5- تويطة n2 6- الكيسة الأرومية n2 7- الوريقات الجنينية n2 8- المضة n2 9- الجنين n2
  - 3- في أي المراحل المذكورة يبدأ تشكل الجهاز العصبي؟ في المرحلة (8).
  - 4- إذا أردنا الحصول على خلايا جذعية كاملة الإمكانيات ، فأي المراحل هي الأفضل؟ المرحلة (5).

- خامساً : اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:
- 1- ينشط هرمون FSH تشكل النطاف من خلال تأثيره على خلايا سرتولي وذلك بسبب : تمتلك خلايا سرتولي وحدها في فئتها الهيمولي المستقل المشابي لهذا الهرمون
  - 2- يتم التعرف إلى النطاف من قبل الخلايا المناعية على أنها أجسام غريبة لكنها لا تهجمها بسبب : تسهم خلايا سرتولي في تشكل الحاجز الدموي الخصوي الذي يمنع مهاجمتها.
  - 3- في الشكل المجاور إحدى الخصيتين مصابة بحالة مرضية ناتجة عن ضعف في الدوران الدموي وتكون إحدى الأوصاف العلمية الآتية صحيحة : الخصية أ مصابة بالدوالي و الخصية ب سليمة.
  - 4- إحدى العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لفيروس الإيدز غلافه الخارجي من طبيعة : دسمة ومادته الوراثية RNA ويحتوي على أنظيمات النسخ التماكسي
  - 5- يمثل النبات العروسي المذكر في نبات الصنوبر ب : حبة الطلع الناضجة.
  - 6- تتغذى البيضة الأصلية والبيضة الإضافية في أثناء نموها على : النوسيل.
  - 7- تتكاثر الأضاليا إعاشياً عن طريق : الجذور الدرنية.
  - 8- في فصل الصيف تعطي أنثى برغوث الماء : بيضاً غير ملقح n2.



- سادساً : أدقق جيداً في المخطط البياني الآتي الذي يبين معدل إنتاج التستوسترون والنطاف وأجيب عن الأسئلة :
- 1- ما أهمية التركيز المرتفع نسبياً للتستوسترون في الجنين خلال الثلث الأخير من الحمل؟ هجرة الخصيتين.
  - 2- لماذا يكون تركيز التستوسترون مرتفعاً عند حديث الولادة؟ من أجل نمو الأعضاء الجنسية الأولية للمولود.
  - 3- ما العلاقة بين معدل تركيز التستوسترون وإنتاج النطاف ولماذا يقل إنتاج النطاف بعد سن السبعين؟ يزداد إنتاج النطاف بزيادة معدل تركيز التستوسترون. ويقل إنتاج النطاف بعد سن السبعين بسبب انخفاض تركيز التستوسترون.
  - 4- تكون الخلايا البينية غير فعالة في خصية الطفل ، وتكون فعالة لدى حديث الولادة والبالغ ، ما دليلك على ذلك؟ يكون تركيز التستوسترون منخفضاً جداً خلال الفترة بين عمر السنة وال 10 سنوات في حين يكون مرتفعاً لدى حديثي الولادة وبعد البلوغ.

- سابعاً : أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي :
- 1- توقف نمو الأنبوب الطلي لمدة عام في عاريات البذور.. حتى تنضج البذيرة وتشكل بداخلها الأرجام.
  - 2- الفيروسات طفيليات نوعية .. لأن كل نوع من الفيروسات يتطفل على نوع محدد من الخلايا إذ تمتلك نقاط استقبال نوعية له.
  - 3- بذرة الفاصولياء عديمة السويداء.. لأن الرشيم في مراحل تكونه الأخيرة هضم السويداء فنمت الفلقتان وامتلأتا بالمدخرات الغذائية.
  - 4- تعالج الخلايا البرانشيمية أنظيميا لإنتاج نباتات الأنايب.. لإزالة الجدار الخلوي.
  - 5- تدخل بذرة الصنوبر في حالة حياة بطيئة بعد تشكلها.. لأنها تفقد الجزء الأكبر من الماء الموجود فيها.
  - 6- من أهم وسائل الوقاية من مرض الإيدز التحلي بالفضيلة ومكارم الأخلاق.. لأن فيروس الإيدز ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي في أغلب الحالات.
  - 7- تبقى المنويات الأربعة المتشكلة من منسلية واحدة مترابطة من خلال جسور من السيترولاسما خلال تمايزها إلى نطفة.. ليساعد ذلك على نقل المواد المغذية والهرمونات فيما بينها مما يضمن تطورها وتمايزها إلى نطاف في آن معا.
  - 8- يستخدم التستوسترون لدى المسنين في معالجة هشاشة العظام ولدى الرياضيين لتحسين الأداء الرياضي.. لأنه يسبب زيادة الكتلة العظمية والعضلية لدى الذكور إذ يحث على تركيب البروتينات وزيادة ترسب الكالسيوم في العظام.

ثامناً : أجيب عما يأتي : لديك الشكل الآتي الذي يمثل موازنة بين تشكل النطاف لدى الذكر وتشكل البويضات لدى الأنثى والمطلوب :



- 1- أملاً الفراغات المحددة على الشكل مع المسمى العلمي المناسب.
- 2- كيف تتوزع الهيمولي في مرحلة الانقسام المنصف لدى الجنسين وما تأثير ذلك على عدد الأعراس الناتجة؟ تتوزع بالتساوي لدى الذكر فينتج أربع نطاف أما الأنثى فلا تتوزع السيترولاسما بالتساوي وينتج بويضة واحدة فقط.

أقارن بين كل مما يأتي :

وحدة النواة	النواة الحيوانية	النواة النباتية
مضخة النسخة	(2n)	(2n)
مزيداً من المواد	الإنزيمات	بالإضافة إلى النسخة
وحدة الخلية	الخلية الحيوانية	الخلية النباتية
الغشاء الخلوي	غشاء الخلية	غشاء الخلية
الغشاء النووي	غشاء الخلية	غشاء الخلية
الغشاء البلازمي	غشاء الخلية	غشاء الخلية
الغشاء الماندوبلازمي	غشاء الخلية	غشاء الخلية

الغشاء	الغشاء	الغشاء
الغشاء	الغشاء	الغشاء
الغشاء	الغشاء	الغشاء
الغشاء	الغشاء	الغشاء
الغشاء	الغشاء	الغشاء
الغشاء	الغشاء	الغشاء
الغشاء	الغشاء	الغشاء
الغشاء	الغشاء	الغشاء

تاسعاً : يمثل الشكل المجاور حادثة الإخصاب المضاعف في مغلفات البذور والمطلوب :

- أكتب المسميات المناسبة لكل من الأرقام المحددة على الشكل 1- حبة طلع 2- أنبوب طلعي 3- نواة ثانوية
- نظفان نباتيتان 5- عروس أنثوية أو بويضة كروية 6- كوة 7- حبل سري 8- مبيض 9- الحافة
- كيس رشيمي 11- خلية إعاشية أو خلية الأنبوب الطلعي 12- خلية توالدية.
- ما نتيجة اتحاد الرقم (3) مع الرقم (4)؟ ينتج عن اتحاد النواة ثانوية (2n) مع النطفة نباتية (n1) : بيضة إضافية (n3).
- ما نتيجة اتحاد الرقم (4) مع الرقم (5)؟ ينتج عن اتحاد العروس الأنثوية (n1) مع النطفة نباتية (n1) : بيضة أصلية (n2).
- مم ينشأ المسمى رقم (2)؟ من نمو الخلية الإعاشية والغلاف الداخلي السيللوزي في حبة الطلع.




عاشراً : لاحظ الشكل الآتي الذي يمثل بنية الخلية البيضة الثانوية وما يحيط بها من أغلفة. وأجب عن الأسئلة المجاورة :


- 1- إكليل مشع 2- منطقة شفيفة 3- كرية قطبية أولى 4- حبيبات قشرية 5- هيولى.
- أين تتوضع صبغيات النواة؟ ولماذا؟
- على اللوحة الاستوائية. - لأنه توقف فيها الانقسام المنصف الثاني في الطور الاستوائي.
- ما وظيفة المسمى رقم (1)؟ وما مصدره؟
- حماية الخلية البيضية الثانوية من الالتصاق بأي مكان قبل وصولها للرحم.
- من الخلايا الجريبية في الجريب



السؤال العاشر : أكمل خارطة المفاهيم الآتية بالحجرات العلمية المناسبة:



السؤال الحادي عشر : يمثل الشكل الآتي مرحلة من مراحل التماس الحسني لدى الإنسان والمطلوب :



- 1- تسمى هذه المرحلة: الكتلة الأروغية وتبدأ بامتصاص بطفة الرحم في اليوم السابع من الإخصاب.
- 2- المسميات: 1- كتلة حلوية داخلية 2- حواف أروغية 3- أرومة معتمة.
- 3- نمو الخلايا ذات الرقم 3 : غشاء الكورديون أو المشيمة.
- 4- تسهم في تشكل المشاء الأمنيوسي: المكون 1 (الكتلة الحلوية الداخلية).

## المراجعة

**تطوّر الدماغ لدى الفقاريات:** لقد تطوّر الدماغ في الفقاريات بدءاً من الأسماك وحتى الثدييات؛ حيث ضمّر الفصان الشميان والغدة الصنوبرية والحدبات التوعمية والفصان البصريان، بينما كبر المخ والمخيخ، وتمايز الجسم الثفني ومثلث المخ وتضاعف عدد الحدبات التوعمية إلى أربع، وأصبح يتضمن أجوافا تسمى: البطينات التي تتصل ببعضها، وتمتد في قناة السيساء في النخاع الشوكي.

-يتكوّن مخ الأسماك من انتفاخين أملسين يُستخدمان مركزاً للشّم. والمخ في البرمائيات أكبر قليلاً ومغطى بقشيرة.

المخ في الزواحف أكبر حجماً وأكثر تعقيداً من نظيره في الأسماك والزواحف، ويقع داخل المخ عقد قاعدية في شكل حزم صغيرة من العصبونات، تكون مناطق رئيسية لتحليل المعلومات ومعالجتها وتخزينها. وتتميز بعض الزواحف بمنطقة صغيرة من القشرة المخية، تؤدي وظيفة معالجة المعلومات وتخزينها.

-مخ الطيور يفقّر إلى القشرة الجديدة، ويتألف المخ من عقد قاعدية كبيرة متطورة تملأ أغلب الجزء الداخلي للدماغ. وهذه العقد القاعدية هي المركز الرئيسي لمعالجة المعلومات وتخزينها، وتخزن التعليمات الخاصة بأنماط السلوك الغريزي المتعددة. وتتميز الطيور أيضاً بمخيخ متطور، ينسق بين كل الدفعات الحسية والحركية المرتبطة بعملية الطيران.

-يصل الدماغ إلى أعلى درجات تعقده في الثدييات. ولمعظم الثدييات البدائية مثل الخلد مخ صغير نسبياً ذو قشرة مخية ناعمة. أما الثدييات المتطورة مثل: الخيل والقطط فلها مخ كبير مغطى بقشرة بها الكثير من النتوءات والأخايد التي تزيد من سطح الدماغ.

## أمثلة حياتية عن الفعل المنعكس الشرطي:

1- عندما يعذك والدك بهدية تحبها إذا حققت نتيجة جيدة في صفك، فعندما تحقق النتيجة المطلوبة ويقدم لك الهدية سيدفعك ذلك إلى الاستمرار في التفوق، وإذا لم يقدم لك ما وعدك به ستضعف لديك الدافعية في السنوات التالية.

2- عندما لا يشاهد المدرس الوظيفة لطلابه في المرة الأولى ثم يقول لهم إنه سيشاهدها لاحقاً وتتكرر هذه العملية مرات عدة من دون مشاهدتها فإن أكثر الطلاب اهتماماً ستجده قد أهمل وظيفته.

