


البطين الثالث يقع بين كتلتين عصبيتين كبيرتين شكلهما بيضوي، يتكوّنان من مادة رمادية هما: المهادان، وبشكل الوطاء أرضية البطين الثالث. الأخط في كلّ نصف كرة مخّية بطناً جانبياً واحداً، وفي قاعدة كلّ بطين جانبي كتلة رمادية تسمى: الجسم المخروط.

الدماغ البيني (المهادي):
يضم المهادين والوطاء.

توظيف الشّكل:

أدرس الشكلين الآتيين، وأجيب عن الأسئلة التي تليهما




بطينات الدماغ

- أسنى القناة التي تصل البطين الثالث مع البطين الرابع.
- ما القناة التي يتصل بها البطين الرابع من الأسفل؟
- أستنتج وظيفة فرجتي مونرو.

ينفتح البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتي عبر ثلاثة ثقوب (ثقب ماجندي، وثقب لوشكا) يمرّ منها السائل الدماغي الشوكي.

• أسأله ماذا ينتج لو حدث انسداد في إحدى القنوات التي تصل بين بطينات الدماغ؟




البطين الثالث يقع بين كتلتين عصبيتين كبيرتين شكلهما بيضوي، يتكوّنان من مادة رمادية هما: المهادان، وبشكل الوطاء أرضية البطين الثالث. الأخط في كلّ نصف كرة مخّية بطناً جانبياً واحداً، وفي قاعدة كلّ بطين جانبي كتلة رمادية تسمى: الجسم المخروط.

الدماغ البيني (المهادي):
يضم المهادين والوطاء.

توظيف الشّكل:

أدرس الشكلين الآتيين، وأجيب عن الأسئلة التي تليه:



بطينات الدماغ

- أسنى القناة التي تصل البطين الثالث مع البطين الرابع.
- ما القناة التي يتصل بها البطين الرابع من الأسفل؟
- أستنتج وظيفة فرجتي مونرو.

ينفتح البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتي عبر ثلاثة ثقوب (ثقب ماجندي، وثقب لوشكا) يمرّ منها السائل الدماغي الشوكي.


• أسأله ماذا ينتج لو حدث انسداد في إحدى القنوات التي تصل بين بطينات الدماغ؟




أقارن:

الدبق العصبي:

ألاحظ المخطط الآتي، وأتعرف أنواع خلايا الدبق العصبي ودور كل منها:



أضيف إلى معلوماتي




- **الضفيرة المشيمية:** مليئة دقيقة من الأم الحنون تبرز في بطيقات الدماغ الأربعة عنية بالأوعية الدموية تعطيها خلايا البطانة العصبية.
- **الحاجز الدماغى الدموى:** يتألف من النهايات المتوسعة لبعض استطالات خلايا الدبق النجمية (الأبواق الوعائية) والأوعية الدموية المرتبطة بها، ويحمى الدماغ من المواد الخطرة التي قد تأتي مع الدم.


أقارن:

الدبق العصبي:

ألاحظ المخطط الآتي، وأتعرف أنواع خلايا الدبق العصبي ودور كل منها:



أضيف إلى معلوماتي



- **الضفيرة المشيمية:** مليئة دقيقة من الأم الحنون تبرز في بطيقات الدماغ الأربعة عنية بالأوعية الدموية تعطيها خلايا البطانة العصبية.
- **الحاجز الدماغى الدموى:** يتألف من النهايات المتوسعة لبعض استطالات خلايا الدبق النجمية (الأبواق الوعائية) والأوعية الدموية المرتبطة بها، ويحمى الدماغ من المواد الخطرة التي قد تأتي مع الدم.



4

خواص الأعصاب

أجرب وأستنتج خواص الأعصاب:

المواد والأدوات اللازمة:

ضفدع مُجهز للتجربة يُطلب من المدرس.

التجربة:

بعد إزالة جلد الطرف الخلفي؛ نباعد بين عضلتي الفخذ عن بعضهما، فيبرز العصب الوركي الذي ينتهي في العضلة الساقية البطنية كما في الشكل المجاور.

نقوم بتبنيه العصب الوركي، ماذا نلاحظ؟ وماذا نستنتج؟



جورج نعمة
0955247802

4

خواص الأعصاب

أجرب وأستنتج خواص الأعصاب:

المواد والأدوات اللازمة:

ضفدع مُجهز للتجربة يُطلب من المدرس.

وبعد إزالة جلد الطرف الخلفي؛ نباعد بين عضلتي الفخذ عن بعضهما، فيبرز العصب الوركي الذي ينتهي في العضلة الساقية البطنية كما في الشكل المجاور.

نقوم بتبنيه العصب الوركي، ماذا نلاحظ؟ وماذا نستنتج؟



أستنتج

يؤدي تبنيه العصب الوركي إلى تقلص العضلة الساقية البطنية، يتمتع العصب بخاصية: قابلية التنبه ونقل التنبه.

الخواص التجريبية لقابلية التنبه:

إذا أثرنا في العصب الوركي للضفدع بسلسلة من التنبهات الكهربائية المتساوية من حيث مدة تأثيرها، والمتدرجة من حيث تزايد شدتها، نلاحظ أن التنبهات الضعيفة لا تقوى على توليد دفعة عصبية (سيالة)، بدليل عدم ظهور تقلص للعضلة الساقية البطنية. (يسمى المنبه دون عتوي).

وعندما نصل إلى شدة تكفي لتوليد الدفعة العصبية والتقلص العضلي نسمي هذه الشدة: الشدة الحدية. (يسمى المنبه: عتويًا).

الشدة الحدية: هي الشدة التي تكفي لتوليد الدفعة العصبية، والتقلص العضلي، خلال زمن تأثير معين.

الخواص التجريبية لقابلية التنبه:

إذا أثرنا في العصب الوركي للضفدع بسلسلة من التنبهات الكهربائية المتساوية من حيث مدة تأثيرها، والمتدرجة من حيث تزايد شدتها، نلاحظ أن التنبهات الضعيفة لا تقوى على توليد دفعة عصبية (سيالة)، بدليل عدم ظهور تقلص للعضلة الساقية البطنية. (يسمى المنبه دون عتوي).

وعندما نصل إلى شدة تكفي لتوليد الدفعة العصبية والتقلص العضلي نسمي هذه الشدة: الشدة الحدية. (يسمى المنبه: عتويًا).

الشدة الحدية: هي الشدة التي تكفي لتوليد الدفعة العصبية، والتقلص العضلي، خلال زمن تأثير معين.

الكروناكسي

1. ما الزمن الأقصر الذي لا يزال الريبوتز فعالاً عنده؟
2. ما الزمن اللازم لحدوث التنبيه في النسيج، إذا بلغت شدة المنبه ضعف الريبوتز؟
3. أستنتج العلاقة بين **قيمة الكروناكسي** في نسيج ما وقابلية هذا النسيج للتنبيه.
4. في أي من النقاط (أ - ب - ج) يكون المنبه فعالاً عندها؟ ولماذا؟

أستنتج
يظهر منحني عتبات التنبيه بشكل فرع من قطع زائد، يفصل بين منطقة التنبهات الفعالة فوقه ومنطقة التنبهات غير الفعالة تحته.

- **الزمن المعقد الأساسي:** هو الزمن الأقصر الذي لا يزال عنده الريبوتز فعالاً.
- **الكروناكسي:** الزمن المعقد اللازم لحدوث التنبيه في نسيج ما عندما تستخدم تياراً شدته ضعف الريبوتز.

التقويم النهائي

1. أولاً: أعطني تفسيراً علمياً لما يأتي:
 1. لعناصر القوس الانعكاسية النخاعية الكروناكسي نفسه.
 2. ملامسة جسم ساخن بسرعة لا تجعلنا نشعر بسخونته.
- ثانياً: عند دراسة تنبيه عصبين وركيين لضفدع: الأول في درجة الحرارة (20) درجة مئوية، والثاني في الدرجة (10) درجة مئوية. حصلنا على النتائج الآتية:

t=20°C	شدة التنبيه - (mV)	2	2	3	4	5	10
زمن التنبيه - (ms)	6	5	2	1.5	1.2	1	
t=10°C	شدة التنبيه - (mV)	3	3	3.5	5	6	10
زمن التنبيه - (ms)	10	9	4	2.5	2.3	2	

والمطلوب:

1. مثل هذه النتائج في رسم بياني واحد مستخدماً ورقاً ميليمترياً.
2. حدد قيم الريبوتز والكروناكسي في التجريبتين على الرسم.
3. ما العصب الأكثر قابلية للتنبيه؟ ولماذا؟ ماذا تستنتج؟

الكروناكسي

1. ما الزمن الأقصر الذي لا يزال الريبوتز فعالاً عنده؟
2. ما الزمن اللازم لحدوث التنبيه في النسيج، إذا بلغت شدة المنبه ضعف الريبوتز؟
3. أستنتج العلاقة بين **قيمتي الريبوتز والكروناكسي** في نسيج ما وقابلية هذا النسيج للتنبيه.
4. في أي من النقاط (أ - ب - ج) يكون المنبه فعالاً عندها؟ ولماذا؟

أستنتج
يظهر منحني عتبات التنبيه بشكل فرع من قطع زائد، يفصل بين منطقة التنبهات الفعالة فوقه ومنطقة التنبهات غير الفعالة تحته.

- **الزمن المعقد الأساسي:** هو الزمن الأقصر الذي لا يزال عنده الريبوتز فعالاً.
- **الكروناكسي:** الزمن المعقد اللازم لحدوث التنبيه في نسيج ما عندما تستخدم تياراً شدته ضعف الريبوتز.

التقويم النهائي

1. أولاً: أعطني تفسيراً علمياً لما يأتي:
 1. لعناصر القوس الانعكاسية النخاعية الكروناكسي نفسه.
 2. ملامسة جسم ساخن بسرعة لا تجعلنا نشعر بسخونته.
- ثانياً: عند دراسة تنبيه عصبين وركيين لضفدع: الأول في درجة الحرارة (20) درجة مئوية، والثاني في الدرجة (10) درجة مئوية. حصلنا على النتائج الآتية:

t=20°C	شدة التنبيه - (mV)	2	2	3	4	5	10
زمن التنبيه - (ms)	6	5	2	1.5	1.2	1	
t=10°C	شدة التنبيه - (mV)	3	3	3.5	5	6	10
زمن التنبيه - (ms)	10	9	4	2.5	2.3	2	

والمطلوب:

1. مثل هذه النتائج في رسم بياني واحد مستخدماً ورقاً ميليمترياً.
2. حدد قيم الريبوتز والكروناكسي في التجريبتين على الرسم.
3. ما العصب الأكثر قابلية للتنبيه؟ ولماذا؟ ماذا تستنتج؟

3

الجهاز العصبي المحيطي (الطرفي)

تتعرض حياتنا لكثير من التغيرات، فتارة نعيش حالة من الراحة والهدوء وتارة نتألمنا حالة من التوتر والقلق.

« ألاحظ الشكل المجاور الذي يمثل الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي.

1 ما الجهاز المسؤول عن تلك المتغيرات؟

يتألف الجهاز العصبي المحيطي من عقد عصبية وأعصاب.

2 ما قسما الجهاز العصبي المحيطي من حيث الوظيفة؟

- يقسم وظيفياً إلى قسمين: **جسمي** إرادي وذاتي لا إرادي.

العقد العصبية:

بني تحوي تجمعات أجسام عصبونات وخلايا دبقية، تنشأ من العرف العصبي مدعومة بنسيج ضام تعمل كمحطة استقبال وإرسال للرسائل العصبية. أحدد نوع الخلايا الدبقية التي تدخل في بنية العقد العصبية.

أنواع العقد:

1. عقد قحفية على الأعصاب القحفية (الدماغية).
2. عقد شوكية على الجذر الخلفي الحسي للعصب الشوكي.
3. عقد ذاتية (مستقلة لإرادية)، وهي نوعان: عقد ودية، وعقد نظيرة ودية.

3

الجهاز العصبي المحيطي (الطرفي)

تتعرض حياتنا لكثير من التغيرات، فتارة نعيش حالة من الراحة والهدوء وتارة نتألمنا حالة من التوتر والقلق.

« ألاحظ الشكل المجاور الذي يمثل الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي.

1 ما الجهاز المسؤول عن تلك المتغيرات؟

يتألف الجهاز العصبي المحيطي من عقد عصبية وأعصاب.

2 ما قسما الجهاز العصبي المحيطي من حيث الوظيفة؟


- يقسم وظيفياً إلى قسمين: جسمين إرادي وذاتي لا إرادي.

العقد العصبية:


بني تحوي تجمعات أجسام عصبونات وخلايا دبقية، تنشأ من العرف العصبي مدعومة بنسيج ضام تعمل كمحطة استقبال وإرسال للرسائل العصبية. أحدد نوع الخلايا الدبقية التي تدخل في بنية العقد العصبية.

أنواع العقد:

1. عقد قحفية على الأعصاب القحفية (الدماغية).
2. عقد شوكية على الجذر الخلفي الحسي للعصب الشوكي.
3. عقد ذاتية (مستقلة لإرادية)، وهي نوعان: عقد ودية، وعقد نظيرة ودية.



إعداد القدير
جورج نعمة
0955220402



■ النواقل الكيميائية العصبية:

تشكل النواقل العصبية إما في جسم الخلية، أو في الرزّ النهائي مباشرة بفعل أنظيماة نوعية. ويكون تأثيره مؤقتاً في المشبك؛ بسبب زوالها بعد أن تؤذي دورها، إما بحلمتها بأنظيماة نوعية أو بإعادة امتصاصها من الغشاء قبل المشبكيّ وخلايا النبق أو بانتشارها خارج الفالق المشبكي.

مثال: الأستيل كولين يتحلّمه بأنظيماة الكولين أستيراز إلى كولين وحمض الخلّ.

■ بعض أنواع النواقل الكيميائية العصبية:

1. الأستيل كولين: يفرز من الجهاز العصبيّ، له تأثير منبه في العضلات الهيكلية، ويبطئ حركة عضلة القلب، وله دور مهم في الذاكرة. ويؤذي البوتوكس المستخدم في عمليات التجميل لإزالة تجاعيد الوجه إلى تثبيط تأثير الأستيل كولين، من ثم ارتخاء العضلات، والبوتوكس سم (Toxin) بروتينيّ مستخرج من بعض الجراثيم.
2. الدوبامين: يفرز من المادة السوداء لجذع الدماغ، ويكمّات قليلة من لبّ الكظر، له تأثير مثبط، ومنتشط في الحالات النفسية والعصبية، يزداد تأثيره بوجود النيكوتين والمواد المخدرة كالكوكتاين.
3. الغلوتامات: يفرز من المسالك الحسية والقشرة المخية، وله تأثير منبه غالباً.
4. المادة "P": بيتيد مكوّن من (11) حمض أمينيّ تفرز من مسالك حنّ الألم في النخاع الشوكي، ولها تأثير منبه ونقل للألم.

■ التحكّم بالألم:

◀ لاحظ الشكل المجاور:

ترسل مستقبلات حنّ الألم السيالات الألمية إلى النخاع الشوكي، إذ يتم تحرير المادة (P) في مسالك حنّ الألم؛ لتصل إلى الدماغ؛ فتدرك حنّ الألم.

يقوم الدماغ بإفراز الأنكيغاليينات والأندورفينات التي تثبط تحرير المادة (p) من خلال منع دخول شوارد الكالسيوم من الغشاء قبل المشبكي، من ثمّ منع وصول السيالات الألمية للدماغ.



■ النواقل الكيميائية العصبية:

تشكل النواقل العصبية إما في جسم الخلية، أو في الرزّ النهائي مباشرة بفعل أنظيماة نوعية. ويكون تأثيرها مؤقتاً في المشبك؛ بسبب زوالها بعد أن تؤذي دورها، إما بحلمتها بأنظيماة نوعية أو بإعادة امتصاصها من الغشاء قبل المشبكيّ وخلايا النبق أو بانتشارها خارج الفالق المشبكي.

مثال: الأستيل كولين يتحلّمه بأنظيماة الكولين أستيراز إلى كولين وحمض الخلّ.

■ بعض أنواع النواقل الكيميائية العصبية:

1. الأستيل كولين: يفرز من الجهاز العصبيّ، له تأثير منبه في العضلات الهيكلية، ويبطئ حركة عضلة القلب، وله دور مهم في الذاكرة. ويؤذي البوتوكس المستخدم في عمليات التجميل لإزالة تجاعيد الوجه إلى تثبيط تأثير الأستيل كولين، من ثم ارتخاء العضلات، والبوتوكس سم (Toxin) بروتينيّ مستخرج من بعض الجراثيم.
2. الدوبامين: يفرز من المادة السوداء لجذع الدماغ، ويكمّات قليلة من لبّ الكظر، له تأثير مثبط، ومنتشط في الحالات النفسية والعصبية، يزداد تأثيره بوجود النيكوتين والمواد المخدرة كالكوكتاين.
3. الغلوتامات: يفرز من المسالك الحسية والقشرة المخية، وله تأثير منبه غالباً.
4. المادة "P": بيتيد مكوّن من (11) حمض أمينيّ تفرز من مسالك حنّ الألم في النخاع الشوكي، ولها تأثير منبه ونقل للألم.

■ التحكّم بالألم:

◀ لاحظ الشكل المجاور:

ترسل مستقبلات حنّ الألم السيالات الألمية إلى النخاع الشوكي، إذ يتم تحرير المادة (P) في مسالك حنّ الألم؛ لتصل إلى الدماغ؛ فتدرك حنّ الألم.

يقوم الدماغ بإفراز الأنكيغاليينات والأندورفينات التي تثبط تحرير المادة (p) من خلال منع دخول شوارد الكالسيوم من الغشاء قبل المشبكي، من ثمّ منع وصول السيالات الألمية للدماغ.



الإحظ وأقارن:

ثانياً: المشابك الكهربائية

الإحظ الشكل الآتي الذي يوضح مقارنة بين المشبك الكهربائي والمشبك الكيميائي، وأكمل الجدول الذي يليه:



وجه المقارنة	المشبك الكهربائي	المشبك الكيميائي
المكونات	بينتان لخلايا متجاورة يفصلهما فائق ضيق، ترتبطان
وجود الناقل الكيميائي
جهة نقل النبضة
السرعة	أكثر سرعة لا يشتمع بالإبطاء	أقل سرعة
مكان وجودها في الجسم	بين الألياف العصبية للمعضو الواحد، كالعضلة القلبية وعضلات الأحشاء

التقويم النهائي

أولاً: اختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- يؤدي ارتباط الناقل الكيميائي الغلوتامات مع مستقبلاته في الغشاء بعد المشبك غالباً إلى:
 - خروج شوارد الصوديوم.
 - خروج شوارد الكلور.
 - دخول شوارد الصوديوم.
 - دخول شوارد الكلور.
- قنوات تفتح وتغلق نتيجة تبدل في كمون (استقطاب) الغشاء.
 - التسريب البروتينية.
 - التأيين القلوطنية.
 - التأيين الكيميائية.
 - القنوات البروتينية.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- تعذ القطعة الأولية من المحوار مكاناً لانطلاق كمونات العمل.
- يقصر نشوء التيارات المحلية على اختلافات رانفييه في الألياف المغتدة في النخاعين.
- يمكن أن يكون الناقل منبهاً في بعض المشابك، ومثبطاً في مشابك أخرى.

الإحظ وأقارن:

ثانياً: المشابك الكهربائية

الإحظ الشكل الآتي الذي يوضح مقارنة بين المشبك الكهربائي والمشبك الكيميائي، وأكمل الجدول الذي يليه:



وجه المقارنة	المشبك الكهربائي	المشبك الكيميائي
المكونات	بينتان لخلايا متجاورة يفصلهما فائق ضيق، ترتبطان
وجود الناقل الكيميائي
جهة نقل النبضة
السرعة	أكثر سرعة لا يشتمع بالإبطاء	أقل سرعة
مكان وجودها في الجسم	بين الألياف العصبية للمعضو الواحد، كالعضلة القلبية وعضلات الأحشاء

التقويم النهائي

أولاً: اختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- يؤدي ارتباط الناقل الكيميائي الغلوتامات مع مستقبلاته في الغشاء بعد المشبك غالباً إلى:
 - خروج شوارد الصوديوم.
 - خروج شوارد الكلور.
 - دخول شوارد الصوديوم.
 - دخول شوارد الكلور.
- قنوات تفتح وتغلق نتيجة تبدل في كمون (استقطاب) الغشاء.
 - التسريب البروتينية.
 - التأيين القلوطنية.
 - التأيين الكيميائية.
 - القنوات البروتينية.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- تعذ القطعة الأولية من المحوار مكاناً لانطلاق كمونات العمل.
- يقصر نشوء التيارات المحلية على اختلافات رانفييه في الألياف المغتدة بالنخاعين.
- يمكن أن يكون الناقل منبهاً في بعض المشابك، ومثبطاً في مشابك أخرى.

يؤدي الاستئصال الواسع للباحات الحسية الجسمية الأولية في نصف الكرة المخية إلى الخدر. كما يتم في الباحات الحسية الجسمية الثانوية الإدراك الحسي الجسمي، والمريض المصاب بلذبة في هذه الباحة لا يعاني من الخدر، ولكنه يُصاب بالعمه المُسي أي يصبح عاجزاً عن تحديد ماهية ما يلمس.


أضف إلى معلوماتي

- **التشكيل الشبكي:** شبكة منتشرة من العصبونات الموجودة في الدماغ المتوسط والحذبة الحلقية، يعتقد بأن له دوراً في النوم واليقظة، ويؤدي تخريبها إلى السبات الدائم.
- تتوضع مراكز الشعور بالألم في التشكيل الشبكي وفي المهاد، بينما يقتصر دور القشرة المخية (الباحات الحسية الجسمية) على تحديد مكان الألم وصفته.

ب. الباحات البصرية:

❑ بالاستعانة بالشكل السابق الذي يوضح الباحات القشرية، أين تقع الباحات البصرية؟

نميز في كل نصف كرة مخية في الفصين القفويين باحتين: أولية، وأخرى ثانوية.



الباحات البصرية الأولية: تصل إليها الألياف العصبية البصرية القادمة من الشبكيين، بعد أن تتصالب أمام الوطاء تصالبًا جزئياً كما في الشكل المعجور ويتم فيها الإحساس البصري. بينما يكون دور الباحات البصرية الثانوية (الإدراك البصري)؛ تحليل شكل الأجسام المرئية، وحركتها، وألوانها.

ج. الباحات السمعية:

توجد في الفصين الصدغيين، لاحظ الشكل السابق الذي يوضح الباحات القشرية.

تصل الألياف العصبية السمعية إلى الباحتين السعيتين الأوليتين بعد أن يتصالب العصب القوقعي جزئياً في جذع الدماغ، ويتم فيها الإحساس السعيمي.

يؤدي التخريب ثنائي الجانب للباحات السمعية الأولية إلى فقدان السمع.

تعمل الباحات السمعية الثانوية على إدراك الأصوات المسموعة (الإدراك السعيمي).

يؤدي الاستئصال الواسع للباحات الحسية الجسمية الأولية في نصف الكرة المخية إلى الخدر. كما يتم في الباحات الحسية الجسمية الثانوية الإدراك الحسي الجسمي، والمريض المصاب بلذبة في هذه الباحة لا يعاني من الخدر، ولكنه يُصاب بالعمه المُسي أي يصبح عاجزاً عن تحديد ماهية ما يلمس.


أضف إلى معلوماتي

- **التشكيل الشبكي:** شبكة منتشرة من العصبونات الموجودة في الدماغ المتوسط والحذبة الحلقية، يعتقد بأن له دوراً في النوم واليقظة، ويؤدي تخريبها إلى السبات الدائم.
- تتوضع مراكز الشعور بالألم في التشكيل الشبكي وفي المهاد، بينما يقتصر دور القشرة المخية (الباحات الحسية الجسمية) على تحديد مكان الألم وصفته.

ب. الباحات البصرية:

❑ بالاستعانة بالشكل السابق الذي يوضح الباحات القشرية، أين تقع الباحات البصرية؟

نميز في كل نصف كرة مخية في الفصين القفويين باحتين: أولية، وأخرى ثانوية.



الباحات البصرية الأولية: تصل إليها الألياف العصبية البصرية القادمة من الشبكيين، بعد أن تتصالب أمام الوطاء تصالبًا جزئياً كما في الشكل المعجور ويتم فيها الإحساس البصري. بينما يكون دور الباحات البصرية الثانوية (الإدراك البصري)؛ تحليل شكل الأجسام المرئية، وحركتها، وألوانها.

ج. الباحات السمعية:

توجد في الفصين الصدغيين، لاحظ الشكل السابق الذي يوضح الباحات القشرية.

تصل الألياف العصبية السمعية إلى الباحتين السعيتين الأوليتين بعد أن يتصالب العصبين القوقعين جزئياً في جذع الدماغ، ويتم فيها الإحساس السعيمي.

يؤدي التخريب ثنائي الجانب للباحات السمعية الأولية إلى فقدان السمع.

تعمل الباحات السمعية الثانوية على إدراك الأصوات المسموعة (الإدراك السعيمي).



التقويم النهائي

أولاً: ما المقصود بكل مما يأتي: الحصين - المرونة العصبية.

ثانياً: اختارُ الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

إحدى هذه العصبونات ليست من المسلك الحسي اللمسي الدقيق الصاعد:

أ - عصبون جسمه يقع في العقدة الشوكية.

ب - عصبون جسمه يقع في المهاد.

ج - عصبون جسمه يقع في البصلة السيسائية.

د - عصبون جسمه يقع في المادة الرمادية للنخاع الشوكي.

ثالثاً: أرثب العصبونات التي تشكل مسلك حن الألم، وأحدد مكان التصالب الحسي.

رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

أ- تعدّ العصبونات النجمية في القرون الأمامية للنخاع الشوكي محرّكة.

ب- تعدّ المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات.

ج - أهمية النوم في تشكيل الذكريات.

التقويم النهائي

أولاً: ما المقصود بكل مما يأتي **تلفيف** الحصين - المرونة العصبية.

ثانياً: اختارُ الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

إحدى هذه العصبونات ليست من المسلك الحسي اللمسي الدقيق الصاعد:

أ - عصبون جسمه يقع في العقدة الشوكية.

ب - عصبون جسمه يقع في المهاد.

ج - عصبون جسمه يقع في البصلة السيسائية.

د - عصبون جسمه يقع في المادة الرمادية للنخاع الشوكي.

ثالثاً: أرثب العصبونات التي تشكل مسلك حن الألم، وأحدد مكان التصالب الحسي.

رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

أ- تعدّ العصبونات النجمية في القرون الأمامية للنخاع الشوكي محرّكة.

ب- تعدّ المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات.

ج - أهمية النوم في تشكيل الذكريات.



المتر واصنف:

■ دور المخ في التعلم والذاكرة:

أ. المرونة العصبية أو التكيف العصبي:

يحتوي المخ (100) مليار عصبون تقريباً، يربط بينها نحو تريليون مشبك في كل 1cm^3 . يمكن تعديل الارتباطات (المشابك) بين العصبونات، من ثم تغيير سعة الجهاز العصبي كاستجابة لنشاط تلك العصبونات، أي تقوى الارتباطات بين العصبونات أو تضعف حسب درجة النشاط بينها، وهذا ما يعرف بالمرونة العصبية.

ب. الذاكرة والتعلم: يتم تنظيم الذاكرة في دماغنا على ثلاث مراحل:

- الذاكرة الحسية: تسجل الانطباعات التي تستقبلها الحواس، وتستمر أجزاء من الثانية، كما هو الحال عند النظر لجسم ما، ومن ثم تغلق عيوننا فنلاحظ بقاء الانطباع لمدة قصيرة جداً.
- الذاكرة القصيرة الأمد: تستمر حتى (20) ثانية أو أكثر، يمكن أن تزول أو تتحول إلى ذاكرة طويلة الأمد. كما هي الحال عندما نحفظ رقم هاتف ما ثم ننساه بعد أن نستخدمه لمرة واحدة.
- الذاكرة الطويلة الأمد: تستمر لمدة طويلة جداً، وسعتها غير محدودة، وتبقى راسخة مدى الحياة وتقاوم الضمور والاضمحلال بدرجة عالية. مثالها: تذكر عنوان منزلك القديم، أو قيادة الدراجة.

الأساس البيولوجي لتشكيل عمليتي التعلم والذاكرة:

تعُد المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات، لأنّ الذكريتين الطويلة الأمد والقصيرة الأمد تتشأن عند المشابك؛ إذ تتشكل مشابك مؤقتة في تلقيف الحصين في أثناء الذاكرة القصيرة الأمد، بينما تتحول إلى روابط (مشابك) دائمة في القشرة المخية في الذاكرة طويلة الأمد، ويعتقد بأن ذلك يحدث في أثناء النوم؛ ممّا يؤكد أهمية النوم في تشكل الذكريات. وبعدّ الحصين ضرورياً لتخزين الذكريات الجديدة الطويلة الأمد لكن ليس للاحتفاظ بها. ويؤكد ذلك أنّ الأشخاص الذين يعانون من تضرر في تلقيف الحصين؛ لا يستطيعون تشكيل ذكريات جديدة دائمة، ويتذكرون الأحداث التي جرت قبل إصابتهم.



أضيف إلى معلوماتي

تلقيف الحصين: جزء منطوق من مادة سنجابية نهائته الأمامية متضخمة، ويمتد في أرضية البطين الجانبي لكل من نصفي الكرة المخية.

المتر واصنف:

■ دور المخ في التعلم والذاكرة:

أ. المرونة العصبية أو التكيف العصبي:


يحتوي المخ (100) مليار عصبون تقريباً، يربط بينها نحو تريليون مشبك في كل 1cm^3 . يمكن تعديل الارتباطات (المشابك) بين العصبونات، من ثم تغيير سعة الجهاز العصبي كاستجابة لنشاط تلك العصبونات، أي تقوى الارتباطات بين العصبونات أو تضعف حسب درجة النشاط بينها، وهذا ما يعرف بالمرونة العصبية.

ب. الذاكرة والتعلم: يتم تنظيم الذاكرة في دماغنا على ثلاث مراحل:

- الذاكرة الحسية: تسجل الانطباعات التي تستقبلها الحواس، وتستمر أجزاء من الثانية، كما هو الحال عند النظر لجسم ما، ومن ثم تغلق عيوننا فنلاحظ بقاء الانطباع لمدة قصيرة جداً.
- الذاكرة القصيرة الأمد: تستمر حتى (20) ثانية أو أكثر، يمكن أن تزول أو تتحول إلى ذاكرة طويلة الأمد. كما هي الحال عندما نحفظ رقم هاتف ما ثم ننساه بعد أن نستخدمه لمرة واحدة.
- الذاكرة الطويلة الأمد: تستمر لمدة طويلة جداً، وسعتها غير محدودة، وتبقى راسخة مدى الحياة وتقاوم الضمور والاضمحلال بدرجة عالية. مثالها: تذكر عنوان منزلك القديم، أو قيادة الدراجة.

الأساس البيولوجي لتشكيل عمليتي التعلم والذاكرة:


تعُد المرونة العصبية أساسية في تشكل الذكريات، لأنّ الذكريتين الطويلة الأمد والقصيرة الأمد تتشأن عند المشابك؛ إذ تتشكل مشابك مؤقتة في تلقيف الحصين في أثناء الذاكرة القصيرة الأمد، بينما تتحول إلى روابط (مشابك) دائمة في القشرة المخية في الذاكرة طويلة الأمد، ويعتقد بأن ذلك يحدث في أثناء النوم؛ ممّا يؤكد أهمية النوم في تشكل الذكريات. وبعدّ تلقيف الحصين ضرورياً لتخزين الذكريات الجديدة الطويلة الأمد لكن ليس للاحتفاظ بها. ويؤكد ذلك أنّ الأشخاص الذين يعانون من تضرر في تلقيف الحصين؛ لا يستطيعون تشكيل ذكريات جديدة دائمة، ويتذكرون الأحداث التي جرت قبل إصابتهم.



أضيف إلى معلوماتي

تلقيف الحصين: جزء منطوق من مادة سنجابية نهائته الأمامية متضخمة، ويمتد في أرضية البطين الجانبي لكل من نصفي الكرة المخية.

8




وظائف الجهاز العصبي المركزي (2)

الاحظ وأحل:

■ دور المخ في الحس:


▼ مستعينا بالشكلين الآتيين اللذين يمثلان المسالك الحسية، أجب عن الأسئلة:



1. أرتب العصبونات التي تشكل المسلك الناقل لحس الحرارة.
2. إلى أين ينتهي كل من مسلك حس اللمس الخشن وحس الاهتزاز؟
3. أين يقع جسم العصبون الثاني في مسلك حس اللمس الدقيق؟
4. أحدد مكان تصالب مسالك الحس اللمس الخشن - الحس العميق - الحرارة.
5. ما الحبال التي تعبرها الألياف الحسية المساعدة في النخاع الشوكي؟

52

8




وظائف الجهاز العصبي المركزي (2)

الاحظ وأحل:

■ دور المخ في الحس:

▼ مستعينا بالشكلين الآتيين اللذين يمثلان المسالك الحسية، أجب عن الأسئلة:



1. أرتب العصبونات التي تشكل المسلك الناقل لحس الحرارة.
2. إلى أين ينتهي كل من مسلك حس اللمس الخشن وحس الاهتزاز؟
3. أين يقع جسم العصبون الثاني في مسلك حس اللمس الدقيق؟
4. أحدد مكان تصالب مسالك الحس اللمس الخشن - الحس العميق - الحرارة.
5. ما الحبال التي تعبرها الألياف الحسية المساعدة في النخاع الشوكي؟

52



جورج نعمة
0955220402

2022 2021

التقويم النهائي

أولاً: ماذا ينتج عن:

- أ- موت عصبونات في المادة السوداء لجذع الدماغ.
 - ب- ترسب بروتين الأميلويد حول عصبونات في القشرة المخية.
 - ج- فقدان خلايا النبق قليلة الإستطالات.
- ثانياً: ما سبب الإصابة بمرض الشقيقة؟**
- ثالثاً: أعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**
1. فقدان الوعي والسقوط أرضاً في حالة الصرع.
 2. ضمور وموت الخلايا العصبية في المخ في حالة الإصابة بآلزهايمر.

ورقة عمل

- ابحث أكثر في مصادر التعلم أو مستعياً بمختص عن التهاب السحايا (الأسباب، الأعراض)، وأعرضها على زملائي وأناقشهم بها.
- اكتب تقريراً وأعرضه على زملائي واحتفظ به في ملف إنجازي.

التقويم النهائي

أولاً: ماذا ينتج عن:

- أ- موت عصبونات في المادة السوداء لجذع الدماغ.
- ب- ترسب بروتين الأميلويد حول عصبونات في القشرة المخية.
- ج- فقدان خلايا النبق قليلة الاستطالات.

ثانياً: ما سبب الإصابة بمرض الشقيقة؟

ثالثاً: أعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. فقدان الوعي والسقوط أرضاً في حالة الصرع.
2. ضمور وموت الخلايا العصبية في المخ في حالة الإصابة بآلزهايمر.

ورقة عمل

- ابحث أكثر في مصادر التعلم أو مستعياً بمختص عن التهاب السحايا (الأسباب، الأعراض)، وأعرضها على زملائي وأناقشهم بها.
- اكتب تقريراً وأعرضه على زملائي واحتفظ به في ملف إنجازي.




0955221402

■ مرض ألزهايمر (الخرف المبكر):

مرض وراثي غالباً يصيب بعض المتقدمين في العمر نحو سن الستين غالباً (شيخوخة مبكرة للدماغ).

■ الأعراض: يعاني المصاب صعوبة في تذكر الأحداث القريبة؛ فيصبح مرتبكاً كثير النسيان، ريثما يحدث فقدان تام للذاكرة في المراحل المتأخرة.



■ آلية حدوث المرض: يحدث نتيجة تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني (الأميلويد) حول العصبونات في القشرة المخية والحصين؛ مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على التواصل مع العصبونات الأخرى وضمورها ثم موتها.

■ مرض الشقيقة (الصداع الوعائي):

توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي يؤدي إلى تنبيه النهايات العصبية في هذا الشريان، وينتج عنها صداع وحيد الجانب، ويثار بعوامل بيئية أو نفسية محددة.

■ التصلب اللويحي المتعدد:

يظهر المرض بين سن (20 - 40) وهو تنكس عصبي، سببه: فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطالات، وتفككها إلى صفائح متصلة نتيجة مرض مناعي ذاتي كما في الشكل المجاور، تنتج الأعراض من زوال غمد النخاعين في مناطق متعددة من المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي. فيصن المريض بصنمة كهربائية عند تحريك العنق.



■ الصرع:

اختلال ناجم عن نوبات من النشاط الكهربائي الدماغى المشوش، يصحبها حركات تشنجية لا إرادية، والسقوط أرضاً، وفقدان الوعي بضع دقائق.

■ مرض ألزهايمر (الخرف المبكر):

مرض وراثي غالباً يصيب بعض المتقدمين في العمر نحو سن الستين غالباً (شيخوخة مبكرة للدماغ).

■ الأعراض: يعاني المصاب صعوبة في تذكر الأحداث القريبة؛ فيصبح مرتبكاً كثير النسيان، ريثما يحدث فقدان تام للذاكرة في المراحل المتأخرة.



■ آلية حدوث المرض: يحدث نتيجة تراكم لويحات من بروتين بيتا النشواني (الأميلويد) حول العصبونات في القشرة المخية وتليف الحصين؛ مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على التواصل مع العصبونات الأخرى وضمورها ثم موتها.

■ مرض الشقيقة (الصداع الوعائي):

توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي يؤدي إلى تنبيه النهايات العصبية في هذا الشريان، وينتج عنها صداع وحيد الجانب، ويثار بعوامل بيئية أو نفسية محددة.

■ التصلب اللويحي المتعدد:

يظهر المرض بين سن (30 - 40) وهو تنكس عصبي، سببه: فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطالات، وتفككها إلى صفائح متصلة نتيجة مرض مناعي ذاتي كما في الشكل المجاور، تنتج الأعراض من زوال غمد النخاعين في مناطق متعددة من المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي. فيصن المريض بصنمة كهربائية عند تحريك العنق.



■ الصرع:

اختلال ناجم عن نوبات من النشاط الكهربائي الدماغى المشوش، يصحبها حركات تشنجية لا إرادية، والسقوط أرضاً، وفقدان الوعي بضع دقائق.




10

الفعل المنعكس

أحببت ابنتي الطفل الصغير الذي وضعته حديثاً، ولكن ما أثار حيرتها هو قدرة الصغير على الرضاعة منذ اليوم الأول لولادته، ولم تستطع تفسير ذلك، وعندما سألت مدرسة العلوم عن السبب، أجابتها بأنه فعل انعكاسي.

1 ما الفعل الانعكاسي؟ كيف يحدث؟ ماهي عناصره؟


الاحظ واستنتج:



4 الاحظ الشكل المجاور، الذي يمثل ضغطاً شوكمياً بعد تنبيه الطرف الخلفي لبعض الغل. وأجيب عن الأسئلة:

1. هل استجابة الضفدع إرادية؟ ولماذا؟
 2. ما المركز العصبي الذي أشرف على هذا الفعل؟
- الفعل **الانعكاسي**؛ استجابة سريعة تلقائية من الجسم لا إرادية، لأنه حدث من دون تدخل قشرة المخ.
- اذكر بعض المراكز العصبية للأفعال الانعكاسية؟

4 الاحظ الشكل الآتي الذي يوضح الأقواس الانعكاسية الشوكية وحيدة المشبك وثانية المشبك وأجيب على الأسئلة:



59

2022 2021


10

الفعل المنعكس

أحببت ابنتي الطفل الصغير الذي وضعته حديثاً، ولكن ما أثار حيرتها هو قدرة الصغير على الرضاعة منذ اليوم الأول لولادته، ولم تستطع تفسير ذلك، وعندما سألت مدرسة العلوم عن السبب، أجابتها بأنه فعل انعكاسي.

1 ما الفعل الانعكاسي؟ كيف يحدث؟ ماهي عناصره؟


الاحظ واستنتج:




4 الاحظ الشكل المجاور، الذي يمثل ضغطاً شوكمياً بعد تنبيهه بحمض الغل. وأجيب عن الأسئلة:

1. هل استجابة الضفدع إرادية؟ ولماذا؟
 2. ما المركز العصبي الذي أشرف على هذا الفعل؟
- الفعل **انعكاسي**؛ استجابة سريعة تلقائية من الجسم لا إرادية، لأنه حدث من دون تدخل قشرة المخ.
- اذكر بعض المراكز العصبية للأفعال الانعكاسية؟

4 الاحظ الشكل الآتي الذي يوضح الأقواس الانعكاسية الشوكية وحيدة المشبك وثانية المشبك وأجيب على الأسئلة:



59




1. لماذا تغلق قنوات الصوديوم في غشاء القطعة الخارجية للعضية في الضوء الضعيف؟
2. متى ينشِط مركب ترانسدوسين؟ وما دور أنظم فوسفو دي استيراز؟
3. ما سبب فرط استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعضية في الضوء الضعيف؟
4. بم تختلف آلية عمل المستقبلات الضوئية عن آلية عمل باقي المستقبلات؟

الرؤية اللونية:

أوظف الأشكال واستنتج:

أدرس المخطط الآتي الذي يوضح العلاقة بين طول الموجة الضوئية والنسبة المنوية لامتناصها من
قبل أنواع المخاريط والشكل المجاور له، ثم أكمل الجدول:



1. لماذا تغلق قنوات الصوديوم في غشاء القطعة الخارجية للعضية في الضوء الضعيف؟
2. متى ينشِط مركب ترانسدوسين؟ وما دور أنظم فوسفو دي استيراز؟
3. ما سبب فرط استقطاب غشاء القطعة الخارجية للعضية في الضوء الضعيف؟
4. بم تختلف آلية عمل المستقبلات الضوئية عن آلية عمل باقي المستقبلات؟

الرؤية اللونية:

أوظف الأشكال واستنتج:

أدرس المخطط الآتي الذي يوضح العلاقة بين طول الموجة الضوئية والنسبة المنوية لامتناصها من
قبل أنواع المخاريط والشكل المجاور له، ثم أكمل الجدول:

التقويم النهائي

■ أولاً: اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:

1. باحة على الشبكية مقابل الحدقة تكثر فيها المخاريط وتقل العصي.
2. منخفض صغير في مركز الشبكية الصفراء تحوي مخاريط فقط.
3. منطقة خروج ألياف العصب البصري من الشبكية ينعدم فيها الإبصار.

■ ثانياً: أقرن بين:

- 1- الحفيرة المركزية والمنطقة الأكثر محيطية في الشبكية من حيث:
 - حدة الإبصار - الخلايا البصرية في كل منهما - عدد الخلايا البصرية التي تقابل ليفاً بصرياً واحداً.
- 2- أصبغة العصي وأصبغة المخاريط من حيث: الجذر البروتيني.

■ ثالثاً: اعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. تعد العصي والمخاريط (الخلايا البصرية) مستقبلات أولية.
 2. ينعدم الإبصار في منطقة النقطة العمياء.
 3. العصي مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة الضعيفة.
 4. المخاريط قادرة على تمييز الألوان أما العصي فلا تميز الألوان.
 5. المخاريط مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة القوية.
- رابعاً: ما طبقات الوريقة العصبية في الشبكية من الخارج إلى الداخل.

■ خامساً: ما وظيفة كل مما يأتي:

- الخلايا المقترنية - الخلايا الأفقية - الجسم المشبكي الصباغ الأسود الموجود في الوريقة الصباغية الخارجية من الشبكية.

التقويم النهائي

■ أولاً: اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:

1. باحة على الشبكية مقابل الحدقة تكثر فيها المخاريط وتقل العصي.
2. منخفض صغير في مركز الشبكية الصفراء تحوي مخاريط فقط.
3. منطقة خروج ألياف العصب البصري من الشبكية ينعدم فيها الإبصار.

■ ثانياً: أقرن بين:

- 1- الحفيرة المركزية والمنطقة الأكثر محيطية في الشبكية من حيث:
 - حدة الإبصار - الخلايا البصرية في كل منهما - عدد الخلايا البصرية التي تقابل ليفاً بصرياً واحداً.
- 2- أصبغة العصي وأصبغة المخاريط من حيث: الجذر البروتيني.

■ ثالثاً: اعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. تعد العصي والمخاريط (الخلايا البصرية) مستقبلات أولية.
 2. ينعدم الإبصار في منطقة النقطة العمياء.
 3. العصي مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة الضعيفة.
 4. المخاريط قادرة على تمييز الألوان أما العصي فلا تميز الألوان.
 5. المخاريط مسؤولة عن رؤية البيئة المحيطة في شروط الإضاءة القوية.
- رابعاً: ما طبقات الوريقة العصبية في الشبكية من الخارج إلى الداخل.

■ خامساً: ما وظيفة كل مما يأتي:

- الخلايا المقترنية - الخلايا الأفقية - الجسم المشبكي - الصباغ الأسود الموجود في الوريقة الصباغية الخارجية من الشبكية.



١٧ تعد الخلايا الحسية الذوقية من المستقبلات الثابتة، لماذا؟

تتوضع الخلايا الحسية الذوقية في بنى تسمى البراعم الذوقية، توجد البراعم الذوقية ضمن بروزات على السطح العلوي للسان تسمى: الخليمات اللسانية، كما يوجد براعم ذوقية خارج الخليمات في البلعوم.

أوظف الأشكال: ▼ من خلال الشكل الآتي أتعرف بنية البرعم الذوقي:



أضيف إلى معلوماتي

يحتوي البرعم الذوقي (40 إلى 100) خلية حسية ذوقية (عصرها قصير 10 أيام فقط). تنقسم الخلايا القاعدية في البرعم الذوقي، فتعطي خلايا انتقالية تقوم بدورها بخلايا استقبالية قبل أن تتحول إلى خلايا حسية ذوقية.

اضغ فرضية: عندما أتذوق رشقة من عصير الليمون المحلى بالسكر، ما العوامل المسببة لزوال استقطب غشاء الخلية الحسية؟

الاحظ واحلل: ▼ آلية عمل المستقبلات الذوقية:

١٨ تعد الخلايا الحسية الذوقية من المستقبلات الثابتة، لماذا؟

تتوضع الخلايا الحسية الذوقية في بنى تسمى البراعم الذوقية، توجد البراعم الذوقية ضمن بروزات على السطح العلوي للسان تسمى: الخليمات اللسانية، كما يوجد براعم ذوقية خارج الخليمات في البلعوم.

أوظف الأشكال: ▼ من خلال الشكل الآتي أتعرف بنية البرعم الذوقي:



أضيف إلى معلوماتي

يحتوي البرعم الذوقي (40 إلى 100) خلية حسية ذوقية (عصرها قصير 10 أيام فقط). تنقسم الخلايا القاعدية في البرعم الذوقي، فتعطي خلايا انتقالية تقوم بدورها بخلايا استقبالية قبل أن تتحول إلى خلايا حسية ذوقية.

اضغ فرضية: عندما أتذوق رشقة من عصير الليمون المحلى بالسكر، ما العوامل المسببة لزوال استقطب غشاء الخلية الحسية؟

الاحظ واحلل: ▼ آلية عمل المستقبلات الذوقية:



هل تعلم

- عند شرب الماء تتسببه مستقبلات ذوقية في البلعوم، وترسل السيالات العصبية إلى الوطاء الذي ينظم توازن الماء في الجسم عن طريق إفراز الحامض المضاد للإبالة (ADH).
- يؤدي اجتماع الإحساس الشمي مع الإحساس الذوقي لمساعدة ما إلى ما يسمى الذقبة.

آلية عمل المستقبلات الذوقية

قوت الملح والصلح: إن التثاثر شوارد الصوديوم لتعاقب المشبعة أو شوارد الهيدروجين لتعاقب الحمضية إلى داخل الخلية الحسية الذوقية يؤدي إلى زوال استقطب غشاءها.

مستقبلات الحلو والمر: ترتبط المسكاة ذات الطعم الحلو والمر بمستقبل نوعي في الغشاء مما يؤدي إلى تنشيط بروتين G مرتبط بمستقبل يسبب زوال استقطب غشاء الخلية الحسية الذوقية.

بعاز زوال الاستقطب الخلية الحسية الذوقية على تحرير النواقل الحسية الكيميائية وإثارة صون عمل في نهايات الأصب العصبية الذوقية التي تنقلها على شكل رسالة عصبية إلى المركز العصبي المتخصص.

هل تعلم

- عند شرب الماء تتسببه مستقبلات ذوقية في البلعوم، وترسل السيالات العصبية إلى الوطاء الذي ينظم توازن الماء في الجسم عن طريق إفراز الحامض المضاد للإبالة (ADH).
- يؤدي اجتماع الإحساس الشمي مع الإحساس الذوقي لمساعدة ما إلى ما يسمى الذقبة.

آلية عمل المستقبلات الذوقية

قوت الملح والصلح: إن التثاثر شوارد الصوديوم لتعاقب المشبعة أو شوارد الهيدروجين لتعاقب الحمضية إلى داخل الخلية الحسية الذوقية يؤدي إلى زوال استقطب غشاءها.

مستقبلات الحلو والمر: ترتبط المسكاة ذات الطعم الحلو والمر بمستقبل نوعي في الغشاء مما يؤدي إلى تنشيط بروتين G مرتبط بمستقبل يسبب زوال استقطب غشاء الخلية الحسية الذوقية.

بعاز زوال الاستقطب الخلية الحسية الذوقية على تحرير النواقل الحسية الكيميائية وإثارة صون عمل في نهايات الأصب العصبية الذوقية التي تنقلها على شكل رسالة عصبية إلى المركز العصبي المتخصص.



النمل الآسيوي

إشارات فيرمونية (فيرمونات): مواد كيميائية تفرز من كائن وتنقل بواسطة البيئة لتؤثر في كائن آخر.
يوجد ثلاثة أنواع من الغدد في الجسم:

1. غدد خارجية الإفراز (الغدة العرقية).
2. غدد داخلية الإفراز أو الغدد الصم (الدرقية).
3. غدد مختلطة (البنكرياس).

العلاقة بين الجهاز العصبي والغدد الصم:

تتشارك الغدد الصم مع الجهاز العصبي في التحكم بوظائف الجسم المختلفة والمحافظة على الاستتباب مع وجود فروق بين عمل كل منها.

ألاحظ الجدول الآتي الذي يوضح مقارنة بين التتميقين العصبي والهرموني وأكمل الفراغات بالعبارات المناسبة:

وجه المقارنة	التتميق العصبي	التتميق الهرموني
السرعة ومدة التأثير	بطيء وطويل الأمد.
الإشارة (الرسالة)	مواد كيميائية (هرمونات) تنتقل عن طريق الدم واللمف.

أضيف إلى معلوماتي

- يتشارك الجهازان العصبي والهرموني في العديد من الرسائل الكيميائية فالأدرينالين والنورأدرينالين يعذآن من الهرمونات عندما يتم تحريرهما إلى مجرى الدم، ويعذآن من النواقل العصبية عندما يتم تحريرهما في المشابك.



النمل الآسيوي

إشارات فيرمونية (فيرمونات): مواد كيميائية تفرز من كائن وتنقل بواسطة البيئة لتؤثر في كائن آخر من نفس النوع.
يوجد ثلاثة أنواع من الغدد في الجسم:

1. غدد خارجية الإفراز (الغدة العرقية).
2. غدد داخلية الإفراز أو الغدد الصم (الدرقية).
3. غدد مختلطة (البنكرياس).

العلاقة بين الجهاز العصبي والغدد الصم:

تتشارك الغدد الصم مع الجهاز العصبي في التحكم بوظائف الجسم المختلفة والمحافظة على الاستتباب مع وجود فروق بين عمل كل منها.

ألاحظ الجدول الآتي الذي يوضح مقارنة بين التتميقين العصبي والهرموني وأكمل الفراغات بالعبارات المناسبة:

وجه المقارنة	التتميق العصبي	التتميق الهرموني
السرعة ومدة التأثير	بطيء وطويل الأمد.
الإشارة (الرسالة)	مواد كيميائية (هرمونات) تنتقل عن طريق الدم واللمف.

أضيف إلى معلوماتي

- يتشارك الجهازان العصبي والهرموني في العديد من الرسائل الكيميائية فالأدرينالين والنورأدرينالين يعذآن من الهرمونات عندما يتم تحريرهما إلى مجرى الدم، ويعذآن من النواقل العصبية عندما يتم تحريرهما في المشابك.



أولاً: اختار الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

1. يتولد الإحساس باللون الأبيض عند تيبه:
 - أ- نوع واحد من المخاريط
 - ب- نوعين من المخاريط
 - ج- أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية
 - د- أنواع المخاريط الثلاثة بنسب مختلفة
2. اقتراب الجسم المرئي من العين يسبب:
 - أ- نقص القوة الكاسرة
 - ب- زيادة تحذب الجسم البلوري
 - ج- زيادة البعد المحرقى
 - د- استرخاء الألياف العضلية الدائرية في الجسم الهدبي

ثانياً: اعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. تبقى قنوات الصوديوم مفتوحة في غشاء القطعة الخارجية للعصية في أثناء الراحة (الظلام)
2. يصبح الجسم البلوري غير نفوذ للضوء عند الإصابة بالساد.
3. يتشكل للجسم المرئي خيال مقلوب ومعكوس على الشبكية.
4. تختلف حساسية أنواع المخاريط لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.

ثالثاً: أضع كلمة (صح) في نهاية كل عبارة تتوافق مع توقف تحرير النواقل العصبية المثبطة من العصية:

- أ- ارتباط مركب cGMP بقنوات الصوديوم.
- ب- نشاط أنزيم فوسفو دي استيراز.
- ج- استقطاب غشاء القطعة الخارجية 40mV-.
- د- توقف دخول شوارد Na⁺ إلى القطعة الخارجية.

أولاً: اختار الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

1. يتولد الإحساس باللون الأبيض عند تيبه:
 - أ- نوع واحد من المخاريط
 - ب- نوعين من المخاريط
 - ج- أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية
 - د- أنواع المخاريط الثلاثة بنسب مختلفة
2. اقتراب الجسم المرئي من العين يسبب:
 - أ- نقص القوة الكاسرة
 - ب- زيادة تحذب الجسم البلوري
 - ج- زيادة البعد المحرقى
 - د- استرخاء الألياف العضلية الدائرية في الجسم الهدبي

ثانياً: اعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:



1. تبقى قنوات الصوديوم مفتوحة في غشاء القطعة الخارجية للعصية في أثناء الراحة (الظلام)
2. يصبح الجسم البلوري غير نفوذ للضوء عند الإصابة بالساد.
3. يتشكل للجسم المرئي خيالاً مقلوباً ومعكوساً على الشبكية.
4. تختلف حساسية أنواع المخاريط لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.

ثالثاً: أضع كلمة (صح) في نهاية كل عبارة تتوافق مع توقف تحرير النواقل العصبية المثبطة من العصية:

- أ- ارتباط مركب cGMP بقنوات الصوديوم.
- ب- نشاط أنزيم فوسفو دي استيراز.
- ج- استقطاب غشاء القطعة الخارجية 40mV-.
- د- توقف دخول شوارد Na⁺ إلى القطعة الخارجية.



09552018402





اللون	النسبة المئوية للاختصاص		
	مخاريط الأزرق	مخاريط الأخضر	مخاريط الأحمر
بنفسج	0
بنفسج	31
أصفر	0
بنفسج	0	42

ما اللون الذي يتولد عن تبيبه أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية؟

- في شبكية العين ثلاثة أنواع من المخاريط تختلف أصبغتها عن بعضها بنسب الفوتوسين، مما يسبب اختلاف حساسيتها لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.
- يتم الإحساس برؤية لون معين في القرية المخية بعد وصول السيالات العصبية الناتجة عن تبيبه نوع واحد من المخاريط، أو نوعين منها، أو أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متفاوتة.
- يتولد الإحساس برؤية اللون الأبيض عند تبيبه أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية.

استنتج



اللون	النسبة المئوية للاختصاص		
	مخاريط الأزرق	مخاريط الأخضر	مخاريط الأحمر
بنفسج	0
أخضر	31
أصفر	0
بنفسج	0	42

ما اللون الذي يتولد عن تبيبه أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية؟

- في شبكية العين ثلاثة أنواع من المخاريط تختلف أصبغتها عن بعضها بنسب الفوتوسين، مما يسبب اختلاف حساسيتها لأطوال الأمواج الضوئية المختلفة.
- يتم الإحساس برؤية لون معين في القرية المخية بعد وصول السيالات العصبية الناتجة عن تبيبه نوع واحد من المخاريط، أو نوعين منها، أو أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متفاوتة.
- يتولد الإحساس برؤية اللون الأبيض عند تبيبه أنواع المخاريط الثلاثة بنسب متساوية.

استنتج



حالة طبية:
تمثل الصورة 1 رؤية طبيعية للألوان بينما تمثل الصورة 2 رؤية لونية لشخص لديه مشكلة إبصارية، أحاول أن أعرف تلك المشكلة.

أضيف إلى معلوماتي

عسى اللون الأحمر (مرض دالتون) وعسى اللون الأخضر يصيب الذكور أكثر من الإناث؛ لأنّ الجين المرضي متنحى، ومحمول على الصبغي الجنسي X، وليس له مقابل على الصبغي Y، أما مرض ضعف الأزرق فهو حالة وراثية نادرة ناتجة عن مورثة متنحية محمولة على أحد أشعاع الصبغيات الجسمية.



حالة طبية:
تمثل الصورة 1 رؤية طبيعية للألوان بينما تمثل الصورة 2 رؤية لونية لشخص لديه مشكلة إبصارية، أحاول أن أعرف تلك المشكلة.

أضيف إلى معلوماتي

عسى اللون الأحمر (مرض دالتون) وعسى اللون الأخضر يصيب الذكور أكثر من الإناث؛ لأنّ الجين المرضي متنحى، ومحمول على الصبغي الجنسي X، وليس لها مقابل على الصبغي Y، أما مرض ضعف الأزرق فهو حالة وراثية نادرة ناتجة عن مورثة متنحية على أحد أشعاع الصبغيات الجسمية.

4

التنسيق الكيميائي لدى النبات

ألاحظ أن شجر التفاح يزهر في شهر آذار، وتتضح الثمار في شهر آب، وتتساقط الأوراق شتاءً، وهكذا بشكل دائم من كل عام.

كيف يتم ضبط هذه العمليات؟

إن تنظيم العمليات الفيزيولوجية للنبات كالنمو، والانجابات، وعمليات الإزهار، وتثبيت النمو تخضع لتأثير:

- عوامل خارجية (الضوء - الحرارة - الجاذبية الأرضية).
- عوامل داخلية (المورثات - مواد التنسيق النباتية).

مواد التنسيق النباتية:

مركبات عضوية تنتجها بعض الأنسجة النباتية بتركيز ضئيلة جداً، وتنتقل إلى أماكن أخرى غالباً، لتقوم بتأثيرات فيزيولوجية (وظيفية)، ومورفولوجية (شكلية).

أهم مواد التنسيق النباتية:

الأوكسينات - السايبتوكينينات - الجبرلينات - حمض الأبسيسيك - الإيثيلين.

أضيف إل معلومات

- تنتش البذرة لتعطي نباتاً ذاتي التغذية يسمى: بادرة، وقد أجرى العلماء التجارب على بدارات نباتات الفصيلة النجيلية لسهولة العمل مثل: (القمح - الشعير - الشوفان).
- الكوليبوتيل: عند مسود الذروة يحيط بالورقة الأولى لنباتات الفصيلة النجيلية.
- الأغار: مادة جيلاتينية سكرية تستخرج من أحد الطحالب البحرية (محتول مائي).



112

2022 2021

4

التنسيق الكيميائي لدى النبات

ألاحظ أن شجر التفاح يزهر في شهر آذار، وتتضح الثمار في شهر آب، وتتساقط الأوراق شتاءً، وهكذا بشكل دائم من كل عام.

كيف يتم ضبط هذه العمليات؟

إن تنظيم العمليات الفيزيولوجية للنبات كالنمو، والانجابات، وعمليات الإزهار، وتثبيت النمو تخضع لتأثير:

- عوامل خارجية (الضوء - الحرارة - الجاذبية الأرضية).
- عوامل داخلية (المورثات - مواد التنسيق النباتية).

مواد التنسيق النباتية:

مركبات عضوية تنتجها بعض الأنسجة النباتية بتركيز ضئيلة جداً، وتنتقل إلى أماكن أخرى غالباً، لتقوم بتأثيرات فيزيولوجية (وظيفية)، ومورفولوجية (شكلية).

أهم مواد التنسيق النباتية:

الأوكسينات - الجبرلينات - السايبتوكينينات - حمض الأبسيسيك - الإيثيلين.

أضيف إل معلومات

- تنتش البذرة لتعطي نباتاً ذاتي التغذية يسمى: بادرة، وقد أجرى العلماء التجارب على بدارات نباتات الفصيلة النجيلية لسهولة العمل مثل: (القمح - الشعير - الشوفان).
- الكوليبوتيل: عند مسود الذروة يحيط بالورقة الأولى لنباتات الفصيلة النجيلية.
- الأغار: مادة جيلاتينية سكرية تستخرج من أحد الطحالب البحرية (محتول مائي).



112

3

آليات السيطرة على إفراز الغدد الصم

إن درجة تأثير الهرمون تعتمد بشكل أساسي على كميته في الدم، وتحدد الكمية حسب حاجة الجسم لتنفيذ الوظائف المختلفة، والمحافظة على اتزان الوسط الداخلي للجسم، ولذلك توجد حاجة لتنظيم إفراز الهرمونات من الغدد الصم، ويتم ذلك بطرق عدة أهمها التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية، والتنظيم المباشر.

1. التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية:

يتصل الوطاء مع الغدة النخامية بواسطة السويقة النخامية التي تؤمن نوعين من الاتصال:

1. اتصال عصبي بين الوطاء والنخامة الخلفية حيث تفرز أجسام العصبونات الموجودة في الوطاء هرموني (ADH-OXT)، وتنتقل عبر محوار العصبون إلى النخامة الخلفية؛ إذ تتحرر من الأزرار عند الحاجة.
2. اتصال دموي بين الوطاء والنخامة الأمامية عن طريق عوامل الإطلاق.

▼ لاحظ المخطط الآتي الذي يوضح آلية التنظيم عن طريق التلقين الراجع الإيجابي والتلقين الراجع السلبي، ثم أكمل الفراغات المجاورة للمخطط:

1. تلقين راجع إيجابي: زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما تؤدي إلى إفراز أحد عوامل الإطلاق من الوطاء، وهرمون النخامة الأمامية من ثم إفراز هذه الغدة للهرمون في المرحلة الأخيرة.
2. تلقين راجع سلبي: زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما فوق المستوى الطبيعي تؤدي إلى الوطاء، والنخامة الأمامية من إفراز العوامل المطلقة، والهرمون المنبه للغدة فيقل إفراز الغدة لهرمونها، وبالعكس.



109

2022

3

آليات السيطرة على إفراز الغدد الصم

إن درجة تأثير الهرمون تعتمد بشكل أساسي على كميته في الدم، وتحدد الكمية حسب حاجة الجسم لتنفيذ الوظائف المختلفة، والمحافظة على اتزان الوسط الداخلي للجسم، ولذلك توجد حاجة لتنظيم إفراز الهرمونات من الغدد الصم، ويتم ذلك بطرق عدة أهمها التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية، والتنظيم المباشر.

1. التنظيم بواسطة الوطاء والنخامة الأمامية:

يتصل الوطاء مع الغدة النخامية بواسطة السويقة النخامية التي تؤمن نوعين من الاتصال:

1. اتصال عصبي بين الوطاء والنخامة الخلفية حيث تفرز أجسام العصبونات الموجودة في الوطاء هرموني (ADH-OXT)، وتنتقل عبر محوار العصبون إلى النخامة الخلفية؛ إذ تتحرر من الأزرار عند الحاجة.
2. اتصال دموي بين الوطاء والنخامة الأمامية عن طريق عوامل الإطلاق.

▼ لاحظ المخطط الآتي الذي يوضح آلية التنظيم عن طريق التلقين الراجع الإيجابي والتلقين الراجع السلبي، ثم أكمل الفراغات المجاورة للمخطط:

1. تلقين راجع إيجابي: زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما تؤدي إلى إفراز أحد عوامل الإطلاق من الوطاء، وهرمون النخامة الأمامية من ثم إفراز هذه الغدة للهرمون في المرحلة الأخيرة.
2. تلقين راجع سلبي: زيادة كمية الهرمونات المفرزة من غدة ما فوق المستوى الطبيعي تؤدي إلى الوطاء، والنخامة الأمامية من إفراز العوامل المطلقة، والهرمون المنبه للغدة فيقل إفراز الغدة لهرمونها، وبالعكس.



109

2021

3. يساعد المبلاتونين في تنظيم الدورات التكاثرية في بعض الأنواع الحيوانية التي تتميز بوجود فصول تكاثر محددة.

4. كيف تقوم الهرمونات بتنظيم الوظائف الحيوية في الجسم؟

آليات عمل الهرمونات:

تؤثر الهرمونات المفروزة من الغدد الصم في الخلايا التي تمتلك مستقبلات نوعية لهذه الهرمونات.

يؤدي ارتباط الهرمون بمستقبله النوعي إلى تفعيل سلسلة من التفاعلات ضمن الخلية بحيث تؤدي كمية ضئيلة من الهرمون إلى فعل خلوي كبير جداً.

تصنف الهرمونات حسب طبيعتها الكيميائية وموقع مستقبلها في الخلية الهدف إلى:

1. الهرمونات البروتينية والبيبتيدية: توجد مستقبلاتها في الغشاء الخلوي أو على سطحه من مثل هرمونات الوطاء والغدة النخامية وجزر لانغرهانس. لماذا لا تستطيع عبور الغشاء؟

2. الهرمونات الستيرويدية: توجد مستقبلاتها داخل

الهيولى من مثل مستقبلات الهرمونات الجنسية وقشرة الكظر. لماذا تستطيع عبور الغشاء؟

3. الهرمونات الأمينية: توجد مستقبلات هرمونات الدرقية الأمينية T_3 و T_4 داخل النواة.

هل تعلم

الأدرينالين والنورأدرينالين والدوبامين هرمونات أمينية لكن مستقبلها النوعي في الغشاء الهيولي.



3. يساعد المبلاتونين في تنظيم الدورات التكاثرية في بعض الأنواع الحيوانية التي تتميز بوجود فصول تكاثر محددة.

4. كيف تقوم الهرمونات بتنظيم الوظائف الحيوية في الجسم؟

آليات عمل الهرمونات:

تؤثر الهرمونات المفروزة من الغدد الصم في الخلايا التي تمتلك مستقبلات نوعية لهذه الهرمونات.

يؤدي ارتباط الهرمون بمستقبله النوعي إلى تفعيل سلسلة من التفاعلات ضمن الخلية بحيث تؤدي كمية ضئيلة من الهرمون إلى فعل خلوي كبير جداً.

تصنف الهرمونات حسب طبيعتها الكيميائية وموقع مستقبلها في الخلية الهدف إلى:

1. الهرمونات البروتينية والبيبتيدية: توجد مستقبلاتها في الغشاء الخلوي أو على سطحه من مثل هرمونات الوطاء والغدة النخامية وجزر لانغرهانس. لماذا لا تستطيع عبور الغشاء؟


2. الهرمونات الستيرويدية: توجد مستقبلاتها داخل

الهيولى من مثل مستقبلات الهرمونات الجنسية وقشرة الكظر. لماذا تستطيع عبور الغشاء؟

3. الهرمونات الأمينية: توجد مستقبلات هرمونات الدرقية الأمينية T_3 و T_4 داخل النواة.


هل تعلم

الأدرينالين والنورأدرينالين والدوبامين هرمونات أمينية لكن مستقبلها النوعي في الغشاء الهيولي.




أولاً: آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية:

الأحظ الشكل الأتى والخص مراحل تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية.



أولاً: آلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية:

الأحظ الشكل الأتى والخص مراحل تأثير الهرمونات ذات المستقبلات الغشائية.




تكاثر الفيروسات

تنتشر الفيروسات بأعداد هائلة في كل مكان حتى في طبقات الغلاف الجوي العليا. مثلاً فيروس آكل الجراثيم، يقدر عدد وحداته في العالم المائي ما يقارب 10^{30} وحدة فيروسية.

❗ فما الفيروسات؟ وكيف تتكاثر؟

الاحظ وأقارن: ❖ الاحظ الأشكال الأتية للفيروسات، وأجيب عن الأسئلة التي تلي الأشكال:



❗ أحد البنى المشتركة بين مختلف الأنواع الفيروسية.

❗ أميّر العادة الوراثية في كل من الفيروسات أعلاه.

Virus كلمة لاتينية تعني: السم، تعّد بنى لا خلوية لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني، مجبرة على التطفل الداخلي؛ لخلوها من الأنظمة الاستقلالية، وهي تسبب عدداً كبيراً من الأمراض، وتؤدي إلى ظهور صفات جديدة للكائنات المضيفة.

يتكوّن الفيروس من:

- محفظة بروتينية (كاسيد) مكوّن من: وحدات بروتينية، ويحاط بغلاف من طبيعة دسمة تختترقه بروتينات الغلاف في الفيروسات المغلفة.
- اللب الحاوي مادة وراثية (DNA أو RNA): يحتوي الفيروس على أحد الحمضين النوويين فقط، بينما في الخلايا الحية نجد كلا الحمضين معاً.




تكاثر الفيروسات

تنتشر الفيروسات بأعداد هائلة في كل مكان حتى في طبقات الغلاف الجوي العليا. مثلاً فيروس آكل الجراثيم، يقدر عدد وحداته في العالم المائي ما يقارب 10^{30} وحدة فيروسية. **تنتج كتلة خضراوات الجراثيم مجموعة مليارات على نحو ثلاثة أضعاف كتلة البشر مجتمعين.**

❗ فما الفيروسات؟ وكيف تتكاثر؟

الاحظ وأقارن: ❖ الاحظ الأشكال الأتية للفيروسات، وأجيب عن الأسئلة التي تلي الأشكال:



❗ أحد البنى المشتركة بين مختلف الأنواع الفيروسية.

❗ أميّر العادة الوراثية في كل من الفيروسات أعلاه.

Virus كلمة لاتينية تعني: السم، تعّد بنى لا خلوية لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني، مجبرة على التطفل الداخلي؛ لخلوها من الأنظمة الاستقلالية، وهي تسبب عدداً كبيراً من الأمراض، وتؤدي إلى ظهور صفات جديدة للكائنات المضيفة.

يتكوّن الفيروس من:

- محفظة بروتينية (كاسيد) مكوّن من: وحدات بروتينية، ويحاط بغلاف من طبيعة دسمة تختترقه بروتينات الغلاف في الفيروسات المغلفة.
- اللب الحاوي مادة وراثية (DNA أو RNA): يحتوي الفيروس على أحد الحمضين النوويين فقط، بينما في الخلايا الحية نجد كلا الحمضين معاً.



التقويم النهائي

أولاً: ما المقصود بكل مما يأتي: الأوكسينات - التربيع.

ثانياً: اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. إحدى مواد التمسيق النباتية الآتية مسؤولة عن عملية الإزهار:

أ- الأوكسينات. ب- الجبريلينات. ج- حمض الأبسيسيك. د- الإيثيلين.

2. إحدى هذه المواد مسؤولة عن إنتاش البذور:

أ- الأوكسينات. ب- الجبريلينات. ج- حمض الأبسيسيك. د- الإيثيلين.

ثالثاً: أعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

أ- الجذور الموضوعة أفقياً تنمو نحو الأسفل.

ب- استطالة الخلايا النباتية بتأثير الأوكسينات غير قابلة للعكس.

ج- لا تحوي ثمار الموز بذوراً.

د- يختلف تركيز الأوكسين على طرفي الكوليوبتيل المعرض لضوء جانبي.

التقويم النهائي

أولاً: ما المقصود بكل مما يأتي: الأوكسينات - التربيع.

ثانياً: اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. إحدى مواد التمسيق النباتية الآتية مسؤولة عن تنشيط عملية الإزهار:

أ- الأوكسينات. ب- الجبريلينات. ج- حمض الأبسيسيك. د- الإيثيلين.

2. إحدى هذه المواد مسؤولة عن تنشيط إنتاش البذور:

أ- الأوكسينات. ب- الجبريلينات. ج- حمض الأبسيسيك. د- الإيثيلين.

3. تقوم قشرة الكنظر لدى الإنسان بإفراز هرمون الكورتيزول استجابة للتوتر الذي يحصل خلال مدة زمنية طويلة، بينما يغلغ النبات مسامته في أثناء الجفاف وإنتاج:

أ- السايتركينينات. ب- حمض الأبسيسيك. ج- الإيثيلين. د- الأوكسينات.

4. مادة تنسيق نباتية تقوم بتأخير شيخوخة الأوراق:

أ- الجبريلينات. ب- الأوكسينات. ج- السايتركينينات. د- حمض الأبسيسيك.

ثالثاً: أعطى تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

أ- الجذور الموضوعة أفقياً تنمو نحو الأسفل.

ب- استطالة الخلايا النباتية بتأثير الأوكسينات غير قابلة للعكس.

ج- لا تحوي ثمار الموز بذوراً.

د- يختلف تركيز الأوكسين على طرفي الكوليوبتيل المعرض لضوء جانبي.



0955208402

1. ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو خلايا الساق واستطالتها في الشكل البياني (أ)؟
2. أحدد التركيز الأمثل لنمو كل من الساق والجذر والبراعم في الشكل البياني (ب).
3. ما تأثير التركيز الأمثل لنمو البراعم على نمو الساق والجذور؟

استنتج

لكل نسيج نباتي تركيز أمثل من الأوكسين للنمو، فالتراكيز المناسبة لنمو الساق تنشط نمو الجذور والبراعم ويعتمد معدل نمو واستطالة خلايا النبات على عاملين:
التركيز المناسب للأوكسين - نوع النسيج النباتي المتأثر.

آلية تأثير الأوكسين على استطالة الخلية النباتية:

▼ لاحظ الصورة الآتية، وأنتبه مراحل استطالة خلية نباتية بتأثير الأوكسينات:



استطالة الخلية النباتية بتأثير الأوكسينات

- عندما يصل الأوكسين إلى الخلية الهدف، تنشط الأوكسينات مضخات البروتون في الغشاء السيتوبلازمي للخلية؛ فتعمل هذه المضخات على ضخ البروتونات من السيتوبلازما إلى الجدار الخلوي.
- ينتج عن ذلك انخفاض درجة (pH) في الجدار الخلوي (وسيط حمضي).
- الوسط الحمضي للجدار ينشط بروتين وتدي (شكل إسفيني)، يعمل على فصل عديدات السكر عن الليفات السيللوز.
- تصبح عديدات السكر معرضة لتأثير أنظيم مفكك يعمل على تقطيع السكريات المتعددة، الرابطة بين ألياف السيللوز؛ فتزداد مرونة الجدار الخلوي.
- يدخل الماء إلى داخل الخلية بتأثير الحلول، وتستطيل الخلية بتأثير الضغط الانتباجي، وتترسب ألياف سيللوز ومواد جدارية جديدة، تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس.

1. ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو خلايا الساق واستطالتها في الشكل البياني (أ)؟
2. أحدد التركيز الأمثل لنمو كل من الساق والجذر والبراعم في الشكل البياني (ب).
3. ما تأثير التركيز الأمثل لنمو البراعم على نمو الساق والجذور؟

استنتج

لكل نسيج نباتي تركيز أمثل من الأوكسين للنمو، فالتراكيز المناسبة لنمو البراعم تنشط نمو الجذور والساق ويعتمد معدل نمو واستطالة خلايا النبات على عاملين:
التركيز المناسب للأوكسين - نوع النسيج النباتي المتأثر.

آلية تأثير الأوكسين على استطالة الخلية النباتية:

▼ لاحظ الصورة الآتية، وأنتبه مراحل استطالة خلية نباتية بتأثير الأوكسينات:




استطالة الخلية النباتية بتأثير الأوكسينات

- عندما يصل الأوكسين إلى الخلية الهدف، تنشط الأوكسينات مضخات البروتون في الغشاء السيتوبلازمي للخلية؛ فتعمل هذه المضخات على ضخ البروتونات من السيتوبلازما إلى الجدار الخلوي.
- ينتج عن ذلك انخفاض درجة (pH) في الجدار الخلوي (وسيط حمضي).
- الوسط الحمضي للجدار ينشط بروتين وتدي (شكل إسفيني)، يعمل على فصل عديدات السكر عن الليفات السيللوز.
- تصبح عديدات السكر معرضة لتأثير أنظيم مفكك يعمل على تقطيع السكريات المتعددة، الرابطة بين ألياف السيللوز؛ فتزداد مرونة الجدار الخلوي.
- يدخل الماء إلى داخل الخلية بتأثير الحلول، وتستطيل الخلية بتأثير الضغط الانتباجي، وتترسب ألياف سيللوز ومواد جدارية جديدة، تجعل استطالة الخلية غير قابلة للعكس.

1 يبدأ التكاثر لدى كثرات الخلايا بخلية واحدة فكيف أصبحت هذه الخلية كأنناً بالغاً عديد الخلايا؟

▼ أنفق في الشكل الآتي الذي يبين كيف ينمو الإنسان، وأستنتج مراحل النمو:



1 مراحل النمو:

1. زيادة عدد الخلايا: عن طريق الانقسام الخيطي.
 2. زيادة حجم الخلايا: عن طريق تركيب المادة الحية.
 3. التمايز الخلوي: التخصص الشكلي والوظيفي للخلايا لتشكيل النسيج والأعضاء المختلفة.
- النمو: هو زيادة في كتلة المادة الحية عن طريق تركيب المواد التي تتكون منها، ولاسيما البروتينات.


الاحظ وأحلل

1 كيف تُتم الكائنات الحية دورة حياتها؟

- ◀ الأخط الشكل المجاور الذي يبين دورة حياة الفطريات والنباتات.
- بم يبدأ كل من الجيلين البوعي والعروسي؟
- ما الصيغة الصبغية لكل منهما؟
- ما نوع الانقسام الذي تنتج عنه:
- أ- الأبواغ الجنسية. ب- الأعراس

1 يبدأ التكاثر لدى كثرات الخلايا بخلية واحدة فكيف أصبحت هذه الخلية كأنناً بالغاً عديد الخلايا؟

▼ أنفق في الشكل الآتي الذي يبين كيف ينمو الإنسان، وأستنتج مراحل النمو:



1 مراحل النمو:

1. زيادة عدد الخلايا: عن طريق الانقسام الخيطي.
 2. زيادة حجم الخلايا: عن طريق تركيب المادة الحية.
 3. التمايز الخلوي: التخصص الشكلي والوظيفي للخلايا لتشكيل النسيج والأعضاء المختلفة.
- النمو: هو زيادة في كتلة المادة الحية عن طريق تركيب المواد التي تتكون منها، ولاسيما البروتينات.

الاحظ وأحلل

1 كيف تُتم الكائنات الحية دورة حياتها؟


- ◀ الأخط الشكل المجاور الذي يبين دورة حياة الفطريات والنباتات.
- بم يبدأ كل من الجيلين البوعي والعروسي؟
- ما الصيغة الصبغية لكل منهما؟
- ما نوع الانقسام الذي تنتج عنه الأبواغ الجنسية؟



التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. تتصف الفيروسات بمجموعة من الصفات التي تميزها، إحدى العبارات الآتية لا تصف الفيروسات بدقة:
 - أ- أكثر عدداً من جميع الكائنات الحية.
 - ب- لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني.
 - ج - خالية من الأنظيمات.
 - د- طفيليات إجبارية داخلية.
2. تتكون الفيروسات من عدد من البنى التي تتشابه بين جميع الأنواع الفيروسية، وقد يختص بعضها ببنى لا توجد لدى غيرها من الفيروسات، إحدى الأوصاف العلمية الآتية صحيحة في الفيروسات.
 - أ- تحتوي جميع الفيروسات على غلاف خارجي من طبيعة دسمة.
 - ب- تتألف الوحيدة البروتينية من أجزاء صغيرة تسمى: كاسيدات.
 - ج- الـ DNA هو المادة الوراثية لجميع أنواع الفيروس.
 - د- تساعد بروتينات غلاف الفيروس على الارتباط بسطح الخلية المضيفة.
3. يعد فيروس أكل الجراثيم من أشهر الفيروسات، وأكثرها دراسة من الباحثين إن كان من حيث البنية أو دورة التكاثر، إحدى العبارات العلمية الآتية لا تصح صحيحة فيما يخص فيروس أكل الجراثيم.
 - أ- تنتج في دورة التحلل فيروسات جديدة، وتطلق خارج الخلية المضيفة.
 - ب- يندمج RNA الفيروسي مع المادة الوراثية للخلية المضيفة في دورة الاندماج.
 - ج- يمكن أن ينتقل الفيروس من دورة الاندماج إلى دورة التحلل.
 - د- يتم تفكيك الخلية الجرثومية في دورة التحلل.
4. يوضح الشكل المجاور بنية فيروس الإيدز، أي الترتيبات الآتية يوافق الأرقام المحددة على الشكل؟
 - أ- 1 كاسيد، 2 أنظيم، 3 غلاف بروتيني، 4 RNA
 - ب- 1 غلاف ذو طبيعة دسمة، 2 كاسيد، 3 RNA، 4 أنظيم
 - ج- 1 غلاف ذو طبيعة دسمة، 2 كاسيد، 3 أنظيم، 4 RNA
 - د- 1 غلاف بروتيني، 2 كاسيد، 3 أنظيم، 4 RNA



ثانياً: أرتب كلاً مما يأتي:


- أ- مراحل دورة التحلل لتكاثر فيروس أكل الجراثيم.
- ب- مراحل تكاثر فيروس الإيدز بدءاً من تضاعف DNA الفيروسي، حتى تبرعم الفيروس خارج الخلية المضيفة.

ثالثاً: أرسم شكلاً يمثل فيروس أكل الجراثيم، وأضع المسميات المناسبة عليه.

التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. تتصف الفيروسات بمجموعة من الصفات التي تميزها، إحدى العبارات الآتية لا تصف الفيروسات بدقة:
 - أ- أكثر عدداً من جميع الكائنات الحية.
 - ب- لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني.
 - ج - خالية من الأنظيمات.
 - د- طفيليات إجبارية داخلية.
2. تتكون الفيروسات من عدد من البنى التي تتشابه بين جميع الأنواع الفيروسية، وقد يختص بعضها ببنى لا توجد لدى غيرها من الفيروسات، إحدى الأوصاف العلمية الآتية صحيحة في الفيروسات.
 - أ- تحتوي جميع الفيروسات على غلاف خارجي من طبيعة دسمة.
 - ب- تتألف الوحيدة البروتينية من أجزاء صغيرة تسمى: كاسيدات.
 - ج- الـ DNA هو المادة الوراثية لجميع أنواع الفيروس.
 - د- تساعد بروتينات غلاف الفيروس على الارتباط بسطح الخلية المضيفة.
3. يعد فيروس أكل الجراثيم من أشهر الفيروسات، وأكثرها دراسة من الباحثين إن كان من حيث البنية أو دورة التكاثر، إحدى العبارات العلمية الآتية لا تصح صحيحة فيما يخص فيروس أكل الجراثيم.
 - أ- تنتج في دورة التحلل فيروسات جديدة، وتطلق خارج الخلية المضيفة.
 - ب- يندمج RNA الفيروسي مع المادة الوراثية للخلية المضيفة في دورة الاندماج.
 - ج- يمكن أن ينتقل الفيروس من دورة الاندماج إلى دورة التحلل.
 - د- يتم تفكيك الخلية الجرثومية في دورة التحلل.
4. يوضح الشكل المجاور بنية فيروس الإيدز، أي الترتيبات الآتية يوافق الأرقام المحددة على الشكل؟
 - أ- 1 كاسيد، 2 أنظيم، 3 غلاف بروتيني، 4 RNA
 - ب- 1 غلاف ذو طبيعة دسمة، 2 كاسيد، 3 RNA، 4 أنظيم
 - ج- 1 غلاف ذو طبيعة دسمة، 2 كاسيد، 3 أنظيم، 4 RNA
 - د- 1 غلاف بروتيني، 2 كاسيد، 3 أنظيم، 4 RNA



ثانياً: أرتب كلاً مما يأتي:



- أ- مراحل دورة التحلل لتكاثر فيروس أكل الجراثيم.
- ب- مراحل تكاثر فيروس الإيدز بدءاً من تضاعف DNA الفيروسي، حتى تبرعم الفيروس خارج الخلية المضيفة.

ثالثاً: أرسم شكلاً يمثل فيروس أكل الجراثيم، وأضع المسميات المناسبة عليه.

▲ بالاستعانة بالشكل السابق، أجب عن الأسئلة الآتية:

- أرتب مراحل تكاثر فيروس الإنز.
 - أستنتج وظيفة أنظيم النسخ التعاكسي.
 - كيف يتحرر فيروس الإنز من الخلايا المضيفة، وأقارن ذلك مع تحرر فيروس أكل الجرثيم.
 - أذكر ما الخلايا التي يهاجمها فيروس الإنز؟ وماذا ينتج عن ذلك؟
- تعرض أجسامنا للعديد من الأمراض، وقسم منها سببه الفيروسات؛ لتعرف بعض الأمراض الفيروسية.

▼ ادقق في الشكل الآتي الذي يبين مرضين شائعين، وأجب عن الأسئلة الآتية:

الزكام (الرشح)	الإنفلونزا (الكريپ)
التهاب الحلق	سعال جاف، التهاب رئوي
سيلان الأنف	الآم في العضلات والشعور بالوهن
اليوم الثالث	ارتفاع حرارة الجسم والإحساس بالقشعريرة
اليوم الثاني	
اليوم الأول للعدوى لا تظهر أعراض	
	
الفيروس الأنفي من أشهر العوامل المسببة للمرض	فيروس الإنفلونزا

طرائق العدوى: السعال والعطس والتعاس المباشر مع إفرازات الجهاز التنفسي للمصاب

■ أقرن بين مرض الإنفلونزا والرشح من حيث: العامل المعرض، الأعراض، طرائق العدوى.

هل تعلم

فيروس كورونا (COVID-19): من الفيروسات المغلفة، يحتوي على سلسلة من الـ RNA يتسبب بمرض الملارمة التنفسية الحادة، ومدة حضانة الفيروس حوالي ١٤ يوم.

أعراضه: ارتفاع حرارة، سعال جاف، **العطس** ضيق التنفس، سيلان مخاط من الأنف، التهاب رئوي شديد.

الوقاية: غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، تجنب لمس العينين والأنف والفم في حال ملامسة اليد لسطح ما.

▲ بالاستعانة بالشكل السابق، أجب عن الأسئلة الآتية:

- أرتب مراحل تكاثر فيروس الإنز.
 - أستنتج وظيفة أنظيم النسخ التعاكسي.
 - كيف يتحرر فيروس الإنز من الخلايا المضيفة، وأقارن ذلك مع تحرر فيروس أكل الجرثيم.
 - أذكر ما الخلايا التي يهاجمها فيروس الإنز؟ وماذا ينتج عن ذلك؟
- تعرض أجسامنا للعديد من الأمراض، وقسم منها سببه الفيروسات؛ لتعرف بعض الأمراض الفيروسية.

▼ ادقق في الشكل الآتي الذي يبين مرضين شائعين، وأجب عن الأسئلة الآتية:

الزكام (الرشح)	الإنفلونزا (الكريپ)
التهاب الحلق	سعال جاف، التهاب رئوي
سيلان الأنف	الآم في العضلات والشعور بالوهن
اليوم الثالث	ارتفاع حرارة الجسم والإحساس بالقشعريرة
اليوم الثاني	
اليوم الأول للعدوى لا تظهر أعراض	
	
الفيروس الأنفي من أشهر العوامل المسببة للمرض	فيروس الإنفلونزا

طرائق العدوى: السعال والعطس والتعاس المباشر مع إفرازات الجهاز التنفسي للمصاب

■ أقرن بين مرض الإنفلونزا والرشح من حيث: العامل المعرض، الأعراض، طرائق العدوى.

هل تعلم

فيروس كورونا (COVID-19): من الفيروسات المغلفة، يحتوي على سلسلة من الـ RNA يتسبب بمرض الملارمة التنفسية الحادة، ومدة حضانة الفيروس حوالي ١٤ يوم.

أعراضه: ارتفاع حرارة، سعال جاف، ضيق التنفس، سيلان مخاط من الأنف، التهاب رئوي شديد.


الوقاية: غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، تجنب لمس العينين والأنف والفم في حال ملامسة اليد لسطح ما.



نقل النوى والاستنساخ:

هل سمعت عن الاستنساخ؟ ما مفهومه وما ألياته؟

1. استنساخ الأبقار عالية الجودة: ▼ الأخط المخطط الآتي وأجيب عن الأسئلة:



أحلل واصنف:

1 ما مصدر النواة في الحالة السابقة؟

فسر: الكائن الناتج في عمليات الاستنساخ يشابه الكائن مصدر النواة دائماً.

2. استنساخ النعجة دولي:

كيف تم إنتاج النعجة دولي؟


4 لاحظ الشكل المجاور، وأنتبه مراحل استنساخ النعجة دولي، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

- أعدد الصيغة الصبغية (2n أو 1n) لكل من خلايا الضرع والبويضة.
- ما العامل الذي سبب اندماج نواة خلية الضرع مع البويضة عديمة النواة؟
- لماذا أثار استنساخ النعجة دولي ضجة عالمية؟
- ما الفائدة المتوقعة من مثل هذه التجارب؟

نقل النوى والاستنساخ:

هل سمعت عن الاستنساخ؟ ما مفهومه وما ألياته؟

1. استنساخ الأبقار عالية الجودة: ▼ الأخط المخطط الآتي وأجيب عن الأسئلة:



أحلل واصنف:

1 ما مصدر النواة في الحالة السابقة؟

فسر: الكائن الناتج في عمليات الاستنساخ يشابه الكائن مصدر النواة دائماً.

2. استنساخ النعجة دولي:

كيف تم إنتاج النعجة دولي؟

4 لاحظ الشكل المجاور، وأنتبه مراحل استنساخ النعجة دولي، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

- أعدد الصيغة الصبغية (2n أو 1n) لكل من خلايا الضرع والبويضة.
- ما العامل الذي سبب اندماج نواة خلية الضرع مع البويضة عديمة النواة؟
- لماذا أثار استنساخ النعجة دولي ضجة عالمية؟
- ما الفائدة المتوقعة من مثل هذه التجارب؟



جورج نعمة

0955220402

4


التكاثر لدى الجراثيم والفطريات

أصيب زميلي بذات الرئة أخيره الطيب أن الالتهاب الجرثومي انتشر بسرعة داخل الرئتين بعد التقاطه العدوى من شخص مريض. وتساءل كيف زادت كمية الجراثيم التي دخلت إلى الرئتين مع الشهيق إلى كمية هائلة انتشرت في معظم الرئتين خلال يومين فقط؟

التكاثر لدى الجراثيم:

1. الانشطار الثنائي:

▼ لاحظ الشكل الاتي الذي يوضح الانشطار الثنائي لدى الجراثيم، وأجيب عن الأسئلة:



- للخيوط البروتينية دور في هجرة الصغيين إلى طرفي الخلية في أثناء انقسامها من المنتصف.

استنتج
يؤدي الانشطار الثنائي إلى
الزيادة العددية السريعة
للجراثيم.

- ما وظيفة الجسم الوسيط؟
- ما وجه التماثل بين الخلايا الناتجة والخلية الأصل؟ ولماذا؟

4


التكاثر لدى الجراثيم والفطريات

أصيب زميلي بذات الرئة أخيره الطيب أن الالتهاب الجرثومي انتشر بسرعة داخل الرئتين بعد التقاطه العدوى من شخص مريض. وتساءل كيف زادت كمية الجراثيم التي دخلت إلى الرئتين مع الشهيق إلى كمية هائلة انتشرت في معظم الرئتين خلال يومين فقط؟

التكاثر لدى الجراثيم:

1. الانشطار الثنائي:

▼ لاحظ الشكل الاتي الذي يوضح الانشطار الثنائي لدى الجراثيم، وأجيب عن الأسئلة:



استنتج
يؤدي الانشطار الثنائي إلى
الزيادة العددية السريعة
للجراثيم.

- ما وظيفة الجسم الوسيط؟
- ما وجه التماثل بين الخلايا الناتجة والخلية الأصل؟ ولماذا؟

تتكون حبة الطلع الناضجة من:

- غلاف خارجي ثخين متقشر.
- غلاف داخلي رقيق سيللوزي.
- كيسين هوائيين.
- خلية توالدية In.
- خلية إعاشية (خلية الأنبوب الطلعي) In.
- خليتين مساعدتين In.



حبة طلع ناضجة

ثانياً: المخروط المؤنث

الأحظ الصور الآتية والتي تمثل مراحل مختلفة من نمو المخاريط المؤنثة.

كل حبة طلع ناضجة تمثل نباتاً عروسياً متكراً In.



مخروط قتي

مخروط السنة الثانية

المخروط بعد الإخصاب

مهارة التحليل والتركيب

مِم يتألف المخروط المؤنث القتي؟

أُنظر إلى الشكل المجاور الذي يمثل مقطعاً طولياً في مخروط مؤنث قتي، واستنتج مكوناته.

يتألف المخروط المؤنث القتي من محور مركزي يرتكز عليه بشكل لولبي عدد من الأزهار الأنثوية، والتي يتألف كل منها من حرشفة تمثل خباءً مفتوحاً، وعلى سطحها العلوي بذيرتان عاريتان وأسفل كل حرشفة قنابة.



مقطع طولى في مخروط مؤنث قتي



حبة طلع ناضجة

تتكون حبة الطلع الناضجة من:

- غلاف خارجي ثخين متقشر.
- غلاف داخلي رقيق سيللوزي.
- خليتين مساعدتين In.
- خلية توالدية In.
- خلية إعاشية (خلية الأنبوب الطلعي) In.
- كيسين هوائيين.

ثانياً: المخروط المؤنث

الأحظ الصور الآتية والتي تمثل مراحل مختلفة من نمو المخاريط المؤنثة.



مخروط قتي

مخروط السنة الثانية

المخروط بعد الإخصاب

مهارة التحليل والتركيب

مِم يتألف المخروط المؤنث القتي؟

أُنظر إلى الشكل المجاور الذي يمثل مقطعاً طولياً في مخروط مؤنث قتي، واستنتج مكوناته.

يتألف المخروط المؤنث القتي من محور مركزي يرتكز عليه بشكل لولبي عدد من الأزهار الأنثوية، والتي يتألف كل منها من حرشفة تمثل خباءً مفتوحاً، وعلى سطحها العلوي بذيرتان عاريتان وأسفل كل حرشفة قنابة.



مقطع طولى في مخروط مؤنث قتي




• ما أقسام الزهرة الأنثوية؟

• لماذا يعد المخروط المونث مجموعة أزهار؟

• كيف تتحول البذيرة الفتية إلى بذيرة ناضجة؟

▼ لاحظ الشكل الآتي الذي يمثل التغيرات التي تطرأ على البذيرة الفتية في أثناء تحولها إلى بذيرة ناضجة، وأكمل النص الذي يليه بالمفاهيم العلمية المناسبة:



بذيرة فتية تحوي بداخلها خلية أم للابواغ الكبيرة $2n$ في وسط النوسيل.

بذيرة ناضجة بداخلها خلية أم للابواغ الكبيرة $2n$ وتنتج أربع أبواغ $1n$ تتلقى نسيج الإندوسيرم $1n$.

بذيرة ناضجة بداخلها إندوسيرم وأرحام $1n$.

توجد البذيرة الفتية على السطح للحرشفة، وتتألف من تحيط بنسيج مغذ يدعى:

..... $2n$ ، وسطه خلية أم للابواغ الكبيرة $2n$ ، تنقسم انقسام منصف فينتج أربع خلايا $1n$ تدعى:

..... الكبيرة تتلاشى منها وتبقى واحدة، البعيدة عن الكوة تنقسم انقسامات

عديدة، وتعطي نسيج مغذ يدعى ثم تدخل البذيرة حالة سبات حتى ربيع السنة التالية فتتشكل

بداخلها من تمايز بعض خلايا الإندوسيرم $1n$.

يتألف الرحم من عنق ووطن في داخله عروس أنثوية $1n$.

• كيف تتشكل البذور والشمار في الصنوبر؟

• ما مراحل الإلقاح؟


• استنتج
الإنديوسيرم والأرحام $1n$ تمثل
النبات العروسي المونث.
• البذيرة الناضجة تحوي أرحاماً.

• ما أقسام الزهرة الأنثوية؟

• لماذا يعد المخروط المونث مجموعة أزهار؟

• كيف تتحول البذيرة الفتية إلى بذيرة ناضجة؟

▼ لاحظ الشكل الآتي الذي يمثل التغيرات التي تطرأ على البذيرة الفتية في أثناء تحولها إلى بذيرة ناضجة، وأكمل النص الذي يليه بالمفاهيم العلمية المناسبة:



بذيرة فتية تحوي بداخلها خلية أم للابواغ الكبيرة $2n$ في وسط النوسيل.

بذيرة ناضجة بداخلها خلية أم للابواغ الكبيرة $2n$ وتنتج أربع أبواغ $1n$ تتلقى نسيج الإندوسيرم $1n$.

بذيرة ناضجة بداخلها إندوسيرم وأرحام $1n$.

توجد البذيرة الفتية على السطح للحرشفة، وتتألف من تحيط بنسيج مغذ يدعى:

..... $2n$ ، وسطه خلية أم للابواغ الكبيرة $2n$ ، تنقسم انقسام منصف فينتج أربع خلايا $1n$ تدعى:

..... الكبيرة تتلاشى منها وتبقى واحدة، البعيدة عن الكوة تنقسم انقسامات

عديدة، وتعطي نسيج مغذ يدعى ثم تدخل البذيرة حالة سبات حتى ربيع السنة التالية فتتشكل

بداخلها من تمايز بعض خلايا الإندوسيرم $1n$.

يتألف الرحم من عنق ووطن في داخله عروس أنثوية $1n$ أو بويضة كروية $1n$.

• كيف تتشكل البذور والشمار في الصنوبر؟

• ما مراحل الإلقاح؟

• استنتج
الإنديوسيرم والأرحام $1n$ تمثل
النبات العروسي المونث.
• البذيرة الناضجة تحوي أرحاماً.

مهارة التحليل والتركيب

1. التابير:

انتقال حبات الطلع الناضجة من الأكياس الطلعية المفتحة في المخروط المذكر بواسطة الرياح، إذ تمكنها الأكياس الهوائية من الطيران إلى كوى البذيرات الفتية الموجودة في المخروط المؤنث الفتى.

تفرز الكوة مادة لاصقة تعمل على لصق حبات الطلع، كما يفرز سطح النوسيل قطرة اللقاح التي تسحب حبات الطلع إلى الحجرة الطلعية.

2. إنتاش حبة الطلع:

أ. لاحظ الشكل المجاور، وأجيب عن الأسئلة الآتية:

1. ما النسيج الذي تلامسه حبة الطلع بعد اجتيازها الكوة ووصولها للحجرة الطلعية؟

2. مم ينشأ الأنبوب الطلعي؟ وأين ينغرس؟

3. لماذا يتوقف الأنبوب الطلعي عن النمو لمدة عام بعد اختراقه للنسيج النوسيل في البذيرة الفتية؟

4. وفي الربيع التالي يستأنف نموه؛ ليصل إلى عنق الرحم؛ إذ تنقسم نواة الخلية التوالدية في حبة الطلع انقساماً خيطياً؛ لتعطي ديتاتين (1n).


3. الإخصاب:

تتمزق نهاية الأنبوب الطلعي عندما تلامس نهايته عنق الرحم، وتحرر منه نواة الخلية الإعاشية والتلقان في بطن الرحم؛ فالتلقفة الأولى تتحد مع البويضة الكروية (1n) مشكلة البيضة الملقحة (2n)، أما التلقفة الثانية ونواة الخلية الإعاشية؛ فتتلاشان.

مراحل تشكل البذرة:

1. تشكل الرشيم:

يحدث الإخصاب في كل الأرحام، وتتطور كل بيضة ملقحة إلى جنين، ولكن البذرة الناضجة لن يبقى فيها إلا جنين واحد.



مهارة التحليل والتركيب

1. التابير:

انتقال حبات الطلع الناضجة من الأكياس الطلعية المفتحة في المخروط المذكر بواسطة الرياح، إذ تمكنها الأكياس الهوائية من الطيران إلى كوى البذيرات الفتية الموجودة في المخروط المؤنث الفتى.

تفرز الكوة مادة لاصقة تعمل على لصق حبات الطلع، كما يفرز سطح النوسيل قطرة اللقاح التي تسحب حبات الطلع إلى الحجرة الطلعية.

2. إنتاش حبة الطلع:

أ. لاحظ الشكل المجاور، وأجيب عن الأسئلة الآتية:

1. ما النسيج الذي تلامسه حبة الطلع بعد اجتيازها الكوة ووصولها للحجرة الطلعية؟

2. مم ينشأ الأنبوب الطلعي؟ وأين ينغرس؟

3. لماذا يتوقف الأنبوب الطلعي عن النمو لمدة عام بعد اختراقه للنسيج النوسيل في البذيرة الفتية؟

4. وفي الربيع التالي يستأنف نموه؛ ليصل إلى عنق الرحم؛ إذ تنقسم نواة الخلية التوالدية في حبة الطلع انقساماً خيطياً؛ لتعطي ديتاتين نباتيين أو عروسين ذكريتين (1n).


3. الإخصاب:

تتمزق نهاية الأنبوب الطلعي عندما تلامس نهايته عنق الرحم، وتحرر منه نواة الخلية الإعاشية والتلقان في بطن الرحم؛ فالتلقفة الأولى تتحد مع البويضة الكروية (1n) مشكلة البيضة الملقحة (2n)، أما التلقفة الثانية ونواة الخلية الإعاشية؛ فتتلاشان.

مراحل تشكل البذرة:

1. تشكل الرشيم:

يحدث الإخصاب في كل الأرحام، وتتطور كل بيضة ملقحة إلى جنين، ولكن البذرة الناضجة لن يبقى فيها إلا جنين واحد.



6

التكاثر الجنسي عند النباتات البذرية (الزهريّة) ثانياً: مغلفات البذور

اعتاد القمام على إنجاز طقوس التلقيح الصناعي للنباتات من دون أن يعرفوا مراحل عملية التكاثر الجنسي بدقة التي تلي عملية تغيير الأزهار المؤنثة بالأزهار المذكرة (التأبير).



◀ لاحظ الصورة السابقة، وانتكّر ما درستّه سابقاً عن الزهرة، والتي تمثل الجهاز التكاثري في النباتات مغلفات البذور.

الاحظ وانتبأ:

تشكّل حبات الطلع:

استخدم الأجهزة بشكل آمن وفعل

الاحظ المنبر وأتمنعه.

نشاط:

- اقوم بعمل مقاطع عرضية في مايز فتية أو ناضجة لبعض الأزهار باستخدام شفرة حادة، مع توخي الحذر الشديد، اتبين عدد الأكياس الطلعية وبنيتها.
- أفحص حبات الطلع بواسطة المجهر بالتكبير الضعيف ثم القوي؛ لآتعرف بنيتها.
- أرسم شكلاً للمنبر القوي والناضج، وأرسم شكلاً لحبة الطلع الناضجة.

158

2022 2021

6

التكاثر الجنسي عند النباتات البذرية (الزهريّة) ثانياً: مغلفات البذور

اعتاد القمام على إنجاز طقوس التلقيح الصناعي للنباتات من دون أن يعرفوا مراحل عملية التكاثر الجنسي بدقة التي تلي عملية تغيير الأزهار المؤنثة بالأزهار المذكرة (التأبير).



◀ لاحظ الصورة السابقة، وانتكّر ما درستّه سابقاً عن الزهرة، والتي تمثل الجهاز التكاثري في النباتات مغلفات البذور.

الاحظ وانتبأ:

تشكّل حبات الطلع:

استخدم الأجهزة بشكل آمن وفعل


الاحظ المنبر وأتمنعه.

نشاط:

- اقوم بعمل مقاطع عرضية في مايز فتية أو ناضجة لبعض الأزهار باستخدام شفرة حادة، مع توخي الحذر الشديد، اتبين عدد الأكياس الطلعية وبنيتها.
- أفحص حبات الطلع بواسطة المجهر بالتكبير الضعيف ثم القوي؛ لآتعرف بنيتها.
- أرسم شكلاً للمنبر القوي والناضج، وأرسم شكلاً لحبة الطلع الناضجة.

158

▼ لاحظ الشكل الآتي، وأجيب عن الأسئلة التي تليه:



- ما عند الأكياس الطلعية في المنبر الفتى؟
- أين توجد الخلية الأم لحبات الطلع؟
- ما نوع الانقسام الذي يطرأ على الخلية الأم لحبات الطلع؟ وماذا ينتج عنه؟
- ماذا نتوقع نتيجة عدم وجود خلايا أم لحبات الطلع في الأكياس الطلعية؟




رسم لتطوُّل لحبة طلع ناضجة

- ينفخ كل كيسين طلعين على بعضهما لتشكل مسكن طلع.
- ينفخ المنبر عند النضج بتأثير الطبقة الآلية في جدار الكيس الطلع.
- تتغذى الخلايا الأم لحبات الطلع من السائل المغذي الناتج عن تهلم الطبقات المغذية في جدار الكيس الطلع.

▼ كيف تتمايز حبة الطلع الفتية إلى حبة طلع ناضجة؟

1. تنقسم كل حبة طلع فتية $1n$ انقساماً خيطياً فتعطي خليتين هما:
 - الخلية الإعاشية ($1n$ الخلية الإنباتية).
 - الخلية التوالدية $1n$.
2. يتضاعف غلاف كل حبة إلى غلافين:
 - غلاف داخلي رقيق سلووزي: يمتد فيما بعد؛ ليشكّل طبقة مستمرة مع جدار الأنبوب الطلع في أثناء إنتاش حبة الطلع.

▼ لاحظ الشكل الآتي، وأجيب عن الأسئلة التي تليه:



- ما عند الأكياس الطلعية في المنبر الفتى؟
- أين توجد الخلية الأم لحبات الطلع؟
- ما نوع الانقسام الذي يطرأ على الخلية الأم لحبات الطلع؟ وماذا ينتج عنه؟
- ماذا نتوقع نتيجة عدم وجود خلايا أم لحبات الطلع في الأكياس الطلعية؟



رسم لتطوُّل لحبة طلع ناضجة

- ينفخ كل كيسين طلعين على بعضهما لتشكل مسكن طلع.
- ينفخ المنبر عند النضج بتأثير الطبقة الآلية في جدار الكيس الطلع.
- تتغذى الخلايا الأم لحبات الطلع من السائل المغذي الناتج عن تهلم الطبقات المغذية في جدار الكيس الطلع.

▼ كيف تتمايز حبة الطلع الفتية إلى حبة طلع ناضجة؟

1. تنقسم كل حبة طلع فتية $1n$ انقساماً خيطياً فتعطي خليتين هما:
 - الخلية الإعاشية ($1n$ الخلية الإنباتية).
 - الخلية التوالدية $1n$.
2. يتضاعف غلاف كل حبة إلى غلافين:
 - غلاف داخلي رقيق سلووزي: يمتد فيما بعد؛ ليشكّل طبقة مستمرة مع جدار الأنبوب الطلع في أثناء إنتاش حبة الطلع.

جورج نعمة
0955220402



تختلف حبات الطلع المنقولة بالهواء عن تلك المنقولة بالحيوانات بأنها جافة، أما التي تنقلها الحشرات فهي لزجة وسريعة الالتصاق.

للتأثير الخلطي أسباب عدة منها:

- اختلاف موعد نضج الأعضاء التكاثرية في الزهرة الخنثوية، فبعضها مبكر الذكورة كما في الشوندن السكري والجزر، وبعضها مبكر الأنوثة كما في الأفوكادو.
- الأزهار منفصلة الجنس.
- اختلاف أطوال الأسدية والأقلام في الزهرة، كما في زهرة الهرجالية.
- حالات عدم التوافق الذاتي، وحالات العقم الذكري لعدم إتمام نمو حبات الطلع، أو فشل تفتح المنبر طبيعياً.



زهرة الهرجالية

2. إنتاش حبة الطلع على الميسم: تنتش حبة الطلع بتحريض كيميائي من الميسم، إذ ينمو لها أنبوب طلعي انطلاقاً من الخلية الإعاشية والغلاف الداخلي لحبة الطلع، تقوم نواة الخلية الإعاشية بتوجيه نمو الأنبوب الطلعي والمحافظة على حيويته حتى يصل إلى كوة البذيرة، في أثناء ذلك تنقسم نواة الخلية التوالدية انقساماً حيطياً مُعطيةً نطفتين نباتيتين (1n).

3. الإخصاب المضاعف: ▼ لاحظ الشكل الآتي، وأجيب عن الأسئلة التي تليه:



تختلف حبات الطلع المنقولة بالهواء عن تلك المنقولة بالحيوانات بأنها جافة، أما التي تنقلها الحشرات فهي لزجة وسريعة الالتصاق.

للتأثير الخلطي أسباب عدة منها:

- اختلاف موعد نضج الأعضاء التكاثرية في الزهرة الخنثوية، فبعضها مبكر الذكورة كما في الشوندن السكري والجزر، وبعضها مبكر الأنوثة كما في الأفوكادو.
- الأزهار منفصلة الجنس.
- اختلاف أطوال الأسدية والأقلام في الزهرة، كما في زهرة الهرجالية.
- حالات عدم التوافق الذاتي، وحالات العقم الذكري لعدم إتمام نمو حبات الطلع، أو فشل تفتح المنبر طبيعياً.



زهرة الهرجالية

2. إنتاش حبة الطلع على الميسم: تنتش حبة الطلع بتحريض كيميائي من الميسم، إذ ينمو لها أنبوب طلعي انطلاقاً من الخلية الإعاشية والغلاف الداخلي لحبة الطلع، تقوم نواة الخلية الإعاشية بتوجيه نمو الأنبوب الطلعي والمحافظة على حيويته حتى يصل إلى كوة البذيرة، في أثناء ذلك تنقسم نواة الخلية التوالدية انقساماً حيطياً مُعطيةً نطفتين نباتيتين (1n).

3. الإخصاب المضاعف: ▼ لاحظ الشكل الآتي، وأجيب عن الأسئلة التي تليه:



رابعاً: ممّ تنشأ كل من التراكيب الآتية: التطفان النباتان - الرشم - الكيس الرشمي.

خامساً: أحدد بدقة مكان وجود كل مما يأتي:

الخلية الأم للكيس الرشمي - البذيرة - نواة الخلية الإعاشية في حبة الطلع المنتشة - السرة (النقير).

سادساً: أين تتشكّل حبات الطلع؟

وضّح بمخطّط مراحل تشكيلها اعتباراً من الخلية الأم لحبات الطلع، ثمّ ارسم حبة طلع ناضجة مع التسميات.

سابعاً: ألاحظ الشكل المجاور، وأجيب عن الأسئلة الآتية:

1. أكتب التسميات للأرقام المحددة على الشكل.

2. أرثب المراحل المجاورة حسب تسلسلها.

3. ما مصير كل من الرقم 8 والرقم 9.

4. ممّ ينشأ الرقم 5؟

ثامناً: ألاحظ الشكل المجاور الذي يمثّل بذيرة مقلوبة، والمطلوب:

1. أكتب التسميات الموافقة للأرقام المحددة على الشكل.

2. أذكر مثلاً عن بذيرة نباتية مقلوبة.

تاسعاً: ارسم شكلاً تخطيطياً لحبة الطلع الناضجة في مغلفات البذور، واضع عليه التسميات.


رابعاً: ممّ تنشأ كل من التراكيب الآتية: التطفان النباتان - الرشم - الكيس الرشمي.

خامساً: أحدد بدقة مكان وجود كل مما يأتي:

الخلية الأم للكيس الرشمي - البذيرة (في مغلفات البذور) - نواة الخلية الإعاشية في حبة الطلع المنتشة - السرة (النقير).

سادساً: أين تتشكّل حبات الطلع؟

وضّح بمخطّط مراحل تشكيلها اعتباراً من الخلية الأم لحبات الطلع، ثمّ ارسم حبة طلع ناضجة مع وضع التسميات.



سابعاً: ألاحظ الشكل المجاور، وأجيب عن الأسئلة الآتية:

1. أكتب التسميات للأرقام المحددة على الشكل.

2. أرثب المراحل المجاورة حسب تسلسلها.

3. ما مصير كل من الرقم 8 والرقم 9.

4. ممّ ينشأ الرقم 5؟

ثامناً: ألاحظ الشكل المجاور الذي يمثّل بذيرة مقلوبة، والمطلوب:

1. أكتب التسميات الموافقة للأرقام المحددة على الشكل.

2. أذكر مثلاً عن بذيرة نباتية مقلوبة.

1. الحويصلان المنويان (الغدد المنوية): تقعان خلف قاعدة المثانة، وتعدان غداً إفرازية نشطة جداً تفرز نحو 60% من السائل المنوي، وتكون مفرزاتها قوية لزجة تحتوي على:
 - تركيز مرتفع من الفركتوز (سكر الفواكه): يتم استقلابه بسهولة من قبل النطاف.
 - البروستاغلاندين: تحدث على تقلص العضلات الملساء في المجرى التكاثري الذكري، وتقلص عضلات المجرى التكاثري الأنثوي في أثناء الاقتران لتأمين وصول النطاف إلى أعلى الرحم.
2. غدة البروستات: غدة عضلية ملساء تحيط بالجزء الأول من الإحليل تنتج:
 - سائلاً حمضياً إلى حد ما حليبياً يشكل (20 - 30%) من حجم السائل المنوي يخلف من لزوجة السائل المنوي، ويحتوي على شوارد الكالسيوم لتنشيط حركة النطاف.
 - مركبات أخرى أهمها: **بلاسمين منوي**: بروتين مضاد للجراثيم يساعد على منع حدوث التهابات المجرى البولي التناسلي لدى الذكور.
3. غدتا كوبر (البصيلتان الإحليلتان): تقعان قرب قاعدة القضيب الذكري، تفرزان مادة مخاطية أساسية تخفف حموضة البول المتبقي في الإحليل.

إضاءة طبية: تتضخم البروستات تلقائياً لدى معظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، ويلجأ عادة إلى الجراحة لحل هذه المشكلة، وقد يكون أحياناً سبب التضخم وربما حميداً أو ورماً خبيثاً.

تكون مفرزات الحويصلين المنويين أساسية (قلوية)، مما يسهم في تخفيف حموضة الميهل لدى الأنثى عند الاقتران والبول المتبقي في الإحليل لدى الذكر؛ لأن النطاف لا تصبح متحركة بشكل مثالي إلا عندما تصبح درجة الـ pH (6.5 - 6).



1. الحويصلان المنويان (الغدد المنوية): تقعان خلف قاعدة المثانة، وتعدان غداً إفرازية نشطة جداً تفرز نحو 60% من السائل المنوي، وتكون مفرزاتها قوية لزجة تحتوي على:
 - تركيز مرتفع من الفركتوز (سكر الفواكه): يتم استقلابه بسهولة من قبل النطاف.
 - البروستاغلاندين: تحدث على تقلص العضلات الملساء في المجرى التكاثري الذكري، وتقلص عضلات المجرى التكاثري الأنثوي في أثناء الاقتران لتأمين وصول النطاف إلى أعلى الرحم.
2. غدة البروستات: غدة عضلية ملساء تحيط بالجزء الأول من الإحليل تنتج:
 - سائلاً حمضياً إلى حد ما حليبياً يشكل (20 - 30%) من حجم السائل المنوي يخفف من لزوجة السائل المنوي، ويحتوي على شوارد الكالسيوم لتنشيط حركة النطاف.
 - مركبات أخرى أهمها: **بلاسمين منوي**: بروتين مضاد للجراثيم يساعد على منع حدوث التهابات المجرى البولي التناسلي لدى الذكور.
3. غدتا كوبر (البصيلتان الإحليلتان): تقعان قرب قاعدة القضيب الذكري، تفرزان مادة مخاطية أساسية تخفف حموضة البول المتبقي في الإحليل.

إضاءة طبية: تتضخم البروستات تلقائياً لدى معظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، ويلجأ عادة إلى الجراحة لحل هذه المشكلة، وقد يكون أحياناً سبب التضخم ورماً حميداً أو ورماً خبيثاً.

تكون مفرزات الحويصلين المنويين أساسية (قلوية)، مما يسهم في تخفيف حموضة الميهل لدى الأنثى عند الاقتران والبول المتبقي في الإحليل لدى الذكر؛ لأن النطاف لا تصبح متحركة بشكل مثالي إلا عندما تصبح درجة الـ pH (6.5 - 6).

التقويم النهائي

1. أحدد بدقة موقع كل من:
 - أ- الأنايب المنوية - خلايا ليدغ - البروستات - الحويصلان المنويان - غدتا كوبر.
 - ب- أنكر وظيفة واحدة لكل من: البلاسمين المنوي - البروستاغلاندين لدى الذكر.
 - ج- أفسر علمياً ما يأتي:
 - أ- تعد الخصية غدة مضاعفة الإفراز (داخلي وخارجي).
 - ب- الرجال الذين يستحمون بماء ساخن جداً بشكل دائم يكون عدد نطافهم في الغالب قليل.
 - ج- تعد حالة الفقق الإربي شائعة لدى الذكور.
 - د- ضرورة إجراء اختبارات فحص البروستات لدى الذكور بعد سن الخمسين.
 - هـ - تعزل المفرزات القلوية للغدد الملحقة لدى الذكر حموضة الميهل وحموضة البول المتبقي في الإحليل.
 - و- يسبب قصور إفراز البروستات التهابات في المجرى البولي التناسلي للذكر.

التقويم النهائي

1. أحدد بدقة موقع كل من:
 - أ- الأنايب المنوية - خلايا ليدغ - البروستات - الحويصلان المنويان - غدتا كوبر.
 - ب- أنكر وظيفة واحدة لكل من: البلاسمين المنوي - البروستاغلاندين لدى الذكر.
 - ج- أفسر علمياً ما يأتي:
 - أ- تعد الخصية غدة مضاعفة الإفراز (داخلي وخارجي).
 - ب- الرجال الذين يستحمون بماء ساخن جداً بشكل دائم يكون عدد نطافهم في الغالب قليل.
 - ج- تعد حالة الفقق الإربي شائعة لدى الذكور.
 - د- ضرورة إجراء اختبارات فحص البروستات لدى الذكور بعد سن الخمسين.
 - هـ - تعزل المفرزات القلوية للغدد الملحقة لدى الذكر حموضة الميهل وحموضة البول المتبقي في الإحليل.
 - و- يسبب قصور إفراز البروستات التهابات في المجرى البولي التناسلي للذكر.




10

جهاز التكاثر الأنثوي

لقد تمكن الطبيب دو غراف 1672 من اكتشاف بروفات على سطح المبيض لدى الثدييات أطلق عليها اسم جريبات، ووصف العروس الأنثوية بأنها تقع على سطح المبيض، إلا أن العالم فون بير 1827 اكتشف وجود العروس الأنثوية داخل جريبات دو غراف، فما البنى التي تنتجها؟ وكيف تتشكل؟

▼ لاحظ الشكلين الاتيين، وانتكر اقسام الجهاز التكاثري الانثوي:




جهاز التكاثر الانثوي

الاحظ واحتل:

■ أولاً: المبيضان:

◀ لاحظ الشكل المجاور الذي يمثل المبيض لدى الأنثى:

لكل مبيض حجم ثمرة اللوز. ما هما المنطقتان الرئيستان اللتان يتألف منهما المبيض؟



المبيض




10

جهاز التكاثر الأنثوي

لقد تمكن الطبيب دو غراف 1672 من اكتشاف بروفات على سطح المبيض لدى الثدييات أطلق عليها اسم جريبات، ووصف العروس الأنثوية بأنها تقع على سطح المبيض، إلا أن العالم فون بير 1827 اكتشف وجود العروس الأنثوية داخل جريبات دو غراف، فما البنى التي تنتجها؟ وكيف تتشكل؟

▼ لاحظ الشكلين الاتيين، وانتكر اقسام الجهاز التكاثري الانثوي:




جهاز التكاثر الانثوي

الاحظ واحتل:

■ أولاً: المبيضان:

◀ لاحظ الشكل المجاور الذي يمثل المبيض لدى الأنثى:

لكل مبيض حجم ثمرة اللوز. ما هما المنطقتان الرئيستان اللتان يتألف منهما المبيض؟



التقويم النهائي



1. أختار الإجابة الصحيحة مما يأتي:

أ- من خلال المخطط البياني المجاور يكون عمر آخر خلية بيضية ثانوية الناتجة من امرأة عمرها خمسون عاماً دخلت سن البلوغ في عمر 12 عاماً؟

أ. 38 سنة ب. 50 سنة ج. 12 سنة د. 38 سنة + 9 أشهر

ب- في حال أعطيت هذه الأنثى منشط إباضة بعد سن الخمسين فيحدث:

- (أ) إنتاج خلايا بيضية ثانوية غير مخصصة قليلة جداً
(ب) يتم إنتاج خلايا بيضية ثانوية لكن بكمية قليلة جداً
(ج) لا يتم إنتاج خلايا بيضية ثانوية لأن مخزون المبيض قد نفذ
(د) أ + ج

2. يحتوي المهبل على مجموعة من الجراثيم المقيمة، وتكون غير ضارة عادة، تنتج بيئة حمضية نتيجة نشاطها الاستقلابي تمنع نمو العديد من العوامل المعرّضة.

ما تأثير هذه البيئة الحمضية في النطاف؟ وكيف تمكنت النطاف من تحقق مهمة الإلقاح الناجح رغم ذلك؟

3. أعدد موقع كل مما يأتي: الخلايا القرابية (الجريبية) - الجريبات المبيضية.

4. ما وظيفة كل من: الاكليل المشع - الخلايا الظهارية المهدبة في القناة الناقلة للبيوض - الرباط المبيضي.

5. بالاستعانة بالأشكال التي تمثل أقسام الجهاز التنكاثري الذكري والأنثوي علينا أن نقرن بينهما من حيث: انفصال المجرى البولي عن المجرى التناسلي.

6. أفسر علمياً ما يأتي:

أ- بعد الجريب الناضج عدة صماء.

ب- الصيغة الصبغية للخلية البيضية الثانوية In.

ج- يكون عمر الخلية البيضية الثانوية مطابقاً لعمر الأنثى الصادرة عنها.

ورقة عمل تظهر أحياناً أكياس مليئة بالسوائل في المبيض أو على سطحه تسمى: الكيسات المبيضية.

بالاستعانة بمصادر التعلم المتوافرة أو بطبيب مختص أبحث في:

أ- تأثيرها في تطوّر الجريبات. ب- الطريقة الطبية لإزالتها.

التقويم النهائي



1. أختار الإجابة الصحيحة مما يأتي:

أ- من خلال المخطط البياني المجاور يكون عمر آخر خلية بيضية ثانوية ناتجة من امرأة عمرها خمسون عاماً دخلت سن البلوغ في عمر 12 عاماً؟

أ. 38 سنة ب. 50 سنة ج. 12 سنة د. 38 سنة + 9 أشهر

ب- في حال أعطيت هذه الأنثى منشط إباضة بعد سن الخمسين فيحدث:

- (أ) إنتاج خلايا بيضية ثانوية غير مخصصة قليلة جداً
(ب) يتم إنتاج خلايا بيضية ثانوية لكن بكمية قليلة جداً
(ج) لا يتم إنتاج خلايا بيضية ثانوية لأن مخزون المبيض قد نفذ
(د) أ + ج

2. يحتوي المهبل على مجموعة من الجراثيم المقيمة، وتكون غير ضارة عادة، تنتج بيئة حمضية نتيجة نشاطها الاستقلابي تمنع نمو العديد من العوامل المعرّضة.

ما تأثير هذه البيئة الحمضية في النطاف؟ وكيف تمكنت النطاف من تحقق مهمة الإلقاح الناجح رغم ذلك؟

3. أعدد موقع كل مما يأتي: الخلايا القرابية - الجريبات المبيضية.

4. ما وظيفة كل من: الاكليل المشع - الخلايا الظهارية المهدبة في القناة الناقلة للبيوض - الرباط المبيضي.

5. بالاستعانة بالأشكال التي تمثل أقسام الجهاز التنكاثري الذكري والأنثوي علينا أن نقرن بينهما من حيث: انفصال المجرى البولي عن المجرى التناسلي.

6. أفسر علمياً ما يأتي:

أ- بعد الجريب الناضج عدة صماء.

ب- الصيغة الصبغية للخلية البيضية الثانوية In.

ج- يكون عمر الخلية البيضية الثانوية مطابقاً لعمر الأنثى الصادرة عنها.


ورقة عمل تظهر أحياناً أكياس مليئة بالسوائل في المبيض أو على سطحه تسمى: الكيسات المبيضية.

بالاستعانة بمصادر التعلم المتوافرة أو بطبيب مختص أبحث في:


أ- تأثيرها في تطوّر الجريبات. ب- الطريقة الطبية لإزالتها.

▼ لاحظ وأنتبع من خلال الأشكال الآتية:

مراحل الإلقاح والتبدلات التي تطرأ على الخلية البيضية الثانوية بعد دخول نواة النطفة إليها، وتشكل البيضة الملقحة وأرتبها.



مراحل الإلقاح




بالاعتماد على الأشكال السابقة أجب عن يأتي:

- لماذا لا تلغ الخلية البيضية الثانوية إلا بنطفة النوع نفسه؟
- ما الذي يسبب تلاشي الخلايا والنطاف المحيطة بالخلية البيضية؟

▼ لاحظ وأنتبع من خلال الأشكال الآتية:

مراحل الإلقاح والتبدلات التي تطرأ على الخلية البيضية الثانوية بعد دخول نواة النطفة إليها، وتشكل البيضة الملقحة وأرتبها.



مراحل الإلقاح



بالاعتماد على الأشكال السابقة أجب عن يأتي:

- لماذا لا تلغ الخلية البيضية الثانوية إلا بنطفة النوع نفسه؟
- ما الذي يسبب تلاشي الخلايا والنطاف المحيطة بالخلية البيضية **الثانوية**؟

إعداد القدر
جورج نعمة
0955220402


13

التنامي الجنيني: التعشيش والحمل

كيف تشكل البيضة الملقحة التي تعدّ خلية واحدة طفلاً وزنه (3 - 4 كغ) يمتلك جسمه تریولونات الخلايا المنظمة ضمن بنى معقدة عالية التخصص والتمايز؟ ما العوامل التي تحدد اتجاهات التطور الجنيني، وتؤمن استمراريته؟

أحلل وارقب: يمكن تقسيم عملية الحمل إلى ثلاث مراحل متكاملة مدة كل منها ثلاثة أشهر:

1. مرحلة التطور الجنيني المبكر تبدأ بالانقسامات الخيطية، وتنتهي بتشكيل المشيمة والحبل السري وتظهر خلالها بدايات جميع أعضاء الأجهزة الرئيسة.
 2. تطور الأعضاء والأجهزة وتنتهي نهاية الشهر السادس إذ يأخذ الجنين شكل إنسان مكتمل.
 3. نمو سريع للجنين: فتصبح غالبية الأعضاء فعالة بشكل كامل، وتنتهي بالولادة.
- المرحلة الأولى: ▼ أتبع الشكل الآتي يمثل مراحل الانقسامات الخيطية التي تطرأ على البيضة الملقحة:



197


13

التنامي الجنيني: التعشيش والحمل

كيف تشكل البيضة الملقحة التي تعدّ خلية واحدة طفلاً وزنه (3 - 4 كغ) يمتلك جسمه تریولونات الخلايا المنظمة ضمن بنى معقدة عالية التخصص والتمايز؟ ما العوامل التي تحدد اتجاهات التطور الجنيني، وتؤمن استمراريته؟

أحلل وارقب: يمكن تقسيم عملية الحمل إلى ثلاث مراحل متكاملة مدة كل منها ثلاثة أشهر:

1. مرحلة التطور الجنيني المبكر تبدأ بالانقسامات الخيطية، وتنتهي بتشكيل المشيمة والحبل السري وتظهر خلالها بدايات جميع أعضاء الأجهزة الرئيسة.
 2. تطور الأعضاء والأجهزة وتنتهي نهاية الشهر السادس إذ يأخذ الجنين شكل إنسان مكتمل.
 3. نمو سريع للجنين: فتصبح غالبية الأعضاء فعالة بشكل كامل، وتنتهي بالولادة.
- المرحلة الأولى: ▼ أتبع الشكل الآتي يمثل مراحل الانقسامات الخيطية التي تطرأ على البيضة الملقحة:



197

إعداد الدرس
جورج نعمة
0955220402

2022 2021

التقويم النهائي

1. يُصاب بعض المواليد خلال الأيام الأولى من ولادتهم باليرقان الوليدي فيبدو الجلد والطبقة الصلبة في العين بلون أصفر ويكون السبب العلمي الأكثر دقة لذلك:
 - أ- ارتفاع تركيز البليروبين المنتقل إليه من دم الأم.
 - ب- كبد المولود غير مهياً للعمل بصورة كافية عند الولادة؛ فيرتفع تركيز البليروبين في دمه.
 - ج- عدم قدرة الكبد على تكوين بروتينات بلازما الدم.
 - د- ضعف الدوران الدموي لدى المولود.
2. يتعرض بعض المواليد لخطر نقص التأكسج في أثناء الولادة، والذي يمكن تحمله لمدة 10 دقائق وقد يسبب الاختناق والموت، لا سيما لدى الخدج، أحد العوامل الأتية لا يعد من مسببات نقص التأكسج:
 - أ- انضغاط الحبل السري.
 - ب- التخدير المفرط للأم.
 - ج- الانفصال المبكر للمشيمة.
 - د- التقلص المفرط للرحم.
 - هـ - التمدد المفرط لعنق الرحم.




0955220402

التقويم النهائي

1. يُصاب بعض المواليد خلال الأيام الأولى من ولادتهم باليرقان الوليدي فيبدو الجلد والطبقة الصلبة في العين بلون أصفر ويكون السبب العلمي الأكثر دقة لذلك:
 - أ- ارتفاع تركيز البليروبين المنتقل إليه من دم الأم.
 - ب- كبد المولود غير مهياً للعمل بصورة كافية عند الولادة؛ فيرتفع تركيز البليروبين في دمه.
 - ج- عدم قدرة الكبد على تكوين بروتينات بلازما الدم.
 - د- ضعف الدوران الدموي لدى المولود.
2. يتعرض بعض المواليد لخطر نقص التأكسج في أثناء الولادة، والذي يمكن تحمله لمدة 10 دقائق وقد يسبب الاختناق والموت، لا سيما لدى الخدج، أحد العوامل الأتية لا يعد من مسببات نقص التأكسج:
 - أ- انضغاط الحبل السري.
 - ب- التخدير المفرط للأم.
 - ج- الانفصال المبكر للمشيمة.
 - د- التقلص المفرط للرحم.
 - هـ - التمدد المفرط لعنق الرحم.

أسئلة الوحدة الثانية


أولاً: لديك المخطط الآتي الذي يمثل العلاقة بين إفراز الهرمونات خلال دورة جنسية بحدوث الحمل ومن دونه، والمطلوب:



1. يكون التلقيح الراجع إيجابياً بين أشغاع الهرمونات الآتية ما عدا:
 - أ- LH والإسترايول في الطور الجريبي.
 - ب- HCG والبروجسترون.
 - ج- LH وHCG.
 - د- FSH والبروجسترون.
2. بالنظر إلى المخطط تعد إحدى العبارات العلمية الآتية ليست صحيحة:
 - أ- ينتج البروجسترون من الجسم الأصفر.
 - ب- التلقيح الراجع سلبى بين الإسترايول والـ LH قبل الإباضة.
 - ج- التلقيح الراجع سلبى بين البروجسترون في الطور الأصفرى والـ FSH.
 - د- تحدث الإباضة بتأثير زيادة تركيز الـ LH والـ FSH.
3. ما الأداة على حدوث الحمل من خلال المخطط؟
4. ما هما الهرمونات اللذان يدعمان تطوّر الجسم الأصفر بعد حدوث الإنقاج؟ وما الدليل على ذلك؟
5. ماذا يحدث للأنثى الحامل السابقة إذا توقف إنتاج HCG في اليوم 15 من عمر المضة؟

أسئلة الوحدة الثانية

أولاً: لديك المخطط الآتي الذي يمثل العلاقة بين إفراز الهرمونات خلال دورة جنسية بحدوث الحمل ومن دونه، والمطلوب:



1. يكون التلقيح الراجع إيجابياً بين أشغاع الهرمونات الآتية ما عدا:
 - أ- LH والإسترايول في الطور الجريبي.
 - ب- HCG والبروجسترون.
 - ج- LH وHCG.
 - د- FSH والبروجسترون.
2. بالنظر إلى المخطط تعد إحدى العبارات العلمية الآتية **ليست** صحيحة:
 - أ- ينتج البروجسترون من الجسم الأصفر.
 - ب- التلقيح الراجع سلبى بين الإسترايول والـ LH قبل الإباضة.
 - ج- التلقيح الراجع سلبى بين البروجسترون في الطور الأصفرى والـ FSH.
 - د- تحدث الإباضة بتأثير زيادة تركيز الـ LH والـ FSH.
3. ما الأداة على حدوث الحمل من خلال المخطط؟
4. ما هما الهرمونات اللذان يدعمان تطوّر الجسم الأصفر بعد حدوث الإنقاج؟ وما الدليل على ذلك؟
5. ماذا يحدث للأنثى الحامل السابقة إذا توقف إنتاج HCG في اليوم 15 من عمر المضة؟


ثانياً: اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي:

البربخ - قطرة اللقاح عند الصنوبر - الإكليل المشع - الإندوسيرم في بذرة الصنوبر - الجسم المتوسط لدى الجراثيم - نواة الخلية الإعاثية عند مغلفات البذور.

ثالثاً: مم تتشأ كل من البنى الآتية:

البيضة الأصلية - البيضة الإضافية - السويداء - غشاء الكوريون - الغلاف المتخشب المجنح لبذرة الصنوبر - الأرحام عند الصنوبر - الجسم الطرفي للنطفة.

رابعاً: يمثل الشكل الآتي حادثة الإلقاح ومراحل التشكل الجنيني لدى الإنسان، والمطلوب:



1. اذكر المسمى الموافق للأرقام المحددة على الشكل.

2. حدد الصيغة الصبغية لخلايا كل من الأقسام السابقة.

3. في أي المراحل المذكورة يبدأ تشكل الجهاز العصبي؟

4. إذا أردنا الحصول على خلايا جذعية كاملة الإمكانيات، فأي المراحل هي الأفضل؟

خامساً: اختارُ الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. ينشط هرمون FSH تشكل النطاف من خلال تأثيره في خلايا سرتولي، وذلك بسبب:

أ- تمتلك خلايا سرتولي في هيولاها المستقبل الغشائي لهذا الهرمون.


ثانياً: اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي:

البربخ - **قطرة** اللقاح عند الصنوبر - الإكليل المشع - الإندوسيرم في بذرة الصنوبر - الجسم المتوسط لدى الجراثيم - نواة الخلية الإعاثية عند مغلفات البذور.

ثالثاً: مم تتشأ كل من البنى الآتية:

البيضة الأصلية - البيضة الإضافية - السويداء - غشاء الكوريون - الغلاف المتخشب المجنح لبذرة الصنوبر - الأرحام عند الصنوبر - الجسم الطرفي للنطفة.

رابعاً: يمثل الشكل الآتي حادثة الإلقاح ومراحل التشكل الجنيني لدى الإنسان، والمطلوب:



1. اذكر المسمى الموافق للأرقام المحددة على الشكل.

2. حدد الصيغة الصبغية لخلايا كل من الأقسام السابقة.

3. في أي المراحل المذكورة يبدأ تشكل الجهاز العصبي؟

4. إذا أردنا الحصول على خلايا جذعية كاملة الإمكانيات، فأي المراحل هي الأفضل؟

خامساً: اختارُ الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. ينشط هرمون FSH تشكل النطاف من خلال تأثيره في خلايا سرتولي، وذلك بسبب:

أ- تمتلك خلايا سرتولي في هيولاها المستقبل الغشائي لهذا الهرمون.



0955200000

ب- تمتلك خلايا سرتولي في غشائها الهيولي المستقبل العشائي لهذا الهرمون.

ج- خلايا سرتولي مصدر غذائي للنفط.

د- الهرمون لا يستطيع عبور الحاجز الدموي الخصوي.

2. يتم تعرف النفط من قبل الخلايا المناعية على أنها أجسام غريبة، لكنها لا تهاجمها بسبب:

أ- تهاجم خلايا سرتولي الخلايا المناعية قبل الوصول إلى النفط.

ب- تسهم خلايا سرتولي في تشكل الحاجز الدموي الخصوي الذي يمنع مهاجمتها.

ج- تكون سيتوبلازما النطفة قليلة؛ فلا تستطيع الخلايا المناعية بلعمتها.

د- لأن النفط تكون متميزة؛ لذلك لا يمكن مهاجمتها.

3. في الشكل المجاور إحدى الخصيتين مصابة بحالة مرضية ناتجة عن

ضعف في الدوران الدموي وتكون إحدى الأوصاف العنمية الآتية صحيحة:

أ- الخصية (ب) سليمة، والخصية (أ) لديها ضمور في الحبل المنوي.

ب- الخصية (أ) مصابة بالدوالي والخصية (ب) سليمة.

ج- الخصية (أ) مصابة بالدوالي والخصية (ب) لديها ضمور في الحبل المنوي.

د- الخصية (أ) مصابة بقتل خصوي والخصية (ب) سليمة.

4. إحدى العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بفيروس الإيدز، غلافه الخارجي من طبيعة:

أ- دسمة، ومادته الوراثية DNA ويحتوي على أنظيمات النسخ التعاكسي.

ب- بروتينية، ومادته الوراثية RAN، ولا يحتوي على أي نوع من الأنظيمات.

ج- دسمة، ومادته الوراثية RNA، ويحتوي على أنظيمات النسخ التعاكسي.

د- بروتينية، ومادته الوراثية RNA، ويحتوي على أنظيمات النسخ التعاكسي.

5. يتمثل الثبات العروسي المذكر في نبات الصنوبر بـ:

أ- المخروط المذكر. ب- السداة. ج- الكيس الطلعي. د- حبة الطلع الناضجة.

6. تتغذى البيضة الأصلية والبيضة الإضافية في أثناء نموها على:

أ- اللحافتين. ب- النوسيل. ج- الخلية الإعاشية. د- الخلية المولدة.

ب- تمتلك خلايا سرتولي في غشائها الهيولي المستقبل العشائي لهذا الهرمون.

ج- خلايا سرتولي مصدر غذائي للنفط.

د- الهرمون لا يستطيع عبور الحاجز الدموي الخصوي.

2. يتم تعرف النفط من قبل الخلايا المناعية على أنها أجسام غريبة، لكنها لا تهاجمها بسبب:

أ- تهاجم خلايا سرتولي الخلايا المناعية قبل الوصول إلى النفط.

ب- تسهم خلايا سرتولي في تشكل الحاجز الدموي الخصوي الذي يمنع مهاجمتها.

ج- تكون سيتوبلازما النطفة قليلة؛ فلا تستطيع الخلايا المناعية بلعمتها.

د- لأن النفط تكون متميزة؛ لذلك لا يمكن مهاجمتها.

3. في الشكل المجاور إحدى الخصيتين مصابة بحالة مرضية ناتجة عن

ضعف في الدوران الدموي وتكون إحدى الأوصاف العنمية الآتية صحيحة:

أ- الخصية (ب) سليمة، والخصية (أ) لديها ضمور في الحبل المنوي.

ب- الخصية (أ) مصابة بالدوالي والخصية (ب) سليمة.

ج- الخصية (أ) مصابة بالدوالي والخصية (ب) لديها ضمور في الحبل المنوي.

د- الخصية (أ) مصابة بقتل خصوي والخصية (ب) سليمة.

4. إحدى العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بفيروس الإيدز، غلافه الخارجي من طبيعة:

أ- دسمة، ومادته الوراثية DNA ويحتوي على أنظيمي النسخ التعاكسي.

ب- بروتينية، ومادته الوراثية RAN، ولا يحتوي على أي نوع من الأنظيمات.

ج- دسمة، ومادته الوراثية RNA، ويحتوي على أنظيمي النسخ التعاكسي.

د- بروتينية، ومادته الوراثية RNA، ويحتوي على أنظيمي النسخ التعاكسي.

5. يتمثل الثبات العروسي المذكر في نبات الصنوبر بـ:

أ- المخروط المذكر. ب- السداة. ج- الكيس الطلعي. د- حبة الطلع الناضجة.

6. تتغذى البيضة الأصلية والبيضة الإضافية في أثناء نموها على:

أ- اللحافتين. ب- النوسيل. ج- الخلية الإعاشية. د- الخلية المولدة.




أ ب



أ ب

إعداد الأستاذ
جورج نعمة
0955220402



قمر مثل ظهور السلالات الجديدة في الجيل الثاني: حسب قانونه الثاني أنه لا يوجد ارتباط بين الصفتين

ملاحظة: شبكة المربعات المستخدمة في تحليل توزيع الصفات تسمى: شبكة بينيت Punnet

قانون ماندل الثاني: تتوزع أشفاغ الصفات بشكل حر ومستقل عن بعضها عن تشكل الأعراس. التحليل الوراثي باستخدام الجداول الوراثية:

في صفة شكل البذور نرسم (R) لأليل الشكل الأملس الراجح، ورمز (r) للأليل المجعد المتحتي. في صفة لون البذور نرسم (Y) لأليل اللون الأصفر الراجح، ورمز (y) للأليل الأخضر المتحتي. نجد: الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

التمط الظاهري للأبوين :	خضراء مجعدة × صفراء ملساء
التمط الوراثي للأبوين:	$RRYY \times rryy$
احتمال أعراس الأبوين:	$RY1/1 \times ry1/1$
التمط الوراثي للجيل الأول F_1 :	$RrYy1/1$
التمط الظاهري للجيل الأول F_1 :	كلها صفراء ملساء

احتمال أعراس الجيل الأول (F_1) : $(RY1/4 + Ryl/4 + rY1/4 + ry1/4)$

يمكن حلّ التمرين السابق للوصول إلى الجيل الثاني بطريقة الصيغة العامة:

التمط الوراثي لـ F_2	التمط الظاهري لـ F_2	النسب لـ F_2
R - Y-	صفراء ملساء	9
R - yy	خضراء ملساء	3
rr Y -	صفراء مجعدة	3
rr yy	خضراء مجعدة	1

حيث يشير الخط (—) إلى الأليل المقابل بشكليه الراجح أو المتحتي.



قمر مثل ظهور السلالات الجديدة في الجيل الثاني: حسب قانونه الثاني أنه لا يوجد ارتباط بين الصفتين

ملاحظة: شبكة المربعات المستخدمة في تحليل توزيع الصفات تسمى: شبكة بينيت Punnet

قانون ماندل الثاني: تتوزع أشفاغ الصفات بشكل حر ومستقل عن بعضها عند تشكل الأعراس. التحليل الوراثي باستخدام الجداول الوراثية:

في صفة شكل البذور نرسم (R) لأليل الشكل الأملس الراجح، ورمز (r) للأليل المجعد المتحتي. في صفة لون البذور نرسم (Y) لأليل اللون الأصفر الراجح، ورمز (y) للأليل الأخضر المتحتي. نجد: الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

التمط الظاهري للأبوين :	خضراء مجعدة × صفراء ملساء
التمط الوراثي للأبوين:	$RRYY \times rryy$
احتمال أعراس الأبوين:	$RY1/1 \times ry1/1$
التمط الوراثي للجيل الأول F_1 :	$RrYy1/1$
التمط الظاهري للجيل الأول F_1 :	كلها صفراء ملساء

احتمال أعراس الجيل الأول (F_1) : $(RY1/4 + Ryl/4 + rY1/4 + ry1/4)$

يمكن حلّ التمرين السابق للوصول إلى الجيل الثاني بطريقة الصيغة العامة:

التمط الوراثي لـ F_2	التمط الظاهري لـ F_2	النسب لـ F_2
R - Y-	صفراء ملساء	9
R - yy	خضراء ملساء	3
rr Y -	صفراء مجعدة	3
rr yy	خضراء مجعدة	1

حيث يشير الخط (—) إلى الأليل المقابل بشكليه الراجح أو المتحتي.



النظرية الصبغية:

أتواصل مع رفاقي لمعرفة أين تحمل مورثات الصفات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء؟

وأفسر قوانين مندل حسب النظرية الصبغية.

النظرية الصبغية: تحمل مورثات الصفات على الصبغيات، وتنتقل عبرها من جيل لآخر.

حيث يحمل الشفع الصبغي الواحد عدد من المورثات المختلفة.

صلة بتاريخ العلوم

- يعود الفضل باكتشاف النظرية الصبغية للعالمين ساتون وبوفيري، حيث وجدا أن الصبغيات تنفصل خلال الانقسام المنصف، وهذا دعم قوانين مندل في التوريث بأن سلوك الصبغيات يطابق سلوك المورثات (عوامل مندل).
- كما أكد العالم مورغان في تجاربه على ذبابة الفاكهة، أن المورثات: دقائق مادية تتوضع بصف خطي واحد على طول الصبغي الذي يحملها؛ بحيث يكون لكل مورثة موقع محدد وثابت عليه.

وتفسير قوانين مندل حسب سلوك الصبغيات خلال الانقسام المنصف عند تشكل الأعراس وانماجها بالاتجاه أقوم بحل المسألة الآتية وفق النظرية الصبغية:

1. تفسير الهجونة الأحادية حسب النظرية الصبغية:

أطبق ما تعلمته لتفسير التهجين بين سلاتين من نبات البازلاء أزهار حمراء (R) مع أزهار بيضاء (r)، كانت جميع أفراد الجيل الأول حمراء الأزهار، والمطلوب:

1. ما نمط الهجونة؟ ولماذا؟

2. ما النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما المحتملة؟

وما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول حسب النظرية الصبغية.

3. بين جدول وراثي نتائج التهجين بين أفراد الجيل الأول.

الحل: رجحان تام لأن جميع الأفراد الناتجة تحمل صفة أحد الأبوين

النمط الظاهري للأبوين (P):	×	أزهار بيضاء	×	أزهار حمراء
النمط الوراثي للأبوين (P):		r R	×	R R
احتمال أعراس الأبوين (P):		r 1/2	×	R 1/2
النمط الوراثي للجيل الأول (F1):		R R		r 1/2
النمط الظاهري للجيل الأول (F1):		أزهار حمراء		هجينة

النظرية الصبغية:

أتواصل مع رفاقي لمعرفة أين تحمل مورثات الصفات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء؟

وأفسر قوانين مندل حسب النظرية الصبغية.

النظرية الصبغية: تحمل مورثات الصفات على الصبغيات، وتنتقل عبرها من جيل لآخر.

حيث يحمل الشفع الصبغي الواحد عدد من المورثات المختلفة.

صلة بتاريخ العلوم

- يعود الفضل باكتشاف النظرية الصبغية للعالمين ساتون وبوفيري، حيث وجدا أن الصبغيات تنفصل خلال الانقسام المنصف، وهذا دعم قوانين مندل في التوريث بأن سلوك الصبغيات يطابق سلوك المورثات (عوامل مندل).
- كما أكد العالم مورغان في تجاربه على ذبابة الفاكهة، أن المورثات: دقائق مادية تتوضع بصف خطي واحد على طول الصبغي الذي يحملها؛ بحيث يكون لكل مورثة موقع محدد وثابت عليه.

وتفسير قوانين مندل حسب سلوك الصبغيات خلال الانقسام المنصف عند تشكل الأعراس وانماجها بالاتجاه أقوم بحل المسألة الآتية وفق النظرية الصبغية:

1. تفسير الهجونة الأحادية حسب النظرية الصبغية:

أطبق ما تعلمته لتفسير التهجين بين سلاتين من نبات البازلاء أزهار حمراء (R) مع أزهار بيضاء (r)، كانت جميع أفراد الجيل الأول حمراء الأزهار، والمطلوب:

1. ما نمط الهجونة؟ ولماذا؟

2. ما النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما المحتملة؟

وما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول حسب النظرية الصبغية.


3. بين جدول وراثي نتائج التهجين بين أفراد الجيل الأول.

الحل: رجحان تام لأن جميع الأفراد الناتجة تحمل صفة أحد الأبوين

النمط الظاهري للأبوين (P):	×	أزهار بيضاء	×	أزهار حمراء
النمط الوراثي للأبوين (P):		r R	×	R R
احتمال أعراس الأبوين (P):		r 1/2	×	R 1/2
النمط الوراثي للجيل الأول (F1):		R R		r 1/2
النمط الظاهري للجيل الأول (F1):		أزهار حمراء		هجينة



تطبيق: لديك شجرة النسب الآتية: ضع تحليلاً وراثياً لها.



من الصبي الثالث نستنتج: أن الأب متخالف للواقع

النمط الظاهري للأبوين:	×	الأم زمرتها AB	×	الأب زمرته B
النمط الوراثي للأبوين:		$I^A I^B$		$I^B i$
احتمال أعراس الأبوين:		$(I^A \frac{1}{2} + I^B \frac{1}{2})$		$(I^B \frac{1}{2} + I^b \frac{1}{2})$
النمط الوراثي للأبناء:		$I^B i \frac{1}{4} + I^B I^B \frac{1}{4} + I^A i \frac{1}{4} + I^A I^B \frac{1}{4}$		
النمط الظاهري للأبناء:		B	B	A AB
الأولاد:		البنات 1	الصبي 3	البنات 2 نمطها الوراثي غير محدد

أقارن:

وراثة زمر الدم من النمط Rh (الريزوس)

يوجد لهذه الصفة نمطان من الأليلات المتعددة المتقابلة:

1. نمط من الأليلات الراجحة يعطى مولد ضد خاص على سطح الكرية الحمراء ترمز له ب (R).


2. نمط من الأليلات المتنحية لا يعطى مولد ضد خاص على سطح الكرية الحمراء ترمز له (r).

الفرد الواحد يمتلك اثنين منها فقط، وهذه الأليلات نشأت بفعل الطفرات.

بناءً على ذلك يكون لدينا الأنماط الآتية:

النمط الوراثي	النمط الظاهري
RR , Rr	إيجابي الريزوس
rr	سلبى الريزوس

تطبيق: لديك شجرة النسب الآتية: ضع تحليلاً وراثياً لها.



من الصبي الثالث نستنتج: أن الأب متخالف للواقع

النمط الظاهري للأبوين:	×	الأم زمرتها AB	×	الأب زمرته B
النمط الوراثي للأبوين:		$I^A I^B$		$I^B i$
احتمال أعراس الأبوين:		$(I^A \frac{1}{2} + I^B \frac{1}{2})$		$(I^B \frac{1}{2} + I^b \frac{1}{2})$
النمط الوراثي للأبناء:		$I^B i \frac{1}{4} + I^B I^B \frac{1}{4} + I^A i \frac{1}{4} + I^A I^B \frac{1}{4}$		
النمط الظاهري للأبناء:		B	B	A AB
الأولاد:		البنات 2 نمطها الوراثي غير محدد	الصبي 3	البنات 1

أقارن:

وراثة زمر الدم من النمط Rh (الريزوس)

يوجد لهذه الصفة نمطان من الأليلات المتعددة المتقابلة:

1. نمط من الأليلات الراجحة يعطى مولد ضد خاص على سطح الكرية الحمراء ترمز له ب (R).

2. نمط من الأليلات المتنحية لا يعطى مولد ضد خاص على سطح الكرية الحمراء ترمز له (r).

الفرد الواحد يمتلك اثنين منها فقط، وهذه الأليلات نشأت بفعل الطفرات.

بناءً على ذلك يكون لدينا الأنماط الآتية:

النمط الوراثي	النمط الظاهري
RR , Rr	إيجابي الريزوس
rr	سلبى الريزوس



مثال: مرض الكساح المقاوم للفيتامين D:

يسببه اليل طافر محمول على الصبغي الجنسي X ويتصف بأنه راجح.

وبذلك يكون لدينا الحالات الآتية:

الجنس	النمط الوراثي	النمط الظاهري
الذكر	$X_R Y_0$	مصاب
	$X_r Y_0$	سليم
الأنثى	$X_R X_R$	مصابة
	$X_R X_r$	مصابة
	$X_r X_r$	سليمة

أحل وأطبق.

مسألة: لديك شجرة النسب الآتية لتورث مرض الكساح المقاوم للفيتامين D، ضع تحليلاً وراثياً لها.


الحل:

من الصبي (3) نستنتج أن الأم متخالفة للواقع $X_R X_r$

النمط الظاهري للأبوين	الأم مصابة × الأب مصاب
النمط الوراثي للأبوين	$X_R Y_0 \times X_R X_r$
احتمالات الأعراس	$(X_R/2 + Y_0/2) \times (X_R/2 + X_r/2)$
النمط الوراثي للأبناء	$X_R X_R/4 + X_R X_r/4 + X_R Y_0/4 + X_r Y_0/4$
النمط الظاهري للأبناء	ذكر سليم ذكر مصاب أنثى مصابة أنثى مصابة
الأولاد وفقاً للشجرة الموضحة	الصبي 3 لما يولد بعد البنات المصابات 1 و2 نمطهما الوراثي غير محدد

تمرين: إذا علمت أن المخطط جانبياً يمثل شجرة نسب لتورث مرض الناعور المرتبط بالجنس بفرض أليلي الصفة H، h المطلوب:

- هل أليل المرض راجح أم متنح؟ ولماذا؟
- حدد الصبغي الجنسي الحامل لأليل المرض، علل إجابتك.
- أستنتج الأنماط الوراثية للأفراد: I₁، I₂، II₃، III₁



مثال: مرض الكساح المقاوم للفيتامين D:

يسببه أليل طافر محمول على الصبغي الجنسي X ويتصف بأنه راجح.

وبذلك يكون لدينا الحالات الآتية:

الجنس	النمط الوراثي	النمط الظاهري
الذكر	$X_R Y_0$	مصاب
	$X_r Y_0$	سليم
الأنثى	$X_R X_R$	مصابة
	$X_R X_r$	مصابة
	$X_r X_r$	سليمة

أحل وأطبق.

مسألة: لديك شجرة النسب الآتية لتورث مرض الكساح المقاوم للفيتامين D، ضع تحليلاً وراثياً لها.


الحل:

من الصبي (3) نستنتج أن الأم متخالفة للواقع $X_R X_r$

النمط الظاهري للأبوين	الأم مصابة × الأب مصاب
النمط الوراثي للأبوين	$X_R Y_0 \times X_R X_r$
احتمالات الأعراس	$(X_R/2 + Y_0/2) \times (X_R/2 + X_r/2)$
النمط الوراثي للأبناء	$X_R X_R/4 + X_R X_r/4 + X_R Y_0/4 + X_r Y_0/4$
النمط الظاهري للأبناء	ذكر سليم ذكر مصاب أنثى مصابة أنثى مصابة
الأولاد وفقاً للشجرة الموضحة	الصبي 3 لما يولد بعد البنات المصابات 1 و2 نمطهما الوراثي غير محدد X_R

تمرين: إذا علمت أن المخطط جانبياً يمثل شجرة نسب لتورث مرض الناعور المرتبط بالجنس بفرض أليلي الصفة H، h المطلوب:

- هل أليل المرض راجح أم متنح؟ ولماذا؟
- حدد الصبغي الجنسي الحامل لأليل المرض، علل إجابتك.
- أستنتج الأنماط الوراثية للأفراد: I₁، I₂، II₃، III₁



التقويم النهائي

أولاً: أضع كلمة (صح) في نهاية العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) في نهاية العبارة الغلط.

1. نمط العلاقة بين أنيل زمرة الدم A وأنيل زمرة الدم B رجحان غير تام.
2. في توريث خصاب الدم تتطابق نسب الأنماط الوراثية مع نسب الأنماط الظاهرية في الأبناء.
3. النمط الوراثي Bb يسبب صلماً جببياً عند الذكور وشعر خفيف عند المرأة.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. عدم وجود إنثى يمكن حزمة شعر على حافة صيوان الأذن.
2. لا يمكن ولادة طفل زمرة الدم O لأبوين أحدهما زمرة الدم AB.
3. الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغي الجنسي X تكون شائعة لدى الذكور أكثر من الإناث.
4. تعدد وراثته عامل اليريزوس لا متنلية.


ثالثاً: أحل المسائل الوراثية الآتية:

المسألة الأولى: تزوج رجل زمرة الدم AB إيجابي اليريزوس من امرأة زمرة الدم A إيجابية اليريزوس فأنجبا ثلاثة أبناء: الأول ذكر زمرة الدم B إيجابي اليريزوس، والثاني أنثى زمرة الدم AB سلبية اليريزوس، والثالث ذكر زمرة الدم A إيجابي اليريزوس. **المطلوب:**

1. حدد النمط الوراثي للأبوين، وما أنماط أعراسهما المحتملة؟
2. ما الأنماط الوراثية المحتملة للأبناء الثلاثة؟ وما احتمالات أعراس كل منها؟

المسألة الثانية: لديك شجرة النسب الآتية لتوريث زمر الدم.

ضع تحليلاً وراثياً لها.



المسألة الثالثة: زوجان لا تظهر عليهما علام الإصابة بالمهق، ويمتلك الزوج حزمة شعر (r) على حافة صيوان الأذن، أنجبا أطفالاً عدة من بينهم ذكر أمهق له حزمة شعر على حافة صيوان الأذن، **المطلوب:**

1. ما الأنماط الوراثية للأبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منهما؟
2. ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء؟
3. ما احتمال ولادة ذكر عادي له حزمة شعر على صيوان الأذن؟ (علماً أن أنيل صفة المهق «والأنيل المقابل له A».)

التقويم النهائي

أولاً: أضع كلمة (صح) في نهاية العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) في نهاية العبارة الغلط.

1. نمط العلاقة بين أنيل زمرة الدم A وأنيل زمرة الدم B رجحان غير تام.
2. في توريث خصاب الدم تتطابق نسب الأنماط الوراثية مع نسب الأنماط الظاهرية في الأبناء.
3. النمط الوراثي Bb يسبب صلماً جببياً عند الذكور وشعر خفيف عند المرأة.

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. عدم وجود إنثى يمكن حزمة شعر على حافة صيوان الأذن.
2. لا يمكن ولادة طفل زمرة الدم O لأبوين أحدهما زمرة الدم AB.
3. الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغي الجنسي X تكون شائعة لدى الذكور أكثر من الإناث.
4. تعدد وراثته عامل اليريزوس لا متنلية.


ثالثاً: أحل المسائل الوراثية الآتية:

المسألة الأولى: تزوج رجل زمرة الدم AB إيجابي اليريزوس من امرأة زمرة الدم A إيجابية اليريزوس فأنجبا ثلاثة أبناء: الأول ذكر زمرة الدم B إيجابي اليريزوس، والثاني أنثى زمرة الدم AB سلبية اليريزوس، والثالث ذكر زمرة الدم A إيجابي اليريزوس. **المطلوب:**

1. حدد النمط الوراثي للأبوين، وما أنماط أعراسهما المحتملة؟
2. ما الأنماط الوراثية المحتملة للأبناء الثلاثة؟ وما احتمالات أعراس كل منها؟

المسألة الثانية: لديك شجرة النسب الآتية لتوريث زمر الدم.


ضع تحليلاً وراثياً لها.



المسألة الثالثة: زوجان لا تظهر عليهما علام الإصابة بالمهق، ويمتلك الزوج حزمة شعر (r) على حافة صيوان الأذن، أنجبا أطفالاً عدة من بينهم ذكر أمهق له حزمة شعر على حافة صيوان الأذن، **المطلوب:**

1. ما الأنماط الوراثية للأبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منهما؟
2. ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء؟
3. ما احتمال ولادة ذكر عادي له حزمة شعر على صيوان الأذن؟ (علماً أن أنيل صفة المهق «والأنيل المقابل له A».)

▼ ألاحظ الشكل الآتي الذي يوضح بعضاً من التبدلات البنيوية على الصبغي وأجيب عن الأسئلة:



1. في أي من الحالات السابقة يحدث ضياع للمورثات؟ وما تأثير ذلك على الفرد؟

2. أي من الحالات السابقة يغير الترتيب الخطي للمورثات؟

3. في نمط الانتقال ينتقل جزء من صبغي إلى آخر غير قرين نكن قد يحدث أحياناً انتقال صبغي بكامله والتحامه مع صبغي آخر غير قرين.

سأل: لدى بعض إنث البشر انتقل صبغي من الشفع 21 والتحم مع صبغي من الشفع 14 ليصبح عدد صبغيات الأنثى 45 وتعطي هذه الأنثى نملطين من الأعراس طبيعية وغير طبيعية مما قد يؤدي إلى ولادة أطفال مصابة بمتلازمة داون.

2. الاضطرابات على مستوى العدد الصبغي:


أ- حالة تعدد الصيغة الصبغية: يشمل الخلل في هذه الحالة صبغيات الأعراس $1n$ وفي حال تعدد الصيغة الصبغية يصبح عدد الصبغيات $3n$ أو $4n$.

وتكون معظم حالات الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل لدى الإنسان بسبب تعدد الصيغة الصبغية.

أخلل وأضع الفرضيات:

وقد يحدث **التعدد الصبغي** لدى النوع نفسه ويسمى **الذاتي** من مثل طفرة الزهرة العملاقة في نبات الأوتوتيرا إذ يكون في النبات العادي ذي الأزهار الصغيرة ($2n = 14$) بينما في النبات الطافر كبير الأزهار ($4n = 28$) وقد يحدث لدى نوعين مختلفين أحياناً ويسمى **الخلطي** كمثال عن ذلك: الحصول على القمح الطري المستخدم في الخبز.

▼ ألاحظ الشكل الآتي الذي يوضح بعضاً من التبدلات البنيوية على الصبغي وأجيب عن الأسئلة:



1. في أي من الحالات السابقة يحدث ضياع للمورثات؟ وما تأثير ذلك على الفرد؟

2. أي من الحالات السابقة يغير الترتيب الخطي للمورثات؟

3. في نمط الانتقال ينتقل جزء من صبغي إلى آخر غير قرين نكن قد يحدث أحياناً انتقال صبغي بكامله والتحامه مع صبغي آخر غير قرين.

مثال: لدى بعض إنث البشر انتقل صبغي من الشفع 21 والتحم مع صبغي من الشفع 14 ليصبح عدد صبغيات الأنثى 45 وتعطي هذه الأنثى نملطين من الأعراس طبيعية وغير طبيعية مما قد يؤدي إلى ولادة أطفال مصابة بمتلازمة داون.

2. الاضطرابات على مستوى العدد الصبغي:

أ- حالة تعدد الصيغة الصبغية: يشمل الخلل في هذه الحالة صبغيات الأعراس $1n$ وفي حال تعدد الصيغة الصبغية يصبح عدد الصبغيات $3n$ أو $4n$.

وتكون معظم حالات الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل لدى الإنسان بسبب تعدد الصيغة الصبغية.

أخلل وأضع الفرضيات:

قد يحدث **التعدد الصبغي الذاتي** لدى النوع نفسه من مثل طفرة الزهرة العملاقة في نبات الأوتوتيرا إذ يكون في النبات العادي ذي الأزهار الصغيرة ($2n = 14$) بينما في النبات الطافر كبير الأزهار ($4n = 28$) وقد يحدث لدى نوعين مختلفين أحياناً ويسمى **التعدد الصبغي الخلطي** كمثال عن ذلك: الحصول على القمح الطري المستخدم في الخبز.

تتطلب الهندسة الوراثية:

1. ناقل وهو DNA حلقي من لإدخال المورثة المرغوبة يسمى
2. أنزيم لفتح البلاسميد و..... المورثة، أنظيم لربط DNA المورثة مع DNA البلاسميد.
3. جرثوم لإدخال البلاسميد للموئب.

أهم النواقل المستخدمة في الهندسة الوراثية:

1. البلاسميدات: جزيئات DNA حلقيه، توجد في بعض الجراثيم.
2. الفيروسات: تحوي جزيء DNA من مثل الفيروس أكل الجراثيم.
3. الكوزميدات: بلاسميدات مندمجة مع DNA الفيروسات.
4. نواقل صناعية: يتم تركيبها في المختبرات.

أحلل واستنتج تطبيقات مهمة لحياتنا في الهندسة الوراثية:

يعاني الكثير من الناس من الجوع فكيف تستطيع الهندسة الوراثية إطفام الجياح ومعالجة سوء التغذية والتقليل من مشكلة ضعف الرؤية.



- استطاع العلماء الحصول على الأرز الذهبي الذي ينتج كمية أكبر من البيتاكاروتين (وهذا ما يجعل لونه ذهبياً) مما يزيد كمية الفيتامين A (ما أهمية ذلك في الرؤية؟).



- يلجأ المزارعون إلى رش المبيدات الحشرية لزيادة الغلال ولكنها ضارة بالصحة وتلوث التربة والمياه الجوفية، ما الحل الذي تقدمها الهندسة الوراثية؟

تتطلب الهندسة الوراثية:

1. ناقل وهو DNA حلقي من لإدخال المورثة المرغوبة يسمى
2. أنظيم لفتح البلاسميد و..... المورثة، أنظيم لربط DNA المورثة مع DNA البلاسميد.
3. جرثوم لإدخال البلاسميد للموئب.

أهم النواقل المستخدمة في الهندسة الوراثية:

1. البلاسميدات: جزيئات DNA حلقيه، توجد في بعض الجراثيم.
2. الفيروسات: تحوي جزيء DNA من مثل الفيروس أكل الجراثيم.
3. الكوزميدات: بلاسميدات مندمجة مع DNA الفيروسات.
4. نواقل صناعية: يتم تركيبها في المختبرات.

أحلل واستنتج تطبيقات مهمة لحياتنا في الهندسة الوراثية:

يعاني الكثير من الناس من الجوع فكيف تستطيع الهندسة الوراثية إطفام الجياح ومعالجة سوء التغذية والتقليل من مشكلة ضعف الرؤية.



- استطاع العلماء الحصول على الأرز الذهبي الذي ينتج كمية أكبر من البيتاكاروتين (وهذا ما يجعل لونه ذهبياً) مما يزيد كمية الفيتامين A (ما أهمية ذلك في الرؤية؟).



- يلجأ المزارعون إلى رش المبيدات الحشرية لزيادة الغلال ولكنها ضارة بالصحة وتلوث التربة والمياه الجوفية، ما الحل الذي تقدمها الهندسة الوراثية؟




4 إن إدخال المورثة في المكان الصحيح أمر مهم، لكن الأهم كيف يمكن تفعيل أو كبح المورثة في الوقت والمكان المناسبين؟

5 بما أن خلايانا تمتلك المورثات ذاتها من الأبوين، لماذا تعبر خلايا القلب عن مورثاتها بشكل مختلف عن خلايا العين مثلاً؟

يتم ذلك من خلال التحكم بمعدل النسخ المورثي وذلك عن طريق بروتينات معينة بعضها ينشط عملية النسخ وبعضها يوقف عملية النسخ عن طريق التأثير على أنظيـم RNA بوليميراز.

الاحظ واستنتج: ▼ الاحظ الشكل الآتي واستنتج دور البروتينات في تنظيم عملية النسخ:



الخطى علاجية مستقبلية:

1. علاج الإيدز: عن طريق التعديل المورثي للخلايا التائية المساعدة، بحيث يتم تغيير المستقبلات النوعية للفيروس على غشاء الخلية المضيفة، فلا يتمكن من مهاجمتها.
2. تعديل الخلايا السرطانية: تنتج أحد عوامل النمو المنشطة للخلايا التائية للمقاومة للسرطان، مما يقوي الاستجابة المناعية ضد خلايا الورم.

هل تعلم


أن مركز إيكاردا للبحوث الزراعية في حلب لديه بنك للمورثات لأكثر من 150 ألف عينة تمثل الأصول الوراثية لمختلف الأنواع النباتية وقد نقل هذا البنك إلى منطقة Svalbard في شمال الترويج نتيجة الظروف التي تعاني منها سورية، وقد حصل الفانمون على نقلها والحفاظ عليها على جائزة مندل وذلك ضمن مراسم خاصة جرت في برلين.

4 إن إدخال المورثة في المكان الصحيح أمر مهم، لكن الأهم كيف يمكن تفعيل أو كبح المورثة في الوقت والمكان المناسبين؟

5 بما أن خلايانا تمتلك المورثات ذاتها من الأبوين، لماذا تعبر خلايا القلب عن مورثاتها بشكل مختلف عن خلايا العين مثلاً؟

يتم ذلك من خلال التحكم بمعدل النسخ المورثي وذلك عن طريق بروتينات معينة بعضها ينشط عملية النسخ وبعضها يوقف عملية النسخ عن طريق التأثير على أنظيـم RNA بوليميراز.

الاحظ واستنتج: ▼ الاحظ الشكل الآتي واستنتج دور البروتينات في تنظيم عملية النسخ:



الخطى علاجية مستقبلية:

1. علاج الإيدز: عن طريق التعديل المورثي للخلايا التائية المساعدة، بحيث يتم تغيير المستقبلات النوعية للفيروس على غشاء الخلية المضيفة، فلا يتمكن من مهاجمتها.
2. تعديل الخلايا السرطانية: تنتج أحد عوامل النمو المنشطة للخلايا التائية للمقاومة للسرطان، وتقوم هذه الخلايا نفسها بتفعيل الخلايا التائية التي تهاجمها مما يقوي الاستجابة المناعية ضد خلايا الورم.

هل تعلم


أن مركز إيكاردا للبحوث الزراعية في حلب لديه بنك للمورثات لأكثر من 150 ألف عينة تمثل الأصول الوراثية لمختلف الأنواع النباتية وقد نقل هذا البنك إلى منطقة Svalbard في شمال الترويج نتيجة الظروف التي تعاني منها سورية، وقد حصل الفانمون على نقلها والحفاظ عليها على جائزة مندل وذلك ضمن مراسم خاصة جرت في برلين.

- إذا علمت أن الصفتين غير مرتبطتين صنع تحليلاً وراثياً لهذه الهجونة (أليل ظهور القرون H والأليل غياب القرون h).

5. تزوج رجل سليم من مرض الضمور العضلي وزمرته الدموية (A) من فتاة لا تظهر عليها علام المرض وزمرتها الدموية (B)، فأنجبا ذكراً مصاباً بالمرض، وزمرته الدموية (O)، والمطلوب:

1. ما النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما المحتملة؟
2. ما احتمال إنجاب ذكر مصاب بالمرض زمرته الدموية (AB) من بين الأبناء؟ إذا علمت أن أليل الضمور العضلي (m) والأليل الصحة (M) (منوهين أن الضمور العضلي يصيب واحداً من كل 4000 ذكر وغالباً ما يموت المصابون قبل سن العشرين بمرض ذات الرئة).

6. تمثّل شجرة النسب المجاورة وراثية مرض مرتبط بالجنس. اجيب عن الأسئلة الآتية:




1. ما الصبغي الحامل لأليل المرض؟ علّل إجابتك.
2. هل أليل المرض راجح أم متنح؟ ولماذا؟
3. إذا علمت أن الأليل الراجح (A)، والأليل المتنح (a)، اكتب الأنماط الوراثية للأفراد: **I₁ ، I₂ ، II₁ ، II₂ ، II₃ ، II₄**
4. ما احتمال ولادة طفل ذكر مصاب من زواج **III₁** من رجل سليم؟

- إذا علمت أن الصفتين غير مرتبطتين صنع تحليلاً وراثياً لهذه الهجونة (أليل ظهور القرون H والأليل غياب القرون h).

5. تزوج رجل سليم من مرض الضمور العضلي وزمرته الدموية (A) من فتاة لا تظهر عليها علام المرض وزمرتها الدموية (B)، فأنجبا ذكراً مصاباً بالمرض، وزمرته الدموية (O)، والمطلوب:

1. ما النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما المحتملة؟
2. ما احتمال إنجاب ذكر مصاب بالمرض زمرته الدموية (AB) من بين الأبناء؟ إذا علمت أن أليل الضمور العضلي (m) والأليل الصحة (M) (منوهين أن الضمور العضلي يصيب واحداً من كل 4000 ذكر وغالباً ما يموت المصابون قبل سن العشرين بمرض ذات الرئة).


6. تمثّل شجرة النسب المجاورة وراثية مرض مرتبط بالجنس. اجيب عن الأسئلة الآتية:



1. ما الصبغي الحامل لأليل المرض؟ علّل إجابتك.
2. هل أليل المرض راجح أم متنح؟ ولماذا؟
3. إذا علمت أن الأليل الراجح (A)، والأليل المتنح (a)، اكتب الأنماط الوراثية للأفراد: **II₁ ، II₂ ، II₃ ، II₄**
4. ما احتمال ولادة طفل ذكر مصاب من زواج **III₁** من رجل سليم؟




▼ الأخط المخطط الآتي، وأستنتج أهمية التستوسترون في المرحلة الجنينية وعند البلوغ:



يعاني زوجان من مشكلة العقم لسنوات وبعد خضوعهما لفحوصات عديدة تبين أنه ليس لديهما موانع عضوية تمنع الإنجاب، وأخبرهما أحد أصدقائهما الأطباء بأن مشكلتهما قد تكون نفسية أو هرمونية. فما دور العوامل النفسية والهرمونية؟ وما علاقة البنى العصبية والغدد في القدرة الإخصابية؟
العلاقة بين الوطاء والغدة النخامية والخصيتين لدى الذكر:

▼ الأخط المخطط الآتي وأستنتج تأثير الوطاء والغدة النخامية في عمل الخصيتين:




▼ الأخط المخطط الآتي، وأستنتج أهمية التستوسترون في المرحلة الجنينية وعند البلوغ:



يعاني زوجان من مشكلة العقم لسنوات وبعد خضوعهما لفحوصات عديدة تبين أنه ليس لديهما موانع عضوية تمنع الإنجاب، وأخبرهما أحد أصدقائهما الأطباء بأن مشكلتهما قد تكون نفسية أو هرمونية. فما دور العوامل النفسية والهرمونية؟ وما علاقة البنى العصبية والغدد في القدرة الإخصابية؟
العلاقة بين الوطاء والغدة النخامية والخصيتين لدى الذكر:

▼ الأخط المخطط الآتي وأستنتج تأثير الوطاء والغدة النخامية في عمل الخصيتين:



ثم أجب عما يأتي:

1. تتخلص المنوية من معظم هيولاها، وتقتد النطفة الناضجة العديد من العضيات الهيولية، ما أهمية ذلك لوظيفة النطفة؟
2. ما العضيات التي تزود النطفة بالطاقة الضرورية لأداء عملياتها الحيوية؟ وأين تتوضع؟
3. ما الأجزاء الرئيسية التي تتكون منها النطفة؟

أضيف إلى معلوماتي

- يتكون ذيل النطفة من غمد ليفي حول سوط مؤلف من أنابيب دقيقة تتشأ من المريكز البعيد وهو السوط الوحيد لدى خلايا الإنسان، ما دوره؟
- تكون حركة النطفة ذاتية لولبية كحركة البرغي.



خلية حاضنة (سرولي)

يبدو في الأنابيب المنوية النشطة متطولة على شكل عمود سيتوبلاسمي يحمل نطافاً.

« أنظر الشكل المجاور الذي يمثل خلية حاضنة في أنبوب منوي نشط وفي الأنابيب المنوية الخاملة (خصية عقيمة أو ضامرة) تكون صغيرة وغير متطولة.

تقوم الخلايا الحاضنة بالوظائف الآتية:

1. مصدر غذائي للمنويات التي تتميز إلى نطاف.
2. تسهم في تشكيل الحاجز التنموي الخصوي الذي يمنع وصول مواد ضارة إلى الخصية، ويمنع خلايا جهاز المناعة من مهاجمة النطاف؛ لأن غشاء النطفة يمتلك مولدات ضد خاصة لا توجد في أغشية الخلايا الجسمية الأخرى؛ لذلك يتم التعرف إليها على أنها مواد غريبة.
3. بلعمة الهيولى المفقودة من المنويات التي تتميز إلى نطاف.

الوسائل المنوي:

ويستى السائل الذي تسبح فيه النطاف سائلاً منوياً يتكون من مفرزات الغدد الملحقة بجهاز التكاثر الذكري و10% نطاف، ويكون عدد النطاف لدى الذكور البالغين الأسوياء ما بين (20 - 100) مليون نطفة / مل، وإذا قلّ العدد عن 20 مليون نطفة / مل يكون الذكر في حالة عقم فيزيولوجي غالباً.

ثم أجب عما يأتي:

1. تتخلص المنوية من معظم هيولاها، وتقتد النطفة الناضجة العديد من العضيات الهيولية، ما أهمية ذلك لوظيفة النطفة؟
2. ما العضيات التي تزود النطفة بالطاقة الضرورية لأداء عملياتها الحيوية؟ وأين تتوضع؟
3. ما الأجزاء الرئيسية التي تتكون منها النطفة؟

أضيف إلى معلوماتي

- يتكون ذيل النطفة من غمد ليفي حول سوط مؤلف من أنابيب دقيقة تتشأ من المريكز البعيد وهو السوط الوحيد لدى خلايا الإنسان، ما دوره؟
- تكون حركة النطفة ذاتية لولبية كحركة البرغي.



خلية حاضنة (سرولي)

يبدو في الأنابيب المنوية النشطة متطولة على شكل عمود سيتوبلاسمي يحمل نطافاً.

« أنظر الشكل المجاور الذي يمثل خلية حاضنة في أنبوب منوي نشط وفي الأنابيب المنوية الخاملة (خصية عقيمة أو ضامرة) تكون الخلايا الحاضنة صغيرة وغير متطولة.

تقوم الخلايا الحاضنة بالوظائف الآتية:

1. مصدر غذائي للمنويات التي تتميز إلى نطاف.
2. تسهم في تشكيل الحاجز التنموي الخصوي الذي يمنع وصول مواد ضارة إلى الخصية، ويمنع خلايا جهاز المناعة من مهاجمة النطاف؛ لأن غشاء النطفة يمتلك مولدات ضد خاصة لا توجد في أغشية الخلايا الجسمية الأخرى؛ لذلك يتم التعرف إليها على أنها مواد غريبة.
3. بلعمة الهيولى المفقودة من المنويات التي تتميز إلى نطاف.

الوسائل المنوي:

ويستى السائل الذي تسبح فيه النطاف سائلاً منوياً يتكون من مفرزات الغدد الملحقة بجهاز التكاثر الذكري و10% نطاف، ويكون عدد النطاف لدى الذكور البالغين الأسوياء ما بين (20 - 100) مليون نطفة / مل، وإذا قلّ العدد عن 20 مليون نطفة / مل يكون الذكر في حالة عقم فيزيولوجي غالباً.





وزارة التعليم
Ministry of Education

كراسة النشاط المنزلي

لُغَتِي

للفص الأول الابتدائي
الفصل الدراسي الأول

اسم الطالب :

الفصل :

المدرسة :

تصميم وإعداد

أ / عبدالرحمن عواد الشمري

حائل ١٤٤٣ هـ



لُغَتِي

م
ل
ن
ب.
د
ر

الوحدة ١
أسرتي



حرف الميم :



ألون حرف الميم



أنطق الحرف بحركته ثم ألونه



أنطق اسم الصورة ثم ألونها



أنطق وأكتب بخط جميل :

في آخر الكلمة

في وسط الكلمة

في أول الكلمة

الحرف بحركاته الثلاثة

م

م

م

م

م

م

م

أنطق الحرف مع المد ، ثم أعيد كتابة المقطع :

مي

مو

ما

.....

.....

.....



مِيزَان



مَوْز



ارسم دائرة حول حرف الميم فقط :





ث م ح م ل م ح م ج م ح

أرسم دائرة حول حرف الميم فقط في الكلمات الآتية :


نمل	مدح	حلم	قيام	أحمد	صوم	مريم	أمي	مدرسة	رمان
-----	-----	-----	------	------	-----	------	-----	-------	------

صل بين حرف (م) في الكلمة وحرف الميم حسب شكله :


نجوم	مصباح	قلم	تمر	مظلة	رمان
------	-------	-----	-----	------	------



اكتب حرف (م) الذي يشتمل عليه اسم الصورة وانتبه لموقعه في الكلمة :




تُو.....



صُبَاَح.....




جَد.....ل



لَح.....

حرف الباء :


ألون حرف الباء



أنطق الحرف بحركته ثم ألونه



انطق اسم الصورة ثم ألونها



أكتب بخط جميل:

في آخر الكلمة		في وسط الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
بُ	ب	بِ	بَ	ب	بُ	بَ
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع المد ، ثم أعيد كتابة المقطع :

بي	بُو	بَا
.....



بُرْتُقَال



بَاب

ب

ارسم دائرة حول حرف الباء فقط ، ثم انطقه مع حركته :





بُ حُ قِ سَبَّ حُ بِرْ جِ حُ نُبْ

ارسم دائرة حول حرف الباء فقط في الكلمات الآتية :

باب	برتقال	كبير	دب	يلعب	برميل	أبي
-----	--------	------	----	------	-------	-----

صل بين حرف (ب) في الكلمة وحرف الباء في الأسفل حسب شكله :

كتاب	أصبح	يصب	بكى	يشرب
------	------	-----	-----	------



أكتب (حرف الباء) الناقص في كل كلمة مما يأتي وأنتبه لموقعه في الكلمة :

.....رميل

طبي.....

مضاح.....

حرف اللام :


ألون حرف اللام

ل

أنطق الحرف بحركته ثم ألونه

لِيمُون

انطق اسم الصورة ثم ألونها




أكتب بخط جميل :

ل ل ل ل


في أول الكلمة		في وسط الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع المد ، ثم أعيد كتابة المقطع :

لي	لؤ	لا
.....



لِسَان



لَيْمُون



ارسم دائرة حول حرف اللام فقط ثم نطقه بحركته :





كُ خ لُ مَ نَ لِ مُمُ كِ مِ لِ

ارسم دائرة حول حرف اللام فقط في الكلمات الآتية :

نمل	يأكل	مظلة	يسيل	كلب	صوم	فيل	سأل	سلم	لعب
-----	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

صل بين حرف (ل) في الكلمة وحرف اللام حسب شكله :

ملف	عادل	قلم	علم	عسل	ليمون
-----	------	-----	-----	-----	-------



أكتب (حرف اللام) الناقص في كل كلمة مما يأتي وأنتبه لموقعه في الكلمة :

سَ.....يَمُّ

حُلُو.....


عَبَ.....

حرف الدال :

ألون حرف الدال



أنطق الحرف بحركته ثم ألونه



انطق اسم الصورة ثم ألونها



أكتب بخط جميل :


في أول الكلمة		في وسط الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
د	د	د	د	د	د	د
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع المد ، ثم أعيد كتابة المقطع :

دي	دو	دا
.....



دُب



دَجَاغَة



ارسم دائرة ○ حول حرف الدال فقط ثم انطقه بحركته :



دِ حِ حُ دَ حَ حِ دُ ذِ حُ دُ

أرسم دائرة ○ حول حرف الدال فقط في الكلمات الآتية :

مفيد	أحمد	دخل	جدي	حديد	سند	يد	دقيقة
------	------	-----	-----	------	-----	----	-------

صل بين حرف (د) في الكلمة وحرف الدال حسب شكله :

درج	وجد	ضفدع	يدخل	دفع
-----	-----	------	------	-----



أكتب (حرف الدال) الناقص في كل كلمة مما يأتي وأنتبه لموقعه في الكلمة :


ي... وُر

سَعي...

خَل...

حرف النون :



ألون حرف النون



أنطق الحرف بحركته ثم ألونه



انطق اسم الصورة ثم ألونها



أكتب بخط جميل:


في أول الكلمة		في وسط الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
نُ	نِ	نْ	نَ	نِ	نُ	نَ
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع المد ، ثم أعيد كتابة المقطع :

نِي	نُو	نَا
.....



نُجُوم



نَحْلَة

ن

ارسم دائرة حول حرف النون فقط ثم انطقه مع حركته :





عُ نِ نٌ تَ ثِ عِ جِ نِ نِ نِ

ارسم دائرة حول حرف النون فقط في الكلمات الآتية :

فن	ينظف	نمر	نجمة	منزل	ألوان	نام
----	------	-----	------	------	-------	-----

صل بين حرف (ن) في الكلمة وحرف النون حسب شكله :

بستان	نمشي	يتجمعن	مصنع	حصان	نحلة
-------	------	--------	------	------	------



أكتب (حرف النون) الناقص في كل كلمة مما يأتي وأنتبه لموقعه في الكلمة :

يُ.....يرُ

يُ.....ظُفُّ

وُ.....ورُ

حرف الراء :


ألون حرف الراء

ر

أنطق الحرف بحركته ثم ألونه

رَمَان

انطق اسم الصورة ثم ألونها



أكتب بخط جميل:


في أول الكلمة		في وسط الكلمة		في آخر الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع المد ، ثم أعيد كتابة المقطع :

ري	رُو	رَا
.....



رُمان



رأس



ارسم دائرة حول حرف لراء فقط، ثم انطقه مع حركته :



ر ن س د ت ر ق ر ب د

ارسم دائرة حول حرف الراء فقط في الكلمات الآتية :

رسم	رأس	يمر	دار	مرفوع	يجري	رفع
-----	-----	-----	-----	-------	------	-----

صل بين حرف (ر) في الكلمة وحرف الراء حسب شكله :

حمار	تأخر	يرجع	رحل
------	------	------	-----



أكتب (حرف الراء) الناقص في كل كلمة مما يأتي وأنتبه لموقعه في الكلمة :

مَجْرُوء.....

فَع.....

يُ.....يدُ

تطبيقات ١

اقرأ الحروف التالية بأصواتها القصيرة (الفتحة - الكسرة - الضمة):

مَ	رِ	لَ	نِ	دَ	بُ
مُ	لِ	دِ	بِ	لُ	دُ
نَ	بَ	نُ	رَ	مِ	رُ

اقرأ الحروف التالية بأصواتها الطويلة (حروف المد):

حروف المد ثلاثة هي: ا - و - ي

مَآ	دُو	مُو	بَا	رُو	تُو
مَآ	نَا	رَا	دَا	دِي	مِي
لِي	نِي	بُو	تُو	رِي	بِي

الحروف بأشكالها المختلفة حسب موقعها في الكلمة:

أول الكلمة	وسط الكلمة	آخر الكلمة
مَ	مَ	مَ
بَ	بَ	بَ
لَ	لَ	لَ
دَ	دَ	دَ
نَ	نَ	نَ
رَ	رَ	رَ

تطبيقات ٢






أقوم بالتهجئة الصحيحة ثم اقرأ الكلمة وأعيد كتابتها :

بَانَ	نَامَ	لَبِنُ	رَدَمَ	بَرَدَ
.....

أحلل الكلمة إلى حروف ومقاطع ، ثم أعيد كتابتها وأقرأها كما هو في المثال :

لَبِنُ	ن	بَ	ل	لَبِنُ
.....	بَدَل
.....	نَدِمَ

أكمل الحرف الناقص في الكلمات التالية :

				
.....يكيُمُونارطَةسُجِد

كوّن كلمات من الحروف الآتية :

مَ نَ دِ	سَ دَ رَ
.....

الوحدة ٢
مَدْرَسَتِي

ص
س
ت
فا
قق
ح



حرف الصاد :


ألون حرف الصاد

حَد

أنطق الحرف بحركته ثم ألونه

صَارُوح

انطق اسم الصورة ثم ألونها



أكتب بخط جميل:

حَد حَد حَص حَص حَص حَص

في أول الكلمة		في وسط الكلمة		في آخر الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
حَا	حَـ	حُـ	حِـ	حُـ	حِـ	حَا	حُـ	حِـ
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع الحركات والمدود:

حَا	حِـ
حُـ	حِـ
حِـ	حِـ

أقرأ المقطع الصوتي الساكن :

بَصْ — لِصْ — نُصْ



صُوص



صَقْر

ص

ارسم دائرة حول حرف الصاد فقط :

م ط ص س ص ع ج ص ن

أرسم دائرة حول حرف الصاد فقط في الكلمات الآتية :

يقص	مصر	فحص	يصيد	صوص	صاد
-----	-----	-----	------	-----	-----

صل بين حرف (ص) في الكلمة وحرف الصاد حسب شكله :


باص	مقص	مصنع	حصان	صفحة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

أضع السكون فوق حرف الصاد ثم أنطق المقطع الساكن فيما يأتي :

نُص	لِص	فَص
-----	-----	-----

حرف الفاء :

ألون حرف الفاء	أنطق الحرف بحركته ثم ألونه	انطق اسم الصورة ثم ألونها
		



أكتب بخط جميل:

الحرف بحركاته الثلاثة			في أول الكلمة	في وسط الكلمة	في آخر الكلمة
					
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع الحركات والمدود:


فَا	فَا
فُو	فُو
فِي	فِي

أقرأ المقطع الصوتي الساكن :

صَفْ — مِفْ — نِفْ



فَأَس



فَرَّاشَةٌ

ف

ارسم دائرة حول حرف الفاء فقط ، ثم أنطق الحرف مع حركته :



فِ نَ فُ فَا غِ عَ جُ نِ بَ فَ

أرسم دائرة حول حرف الفاء فقط في الكلمات الآتية :





فن	أنف	خلف	فوق	يقفز	فيل	فاز
----	-----	-----	-----	------	-----	-----

صل بين حرف (ف) في الكلمة وحرف الفاء حسب شكله :

ظرف	طفل	مفتاح	زرافة	كف	فراشة
-----	-----	-------	-------	----	-------



أضع السكون فوق حرف الفاء ثم أنطق المقطع الساكن فيما يأتي :



حرف السين :

ألون حرف السين

س

أنطق الحرف بحركته ثم ألوئه

سَيَّارَةٌ

انطق اسم الصورة ثم ألوئها



س س س س

أكتب بخط جميل:


في أول الكلمة		في وسط الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
س	س	س	س	س	س	س
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع الحركات والمدود:

سَا	سَ
سُو	سُ
سِي	سِ

أقرأ المقطع الصوتي الساكن :

نَسْ — مَسْ — بُسْ



سَمَكَة



سَاعَة

س

ارسم دائرة حول حرف السين فقط ، ثم أقرأه بحركته :





سَ سِ سٍ سٌ سَقِ مٌ بَ سِدِ صِ سَسِ

ارسم دائرة حول حرف السين فقط في الكلمات الآتية :




مسجد	شمس	جرس	سهر	جلس	سلة	سيف
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

صل بين حرف (س) في الكلمة وحرف السين حسب شكله :

يسير	جرس	يجلس	رأس	سأل	بستان
------	-----	------	-----	-----	-------



ضع السكون فوق حرف السين ثم أنطق المقطع الساكن فيما يأتي :



حرف القاف :


ألون حرف القاف

ق

أنطق الحرف بحركته ثم ألونه

قَطَار

انطق اسم الصورة ثم ألونها



ق ق ق ق

أكتب بخط جميل:

في أول الكلمة		في وسط الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع الحركات والمدود:


قَا	قَ
قُو	قُ
قِي	قِ

أقرأ المقطع الصوتي الساكن :

سَقْ — لِقْ — ثَقْ



قَمْح



قَلَم

ق

ارسم دائرة ○ حول حرف القاف فقط، ثم انطقه مع حركته :

عَ قَ نُ سَ قُ فَ قِ حِ نُ

ارسم دائرة ○ حول حرف القاف فقط في الكلمات الآتية :


يقفز	قفز	قط	وقف	قطار	دقيق	مقص
------	-----	----	-----	------	------	-----

صل بين حرف (ق) في الكلمة وحرف القاف حسب شكله :

حريق	قلم	ساق	يقراً	فريق	قلب
------	-----	-----	-------	------	-----




ضع السكون فوق حرف القاف ثم أنطق المقطع الساكن فيما يأتي :



حرف التاء :


ألون حرف التاء



أنطق الحرف بحركته ثم ألونه

تَفَا حَة

انطق اسم الصورة ثم ألونها



ت ت ت

أكتب بخط جميل:

في آخر الكلمة			في وسط الكلمة		في أول الكلمة			الحرف بحركاته الثلاثة		
هَ	ةَ	تِ	تُ	تَ	تِ	تُ	تَ			

أضع خطأً واحدًا تحت التاء المفتوحة - وخطين تحت التاء المربوطة

سَاحَة	بَيْت	قِصَة
حَدِيقَة	تُوت	فَرِحْتُ



تفاح



تمر



ارسم دائرة حول حرف التاء فقط ، ثم انطقه بحركته :


تَ نَ نُ نِ رَ بُ بَ تِ تِ نِ نِ

ارسم دائرة حول حرف التاء فقط في الكلمات الآتية :


فن	مفتاح	يرتب	تفاح	تنازل	ابتسم	توفيق
----	-------	------	------	-------	-------	-------

صل بين حرف (ت) في الكلمة وحرف التاء حسب شكله :

تسلق	بيت	شجرة	يتجمعن	برتقال	مدينة	كتب
------	-----	------	--------	--------	-------	-----




ضع السكون فوق حرف التاء ثم أنطق المقطع الساكن فيما يأتي :










حرف الحاء :

ألون حرف الحاء	أنطق الحرف بحركته ثم ألونه	انطق اسم الصورة ثم ألونها
	حَصَان	



أكتب بخط جميل:

في آخر الكلمة		في وسط الكلمة		الحرف بحركاته الثلاثة		
						
.....
.....
.....

أنطق الحرف مع الحركات والمدود:

حَا	حَ
حُو	حُ
حِي	حِ

أقرأ المقطع الصوتي الساكن :

صَحْ — مِحْ — بُحْ

تطبيقات ١

اقرأ الحروف التالية بأصواتها القصيرة (الفتحة - الكسرة - الضمة) :

صَ	حَ	تَ	فَ	قَ	حَ
سَ	قُ	تَ	فِ	قِ	سِ
سُ	صُ	تُ	فُ	صِ	حُ

اقرأ الحروف التالية بأصواتها الطويلة (حروف المد) :

حروف المد ثلاثة هي : ا - و - ي

صَا	حِي	تِي	فَا	قَا	حَا
سَا	قُو	تَا	فِي	قِي	سِي
سُو	صُو	تُو	فُو	صِي	حُو

الحروف بأشكالها المختلفة حسب موقعها في الكلمة :

أول الكلمة	وسط الكلمة	آخر الكلمة
صَ	صَ	صَ
فَ	فَ	فَ
سَ	سَ	سَ
قَ	قَ	قَ
تَ	تَ	تَ
حَ	حَ	حَ

تطبيقات ٢

اقرأ المقاطع الساكنة :

فَمَ	سَدَ	نِتَ	صَلَّ	رَفَ
دُبَّ	بُرَّ	فَصَّ	رَفَّ	حَبَّ






أقوم بالتهجئة الصحيحة ثم اقرأ الكلمة وأعيد كتابتها :

لَبِسَ	فُتِحَ	رَسَمَ	صَامَ	دَرَسَ
.....
قَصَرَ	لَصِقَ	تَحَمَلُ	فَرِحَتْ	صُدِمَ
.....

أحلل الكلمة إلى حروف ومقاطع ، ثم أعيد كتابتها وأقرأها كما هو في المثال :

.....	فُصُول
.....	مُدِير
.....	مَسْرَح

أكمل الحرف الناقص في الكلمات التالية :

				
.....رَاشَةٌارُوخٌصَانٌظَارٌمَكَّةٌ