




# نوطة فورنيكس



الوراثة

## في علم الأحياء الثالث الثانوي العلمي

التعلم البصري:

يعتمد أسلوب التعلم البصري السريع  
لمادة العلوم.

التكامل:

كل فقرة هي وحدة متكاملة  
بذاتها، تجمع بين فهم المعلومة  
وحفظها والتدريب على أسئلتها.

إعداد المدرس  
د. حازم ضعيف



٢٠٢٤

## محتويات نوطة فورنيكس لمادة العلوم:



تجزئة كل درس إلى فقراته، بحيث أصبحت كل فقرة منسقة في جدول واحد يحوي:

- جميع المعلومات بخصوص هذه الفقرة من الكتاب + دليل المعلم.
- تجزئة المعلومات وتلوينها مع وضع خط تحت كل كلمة يمكن استخراج سؤال منها.
- تجميع المعلومات المشتتة في جداول لسهولة الوصول لها والمقارنة.
- الإشارة إلى جميع الأسئلة الواردة في الدورات من عام 2013 إلى عام 2023
- إرفاق الصور المتعلقة بها من الكتاب.
- إضافة صور خارجية لتوضيح الأفكار والآليات غير المفهومة جيدًا في الكتاب.
- الإشارة إلى الصور المطلوب حفظ مسمياتها والصور المطلوب رسمها.
- استخراج المعلومات التي بين السطور وإظهارها بشكل معلومات أو جداول واضحة.
- بأخر كل فقرة قسم يحوي معظم الأسئلة الامتحانية التي قد تأتي من هذه الفقرة ويمكن الإجابة عليها جميعها من المعلومات في الجدول بسهولة.

**يكون ترتيب كل فقرة كما يلي:**

<b>هنا: عنوان الفقرة</b>	
<b>هنا:</b> قسم الرسومات فقط الرسومات المكتوب بجانبها إشارة * مطلوب حفظ مسمياتها, أما ما تبقى من صور بدون إشارة فهي إما من الكتاب ولكن فقط للفهم أو خارجية من المدرس لتوضيح الفكرة بالنسبة للرسومات المحتمل أن يُطلب من الطالب رسمها تم إضافة عبارة <b>(ارسم) فوقها</b>	<b>هنا:</b> جميع المعلومات بخصوص هذه الفقرة بشكل منظم ووضع خط تحت أي كلمة توحى بسؤال (حدد موقع – اذكر وظيفة – ماذا ينتج عن – فسر – رتب – كيف)....
<b>هنا:</b> معظم الأسئلة التي قد تأتي من الفقرة السابقة	

توجد فيديوهات توضيحية هامة لمعظم الدروس تشرح بعض الفقرات بأمثلة ولقطات من الواقع لا تنس عزيزي الطالب مشاهدتها, ولا تنس حل نموذج الامتحان الخاص بكل درس.

يتم نشر الفيديوهات والمذكرات عبر مجموعاتي على واتس أب  
قم بطلب الانضمام عبر مراسلتي على الواتس حصرًا على الرقم: 0942249948



تم تقسيم النوطة إلى عدة أقسام لسهولة الطباعة:

- 1- **الجزء 1:** يشمل: الجهاز العصبي
- 2- **الجزء 2:** يشمل: المستقبلات
- 3- **الجزء 3:** يشمل: التنسيق الهرموني
- 4- **الجزء 4:** يشمل: التكاثر لدى الكائنات
- 5- **الجزء 5:** يشمل: التكاثر لدى الإنسان
- 6- **الجزء 6:** يشمل: الوراثة



لتحميل أي جزء من الأجزاء من قناة  
التجرام للمدرس حازم ضعيف:  
<https://t.me/science12hazem>



**توضيح:**

اسم النوطة مأخوذ من عضو في المخ هو مثلث المخ (*Fornix*) والذي له دور هام في الإدراك والتذكر, وهي نفس الوظيفة التي تم إعداد نوطة فورنيكس لها.

# قسم الوراثة



## الدرس (١): تجارب مندل في الوراثة


## مقدمة



- ألاحظ سبب التشابه والاختلاف بين الأحياء.  
- أتساءل لماذا تشبه الأبناء آباءها ببعض الصفات وتختلف عنها بصفات أخرى؟  
تمت الإجابة على هذه التساؤلات من خلال:  
**علم الوراثة Genetics**

يرتبط علم الوراثة بالعلوم الحيوية الأخرى مثل:

- علم الأحياء
- الكيمياء الحيوية
- الأحياء الدقيقة
- الهندسة الوراثية
- علم الأمراض الوراثية البشرية
- العلوم الصيدلانية



مؤسس علم الوراثة:  
العالم مندل

أجرى دراسته على:  
نبات البازلاء

(فيالنتيجة:)

استنتج من خلال ذلك القوانين الأساسية في توريث الصفات

مادة علم الأحياء

- ١- ما هي العلوم التي ترتبط بعلم الوراثة؟
- ٢- من هو مؤسس علم الوراثة؟
- ٣- ما هو النبات الذي أجرى عليه مندل دراسته؟
- ٤- ماذا نتج عن دراسة مندل لنبات البازلاء؟

## أنواع السلالات

**الهجونة:** عملية تزاوج بين سلالتين إما صافيتين، أو هجينتين من نوع واحد، تختلفان بشفع واحد (هجونة أحادية) أو أكثر من الصفات الوراثية المتقابلة.

**السلالة الصافية:**

مجموعة من أفراد النوع الواحد تتماثل بصفة وراثية واحدة أو أكثر، يعطي التزاوج فيما بينها أفراداً تماثل الآباء من حيث الصفة المدروسة.

**فسر:**



الأزهار في الصورتين المجاورتين هي من سلالة صافية. ج- لأن التزاوج فيما بينها يعطي أفراداً تماثل الآباء من حيث الصفة المدروسة.

**السلالة الهجينة:**

مجموعة من أفراد النوع الواحد تتماثل بصفة وراثية واحدة أو أكثر، يعطي التزاوج فيما بينها أفراداً بعضها مماثل للآباء، وبعضها الآخر يختلف من حيث الصفة المدروسة.

**فسر:**

الأزهار في الصورة المجاورة هي من سلالة هجينة. ج- لأن التزاوج فيما بينها يعطي التزاوج فيما بينها أفراداً بعضها مماثل للآباء، وبعضها الآخر يختلف من حيث الصفة المدروسة.



- ١- **اكتب المصطلح:** مجموعة من أفراد النوع الواحد تتماثل بصفة وراثية واحدة أو أكثر، يعطي التزاوج فيما بينها أفراداً تماثل الآباء من حيث الصفة المدروسة.
- ٢- **اكتب المصطلح:** مجموعة من أفراد النوع الواحد تتماثل بصفة وراثية واحدة أو أكثر، يعطي التزاوج فيما بينها أفراداً بعضها مماثل للآباء، وبعضها الآخر يختلف من حيث الصفة المدروسة
- ٣- (صورة ثم سؤال): **فسر:** الأزهار في الصورة المجاورة هي من سلالة هجينة (أو صافية)

## استعمال الرموز والتحليل الوراثي

تتمثل الصفة بنمطين: نمط ظاهري - نمط وراثي

## النمط الظاهري

التعريف الشكل الظاهر للصفة

التعريف


يعبر عنه بـ: بكلمة  
مثل:  
(طويل - قصير -  
أحمر - أبيض)

التعبير عنه

## النمط الوراثي

هو التركيب الوراثي للفرد  
أو الكائن المسؤول عن إظهار  
الصفات

يعبر عنه بـ: أحرف

تم الاتفاق عالمياً على إعطاء  
الحرف الأول من الكلمة الأجنبية  
الدالة على الصفة الوراثية  
المدرسة؛ على أن يكون:

متماثل اللواقح = AA

متماثل اللواقح = bb


مختلف اللواقح = Cc

ثلاثة أشعاع  
من المورثات  
تحتل ثلاثة  
مواقع مختلفة

الصفة المتنحية	الصفة الراجحة
حرف صغير مثل: (a)	حرف كبير مثل: (A)

تتمثل كل مورثة بوجود عاملين (أليلين قرينين):

- أحدهما مورث من الأب
- والثاني مورث من الأم



متماثل اللواقح

متخالف اللواقح

أنواع الأنماط الوراثية:

- نمط وراثي متماثل اللواقح (سلالة صافية)
- نمط وراثي متخالف اللواقح (سلالة هجينة)

الفرق بين الصفة الراجحة والمنتحية:

## الصفة المتنحية

## الصفة الراجحة



حرف صغير  
مثل: (a)حرف كبير  
مثل: (A)

الحرف

من سلالة صافية دائماً

لها نمطان وراثيان:


- إما سلالة صافية (فرد متماثل اللواقح)
- أو سلالة هجينة (فرد متخالف اللواقح)

النمط  
الوراثي٤- قارن بين الصفة الراجحة والمنتحية من حيث الحرف -  
النمط الوراثي.


- ١- قارن بين النمط الظاهري والنمط الوراثي من حيث: التعريف - التعبير عنه.
- ٢- مم تتألف المورثة وما مصدر كل من هذه الأقسام؟
- ٣- ما هي أنواع الأنماط الوراثية.

## خطوات العمل عند مندل على نبات البازلاء


خطوات العمل عند مندل على نبات البازلاء للحصول على النتائج المطلوبة:  
راقب مندل توريث الصفات المتقابلة، المتعلقة بصفة لون الزهرة في نبات البازلاء.




**المرحلة الأولى:**  
تأبير ذاتي للحصول على سلالات صافية



**المرحلة الثانية:**  
تأبير غير ذاتي (تصالبي - خلطي)



**المرحلة الثالثة:**  
تأبير ذاتي (لأفراد الجيل الأول)



**المرحلة الرابعة:**  
تأبير ذاتي (لأفراد الجيل الثاني)


١- ما هي خطوات العمل عند مندل على نبات البازلاء



## المرحلة الأولى (١)

المرحلة الأولى: تأبير ذاتي للحصول على سلالات صافية

التطبيق العملي			النظري
أزهار بيضاء (صافية) × أزهار بيضاء (صافية)	أزهار أرجوانية (صافية) × أزهار أرجوانية (صافية)	النمط الظاهري للأبوين P	
$pp \times pp$	$PP \times PP$	النمط الوراثي للأبوين P	
$\frac{1}{1} p \times \frac{1}{1} p$	$\frac{1}{1} P \times \frac{1}{1} P$	احتمال أعراس الأبوين P	كيف تأكد مندل أن السلالات صافية؟ تركها ليتم التأبير ذاتياً لأجيال عدة كل منها على حدة، للتأكد من أنها سلالات صافية أطلق عليها: الأبوين Pa: (Parental) فكانت جميع الأزهار الأبناء بلون مطابق للون الأزهار الآباء
$\frac{1}{1} pp$	$\frac{1}{1} PP$	النمط الوراثي للجيل الأول F1	
أزهار بيضاء (صافية)	أزهار أرجوانية (صافية)	النمط الظاهري للجيل الأول F1	



د. حازم ضيف

١- كيف تأكد مندل أن السلالات صافية؟

## المرحلة الثانية (٢)

المرحلة الثانية: تأبير غير ذاتي (تصالبي-خلطي)  
قام مندل بإجراء التهجين بين الأبوين ليحصل على الجيل الأول

التطبيق العملي		النظري		
	<p>النمط الظاهري للأبوين P</p> <p>أزهار بيضاء × أزهار أرجوانية</p>	<p>١- قطع أسدية أزهار النباتات الأرجوانية قبل نضجها (فسر):</p> <p>لمنع التأبير الذاتي للأزهار الأرجوانية</p>	<p>١- قطع أسدية أزهار النباتات الأرجوانية قبل نضجها</p> <p>١</p>	
	<p>النمط الوراثي للأبوين P</p> <p>PP × pp</p>	<p>٢- نقل حبات الطلع من مآبر أسدية النباتات البيضاء الأزهار إلى مياسم النباتات الأرجوانية الأزهار (ما نوع التأبير؟) تأبير خلطي</p>	<p>٢- نقل حبات الطلع من مآبر أسدية النباتات البيضاء الأزهار إلى مياسم النباتات الأرجوانية الأزهار (ما نوع التأبير؟) تأبير خلطي</p>	<p>٢- نقل حبات الطلع من مآبر أسدية النباتات البيضاء الأزهار إلى مياسم النباتات الأرجوانية الأزهار (ما نوع التأبير؟) تأبير خلطي</p>
	<p>احتمال أعراس الأبوين P</p> <p><math>\frac{1}{1} P \times \frac{1}{1} p</math></p>	<p>النمط الوراثي للجيل الأول F1</p> <p><math>\frac{1}{1} Pp</math></p>	<p>٣- تحول المبيض إلى قرن بازلاء (ثمرة)</p>	<p>٣- تحول المبيض إلى قرن بازلاء (ثمرة)</p>
	<p>النمط الظاهري للجيل الأول F1</p> <p>كلها أزهار أرجوانية</p>	<p>٤- زرع مندل البذور الناتجة: كانت أزهار نباتات الجيل الأول جميعها أرجوانية اللون أطلق عليها: أفراد الجيل الأول First Filial Generation (F1)</p> <p>اختفت صفة اللون الأبيض للأزهار ظاهرياً في الجيل الأول.</p> <p>أجرى أيضاً تهجيناً معاكساً في تجارب لاحقة؛ فحصل على النتائج نفسها،</p>	<p>٤- زرع مندل البذور الناتجة: كانت أزهار نباتات الجيل الأول جميعها أرجوانية اللون أطلق عليها: أفراد الجيل الأول First Filial Generation (F1)</p> <p>اختفت صفة اللون الأبيض للأزهار ظاهرياً في الجيل الأول.</p> <p>أجرى أيضاً تهجيناً معاكساً في تجارب لاحقة؛ فحصل على النتائج نفسها،</p>	<p>٤- زرع البذور الناتجة عن المتصالب</p> <p>٥- جمع نباتات الجيل الأول أزهارها أرجوانية</p> <p>١٠٠% أرجوانية (F<sub>1</sub>)</p>

- ١- عدد خطوات المرحلة الثانية من تجارب مندل (مرحلة التأبير غير الذاتي/الخلطي/التصالبي).
- ٢- فسر: قطع مندل أسدية أزهار النباتات الأرجوانية قبل نضجها.
- ٣- ما نوع التأبير عندما يكون بين زهرتين مختلفتين؟

## المرحلة الثالثة (٣)

## المرحلة الثالثة: تآبير ذاتي (لأفراد الجيل الأول)

التطبيق العملي				النظري	
أزهار أرجوانية × أزهار أرجوانية				ترك مندل نباتات الجيل الأول أرجوانية الأزهار تتآبير ذاتياً (كل على حدة) حتى مرحلة تشكل البذور	
النمط الظاهري للجيل الأول F1				قام بزراعة البذور المتشكلة	
النمط الوراثي للجيل الأول F1				فأعطت نباتات أرجوانية وأخرى بيضاء الأزهار، بنسبة 4/3 أرجوانية الأزهار و 4/1 بيضاء الأزهار تقريباً	
احتمال أعراس الجيل الأول F1				أطلق عليها: أفراد الجيل الثاني	
$(\frac{1}{2}P + \frac{1}{2}p) \times (\frac{1}{2}P + \frac{1}{2}p)$				Second Filial (F2) Generation	
$\frac{1}{4}PP$	$+\frac{1}{4}Pp$	$+\frac{1}{4}Pp$	$+\frac{1}{4}pp$	التنمط الوراثي للجيل الثاني F2	
أزهار أرجوانية	أزهار أرجوانية	أزهار بيضاء		النمط الظاهري للجيل الثاني F2	
<p>تآبير ذاتي</p> <p>100% أرجوانية</p> <p>النسبة: 3:1</p>				<p>أطلق عليها: أفراد الجيل الثاني</p> <p>Second Filial (F2) Generation</p>	

١- عدد خطوات التآبير الذاتي لأفراد الجيل الأول التي قام بها مندل.

د.حازم ضيف

مادة علم الأحياء

## المرحلة الرابعة (٤)

## المرحلة الرابعة: تأبير ذاتي (لأفراد الجيل الثاني)

## النظري

ترك مندل نباتات الجيل الثاني تتأبر ذاتياً (كل على حدة) حتى مرحلة تشكل البذور

قام بزراعة البذور المتشكلة  
لاحظ أن النباتات بيضاء الأزهار تعطي نباتات أزهارها بيضاء،  
أما النباتات أرجوانية الأزهار:  
- فبعضها يعطي نباتات أرجوانية الأزهار  
- وبعضها الآخر يعطي نباتات أرجوانية الأزهار ونباتات بيضاء الأزهار

## التطبيق العملي


النمط الظاهري للجيل الثاني	أزهار أرجوانية × أزهار أرجوانية	النمط الظاهري للجيل الثاني	أزهار بيضاء (صافية) × أزهار بيضاء (صافية)
النمط الوراثي للجيل الثاني	$Pp \times Pp$	النمط الوراثي للجيل الثاني	$pp \times pp$
احتمال أعراس للجيل الثاني	$(\frac{1}{2}P + \frac{1}{2}p) \times (\frac{1}{2}P + \frac{1}{2}p)$	احتمال أعراس للجيل الثاني	$\frac{1}{1}p \times \frac{1}{1}p$
النمط الوراثي للجيل الثالث	$\frac{1}{4}PP$ $+\frac{1}{4}Pp$ $+\frac{1}{4}Pp$ $+\frac{1}{4}pp$	النمط الوراثي للجيل الثالث	$\frac{1}{1}pp$
النمط الظاهري للجيل الثالث	أزهار أرجوانية   أزهار بيضاء	النمط الظاهري للجيل الثالث	أزهار بيضاء (صافية)

١- عدد خطوات التأبير الذاتي لأفراد الجيل الثاني التي قام بها مندل.


## تفسير مندل للنتائج

استنتج ماندل من الخطوات الأربع السابقة التفسيرات التالية:


صفة متنحية × صفة راجحة

**فكرة الرجحان التام (السيادة):**

الصفة التي ظهرت في الجيل الأول؛ هي صفة راجحة، أما الصفة التي اختفت ظاهرياً في الجيل الأول هي صفة متنحية

**فكرة العامل (المورثة):**


افترض مندل أن الصفات المدروسة في نبات البازلاء تنتقل عن طريق عوامل وراثية سميت فيما بعد بالمورثات Genes ويتحكم بكل صفة عاملان أحدهما من الأب، والثاني من الأب الآخر.

**قانون مندل الأول (قانون الافتراق):**

يفترق عاملاً الصفة الواحدة عن بعضهما عند تشكل الأعراس ويذهب كل منهما إلى عروس.

**مبدأ نقاوة الأعراس:**

تمتلك العروس الواحدة عاملاً مورثياً واحداً من عاملي الصفة الواحدة



- ٤- اكتب المصطلح: تنتقل الصفات عن طريق عوامل وراثية سميت فيما بعد بالمورثات Genes ويتحكم بكل صفة عاملان أحدهما من الأب، والثاني من الأب الآخر.
- ٥- اكتب المصطلح: يفترق عاملاً الصفة الواحدة عن بعضهما عند تشكل الأعراس ويذهب كل منهما إلى عروس..

- ١- عدد القوانين التي استنتجها ماندل في الهجونة الأحادية.
- ٢- اكتب المصطلح: الصفة التي ظهرت في الجيل الأول؛ هي صفة راجحة، أما الصفة التي اختفت ظاهرياً في الجيل الأول هي صفة متنحية
- ٣- اكتب المصطلح: تمتلك العروس الواحدة عاملاً مورثياً واحداً من عاملي الصفة الواحدة

### التهجين الاختباري في الهجونة الأحادية

تسمى أيضاً: الهجونة التحليلية - الهجونة الاختبارية  
وظيفة التهجين الاختباري:

يمكن من خلاله تعرف النمط الوراثي لفرد يحمل صفة راجحة (سائدة)؛ فيما إذا كان متماثل أم متخالف اللواقح

**لدينا فرد يحمل نمطاً ظاهرياً لصفة راجحة، كيف نحدد نمطه الوراثي؟**

من خلال تهجين الفرد الراجح مجهول النمط الوراثي مع أفراد من النوع نفسه تحمل الصفة المقابلة المتنحية

**طريقة التهجين الاختباري:**

عندما نجري التهجين الاختباري لفرد فإما أن يكون من سلالة صافية أو من سلالة هجينة فإذا كان:

#### من سلالة هجينة


ستكون نتيجة تهجينه مع الفرد  
ذي الصفة المقابلة المتنحية كما  
يلي:

الأفراد الناتجة:  
٥٠% تحمل الصفة الراجحة  
و ٥٠% تحمل الصفة المتنحية

#### من سلالة صافية

ستكون نتيجة تهجينه مع الفرد  
ذي الصفة المقابلة المتنحية  
كما يلي:

الأفراد الناتجة:  
١٠٠% تحمل الصفة  
الراجحة



- ١- اذكر وظيفة التهجين الاختباري/ الهجونة التحليلية/ الهجونة الاختبارية.
- ٢- لدينا فرد يحمل نمطاً ظاهرياً لصفة راجحة، كيف نحدد نمطه الوراثي؟
- ٣- اذكر طريقة التهجين الاختباري.

### التهجين الاختباري في الهجونة الأحادية

من الفقرة السابقة نستنتج:

#### النظري

إذا كانت الأفراد الناتجة ١٠٠% تحمل الصفة الراجحة:

فالفرد متمثل اللواقح والسلالة صافية

إذا كانت الأفراد الناتجة: ٥٠% تحمل الصفة الراجحة و ٥٠% تحمل الصفة المتنحية:

فالفرد متخالف اللواقح والسلالة هجينة (غير صافية)

#### من تطبيقات الهجونة الاختبارية في المجال الحيواني:

- يتم اختيار ذكور من سلالات صافية لصفة راجحة مرغوبة (فسر):

من أجل تلقيح أعداد كبيرة من الإناث؛ وتثبيت الصفة المرغوبة في جميع الأفراد الناتجة.

- يتم استبعاد ذكور الأغنام سوداء الصوف من عملية التلقيح (فسر):

لأن صفة الصوف الأبيض مرغوبة اقتصادياً وبالتالي يتم تلقيح أعداد كبيرة من الإناث من ذكور بيضاء الصوف؛ وتثبيت صفة الصوف الأبيض في جميع الأفراد الناتجة.

#### التطبيق العملي

أجري تهجين بين نبات بازلاء طويل الساق T وهي صفة راجحة مع نبات بازلاء قصيرة الساق t وهي صفة متنحية، كان النسل الناتج ٥٠% طويلة الساق، و ٥٠% قصيرة الساق  
وضح بجدول وراثي هذه الهجونة، وماذا تسمى هذه الطريقة؟ وما هي استخداماتها؟

طويلة الساق × قصيرة الساق



النمط الظاهري للأبوين

tt × Tt

النمط الوراثي للأبوين

$(\frac{1}{1} t) \times (\frac{1}{2} T + \frac{1}{2} t)$

احتمال أعراس الأبوين P

$\frac{1}{2} Tt$

$+\frac{1}{2} tt$

النمط الوراثي للجيل الأول F1

٥٠% طويلة الساق



٥٠% قصيرة الساق



النمط الظاهري للجيل الأول F1

مادة علم الأحياء

تسمى هذه الطريقة: التهجين الاختباري  
استخدامها: يمكن من خلالها تعرف النمط الوراثي لفرد يحمل صفة راجحة (سائدة)؛ فيما إذا كان متمثل أم متخالف اللواقح

١- ماذا نستنتج إذا كانت إذا كانت الأفراد الناتجة ١٠٠% تحمل

الصفة الراجحة في التهجين الاختباري؟

٢- ماذا نستنتج إذا كانت الأفراد الناتجة: ٥٠% تحمل الصفة

الراجحة و ٥٠% تحمل الصفة المتنحية في التهجين

الاختباري؟

٣- عدد تطبيقات للهجونة الاختبارية

- ٤- فسر: يتم اختيار ذكور من سلالات صافية لصفة راجحة مرغوبة  
٥- فسر: يتم استبعاد ذكور الأغنام سوداء الصوف من عملية التلقيح

## الهجونة الثنائية وقانون مندل الثاني

## التطبيق العملي

اختار مندل بذور بازلاء صفراء ملساء من سلالة صافية  
قام بتهجينها مع بذور خضراء مجعدة أيضاً من سلالة صافية:

(سلالتين صافيتين)  
خضراء مجعدة × صفراء ملساء



النمط الظاهري  
للأبوين

RR YY × rr yy

النمط الوراثي  
للأبوين

$(\frac{1}{1} RY) \times (\frac{1}{1} ry)$

احتمال أعراس  
الأبوين P

تأبير متصالب

$\frac{1}{1} Rr Tt$

النمط الوراثي  
للجيل الأول F1

١٠٠% صفراء ملساء  
(صفتان راجحتان)



النمط الظاهري  
للجيل الأول F1

صفراء ملساء × صفراء ملساء  
RrYr × RrYy



تهجين ذاتي لأفراد  
الجيل الأول

$(\frac{1}{4} RY + \frac{1}{4} Ry + \frac{1}{4} rY + \frac{1}{4} ry)$   
×  
 $(\frac{1}{4} RY + \frac{1}{4} Ry + \frac{1}{4} rY + \frac{1}{4} ry)$

احتمال أعراس  
الجيل الأول F1

تأبير ذاتي

	$\frac{1}{4}$ RY	$\frac{1}{4}$ Ry	$\frac{1}{4}$ rY	$\frac{1}{4}$ ry
$\frac{1}{4}$ RY	RRY Y	RR Yy	Rr Y Y	Rr Yy
$\frac{1}{4}$ Ry	Rr Y Y	RR yy	Rr Yy	Rr yy
$\frac{1}{4}$ rY	RR Yy	Rr Yy	rr Y Y	rr Yy
$\frac{1}{4}$ ry	Rr Yy	Rr yy	rr Yy	rr yy
	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{9}{16}$

النمط الوراثي  
للجيل الثاني F2

## النظري

## الهجونة الثنائية:

كيف قام مندل بالهجونة الثنائية؟

بتوريث شفعين من الصفات المتقابلة في  
البازلاء دفعة واحدة

نلاحظ في العمود المجاور خطوات مندل في  
دراسته للهجونة الثنائية

استنبط مندل قانونه الثاني:

## قانون ماندل الثاني:

تتوزع أشعاع الصفات بشكل حر ومستقل عن  
بعضها عند تشكل الأعراس

للتعبير عن النمط الوراثي والنمط الظاهري  
للجيل الثاني يمكن استخدام إحدى الطريقتين:

١- شبكة بينيت Punnet :


تعريفها: هي شبكة المربعات  
المستخدمة في تحليل توزع الصفات  
(الشبكة المستخدمة في الصورة  
المجاورة)

٢- الصيغة العامة

(سنستخدمها في الفقرة التالية)



<p>9/16 صفراء ملساء سلالة أبوية </p> <p>3/16 خضراء ملساء سلالة جديدة </p> <p>3/16 صفراء مجعدة سلالة جديدة </p> <p>1/16 خضراء مجعدة سلالة أبوية </p>	<p>النمط الظاهري للجيل الثاني F2</p>	<p><u>فسر ماندل ظهور سلالات جديدة في الجيل الثاني:</u> أنه حسب قانونه الثاني (لا يوجد ارتباط بين الصفتين)</p>
<p>١- كيف قام مندل بالهجونة الثنائية؟ ٢- عدد خطوات مندل في دراسته للهجونة الثنائية. ٣- اكتب المصطلح: تتوزع أشفاغ الصفات بشكل حر ومستقل عن بعضها عن تشكل الأعراس. ٤- ما هي طرق التعبير عن النمط الوراثي والنمط الظاهري للجيل الثاني. ٥- كيف فسّر ماندل ظهور سلالات جديدة في الجيل الثاني؟</p>		



د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء


## التحليل الوراثي باستخدام الجداول الوراثية

التطبيق العملي		النظري	
اختار مندل بذور بازلاء صفراء ملساء من سلالة صافية قام بتهجينها مع بذور خضراء مجعدة أيضاً من سلالة صافية:			
خضراء مجعدة × صفراء ملساء (سلالتين صافيتين)	النمط الظاهري للأبوين		
 			
$RR YY \times rr yy$	النمط الوراثي للأبوين		
$(\frac{1}{1} RY) \times (\frac{1}{1} ry)$	احتمال أعراس الأبوين P		
$\frac{1}{1} Rr Yy$	النمط الوراثي للجيل الأول F1		
١٠٠% صفراء ملساء (صفتان راجحتان)	النمط الظاهري للجيل الأول F1	في صفة شكل البذور: - نرّمز (R) لأليل الشكل الأملس الراجح - ونرّمز (r) لأليل الشكل المجدّد المتتحي	
		في صفة لون البذور: - نرّمز (Y) لأليل اللون الأصفر الراجح - ونرّمز (y) لأليل اللون الأخضر المتتحي	
صفراء ملساء × صفراء ملساء $RrYr \times RrYr$	تهجين ذاتي لأفراد الجيل الأول		
 			
$(\frac{1}{4} RY + \frac{1}{4} Ry + \frac{1}{4} rY + \frac{1}{4} ry) \times (\frac{1}{4} RY + \frac{1}{4} Ry + \frac{1}{4} rY + \frac{1}{4} ry)$	احتمال أعراس الجيل الأول F1		
	مادة علم الأحياء		
النسب لـ F2	صورة	النمط الظاهري لـ F2	النمط الوراثي لـ F2
٩		صفراء ملساء	R - Y -
٣		خضراء ملساء	R - yy
٣		صفراء مجعدة	rr Y-
١		خضراء مجعدة	rr yy
سنستخدم هنا الطريقة العامة للوصول إلى النمط الوراثي والنمط الظاهري لأفراد الجيل الثاني حيث يشير الخط ( — ) إلى الأليل المقابل بشكليته الراجح أو المتتحي.			

## النظرية الصبغية

## النظرية الصبغية:

تحمل مورثات الصفات على الصبغيات، وتنتقل عبرها من جيل لآخر. حيث يحمل الشفع الصبغي الواحد عددًا من المورثات المختلفة



يعود الفضل باكتشاف النظرية الصبغية لـ:  
العالمين ساتون وبوفيري



ساتون

بوفيري

دور العالمين ساتون وبوفيري في النظرية الصبغية:  
وجدوا أن الصبغيات تنفصل خلال الانقسام المنصف.

هذا دعم قوانين مندل في التوريث بأن سلوك الصبغيات يطابق سلوك المورثات (عوامل مندل).



مورغان

دور العالم مورغان في النظرية الصبغية:  
بين في تجاربه على ذبابة الفاكهة أن:  
المورثات:

دقائق مادية تتوضع بصف خطي واحد على طول الصبغي الذي يحملها؛ بحيث يكون لكل مورثة موقع محدد وثابت عليه

- ١- اكتب المصطلح: تحمل مورثات الصفات على الصبغيات، وتنتقل عبرها من جيل لآخر حيث يحمل الشفع الصبغي الواحد عددًا من المورثات المختلفة.
- ٢- من هما أهم عالَمين لهما الدور باكتشاف النظرية الصبغية؟

- ٣- ما هو دور العالمين ساتون وبوفيري في النظرية الصبغية؟
- ٤- ما هو دور العالم مورغان في النظرية الصبغية؟

## تفسير الهجونة الأحادية حسب النظرية الصبغية

## التطبيق العملي

عند التهجين بين سلالتين من نبات البازلاء أزهار حمراء R مع أزهار بيضاء r كانت جميع أفراد الجيل الأول حمراء الأزهار.

والمطلوب:

1. ما نمط الهجونة؟ ولماذا؟
2. ما النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما المحتملة؟ وما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول حسب النظرية الصبغية.
3. بين بجدول وراثي نتائج التهجين بين أفراد الجيل الأول.

الحل: ١- رجحان تام لأن جميع الأفراد الناتجة تحمل صفة أحد الأبوين

أزهار بيضاء × أزهار حمراء



النمط الظاهري للأبوين

R R × r r

النمط الوراثي للأبوين

R  $\frac{1}{1}$  × r  $\frac{1}{1}$

احتمال أعراس الأبوين P

R R r r

النمط الوراثي للجيل الأول F1

أزهار حمراء



النمط الظاهري للجيل الأول F1

R R r × R R r

مادة علم الأحياء  
تهجين ذاتي لأفراد الجيل الأول

(R  $\frac{1}{2}$  + r  $\frac{1}{2}$ ) (R  $\frac{1}{2}$  + r  $\frac{1}{2}$ )

احتمال أعراس الجيل الثاني F2

r r  $\frac{1}{4}$  + R R  $\frac{1}{4}$  + R r  $\frac{1}{4}$  + R r  $\frac{1}{4}$

النمط الوراثي للجيل الثاني F2

بيضاء

حمراء

حمراء



حمراء



النمط الظاهري للجيل الثاني F2

## النظري

تفسير قانون ماندل الثاني حسب النظرية الصبغية كما يلي:



**التقويم النهائي****أولاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

1. الأعراس نقية دوماً.
2. ظهور سلالات وراثية جديدة في الجيل الثاني للهجونة الثنائية المندلية.

**ثانياً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:****1. عند تكوين الأعراس فإن كل زوج من الأليلات الخاص بصفة وراثية واحدة:**

- أ- يتحد. ب- يفترق. ج- يتضاعف. د- يلتحم.

**2. أحد الأنماط الوراثية الآتية يعد هجيناً بالنسبة للصفات:**

- أ- RR bb      ب- Rr Bb      ج- Rr BB      د- rr Bb

**3. نحصل على أربعة أنماط من الأعراس إذا كان النمط الوراثي للفرد هو:**

- أ- Aa bb      ب- Aa Bb      ج- Aa BB      د- aa Bb

**4. إذا كان النمط الوراثي لنصف الجيل الناتج هو RR فإن النمط الوراثي للأبوين هو:**

- أ- Rr × rr      ب- Rr × RR      ج- Rr × Rr      د- rr × RR

**ثالثاً: أحل المسائل الوراثية الآتية:****1. أجري تهجين بين كبش (ذكر) أغنام صوفه أبيض A وأغنام صوفها أسود a فكان الجيل الأول كله بصوف أبيض.****المطلوب:**

- ما نمط الهجونة؟ ولماذا؟

- وضح بجدول وراثي هجونة الآباء وهجونة أفراد الجيل الأول.

**2. لدى إجراء التهجين بين سلالتين من نبات البازلاء الأولى طويلة الساق T حمراء الأزهار R صفتان راجحتان، والثانية قصيرة الساق t بيضاء الأزهار r حصلنا على 50% من النباتات طويلة الساق حمراء الأزهار و 50% قصيرة الساق وحمراء الأزهار.**

د ٢٠١٣ ت

**المطلوب:**

بين بجدول وراثي نتائج هذه الهجونة.

**3. أجري التزاوج بين فأر ذو شعر أسود وخشن وفأرة ذات شعر أبيض وناعم فكان من بين النواتج**

فأر ذو شعر أسود وناعم وفأر آخر ذو شعر أبيض وخشن

فإذا كان أليل الشعر الأسود B راجح على أليل الشعر الأبيض b وأليل الشعر الخشن H راجح على أليل الشعر الناعم h وكانت هذه الصفات غير مرتبطة بالجنس.

**المطلوب:**

- ما النمط الوراثي لكل من الأبوين ولأعراسهما المحتملة؟

- بين بجدول النمط الوراثي والظاهري لكل من الأفراد الناتجة.

4. أجري التهجين بين سلالتين من نبات البندورة، الأولى ثمارها كبيرة  $b$  لا تقاوم الفطر  $F$  والثانية ثمارها صغيرة  $B$  وتقاوم الفطر  $f$  فحصلنا على جيل أول ثماره صغيرة لا تقاوم الفطر. د ٢٠١٤

المطلوب:

- ما نمط الهجونة للصفاتين معاً؟
- ما النمط الوراثي للأبوين وأعراسهما المحتملة؟ وما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول للصفاتين معاً؟
- ما الأعراس المحتملة للجيل الأول؟
- ما الأنماط الوراثية للجيل الثاني بالصيغة العامة؟ وما الأنماط الظاهرية الموافقة لها؟

ورقة عمل

أجري التهجين بين نباتات بازلاء بعضها ذات بذور ملساء  $R$  صفراء  $Y$  وبعضها الآخر ذو بذور مجعدة  $r$  وخضراء  $y$  كما في الحالات الآتية:

أ- بذور صفراء ملساء × بذور خضراء مجعدة	←	100 % بذور صفراء ملساء
ب- بذور صفراء ملساء × بذور خضراء مجعدة	←	50 % بذور صفراء ملساء + 50 % بذور خضراء ملساء.
ج- بذور صفراء ملساء × بذور خضراء مجعدة	←	50 % بذور صفراء ملساء + 50 % بذور صفراء مجعدة.
د- بذور صفراء ملساء × بذور خضراء مجعدة	←	25 % بذور صفراء ملساء + 50 % بذور خضراء ملساء. 25 % بذور صفراء مجعدة + 25 % بذور خضراء مجعدة.

(والمطلوب: أبين نتائج التهجين السابقة وأطبق طريقة التحليل الوراثي)

د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء

## حل التقويم النهائي

أولاً:

- ١- لأنها أحادية الصيغة الصبغية (١) حيث تمتلك العروس الواحدة عاملاً مورثياً واحداً من عاملي الصفة الواحدة.  
٢- لعدم وجود ارتباط بين الصفتين.

ثانياً:

- ١- ب- يفترق  $Rr Bb$  - ٢- ب-  $Rr Bb$  ٣- ب-  $Aa Bb$  ٤- ب-  $Rr \times RR$

ثالثاً:

١-

نمط الهجونة: رجحان تام - يحمل الفرد متخالف اللواقح صفة أحد الأبوين.

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

أبيض × أسود	النمط الظاهري للأبوين
$aa \times AA$	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} a) \times (\frac{1}{1} A)$	احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{1} Aa$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
١٠٠% صفراء ملساء	النمط الظاهري للجيل الأول F1
التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:	
أبيض × أبيض	النمط الظاهري للجيل الأول
$Aa \times Aa$	النمط الوراثي للجيل الأول
$(\frac{1}{2} A + \frac{1}{2} a) \times (\frac{1}{2} A + \frac{1}{2} a)$	احتمال أعراس الجيل الأول F1
$\frac{1}{4} AA$ $+\frac{1}{4} Aa$ $+\frac{1}{4} Aa$ $+\frac{1}{4} aa$	النمط الوراثي للجيل الثاني F2
أبيض	أسود
أبيض	النمط الظاهري للجيل الثاني F2

٢-

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

طويلة الساق حمراء الأزهار × قصيرة الساق بيضاء الأزهار	النمط الظاهري للأبوين
$Tt rr \times Tt RR$	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} tr) \times (\frac{1}{2} TR + \frac{1}{2} tR)$	احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{2} ttRr$ $+\frac{1}{2} TtRr$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
50% قصيرة الساق حمراء الأزهار	النمط الظاهري للجيل الأول F1
50% طويلة الساق حمراء الأزهار	

٣-

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

أسود خشن × أبيض ناعم	النمط الظاهري للأبوين
$bb hh \times Bb Hh$	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} bh) \times (\frac{1}{4} BH + \frac{1}{4} Bh + \frac{1}{4} bH + \frac{1}{4} bh)$	احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{4} Bb Hh$ $+\frac{1}{4} Bb hh$ $+\frac{1}{4} bb Hh$ $+\frac{1}{4} bb hh$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
أسود خشن	أبيض ناعم
أسود ناعم	النمط الظاهري للجيل الأول F1
أبيض خشن	

٤- د ٢٠١٤ ت

١- رجحان تام		
الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:		
كبير لا تقاوم × صغيرة تقاوم	النمط الظاهري للأبوين	
$ff BB \times FF bb$	النمط الوراثي للأبوين	
$(\frac{1}{1} fB) \times (\frac{1}{1} Fb)$	احتمال أعراس الأبوين P	
$\frac{1}{1} Ff Bb$	النمط الوراثي للجيل الأول F1	
١٠٠% صغيرة لا تقاوم	النمط الظاهري للجيل الأول F1	
الهجونة بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:		
صغيرة لا تقاوم × صغيرة لا تقاوم	تهجين ذاتي لأفراد الجيل الأول	
$Ff Bb \times Ff Bb$	احتمال أعراس الجيل الأول F1	
$(\frac{1}{4} FB + \frac{1}{4} Fb + \frac{1}{4} fB + \frac{1}{4} fb)$ × $(\frac{1}{4} FB + \frac{1}{4} Fb + \frac{1}{4} fB + \frac{1}{4} fb)$		
<b>النسب لـ F2</b>	<b>النمط الظاهري لـ F2</b>	<b>النمط الوراثي لـ F2</b>
٩	صغيرة لا تقاوم	F- B-
٣	صغيرة تقاوم	F- bb
٣	كبير لا تقاوم	ff B-
١	كبير تقاوم	ff bb

**حل ورقة العمل:**

أ- الهجونة بين الأبوين في التهجين الأول:		
صفراء ملساء × خضراء مجعدة	النمط الظاهري للأبوين	
$rr yy \times RR YY$	النمط الوراثي للأبوين	
$(\frac{1}{1} ry) \times (\frac{1}{1} RY)$	احتمال أعراس الأبوين P	
$\frac{1}{1} Rr Yy$	النمط الوراثي للجيل الأول F1	
١٠٠% صفراء ملساء	النمط الظاهري للجيل الأول F1	

ب- الهجونة بين الأبوين في التهجين الثاني:		
صفراء ملساء × خضراء مجعدة	النمط الظاهري للأبوين	
$rr yy \times RR Yy$	النمط الوراثي للأبوين	
$(\frac{1}{1} ry) \times (\frac{1}{2} RY + \frac{1}{2} Ry)$	احتمال أعراس الأبوين P	
$\frac{1}{2} Rr Yy$	$+\frac{1}{2} Rr yy$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
صفراء ملساء	خضراء ملساء	النمط الظاهري للجيل الأول F1

ج- الهجونة بين الأبوين في التهجين الثالث:		
صفراء ملساء × خضراء مجعدة	النمط الظاهري للأبوين	
$rr yy \times Rr YY$	النمط الوراثي للأبوين	
$(\frac{1}{1} ry) \times (\frac{1}{2} RY + \frac{1}{2} rY)$	احتمال أعراس الأبوين P	
$\frac{1}{2} Rr Yy$	$+\frac{1}{2} rr Yy$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
صفراء ملساء	صفراء مجعدة	النمط الظاهري للجيل الأول F1




أ- الهجونة بين الأبوين في التهجين الرابع:

صفراء ملساء × خضراء مجعدة				النمط الظاهري للأبوين
$rr\ yy \times Rr\ Yy$				النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} ry) \times (\frac{1}{4} RY + \frac{1}{4} Ry + \frac{1}{4} rY + \frac{1}{4} ry)$				احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{4} Rr\ Yy$	$+\frac{1}{4} Rr\ yy$	$+\frac{1}{4} rr\ Yy$	$+\frac{1}{4} rr\ yy$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
صفراء ملساء	خضراء ملساء	صفراء مجعدة	خضراء مجعدة	النمط الظاهري للجيل الأول F1

توجد فيديوهات توضيحية هامة لهذا الدرس تشرح بعض الفقرات بأمتثلة ولقطات من الواقع لا تنس عزيزي الطالب مشاهدتها، ولا تنس حل نموذج الامتحان الخاص لهذا الدرس.



يتم نشر الفيديوهات والمذكرات عبر مجموعاتي على واتس أب،  
قم بطلب الانضمام عبر مراسلتي على الواتس حصراً على الرقم: ٠٩٤٢٢٤٩٩٤٨.



د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء

## الدرس (٢): تأثر المورثات وتعديلات النسب المنديلية في الهجونة

### مقدمة

من الطبيعي ألا تتوافق كلّ الحالات والحوادث الوراثية مع تصور مندل للسيادة التامة، ولا بدّ من انحرافات في النسب المنديلية نتيجة التأثير بين المورثات وسندرس النماذج الآتية:



### أولاً :

#### التأثر بين المورثات وتعديلات النسب المنديلية في الهجونة (الأحادية):

- ١- نمط الرجحان غير التام (السيدة غير التامة)
- ٢- السيادة المشتركة (الرجحان المشترك المتساوي)
- ٣- التأثير المتعدد للمورثة الواحدة (مورثة تؤثر في أكثر من صفة)
- ٤- المورثات المميّنة



### ثانياً :

#### التأثر بين المورثات وتعديلات النسب المنديلية في الهجونة (الثنائية):

- ١- المورثات المتتامة
- ٢- الحجب
- ٣- الارتباط والعبور
- ٤- الخارطة الصبغية (الوراثية)
- ٥- الصفات الكمية

د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء

- ١- عدد تعديلات النسب المنديلية في الهجونة الأحادية
- ٢- عدد تعديلات النسب المنديلية في الهجونة الثنائية

## أولاً) التأثير بين المورثات في الهجونة الأحادية:

## ١- نمط الرجحان غير التام (السيادة غير التامة)

## التطبيق العملي

التزاوج بين سلالتين من الخيول الأولى ذات لون أبيض كريمي، والثانية ذات لون أحمر كستنائي فكان الجيل الأول كله ذو لون أسمر، والمطلوب:

١- ما نمط هذه الهجونة؟ ولماذا؟

٢- وضح بجدول وراثي هجونه الآباء، وهجونه أفراد الجيل الأول.

نمط الهجونة رجحان غير تام؛ لأنه لم يرجح أليل أحد الأبوين على أليل الآخر؛ مما أدى إلى ظهور نمط ظاهري جديد.

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

خيول بيضاء × خيول حمراء

النمط الظاهري للأبوين

BB × AA

النمط الوراثي للأبوين

$\frac{1}{2} B \times \frac{1}{2} A$

احتمال أعراس الأبوين P

$\frac{1}{1} AB$

النمط الوراثي للجيل الأول F1

١٠٠% خيول سمراء

النمط الظاهري للجيل الأول F1

التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:

خيول سمراء × خيول سمراء

النمط الظاهري للجيل الأول

AB × AB

النمط الوراثي للجيل الأول

$(\frac{1}{2} B + \frac{1}{2} A) \times (\frac{1}{2} B + \frac{1}{2} A)$

احتمال أعراس الجيل الأول F1

$\frac{1}{4} AA$

$+\frac{1}{4} AB$

$+\frac{1}{4} AB$

$+\frac{1}{4} BB$

النمط الوراثي للجيل الثاني F2

بيضاء

سمراء

حمراء

النمط الظاهري للجيل الثاني F2

١

٢

١


النسبة

## النظري

## التعريف:

في هذا النمط من الهجونة لا يرجح أليل أحد الأبوين على أليل الأب الآخر بشكل تام، إنما يحدث بينهما تأثير (فبالنتيجة):


مما يؤدي إلى ظهور نمط ظاهري جديد في الفرد متخالف اللواقح (مزيج بين النمطين الظاهرين للأبوين).



## أمثلة:



التزاوج بين سلالتين من الخيول الأولى ذات لون أبيض كريمي، والثانية ذات لون أحمر كستنائي يعطي جيلاً ذا لون أسمر



التهجين بين سلالتين من نبات فم السمكة الأولى حمراء الأزهار مع سلالة ثانية بيضاء الأزهار يعطي جيلاً وردي الأزهار

## نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني:

١ : ٢ : ١

- ١- اكتب المصطلح: نمط من الهجونة لا يرجح أليل أحد الأبوين على أليل الأب الآخر بشكل تام، إنما يحدث بينهما تأثير مما يؤدي إلى ظهور نمط ظاهري جديد في الفرد متخالف اللواقح (مزيج بين النمطين الظاهرين للأبوين)
- ٢- ماذا ينتج عن عدم رجحان أليل أحد الأبوين على أليل الأب الآخر بشكل تام وحدوث تأثير بينهما؟
- ٣- عدد مثاليين عن الرجحان غير التام

**تطبيق على نمط الرجحان غير التام (السيادة غير التامة) نبات فم السمكة**

عند التهجين بين سلالتين من نبات فم السمكة الأولى حمراء الأزهار R مع سلالة ثانية بيضاء الأزهار W كان الجيل الأول كله وردي الأزهار، والمطلوب:













1. ما نمط هذه الهجونة الأحادية؟ ولماذا؟

2. وضح بجدول وراثي هجونة الآباء وهجونة أفراد الجيل الأول.

3. وضح بجدول وراثي نتائج التهجين بين فرد من الجيل الأول مع فرد أحمر الأزهار؟

نمط الهجونة رجحان غير تام في الفرد متخالف اللواقح؛ لأنه لم يرجح أليل صفة أحد الأبوين على أليل صفة الأب الآخر بشكل تام وإنما حدث بينهما تفاعل ونتج نمط ظاهري جديد وسط بين صفتي الأبوين.

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

حمراء الأزهار × بيضاء الأزهار		النمط الظاهري للأبوين
		
WW × RR		النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} W) \times (\frac{1}{1} R)$		احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{1} RW$		النمط الوراثي للجيل الأول F1
١٠٠% وردية الأزهار		النمط الظاهري للجيل الأول F1
		
التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:		
وردية الأزهار × وردية الأزهار		النمط الظاهري للجيل الأول
		
RW × RW		النمط الوراثي للجيل الأول
$(\frac{1}{2} R + \frac{1}{2} W) \times (\frac{1}{2} R + \frac{1}{2} W)$		احتمال أعراس الجيل الأول F1
$\frac{1}{4} RR$	$+\frac{1}{4} RW$	$+\frac{1}{4} RW$ مادة علم
$+\frac{1}{4} RW$	$+\frac{1}{4} WW$	
حمراء 	وردية 	بيضاء 
		النمط الظاهري للجيل الثاني F2
التهجين بين فرد من الجيل الأول مع فرد أحمر الأزهار:		
حمراء الأزهار × وردية الأزهار		النمط الظاهري للأبوين p
		
RW × RR		النمط الوراثي للأبوين p
$(\frac{1}{2} R + \frac{1}{2} W) \times (\frac{1}{1} R)$		احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{2} RR$	$\frac{1}{2} RW$	النمط الوراثي للأبناء
٥٠% حمراء الأزهار 	٥٠% وردية الأزهار 	النمط الظاهري للأبناء

## أولاً) التأثير بين المورثات في الهجونة الأحادية:

## 2- السيادة المشتركة (الرجحان المشترك المتساوي)

التطبيق العملي		النظري	
<p>٢٠٢٣ (مشابهة)</p> <p>لدى التهجين بين سلالتين من نبات الكاميليا الأولى أزهارها حمراء R والثانية ذات أزهار بيضاء W كان الجيل الأول كله أحمر وأبيض الأزهار (بشكل مختلط) والمطلوب:</p> <p>1. ما نمط هذه الهجونة؟ ولماذا؟</p> <p>2. وضح بجدول وراثي هجونة الآباء، وهجونة أفراد الجيل الأول. نمط الهجونة رجحان مشترك؛ لأن كل من الأليلين يعبر عن نفسه لتشكل النمط الظاهري (تظهر لديه صفتا الأبوين معاً).</p> <p>الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:</p>		<p><b>التعريف:</b></p> <p>حالة من التوازن بين أليلي الصفة الواحدة لدى وجودهما في فرد متخالف اللواقح؛ يعبر فيها الفرد الهجين عن نمط ظاهري يمثل مجموع النمطين الظاهريين للأبوين (تظهر لديه صفتا الأبوين معاً).</p>	
أزهار بيضاء × أزهار حمراء	النمط الظاهري للأبوين	<p><b>أمثلة:</b></p> <p>صفة اللون الأحمر واللون الأبيض لأزهار نبات الكاميليا</p> <p>صفة اللون الأخضر واللون الأصفر لثمار نبات قرع الزينة</p>	
RR × WW	النمط الوراثي للأبوين		
$\frac{1}{2} R \times \frac{1}{2} W$	احتمال أعراس الأبوين P	<p>نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني:</p> <p>١ : ٢ : ١</p>	
$\frac{1}{1} RW$	النمط الوراثي للجيل الأول F1	<p>١- اكتب المصطلح: حالة من التوازن بين أليلي الصفة الواحدة لدى وجودهما في فرد متخالف اللواقح؛ يعبر فيها الفرد الهجين عن نمط ظاهري يمثل مجموع النمطين الظاهريين للأبوين (تظهر لديه صفتا الأبوين معاً).</p> <p>٢- عدد مثاليين عن الرجحان المشترك/المتساوي</p>	
١٠٠% أزهار حمراء وبيضاء	النمط الظاهري للجيل الأول F1	<p>١- اكتب المصطلح: حالة من التوازن بين أليلي الصفة الواحدة لدى وجودهما في فرد متخالف اللواقح؛ يعبر فيها الفرد الهجين عن نمط ظاهري يمثل مجموع النمطين الظاهريين للأبوين (تظهر لديه صفتا الأبوين معاً).</p> <p>٢- عدد مثاليين عن الرجحان المشترك/المتساوي</p>	
التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:			
أزهار حمراء وبيضاء × أزهار حمراء وبيضاء	النمط الظاهري للجيل الأول		
RW × RW	النمط الوراثي للجيل الأول		
$(\frac{1}{2} R + \frac{1}{2} W) \times (\frac{1}{2} R + \frac{1}{2} W)$	احتمال أعراس الجيل الأول F1		
$\frac{1}{4} RR$	$\frac{1}{4} RW$	$\frac{1}{4} RW$	$\frac{1}{4} WW$
النمط الوراثي للجيل الثاني F2	النمط الظاهري للجيل الثاني F2	النمط الظاهري للجيل الثاني F2	النسبة
أزهار حمراء	أزهار حمراء وبيضاء	أزهار بيضاء	١ : ٢ : ١
١	٢	١	



## تطبيق على نمط السيادة المشتركة (الرجحان المشترك المتساوي)

عند التهجين بين سلالتين من نبات القرع الأولى ثمارها صفراء  $Y$  والثانية ثمارها خضراء  $G$  كان الجيل الأول جميع نباتاته ذات ثمار مخططة بالأصفر والأخضر، والمطلوب:






1. ما نمط هذه الهجونة؟
2. وضح بجدول وراثي هجونة الأبوين وهجونة أفراد الجيل الأول.
3. وضح بجدول وراثي نتائج التهجين بين فرد من الجيل الأول مع فرد ثماره خضراء.

نمط الهجونة رجحان مشترك؛ لأنه في الفرد متخالف اللواقح يوجد حالة توازن بين الأليلين يعبر كل منهما يعبر عن نفسه لتشكيل النمط الظاهري تظهر لديه صفتا الأبوين معاً





الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

ثمار صفراء × ثمار خضراء  	النمط الظاهري للأبوين
$GG \times YY$	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} G) \times (\frac{1}{1} Y)$	احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{1} GY$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
١٠٠% ثمار مخططة بالأصفر والأخضر	النمط الظاهري للجيل الأول F1

التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:

ثمار مخططة بالأصفر والأخضر × ثمار مخططة بالأصفر والأخضر  	النمط الظاهري للجيل الأول
$GY \times GY$	النمط الوراثي للجيل الأول
$(\frac{1}{2} G + \frac{1}{2} Y) \times (\frac{1}{2} G + \frac{1}{2} Y)$	احتمال أعراس الجيل الأول F1
$\frac{1}{4} GG$ $+\frac{1}{4} GY$ $+\frac{1}{4} GY$ $+\frac{1}{4} YY$	النمط الوراثي للجيل الثاني F2
ثمار خضراء    ثمار مخططة بالأصفر والأخضر    ثمار صفراء   	النمط الظاهري للجيل الثاني F2

التزاوج بين فرد من الجيل الأول مع فرد ثماره خضراء:

ثمار مخططة بالأصفر والأخضر × ثمار خضراء  	النمط الظاهري للأبوين p
$GG \times GY$	النمط الوراثي للأبوين p
$(\frac{1}{1} G) \times (\frac{1}{2} G + \frac{1}{2} Y)$	احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{2} GG$ $\frac{1}{2} GY$	النمط الوراثي للأبناء
٥٠% ثمار خضراء    ٥٠% ثمار مخططة بالأصفر والأخضر  	النمط الظاهري للأبناء

## أولاً) التأثير بين المورثات في الهجونة الأحادية:

## 3- التأثير المتعدد للمورثة الواحدة (مورثة تؤثر في أكثر من صفة)

## التطبيق العملي


## النظري

في حالة التأثير المتعدد للمورثة الواحدة

في الوراثة المنديلية

المورثة الواحدة:  
تسهم في إظهار أكثر من صفة فتسمى المورثة ذات التأثير المتعدد

المورثة الواحدة:  
مسؤولة عن تشكيل نمط ظاهري واحد للصفة الواحدة



## أمثلة:

يعد نبات الشعير مثلاً عن نمط التأثير المتعدد للمورثة الواحدة (فسر):



يوجد في نبات الشعير Hordium مورثة واحدة تشرف على صفتي:

- كثافة السنابل
- وطول الفاصلة (السلامية) الأخيرة للنبات وهما راجحتان على صفتين هما:
- السنابل قليلة الكثافة
- وقصر الفاصلة الأخيرة للنبات



تعد صفة الدجاج الزاحف نمطاً للتأثير المتعدد للمورثة الواحدة (فسر):

لأن الأليل الراجح A في الدجاج:

- يحدد دجاج زاحف
- وهو مبيت في حالة تماثل اللواقح AA




تعد صفة اللون الأصفر للفئران نمطاً للتأثير المتعدد للمورثة الواحدة (فسر):  
لأن الأليل الراجح Y في الفئران:  
- يحدد اللون الأصفر للفئران  
- وهو مميّت في حالة تماثل اللواقح

#### نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني:

مماثلة للهجونة الأحادية من حيث نسبة الظهور في الجيل الثاني أي:  
١ : ٣

- ١- قارن بين الوراثة المنديلية و حالة التأثير المتعدد للمورثة الواحدة من حيث دور المورثة
- ٢- عدد ٣ أمثلة عن حالة التأثير المتعدد للمورثة الواحدة.
- ٣- فسر: يعد نبات الشعير مثلاً عن نمط التأثير المتعدد للمورثة الواحدة.
- ٤- فسر: تعد صفة الدجاج الزاحف نمطاً للتأثير المتعدد للمورثة الواحدة
- ٥- فسر: تعد صفة اللون الأصفر للفئران نمطاً للتأثير المتعدد للمورثة الواحدة
- ٦- قارن بين نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني في الوراثة المنديلية و في حالة التأثير المتعدد للمورثة الواحدة



د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء



## أولاً) التآثر بين المورثات في الهجونة الأحادية:

## 4- المورثات المميّنة

## التطبيق العملي

عند إجراء التهجين بين سلالتين الدجاج الزاحف تكون النتيجة كما يلي:

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

الدجاج الزاحف × الدجاج الزاحف



النمط الظاهري للأبوين

Aa × Aa

النمط الوراثي للأبوين

$(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}a) \times (\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}a)$

احتمال أعراس الأبوين P

$\frac{1}{4}AA$     $+\frac{1}{4}Aa$     $+\frac{1}{4}Aa$     $+\frac{1}{4}aa$

النمط الوراثي للجيل الأول F1

زاحف (يموت جنينياً)



زاحف (حي)



طبيعي (حي)



النمط الظاهري للجيل الأول F1

1

2

1

النسب الظاهرية للأفراد الحية

## النظري

## التعريف:

تسبب المورثات المميّنة موت الفرد لدى وجودها في حالة تماثل اللواقح؛ سواء أكانت راجحة AA في بعض الحالات، أو متنحية aa في حالات أخرى، بينما لا يظهر الأثر المميّنة لدى وجودها في حالة تخالف اللواقح

تؤدي المورثات المميّنة إلى الانحراف عن النسبة المنديلية (فسر): لأن هذه المورثات تسبب موت الفرد (متى؟) جنينياً - أو بعد الولادة حتى مرحلة النضج الجنسي

## أمثلة:

يوجد في الدجاج أليل راجح A (وظيفته):  
- حدد دجاج زاحف  
- وهو مميّنة في حالة تماثل اللواقح AA

بينما التماثل في الأليل المتنحي aa (ينتج عنه):

- يحدد دجاج طبيعي
- ويكون الدجاج حيّاً

الدجاج الزاحف مرغوب اقتصادياً (فسر): لأن غريزة الرقاد على البيض كبيرة لديه فهو مناسب أجل التفقيس الطبيعي

(تعد صفة الدجاج الزاحف أيضاً نمطاً للتأثير المتعدد للمورثة الواحدة)



يوجد في الفئران أليل راجح Y (وظيفته):  
- يحدد اللون الأصفر للفئران  
- وهو مميّنة في حالة تماثل اللواقح

(تعد صفة اللون الأصفر للفئران أيضاً نمطاً للتأثير المتعدد للمورثة الواحدة)

نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني: د ٢٠١٥  
تتحول النسبة المنديلية 1:3 إلى النسبة 1:2

- ١- اكتب المصطلح: تسبب المورثات المميّمة موت الفرد لدى وجودها في حالة تماثل اللواقح؛ سواء أكانت راجحة AA في بعض الحالات، أو متنحية aa في حالات أخرى، بينما لا يظهر الأثر المميّمة لدى وجودها في حالة تخالف اللواقح.
- ٢- فسّر: تؤدي المورثات المميّمة إلى الانحراف عن النسبة المندلية.
- ٣- متى يموت الفرد بتأثير المورثات المميّمة.
- ٤- اذكر وظيفة الأليل الراجح A في الصورة في الأعلى.
- ٥- ماذا ينتج عن التماثل في الأليل المتنحي aa لدى الدجاج في صفة الزحف؟
- ٦- فسّر: الدجاج الزاحف مرغوب اقتصاديًا.
- ٧- اذكر مثالين عن صفات تتبع للمورثات المميّمة وتتبع للتأثير المتعدد للمورثة في آن واحد.
- ٨- اذكر وظيفة الأليل الراجح Y في الفران في الصورة في الأعلى.





## تطبيق على نمط المورثات المميّمة

د ٢٠٢٢

تم التهجين بين فأرين أصفرين فكانت الأفراد الناتجة بعضها أصفر اللون وبعضها الآخر رمادي بنسبة 1:2 فإذا علمت أن أليل اللون الأصفر Y والرمادي y المطلوب:




1. بين جدول وراثي نتائج الهجونة بين الفأرين، ولماذا تختلف النسب عن المندلية؟
2. بين جدول وراثي نتائج التزاوج بين فأر أصفر وآخر رمادي.

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

فأر أصفر × فأر أصفر		النمط الظاهري للأبوين	
			
Yy × Yy		النمط الوراثي للأبوين	
$(\frac{1}{2} Y + \frac{1}{2} y) \times (\frac{1}{2} Y + \frac{1}{2} y)$		احتمال أعراس الأبوين P	
$\frac{1}{4} YY$	$+\frac{1}{4} Yy$	$+\frac{1}{4} Yy$	$+\frac{1}{4} yy$
أصفر (يموت جنينيًا)	أصفر (حي)	مادة علم الأحياء	رمادي حي
			

ألاحظ تحول النسبة المندلية 3:1 إلى النسبة 2:1 بسبب وجود مورثات مميّمة، إذ أن الأفراد الصفراء المتماثلة YY تموت في المرحلة الجنينية

التهجين بين بين فأر أصفر وآخر رمادي:

فأر أصفر × فأر رمادي		النمط الظاهري للأبوين	
			
yy × Yy		النمط الوراثي للأبوين	
$(\frac{1}{1} y) \times (\frac{1}{2} Y + \frac{1}{2} y)$		احتمال أعراس الأبوين P	
$\frac{1}{2} Yy$	$+\frac{1}{2} yy$	النمط الوراثي للأبناء	
أصفر (حي)	رمادي (حي)	النمط الظاهري للأبناء	
			

## ثانياً) التآثر بين المورثات وتعديلات النسب المندلية في الهجونة الثنائية:

## ١- المورثات المتتامة:

## التطبيق العملي

د ٢٠٢١ ت

أجري التهجين بين سلالتين صافيتين من نبات الذرة ذات البذور البيضاء، فكان الجيل الأول كل بذوره أرجوانية، ولدى تزواج أفراد الجيل الأول ظهر في الجيل الثاني 9/16 بذور أرجوانية و 7/16 بذور بيضاء .

والمطلوب:

1. بين بجدول وراثي الهجونة بين الأبوين؟
2. ما احتمالات أعراس الجيل الأول؟
3. ما الأنماط الظاهرية المحتملة في الجيل الثاني؟ وما الأنماط الوراثية المقابلة لها مع النسب الموافقة؟ وضّح ذلك من خلال الصيغة العامة.
4. ما سبب اختلاف النسب الظاهرية في الجيل الثاني عن النسب المندلية؟

## ١- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

بذور بيضاء × بذور بيضاء



النمط الظاهري للأبوين

aa BB × AA bb

النمط الوراثي مادة للأبوين

 $(\frac{1}{1} aB) \times (\frac{1}{1} Ab)$ 

احتمال أعراس الأبوين P

 $\frac{1}{1} Aa Bb$ 

النمط الوراثي للجيل الأول F1

١٠٠% بذور أرجوانية



النمط الظاهري للجيل الأول F1

بذور أرجوانية × بذور أرجوانية

Aa Bb × Aa Bb



تهجين ذاتي لأفراد الجيل الأول

 $(\frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} Ab + \frac{1}{4} aB + \frac{1}{4} ab)$  $(\frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} Ab + \frac{1}{4} aB + \frac{1}{4} ab)$ 

٢- احتمال أعراس الجيل الأول F1

## النظري

## التعريف:

حالة يعمل فيها أليل سائد لمورثة ثانية على إتمام عمل وظيفي لأليل سائد لمورثة أولى (هاتان المورثتان غير متقابلتين، وغير مرتبطين)؛ لإعطاء نمط ظاهري معين لا يستطيع أي من الأليلين إعطاءه بمفرده.

## مثال:

في نبات الذرة:

- هناك مورثة لها أليلان متقابلان أحدهما: راجح A والآخر متنح a
- وتوجد مورثة أخرى غير مقابلة للمورثة الأولى، وغير مرتبطة معها لها أليلان متقابلان أحدهما راجح B والآخر متنح b

- اجتماع الأليلين الراجحين A و B معاً (ينتج عنه):

عرانيس لون بذورها أرجواني (أثر متتام للأليلين A و B)

- وغياب أحد الأليلين الراجحين أو كليهما (ينتج عنه):

عرانيس لون بذورها أبيض.



نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني:

تتحول النسبة المندلية 1:3:3:9 إلى النسبة 7:9


٣-				
النسبة الظاهرية F2 لـ	النسبة الوراثية F2 لـ	صورة	النمط الظاهري F2 لـ	النمط الوراثي F2 لـ
٩	٩		بذور أرجوانية	A- B-
٧	٣		بذور بيضاء	A- bb
	٣		بذور بيضاء	aa B-
	١		بذور بيضاء	aa bb
أستنتج: أن نسب الأنماط الظاهرية 7:9 أصبحت غير متوافقة مع النسب المندلية 1:3:3:9				
٤- يتطلب ظهور اللون الأرجواني في البذور وجود الأليلين الراجحين A و B معاً، وعند غياب أحدهما أو كليهما تبدو البذور بلون أبيض				
<p>١- اكتب المصطلح: حالة يعمل فيها أليل سائد لمورثة ثانية على إتمام عمل وظيفي لأليل سائد لمورثة أولى (هاتان المورثتان غير متقابلتين، وغير مرتبطين) لإعطاء نمط ظاهري معين لا يستطيع أي من الأليلين إعطائه بمفرده.</p> <p>٢- اذكر مثلاً عن المورثات المتتامة.</p> <p>٣- ماذا ينتج عن اجتماع الأليلين الراجحين A و B في نبات الذرة؟</p> <p>٤- ماذا ينتج عن غياب أو غياب أحد الأليلين الراجحين A و B أو كليهما في نبات الذرة؟</p> <p>٥- قارن بين نسب الأنماط الظاهرية للجيل الثاني في الوراثة المندلية وفي حالة المورثات المتتامة.</p>				

## ثانياً) التأثير بين المورثات وتعديلات النسب المنديلية في الهجونة الثنائية: 2- الحجب:

مثال				المعلومات النظرية	
(الحجب الراجح) في نبات الكوسا				الفرق بين الرجحان التام والحجب:	
يوجد لثمار نبات الكوسا ٣ ألوان:				الحجب	الرجحان التام
الأصفر	الأخضر	الأبيض		في الحجب: يقوم أليل راجح أو شفع أليلي متنح غير مقابل وغير مرتبط معه لدى اجتماعهما في فرد واحد، وله نوعان وفق حالة الأليل هما: - حجب راجح - حجب متنحي	في حالة الرجحان التام؛ يرجح الأليل A على الأليل المقابل المتنحي للمورثة الواحدة؛ بحيث يكون النمط الظاهري في الجيل الأول الناتج للأليل الراجح أي A
				نسب الأنماط الظاهرية 1:3:12	نسب الأنماط الظاهرية 1:3:3:9
Y- ww	ww yy	W/- مهما كان النمط الوراثي للمورثات الأخرى	النمط الوراثي	الفرق بين الحجب الراجح والحجب المتنحي:	
الثمار التي تحمل الأليل السائد Y ويكون w بحالة تنحي Y-ww فإنها تتركب الأنظيمين I و II معاً وتظهر باللون الأصفر.	الثمار ذات النمط الوراثي ww yy قادرة على تركيب الأنظيم I الذي يقوم بتثبيت اللون الأخضر.	الثمار ذات الأليل السائد W لا تمتلك القدرة على تركيب الأنظيم I بالتالي تبقى بيضاء	تفسير ظهور اللون	الحجب المتنحي	الحجب الراجح
				شفع أليلي متنح لمورثة أولى aa يحجب عمل أليل راجح لمورثة ثانية B غير مقابل وغير مرتبط معه إذا اجتمعا معاً في فرد واحد	أليل راجح A لمورثة أولى يحجب عمل أليل راجح B لمورثة أخرى غير مقابل له، وغير مرتبط معه إذا اجتمعا معاً في فرد واحد
				aa > B	A > B

1

النبات ذو النمط الوراثي ww يقوم بتركيب الأنظيم I الذي يحول المركب A عديم اللون إلى المركب B ذو اللون الأخضر.




2

وجود الأليل السائد W يحجب تحويل المركب A إلى المركب B.

3

النبات ذو النمط الوراثي Y- قادر على تركيب الأنظيم II الذي يحول المركب B الأخضر إلى المركب C الأصفر.



4

النبات الذي يكون نمطه الوراثي yy لا يرمز تركيب الأنظيم II.


- ١- قارن بين الرجحان التام والحجب من حيث: التعريف - نسب الأنماط الظاهرية.
- ٢- عدد أنواع الحجب.
- ٣- قارن بين الحجب الرجحان والحجب المتنحي من حيث: المفهوم - رجحان الأليلات
- ٤- قارن بين ثمار الكوسا البيضاء و الخضراء و الصفراء من حيث: النمط اللوراثي- وسبب ظهور اللون

### تطبيق على نمط الحجب الرجحان

بالتهجين بين سلالتين صافيتين من نبات الكوسا الأولى ثمارها بيضاء  $WW yy$  والثانية ثمارها صفراء  $ww YY$  كانت ثمار الجيل الأول بيضاء اللون، وبالتهجين ذاتياً بين نباتات الجيل الأول، كانت ثمار الجيل الثاني نسبها:  
 16/12 بيضاء + 16/3 صفراء + 16/1 خضراء. المطلوب:

- ١- بين بجدول وراثي الهجونة بين الأبوين؟ كيف تفسر ظهور اللون الأبيض في ثمار الجيل الأول؟
- ٢- ما احتمالات أعراس الجيل الأول؟
- ٣- ما الأنماط الظاهرية المحتملة في الجيل الثاني؟ وما الأنماط الوراثية المقابلة لها مع النسب الموافقة؟ وضح ذلك من خلال الصيغة العامة.

التهجين بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:	
النمط الظاهري للأبوين	ثمار بيضاء × ثمار صفراء
النمط الوراثي للأبوين	$ww YY \times WW yy$
احتمال أعراس الأبوين P	$(\frac{1}{1} wY) \times (\frac{1}{1} Wy)$
النمط الوراثي للأبناء	$(\frac{1}{1} Ww Yy)$
النمط الظاهري للأبناء	١٠٠% ثمار بيضاء
أستنتج: الأليل الرجحان W للمورثة الأولى المسؤول عن اللون الأبيض، حجب عمل الأليل الرجحان Y للمورثة الثانية غير مقابل له، وغير مرتبط معه لدى اجتماعهما في فرد واحد.	
تهجين ذاتي لأفراد الجيل الأول:	
تهجين ذاتي لأفراد الجيل الأول	ثمار بيضاء × ثمار بيضاء
احتمال أعراس الجيل الأول F1	$Ww Yy \times Ww Yy$
	$(\frac{1}{4} WY + \frac{1}{4} Wy + \frac{1}{4} wY + \frac{1}{4} wy)$
	$(\frac{1}{4} WY + \frac{1}{4} Wy + \frac{1}{4} wY + \frac{1}{4} wy)$
النمط الوراثي F2	النمط الظاهري F2
النسبة الوراثية F2	النسبة الظاهرية F2
W- Y-	ثمار بيضاء
W- yy	ثمار بيضاء
ww Y-	ثمار صفراء
ww yy	ثمار خضراء
أستنتج:	
أن نسب الأنماط الظاهرية 1:3:3:9 أصبحت غير متوافقة مع النسب المندلية 1:3:3:9	



## ثانياً) التأثير بين المورثات وتعديلات النسب المنديلية في الهجونة الثنائية: 3- الارتباط والعبور:

### الارتباط:

#### مثال

#### الارتباط والعبور في ذبابة الخل:


#### في ذبابة الخل:

لصفتي شكل الجناح ولون الجسم  
شفعان أليلان مرتبطان على شفع  
صبغي واحد، حيث:  
أليل الجناح الطويل L  
وأليل الجسم الرمادي G

#### راجحان على:


أليل الجناح الضامر l  
ولون الجسم الأسود g

#### ارتباط صفتي شكل الجناح ولون الجسم عند ذبابة الخل:




#### عند الإناث

ارتباط جزئي  
(فسر:)  
لأنه يكسر  
بالعبور




#### عند الذكور

ارتباط كامل  
(فسر:)  
لأنه لا يحدث  
فيه عبور



#### المعلومات النظرية

يبلغ عدد المورثات عند الإنسان:  
قرابة 22 ألف مورثة مشفرة  
الـ 22 ألف مورثة موزعة على:  
23 شفعاً من الصبغيات



(فسر: كيف يمكن لهذا العدد  
القليل من الصبغيات أن تحمل  
على هذا العدد من المورثات؟  
إن عدد الأشعاع الصبغية أقل  
بكثير من عدد المورثات في  
معظم الكائنات الحية

#### حيث يبلغ عدد الأشعاع:

عند الإنسان: 23

عند الذرة: 10

عند ذبابة الخل: 4

عند نبات القمح الطري: 21

من هنا توجه التفكير بوجود ظاهرة الارتباط



#### الارتباط:

الشفع الصبغي الواحد يحمل العشرات من الأليلات  
المورثية

#### المجموعة المرتبطة:

تمثل مجموعة الأشعاع الأليلية المحمولة على شفع  
واحد من الصبغيات؛ إذ أن عدد المجموعات  
المرتبطة يساوي عدد الأشعاع الصبغية.

1- قارن بين الإنسان - الذرة - ذبابة الخل - القمح الطري من حيث: عدد الأشعاع الصبغية.

2- كم يبلغ عدد المورثات لدى الإنسان؟

3- فسر: يمكن لعدد قليل من الصبغيات (23 شفعاً) أن تحمل على هذا العدد من المورثات (22 ألفاً)؟

4- اكتب المصطلح: الشفع الصبغي الواحد يحمل العشرات من الأليلات المورثية.

5- اكتب المصطلح: مجموعة الأشعاع الأليلية المحمولة على شفع واحد من الصبغيات؛ إذ أن عدد المجموعات المرتبطة يساوي عدد الأشعاع الصبغية.

6- اذكر مثلاً عن ظاهرة الارتباط.

7- قارن بين نوع الارتباط لدى ذكور ذبابة الخل - إناث ذبابة الخل.

## العبور

إن المورثات المرتبطة على الصبغي ذاته لن تخضع لقانون التوزيع المستقل (فسر: ) لأنها سوف تنتقل من جيل إلى جيل كوحدة واحدة على عروسٍ واحدة (حسب النظرية الصبغية) هناك نوعان من الارتباط:

ارتباط جزئي

ارتباط كامل

يكسر بالعبور

لا يحدث فيه عبور

ظاهرة الارتباط الكامل والجزئي تختلف من كائن إلى آخر سواء أكان نباتاً أم حيواناً.

## كيف يمكن إظهار نمط الارتباط؟

يجب اللجوء إلى التهجين التحليلي وليس إلى التهجين الذاتي لأفراد الجيل الأول (فسر: ) لأن النتائج تكون غير واضحة



## أين يحصل العبور؟


بين صبيغيات الجيل الأول الحاملة للأليلات المرتبطة .

## متى يحصل العبور؟

في مرحلة الخيوط الأربعة من الانقسام المنصف الأول.

## آلية العبور:

ينقطع الصبيغيان الداخليان في من كل صبغي ويتبادلان القطع المتناظرة فيما بينهما مع ما تحمل من أليلات.



د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء

- ١- فسر: المورثات المرتبطة على الصبغي ذاته لن تخضع لقانون التوزيع المستقل.
- ٢- عدد أنواع الارتباط.
- ٣- قارن بين الارتباط الكامل والارتباط الجزئي من حيث العبور.
- ٤- كيف يمكن إظهار نمط الارتباط؟
- ٥- فسر: لإظهار نوع/نمط الارتباط يجب اللجوء إلى التهجين التحليلي وليس إلى التهجين الذاتي لأفراد الجيل الأول.
- ٦- أين ومتى يحصل العبور؟
- ٧- اشرح آلية العبور.








## تطبيق على الارتباط والعبور في ذبابة الخل

٢٠١٩د

في ذبابة الخل لصفتي شكل الجناح ولون الجسم شفعان أليلان مرتبطان على شفع صبغي واحد، حيث أليل الجناح الطويل  $L$  وأليل الجسم الرمادي  $G$  راجحان على أليل الجناح الضامر  $l$  ولون الجسم الأسود  $g$ :


- أجري التهجين بين سلالتين صافيتين من ذبابة الخل، الأولى طويلة رمادية والثانية ضامرة سوداء فكان الجيل الأول كله طويل رمادي، وضح ذلك بجدول وراثي.
- وبالتهجين الاختباري بين ذكور الجيل الأول مع إناث تحمل الصفة المتنحية ضامرة سوداء حصلنا على جيل أول نصفه طويل رمادي، ونصفه الآخر ضامر أسود، وضح ذلك بجدول وراثي.
- بالتهجين الاختباري بين إناث الجيل الأول مع ذكور ذات جناح ضامر وجسم أسود، تم الحصول على جيل أفراد موزعة  $41.5\%$  طويل رمادي، و  $41.5\%$  ضامر أسود، و  $8.5\%$  طويل أسود، و  $8.5\%$  ضامر رمادي. وضح ذلك بجدول وراثي.

١- التهجين بين سلالتين صافيتين من ذبابة الخل، الأولى طويلة رمادية والثانية ضامرة سوداء:


<p>رمادي الجسم طويل الجناح <math>\times</math> أسود الجسم ضامر الجناح</p> 	النمط الظاهري للأبوين
	النمط الوراثي للأبوين
<p>مادة علم الأحياء <math>\times</math></p> 	احتمال أعراس الأبوين
	النمط الوراثي للأفراد الناتجة
<p>١٠٠% رمادي الجسم طويل الجناح</p> 	النمط الظاهري للأفراد الناتجة

٢- التهجين الاختباري بين ذكور الجيل الأول مع إناث تحمل الصفة المتنحية (ضامرة سوداء):


ذكور رمادية الجسم طويل الجناح × إناث سوداء الجسم ضامرة الجناح




النمط الظاهري للأبوين




×



النمط الوراثي للأبوين




×



احتمال أعراس الأبوين



+



النمط الوراثي للأفراد الناتجة

٥٠% أسود الجسم ضامر الجناح



٥٠% رمادي الجسم طويل الجناح




النمط الظاهري للأفراد الناتجة

د.حازم ضيف


مادة علم الأحياء

## ٣- التهجين الاختباري بين إناث الجيل الأول مع ذكور ذات جناح ضامر وجسم أسود:


إناث رمادية الجسم طويلة الجناح × ذكور سوداء الجسم ضامرة الجناح




النمط الظاهري للأبوين



×



النمط الوراثي للأبوين



احتمال أعراس الأبوين



النمط الوراثي للأفراد الناتجة

رمادي الجسم  
ضامر الجناح

8.5%

أسود الجسم  
طويلة الجناح

8.5%

أسود الجسم  
ضامر الجناح

41.5%

رمادي الجسم  
طويلة الجناح

41.5%

النمط الظاهري للأفراد الناتجة

النسب

تراكيب وراثية جديدة نتجت عن العبور

سلالات وراثية أبوية

السلالات

**نستنتج:** ارتباط صفتي شكل الجناح ولون الجسم عند ذبابة الخل هو ارتباط كامل عند الذكور (لا يحدث عبور) وارتباط جزئي عند الإناث، أي يكسر بالعبور

## الخارطة الصبغية (الوراثية)

## المعلومات النظرية

## الخارطة الوراثية:

## تعريفها:

خارطة تشير إلى موقع المورثات المحمولة على الصبغي من حيث ترتيبها والمسافات الفاصلة بينها.

## طريقة تحديدها:

يمكن تحديدها من خلال النسب المئوية للعبور بين المورثات ومن ثم رسمها.

## تحديد المسافة بين موقعين مورثيين:

- نسبة العبور بين موقعين مورثيين على الصبغي تساوي: المسافة فيما بينهما.
- كلما زادت المسافة بين مورثيين متجاورتين زادت نسبة العبور فيما بينهما.
- كلما نقصت المسافة قلت نسبة العبور.
- كل وحدة من المسافة الموجودة بينهما تعادل 1% وحدة خارطية.

## واحدة المسافة بين موقعين مورثيين:

المورغان أو الوحدة الخارطية.

## كيف تم رسم الخارطة الوراثية وتحديد

## مواقع المورثات الإنسان؟

- باستخدام تقانات حيوية حديثة تعتمد على معرفة تسلسل النكليوتيدات الموجودة في جينوم الإنسان.
- يبدأ رسم الخارطة الصبغية لثلاث مورثات بتحديد ترتيبها الصحيح على الصبغي، ومن ثم تحديد المسافات الفاصلة فيما بينها.

## مثال

إذا كانت نسبة العبور بين A و B هي 10% فإن ذلك يدل على أن المسافة الخطية بين هاتين المورثتين هي 10 وحدات خارطية.


## تمرين:

المورثات A، B، C مرتبطة على صبغي واحد نسبة العبور بين A و B هي 20% وبين B و C هي 30% بين A و C هي 10%.


## المطلوب:

- 1- حدد المواقع النسبية لهذه المورثات على الصبغي مبيناً ذلك بالرسم.
- 2- حدد المسافة بين المورثتين A و C مقدره بالوحدة الخارطية ( مورغان).

1- مما سبق نجد أن المورثة A تقع بين المورثتين B و C وهي أقرب للمورثة C.



2- المسافة بين A و C تساوي 10 وحدات خارطية.



- 1- اكتب المصطلح: خارطة تشير إلى موقع المورثات المحمولة على الصبغي من حيث ترتيبها والمسافات الفاصلة بينها.
- 2- ما هي طريقة تحديد الخارطة الوراثية؟
- 3- ما هي واحدة تقدير الخارطة الوراثية؟
- 4- ما هي طريقة تحديد المسافة بين موقعين مورثيين؟
- 5- كيف تم رسم الخارطة الوراثية وتحديد مواقع المورثات الإنسان؟

**ثانياً) التأثير بين المورثات وتعديلات النسب المنديلية في الهجونة الثنائية:**  
4- الصفات الكمية:

صورة	أمثلة	المعلومات النظرية
	<p><b>لدينا سلالتان من القمح:</b>  <b>سلالة ١:</b>  <b>حبوبها حمراء</b>  <b>R1R1 R2R2 R3R3</b>  <b>سلالة ٢:</b>  <b>حبوبها بيضاء</b>  <b>r1r1 r2r2 r3r3</b></p> <p>بالتجهين بينهما كان الجيل الأول:  <b>أحمر وسطي اللون:</b>  <b>R1r1 R2r2 R3r3</b></p> <p>وظهر في الجيل الثاني أنماط ظاهرية متدرجة للون الأحمر للحبوب.          ألاحظ ترتيب الأنماط الوراثية الآتية حسب تدرجها اللوني من الفاتح إلى الغامق:  <b>r1r1 R2r2 r3r3</b>  <b>R1r1 R2R2 r3r3</b>  <b>R1r1 R2r2 R3R3</b></p>	<p><b>الصفات الكمية:</b>          صفات لها أنماط ظاهرية عديدة متدرجة تختلف عن بعضها بمقادير كمية، وليست نوعية.</p> <p><b>تفسير وجود الصفات الكمية:</b>          تخضع هذه الصفات إلى تأثير عدد من الأليلات التراكمية الراجحة غير المرتبطة، والتي تعود لصفة واحدة، وكل أليل راجح منها يضيف تأثيره إلى الأليلات الأخرى بشكل تراكمي، بحيث يتحدد النمط الظاهري بعدد الأليلات التراكمية الراجحة في النمط الوراثي للفرد، ودرجة تأثير النمط الظاهري بالعوامل البيئية</p>
	<p><b>لون العيون عند الإنسان</b>          يعتقد أن صفة لون العيون متأثرة ب 16 مورثة مختلفة.          يتحدد لون العيون ب:          كمية صباغ الميلانين في القرنية</p> <p><b>مثال:</b>          تكون كمية صباغ الميلانين أكبر وفق الترتيب:          ١- في العيون البنية الداكنة.          ٢- في العيون العسلية والخضراء.          ٣- في العيون الزرقاء.</p>	<p><b>مثال:</b>          إن زيادة عدد الأليلات الراجحة في النمط الوراثي للفرد يزيد تدريجياً من شدة اللون الأحمر وبالعكس.</p>

١- اكتب المصطلح: صفات لها أنماط ظاهرية عديدة متدرجة تختلف

عن بعضها بمقادير كمية، وليست نوعية

٢- فسر وجود الصفات الكمية.

٣- كم عدد المورثات التي تحدد لون العيون لدى الإنسان

٤- رتب ألوان العيون التالية حسب كمية الميلانين في قزحيتها:  
 الأزرق - البني الداكن - العسلي والأخضر

## التقويم النهائي

أولاً: أجب بكلمة صح للعبارة الصحيحة وبكلمة غلط للعبارة المغلوطة لكل مما يأتي:

1. يمكن الحصول على سلالات صافية من اللون الأسمر في خيول البالمينو.
2. الأزهار البيضاء في نبات الكاميليا نمطها الوراثي RW
3. تموت الدجاجات الزاحفة من النمط الوراثي Aa
4. النمط الوراثي في نبات الكوسا WW YY يعطي ثماراً بيضاء.
5. ظهور تراكيب وراثية جديدة عند إجراء تهجين اختباري لأنثى ذبابة الخل رغم وجود الارتباط.

ثانياً: أختار لكل عبارة من العمود (أ) ما يناسبها من العمود (ب):

العمود (ب)	العمود (أ)
1:2:1 (أ)	١- نسب F2 في الهجونة الأحادية المندلية ( )
1:2 (ب)	٢- نسب F2 في الحجب الراجح ( )
1:3 (ج)	٣- النسب في المورثات المميّنة ( )
1:3:12 (د)	٤- نسب F2 في الرجحان غير التام والمشارك ( )



ثالثاً: أحل المسائل الوراثية الآتية:

1. أجري التهجين بين سلالتين من الدجاج الأندلسي الأولى ريشها أسود B والثانية ذات ريش أبيض W كان الجيل الأول كله مع ريش أسود وأبيض، والمطلوب:

أ- ما نمط هذه الهجونة؟ ولماذا؟

ب- وضع بجدول وراثي نتائج هجونة الآباء، وهجونة أفراد الجيل الأول.

ج- وضع بجدول وراثي نتائج التزاوج بين ديك من الجيل الأول

مع دجاجات ذات ريش أسود.

2. أجري التهجين بين سلالتين من نبات فم السمكة إحداها بأزهار حمراء R طويلة الساق L والأخرى بأزهار بيضاء W قصيرة الساق l فكان الجيل الأول كله بأزهار وردية طويلة الساق. والمطلوب:

أ- ما نمط الهجونة لكل من الصفتين؟

ب- ما النمط الوراثي للأبوين وأفراد الجيل الأول؟

ج- وضع بجدول وراثي نتائج التهجين بين فرد من الجيل الأول وردي طويل مع فرد أبيض قصير. فإذا كان أليل

الشعر الأسود B راجح على أليل الشعر الأبيض b وأليل الشعر الخشن H راجح على أليل الشعر الناعم h كانت هذه الصفات غير مرتبطة بالجنس.

المطلوب:

- ما النمط الوراثي لكل من الأبوين ولأعراسهما المحتملة؟
- بين بجدول النمط الوراثي والظاهري لكل من الأفراد الناتجة.

## حل التقويم النهائي

أولاً:

١- غلط ٢- غلط ٣- غلط ٤- صح ٥- صح

ثانياً:

العمود (ب)	العمود (أ)
ج) 1:3	١- نسب F2 في الهجونة الأحادية المندلية ( )
د) 1:3:12	٢- نسب F2 في الحجب الراجح ( )
ب) 1:2	٣- النسب في المورثات المميّنة ( )
أ) 1:2:1	٤- نسب F2 في الرجحان غير التام والمشارك ( )

ثالثاً:

١-

نمط الهجونة: رجحان تام - يحمل الفرد متخالف اللواقح صفة أحد الأبوين.

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:	
ريش أبيض × ريش أسود	النمط الظاهري للأبوين
BB × WW	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} B) \times (\frac{1}{1} W)$	احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{1} BW$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
100% ريش أسود وأبيض	النمط الظاهري للجيل الأول F1
التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:	
ريش أسود وأبيض × ريش أسود وأبيض	النمط الظاهري للجيل الأول
BW × BW	النمط الوراثي للجيل الأول
$(\frac{1}{2} B + \frac{1}{2} W) \times (\frac{1}{2} B + \frac{1}{2} W)$	احتمال أعراس الجيل الأول F1
$\frac{1}{4} WW$	النمط الوراثي للجيل الثاني F2
$+\frac{1}{4} BW$	ريش أسود
$+\frac{1}{4} BW$	ريش أسود وأبيض
$+\frac{1}{4} BB$	ريش أبيض
النسبة:	1
2	1
1	2
التزاوج بين ديك من الجيل الأول مع دجاجات ذات ريش أسود:	
ريش أسود وأبيض × ريش أسود	النمط الظاهري للأبوين
BB × BW	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} B) \times (\frac{1}{2} B + \frac{1}{2} W)$	احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{2} BB$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
$+\frac{1}{2} BW$	النمط الظاهري للجيل الأول F1
50% ريش أسود	50% ريش أسود وأبيض

٢-

أ- الرجحان غير التام بالنسبة لصفة اللون، رجحان تام لصفة الشكل


ب- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:	
حمراء طويلة × بيضاء قصيرة	النمط الظاهري للأبوين
rr ll × RR LL	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} rl) \times (\frac{1}{1} RL)$	احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{1} Rr Ll$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
100% وردية طويلة	النمط الظاهري للجيل الأول F1
ج- التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:	

وردية طويلة × بيضاء قصيرة		النمط الظاهري للأبوين	
$Rr Ll \times rr ll$		النمط الوراثي للأبوين	
$(\frac{1}{2} RL + \frac{1}{2} Rl + \frac{1}{2} rL + \frac{1}{2} rl)$		احتمال أعراس الأبوين	
$\frac{1}{4} Rr Ll$	$+\frac{1}{4} Rr ll$	$+\frac{1}{4} rr Ll$	$+\frac{1}{4} rr ll$
وردية طويلة	وردية قصيرة	بيضاء طويلة	بيضاء قصيرة

توجد فيديوهات توضيحية هامة لهذا الدرس تشرح بعض الفقرات بأمتثلة ولقطات من الواقع لا تنس عزيزي الطالب مشاهدتها، ولا تنس حل نموذج الامتحان الخاص لهذا الدرس.



يتم نشر الفيديوهات والمذكرات عبر مجموعاتي على واتس أب،  
قم بطلب الانضمام عبر مراسلتي على الواتس حصراً على الرقم: ٠٩٤٢٢٤٩٩٤٨



د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء



## الدرس (٣): تحديد الجنس لدى الأحياء


## أنواع الصبغيات

نميز عند الإنسان والحيوان وقليل من النباتات نوعين من الصبغيات:

- صبغيات جسمية A
- صبغيات جنسية

صبغيات جنسية	صبغيات جسمية A	
مختلفة بين الذكر والأنثى	متماثلة عند الذكر والأنثى	وجودها لدى الذكر والأنثى
تحمل: - مورثات تحدد الصفات الجنسية الأولية - و مورثات ترمز إلى صفات جسمية أيضاً	تحمل: مورثات مسؤولة عن ظهور الصفات الجسمية	الوظيفة







## الصبغيات الجسمية



١- قارن بين الصبغيات الجسمية A والصبغيات الجنسية من حيث: وجودها لدى الذكر والأنثى - الوظيفة

## تحديد الجنس لدى الأحياء

توجد عدة أنظمة تحديد الجنس لدى الأحياء المختلفة كما يلي:





الصبغيات المسؤولة	نظام تحديد الجنس			الكائن
	المسؤول عن تحديد الجنس	الأنثى	الذكر	
الصبغيات المسؤولة	الذكر	XX	XY	الإنسان 
				ذبابة الخل 
الصبغيات الجنسية	الأنثى	ZW	ZZ	معظم الطيور 
				الفرشات 
				الأسماك 
	الذكر	XX	XO	الجراد 

- ١- قارن بين الإنسان - ذبابة الخل - معظم الطيور - الفراشات - الأسماك - الجراد من حيث: نظام تحديد الجنس.
- ٢- قارن بين الإنسان - ذبابة الخل - معظم الطيور - الفراشات - الأسماك - الجراد من حيث: المسؤول عن تحديد الجنس.

## تحديد الجنس لدى الإنسان

ما عدد الصبغيات عند كل من ذكر وأنثى الإنسان؟ وبماذا تختلف صبغيات الذكر عن صبغيات الأنثى؟  
٤٦ صبغي لدى كل من ذكر و أنثى الانسان.

وتختلف صبغيات الذكر عن صبغيات الأنثى بالصبغيات الجنسية فهي لدى الأنثى XX ولدى الذكر و XY

عند الذكر	عند الأنثى	
		
		الطابع النووي
<p>د.حازم ضعيف</p> <p>23 شفعًا صبغياً: 22 شفعًا جسمياً + 1 شفع جنسي مادة علم الأحياء</p>		الأشفاص الصبغية
الصبغة الصبغية للذكر الطبيعي: $2n = 44 + XY$	الصبغة الصبغية للأنثى الطبيعية: $2n = 44 + XX$	الصبغة الصبغية
XY	XX	الصبغيات الجنسية
يعطي الذكر نوعين من النطاف: $n = 22 + X$ $n = 22 + Y$	تعطي الأنثى نوعًا واحدًا من البيوض: $n = 22 + X$	أنواع الأعراس
<p>نستنتج أن :</p> <p><b>أعراس الذكر هي التي تحدد الجنس عند الإنسان</b> أو: المسؤول عن تحديد الجنس لدى الإنسان هو الذكر (فسر): لوجود نوعين من الأعراس.</p>		
<p>١- (صورة طابع نووي ثم سؤال): حدد لمن يعود هذا الطابع النووي ج- ذكر أو أنثى إنسان ٢- قارن بين ذكر الإنسان وأنثى الإنسان من حيث: الصيغة الصبغية - الصبغيات الجنسية - أنواع الأعراس وصيغتها ٣- من الجنس المسؤول عن تحديد جنس المولود عند الإنسان؟ ٤- فسر: المسؤول عن تحديد الجنس لدى الإنسان هو الذكر</p>		





## تحديد الجنس لدى ذبابة الخل

١ - ما عدد الأشفاغ الصبغية لدى كل من ذكر ذبابة الخل و أنثاه؟ و بماذا تختلف بينها؟  
أربع أشفاغ صبغية

تختلف فيما بينها بالشفع الصبغي الجنسي فهو لدى الذكر XY, لدى الأنثى XX

٢- ماذا أسمى الأشفاغ الصبغية المتماثلة والمتخالفة عند كل منهما؟ وما دور كل منها؟

نسمى الأشفاغ الصبغية المتماثلة صبغيات جسمية مسؤولة عن الصفات الجسمية والشفع المختلف صبغيات جنسية تحمل مورثات مسؤولة عن الصفات الجنسية الأولية ومورثاتها ترمز صفات جسمية أيضاً



عند الذكر	عند الأنثى	
		
		الطابع النووي
4 أشفاغ صبغية: 3 أشفاغ جسمية + 1 شفع جنسي		الأشفاغ الصبغية
الصيغة الصبغية للذكر الطبيعي: $2n = 6 + XY$	الصيغة الصبغية للأنثى الطبيعية: $2n = 6 + XX$	الصيغة الصبغية
XY	XX	الصبغيات الجنسية
يعطي الذكر نوعين من النطاف: $n = 3 + X$ $n = 3 + Y$	تعطي الأنثى نوعاً واحداً من البيوض: $n = 3 + X$	أنواع الأعراس

نستنتج أن :

أعراس الذكر هي التي تحدد الجنس عند ذبابة الخل  
أو: المسؤول عن تحديد الجنس لدى ذبابة الخل هو الذكر (فسر):  
لوجود نوعين من الأعراس.

- ١- (صورة طابع نووي ثم سؤال): حدد لمن يعود هذا الطابع النووي ج- ذكر أو أنثى ذبابة الخل
- ٢- قارن بين ذكر ذبابة الخل وأنثى ذبابة الخل من حيث: الصيغة الصبغية - الصبغيات الجنسية - أنواع الأعراس وصيغتها
- ٣- من الجنس المسؤول عن تحديد جنس المولود عند ذبابة الخل ؟
- ٤- فسر: المسؤول عن تحديد الجنس لدى ذبابة الخل هو الذكر

تحديد الجنس لدى معظم الطيور + الفراشات + الأسماك		
عند الأنثى	عند الذكر	
		
ZW	ZZ	الصبغيات الجنسية
تعطي الأنثى نوعين من البيوض	يعطي الذكر نوعًا واحدًا من النطاف	أنواع الأعراس
<p><b>نستنتج أن :</b>  <b>أعراس الأنثى هي التي تحدد الجنس عند معظم الطيور + الفراشات + الأسماك</b></p> <p><b>بعبارة أخرى:</b>  <b>المسؤول عن تحديد الجنس لدى معظم الطيور + الفراشات + الأسماك هي الأنثى (فسر:)</b>  <b>لوجود نوعين من الأعراس.</b></p>		
<p>١- قارن بين ذكر وأنثى معظم الطيور/ الفراشات / الأسماك من حيث: الصبغيات الجنسية – أنواع الأعراس          ٢- من الجنس المسؤول عن تحديد جنس المولود عند معظم الطيور/ الفراشات / الأسماك.          ٣- فسر: المسؤول عن تحديد الجنس لدى معظم الطيور/ الفراشات / الأسماك هي الأنثى</p>		

تحديد الجنس لدى الجراد		
عند الأنثى	عند الذكر	
		
XX	X0	الصبغيات الجنسية
تعطي الأنثى نوعًا واحدًا من البيوض	يعطي الذكر نوعين من النطاف	أنواع الأعراس
<p><b>نستنتج أن :</b>  <b>أعراس الذكر هي التي تحدد الجنس عند الجراد</b></p> <p><b>بعبارة أخرى:</b>  <b>المسؤول عن تحديد الجنس لدى الجراد هو الذكر (فسر:)</b>  <b>لوجود نوعين من الأعراس.</b></p>		
<p>١- قارن بين ذكر وأنثى الجراد من حيث: الصبغيات الجنسية – أنواع الأعراس          ٢- من الجنس المسؤول عن تحديد جنس المولود عند الجراد          ٣- فسر: المسؤول عن تحديد الجنس لدى الجراد هي الأنثى</p>		

## الوراثة والجنس

هناك علاقة بين جنس الكائن (ذكر/أنثى) مع الوراثة من ناحيتين:  
 ١- الوراثة المرتبطة بالصبغيات الجنسية.  
 ٢- الوراثة المتأثرة بالجنس.

## ١- الوراثة المرتبطة بالصبغيات الجنسية

## التطبيق العملي

الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي X لدى ذبابة الخل: وراثه صفة لون العيون:  
 بالتهجين بين إناث بيضاء العيون r مع ذكور حمراء العيون R كانت النتائج كما يلي:  
 جميع الذكور الناتجة بعيون بيضاء و جميع الإناث الناتجة بعيون حمراء.  
 بفرض أليل الصفة محمول على الصبغي الجنسي X دون مقابل له على الصبغي الجنسي Y وأليل العيون الحمراء راجح على أليل العيون البيضاء.

الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

النمط الظاهري للأبوين	ذكر أحمر العينين × أنثى بيضاء العينين
النمط الوراثي للأبوين	$X_{(r)}X_{(r)} \times X_{(R)}Y_{(0)}$
احتمال أعراس الأبوين P	$(\frac{1}{2} X_{(r)}) \times (\frac{1}{2} X_{(R)} + \frac{1}{2} Y_{(0)})$
النمط الوراثي للجيل الأول F1	$\frac{1}{2} X_{(R)}X_{(r)} + \frac{1}{2} X_{(r)}Y_{(0)}$
النمط الظاهري للجيل الأول F1	٥٠% ذكور بيضاء العينين ٥٠% إناث حمراء العينين

التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:

النمط الظاهري للأبوين	ذكور بيضاء العينين × إناث حمراء العينين
النمط الوراثي للأبوين	$X_{(R)}X_{(r)} \times X_{(r)}Y_{(0)}$
احتمال أعراس الأبوين	$(\frac{1}{2} X_{(R)} + \frac{1}{2} X_{(r)}) \times (\frac{1}{2} X_{(r)} + \frac{1}{2} Y_{(0)})$
النمط الوراثي للأبناء	$\frac{1}{4} X_{(R)}X_{(r)} + \frac{1}{4} X_{(R)}Y_{(0)} + \frac{1}{4} X_{(r)}X_{(r)} + \frac{1}{4} X_{(r)}Y_{(0)}$
النمط الظاهري للأبناء	٢٥% ذكور بيضاء العينين ٢٥% ذكور حمراء العينين ٢٥% إناث بيضاء العينين ٢٥% إناث حمراء العينين

## النظري

**الوراثة المرتبطة بالصبغيات الجنسية هي:**  
 حالة أليلات مسؤولة عن صفات جسمية محمولة على الصبغي الجنسي X دون مقابل لها على الصبغي الجنسي Y وتسمى وراثه مرتبطة بالصبغي الجنسي X.

مثال:








- الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي X لدى ذبابة الخل ( وراثه صفة لون العيون)



- لون ريش الببغاء  
 - لون فراشة عثة الغراب

- ١- اكتب المصطلح: حالة أليلات مسؤولة عن صفات جسمية محمولة على الصبغي الجنسي X دون مقابل لها على الصبغي الجنسي Y وتسمى وراثه مرتبطة بالصبغي الجنسي X
- ٢- اذكر مثلاً عن الوراثة المرتبطة بالصبغيات الجنسية.
- ٣- حدد نوع وراثه صفة لون العيون لدى ذبابة الخل.

## ٢- الوراثة المتأثرة بالجنس

التطبيق العملي			النظري
صفة ظهور القرون وانعدامها عند الأغنام: الأليل H مسؤول عن ظهور القرون عند الأغنام راجح عند الذكور على الأليل h المسؤول عن غياب القرون ومنتج عند الإناث كما يظهر الجدول الآتي:			<p><b>في الوراثة المتأثرة بالجنس:</b> المورثات المسؤولة عن هذه الصفات (موقعها): د ٢٠١٧ محمولة على الصبغيات الجسمية، حيث:</p> <p>النمط الوراثي متخالف للواقع يعبر عند الذكر بنمط ظاهري مختلف عنه عند الأنثى (فسر): يعود ذلك إلى أثر الحاثات الجنسية على عمل المورثات في كلا الجنسين.</p> <p><b>مثال:</b> صفة ظهور القرون وانعدامها عند الأغنام.</p> 
النمط الظاهري للإناث	النمط الظاهري للذكور	النمط الوراثي	
مع قرون 	مع قرون 	HH	
بدون قرون 	بدون قرون 	hh	
بدون قرون 	مع قرون 	Hh	

١- اكتب المصطلح: تكون المورثات المسؤولة عن هذه الصفات محمولة على الصبغيات الجسمية، حيث النمط الوراثي متخالف للواقع يعبر عند الذكر بنمط ظاهري مختلف عنه عند الأنثى ويعود ذلك إلى أثر الحاثات الجنسية على عمل المورثات في كلا الجنسين.

٢- فسر: النمط الوراثي متخالف للواقع يعبر عند الذكر بنمط ظاهري مختلف عنه عند الأنثى.

٣- اذكر مثالاً عن الوراثة المتأثرة بالجنس.

٤- حدد نوع وراثته وظهور القرون وانعدامها عند الأغنام.

٥- حدد موقع أليلات المورثات المتأثرة بالجنس = موقع أليلات صفة ظهور القرون وانعدامها عند الأغنام = موقع أليلات الصلع الجبهي لدى الإنسان

توجد فيديوهات توضيحية هامة لهذا الدرس تشرح بعض الفقرات بأمثلة ولقطات من الواقع لا تنس عزيزي الطالب مشاهدتها، ولا تنس حل نموذج الامتحان الخاص لهذا الدرس.

يتم نشر الفيديوهات والمذكرات عبر مجموعاتي على واتس أب،  
قم بطلب الانضمام عبر مراسلتي على الواتس حصراً على الرقم: ٠٩٤٢٢٤٩٩٤٨



## التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. يتحدد الجنس عندها بأعراس الأنثى  
أ- الطيور ب- النباتات ج- الإنسان د- الجراد
2. دور الصبغي Y عند الإنسان هو:  
أ- تحديد الذكورة ب- تحديد الأنوثة ج- تحديد الخصب الجنسي د- أوج

ثانياً: أكتب في القائمة B الرقم الموافق من القائمة A:

القائمة B	القائمة A
نظام تحديد الجنس ZZ – ZW ( )	١- الإنسان وذبابة الخل
نظام تحديد الجنس XX – XO ( )	٢- الفراشات والطيور
نظام تحديد الجنس XX – XY ( )	٣- الجراد

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- أ- النمط الوراثي Hh يسبب ظهور القرون عند ذكور الأغنام وانعدامها عند الإناث.  
ب- تكون أنثى ذبابة الخل ذات العيون البيض دوماً متماثلة اللواقح.

رابعاً: أحل المسائل الوراثية الآتية:

## المسألة الأولى:

أجري التهجين بين ذكر ببغاء يحمل صفة اللون الكستنائي للريش G مع أنثى كستنائية لون لريش G فكان من بين الأفراد الناتجة إناث عادية لون الريش g د ٢٠١٦

المطلوب:

١. ما النمط الوراثي لكل من الأبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منهما؟
٢. ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأفراد الناتجة؟
٣. كيف تفسر هذه النتائج؟

مادة علم الأحياء

## المسألة الثانية:

أجري التهجين بين ذكر فراشة عثة الغراب شاحب اللون n مع أنثى طبيعية اللون N فكانت جميع الذكور طبيعية اللون وجميع الإناث شاحبة اللون

المطلوب:

١. ما نمط هذه الهجونة؟
٢. ضع تحليلاً وراثياً لهذه الهجونة.
٣. كيف تفسر هذه النتائج؟



## حل التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. يتحدد الجنس عندها بأعراس الأنثى

أ- الطيور ب- النباتات ج- الإنسان د- الجراد

2. دور الصبغي Y عند الإنسان هو:

أ- تحديد الذكورة ب- تحديد الأنوثة ج- تحديد الخصب الجنسي د- أوج

ثانياً: أكتب في القائمة B الرقم الموافق من القائمة A:

القائمة B	القائمة A
نظام تحديد الجنس ZZ - ZW ( ٢ )	١- الإنسان وذبابة الخل
نظام تحديد الجنس XX - XO ( ٣ )	٢- الفراشات والطيور
نظام تحديد الجنس XX - XY ( ١ )	٣- الجراد

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

أ- النمط الوراثي Hh يسبب ظهور القرون عند ذكور الأغنام وانعدامها عند الإناث. لأن الأليل الراجح لدى الذكور h المسؤول عن تشكل القرون راجح على الأليل H ومنتج لدى الإناث بسبب أثر الحاثات الجنسية على عمل المورثات في كلا الجنسين

ب- تكون أنثى ذبابة الخل ذات العيون البيضاء دوماً متمثلة للواقع. لأن أليل لون العيون البيضاء منتج فلا تظهر الصفة المتنحية إلا في حال تماثل اللواقح

رابعاً: أحل المسائل الوراثية الآتية:

المسألة الأولى:

أجري التهجين بين ذكر بيغاء يحمل صفة اللون الكستنائي للريش G مع أنثى كستنائية لون لريش G فكان من بين الأفراد الناتجة إناث عادية لون الريش g د ٢٠١٦

مادة علم الأحياء

المطلوب:

1. ما النمط الوراثي لكل من الأبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منهما؟

2. ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأفراد الناتجة؟

3. كيف تفسر هذه النتائج؟

التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني:

أنثى بلون كستنائي × ذكر بلون كستنائي				النمط الظاهري للأبوين
$Z_G Z_g \times Z_G W_0$				النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{2} Z_G + \frac{1}{2} Z_g) \times (\frac{1}{2} Z_G + \frac{1}{2} W_0)$				احتمال أعراس الأبوين
$\frac{1}{4} Z_G Z_G$	$+\frac{1}{4} Z_G Z_g$	$+\frac{1}{4} Z_G W_0$	$+\frac{1}{4} Z_g W_0$	النمط الوراثي للأبناء
ذكر بلون كستنائي	ذكر بلون كستنائي	أنثى بلون كستنائي	أنثى بلون عادي	النمط الظاهري للأبناء
٣- تفسر هذه النتائج لأن أليل لون الريش محمول على الصبغي الجنسي Z ولا مقابل له على الصبغي الجنسي W				


**المسألة الثانية:**

أجري التهجين بين ذكر فراشة عثة الغراب شاحب اللون  $n$  مع أنثى طبيعية اللون  $N$  فكانت جميع الذكور طبيعية اللون وجميع الإناث شاحبة اللون

**المطلوب:**

1. ما نمط هذه الهجونة؟
2. ضع تحليلاً وراثياً لهذه الهجونة.
3. كيف تفسر هذه النتائج؟

١- نمط الهجونة رجحان تام		
ذکر شاحب اللون × أنثى طبيعية		النمط الظاهري للأبوين
$Z_n Z_n \times Z_N W_0$		النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{2} Z_n) \times (\frac{1}{2} Z_N + \frac{1}{2} W_0)$		احتمال أعراس الأبوين
$\frac{1}{2} Z_N Z_n$	$+\frac{1}{2} Z_n W_0$	النمط الوراثي للأبناء
50% أنثى شاحبة اللون	50% ذكر عادي اللون	النمط الظاهري للأبناء
٣- تفسر هذه النتائج لأن أليل اللون محمول على الصبغي الجنسي $Z$ ولا مقابل له على الصبغي الجنسي $W$		



**د.حازم ضعيف**


مادة علم الأحياء

## الدرس (٤): الوراثة عند الإنسان

## مقدمة

نميّر عند الإنسان أنماطاً مختلفة من التوريث:

- وراثة مندلية
- وراثة لا مندلية
- وراثة مرتبطة بالجنس بالصبغي X أو بالصبغي Y
- وراثة مرتبطة بالجنس جزئياً
- وراثة متأثرة بالجنس



دراسة الوراثة عن الإنسان تعاني صعوبات كثيرة، ما هي؟


- الإنسان غير خاضع للتجريب
- لا يمكن عزل سلالات أبوية صافية
- قلة عدد الأفراد في الأسرة
- طول عمر الإنسان

- ١- عدد أنواع التوريث لدى الإنسان.
- ٢- عدد الصعوبات التي تواجه دراسة الوراثة عن الإنسان.

د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء

## شجرة النسب



## شجرة النسب:

هي مخطط يبين توارث صفة ما بين أفراد أسرة معينة

نلجأ لاستخدام شجرة النسب عند الإنسان (فسر):  
بسبب الصعوبات الكثيرة التي تعاني منها دراسة الوراثة لدى الإنسان

## الرموز والمصطلحات المستخدمة في شجرة النسب:

الرمز	الأفراد	الرمز	الأفراد	الرمز	الأفراد
—	خط التزاوج		الذكر		الأنثى
I	جيل الآباء		ذكر مصاب		أنثى مصابة
II	جيل الأبناء		ذكر ناقل للصفة		أنثى ناقلة للصفة

١- اكتب المصطلح: مخطط يبين توارث صفة ما بين أفراد أسرة معينة

٢- فسر: نلجأ لاستخدام شجرة النسب عند الإنسان.

٣- ارسم الشكل المعبر عن: الأنثى - أنثى مصابة - أنثى ناقلة للصفة - الذكر - ذكر مصاب - ذكر ناقل للصفة - خط التزاوج - جيل الآباء - جيل الأبناء في شجرة النسب.

مادة علم الأحياء

٤- (رمز من الجدول ثم سؤال): إلام يرمز هذا الشكل؟

## أولاً: الوراثة المنديلية لدى الإنسان


من الأمثلة التي يتبع توريثها للوراثة المنديلية:



١- مرض هنتغتون



٢- مرض المهق



٣- وراثة زمر الدم من النمط Rh (الريزوس)

(وضعتها مع الوراثة المنديلية لأنه هذا هو الصحيح،  
لكن إذا سؤلنا عنها نجيب كما في الكتاب بأنها وراثة لا  
منديلية / أليالات متعددة متقابلة/ د ٢٠١٨ت)


١- عدد ٣ أمثلة عن صفات يتبع توريثها للوراثة المنديلية

## أولاً: الوراثة المنديلية لدى الإنسان

## ١- مرض هنتغتون

## التطبيق العملي

لديك شجرة النسب المجاورة تبين توارث مرض هنتغتون المطلوب:  
ضع تحليلاً وراثياً لها



## النظري

من أعراض مرض هنتغتون:  
- اضطرابات حركية على شكل حركات مفاجئة وغير متناسقة.  
- اضطرابات في الذاكرة

وقت (سن) ظهور مرض هنتغتون:  
نحو سن 40 سنة.

## آلية مرض هنتغتون:

أليل راجح طافر محمول على أحد صبغيات الشفع الرابع

ينتج عنه

تغيرات تجعل العصبونات في دماغ المريض فائقة الحساسية للناقل العصبي غلوتامات

مما يؤدي إلى

تهتك في هذه العصبونات



١- دراسة حالة: مريض يعاني من: اضطرابات حركية على شكل حركات مفاجئة وغير متناسقة - اضطرابات في الذاكرة، ما المرض المتوقع.

٢- عدد أعراض مرض هنتغتون.

٣- ما هو السن الوسطي لظهور مرض هنتغتون

٤- اشرح آلية مرض هنتغتون.

٥- ماذا ينتج عن وجود أليل مرض هنتغتون الراجح الطافر على أحد صبغيات الشفع الرابع؟


٦- ماذا ينتج عن التغيرات التي تجعل العصبونات في الدماغ فائقة الحساسية للناقل العصبي غلوتامات؟

## أولاً: الوراثة المندلية لدى الإنسان

## ٢- وراثة زمر الدم من النمط Rh (الريزوس)


## التطبيق العملي

لديك شجرة النسب المجاورة بالنسبة لعامل الريزوس (RH)، ضع تحليلاً وراثياً لها:



من البنت (١) تبين أن الأبوين متخالفا للواقع (Rr) الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول:

م إيجابية الريزوس (Rh+) × أب إيجابي الريزوس (Rh+)



النمط الظاهري للأبوين

Rr × Rr

النمط الوراثي للأبوين

( $\frac{1}{2}R + \frac{1}{2}r$ ) × ( $\frac{1}{2}R + \frac{1}{2}r$ )

احتمال أعراس الأبوين P

$\frac{1}{4}RR$


$+\frac{1}{4}Rr$

$+\frac{1}{4}Rr$

$+\frac{1}{4}rr$

النمط الوراثي للأبناء

إيجابي الريزوس (Rh+)



سلبى الريزوس (Rh-)



النمط الظاهري للأبناء

الصبي ٢ نمطه الوراثي غير محدد R-

البنت ١

الأفراد في المسألة

## النظري

يوجد لهذه الصفة نمطان من: د ٢٠١٨ ت  
الآليات المتعددة المتقابلة:

الأليل r	الأليل R	
متنح	راجح	الرجحان
لا يعطي مولد ضد خاص على سطح الكرية الحمراء	يعطي مولد ضد خاص على سطح الكرية الحمراء	إعطاء مولد ضد

الفرد الواحد يمتلك:

أليلين منها فقط

هذه الآليات نشأت (كيف):

بفعل الطفرات

بناءً على ذلك يكون لدينا الأنماط الآتية:

النمط الوراثي

النمط الظاهري

إيجابي الريزوس (+)

RR, Rr

سلبى الريزوس (+)

rr

١- قارن بين الأليل R والأليل r وراثة زمر الدم من النمط Rh من حيث: الرجحان - إعطاء مولد ضد.

٢- كم يمتلك الفرد من آليات تخص وراثة زمر الدم من النمط Rh؟

٣- كيف نشأت الآليات المختلفة؟


٤- وراثة زمر الدم من النمط Rh حدد الأنماط الظاهرية للأنماط الوراثية: RR - Rr - rr

٥- وراثة زمر الدم من النمط Rh حدد الأنماط الوراثية للأنماط الظاهرية:

إيجابي الريزوس (+) ، سلبى الريزوس (-)

## تطبيق ١ على الوراثة المنديلية لدى الإنسان

## مرض هنتغتون



٢٠٢٢د

لديك شجرة النسب المجاورة تبين توارث مرض هنتغتون  
المطلوب:

- ١- ما نمط هذه الهجونة
- ٢- ضع تحليلاً وراثياً لها

## ١- رجحان تام

أب سليم × أم مصابة

Hh × hh

 $(\frac{1}{2} H + \frac{1}{2} h) \times (\frac{1}{2} h)$  $\frac{1}{2} Hh$ 

مصاب

 $+\frac{1}{2} hh$ 

سليم

النمط الظاهري للأبوين

النمط الوراثي للأبوين


احتمال أعراس الأبوين P

النمط الوراثي للأبناء

النمط الظاهري للأبناء

## تطبيق ٢ على الوراثة المنديلية لدى الإنسان

## مرض هنتغتون



يظهر المخطط جانباً شجرة نسب لتوريث مرض هنتغتون:  
المطلوب:

اعتماداً على بيانات الشجرة:

١. هل أليل المرض راجح أم متنح؟ فسّر إجابتك .
٢. حدد الأنماط الوراثية للأفراد  $I_1 - I_2 - II_2$


١- أليل المرض هو أليل راجح لظهور صفة المرض في الأبوين متخالفي اللواقح ووجود أبناء غير مصابين.

٢- النمط الوراثي لـ  $I_1$  هو Hh ، والنمط الوراثي لـ  $I_2$  هو Hh ، والنمط الوراثي لـ  $II_3$  هو hh

## تطبيق ٣ على الوراثة المنديلية لدى الإنسان

## مرض المهق

مادة علم الأحياء



تمثل شجرة النسب المجاورة توريث حالة المهق لإحدى الأسر  
والمطلوب:

١. هل صفة المهق راجحة أم متنحية؟ علل إجابتك.
٢. هل وراثة هذه الصفة مرتبطة بالصبغي الجنسي X؟ علل إجابتك.
٣. بفرض أليل الصفة المدروسة a والأليل المقابل A اكتب الأنماط الوراثية للأفراد  $I_1 - I_2 - II_3 - II_2$

١- صفة المهق متنحية ،

التفسير: بما أن الأبوين غير مصابين وظهرت صفة المهق في بعض الأفراد الناتجة فهي صفة متنحية

٢- هذه الوراثة ليست مرتبطة بالصبغي الجنسي X،

التفسير: لأنها لو كانت مرتبطة بالصبغي الجنسي X لما كان الأب حامل الصفة وإنما مصاب (في حال وجود أليل المرض على X)

٣- من الصبي 2 والبنت 4 نستنتج أن الأبوين متخالفا اللواقح

- النمط الوراثي لـ  $I_1$  هو Aa- النمط الوراثي لـ  $I_2$  هو Aa- النمط الوراثي لـ  $II_3$  هو A- (نمط وراثي غير محدد إما سليم أو ناقل لمرض المهق)- النمط الوراثي لـ  $II_2$  هو aa



## ثانيا: الوراثة اللامندلية لدى الإنسان

## من الأمثلة على الوراثة اللامندلية:




صورة	نوع الوراثة	المثال
	رجحان مشترك (وراثة لامندلية) (بين الأليلين N,S)	مرض فقر الدم المنجلي
	رجحان مشترك (وراثة لامندلية) (بين الأليلين I^A, I^B)	
	رجحان تام (وراثة مندلية) (بين الأليلين I^A, i) و (بين الأليلين I^B, i)	زمرة الدم عند الإنسان (A,B,AB,O)

## مادة علم الأحياء

- عدد مثالين عن الوراثة اللامندلية وحدد نوع الوراثة اللامندلية لكل منهما.
- قارن بين الأشعاع الأليلية (I<sup>A</sup>, I<sup>B</sup>) - (I<sup>A</sup>, i) - (i, I<sup>B</sup>) من حيث: نوع الوراثة لكل منها.

## ثانيا: الوراثة اللامندلية لدى الإنسان

## ١- وراثة مرض فقر الدم المنجلي:

التطبيق العملي				النظري		
تزوج رجل وامرأة لا تبدو عليهما علائم الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي، فأنجبا أطفالاً بعضهم مصاب بمرض فقر الدم المنجلي. <b>المطلوب:</b> ١- ما النمط الوراثي للأبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منهما؟ ٢- ما الأنماط الوراثية و الظاهرية للأبناء الناتجة عن هذا التزاوج؟				<p><b>نمط الوراثة اللامندلية:</b> رجحان مشترك (بين الأليلين N,S) (فسر:) د٢٠١٩ت لأن كلا الأليلين يعبر عن نفسه لتشكل النمط الظاهري في الفرد متخالف اللواقح فقر الدم المنجلي يؤدي إلى التشوه في كريات الدم الحمراء كما يلي:</p>		
أب له صفة الخلايا المنجلية × أم لها صفة الخلايا المنجلية		النمط الظاهري للأبوين		فقر الدم المنجلي	الدم الطبيعي	
NS × NS		النمط الوراثي للأبوين				صورة للكريات الحمراء
$(\frac{1}{2}N + \frac{1}{2}S) \times (\frac{1}{2}N + \frac{1}{2}S)$		احتمال أعراس الأبوين P				
$\frac{1}{4}NN$	$\frac{1}{4}NS$	$\frac{1}{4}NS$	$\frac{1}{4}SS$	النمط الوراثي للأبناء		
خضاب دم طبيعي	له صفة الخلايا المنجلية	مصاب بفقر الدم المنجلي	النمط الظاهري للأبناء	منجلية الشكل	قرصية مقعرة الوجهين	شكل الكريات الحمراء
				أليل طافر S (Sickle)	أليل طبيعي N (Normal)	الأليل المسؤول
				خضاب دم منجلي	خضاب دم طبيعي	الخضاب
				غير طبيعية	طبيعية	الكريات الحمراء
				لأنها رديئة النقل للأكسجين	لأنها جيدة النقل للأكسجين	سبب كونها طبيعية أو غير طبيعية
				قليلة المرونة	جيدة	المرونة
 <p>كريات دم طبيعية جريان طبيعي</p> <p>يمكن أن تسد الكريات الحمر المنجلية المنطقة الوريدية من الشعيرات الدموية عندما تمرّ فيها لأن الكريات الحمر المنجلية قليلة المرونة</p> <p>كريات دم منجلية</p>				<p>يمكن أن تسد الكريات الحمر المنجلية المنطقة الوريدية من الشعيرات الدموية عندما تمرّ فيها (فسر:) لأن الكريات الحمر المنجلية قليلة المرونة</p>		

في فقر الدم المنجلي توجد ثلاثة أنماط وراثية تحدد ثلاثة أنماط ظاهرية (فسر):  
لأن العلاقة بين الأليل N والأليل S علاقة رجحان مشترك  
الأنماط الوراثية لفقر الدم المنجلي:

النمط الوراثي	الحالة المرضية	شكل الكريات الحمراء	صورة للكريات الحمراء	الخضاب الموجود في الكرية الحمراء
NN	أفراد أصحاء	طبيعية		طبيعي
SS	أفراد مرضى بفقر الدم المنجلي (غالباً مميت في مرحلة الطفولة)	منجلية الشكل		غير طبيعي
NS	حالة وسط بين الشكل القرصي والشكل المنجلي الطافر			في كل كرية حمراء نصف كمية الخضاب طبيعي ونصفه الآخر منجلي


- ١- حدد نمط وراثية مرض فقر الدم المنجلي.
- ٢- قارن بين الدم الطبيعي وفقر الدم المنجلي من حيث: شكل الكريات الحمراء - الأليل المسؤول - الخضاب - الكريات الحمراء - سبب كونها طبيعية أو غير طبيعية - المرونة
- ٣- فسر: يمكن أن تسد الكريات الحمر المنجلية المنطقة الوريدية من الشعريات الدموية عندما تمرّ فيها.
- ٤- فسر: تعود صفة الخلايا المنجلية لدى الإنسان إلى الرجحان المشترك.
- ٥- فسر: في فقر الدم المنجلي توجد ثلاثة أنماط وراثية تحدد ثلاثة أنماط ظاهرية
- ٦- قارن بين الأنماط الوراثية المتعلقة بفقر الدم المنجلي: NN - SS - NS من حيث: الحالة المرضية - شكل الكريات الحمراء - الخضاب الموجود في الكرية الحمراء

## ثانيًا: الوراثة اللامندلية لدى الإنسان

## ١- وراثة مرض فقر الدم المنجلي:

## التطبيق العملي

لديك شجرة النسب الآتية، ضع تحليلًا وراثيًا لها:



## النظري

تختلف الكريات الحمراء عن بعضها (كيف؟) بنوع مولد الضد الموجود على سطح الكرية الحمراء.

نمط وراثة زمر الدم عند الإنسان من حيث الأليلات: نمط الأليلات المتعددة المتقابلة

## نمط الأليلات المتعددة المتقابلة:

(أو فسر وراثة زمر الدم عند الإنسان تعد نمطًا من الأليلات المتعددة المتقابلة) د ٢٠٢٣

نمط يوجد فيه للصفة الواحدة أكثر من أليلين ضمن التجمع الوراثي Gene Poa للجماعة البشرية ولكن الفرد الواحد لا يمتلك سوى أليلين منها فقط.

وهذه الأليلات نشأت (كيف؟) نتيجة سلسلة من الطفرات

## أنماط الزمر الدموية:

النمط الظاهري	النمط الوراثي	مولدات الضد الموجودة على سطح الكريات الحمراء	صورة
الزمرة A	$I^A I^A$ أو $I^A i$	A	<p>زمرة الدم A</p>
الزمرة B	$I^B I^B$ أو $I^B i$	B	<p>زمرة الدم B</p>
الزمرة O	ii	لا يوجد مولد ضد	<p>زمرة الدم O</p>
الزمرة AB	$I^A I^B$	A و B	<p>زمرة الدم AB</p>

من الصبي ٣ نستنتج أن الأب متخالف للواقع

النمط الظاهري للأبوين

أم زمرتها AB × أب زمرة B

النمط الوراثي للأبوين

 $I^B i$  ×  $I^A I^B$ 

احتمال أعراس الأبوين P

 $(\frac{1}{2} I^B + \frac{1}{2} i)$  ×  $(\frac{1}{2} I^A + \frac{1}{2} I^B)$ 

النمط الوراثي للأبناء

 $\frac{1}{4} I^A I^B$   $+\frac{1}{4} I^A i$   $+\frac{1}{4} I^B I^B$   $+\frac{1}{4} I^B i$ 

النمط الظاهري للأبناء

AB A B

الأفراد في المسألة

بنت ٢ (نمطها الوراثي غير محدد -  $I^B$ )

صبي ٣ بنت ١

الرجحان بين أليلات الزمر الدموية:	
رجحان تام (سيادة تامة)	رجحان مشترك (تساوي في السيادة)
(بين الأليلين $I^A, i$ ) و (بين الأليلين $I^B, i$ )	بين الأليلين $I^A$ و $I^B$ إذ عبّر كلّ منهما عن نفسه ظاهرياً

١- لماذا تختلف كريات الدم الحمراء في الشكل السابق عن بعضها؟  
٢- ما أنواع زمر الدم لدى الإنسان؟ ما نوع مولدات الضدّ على سطح الكريات الحمر في كلّ منها؟  
٣- فسر: وجود مولدي الضد A و B معاً على سطح الكرية الحمراء في النمط AB  
٤- حدد نمط وراثة زمر الدم عند الإنسان من حيث الأليلات.  
٥- اكتب المصطلح: نمط يوجد فيه للصفة الواحدة أكثر من أليلين ضمن التجمع الوراثي للجماعة البشرية ولكن الفرد الواحد لا يمتلك سوى أليلين منها فقط.  
٦- حدد طبيعة الرجحان بين أليلات الزمر الدموية المختلفة.  
٧- كيف نشأت الأليلات المختلفة؟

## تطبيق على الزمر الدموية

٢٠٢١د

تزوج رجل زمرة الدموية O إيجابي عامل الريزوس من امرأة زمرة الدموية B سلبي الريزوس؛ فأنجبا أطفالاً أحدهم زمرة الدموية O سلبي الريزوس. المطلوب:

1. ما نمط الهجونة لكلا الصفتين؟
2. ما الأنماط الوراثية المحتملة للأبوين ولأعراسهما المحتملة؟
3. ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء؟ وما احتمال إنجاب طفل B إيجابي الريزوس؟

١- نمط الهجونة رجحان تام للفتين

أب زمرة O إيجابي × أم زمرة B سلبي	النمط الظاهري للأبوين		
$I^B i Rr$ × $ii Rr$	النمط الوراثي للأبوين		
$(\frac{1}{2} I^B r + \frac{1}{2} i r)$ × $(\frac{1}{2} i R + \frac{1}{2} i r)$	احتمال أعراس الأبوين P		
$\frac{1}{4} I^B i Rr$	$+\frac{1}{4} ii Rr$	النمط الوراثي للأبناء	
$+\frac{1}{4} I^B i rr$	$+\frac{1}{4} ii Rr$	النمط الظاهري للأبناء	
B إيجابي	B سلبي	O سلبي	O سلبي

احتمال إنجاب طفل B إيجابي الريزوس هو  $\frac{1}{4}$

## الوراثة والجنس

ترتبط الوراثة مع جنس الإنسان (ذكر/ أنثى) بعدة أشكال:

- ١- الوراثة المرتبطة بالصبغيات الجنسية
  - أ- المورثات المرتبطة بالصبغي الجنسي X
  - ب- المورثات المرتبطة بالصبغي الجنسي Y

٢- الوراثة المرتبطة بالجنس جزئياً

٣- الوراثة المتأثرة بالجنس

## ١- الوراثة المرتبطة بالصبغيات الجنسية:

## أ- المورثات المرتبطة بالصبغي الجنسي X



المورثات المرتبطة بالصبغي الجنسي X :

مورثات لصفات جسمية غالباً

(موقع هذه المورثات/ألياتها): د ٢٠١٣ ت

محمولة على جزء من الصبغي X، وليس لها مقابل على الصبغي Y

## من الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغي الجنسي X :



١- مرض الكساح المقاوم للفيامين D



٢- مرض الناعور المرتبط بالجنس




٣- وراثه مرض عمى الألوان الجزئي



٤- مرض الفوال



٥- مرض الضمور العضلي لدوشين DMP



٦- مرض تصلب مشيمية العين

## ٧- العشا الليلي




- ١- اكتب المصطلح: مورثات لصفات جسمية غالباً محمولة على جزء من الصبغي X ، وليس لها مقابل على الصبغي Y
  - ٢- عدد ٦ أمثلة عن الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي X.
  - ٣- حدد موقع أليلات الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي X
- = موقع أليلات مرض الكساح المقاوم للفيتامين D = موقع أليلات مرض الناعور المرتبط بالجنس = موقع أليلات مرض عمى الألوان الجزئي  
 = موقع أليلات مرض الفوال = موقع أليلات مرض الضمور العضلي لدوشين DMP = موقع أليلات مرض تصلب مشيمية العين  
 = موقع أليلات مرض العشا الليلي

## مرض الكساح المقاوم للفيتامين D

## التطبيق العملي

لديك شجرة النسب الآتية لتوريث مرض الكساح المقاوم للفيتامين D ، ضع تحليلاً وراثياً لها:



من الصبي ٣ نستنتج أن الأم متخالفة للواقع  $X_R X_r$

النمط الظاهري		النمط الوراثي		الجنس
مصاب	للأبوين	$X_R Y_0$	$X_R Y_0$	
سليم	للأبوين	$X_r Y_0$	$X_r Y_0$	الأنثى
مصابة	للأبوين	$X_R X_R$	$X_R X_R$	
مصابة	للأبوين	$X_R X_r$	$X_R X_r$	
سليمة	للأبوين	$X_r X_r$	$X_r X_r$	
أنثى مصابة	ذكر مصاب	ذكر سليم		
البناتان ١ و ٢ نمطهما الوراثي غير محدد $X_R$	لم يولد بعد	صبي ٣		

## النظري



## مرض الكساح المقاوم للفيتامين D

سببه:

أليل طافراجح محمول على الصبغي الجنسي X


وبذلك يكون لدينا الحالات الآتية:

- ١- ما سبب مرض الكساح المقاوم للفيتامين D؟
- ٢- إذا علمت أن أليل الإصابة بمرض الكساح المقاوم للفيتامين D هو الأليل الراجح R يقابله الأليل المتنحي r فحدد النمط الظاهري للأنماط الوراثية:  $X_r X_r - X_R X_r - X_R X_R - X_r Y_0 - X_R Y_0$

## تطبيق على مرض الناعور المرتبط بالجنس

د ٢٠١٤

إذا علمت أن المخطط جانباً يمثل شجرة نسب لتوريث مرض الناعور المرتبط بالجنس بفرض أليلي الصفة  $h$  ،  $H$



## ملاحظة:

الإناث المصابة بمرض الناعور المرتبط بالجنس:  
- تموت في المرحلة الجنينية غالباً  
- وفي حالات نادرة تصل إلى سن البلوغ، وتموت عند أول طمث.

- ١- هل أليل المرض راجح أم متنح؟ ولماذا؟
- ٢- حدد الصبغي الجنسي الحامل لأليل المرض، علل إجابتك.
- ٣- أستنتج الأنماط الوراثية للأفراد:  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $II_3$ ,  $III_1$  وحدد من منها يموت جنينياً غالباً.

- ١- بما أن الأبوين غير مصابين وظهرت الصفة في بعض الأفراد فهي صفة متنحية.
- ٢- الأليل محمول على الصبغي  $X$  وليس له مقابل على الصبغي  $Y$  بدليل ظهور ذكور سليمة وذكور مصابة في أبناء الجيل  $II$

٣-


- النمط الوراثي لـ  $I_1$  هو  $X_H X_h$  (تموت جنينياً غالباً لأنها أنثى مصابة)
- النمط الوراثي لـ  $I_2$  هو  $X_H Y_0$
- النمط الوراثي لـ  $II_3$  هو  $X_H X_h$  (تموت جنينياً غالباً لأنها أنثى مصابة)
- النمط الوراثي لـ  $III_1$  غير محدد  $X_H X(-)$  مادة علم الأحياء

- ٤- ما مصير الإناث المصابة بمرض الناعور المرتبط بالجنس؟ (سؤال إضافي)
- تموت في المرحلة الجنينية غالباً
- وفي حالات نادرة تصل إلى سن البلوغ، وتموت عند أول طمث.



## ١- الوراثة المرتبطة بالصبغيات الجنسية:

## ب- المورثات المرتبطة بالصبغي الجنسي Y

**الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي Y:**

وراثة تعود إلى مورثات

(موقع هذه المورثات/أليلاتها): د ٢٠١٦-٢٠١٩


محمولة على الصبغي Y وليس لها مقابل على الصبغي X.

الأب الحامل للصفة يورثها إلى جميع أبنائه الذكور (فسر):  
لأن المورثة المسؤولة عن إظهار هذه الصفة محمولة على  
الصبغي الجنسي Y الموجود عند الذكور فقط.

**مثال عن الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي Y:**

د ٢٠١٦-٢٠١٩

وراثة حزمة شعر على حافة صيوان الأذن



لا توجد إناث تمتلك حزمة شعر على حافة صيوان الأذن.

(فسر): د ٢٠١٧

لأن المورثة المسؤولة عن إظهار هذه الصفة محمولة على  
الصبغي الجنسي Y والأنثى لا تمتلك هذا الصبغي

- ١- اكتب المصطلح: وراثة تعود إلى مورثات محمولة على الصبغي Y وليس لها مقابل على الصبغي X
- ٢- فسر: في الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي Y الأب الحامل للصفة يورثها إلى جميع أبنائه الذكور.
- ٣- اذكر مثالاً عن الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي Y
- ٤- فسر: لا توجد إناث تمتلك حزمة شعر على حافة صيوان الأذن
- ٥- حدد موقع أليلات الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي Y = موقع أليلات الوراثة التي تورث للذكور فقط = موقع أليلات وراثة حزمة شعر على حافة صيوان الأذن

## ٢- الوراثة المرتبطة بالجنس جزئياً

## الوراثة المرتبطة بالجنس جزئياً :

وراثة يوجد فيها للصفة أليل

(موقع هذا الأليل: د ٢٠١٥)

محمول على الصبغي الجنسي X ، وله أليل مقابل على الصبغي الجنسي Y.

## أمثلة على الوراثة المرتبطة بالجنس جزئياً:











وراثة مرض عمى الألوان الكلي



وراثة بعض سرطانات الجلد

- ١- اكتب المصطلح: وراثة يوجد فيها للصفة أليل محمول على الصبغي الجنسي X ، وله أليل مقابل على الصبغي الجنسي Y
- ٢- اذكر مثالين عن الوراثة المرتبطة بالجنس جزئياً
- ٣- حدد موقع أليلات الوراثة المرتبطة بالجنس
- = موقع أليلات وراثة مرض عمى الألوان الكلي
- = موقع أليلات وراثة بعض سرطانات الجلد

## ٣- الوراثة المتأثرة بالجنس

التطبيق العملي			النظري
صفة الصلع الجبهي عند الإنسان:			<p><b>الوراثة المتأثرة بالجنس:</b></p> <p>وراثة يعبر فيها النمط الوراثي متخالف اللواقح عن نفسه بنمط ظاهري لدى الذكر يختلف عما هو عليه لدى الأنثى</p> <p>(فسر:)</p> <p>يعود ذلك إلى تأثير الحاثات الجنسية على عمل المورثات في كلا الجنسين</p>
	يسبب صفة الصلع الجبهي أليل راجح B (موقعه: د ٢٠١٧) محمول على أحد الصبغيات الجسمية		
	ويحدد الأليل المقابل المتنحي b التوزيع الطبيعي للشعر عند كل من الجنسين		
وبذلك يحدد النمط الوراثي Bb صلعاً جبهيّاً عند الذكور، وتوزع طبيعي للشعر عند الإناث			
النمط الظاهري للذكر	النمط الظاهري للأنثى	النمط الوراثي	
صلع جبهي 	شعر خفيف 	BB	
صلع جبهي 	شعر طبيعي 	Bb	
شعر طبيعي 	شعر طبيعي 	bb	
<p>١- اكتب المصطلح: وراثة يعبر فيها النمط الوراثي متخالف اللواقح عن نفسه بنمط ظاهري لدى الذكر يختلف عما هو عليه لدى الأنثى</p> <p>٢- فسر: في الوراثة المتأثرة بالجنس يعبر النمط الوراثي متخالف اللواقح عن نفسه بنمط ظاهري لدى الذكر يختلف عما هو عليه لدى الأنثى</p> <p>٣- ما هي الأليلات المسؤولة عن صفة الصلع الجبهي عند الإنسان؟</p> <p>٤- قارن بين النمط الظاهري لدى كل من الذكر والأنثى بالنسبة لأنماط الوراثة BB - Bb - bb</p>			

## ملخص تعديلات النسب المنديلية:

## الهجونة الأحادية

الحالة	النسب الظاهرية لأفراد الجيل الثاني	مثال (نبات)	مثال (إنسان)	مثال (حيوان)
الوراثة المنديلية (هجونة أحادية)	3:1	لون أزهار نبات البازلاء	مرض هنتغتون - مرض المهق	
رجحان غير تام	1:2:1	لون أزهار نبات فم السمكة		لون خيول البالمينو
رجحان مشترك (متساو)	1:2:1	لون أزهار نبات الكاميليا - لون ثمار قرع الزينة	مرض فقر الدم المنجلي	
أثر متعدد للمورثة الواحدة	3:1	الشعير		صفة الدجاج الزاحف - صفة الفئران الصفراء
مورثات مميتة	2:1 د ٢٠١٥			صفة الدجاج الزاحف - صفة الفئران الصفراء
أليات متعددة متقابلة			زمر الدم - عامل الريزوس د ٢٠١٨	
وراثة مرتبطة بالجنس (X)			مرض الكساح المقاوم للفيتامين D - مرض الناعور المرتبط بالجنس - وراثة مرض عمى الألوان الجزئي - مرض الفوال - مرض الضمور العضلي لدوشين DMP - مرض تصلب مشيمية العين - مرض العشا الليلي	لون عيون ذبابة الخل - لون ريش الببغاء - لون فراشة عث الغراب
وراثة مرتبطة بالجنس (Y)			حزمة شعر على صيوان الأذن	
وراثة مرتبطة بالجنس جزئياً			عمى الألوان الكلي - بعض سرطانات الجلد	
وراثة متأثرة بالجنس			الصلع الجبهي عند الإنسان	القرون عند الأغنام

## الهجونة الثنائية

الوراثة المنديلية (هجونة ثنائية)	9:3:3:1	شكل ولون بذور نبات البازلاء	أي صفتين نستطيع دراستهما سوياً	أي صفتين نستطيع دراستهما سوياً
مورثات متتامة	9:7	اللون الأرجواني لعرانيس الذرة		
حجب راجح	12:3:1	لون ثمار نبات الكوسا		
ارتباط وعبور				لون جسم وطول جناح ذبابة الخل

**التقويم النهائي**

**أولاً: أجب بكلمة صح للعبارة الصحيحة وبكلمة غلط للعبارة المغلوطة لكل مما يأتي:**

1. نمط العلاقة بين أليل زمرة الدم A وأليل زمرة الدم B رجحان غير تام.
2. في توريث خضاب الدم تتطابق نسب الأنماط الوراثية مع نسب الأنماط الظاهرية في الأبناء.
3. النمط الوراثي Bb يسبب صلعاً جبهياً عند الذكور وشعر خفيف عند المرأة.

**ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

- 1- عدم وجود إناث يملكن حزمة شعر على حافة صيوان الأذن.
- 2- لا يمكن ولادة طفل زمرة الدموية O لأبوين أحدهما زمرة الدموية A.
- 3- الأمراض الوراثية المتنحية المرتبطة بالصبغي الجنسي X تكون شائعة لدى الذكور أكثر من الإناث.
- 4- تعدد وراثية عامل الريزوس لا مندلية.


**ثالثاً: أحل المسائل الوراثية الآتية:**

**المسألة الأولى:**

تزوج رجل زمرة الدموية AB إيجابي الريزوس من امرأة زمرة الدموية A إيجابية الريزوس فأنجبا ثلاثة أبناء: الأول ذكر زمرة الدموية B إيجابي الريزوس، والثاني أنثى زمرة الدموية AB سلبية الريزوس، والثالث ذكر زمرة الدموية A إيجابي الريزوس.

**المطلوب:**

1. حدد النمط الوراثي للأبوين، وما أنماط أعراسهما المحتملة؟
2. ما الأنماط الوراثية المحتملة للأبناء الثلاثة؟ وما احتمالات أعراس كل منها؟

**المسألة الثانية:**

لديك شجرة النسب الآتية لتوريث زمر الدم. ضع تحليلاً وراثياً لها.

**المسألة الثالثة: د ٢٠١٨ (مشابهة)**

زوجان لا تظهر عليهما علائم الإصابة بالمهق، ويمتلك الزوج حزمة شعر r على حافة صيوان الأذن، أنجبا أطفالاً عدة من بينهم ذكر أمهق له حزمة شعر على حافة صيوان الأذن

**المطلوب:**

1. ما الأنماط الوراثية للأبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منهما؟
2. ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء؟
3. ما احتمال ولادة ذكر عادي له حزمة شعر على صيوان الأذن؟  
(علماً أن أليل صفة المهق a والأليل المقابل له A)

## حل التقويم النهائي

أولاً: أجب بكلمة صح للعبارة الصحيحة وبكلمة غلط للعبارة المغلوطة لكل مما يأتي:

1. نمط العلاقة بين أليل زمرة الدم A وأليل زمرة الدم B رجحان غير تام. (غلط)
2. في توريث خضاب الدم تتطابق نسب الأنماط الوراثية مع نسب الأنماط الظاهرية في الأبناء. (صح)
3. النمط الوراثي Bb يسبب صلعاً جبهيّاً عند الذكور وشعر خفيف عند المرأة. (غلط)

## ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

- 1- عدم وجود إناث يملكن حزمة شعر على حافة صيوان الأذن.  
لأن المورثة المسؤولة عن إظهار هذه الصفة محمولة على الصبغي الجنسي Y والأنثى لا تمتلك هذا الصبغي
- 2- لا يمكن ولادة طفل زمرة الدموية O لأبوين أحدهما زمرة الدموية A.  
لأن الزمرة O تحتاج إلى أليلين متنحيين ii غير موجودين في الزمرة AB ذات النمط الوراثي I<sub>A</sub>I<sub>B</sub>
- 3- الأمراض الوراثية المتنحية المرتبطة بالصبغي الجنسي X تكون شائعة لدى الذكور أكثر من الإناث لأن إصابة الذكر تتطلب أليلاً واحداً أما إصابة الأنثى فتتطلب أليلين وهذا أقل احتمالاً
- 4- تعدّ وراثة عامل الريزوس لا مندلية.  
لأن وراثة الزمر الدموية عند الإنسان تعود إلى نمط الأليلات المتعددة المتقابلة؛ حيث يوجد للصفة الواحدة أكثر من أليل في حوض المورثات الجماعة البشرية ولكن الفرد الواحد لا يمتلك سوى أليلين منها فقط.

## ثالثاً: أحل المسائل الوراثية الآتية:


## المسألة الأولى:

تزوج رجل زمرة الدموية AB إيجابي الريزوس من امرأة زمرتها الدموية A إيجابية الريزوس فأنجبا ثلاثة أبناء: الأول ذكر زمرة الدموية B إيجابي الريزوس، والثاني أنثى زمرتها الدموية AB سلبية الريزوس، والثالث ذكر زمرة الدموية A إيجابي الريزوس.

## المطلوب:

1. حدد النمط الوراثي للأبوين، وما أنماط أعراسهما المحتملة؟
2. ما الأنماط الوراثية المحتملة للأبناء الثلاثة؟ وما احتمالات أعراس كل منها؟

النمط الظاهري للأبوين	أب AB إيجابي × أم A إيجابي
النمط الوراثي للأبوين	I <sup>A</sup> i Rr × I <sup>A</sup> I <sup>B</sup> Rr
احتمال أعراس الأبوين	( $\frac{1}{4}$ I <sup>A</sup> R + $\frac{1}{4}$ I <sup>A</sup> r + $\frac{1}{4}$ iR + $\frac{1}{4}$ ir) × ( $\frac{1}{4}$ I <sup>A</sup> R + $\frac{1}{4}$ I <sup>A</sup> r + $\frac{1}{4}$ I <sup>B</sup> R + $\frac{1}{4}$ I <sup>B</sup> r)
النمط الوراثي لـ (الذكر B إيجابي)	إما: I <sup>B</sup> i RR فتكون احتمالات أعراسه: ( $\frac{1}{2}$ I <sup>B</sup> R + $\frac{1}{2}$ iR) أو: I <sup>B</sup> i Rr فتكون احتمالات أعراسه: ( $\frac{1}{4}$ I <sup>B</sup> R + $\frac{1}{4}$ I <sup>B</sup> r + $\frac{1}{4}$ iR + $\frac{1}{4}$ ir)
النمط الوراثي لـ (الأنثى AB سلبية)	I <sup>A</sup> I <sup>B</sup> rr فتكون احتمالات أعراسها: ( $\frac{1}{2}$ I <sup>A</sup> r + $\frac{1}{2}$ I <sup>B</sup> r)
النمط الوراثي لـ (الذكر A إيجابي)	إما: I <sup>A</sup> I <sup>A</sup> RR فيكون احتمال أعراسه: ( $\frac{1}{4}$ I <sup>A</sup> R) أو: I <sup>A</sup> I <sup>A</sup> Rr فتكون احتمالات أعراسه: ( $\frac{1}{2}$ I <sup>A</sup> R + $\frac{1}{2}$ I <sup>A</sup> r) أو: I <sup>A</sup> i RR فتكون احتمالات أعراسه: ( $\frac{1}{2}$ I <sup>A</sup> R + $\frac{1}{2}$ iR) أو: I <sup>A</sup> i Rr فتكون احتمالات أعراسه: ( $\frac{1}{4}$ I <sup>A</sup> R + $\frac{1}{4}$ I <sup>A</sup> r + $\frac{1}{4}$ iR + $\frac{1}{4}$ ir)



## المسألة الثانية:

لديك شجرة النسب الآتية لتوريث زمر الدم .  
ضع تحليلاً وراثياً لها.

من الذكر 1 والذكر 3 نستنتج أن الأبوين متخالفا للواقع			
أب زمرة A × أم زمرة B			
$I^B i \times I^A i$			
$(\frac{1}{2} I^B + \frac{1}{2} i) \times (\frac{1}{2} I^A + \frac{1}{2} i)$			
$\frac{1}{4} I^A I^B$	$+\frac{1}{4} I^B i$	$+\frac{1}{4} I^A i$	$+\frac{1}{4} ii$
زمرة AB	زمرة B	زمرة A	زمرة O
بنات ٢	صبي ١	صبي ٣	لم يولد بعد

## المسألة الثالثة: د ٢٠١٨ (مشابهة)

زوجان لا تظهر عليهما علائم الإصابة بالمهق، ويمتلك الزوج حزمة شعر r على حافة صيوان الأذن، أنجبا أطفالاً عدة من بينهم ذكر أمهق له حزمة شعر على حافة صيوان الأذن  
المطلوب:

1. ما الأنماط الوراثية للأبوين؟ وما احتمالات أعراس كل منهما؟
2. ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء؟
3. ما احتمال ولادة ذكر عادي له حزمة شعر على صيوان الأذن؟  
(علماً أن أليل صفة المهق a والأليل المقابل له A)

من الذكر 1 والذكر 3 نستنتج أن الأبوين متخالفا للواقع							
أب له حزمة شعر سليم من المهق × أم بدون حزمة شعر سليمة من المهق							
$Aa X_0 X_0 \times Aa X_0 Y_r$							
$(\frac{1}{2} AX_0 + \frac{1}{2} aX_0) \times (\frac{1}{4} AX_0 + \frac{1}{4} AY_r + \frac{1}{4} aX_0 + \frac{1}{4} aY_r)$							
$\frac{1}{8} AAX_0X_0$	$+\frac{1}{8} AAX_0Y_r$	$+\frac{1}{8} AaX_0X_0$	$+\frac{1}{8} AaX_0Y_r$	$+\frac{1}{8} AaX_0X_0$	$+\frac{1}{8} AaX_0Y_r$	$+\frac{1}{8} aaX_0X_0$	$+\frac{1}{8} aaX_0Y_r$
أنثى بدون حزمة بدون مهق	ذكر بحزمة بدون مهق	أنثى بدون حزمة بدون مهق	ذكر بحزمة بدون مهق	أنثى بدون حزمة بدون مهق	ذكر بحزمة بدون مهق	أنثى بدون حزمة مهق	ذكر بحزمة أمهق
٣- احتمال ولادة ذكر عادي له حزمة شعر هو $\frac{3}{8}$							

توجد فيديوهات توضيحية هامة لهذا الدرس تشرح بعض الفقرات بأمثلة ولقطات من الواقع لا تنس عزيزي الطالب مشاهدتها، ولا تنس حل نموذج الامتحان الخاص لهذا الدرس.



يتم نشر الفيديوهات والمذكرات عبر مجموعاتي على واتس أب،  
قم بطلب الانضمام عبر مراسلتي على الواتس حصراً على الرقم: ٠٩٤٢٢٤٩٩٤٨

## الدرس (٥): الطفرات

## مقدمة



ظهر في قطيع من الأغنام لون صوفه أبيض ناصع:  
خروف مختلف بلون صوفه وشكله عن أفراد القطيع.



ظهرت صفة جديدة بشكل مفاجيء في نبات الأنوتير  
(زهرة الربيع المسائية): وهي الأزهار الكبيرة

لاحظ هذه صفة الجديدة:  
العالم دوفريز عام 1901 م

فاقترح مفهوم الطفرة

ماذا أسمي صفة اللون الجديد للأغنام، وصفة الأزهار الكبيرة لنبات الأنوتيرا، وهل تورث للأبناء؟  
تسمى كل من هاتين الصفتين صفة طافرة، وهي تورث للأبناء

مادة علم الأحياء

- ١- اذكر مثالين عن طفرات في الحيوانات أو النباتات.
- ٢- من العالم الذي لاحظ صفة الأزهار الكبيرة في نبات الأنوتيرا؟



## الطفرات




## الطفرة:

تغير مفاجئ في بعض صفات الفرد مرتبط بالتبدل الوراثي

## أنواع الطفرات من حيث تأثيرها: طفرات ضارة - طفرات نافعة

## أنواع الطفرات من حيث الخلايا المتأثرة:



## طفرات تحدث في الخلايا الجنسية

الخلايا الجنسية وهي:  
- الأعراس  
- مولدات الأعراس

## طفرات تحدث في الخلايا الجسمية

الخلايا الجسمية

الخلايا المتأثرة

تورث إلى الأجيال التالية


لا تورث إلى الأجيال التالية

التوريث للأبناء

- عمى الألوان الجزئي  
- الضمور العضلي

أمثلة

## أنواع الطفرات من حيث مكان حدوثها:



## طفرة صبغية

١- اضطرابات بنيوية، وتشمل:  
أ- الحذف  
ب- الانقلاب  
ت- الانتقال

## طفرة مورثية

١- الاستبدال

٢- الإدخال

٣- الحذف

الأنواع

٢- اضطرابات على مستوى العدد الصبغي، وتشمل:  
أ- تعدد الصيغة الصبغية  
ب- اختلال الصيغة الصبغية

١- اكتب المصطلح: تغير مفاجئ في بعض صفات الفرد مرتبط بالتبدل الوراثي

٢- عدد أنواع الطفرات من حيث تأثيرها


٣- عدد أنواع الطفرات من حيث: الخلايا المتأثرة

٤- عدد أنواع الطفرات من حيث: مكان/مستوى حدوثها.


٥- قارن بين الطفرات التي تحدث في الخلايا الجسمية والطفرات التي تحدث في الخلايا الجنسية من حيث: الخلايا المتأثرة - التوريث للأبناء - أمثلة.

٦- قارن بين الطفرة المورثية والطفرة الصبغية من حيث: الأنواع.

## ١- الطفرات المورثية



**الطفرات المورثية:** د٢٠١٩ت  
تتضمن استبدال أو إضافة أو حذف نكليوتيد أو أكثر في الـ DNA وتسمى بالطفرة النقطية.



**متى تحدث الطفرة:**  
قد تحدث في أثناء عملية تضاعف الـ DNA في الخلية.


- ١- اكتب المصطلح: تتضمن استبدال أو إضافة أو حذف نكليوتيد أو أكثر في الـ DNA وتسمى بالطفرة النقطية.
- ٢- متى تحدث الطفرة؟

د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء

## آلية حدوث الطفرة المورثية

## ما آلية حدوث الطفرة المورثية (كيف تحدث الطفرة؟)



في أثناء عملية تضاعف ال DNA في الخلية يحدث حذف أو استبدال أو إدخال نيكليوتيد

(فبالنتيجة:)

تغير تقابل الأسس الأزوتية مع بعضها: (مثال: يتقابل أساس الأدينين مع السيتوزين)

(فبالنتيجة:)

يحدث تغير في المورثة والمرسال mRNA

(فبالنتيجة:)

- يتغير الحمض الأميني الموافق في سلسلة عديد الببتيد التي يشرف الـ DNA على تركيبها.
- يتغير البروتين (ينتج بروتين جديد).

(فسر:)

لأن كل 3 نكليوتيدات (شيفرة وراثية) ترمز حمضاً أمينياً واحداً من البروتين المتشكل فإذا تغير الأساس الأزوتي يتغير الحمض الأميني الموافق.

(فبالنتيجة:)

تتغير الصفة الوراثية

- فسر: (يتغير (بتأثر تركيب) البروتين نتيجة الطفرة المورثية) أو: (يتغير الحمض الأميني الموافق في سلسلة عديد الببتيد التي يشرف الـ DNA على تركيبها)
- ماذا ينتج عن تغير البروتين/تشكل بروتين جديد نتيجة الطفرة؟
- ماذا ينتج عن تغير تقابل الأسس الأزوتية مع بعضها؟

- اكتب المصطلح: تتضمن استبدال أو إضافة أو حذف نكليوتيد أو أكثر في الـ DNA
- ماذا ينتج عن حذف أو استبدال أو إدخال نيكليوتيد في أثناء عملية تضاعف الـ DNA؟
- كيف تحدث الطفرة المورثية؟

## أنواع الطفرات المورثية

أنواع الطفرات المورثية: الاستبدال – الإدخال – الحذف


**1. طفرة الاستبدال:** استبدال نكليوتيد بآخر

مثال عن طفرة الاستبدال:

## طفرة فقر الدم المنجلي

فقر الدم المنجلي	الدم الطبيعي	
CAC	CTC	الشفيرة رقم ٦ من الـ DNA
↓	↓	
GUG	GAG	الـ mRNA الناتج عن الـ DNA
↓	↓	
حمض الفالين	حمض الغلوتاميك	الحمض الأميني الذي يشكله الـ mRNA

طبيعي



استبدال

طفرة فقر الدم المنجلي



## الآلية الوراثية لحدوث مرض فقر الدم المنجلي:


استبدال الأساس الأزوتي الأدينين بالتايمين في الشفرة السادسة من مورثة خضاب الدم الطبيعي (ملاحظة لغوية: في فعل "استبدل" تدخل الباء على المتروك فالصحيح كما كتبت هنا لأن الأدينين هو الذي يدخل والتايمين هو الذي يخرج)

تغير أحد الحموض الأمينية حيث حل الفالين مكان الحمض الأميني الغلوتاميك


تغيرت نوعية البروتين

تغيرات في الخضاب وفي الكرية الحمراء


الترتيب الأساسي



طفرة الإدخال

**2. طفرة الإدخال:** يتم فيها إدخال نكليوتيد أو أكثر.


3. **طفرة الحذف:** يتم فيها حذف نكليوتيد أو أكثر.  
وتسمى: طفرات إزاحة الإطار



مادة علم الأحياء

- ١- عدد أنواع الطفرات المورثية.
- ٢- ما نوع الطفرة المسببة لمرض فقر الدم المنجلي؟
- ٣- اكتب المصطلح: طفرة يتم فيها استبدال نكليوتيد بأخر - طفرة يتم فيها إدخال نكليوتيد أو أكثر - طفرة يتم فيها حذف نكليوتيد أو أكثر.
- ٤- قارن بين: الدم الطبيعي وفقر الدم المنجلي من حيث: الشيفرة رقم ٦ من الـ DNA - الـ mRNA الناتج عن الـ DNA - الحمض الأميني الذي يشكله الـ mRNA
- ٥- اشرح الآلية الوراثية لحدوث مرض فقر الدم المنجلي.

## ٢- الطفرات على مستوى الصبغيات



## الطفرات على مستوى الصبغيات:

تأثيرها على الجنين/الحمل:

- تسبب 50 % من الإجهاضات العفوية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
- و 20 % في الأشهر التالية من الحمل.

تحدث عند: أحد الأبوين أو كليهما

(متى تحدث؟)

- في أثناء الانقسام المنصف وتشكل الأعراس.
- وخلال المراحل الأولى من التشكل الجنيني.

## أنواع الطفرات على مستوى الصبغيات:

١- اضطرابات بنيوية، وتشمل:

- أ- الحذف
- ب- الانقلاب
- ت- الانتقال


٢- اضطرابات على مستوى العدد الصبغي، وتشمل:

- أ- تعدد الصيغة الصبغية
- ب- اختلال الصيغة الصبغية

- ١- ما تأثير الاضطرابات الصبغية (الطفرات على مستوى الصبغيات) على الجنين؟
- ٢- لدى أي من الأبوين تحدث الاضطرابات الصبغية؟
- ٣- متى تحدث الاضطرابات الصبغية (الطفرات على مستوى الصبغيات)؟ لم الأحياء
- ٤- عدد أنواع الطفرات على مستوى الصبغيات.
- ٥- عدد أنواع الاضطرابات البنيوية للصبغيات.
- ٦- عدد أنواع الاضطرابات على مستوى العدد الصبغي.

## ٢- الطفرات على مستوى الصبغيات:


## ١- اضطرابات بنيوية




(الاضطرابات البنيوية) على مستوى الصبغيات:  
تحدث نتيجة كسر أو كسور في بنية الصبغي في أثناء الانقسام  
المنصف ويمكن أن تحدث في أي منطقة من الصبغي

أنواع (الاضطرابات البنيوية) على مستوى الصبغيات :


- أ- الحذف
- ب- الانقلاب
- ت- الانتقال



**أ- الحذف**  
يؤدي إلى غياب بعض الصفات الوراثية (فسر):  
بسبب حدوث ضياع للمورثات



**ب- الانقلاب**  
يتغير الترتيب الخطي للمورثات



مادة علم الأحياء

**ت- الانتقال**  
أنواعه:  
- ينتقل جزء من صبغي إلى آخر غير قرين  
- قد يحدث أحياناً انتقال صبغي بكامله والتحامه مع صبغي آخر غير قرين.

- ١- اكتب المصطلح: تحدث نتيجة كسر أو كسور في بنية الصبغي في أثناء الانقسام المنصف ويمكن أن تحدث في أي منطقة من الصبغي.
- ٢- عدد أنواع الاضطرابات البنيوية على مستوى الصبغيات.
- ٣- فسر: يؤدي اضطراب الحذف في بنية الصبغي إلى غياب بعض الصفات الوراثية.
- ٤- عدد أنواع اضطراب الانتقال في بنية الصبغي.

## مثال عن اضطراب الانتقال (من الاضطرابات البنيوية للصبغيات) متلازمة داون

الآلية الوراثية لمتلازمة داون:

(فسر الإصابة بمتلازمة داون):

٢٠١٣-٢٠١٩-٢٠٢١ ت



بسبب زيادة صبغي على الشفع الصبغي 21

أو بسبب الآلية التالية:

عند الأنثى (الأم):

ينتقل: صبغي من الشفع 21

ويلتحم مع: صبغي من الشفع 14



يصبح عدد صبغيات الأنثى 45



أعراس طبيعية + أعراس غير طبيعية

وتعطي هذه الأنثى نمطين من الأعراس طبيعية وغير طبيعية

مادة علم الأحياء



بعد التلقيح من ذكر طبيعي يكون بعض الأبناء مصابين بمتلازمة داون  
(٣ صبغيات ٢١)

الأعراس غير الطبيعية تؤدي إلى ولادة أطفال مصابة بمتلازمة داون

١- فسر إصابة بعض البشر بمتلازمة داون.

٢- اشرح الآلية الوراثية لمتلازمة داون.

٣- ما هو الانتقال المؤدي إلى حدوث متلازمة داون.

٤- فسر إصابة بعض البشر بمتلازمة داون

٥- قارن بين العدد الكلي للصبغيات في متلازمة داون لدى الأم - الابن المصاب

ج- الأم: ٤٥ صبغي، الابن المصاب: ٤٧ صبغي

## ٢- الطفرات على مستوى الصبغيات: ٢- الاضطرابات على مستوى العدد الصبغي

**أنواع الاضطرابات على مستوى العدد الصبغي:**

أ- حالة تعدد الصيغة الصبغية

ب- اختلال الصيغة الصبغية





## ٢- الطفرات على مستوى الصبغيات:

## ٢- الاضطرابات على مستوى العدد الصبغي

## أ- حالة تعدد الصيغة الصبغية:


## أ- حالة تعدد الصيغة الصبغية:

يشمل الخلل في هذه الحالة:


صبغيات الأعراس  $1n$  فتصبح  $2n$ بعد إخصاب الأعراس  $2n$  المختلفة مع أعراس الأب الآخر:يصبح عدد الصبغيات  $3n$  أو  $4n$ 

تأثيرها على الجنين/الحمل:

تسبب معظم حالات الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل لدى الإنسان.



## أنواع التعدد الصبغي (تعدد الصيغة الصبغية):



## تعدد صبغي خلطي

(الحصول على القمح الطري المستخدم في الخبز)

تعدد صبغي خلطي	تعدد صبغي ذاتي	أين يحدث
لدى نوعين مختلفين	لدى النوع نفسه	أين يحدث
الحصول على القمح الطري المستخدم في الخبز	طفرة الزهرة العملاقة في نبات الأوتيرا، حيث نميز:	مثال
لماذا يكون الهجين AB عقيماً؟ (يكون الهجين AB عقيماً لعدم تشافع صبغياته)	نبات الأوتيرا الطافر	الأزهار الصغيرة
2 يمنع مركب الكولشيسين هجرة الصبغيات في الخلية المنقسمة إلى القطبين فكيف يصبح الهجين AB خصباً؟ (يصبح الهجين خصباً بمضاعفة الصيغة الصبغية وذلك بإضافة الكولشيسين).	نبات الأوتيرا العادي	الأزهار الكبيرة
	4n = 28	الصيغة
	2n = 14	صورة


- ٦- قارن بين نبات الأوتيرا العادي ونبات الأوتيرا الطافر من حيث: الأزهار - الصيغة
- ٧- فسر: لماذا يكون الهجين AB عقيماً في عملية الحصول على القمح الطري المستخدم في الخبز.
- ٨- كيف يصبح الهجين AB خصباً في عملية الحصول على القمح الطري المستخدم في الخبز؟

- ١- ما هي الخلايا التي تختل في حالة تعدد الصيغة الصبغية.
- ٢- ما هي الحالات الصبغية لحالة تعدد الصيغة الصبغية؟
- ٣- ما تأثير حالة تعدد الصيغة الصبغية على الجنين/الحمل؟
- ٤- ما هي أنواع التعدد الصبغي؟
- ٥- قارن بين التعدد الصبغي الذاتي - التعدد الصبغي الخلطي من حيث: أين يحدث - مثال.

## ٢- الطفرات على مستوى الصبغيات:

## ٢- الاضطرابات على مستوى العدد الصبغي

## ب- اختلال الصيغة الصبغية:



## ب- حالة اختلال الصيغة الصبغية:

يتمثل ب:

- زيادة صبغي واحد أو أكثر ( $2n+1$  ,  $2n+2$ )
- أو نقصان صبغي واحد أو أكثر ( $2n-1$  ,  $2n-2$ )



أو من المشيمة

أخذ عينة من السائل السلوي

كيف يمكن الكشف عن حالات اختلال الصيغة الصبغية قبل الولادة؟  
من خلال:

- أخذ عينه من السائل السلوي أو من المشيمة
- وتحليل صبغيات الخلايا الجنينية التي يحتويها

فائدة الكشف عن حالات اختلال الصيغة الصبغية قبل الولادة:

(أو) فائدة تحليل صبغيات الخلايا الجنينية:

يمكن من خلالها تحديد أكثر من 20 حالة، منها متلازمة داون.











تحليل صبغيات  
الخلايا الجنينية



- ٣- ما فائدة الكشف عن حالات اختلال الصيغة الصبغية قبل الولادة؟
- ٤- ما فائدة تحليل صبغيات الخلايا الجنينية؟

- ١- اكتب المصطلح: يتمثل بزيادة صبغي واحد أو أكثر أو نقصان صبغي واحد أو أكثر.
- ٢- كيف يمكن الكشف عن هذه الحالات قبل الولادة

## بعض الحالات الناتجة عن اختلال الصيغة الصبغية لدى الإنسان:

اسم المتلازمة	الصيغة الصبغية	الجنس	الأعراض	الصيغة الصبغية (للاطلاع فقط)	صورة
الحالة الطبيعية (لا يوجد متلازمة)	ذكر: $2n = 44A + XY = 46$ أنثى: $2n = 44A + XX = 46$	ذكر أنثى	----		
متلازمة كلاينفلتر	$2n + 1 = 44A + XXY = 47$	ذكر	- يمتلك صفات جنسية ثانوية أنثوية - عقيم - ينخفض إفراز الأندروجينات لديه (فسر): بسبب وجود صبغي إضافي X.		
متلازمة تيرنر	$2n - 1 = 44A + X = 45$	أنثى	- لا تمتلك صفات جنسية ثانوية طبيعية (فسر): ٢٠٢٣ بسبب غياب الصبغي الجنسي X لديها - قصيرة القامة		
متلازمة ثنائي الصبغي Y	$2n + 1 = 44A + XYY = 47$	ذكر	- ذكر طويل القامة - ذكاؤه منخفض - يمكن أن يقوم بأعمال عدوانية علم الأحياء		
متلازمة داون	ذكر: $2n + 1 = 45A + XY = 47$ أنثى: $2n + 1 = 45A + XX = 47$	ذكر أنثى	- وجود ثنية إضافية على الجفن العلوي تشبه السلالة المنغولية - بصمات أصابعهم مختلفة - يعانون من تأخر عقلي		

- ١- قارن بين الصيغة الصبغية لكل من ذكر الإنسان الطبيعي - أنثى الإنسان الطبيعي - مريض متلازمة كلاينفلتر - مريضة متلازمة تيرنر - مريض متلازمة ثنائي الصبغي Y - مريض متلازمة داون.
- ٢- قارن بين أعراض متلازمة كلاينفلتر - متلازمة تيرنر - متلازمة ثنائي الصبغي Y - متلازمة داون.
- ٣- قارن بين جنس المصاب ب: متلازمة كلاينفلتر - متلازمة تيرنر - متلازمة ثنائي الصبغي Y - متلازمة داون.
- ٤- فسر: ينخفض إفراز الأندروجينات لدى مريض متلازمة كلاينفلتر.
- ٥- لمن تعود الصيغة الصبغية التالية:

$$2n = 44A + XY = 46$$

$$2n - 1 = 44A + X = 45$$

$$2n + 1 = 45A + XX = 47$$

$$2n = 44A + XX = 46$$






$$2n + 1 = 44A + XYY = 47$$

$$2n + 1 = 44A + XXY = 47$$

$$2n + 1 = 45A + XY = 47$$

## العوامل المسببة للطفرات

من العوامل المسببة لحدوث الطفرات:

العوامل	أمثلة	التأثير (فسر سبب إحداثها للطفرات)	صورة
	مثل: أشعة X - أشعة UV الأشعة	د ٢٠١٨-٢٠١٨-٢٠٢٢ لأن الأشعة تعمل على: - زيادة لزوجة السيتوبلازما - وتقطع الصبغيات وإعادة التحامها بتنسيقات جديدة	 
		عوامل فيزيائية	
	الحرارة	د ٢٠٢١ لأن الحرارة تسبب: انشطار سلسلتي ال DNA عن بعضهما ↓ وإعادة بناء سلاسل غير نظامية ↓ لا تلبث أن تتفكك لتعيد بناء سلاسل جديدة بعضها طافر	
عوامل كيميائية	- الملونات والصبغات التي تضاف للأطعمة - أملاح المعادن الثقيلة من مثل: املاح الرصاص والزنبق - المواد الموجودة في دخان السجائر والدهانات والمبيدات الحشرية.		
طفرات تلقائية	----	تظهر أغلب الطفرات بشكل تلقائي (متى؟) في أثناء تضاعف ال DNA (فسر): إذ يقوم أنظيم DNA بوليميراز بارتكاب خطأ ما في أثناء تلك العملية غالباً ما يتم إصلاحه بواسطة أنظيمات خاصة تسمى أنظيمات القطع الداخلية وفي حال لم يتم إصلاح الخطأ تحدث الطفرة.	

- ١- عدد العوامل المسببة للطفرات.
- ٢- ما تأثير الأشعة/فسر تسبب الأشعة حدوث الطفرات.
- ٣- ما تأثير الحرارة/فسر تسبب الحرارة حدوث الطفرات.
- ٤- متى تظهر أغلب الطفرات؟
- ٥- فسر: تظهر أغلب الطفرات بشكل تلقائي في أثناء تضاعف ال DNA

## الطفرات المفيدة

ليست جميع الطفرات ضارة، فهناك للطفرات فوائد منها:

الكائن	فائدة الطفرة	صورة
الجراثيم	بعض أنواع الجراثيم الطافرة تسمى جراثيم النايلون (وظيفتها): تنتج أنظيماً قادراً على حلحلة جزيئات النايلون من النفايات. <b>بعبارة أخرى:</b> لبعض أنواع البكتريا الطافرة أهمية بيئية (فسر: د ٢٠٢٢) لأنها تخلصنا من بعض النفايات مثل جراثيم النايلون التي تنتج أنظيماً قادراً على حلحلة جزيئات النايلون من النفايات	
نبات اللوز	بعض أنواع شجر اللوز البرية لا تنتج المادة المرة في بذور اللوز والتي تتحول إلى سيانيد سام في الجسم (فسر: نتيجة طفرة في المورثة المسؤولة عن إنتاج هذه المادة لدى هذه الأنواع	
الكائنات بشكل عام	مادة علم الأحياء تزيد الطفرات المخزون الوراثي للجماعة وتزيد التنوع الحيوي (فسر: د ٢٠٢٣) لأن الطفرات المورثية تؤدي إلى تشكيل العديد من الأليلات المورثية	

- ١- اذكر ٣ فوائد للطفرات.
- ٢- اذكر وظيفة جراثيم النايلون.
- ٣- فسر: بعض أنواع شجر اللوز البرية لا تنتج المادة المرة في بذور اللوز والتي تتحول إلى سيانيد سام في الجسم.
- ٤- فسر: تزيد الطفرات المخزون الوراثي للجماعة وتزيد التنوع الحيوي.

توجد فيديوهات توضيحية هامة لهذا الدرس تشرح بعض الفقرات بأمثلة ولقطات من الواقع لا تنس عزيزي الطالب مشاهدتها، ولا تنس حل نموذج الامتحان الخاص لهذا الدرس.



يتم نشر الفيديوهات والمذكرات عبر مجموعاتي على واتس أب،  
قم بطلب الانضمام عبر مراسلتي على الواتس حصراً على الرقم: ٠٩٤٢٢٤٩٩٤٨

### التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. متلازمة تتمثل بزيادة صبغي واحد في المجموعة 21 :

أ - متلازمة داون      ب - متلازمة تيرنر      ج - متلازمة كلاينفلتر

2. إحدى الطفرات الآتية تسبب تغير الترتيب الخطي للمورثات:

أ- الانتقال      ب- الانقلاب      ج- الحذف      د- التعدد الصبغي الذاتي

3. النمط XXY يمثل متلازمة:

أ - متلازمة داون      ب - متلازمة تيرنر      ج - متلازمة كلاينفلتر

ثانياً : ماذا ينتج عن كل مما يأتي:

١ - زيادة صبغي واحد Y عند ذكر الانسان.

٢ - تهجين قمح رباعي 2٨ ص مع نجيل ١٤ ص.

٣ - طفرات الحذف الصبغية.

٤ - استبدال نكليوتيد A محل نكليوتيد T في الشيفرة السادسة من مورثة الهيموغلوبين الطبيعي.

ثالثاً : أكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يأتي:

١ - تغير مفاجيء في بعض صفات الفرد مرتبط بالتبدل الوراثي.

٢ - أنظيمات تعمل على إصلاح الطفرات المورثية في أثناء تضاعف الـ DNA

مادة علم الأحياء

رابعاً : أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

١ - لبعض أنواع البكتريا الطافرة أهمية بيئية. د ٢٠٢٢ت

٢ - تؤدي الطفرات المورثية إلى زيادة المخزون الوراثي للجماعة. د ٢٠٢٣ت

٣ - تسبب طفرات إزاحة الإطار تشكل بروتين غير وظيفي.

٤ - تعد الأشعة من العوامل المحرصة للطفرات.

**حل التقويم النهائي****أولاً: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:**

1. متلازمة تتمثل بزيادة صبغي واحد في المجموعة 21 :  
 أ - متلازمة داون      ب - متلازمة تيرنر      ج - متلازمة كلاينفلتر  
 2. إحدى الطفرات الآتية تسبب تغير الترتيب الخطي للمورثات:  
 أ- الانتقال      ب- الانقلاب      ج- الحذف      د- التعدد الصبغي الذاتي  
 3. النمط XXY يمثل متلازمة:  
 أ - متلازمة داون      ب - متلازمة تيرنر      ج - متلازمة كلاينفلتر

**ثانياً : ماذا ينتج عن كل مما يأتي:**

- ١- زيادة صبغي واحد Y عند ذكر الانسان.  
 متلازمة ثنائي الصبغي Y
- ٢- تهجين قمح رباعي ٢٨ ص مع نجيل ١٤ ص.  
 هجين خلطي الصبغيات غير متشافعة
- ٣- طفرات الحذف الصبغية.  
 يحدث ضياع المورثات
- ٤- استبدال نكليوتيد A محل نكليوتيد T في الشيفرة السادسة من مورثة الهيموغلوبين الطبيعي.  
 خضاب دم طافر (مرض فقر الدم المنجلي)

**ثالثاً : أكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يأتي:**

- ١- تغير مفاجيء في بعض صفات الفرد مرتبط بالتبدل الوراثي. (الطفرة)
- ٢- أنظيمات تعمل على إصلاح الطفرات المورثية في أثناء تضاعف الـ DNA (أنظيمات القطع الداخلية)

مادة علم الأحياء

**رابعاً : أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

- ١- لبعض أنواع البكتريا الطافرة أهمية بيئية. ٢٠٢٢ت  
 لأنها تخلصنا من بعض النفايات مثل جراثيم النايلون التي تنتج أنظيمًا قادرًا على حلمة جزيئات النايلون من النفايات.
- ٢- تؤدي الطفرات المورثية إلى زيادة المخزون الوراثي للجماعة. ٢٠٢٣ت  
 لأنها تؤدي إلى تشكيل العديد من الأليلات المورثية.
- ٣- تسبب طفرات إزاحة الإطار تشكل بروتين غير وظيفي  
 لأن كل إضافة أو حذف نكليوتيد على الشيفرة الوراثية يسبب تغيرًا في المورثة والـ RNA المرسل  
 فينتج بروتين جديد مما يؤدي إلى تغير الصفة الوراثية.
- ٤- تعد الأشعة من العوامل المحرصة للطفرات.  
 لأن الأشعة تعمل على زيادة لزوجة السيتوبلازما وتقطع الصبغيات وإعادة التحامها بتنسيقات جديدة غير نظامية.


## الدرس (٦): الهندسة الوراثية

## مقدمة


إليك بعض الأسئلة (للتفكير فقط ولا تحتاج إلى إجابة):




لماذا لانملك قدرات خارقة كما في أفلام الخيال العلمي؟



هل نستطيع إعادة الحيوانات المنقرضة؟



هل نستطيع إصلاح عيوبنا الوراثية؟



هل بإمكاننا تعديل الأطعمة التي نتناولها أو تغيير المحاصيل الزراعية؟



## علم الهندسة الوراثية

## علم الهندسة الوراثية:

هو مجموعة تقانات حيوية تتناول نقل مورثة أو مورثات من كائن لآخر بغرض تعديل مادته الوراثية وإعطائه صفة جديدة لم تكن موجودة فيه

## بعض التطبيقات للهندسة الوراثية:



الحصول على هرمون النمو البقري BGH




الحصول على هرمون النمو البشري HGH



الحصول على الأرز الذهبي



جعل النباتات مقاومة للحشرات دون رش المبيدات الحشرية



العلاج الجيني  
(أفق علاجية للأمراض الوراثية و لمرضى الإيدز ومرضى السرطان)

١- اكتب المصطلح: مجموعة تقانات حيوية تتناول نقل مورثة أو مورثات من كائن لآخر بغرض تعديل مادته الوراثية وإعطائه صفة جديدة لم تكن موجودة فيه.

٢- اذكر ٥ من التطبيقات للهندسة الوراثية.

## متطلبات الهندسة الوراثية

تتطلب الهندسة الوراثية استخدام العوامل الآتية:

## ١- ناقل (مثال: البلاسميد)

أهم النواقل المستخدمة في الهندسة الوراثية:

نواقل صناعية	الكوزميدات	الفيروسات	البلاسميدات
يتم تركيبها في المختبرات	بلاسميدات مدمجة مع: DNA الفيروسات	تحتوي: جزيء DNA مثل: الفيروس أكل الجراثيم	يتألف من: DNA حلقي (جزيئات DNA حلقي) مصدره: من خلية جرثومية وظيفته: إدخال المورثة المرغوبة
			

أنظيم قطع



## ٢- أنظيم قطع:

وظيفته: فتح البلاسميد وفتح المورثة

أنظيم ربط



## ٣- أنظيم ربط:

وظيفته: ربط DNA المورثة مع DNA البلاسميد



## ٤- جرثوم حاضن:


وظيفته: إدخال البلاسميد المؤشب

- ١- عدد متطلبات الهندسة الوراثية.
- ٢- عدد أهم النواقل المستخدمة في الهندسة الوراثية.
- ٣- مم يتألف البلاسميد؟ وما مصدره؟ واذكر وظيفته.
- ٤- ماذا تحوي الفيروسات المستخدمة كناقل؟ واذكر مثلاً لفيروس يستخدم كناقل.
- ٥- مم يتألف الكوزميد؟
- ٦- قارن بين وظيفة كل من: أنظيم القطع - أنظيم الربط - الجرثوم الحاضن.

## ١- الحصول على هرمون النمو البقري BGH

استطاع العلماء الحصول على هرمون النمو البقري BGH بتقانات الهندسة الوراثية (متى؟) في أوائل الثمانينات من القرن العشرين واستخدمت التقانات ذاتها للحصول على هرمون النمو البشري

## مراحل العمل للحصول على هرمون النمو البقري BGH:



## استنتاجات وملاحظات مما سبق:

ينتج عن وضع البلازميد والمورثة المعزولة في أنبوب اختبار بوجود أنظمة ربط: د ٢٠١٦  
تتلاءم النهايات اللزجة ويتشكل بلازميد مؤشب  
ينتج عن حقن الأبقار بهرمون BGH:  
زيادة إنتاج الحليب

البلازميد المؤشب (تعريفه/ينتج من): د ٢٠١٦

بلازميد ينتج من ربط المورثة المرغوبة مع DNA حلقي من الجرثوم

- ١- متى استطاع العلماء الحصول على هرمون النمو البقري BGH بتقانات الهندسة الوراثية؟
- ٢- عدد مراحل الحصول على هرمون النمو البقري BGH بتقانات الهندسة الوراثية.
- ٣- ماذا ينتج عن وضع البلازميد والمورثة المعزولة في أنبوب اختبار بوجود أنظمة ربط؟
- ٤- ماذا ينتج عن حقن الأبقار بهرمون BGH؟

## ٢- تطبيقات غذائية للهندسة الوراثية

## من الفوائد الغذائية للهندسة الوراثية:

- إطعام الجياع
- معالجة سوء التغذية
- التقليل من مشكلة ضعف الرؤية من خلال الحصول على الأرز الذهبي

## الأرز الذهبي:

## خطوات الحصول على الأرز الذهبي:

تعديل وراثي للأرز يجعله ينتج كمية أكبر من البيتاكاروتين (فبالنتيجة):  
مما يزيد كمية الفيتامين A ويجعل لونه ذهبياً.



ما أهمية زيادة كمية الفيتامين A للأرز الذهبي في الرؤية؟  
يعد الفيتامين A طليعة للأصبغة الحساسة للضوء للخلايا البصرية

- ١- اذكر الفوائد الغذائية للهندسة الوراثية.
  - ٢- ما هي خطوات الحصول على الأرز الذهبي؟
  - ٣- ماذا ينتج عن زيادة كمية البيتاكاروتين في الأرز؟
  - ٤- فسر للأرز الذهبي فائدة للرؤية على مستوى المجتمع؟
- ج- يحوي كمية أكبر من الفيتامين A و الفيتامين A طليعة للأصبغة الحساسة للضوء للخلايا البصرية

د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء


## ٣- جعل النباتات مقاومة للحشرات دون رش المبيدات الحشرية

لمقاومة الحشرات التي تضر بالمحاصيل الزراعية، هناك طريقتان:

جعل النباتات مقاومة للحشرات وراثيًا	رش المبيدات الحشرية	
<p>- التكلفة العالية</p> <p>- الجهد الكبير</p> <p>عزل المورثة التي تشرف على تركيب بروتين يقتل يرقات فراشات حفار الذرة</p> <p>↓</p> <p>إدخال المورثة التي تشرف على تركيب هذا البروتين في خلايا الذرة</p> <p>↓</p> <p>تنتج خلايا الذرة البروتين الذي يقتل يرقات فراشات حفار الذرة</p> <p>↓</p> <p>تقتل أنسجة نبات الذرة المعدلة وراثيًا يرقات فراشات حفار الذرة عندما تتغذى عليها</p>	<p>- ضارة بالصحة</p> <p>- تلوث التربة والمياه الجوفية</p> <p>-----</p>	<p>السلبيات</p> <p>الآلية</p>
<p>١- عزل المورثة التي تشرف على تركيب بروتين يقتل يرقات فراشات حفار الذرة</p> <p>٢- إدخال المورثة التي تشرف على مادة تركيب هذا البروتين في خلايا الذرة</p> <p>٣- تنتج خلايا الذرة البروتين الذي يقتل يرقات فراشات حفار الذرة. تقتل أنسجة نبات الذرة المعدلة وراثيًا هذه اليرقات عندما تتغذى عليها</p>		<p>صورة</p>

١- قارن بين كل من طريقة رش المبيدات الحشرية وطريقة جعل النباتات مقاومة للحشرات وراثيًا من حيث: السلبيات والآلية.


## ٤- العلاج الجيني

**مشروع الجينوم البشري:**


أطلق عام: 1990

**محتويات مشروع الجينوم البشري:**

- تمكن العلماء من رسم الخارطة الوراثية للمورثات البشرية والبالغ عددها 22000 مورثة
- تم عزل الحمض النووي وتقطيع الصبغيات وتحديد تسلسلات الـ DNA
- تبلورت فكرة العلاج الجيني

**أسس فكرة العلاج الجيني:**

- ١- إدخال مورثة تعمل بدل المورثة غير الوظيفية
- ٢- أو بإسكات مورثة غير طبيعية (معيبة)




مادة علم الأحياء

- ١- متى أطلق مشروع الجينوم البشري؟
- ٢- ما هي محتويات مشروع الجينوم البشري؟
- ٣- ما هي أسس فكرة العلاج الجيني؟

## طرق العلاج الجيني

طرق مباشرة	طرق غير مباشرة
نقل المورثة إلى داخل الخلايا في الجسم مباشرة	نقل المورثة إلى داخل خلايا مزروعة
	ثم نقل الخلايا الحاملة للمورثة إلى داخل الجسم



## أفق علاجية مستقبلية باستخدام العلاج الجيني:



## علاج الإيدز:

عن طريق:


التعديل المورثي للخلايا التائية المساعدة بحيث يتم تغيير المستقبلات النوعية للفيروس على غشاء الخلية المضيفة (فبالنتيجة):

لا يتمكن الفيروس من مهاجمتها.

## تقوية الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية:

عن طريق:

- تعديلها لتنتج أحد عوامل النمو المنشطة للخلايا اللمفية التائية المقاومة للسرطان.
- مما يقوي الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية (خلايا الورم).




- 1- عدد طرق العلاج الجيني.
- 2- قارن بين الطرق غير مباشرة والطرق المباشرة للعلاج الجيني من حيث: الآلية.
- 3- اذكر ٢ من الأفق العلاجية المستقبلية باستخدام العلاج الجيني.
- 4- اشرح آلية تقوية الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية.

## التحكم بمعدل النسخ المورثي

## التحكم بمعدل النسخ المورثي:

يتم عن طريق بروتينات معينة:

- بعضها ينشط عملية النسخ
  - وبعضها يوقف عملية النسخ
- (كيف؟) عن طريق التأثير على أنظيم RNA بوليميراز.




## من تطبيقات التحكم بمعدل النسخ المورثي:

٢- تعبر خلايا معينة (خلايا القلب مثلاً) عن مورثاتها بشكل مختلف عن خلايا أخرى (خلايا العين مثلاً).

١- تفعيل أو كبح المورثة بعد إدخالها في مكانها الصحيح في عملية الهندسة الوراثية.

مادة علم الأحياء



- ١- كيف يتم التحكم بمعدل النسخ المورثي؟
- ٢- كيف تقوم البروتينات بتنشيط/إيقاف عملية النسخ؟
- ٣- اذكر ٢ من تطبيقات التحكم بمعدل النسخ المورثي.



**التقويم النهائي****أولاً: أصحح ما وضع تحته خط في العبارات الآتية:**

1. في علاج السرطان بتقنية الهندسة الوراثية يتم تعديل المادة الوراثية للخلايا المناعية.
2. في النسخ المورثي يرتبط mRNA بالمحضض لبدء عملية النسخ.
3. تُدخل الجرثومة التي تنتج بروتيناً ساماً لحفار الذرة إلى خلايا النبات.

**ثانياً: أكتب المصطلح العلمي الموافق لما يأتي:**

1. بلاسميد ينتج من ربط المورثة المرغوبة مع DNA حلقي من الجرثوم.
2. بلاسميدات مندمجة مع DNA الفيروسات.
3. يمكن التحكم بزيادة أو إنقاص معدل نسخ المورثة لل mRNA.

**ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

- ١- تمكّن الهندسة الوراثية الإنسان من الحدّ من تلوث المياه الجوفية والتربة.
- ٢- تستخدم الهندسة الوراثية في الحدّ من انتشار عدوى الإيدز.
- ٣- الأمراض الوراثية المتنحية المرتبطة بالصبغي الجنسي X تكون شائعة لدى الذكور أكثر من الإناث.
- ٤- يستطيع الأرز الذهبي تحسين الأداء البصري للعين والتقليل من مشكلة العمى.

د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء

**حل التقويم النهائي****أولاً: أصحح ما وضع تحته خط في العبارات الآتية:**

- 1 في علاج السرطان بتقنية الهندسة الوراثية يتم تعديل المادة الوراثية للخلايا المناعية. (للخلايا التائية)
2. في النسخ المورثي يرتبط mRNA بالمحضض لبدء عملية النسخ. (RNA بوليميراز)
3. تُدخل الجرثومة التي تنتج بروتيناً ساماً لحفار الذرة إلى خلايا النبات. (المورثة)

**ثانياً: أكتب المصطلح العلمي الموافق لما يأتي:**

1. بلاسميد ينتج من ربط المورثة المرغوبة مع DNA حلقي من الجرثوم. (البلاسميد المؤشب)
2. بلاسميدات مندمجة مع DNA الفيروسات. (الكوزميدات)
3. يمكن التحكم بزيادة أو إنقاص معدل نسخ المورثة لل mRNA. (للخلايا التائية)

**ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

- ١- تمكّن الهندسة الوراثية الإنسان من الحدّ من تلوث المياه الجوفية والتربة. بإنتاج نباتات ذرة تقتل الحشرات وتتغذى عليها، وهكذا تصبح النباتات مقاومة للحشرات دون رش المبيدات الحشرية التي تلوث التربة والمياه الجوفية.
- ٢- تستخدم الهندسة الوراثية في الحدّ من انتشار عدوى الإيدز. يتم علاج الإيدز عن طريق التعديل المورثي للخلايا التائية المساعدة، بحيث تغير المستقبلات النوعية للفيروس على غشاء الخلية المضييفة فلا يتمكن من مهاجمتها.
- ٣- يمكن التحكم بزيادة أو إنقاص معدل نسخ المورثة لل mRNA. عن طريق بروتينات معينة بعضها ينشط عملية النسخ وبعضها يوقف عملية النسخ عن طريق التأثير على أنزيم RNA بوليميراز.
- ٤- يستطيع الأرز الذهبي تحسين الأداء البصري للعين والتقليل من مشكلة العمى. لأن الأرز الذهبي ينتج كمية أكبر من البيتا كاروتين مما يزيد كمية الفيتامين A الذي يعد طليعة للأصبغة الحساسة للضوء للخلايا البصرية.

توجد فيديوهات توضيحية هامة لهذا الدرس تشرح بعض الفقرات بأمثلة ولقطات من الواقع لا تنس عزيزي الطالب مشاهدتها، ولا تنس حل نموذج الامتحان الخاص لهذا الدرس.

يتم نشر الفيديوهات والمذكرات عبر مجموعاتي على واتس أب،

قم بطلب الانضمام عبر مراسلتي على الواتس حصراً على الرقم: ٠٩٤٢٢٤٩٩٤٨



## أسئلة الوحدة الثالثة

■ أولاً: أختارُ الإجابة الصحيحة لكلِّ مما يأتي:

- ١- يكون في الحجب المتنحي:
  - أ-  $a < A$
  - ب-  $a < B$
  - ج-  $B < aa$
  - د-  $aa < B$
- ٢- النمط الوراثي الذي يعطي لوناً وسطياً لحبوب القمح هو:
  - أ-  $r_1r_1 r_2r_2 r_3r_3$
  - ب-  $R_1r_1 R_2r_2 R_3r_3$
  - ج-  $R_1r_1 r_2r_2 R_3r_3$
  - د-  $R_1R_1 R_2r_2 R_3r_3$
- ٣- الصيغة الصبغية لأنثى ذبابة الخل الطبيعية من الشكل:
  - أ-  $2n = 6A + XY$
  - ب-  $2n = 6A + X0$
  - ج-  $2n = 6A + XX$
  - د-  $2n = 6A + XXY$
- ٤- صفة وراثية غير مرتبطة بالصبغي X عند الإنسان:
  - أ- زمر الدم ABO
  - ب- الناعور
  - ج- مرض الفوال
  - د- الضمور العضلي.

■ ثانياً: أجبُ بكلمة (صح) أو (غلط) في كلِّ من العبارات الآتية:

- ١- تتوافق نسبة الأنماط الوراثية مع الأنماط الظاهرية في الجيل الثاني من الرجحان المشترك.
- ٢- ارتباط صفتي شكل الجناح، ولون الجسم عند أنثى ذبابة الخل هو : ارتباط تام.
- ٣- الأب الحامل لمورثة الصفة المرتبطة بالصبغي Y يورث هذه الصفة لجميع أبنائه الذكور.
- ٤- يمكن لأبوين الأول زمرة AB والآخر زمرة B ، ولادة طفل زمرة A.
- ٥- في الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي X تورث الأم الناقلة للصفة المتنحية هذه الصفة لأبنائها الذكور كافةً.

■ ثالثاً: أكتب المصطلح العلمي المناسب لكلِّ من العبارات الآتية:

- ١- حالة من التوازن بين أليلي الصفة الواحدة لدى وجودهما في فرد متخالف اللواقح.
- ٢- حالة يقوم فيها أليل راجح لمورثة أولى بحجب عمل أليل راجح لمورثة أخرى غير مقابل له، وغير مرتبط معه.
- ٣- جزيئات DNA حلقيية، توجد في بعض الجراثيم.

■ رابعاً: أحلُّ المسائل الوراثية الآتية:

- ١- أُجري التهجين بين سلالتين من نبات البطاطا الأولى درناتها كبيرة a غير مقاومة للمرض B والثانية درناتها صغيرة A ومقاومة للمرض b فكانت جميع أفراد الجيل الأول F<sub>1</sub> صغيرة الدرنة، وغير مقاومة للمرض، والمطلوب:
  - ١- ما نمط هذه الهجونة الثنائية؟
  - ٢- ما النمط الوراثي لكلِّ من الأبوين؟ وما احتمال أعراسهما؟
  - ٣- ما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول؟
  - ٤- ما احتمال الأعراس التي ينتجها الجيل الأول؟
  - ٥- ما الأنماط الوراثية والظاهرية لأفراد الجيل الثاني وفق الصيغة العامة؟

- ٢- أجري التهجين بين سلالتين من الكوسا الأولى ثمارها بيضاء  $WW yy$  والثانية ثمارها صفراء  $ww YY$  فكانت نباتات الجيل الأول ذات ثمار بيضاء، والمطلوب:
- ١- ما سبب ظهور اللون الأبيض في أفراد الجيل الأول؟
  - ٢- ما احتمال أعراس الأبوين؟ وما النمط الوراثي للجيل الأول؟
  - ٣- كيف تفسر ظهور النسب 16 / 12 بلون أبيض في الجيل الثاني؟
  - ٤- ما سبب ظهور اللون الأخضر في الجيل الثاني؟

د٢٠٢٣ت(مشابهة)


- ٣- تزوج رجل زمرته الدموية A ويملك حزمة شعر زائدة على حافة صيوان الأذن r من امرأة زمرتها الدموية AB فولد لهما بنت زمرتها الدموية B وذكر زمرته A وله حزمة شعر زائدة. والمطلوب:
- ١- ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء الناتجة عن هذا التزاوج؟
  - ٢- ما الأنماط الوراثية المحتملة لكل من البنت والصبي وما احتمال أعراس كل منهما؟

- ٤- تم التهجين بين كبش أغنام صوفه ناعم S وليس له قرون، مع نعجة صوفها خشن R وليس لها قرون، فكان من بين الأفراد الناتجة ذكر صوفه متموج، وله قرون، وأنثى صوفها متموج، وليس لها قرون. والمطلوب:

- إذا علمت أن الصفتين غير مرتبطين ضع تحليلاً وراثياً لهذه الهجونة أليل ظهور القرون H وأليل غياب القرون h

- ٥- تزوج رجل سليم من مرض الضمور العضلي وزمرته الدموية A من فتاة لا تظهر عليها علائم المرض وزمرتها الدموية B فأنجبا ذكراً مصاباً بالمرض، وزمرته الدموية O والمطلوب:
- ١- ما النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما المحتملة؟
  - ٢- ما احتمال إنجاب ذكر مصاب بالمرض وزمرته الدموية AB من بين الأبناء؟
- إذا علمت أن أليل الضمور العضلي m وأليل الصحة M منوهين أن الضمور العضلي يصيب واحداً من كل ٤٠٠٠ ذكر وغالباً ما يموت المصابون قبل سن العشرين بمرض ذات الرئة.

- ٦- تمثل شجرة النسب المجاورة وراثية مرض مرتبط بالجنس. أجب عن الأسئلة الآتية:



- ١- ما الصبغي الحامل لأليل المرض؟ علل إجابتك.
- ٢- هل أليل المرض راجح أم متنح، ولماذا؟
- ٣- إذا علمت أن الأليل الراجح A والأليل المتنح a اكتب الأنماط الوراثية للأفراد:  $II_2 - III_2 - I_1 - I_2$
- ٤- ما احتمال ولادة طفل ذكر مصاب من زواج  $III_1$  من رجل سليم؟

## حل أسئلة الوحدة الثالثة

■ أولاً: أختارُ الإجابة الصحيحة لكلِّ مما يأتي:

- ١- يكون في الحجب المتنحي:
  - أ-  $a < A$
  - ب-  $a < B$
  - ج-  $B < aa$
  - د-  $aa < B$
- ٢- النمط الوراثي الذي يعطي لوناً وسطياً لحبوب القمح هو:
  - أ-  $r_1r_1 r_2r_2 r_3r_3$
  - ب-  $R_1r_1 R_2r_2 R_3r_3$
  - ج-  $R_1r_1 r_2r_2 R_3r_3$
  - د-  $R_1R_1 R_2r_2 R_3r_3$
- ٣- الصيغة الصبغية لأنثى ذبابة الخل الطبيعية من الشكل:
  - أ-  $2n = 6A + XY$
  - ب-  $2n = 6A + X0$
  - ج-  $2n = 6A + XX$
  - د-  $2n = 6A + XXY$
- ٤- صفة وراثية غير مرتبطة بالصبغي X عند الإنسان:
  - أ- زمر الدم ABO
  - ب- الناعور
  - ج- مرض الفوال
  - د- الضمور العضلي

■ ثانياً: أجبُ بكلمة (صح) أو (غلط) في كلِّ من العبارات الآتية:

- ١- تتوافق نسبة الأنماط الوراثية مع الأنماط الظاهرية في الجيل الثاني من الرجحان المشترك. (صح)
- ٢- ارتباط صفتي شكل الجناح، ولون الجسم عند أنثى ذبابة الخل هو: ارتباط تام. (غلط)
- ٣- الأب الحامل لمورثة الصفة المرتبطة بالصبغي Y يورث هذه الصفة لجميع أبنائه الذكور. (صح)
- ٤- يمكن لأبوين الأول زمرة AB والآخر زمرة B، ولادة طفل زمرة A. (صح)
- ٥- في الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي X تورث الأم الناقلة للصفة المتنحية هذه الصفة لأبنائها الذكور كافةً. (غلط)

■ ثالثاً: أكتب المصطلح العلمي المناسب لكلِّ من العبارات الآتية:

- ١- حالة من التوازن بين أليلي الصفة الواحدة لدى وجودهما في فرد متخالف اللواقح. **رجحان مشترك (متساو)**
- ٢- حالة يقوم فيها أليل راجح لمورثة أولى بحجب عمل أليل راجح لمورثة أخرى غير مقابل له، وغير مرتبط معه. **الحجب الراجح**
- ٣- جزيئات DNA حلقيّة، توجد في بعض الجراثيم. **البلاسميدات**

■ رابعاً: أحلُّ المسائل الوراثية الآتية:

- ١- أجري التهجين بين سلالتين من نبات البطاطا الأولى درناتها كبيرة a غير مقاومة للمرض B والثانية درناتها صغيرة A ومقاومة للمرض b فكانت جميع أفراد الجيل الأول F1 صغيرة الدرنة، وغير مقاومة للمرض، والمطلوب:
  - ١- ما نمط هذه الهجونة الثنائية؟
  - ٢- ما النمط الوراثي لكلِّ من الأبوين؟ وما احتمال أعراسهما؟
  - ٣- ما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول؟
  - ٤- ما احتمال الأعراس التي ينتجها الجيل الأول؟
  - ٥- ما الأنماط الوراثية والظاهرية لأفراد الجيل الثاني وفق الصيغة العامة؟

## نمط الهجونة رجحان تام للصفاتين

كبيرة غير مقاومة × صغيرة مقاومة	النمط الظاهري للأبوين P	
bb AA × BB aa	النمط الوراثي للأبوين P	
$(\frac{1}{1} bA) \times (\frac{1}{1} Ba)$	احتمال أعراس الأبوين P	
$(\frac{1}{1} Aa Bb)$	النمط الوراثي للجيل الأول F1	
١٠٠% صغيرة غير مقاومة	النمط الظاهري للجيل الأول F1	
صغيرة غير مقاومة × صغيرة غير مقاومة	تهجين ذاتي لأفراد الجيل الأول	
Aa Bb × Aa Bb		
$(\frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} Ab + \frac{1}{4} aB + \frac{1}{4} ab)$	احتمال أعراس الجيل الأول F1	
×		
$(\frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} Ab + \frac{1}{4} aB + \frac{1}{4} ab)$		
النسبة الوراثية لـ F2	النمط الظاهري لـ F2	النمط الوراثي لـ F2
٩	صغيرة غير مقاومة	A- B-
٣	صغيرة مقاومة	A- bb
٣	كبيرة غير مقاومة	aa B-
١	كبيرة مقاومة	aa bb

- ٢- أجري التهجين بين سلالتين من الكوسا الأولى ثمارها بيضاء WW yy والثانية ثمارها صفراء ww YY فكانت نباتات الجيل الأول ذات ثمار بيضاء، والمطلوب:
- ١- ما سبب ظهور اللون الأبيض في أفراد الجيل الأول؟
  - ٢- ما احتمال أعراس الأبوين؟ وما النمط الوراثي للجيل الأول؟
  - ٣- كيف تفسر ظهور النسب 16 / 12 بلون أبيض في الجيل الثاني؟
  - ٤- ما سبب ظهور اللون الأخضر في الجيل الثاني؟

الأليل الراجح W للمورثة الأولى المسؤول عن اللون الأبيض ، حجب عمل الأليل الراجح Y للمورثة الثانية غير مقابل له للون الأصفر ، وغير مرتبط معه لدى اجتماعهما في فرد واحد.	
$(\frac{1}{1} wY) \times (\frac{1}{1} Wy)$	٢- احتمال أعراس الأبوين P
$\frac{1}{1} Ww Yy$	النمط الوراثي للجيل الأول F1
	٣-
$(\frac{9}{16} W- Y-)$ : تعطي ثمارًا بيضاء لأن الراجح W حجب عمل الأليل الراجح Y	
$(\frac{3}{16} W- yy)$ : تعطي ثمارًا بيضاء لأن الراجح W يعطي اللون الأبيض	

- ٣- تزوج رجل زمرته الدموية A ويملك حزمة شعر زائدة على حافة صيوان الأذن r من امرأة زمرتها الدموية AB فولد لهما بنت زمرتها الدموية B وذكر زمرته A وله حزمة شعر زائدة. والمطلوب:
- ١- ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء الناتجة عن هذا التزاوج؟
  - ٢- ما الأنماط الوراثية المحتملة لكل من البنت والصبي وما احتمال أعراس كل منهما؟

من البنت ذات الزمرة الدموية B نستنتج أن الأب متخالف اللواقح بالنسبة لزمرة الدم							
رجل زمرة A له حزمة شعر × امرأة زمرة AB بدون حزمة شعر							
$I^A I^B X_0 X_0 \times I^A i X_0 Y_r$							
$(\frac{1}{2} I^A X_0 + \frac{1}{2} I^B X_0) \times (\frac{1}{4} I^A X_0 + \frac{1}{4} I^A Y_r + \frac{1}{4} i X_0 + \frac{1}{4} i Y_r)$							
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
$I A I A X_0 X_0$	$I A I A X_0 Y_r$	$I A i X_0 X_0$	$I A i X_0 Y_r$	$I A I B X_0 X_0$	$I A I B X_0 Y_r$	$I B i X_0 X_0$	$I B i X_0 Y_r$
أنثى زمرة A بدون حزمة	ذكر زمرة A بحزمة	أنثى زمرة A بدون حزمة	ذكر زمرة A بحزمة	أنثى زمرة AB بدون حزمة	ذكر زمرة AB بحزمة	أنثى زمرة B بدون حزمة	ذكر زمرة B بحزمة
النمط الظاهري للأبناء							
النمط الوراثي للأبناء							
احتمال أعراس الأبوين							
النمط الظاهري للأبوين							

٤- تم التهجين بين كبش أغنام صوفه ناعم S وليس له قرون، مع نعجة صوفها خشن R وليس لها قرون، فكان من بين الأفراد الناتجة ذكر صوفه متموج، وله قرون، وأنثى صوفها متموج، وليس لها قرون. والمطلوب:

- إذا علمت أن الصفتين غير مرتبطتين ضع تحليلاً وراثياً لهذه الهجونة أليل ظهور القرون H وأليل غياب القرون h


ذكر صوف ناعم بلا قرون × أنثى صوف خشن بلا قرون		النمط الظاهري للأبوين
$Hh RR \times hh SS$		النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{2} HR + \frac{1}{2} hR) \times (\frac{1}{2} hS)$		احتمال أعراس الأبوين
$\frac{1}{2} Hh RS$	$+\frac{1}{2} hh RS$	النمط الوراثي للأبناء
٥٠% صوف متموج (بقرون للذكور، بلا قرون للإناث)	٥٠% صوف متموج بلا قرون (للجنسين)	النمط الظاهري للأبناء

٥- تزوج رجل سليم من مرض الضمور العضلي وزمرته الدموية A من فتاة لا تظهر عليها علائم المرض وزمرتها الدموية B فأنجبا ذكراً مصاباً بالمرض، وزمرته الدموية O والمطلوب:

- ١- ما النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما المحتملة؟
  - ٢- ما احتمال إنجاب ذكر مصاب بالمرض زمرة الدموية AB من بين الأبناء؟
- إذا علمت أن أليل الضمور العضلي m وأليل الصحة M منوهين أن الضمور العضلي يصيب واحداً من كل ٤٠٠٠ ذكر وغالباً ما يموت المصابون قبل سن العشرين بمرض ذات الرئة.

بما أنه تم إنجاب ذكر مصاب زمرة O فيكون:	
أب سليم من الضمور العضلي زمرة A × أم لا تظهر عليها علائم المرض زمرة B	
$I^B i X_M X_m \times I^A i X_m Y_0$	
$(\frac{1}{4} I^B X_M + \frac{1}{4} I^B X_m + \frac{1}{4} i X_M + \frac{1}{4} i X_m) \times (\frac{1}{4} I^A X_m + \frac{1}{4} I^A Y_0 + \frac{1}{4} i X_m + \frac{1}{4} i Y_0)$	
النمط الوراثي له: $I^A I^B X_m Y_0$	
احتماله: $\frac{1}{16}$	
احتمال إنجاب ذكر مصاب زمرة AB	

٦- تمثّل شجرة النسب المجاورة ووراثة مرض مرتبط بالجنس. أجب عن الأسئلة الآتية:



- ١- ما الصبغي الحامل لأليل المرض؟ علّل إجابتك.
- ٢- هل أليل المرض راجح أم متنح، ولماذا؟
- ٣- إذا علمت أنّ الأليل الراجح A والأليل المتنحّ a اكتب الأنماط الوراثية للأفراد:  $II_2 - III_2 - I_1 - I_2$
- ٤- ما احتمال ولادة طفل ذكر مصاب من زواج  $III_1$  من رجل سليم؟

١- أليل المرض محمول على الصبغي X لأنه لو كان أليل المرض محمولاً على الصبغي Y لما أصيبت الأنثى $II_1$				
٢- أليل راجح، لأنه لو كان أليل المرض متنحياً لما نتجت الأنثى $III_1$ (أنثى مصابة من أب سليم)				
$II_2: X_a Y_0$ $III_2: X_a Y_0$ $I_1: X_A Y_0$ $I_2: X_a X_a$			٣- النمط الوراثي	
٤- احتمال ولادة طفل ذكر مصاب من زواج $III_1$ من رجل سليم هو $\frac{1}{4}$ ، التفسير:				
الأم $III_1$ مصابة × أب سليم			النمط الظاهري للأبوين	
$X_a Y_0 \times X_A X_a$			النمط الوراثي للأبوين	
$(\frac{1}{2} X_a + \frac{1}{2} Y_0) \times (\frac{1}{2} X_A + \frac{1}{2} X_a)$			احتمال أعراس الأبوين	
$\frac{1}{4} X_A X_a$	$+\frac{1}{4} X_a X_a$	$+\frac{1}{4} X_A Y_0$	$+\frac{1}{4} X_a Y_0$	النمط الوراثي للأبناء
أنثى مصابة	أنثى سليمة	ذكر مصاب	ذكر سليم	النمط الظاهري للأبناء

د.حازم ضعيف

مادة علم الأحياء