



♥ سلسلة التجمع التعليمي ♥

القناة الرئيسية: [T.me/BAK111](https://t.me/BAK111)

بوت الملفات العلمي @Ob\_Am2020bot



للتواصل

[T.me/BAK117\\_BOT](https://t.me/BAK117_BOT)

## الأغوال

## أعط تفسيراً علمياً لكل مما يلي

- 1- درجة غليان الأغوال أعلى من درجة غليان الألكانات الموافقة؟  
بسبب قدرة الأغوال على تشكيل روابط هيدروجينية بين جزيئاتها بينما لا تستطيع الألكانات تشكيل هذه الروابط.
  - 2- تناقص مزوجية الأغوال في الماء بزيادة كتلتها المولية؟  
بسبب نقصان تأثير الجزء القطبي ( $-OH$ ) على حساب تأثير الجزء غير القطبي ( $R$ ).
  - 3- مزوجية الإيثانول في الماء بالنسب كافة.  
بسبب تشكل الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الغول وجزيئات الماء.
  - 4- تتفاعل الأغوال مع المعادن النشيطة كيميائياً؟  
لأن المعادن النشيطة تستطيع إزاحة الهيدروجين في الرابطة ( $OH$ ).
- ### الألدهيدات والكيوتونات
- 5- درجة غليان الأغوال أعلى من درجة غليان الألدهيدات والكيوتونات الموافقة.  
لأن قطبية الرابطة ( $O - H$ ) في الأغوال أقوى من قطبية الرابطة ( $C = O$ ) في الألدهيدات والكيوتونات إضافة إلى أن جزيئات الأغوال تشكل رابطة هيدروجينية بين جزيئاتها بينما لا تشكل الألدهيدات والكيوتونات هذه الرابطة بين جزيئاتها.
  - 6- درجة غليان الألدهيدات والكيوتونات أعلى من درجة غليان الألكانات الموافقة لها.  
لأن قطبية روابط الألدهيدات والكيوتونات أعلى من قطبية روابط الألكانات.
  - 7- درجة غليان الألدهيدات والكيوتونات أعلى من درجة غليان الإيترات الموافقة لها.  
لأن قطبية الرابطة ( $-C = O -$ ) في الألدهيدات والكيوتونات أقوى من قطبية الرابطة ( $C - O - R$ ) في الإيترات.
  - 8- تمازج الألدهيدات والكيوتونات ذات الكتل المنخفضة بالماء؟  
بسبب الصفة القطبية لزمرة الكربونيل.
  - 9- تقل مزوجية الألدهيدات والكيوتونات تدريجياً مع ازدياد كتلتها الجزيئية؟  
بسبب ضعف تأثير الجزء القطبي (زمرة الكربونيل) عند كبر الجزء غير القطبي ( $R$ ).
  - 10- سهولة أكسدة الألدهيدات إلى حموض كربوكسيلية؟  
بسبب وجود ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة كربون الزمرة الكربونيلية.
  - 11- تقاوم الكيوتونات تفاعل الأكسدة؟  
بسبب عدم وجود ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة كربون الزمرة الكربونيلية.

## الحموض الكربوكسيلية

- 12- تفوق الصفة القطبية للحموض الكربوكسيلية مقارنةً مع باقي المواد العضوية؟  
لأن زمرة الكربوكسيل ( $-COOH$ ) تحوي زميرتين قطبيتين هما الهيدروكسيل ( $-OH$ ) والكربونيل ( $-CO-$ ).
  - 13- ارتفاع درجة غليان الحموض الكربوكسيلية مقارنةً بالمواد العضوية الموافقة لها بعدد ذرات الكربون.  
بسبب تفوق الصفة القطبية للحموض الكربوكسيلية حيث أن زمرة الكربوكسيل ( $-COOH$ ) تحتوي على زميرتين قطبيتين هما الهيدروكسيل  $-OH$  والكربونيل ( $-C = O$ ) وبسبب تشكل رابطتين هيدروجينيتين بين كل جزئين من الحمض الكربوكسيلي.
  - 14- تمازج الحموض الكربوكسيلية التي تحوي (4 - 1) ذرات كربون في الماء بالنسب كافة؟  
بسبب تشكل روابط هيدروجينية بين جزيئات الحمض وجزيئات الماء.
  - 15- يتناقص تمازج الحموض الكربوكسيلية في الماء بزيادة كتلتها المولية.  
بسبب نقصان تأثير الجزء القطبي ( $-COOH$ ) وزيادة تأثير الجزء غير القطبي ( $R$ ).
- ### مشتقات الحموض الكربوكسيلية
- 16- درجات غليان الأسترات أقل من درجات غليان الحموض الكربوكسيلية الموافقة لها بعدد ذرات الكربون.  
لعدم وجود روابط هيدروجينية بين جزيئات الأسترات ووجود هذه الروابط بين جزيئات الحموض الكربوكسيلية.
  - 17- عدم قدرة الأسترات على تشكيل روابط هيدروجينية بين جزيئاتها.  
لعدم وجود ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة شديدة الكهروسلبية.
  - 18- تستطيع الأميدات الأولية والثانوية تشكيل روابط هيدروجينية بين جزيئاتها؟  
بسبب وجود ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة شديدة الكهروسلبية (النتروجين).
  - 19- عدم تشكل روابط هيدروجينية بين جزيئات الأميدات الثالثية.  
بسبب عدم وجود ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة شديدة الكهروسلبية (النتروجين).
  - 20- درجة غليان الأمينات الأولية والثانوية أعلى من درجة غليان الألكانات الموافقة لها.  
لأن الأمينات الأولية والثانوية تستطيع تشكيل روابط هيدروجينية فيما بينها بينما لا تستطيع الألكانات تشكيل هذه الروابط بين جزيئاتها.
  - تعتبر الأمينات أسس ضعيفة؟ لأنها تحوي زوج الكترولني حر على ذرة النتروجين فهي قادرة على منحه أو استقبال بروتون.