



السُّلْطَانُ هَذِهِ الْأَرْضُ


وزارة التربية والتعليم

قطاع المناهج والتوجيه

الإدارة العامة للمناهج

الرياضيات

لأصنف السابع من مرحلة التعليم الأساسي



حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم
١٤٣٦هـ / ٢٠١٥م



إيماناً منا بأهمية المعرفة ومواكبة لعصر التكنولوجيا تشرف
الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات
في ربوع الوطن الحبيب بهذا العمل آملين أن ينال رضا الجميع

فكرة وإعداد

أ. عادل علي عبد الله البقع

مساعد

أ. زينب ممدوح السمان

مراجعة وتدقيق

أ. محمد شرف الدين

أ. خديجة عبدالهادي

أ. رقية الأهدل

متابعة

أمين الإدريسي

إشراف مدير عام

الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني

أ. محمد عبد الصرمي



الجَمْهُورِيَّةُ الْبَلْقَارِيَّةُ
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج

الرياضيات

للصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي

فريق التأليف

د/ شكيب محمد باجرش (رئيساً).

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| د/ أمة الإله علي حُمد الحوري. | د/ ردمان محمد سعيد. |
| د/ منصور عطاء. | د/ علي شاهر نعeman القرشي. |
| د/ محمد عبد الرب محمد بشر (منسقاً). | د/ عبدالله سلطان عبد الغني. |
| د/ علي عبده عبد الواحد. | د/ محمد علي مرشد. |
| أ/ يحيى بكار مصطفى. | أ/ سالمين محمد باسلوم. |
| أ/ ذا النون سعيد طه. | أ/ عبد الباري طه. |
| أ/ مصطفى عبد الواحد. | أ/ عبد الله أحمد سيف. |
| أ/ جميلة إبراهيم أحمد. | أ/ أحمد سالم باحويت. |
| أ/ مريم عبد الجبار. | |

فريق المراجعة:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| أ/ جميلة إبراهيم أحمد. | أ/ شرف عثمان الخامري. |
| أ/ تهاني سعيد الحكيمي. | أ/ مختار حيدر هزار. |
- تنسيق: أ/ سعيد محمد ناجي الشرعي.
تدقيق: د. محمد عبد الرب بشر.
إشراف: د. عبدالله سلطان الصلاحية.

الإخراج الفني

- الصف والتصميم: علي عبد الله السلفي.
اللائحة: سلطان علي.
صورة: عبد الجبار محسن مسعود.
محمد حسين الدمامي.

تدقيق التصميم : حامد عبدالعال الشيباني.

٢٠١٥ هـ / ٢٠١٤



النشيد الوطني

رددت أيتها الدنيا نشيدى رددتىه وأعىدي واعيىدى
واذكري في فرحتى كل شهيد وامنحيه حلالاً من ضوء عيدى

رددت أيتها الدنيا نشيدى

رددت أيتها الدنيا نشيدى

وحدتى .. وحدتى .. يا نشيدأ يملأ نفسي أنت عهد عالق في كل ذمة
رأيتى .. رأيتى .. يا نسجأ حكته من كل شمس أخلدأ خافقة في كل قمة
أمتى .. أمتى .. امنحيني الباس يا مصدر بأسى واذخرني لكي يا أكره أمة

عشّت إيمانى وحبّى أمميا

وسيرى فوق دربي عربيا

وسبّقى نبض قلبي يمنيا

لن ترى الدنيا على أرضي وصيا

المصدر: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٦م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

أعضاء اللجنة العليا للمناهج

أ. د. عبدالرزاق يحيى الأشول.

- أ/ عبد الله عبده الحامدي.
- د/ عبدالله سالم ملس.
- أ/ أحمد عبدالله أحمد.
- د/ فضل أحمد ناصر مطلي.
- د/ صالح ناصر الصوفي.
- د/ محمد عمر سالم باسليم.
- أ. د/ داود عبد المللк الحدادي.
- أ. د/ محمد حاتم المخلافي.
- أ. د/ محمد عبدالله الصوفي.
- د/ عبد الله زبارة.
- أ/ محمد عبد الله علي النزيли.
- أ/ إبراهيم محمد الحوشى.
- أ/ عبدالله علي إسماعيل الرازحي.
- د. عبدالله سلطان الصلاحي.

في إطار تفزيذ التوجهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته تلبية للاحتجاجات ووفقاً للمتطلبات الوطنية.

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي على إعطاء أولوية استثنائية لتطوير المناهج الدراسية، كونها جوهر العملية التعليمية وعملية ديناميكية تتسم بالتجديد والتغيير المستمر لاستيعاب التطورات المتسارعة التي تسود عالم اليوم في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذا الكتاب في طبعته المعدلة ضمن سلسلة الكتب الدراسية التي تم تعديلها وتنقيحها في عدد من صنوف المراحلين الأساسية والثانوية لتحسين وتجويد الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، اعتماداً على العديد من المصادر أهمها: الملاحظات الميدانية، والمراجعات المكتبية لتلقي أوجه القصور، وتحديث المعلومات وبما يناسب مع قدرات المتعلم ومستواه العمري، وتحقيق الترابط بين المواد الدراسية المقررة، فضلاً عن إعادة تصميم الكتاب فنياً وجعله عنصراً مشوقاً وجذاباً للمتعلم وخصوصاً تلاميذ الصنوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

ويعد هذا الإنجاز خطوة أولى ضمن مشروعنا التطوري المستمر للمناهج الدراسية ستتبعها خطوات أكثر شمولية في الأعوام القادمة، وقد تم تفزيذ ذلك بفضل الجهد الكبير التي بذلها مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة التربية والتعليم والجامعات من الذين أنضجتهم التجربة وصقلهم الميدان برعاية كاملة من قيادة الوزارة والجهات المختصة فيها.

ونؤكد أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى عن السير بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير الجيل وتسلیحه بالعلم وبناء شخصيته المتزنة والمتكاملة القادرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن اليمني الحديث والتعامل الإيجابي مع كافة التطورات العصرية المتسارعة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

أ.د. عبدالرازاق يحيى الأشول
وزير التربية والتعليم
رئيس اللجنة العليا للمناهج



سبع لغز لمحك

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على خاتم النبيين ، وآلها وصحبه أجمعين .
لقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي وفق أسس علمية وتربوية . . . ويأتي كتاب الرياضيات للصف السابع في موكب هذا التطوير .

وفي هذا الكتاب يجد أبناءنا الطلبة مادة الرياضيات معروضة لهم بأساليب وقوالب جديدة تساعدهم على سرعة الفهم والاستيعاب ، وتسهل لهم التعامل مع المادة وتحفظهم على حبها ، كما تتنمي فيهم القدرات التفكيرية الثقافة العلمية المنشورة .

إن الكتاب غنى بالشرح والأمثلة إلى جانب الأنشطة والتدريب لكل درس ، والتمارين العامة لكل وحدة دراسية ؛ ولذا على أبناءنا الطلبة بذل أقصى جهودهم والاستفادة من توجيهات المدرسين ، والدراسة المتمعنة للمادة المقدمة وتتبعها بدقة وحل أكبر قدر من التمارين والمسائل ؛ وهذا من شأنه ترسیخ المعرفة الرياضية في أذهانهم وإكسابهم المهارات الكافية للاستمرار في التعلم .

وفي هذا الكتاب نقدم لأبناءنا الطلبة مادة الرياضيات بدقة علمية مع مراعاة جوانبها التربوية ، ولذا تضمنت وحدات الكتاب تعاريف رياضية دقيقة ولكنها مبسطة ، واحتوت على برهنة رياضية ولكنها متدرجة . وترتبط المواضيع في بناء منطقي متسلسل يساعد أبناءنا على التقدم الراسخ في تعلم المادة .

كل ذلك قدمناه بلغة مبسطة مشوقة ، مدرومة بالأشكال والتوضيحات الكافية ترغيباً لهم في المادة ، وعلى طريق تحقيق الطموح العلمي المنشود .

كما عليك عزيزي المعلم / المعلمة تدريس موضوعات الجبر والهندسة بشكل متوازي من بداية العام الدراسي بما يحقق التكامل بين الموضوعات .
والله من وراء القصد ، وهو ولي التوفيق .

المؤلفون

المحتويات

الموضوع

الصفحة

الوحدة الأولى : المجموعة والعنصر

٩	١ - المجموعة والعنصر
١٣	٢ - طرق كتابة المجموعة وتمثيلها
١٧	٣ - المجموعة المنتهية والمجموعة غير المنتهية
٢٠	٤ - تساوي المجموعات
٢٣	٥ - المجموعة الجزئية
٢٦	٦ - تقاطع مجموعتين
٢٩	٧ - اتحاد مجموعتين
٣٢	٨ - الزوج المرتب
٣٤	٩ - حاصل ضرب مجموعتين
٣٧	١٠ - العلاقات
٤٣	١١ - تمارين عامة
٤٦	١٢ - اختبار الوحدة

الوحدة الثانية : مجموعة الأعداد الصحيحة

٤٧	١ - مجموعة الأعداد الطبيعية
٥٢	٢ - مجموعة الأعداد الصحيحة
٥٦	٣ - مقارنة الأعداد الصحيحة
٥٩	٤ - جمع الأعداد الصحيحة
٦٣	٥ - طرح الأعداد الصحيحة
٦٦	٦ - ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة
٧١	٧ - خواص العمليات على الأعداد الصحيحة
٧٨	٨ - الأسس (القوى)
٨٢	٩ - تمارين عامة
٨٤	١٠ - اختبار الوحدة



تابع المحتويات

الصفحة

الموضوع

الوحدة الثالثة : الحدود الجبرية

٨٥	١ - الحدود الجبرية
٩١	٢ - جمع الحدود الجبرية المتشابهة
٩٥	٣ - طرح الحدود الجبرية المتشابهة
٩٨	٤ - ضرب الحدود الجبرية
١٠٣	٥ - قسمة الحدود الجبرية
١٠٧	٦ - المقدار الجيري
١١٠	٧ - جمع المقادير الجبرية
١١٤	٨ - طرح المقادير الجبرية
١١٩	٩ - تمارين ومسائل عامة
١٢١	١٠ - اختبار الوحدة

الوحدة الرابعة : المعادلات والمتراجحات

١٢٢	٤ - الجملة المفتوحة
١٢٥	٤ - المعادلة
١٣٠	٤ - معادلة الدرجة الأولى في متغير واحد
١٣٥	٤ - مسائل تطبيقية
١٤١	٤ - المتراجحات
١٤٣	٤ - حل المتراجحات من الدرجة الأولى في متغير واحد
١٤٧	٤ - تمارين عامة ومسائل
١٤٩	٤ - اختبار الوحدة

تابع المحتويات

الصفحة

الموضوع

الوحدة الخامسة : الهندسة

١٥٠	أنواع الزوايا	١ - ٥
١٥٥	العلاقة بين الزوايا	٢ - ٥
١٦١	الزوايا المتقابلة بالرأس	٣ - ٥
١٦٧	المستقيمات المتوازية	٤ - ٥
١٧٠	الزوايا المتبادلة والزوايا المتناظرة والزوايا الداخلية	٥ - ٥
١٨٢	زوايا المثلث	٦ - ٥
١٨٧	تطابق المثلثات	٧ - ٥
١٨٨	الحالة الأولى : تطابق الأضلاع الثلاثة	
١٩٣	الحالة الثانية : تطابق ضلعين والزاوية المحسورة	
١٩٧	الحالة الثالثة : تطابق زاويتين وضلع	
٢٠١	الحالة الرابعة : تطابق وتر وضلع في مثلث قائم الزاوية	
٢٠٥	نظام الإحداثيات	٨ - ٥
٢١٤	الانعكاس	٩ - ٥
٢٢٠	تمارين ومسائل عامة	١٠ - ٥
٢٢٤	اختبار الوحدة	١١ - ٥

الوحدة السادسة : القياس

٢٢٦	المضلعات	٦ - ١
-----	----------	-------



تابع المحتويات

الصفحة

الموضوع

٢٣١	قياسات الزوايا الداخلية للمضلع التوسي	٦ - ٢
٢٣٦	متوازي المستطيلات	٦ - ٣
٢٣٩	المنشور	٦ - ٤
٢٤٢	الاسطوانة	٦ - ٥
٢٤٦	حجم الهرم	٦ - ٦
٢٤٩	حجم المخروط	٦ - ٧
٢٥٣	تمارين ومسائل عامة	٦ - ٨
٢٥٤	اختبار الوحدة	٦ - ٩


الوحدة السابعة : الإحصاء

٢٥٥	تبويب وتنظيم البيانات الإحصائية	٧ - ١
٢٥٩	التمثيل البياني لبيانات إحصائية	٧ - ٢
٢٦٤	المتوسط الحسابي	٧ - ٣
٢٦٨	تمارين عامة ومسائل	٧ - ٤
٢٧٠	اختبار الوحدة	٧ - ٥

الوحدة الأولى

المجموعات والعلاقات

١ : المجموعة والعنصر



تأمل الكلمات التي تحتها خط في الجمل التالية:
احتفلت أسرتي بنجاحي إلى الصيف السابع .

هل شاهدت سرباً من الطائرات؟
ترعى أم سلمى قطيعاً من الأغنام في مزرعتها.
تلاحظ أنَّ كلاً منها يدل على تجمُّع من الأشياء. هذا التجمُّع يطلق عليه بالمفهوم الرياضي لفظ "مجموعة".
كلمة "أسرة" تدل على مجموعة من الأفراد.

وكلمة "سرب" تدل على مجموعة من الطائرات .
وتدل كلمة "قطيع" على مجموعة من الأغنام .

فلفظ "مجموعة" يدل على تجمُّع من الأشياء سواء كانت هذه الأشياء أفراداً أو طائرات أو أغنام ... إلخ، بشرط أن تكون هذه الأشياء محددة تحديداً تماماً.

والأشياء التي تتكون منها المجموعة تسمى "عناصر" ؛ فمثلاً: مجموعة الخلفاء الراشدين عناصرها: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. وعناصر مجموعة ألوان علم الجمهورية اليمنية هي: الأحمر، الأبيض، الأسود.

تدريب (١)

اذكر عناصر مجموعة أرقام العدد ٩٤٥
وإذا كان التجمع من أشياء غير محددة تحديداً تماماً فلا يصح أن نطلق عليه لفظ "مجموعة" ؛ فمثلاً:
"الأشجار الجميلة" تجمع لا يدل على مجموعة ، لأن صفة الجمال تختلف من شخص إلى آخر فتصبح غير محددة .

ولا تمثل "التمارين الصعبة في هذا الكتاب" مجموعة ، لأنها تختلف في درجة صعوبتها من طالب آخر ؛ فالتمرين الصعب لدى زميلك قد لا يكون صعباً لدريك .

تدريب (٢)

اذكر عناصر كلٌّ من المجموعات التالية :

- ا) مجموعة أسماء الطلبة في فصلك الذين تبدأ أسماؤهم بحرف ع
هل اسمك عنصر في هذه المجموعة؟
ب) مجموعة المواد الدراسية التي تتعلمتها هذا العام .

الانتفاء :

تعلمت أن عناصر مجموعة أرقام العدد ٢٧٤ هي ٤ ، ٧ ، ٢ هي
تلاحظ أن الرقم ٤ عنصراً من عناصر هذه المجموعة، فنقول إنَّ :

٤ ينتمي إلى مجموعة أرقام العدد ٢٧٤
ونكتب ذلك رمياً ٤ ⊂ مجموعة أرقام العدد ٢٧٤ ،
فالرمز (⊂) يعبر عن الانتفاء ، ويقرأ «ينتمي إلى» .

بينما الرقم ٨ ليس عنصراً من عناصر هذه المجموعة فنقول إنَّ :

٨ لا ينتمي إلى مجموعة أرقام العدد ٢٧٤

ونكتب ذلك رمزاً ٨ ≠ مجموعة أرقام العدد ٢٧٤

فالرمز (≠) يعبر عن عدم الانتفاء ويقرأ (لا ينتمي إلى).

فمثلاً: اليمن ∈ مجموعة الدول العربية ، بينما الصين ≠ مجموعة الدول العربية .

تدريب (٣)

اذكر عنصراً ينتمي إلى مجموعة حروف كلمة "الرياضيات" وآخر لا ينتمي .

ćمارين وسائل

[١] أي العبارات التالية تدل على مجموعة ، وأياً منها لا تدل على مجموعة؟ :

- أ) الأعداد الطبيعية التي على وجه الساعة . ب) الطلبة الأذكياء في فصلك .
ج) الرجال الشجعان . د) الحروف التي تكون كلمة " تعز " .

[٢] اذكر عناصر المجموعات التالية :

أ) مجموعة أرقام العدد ١٤٧٣ ب) مجموعة حروف كلمة " مُسلم " .

ج) مجموعة أيام الأسبوع . د) مجموعة الصلوات الخمس .


[٣] اكتب خمسة عناصر من مجموعة الحروف الأبجدية .

ب) اكتب أربعة عناصر من مجموعة الحافظات اليمنية .

ج) اكتب ثلاثة عناصر من مجموعة أشهر السنة الهجرية .

[٤] اكتب عناصر مجموعة الكسور التي بسط كل منها (٣) ومقاماتها

الأعداد الطبيعية من ٥ إلى ٩ .



[٥] اكتب عناصر مجموعة رؤوس الشكل (١-١).

[٦] اكتب أسماء الأشكال الهندسية التالية في الشكل (٢-١). هل تمثل هذه الأشكال مجموعة؟

[٧] ضع علامة (✓) أو (✗) في لتحصل على عبارة صحيحة فيما يلي :


- ١) صعدة ⊆ مجموعة محافظات الجمهورية اليمنية .
- ٢) ٨ ∈ مجموعة الأعداد الزوجية .
- ٣) ١٩ ∉ مجموعة الأعداد الأولية .
- ٤) الشرق ⊆ مجموعة الجهات الأربع الأصلية .

[٨] ضع الرمز ⊆ أو الرمز ⊇ في لتحصل على عبارة صحيحة في كل مما يلي :

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| مجموعة الأعداد الفردية . | <input type="checkbox"/> | ١٧ |
| مجموعة الأشهر الميلادية . | <input type="checkbox"/> | رمضان |
| مجموعة الحروف الهجائية . | <input type="checkbox"/> | س |
| مجموعة أرقام العدد ٣٥٥٢٤ | <input type="checkbox"/> | ٣٥٥ |

- [٩] اذكر ثلاثة عناصر تنتهي إلى مجموعة الأعداد الزوجية .
ب) اذكر عنصراً ينتمي إلى مجموعة حروف كلمة "خديجة" ، وآخر لا ينتمي .

[١٠] انظر إلى الشكل (١-٣) جانباً، ثم ضع علامة (✓) أو (✗) في لتحصل على عبارة صحيحة فيما يلي :



شكل (١-٣)

- | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|
| <input type="checkbox"/> | م | ⇒ | أ ب |
| <input type="checkbox"/> | ج | ⇒ | أ ب |
| <input type="checkbox"/> | ب | ≠ | أ ب |

[١١] إذا كانت م هي مجموعة مضاعفات العدد ٣ المخصوصة بين ٣ ، ٢٥

ضع في أحد الرموزين ⇒ أو ≠ لتصبح العبارة صحيحة في كل مما يلي :

- | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|--------|
| أ) ٦ | <input type="checkbox"/> | م | <input type="checkbox"/> | ٩٦ | <input type="checkbox"/> | ج) ٢٥ |
| د) ١٣ | <input type="checkbox"/> | م | <input type="checkbox"/> | ١٨ | <input type="checkbox"/> | ه) ٠ |

١ : طرق كتابة المجموعة وتمثيلها

١) طرق كتابة المجموعة :

غالباً ما تستخدم الحروف الهجائية لترميز للمجموعة، فيرمز للمجموعة عادة بأحد الحروف الكبيرة : سه ، صه ، مع ، د ، ل ، ... ؛ كما يرمز للعنصر بأحد الحروف الصغيرة : أ ، ب ، ج ، ي ، س ، ص ، { }....؛ حيث نكتب جميع عناصر المجموعة داخل حاصل حاصلتين بالشكل { }

(تسمى الحاصلتين) ، ونضع فاصلة (،) بين كل عنصر وآخر؛ فمثلاً :

إذا رمزنا لمجموعة الأعداد الفردية الأصغر من ٩ بالرمز سه ؛ فنكتب :

سه = { ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ }. لاحظ أننا كتبنا العناصر بدون ترتيب .

وإذا كانت ص هي مجموعة حروف كلمة "مسلسل" ؛ فنكتب :

صه = { م ، س ، ل }. لاحظ أننا لم نكر الحرفين س ، ل .

وتسمى هذه الطريقة كتابة المجموعة " **بطريقة السرد**" أو بذكر عناصرها .

وبشكل عام ، عندما نكتب المجموعة بطريقة السرد ، فإننا :

- ١ - نكتب جميع العناصر داخل الحاصلتين { } .
- ٢ - نضع فاصلة (،) بين كل عنصر وآخر.
- ٣ - نكتب كل عنصر مرة واحدة دون تكرار .
- ٤ - نكتب العناصر دون مراعاة لترتيبها .

مثال (١)

اكتب المجموعات التالية بطريقة السرد :

- أ) سه هي مجموعة حروف كلمة "بلبل"
ب) مع هي مجموعة أرقام العدد ٦٥٧٧

الحل:

- أ) سه = { ب ، ل } بدون تكرار العنصرين ب ، ل
ب) مع = { ٦ ، ٥ ، ٧ } بدون تكرار الرقم ٧ ، بأي ترتيب نراه .

أحياناً نجد مجموعات من السهل معرفة الصفة التي تحدد عناصرها تحديداً واضحاً وتميزها عن غيرها .

فإذا كان لدينا المجموعة سه = { الصيف ، الشتاء ، الخريف ، الربيع } ،
تلاحظ أنها كتبت بطريقة السرد أي بذكر عناصرها ، كما تلاحظ أن كل عنصر
في المجموعة سه فصل من فصول السنة ، ولا توجد فصول أخرى للسنة .

لذا يمكن كتابة المجموعة سه بطريقة أخرى كالتالي :

سه هي مجموعة فصول السنة .

وتسمى هذه الطريقة : كتابة المجموعة بذكر « **الصفة المميزة** » للمجموعة .

مثال (٢)

اكتب المجموعات التالية بطريقة ذكر الصفة المميزة :

$$\text{أ) } \text{ص} = \{ \text{أبو بكر ، عمر ، عثمان ، علي} \}$$

$$\text{ب) } \text{ل} = \{ ٥، ٣، ٢ \}$$

الحل :

أ) ص هي مجموعة الخلفاء الراشدين

ب) ل هي مجموعة أرقام العدد ٥٣٢

وهنالك إجابات أخرى للفقرة (ب) مثل :


ل هي مجموعة الأعداد الأولية الأصغر من ٧ ،

ل هي مجموعة أرقام العدد ٢٣٥ ... وهكذا

تدريب (١)

أ) اكتب بطريقة السرد مجموعة الأعداد الأولية التي تقع بين ٢٠ ، ١٣

ب) اكتب بطريقة الصفة المميزة المجموعة ص = { ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠ }

ب) تمثيل المجموعة بأشكال فن :

شكل (٤-١)

الأعداد المبينة في الشكل (٤-١) هي :

٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ فإذا أردنا تمييز مجموعة

الأعداد الزوجية من بين الأعداد

المكتوبة، نرسم منحنى مغلق تقع

هذه الأعداد الزوجية بداخله ، بحيث إن كل عنصر داخل هذا المنحنى ينتمي إلى المجموعة وكل عنصر يقع خارج هذا المنحنى لا ينتمي إلى المجموعة . وهذا المنحنى أو أي شكل مغلق يسمى شكل فن نسبة للعالم الرياضي فن .

مثال (٣)

مثل المجموعات التالية بأشكال قن :


$$\{ م = \{ ١١, ٩, ٧ \} .$$

الحل :


$$\{ م تمثل = \{ ١١, ٩, ٧ \} \text{ بالشكل (٥-١) :}$$



شكل (٥-١)



شكل (٦-١)



شكل (٧-١)

تدريب (٢)

١) مثل بشكل قن مجموعة أرقام العدد ٧٢٧٢ .

٢) اكتب بطريقة السرد المجموعة صه التي يمثلها

الشكل (٧-١)

تمارين ومسائل


[١] اكتب المجموعات التالية بطريقة السرد :

أ) سه هي مجموعة حروف كلمة « شمام » .

ب) صه هي مجموعة أرقام العدد ٤٧٤٧٥ .

ج) لـ هي مجموعة المستقيمات التي تمر

بالنقطة ن في الشكل (٨-١) :



شكل (٨-١)

[٢] اكتب المجموعات التالية بذكر الصفة المميزة :

أ) ل = {اللمس ، التذوق ، الشم ، السمع ، البصر}

ب) م = {٢٠، ١٨، ١٦، ١٤، ١٢}

ج) ن = {شمال ، جنوب ، شرق ، غرب}


د) د = {م ، د ، ر ، س ، ة}

[٣] مثل المجموعات التالية بأشكال فن :

أ) سه = {ا ، ب ، ج ، د} ب) صه = {٠ ، ٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٠}

ج) ن = {○ ، □ ، Δ} د) ل = {خالد ، سعد ، أبو عبيدة}

[٤] اكتب بطريقة السرد المجموعات المرسومة في الشكل (١-٩) التالي :



١ : ٣ المجموعات المنتهية والمجموعات غير المنتهية

إذا كانت سه هي الأعداد الأصغر من ٥ ، فإننا نكتب :

سه = {٤، ٣، ٢، ١، ٠} ، وهي «مجموعة متميزة» .

أما إذا كانت صه هي مجموعة الأعداد الأكبر من ٥ ، فإننا نكتب :

صه = {...، ٦، ٧، ٨} .

تلحظ عدم قدرتنا على تحديد عدد عناصر المجموعة صه ، ولذا نكتفي بوضع ثلاثة نقاط لتعني أن هناك أعداداً أخرى تتبع هذه المجموعة . ولذا نسمى هذه المجموعة «مجموعة غير متميزة» .

مثلاً: مجموعة الحروف الهجائية = {أ ، ب ، ت ، ... ، ي} مجموعة متئية، لأننا نستطيع حصر عدد عناصرها؛ بينما مجموعة مضاعفات العدد ٧ = {٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ...} مجموعة غير متئية، لأننا لا نستطيع تحديد عدد عناصرها .

المجموعة التي يمكن تحديد عدد عناصرها تسمى مجموعة متئية أما المجموعة التي لا يمكن تحديد عدد عناصرها تسمى مجموعة غير متئية.

بَيْنَ أَيِّ الْمَجْمُوعَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ مَنْتَهِيَةٌ وَأَيِّهِمَا غَيْرُ مَنْتَهِيَةٌ؟

مثال

(١) مجموعة دول العالم . (٢) مجموعة الأعداد الفردية .

الحل: (١) مجموعة دول العالم مجموعة متئية، لأن عدد هذه الدول

ممكن حصره .

(٢) مجموعة الأعداد الفردية = {١ ، ٣ ، ٥ ، ...}، وهي

مجموعة غير متئية لأنه لا يمكن تحديد عدد عناصرها .

المجموعة الحالية :

تأمل المجموعات التالية:

ان مجموعة حروف كلمة " سميرة "

صه مجموعة الأعداد الزوجية الأكبر من ٢

بع مجموعة طلبة فصلك الذين تقل أعمارهم عن ٧ سنوات

فالمجموعة ان = {س ، م ، ي ، ر ، ة} ، وهي مجموعة متئية ؟

والمجموعة صه = {٤ ، ٦ ، ٨ ، ...} ، وهي مجموعة غير متئية ؟

أما المجموعة M فلا يمكن تحديد أي عنصر فيها ، إذ لا يوجد طالب في فصلك عمره أقل من 7 سنوات . ومثل هذه المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر تسمى « **مجموعة خالية** »، ويرمز لها بالرمز \emptyset (ويقرأ فاي) . أي أن $M = \emptyset$ أو $M = \{\}$

فمثلاً : (١) مجموعة الدول العربية التي تقع في قارة أستراليا مجموعة خالية ، إذ لا توجد دولة عربية في قارة أستراليا .

(٢) مجموعة الأعداد الفردية التي تقبل القسمة على ٤ مجموعة خالية .

المجموعة الخالية هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر ويرمز لها بالرمز " \emptyset " (ويقرأ فاي) .

ćمارين وسائل

[١] بين أي المجموعات الآتية منتهية وأيها غير منتهية :

أ) مجموعة سور القرآن الكريم

ب) مجموعة الأعداد الأكبر من ١٠٠٠

ج) مجموعة أشجار النخيل في اليمن

د) $M = \{40, 42, 44, \dots\}$

[٢] أي المجموعات التالية تكون مجموعة خالية :

أ) مجموعة المثلثات ذات الأضلاع الأربع

ب) مجموعة الأعداد الزوجية الأصغر من ٣٥

ج) مجموعة الطلبة في فصلك الذين تزيد أعمارهم عن ٢٥ سنة

د) مجموعة الأعداد الفردية التي تقبل القسمة على ٢

ه) مجموعة الأعداد الأولية المحسورة بين ٥ ، ٩

[٣] اكتب المجموعات الآتية بطريقة السرد، ثم بين أيها متممة وأيها غير متممة:

أ) مجموعة أرقام العدد ٢٢٥٥

ب) مجموعة الأعداد الطبيعية التي تقبل القسمة على ٢

ج) مجموعة مضاعفات العدد ٥

[٤] ضع علامة (✓) أو (✗) في لتحصل على عبارة صحيحة فيما يلي :

أ) مجموعة الكتب في مكتبة مدرستك متممة متممة

ب) مجموعة عوامل العدد ٣٦ متممة متممة

ج) مجموعة مضاعفات العدد ٣ التي تقل عن ٣٠ متممة غير متممة

د) مجموعة الأعداد الطبيعية الأصغر من صفر متممة خالية

هـ) مجموعة الأعداد الطبيعية الأكبر من ٩٠ متممة غير متممة

[٥] حدد المجموعة غير المتممة فيما يلي مع ذكر السبب :

أ) مجموعة موانئ الجمهورية اليمنية .

ب) مجموعة الدول العربية في قارة آسيا .

ج) مجموعة الأعداد الزوجية الأكبر من ١٦

١ : ٤ تساوي المجموعات

لتكن L هي مجموعة أرقام العدد 3735 ؛ أي أن $L = \{5, 3, 7, 3\}$

ولتكن M هي مجموعة الأعداد الفردية المحسوبة بين $2, 9$ ،

أي أن $M = \{3, 5, 7\}$

تلاحظ أن: كل عنصر في المجموعة L ينتمي إلى المجموعة M وكل عنصر في المجموعة M ينتمي إلى المجموعة L ، أي أن المجموعتين L, M لهما نفس العناصر .

نقول إن \in لـ M مجموعتان متساويتان .

$$\{7, 5, 3\} = \{7, 3, 5\} \therefore$$

$S = C$ إذا كان كل عنصر في S ينتمي إلى C هـ وكل عنصر في C ينتمي إلى S هـ

مثال (١) إذا كانت $S = \{1, 2, 3\}$ ، $C = \{3, 2, 1\}$ ، هل $S = C$ ؟ ولماذا؟

الحل: $S \neq C$ ، لأن $3 \not\in C$ ، $3 \in S$

مثال (٢) $\{1, 5, 6, 6\} \neq \{1, 5, 6\}$ ، لماذا؟

ب) اكتب مجموعة تساوي $\{1, b\}$

الحل:

أ) $\{1, 5, 6, 6\} \neq \{1, 5, 6\}$ ، لأن $1 \in \{1, 5, 6, 6\}$

ب) $\{1, b\} = \{b, 1\}$

ćمارين ومسائل

[١] ضع أحد الرمزين = أو \neq في \bigcirc ، لتحصل على عبارة صحيحة ،

واذكر السبب :

أ) $\{M, N\} \bigcirc \{N, M\}$

ب) $\{10, 9, 11\} \bigcirc \{11, 10, 9\}$

ج) $\{2, 1\} \bigcirc \{21\}$

د) $\{\aleph, \beth\} \bigcirc$ مجموعة حروف كلمة " عدد " .

[٢] $\{2, 3, 4\} \neq \{4, 3, 2\}$ ؟ لماذا؟

[٣] إذا كانت س = {ا، ب، ج، د، هـ، ص} ، هـ = {هـ، د، ج، ب، ا} ،

هل س = ص؟ اذكر السبب.

[٤] لتكن: م = مجموعة أرقام العدد ٢٨٤٧٩٧

ن = مجموعة أرقام العدد ٧٩٤٢٩٨

أ) اكتب كلاً من م ، ن بطريقة السرد.

ب) هل م = ن؟ اذكر السبب.

[٥] أكمل العناصر في المجموعات التالية لتحصل على عبارات صحيحة:

$$أ) \{19, 21, 22, \dots\} = \{19, 22, \dots\}$$

$$ب) \{ا، ب، ج\} = \{\dots، ج، \dots\}$$

$$ج) \{\bigcirc, \dots, \Delta\} = \{\Delta, *, \dots\}$$

$$د) \{ا، ٥، \dots\} = \{ا، ١، \dots\}$$

هـ) مجموعة حروف كلمة "علم" = {م، \dots، ل}

[٦] إذا كانت س = مجموعة أرقام العدد ٢٢٢ ، عين أي المجموعات التالية

تساوي س:

$$أ) \{2\} \quad ب) \{200, 22\} \quad ج) \{200, 20, 2\}$$

[٧] إذا كانت ن = مجموعة حروف كلمة "حامد" ، اكتب مجموعة

تساوي هذه المجموعة.

المجموعة الجزئية

١ : ٥


تأمل المجموعتين : $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $C = \{1, 2, 3, 5\}$:

تلاحظ أن : $1 \in S$ ، $1 \in C$

$2 \in S$ ، $2 \in C$

$3 \in S$ ، $3 \in C$

إذاً كل عنصر في S ينتمي أيضاً إلى C . تسمى المجموعة S مجموعة جزئية من C . ونرمز لذلك بالرمز : $S \subset C$



شكل (١٠ - ١)

وتقرأ « S مجموعة جزئية من C »
أو « S محتواه في C »

كما هو موضح في الشكل (١٠ - ١)
ومن أمثلة ذلك مايلي :

(١) مجموعة الطلبة في فصلك تعتبر مجموعة جزئية من مجموعة طلبة مدرستك ، لأن كل طالب في فصلك أيضاً طالب في المدرسة.

(٢) مجموعة سكان محافظة حضرموت مجموعة جزئية من مجموعة سكان الجمهورية اليمنية . لماذا ؟

لأي مجموعتين S ، C إذا كان كل عنصر في S ينتمي إلى C
 فإن " S مجموعة جزئية من C " أو " S محتواه في C "
 ونكتب ذلك رمزاً : $S \subset C$

وإذا تأملنا المجموعتين S ، C مرة أخرى ،
 تلاحظ أن العنصر $4 \in S$ ، فهل $4 \in C$ ؟

نقول إنَّ : صه ليست مجموعة جزئية من سه ، ونكتب " صه $\not\in$ سه " وتقراً **صه ليست مجموعة جزئية من سه** أو " صه ليست محتواه في سه " إذا وجد على الأقل عنصر واحد ينتمي إلى مجموعة (مثل صه) ولا ينتمي إلى مجموعة أخرى (مثل سه) نقول إنَّ « صه ليست مجموعة جزئية من سه »

إذا كانت ل = {م ، د ، ر ، س ، ة} ،

مثال

صه = {م ، د ، ر ، س} ، مع = {م ، ا ، ر ، س}

ضع في \square أحد الرموز \subset ، $\not\in$ لتصبح العبارة صحيحة مع ذكر السبب :

(١) صه \square ل (٢) صه \square مع (٣) مع \square ل

الحل:

(١) صه \subset ل ، لأن كل عنصر في صه ينتمي إلى ل

(٢) صه $\not\in$ مع ، لأن د \in صه بينما د $\not\in$ مع

(٣) مع \subset ل ، لأن ا \in مع بينما ا $\not\in$ ل

ćمارين ومسائل

[١] ضع علامة (✓) أو (✗) في \square لتحصل على عبارة صحيحة فيما يلي :

أ) $\square \subset \{7, 5, 3, 7\}$

ب) $\square \subset \{18\}$

ج) $\square \not\subset \{ا، ب، ج، د\}$

د) $\square \subset \{71\}$

[٢] إذا كانت سه = {ا، ب} ، صه = {ج، د} ،
 دع = {ا، ب، ج، د، ه}

أ) هل صه ⊂ سه؟ ولماذا؟ ب) هل سه ⊂ دع؟ ولماذا؟

[٣] ضع أحد الرمزيين ⊂ ، ⊇ في لتتصبح العبارة صحيحة:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| أ) {٥} <input type="text"/> | {٩،٥} |
| ب) {٦٤} <input type="text"/> | {٦،٤} |
| ج) {٣٥،٣٠} <input type="text"/> | {٣٠} |
| د) {٤،٥،٧} <input type="text"/> | {٧٥،٥،٧،٤} |

[٤] إذا كانت سه = {٥، ٧، ٩، ١١، ١٣، ١٥} ، عِين أي المجموعات الآتية مجموعة جزئية من سه ، وأيها ليست مجموعة جزئية من سه مع ذكر السبب :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| أ) {١٥، ١١، ٥} <input type="text"/> | {٩٧٥} <input type="text"/> |
| ب) {١٢، ٩} <input type="text"/> | هـ) {٥، ٣، ١} <input type="text"/> |
| ج) {١١} <input type="text"/> | و) مجموعة أرقام العدد ٥٩٩ <input type="text"/> |

[٥] ما العدد الذي يحل محل العنصر ل تكون كل من العبارات الآتية صحيحة؟

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| أ) {٥، ٢} <input type="text"/> | {٤، ٢} <input type="text"/> | ص) {٥} <input type="text"/> |
| ب) {١، ص} <input type="text"/> | {١، ٩} <input type="text"/> | |
| ج) {٥، ٣، ٢، ٧} <input type="text"/> | {٣، ٢، ص} <input type="text"/> | |
| د) {ص} <input type="text"/> | {٨، ٦، ٢} <input type="text"/> | |

[٦] لتكن : ل = {ا، ب، ج} ؛


اكتب ثلاث مجموعات جزئية من ل كل منها مكون من عنصرين .

٦ : تقاطع مجموعتين

سبق أن درست عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة على الأعداد الطبيعية . وهنالك توجد عمليات على المجموعات ، سندرس منها عمليتين ، هما : التقاطع والاتحاد ، ونببدأ في هذا الدرس بعملية التقاطع .

لتكن $S_h = \{ علی ، حسین ، احمد ، سالم \}$ ، وهي مجموعة الطلبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الرياضيات في اختبار الفصل الأول . ولتكن $S_c = \{ احمد ، صالح ، سالم ، عادل \}$ ، وهي مجموعة الطلبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية في مادة القرآن في الفصل الأول أيضاً .

تلاحظ أن أَحمد ، سالم حصلا على الدرجة النهائية في مادتي الرياضيات والقرآن معاً .



شكل (١١ - ١)

وإذا تأملت الشكل (١ - ١١) المرسوم جانباً تلاحظ أن هناك مجموعة مشتركة بين المجموعتين

S_h ، S_c ، نسميها « مجموعـة التقاطـع » .

نقول إنَّ المجموعـة $\{ احمد ، سالم \}$ مجموعـة تقاطـع المجموعـتين S_h ، S_c

ونكتب رمـزاً $(S_h \cap S_c)$ وتقرأ " S_h تقاطـع S_c "

إذن $S_h \cap S_c = \{ احمد ، سالم \}$

تقاطـع مجموعـتين S_h و S_c هي مجموعـة كل العناصر التي تنتـمـي إـلـى S_h و تنتـمـي إـلـى S_c فـي آن واحـد . ونرمـز لـهـا بالرمـز " $S_h \cap S_c$ " و تـقـرـأ " S_h تقـاطـع S_c "


مثال

(١) إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، $B = \{1, 3, 4\}$.

فأوجد $A \cap B$ ، ومثل ذلك بشكل فن .

(٢) إذا كانت $S = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ ، $C = \{3, 4\}$ ؛ فأوجد

$S \cap C$ ، ومثل ذلك بشكل فن .



شكل (١٢-١)

الحل:


$$(1) A \cap B = \{3, 4\}$$

ويمثل الجزء المظلل في الشكل (١٢-١)

(٢) تلاحظ أن المجموعتين S ، C ، لا توجد بينهما عناصر مشتركة

$$\text{أي أن: } S \cap C = \emptyset$$

والشكل (١٣-١) يمثل $S \cap C$



شكل (١٣-١)

[١] أوجد $A \cap B$ في كل مما يلي، ثم مثل ذلك بشكل فن :


$$\text{أولاً: } A = \{4, 5, 6, 3\} , B = \{7, 5, 3\}$$

$$\text{ثانياً: } A = \{م، هـ، جـ\} , B = \{هـ، مـ، نـ\}$$


ثالثاً: $A = \{مـ، نـ، سـ\}$ ، B مجموعة حروف كلمة "سمية"

رابعاً: $A = \{2, 4, 6\}$ ، B مجموعة الأعداد الطبيعية الأصغر من ٧

[٢] في كل من الشكلين (١٤ - ١) ، (١٥ - ١) التاليين ظلل المنطقة التي تمثل $\cap S$:




[٣] اكتب ما يمثله الجزء المظلل في كل من الشكلين (١٦ - ١) ، (١٧ - ١) التاليين :




[٤] لتكن S هي مجموعة أرقام العدد ٧٨٩٧٨٤ ص هي مجموعة الأعداد الطبيعية المحسورة بين ٣ ، ١٠ اكتب S ، $S \cap M$ بطريقة السرد، ثم أوجد $S \cap M$

[٥] باستخدام الشكل (١٨ - ١) المرسوم أدناه اكتب بطريقة السرد كلاً مما يلي :



[٦] إذا كانت $S = \{ا، ب، ج، د\}$
 $S = \{م، ن، ج\}$. ص = {و، ه، م}
 اكتب على الشكل (١٩ - ١) عناصر كل من المجموعات S ، $S \cap M$ مع السابقة :




١ : اتحاد مجموعتين

درست في الدرس السابق عملية التقاطع على مجموعتين .

إذا كانت $S = \{1, 3, 5\}$ ، $C = \{2, 3, 5\}$ ، فإن

$S \cap C = \{3, 5\}$ ، وهي مجموعة العناصر المشتركة بين المجموعتين S ، C أما إذا ضمت عناصر المجموعة C إلى عناصر المجموعة S دون تكرار نتجت مجموعة جديدة هي $\{1, 2, 3, 5\}$ تسمى **الاتحاد** .



شكل (٢٠ - ١)

تأمل الشكل (١ - ٢٠) ماذا تلاحظ .

أنَّ الشكل يوضح اتحاد المجموعتين S ، C المجموعة $\{1, 2, 3, 5\}$ هي اتحاد المجموعتين S ، C ، و تكتب رمزيًا " $S \cup C$ "

" $S \cup C$ " وتقرأ "س اتحاد ص"

أي أن: $S \cup C = \{1, 2, 3, 5\}$

وبشكل عام:

الاتحاد مجموعتين S ، C هي مجموعة كل العناصر التي تنتمي إلى S أو تنتمي إلى C أو إلى كليهما . ويرمز لها بالرمز " $S \cup C$ " وتقرأ "س اتحاد ص"

مثال


أوجدل $L \cup M$ لكل مما يأتي ثم مثل ذلك بشكل فن :

$$ا) L = \{7, 8, 9\} , M = \{7, 8, 11\}$$

$$ب) L = \{ن، ه، ي، ج، ب، أ\}$$

الحل:


$$ا) L \cup M = \{11, 9, 8, 7\} = \{8, 11, 7\} \cup \{9, 8, 7\}$$



في الشكل (٢١-١) المرسوم جانباً

 المنطقة المظللة تمثل $L \cup M$

$$ب) L \cup M = \{ا, ب, ج\} \cup \{ي, ه, ن\}$$



$$\{ا, ب, ج, ي, ه, ن\} =$$

 في الشكل (٢٢-١) المنطقة المظللة تمثل $L \cup M$

تمارين ومسائل

[١] أوجد سه L صه ثم مثّلها بشكل قن في كل ما يلي :

$$ا) سه = \{4, 5, 6, 7\}, \text{ صه} = \{2, 5, 6, 9\}$$




$$ب) سه = \{أ, ب, ج\}, \text{ صه} = \{ج, ه, د\}$$

ج) سه مجموعة حروف كلمة "حمزة"، صه = {م، ح، د}


د) سه مجموعة أرقام العدد ٨٧٧ ، صه = مجموعة أرقام العدد ٢٩٠٠

[٢] ظلل المنطقة التي تمثل L في كل شكل من الأشكال (٢٣-١) ،

(٢٤-١) ، (٢٥-١) التالية :



[٣] من الشكل (١ - ٢٦) اكتب بطريقة السرد كلاً من المجموعات:



ب) $S \cap \text{ص}$

ا) $S \cup \text{ص}$

ج) $S \cap \text{ص}$

[٤] أكمل الجدول التالي:

$S \cup \text{ص}$	$S \cap \text{ص}$	ص	S
		{٥، ٣، ٢}	{٣، ٢، ١}
		{ج، م، أ، ل}	مجموعة حروف كلمة "جميل"
		{٤، ٢، ١}	مجموعة عوامل العدد ٨
		مجموعة حروف كلمة "عدن"	{أ، ب، ج}

[٥] لتكن $S = \{١، ٢، ٣، ٤\}$ ، ص = مجموعة أرقام العدد ٣٦٦


أ) اكتب كلاً من $S \cap \text{ص}$ ، $S \cup \text{ص}$ بطريقة السرد .

ب) مثل S ، ص بأشكال ثفن.

ج) ظلل في الشكل الذي رسمته : $S \cap \text{ص}$ باللون الأحمر

و $S \cup \text{ص}$ باللون الأزرق .

[٦] من الشكل (١ - ٢٧) المرسوم أدناه: اكتب بطريقة السرد كلاً مما يأتي :



أ) المجموعات S ، ص ، مع

ب) $\text{ص} \cap \text{مع}$

ج) $S \cup \text{ص}$

د) $S \cup \text{مع}$

هـ) $(S \cap \text{ص}) \cap \text{مع}$

و) $(S \cap \text{ص}) \cup \text{مع}$

١ : الزوج المرتب

تعلم أن اسم الشخص "عبد الله محمد" يختلف عن اسم الشخص "محمد عبدالله" فهذا الاسمان لشخصين مختلفين، لأننا اعتدنا أن نكتب «اسم الشخص أولاً ثم اسم أبيه ثانياً» فالترتيب مهم جداً. ولهذا فإن الزوج (محمد، عبدالله) ليس هو الزوج (عبد الله ، محمد) حيث يدل الزوج الأول على أن محمد ابن عبدالله ؛ بينما يدل الزوج الثاني على أن عبدالله ابن محمد.

ونظراً لأهمية ترتيب عنصري الزوج داخل القوسين (. . . . ،)
نسمى هذا الزوج **«الزوج المرتب»** .

يتضح مما سبق أن :

يسمى (ا ، ب) زوجاً مرتبًا ، فالعنصر الأول (ا) يسمى المسقط الأول ،
والعنصر الثاني (ب) يسمى المسقط الثاني .
يتساوى الزوجان المرتبان ، (ا ، ب) ، (ج ، د) إذا كان : $a = j$ ، $b = d$

مثال (١)

لتكن $S = \{صنعاء، الرياض ، دمشق\}$ ، $C = \{\text{اليمن} ، \text{السعودية} ، \text{سوريا}\}$. كون أزواج مرتبة بحيث يكون المسقط الأول قطرًا عربياً والمسقط الثاني عاصمة ذلك القطر .

الحل :

الأزواج المرتبة هي :
(اليمن ، صنعاء) ، (السعودية ، الرياض) ، (سوريا ، دمشق) .

مثال (٢)

إذا كان $(١, ٧) = (٦, ٥)$ ، فما يجد كلاً من $١, ٥$ ، ٦

الحل :

$$\therefore (١, ٧) = (٦, ٥) \quad , \quad ٦ = ١ \quad , \quad ٥ = ٧$$

ملاحظة : في المجموعات $\{٥, ٨\} = \{٨, ٥\}$ لعدم أهمية ترتيب عناصر المجموعة.
بينما الأزواج المرتبة $(٥, ٨) \neq (٨, ٥)$ لأن أهمية الترتيب داخل الزوج المرتب.

تمارين ومسائل

[١] لتكن $س، ص = \{\text{عدن، تعز، الحديدة، صنعاء}\}$ ، $س = \{\text{ع، ت، أ، ص}\}$
اكتب الأزواج المرتبة بحيث يكون المسقط الأول اسم مدينة من
المجموعة $س$ ، والمسقط الثاني هو أول حرف من حروف تلك المدينة
من المجموعة $ص$.

[٢] إذا كان : $١) (س, ٥) = (٨, ٥)$ فما قيمة $س$ ؟

ب) $(٢, ٣) = (ص, ٣)$ فما قيمة $ص$ ؟

ج) $(٧, ٧) = (أ, ب)$ فما قيمة $أ$ ، $ب$ ؟

د) $(٥, م) = (ن, ٢)$ فما قيمة $م$ ، $ن$ ؟

[٣] ضع علامة (✓) أو (✗) في لتحصل على عبارة صحيحة مع تصويب الخطأ أيهما وجد فيما يلي :

١) $(٣, ٤) = (٤, ٣)$

ب) $\{٨, ٧\} = (٨, ٧)$

ج) إذا كان $(س, ٣) = (٥, ص)$ فإن $س = ٥$ ، $ص = ٣$

د) إذا كان $١ + ٣ = ب - ٢$ فإن $١ = ٤$ ، $ب = ٧$

٩ : حاصل ضرب مجموعتين

سبق أن درست عمليتي التقاطع والاتحاد على المجموعات وهنا سندرس عملية جديدة وهي حاصل ضرب مجموعتين .

لتكن لدينا المجموعتين $S = \{1, 2\}$ ، $C = \{a, b\}$ ؛ إذا كتبنا جميع الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول من S ، ومسقطها الثاني من C ، فإننا نحصل على الأزواج المرتبة التالية :

$$\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

نكتب هذه الأزواج المرتبة على صورة مجموعة :

$$\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

نسمى هذه المجموعة من الأزواج المرتبة :

حاصل ضرب المجموعة S في المجموعة C ، ويرمز لها بالرمز $S \times C$

$$\text{أي أن : } S \times C = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

أما مجموعة الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول من C ومسقطها الثاني

$$\text{من } S \text{ فهي } C \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$$

تلاحظ أن $S \times C \neq C \times S$ ، لأن الزوج $(1, 1)$ مثلاً ينتمي

إلى $S \times C$ ولا ينتمي إلى $C \times S$

لكل مجموعتين غير خاليتين S ، C ؛ فإن حاصل ضرب المجموعة S في المجموعة C هو مجموعة كل الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول من S ومسقطها الثاني من C ويرمز لها الرمز $S \times C$

مثال (١)

إذا كانت $S = \{ج، ه، ص\}$ ، فأوجد ما يلي :

$$(1) S \times S \quad (2) S \times S \quad (3) S \times S$$

الحل:

$$(1) S \times S = \{ج، ه\} \times \{3, 2\} = \{(ج, 3), (ج, 2), (ه, 3), (ه, 2)\}$$

$$\{(3, ج), (3, ه), (2, ج), (2, ه)\} =$$

$$(2) S \times S = \{ج، ه\} \times \{3, 2\} = \{(ج, 3), (ج, 2), (ه, 3), (ه, 2)\}$$

$$\{(3, ج), (3, ه), (2, ج), (2, ه)\} =$$

$$(3) S \times S = \{3, 2\} \times \{3, 2\} = \{(3, 3), (3, 2), (2, 3), (2, 2)\}$$

$$\{(3, 3), (3, 2), (2, 3), (2, 2)\} =$$

مثال (٢)

إذا كانت $L = \{1, 3, 5, م\}$ ، بـ؛ اكتب عدد عناصر كل

من الجموعات التالية :

$$(1) L, M \quad (2) L \times L \quad (3) L \times M$$

الحل:

١) عدد عناصر $L = 3$ عناصر ، عدد عناصر $M = 2$ (عنصران).

٢) عدد عناصر $L \times M = 2 \times 3 = 6$ عناصر.

٣) عدد عناصر $L \times L = 3 \times 3 = 9$ عناصر.

تارين ومسائل

[١] إذا كانت $L = \{5, 6, 7\}$ ، $M = \{b, c, d\}$ أكمل ما يأتي :

$$L \times M = \{(5, b), (5, c), (5, d), (6, b), (6, c), (6, d), (7, b), (7, c), (7, d)\}$$

$$M \times L = \{(b, 5), (b, 6), (b, 7), (c, 5), (c, 6), (c, 7), (d, 5), (d, 6), (d, 7)\}$$

$$J \times M = \{(b, b), (b, c), (b, d), (c, b), (c, c), (c, d), (d, b), (d, c), (d, d)\}$$

[٢] إذا كانت $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ؛ فأوجد ما يأتي :

$$A) S \times S = \{S \times S, S \times S\}$$

[٣] إذا كانت $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ، فأجد كلاً من :

$$A) \text{ عدد عناصر } S \times S \quad B) \text{ عدد عناصر } S \times S$$

$$C) \text{ عدد عناصر } S \times S \quad D) \text{ عدد عناصر } S \times S$$

[٤] ضع علامة (✓) أو (✗) في لتحصل على عبارة صحيحة

فيما يلي :

$$A) (3, 2) = (3, 2)$$

$$B) (4, 5) = (5, 4)$$

$$C) S \times S = S \times S \quad (\text{حيث } S \neq S)$$

$$D) \text{ عدد عناصر } (S \times S) = \text{ عدد عناصر } (S \times S)$$

[٥] لتكن $L = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ، $R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ في كل مما يلي لتصبح العبارة صحيحة :

أ) $\square \times L \subseteq R \times \square$ ب) $\square \times L \subseteq \square \times R$

ج) $L \times \square \subseteq R \times \square$

[٦] إذا كانت $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (5, 1)\}$

{(ب، ب)، (ب، ٣)، (ب، ٤)، (ب، ٥)، (ب، ٦)، (ب، ٧)، (ب، ٨)، (ب، ٩)، (ب، ١٠)}

فأوجد كلاً من : ١) S ، $S \times S$ ٢) $S \times S$ ، S

العلاقات

١٠:

صالح رب أسرة يمنية مكونة من زوجته أروى ، وابنه محمد ، وابنته بلقيس ومريم .

ما هي الروابط بين أفراد هذه الأسرة ؟

من هذه الروابط : " والد " ، " أخ " ، " اخت " ، " ابن " ، ... إلى آخره .

جميع هذه الروابط **علاقة** أسرية تربط بين أفراد الأسرة الواحدة .

فمثلاً تلاحظ أن :

بلقيس " اخت " صالح .

صالح " والد " محمد .

بلقيس " اخت " صالح .

صالح " والد " بلقيس .

مريم " اخت " بلقيس .

صالح " والد " مريم .

مريم " اخت " محمد .

صالح " والد " مريم .

ونستطيع التعبير عن تلك العلاقات الأسرية بأزواج مرتبة فمثلاً :

علاقة " والد " نكتبها كالتالي :

(صالح ، محمد) ، (صالح ، بلقيس) ، (صالح ، مريم) .
وهذا يعني أن المسقط الأول هو الأب والمسقط الثاني هو الابن .
أما علاقة "أخت" فتكتب كأزواج مرتبة على النحو التالي :
(بلقيس ، مريم) ، (بلقيس ، محمد) ، (مريم ، بلقيس) ، (مريم ، محمد) .

تدريب

أكمل العلاقات الأسرية التالية بالنسبة لأسرة صالح :

- ا) علاقـة "والـدة" : (أروى ، محمد) ، (أروى ، ...) ، ...
- ب) عـلاقـة "أخـو" : (محمد ، مريم) ، ...
- ج) عـلاقـة "زوجـة" :

العلاقة من مجموعة إلى أخرى :

إذا كانت $S_m = \{5, 3, 2\}$ ، $S_n = \{2, 4, 6\}$ ؛ فإن $S_m \times S_n = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 2), (3, 4), (3, 6), (5, 2), (5, 4), (5, 6)\}$
ليكن لدينا المجموعة $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ مجموعة جزئية من المجموعة $S_m \times S_n$ بحيث
أن المجموعة M مكونة من الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول أكبر من مسقطها
الثاني فنحصل على :

$$M = \{(2, 4), (2, 6), (4, 3), (4, 5), (6, 3), (6, 5)\}$$

وبنفس الطريقة يمكن أن نأخذ M عـلاقـة "أكـبرـمـن" من المجموعـة $S_m \times S_n$ ، أي
أن عناصرها أزواج مرتبة مسقطها الأول أكبر من مسقطها الثاني ؛ فنحصل على :

$$M = \{(3, 2), (3, 5), (4, 2), (4, 5)\}$$


تلاحظ أن المجموعة الجزئية الأولى M من $S_m \times S_n$ أخذت برابطة
"أصغرـمن" ، بينما المجموعة الجزئية الثانية M من $S_m \times S_n$ أخذـت
برابـطة "أكـبرـمـن". تسمـى كلـ من M ، M' **عـلاقـة** من $S_m \times S_n$ إلى S_n

وبشكل عام :


العلاقة \sqsubset من المجموعة S إلى المجموعة T هي مجموعة جزئية
من حاصل ضرب المجموعتين $S \times T$; أي أن: $\sqsubset \subseteq S \times T$

تمثيل العلاقة بخطوط سهمي:

تعلم مما سبق أن \sqsubset هي علاقة "أصغر من" ، وكتابتها كأزواجاً مرتبة على النحو التالي :



"علاقة "أصغر من"
شكل (٢٨ - ١)



"علاقة "أكبر من"
شكل (٢٩ - ١)

ويتم توضيح هذه العلاقة بخط سهمي كال التالي :
نرسم المجموعتين S ، T ثم نرسم سهماً يربط مسقطي كل زوج في المجموعة $\{S\}$ يبدأ من المسقط الأول في S وينتهي في المسقط الثاني في T . انظر الشكل (٢٨ - ١) .
نسمى هذا الخط **خططاً سهرياً**.


ويمكن بالطريقة نفسها رسم خط سهمي للعلاقة:
 \sqsupset وهي علاقة "أكبر من" ، حيث :
 $\{S\} = \{(3, 2), (2, 5), (4, 5)\}$
الشكل (٢٩ - ١) يوضح العلاقة \sqsupset .

مثال (١)


إذا كانت $S = \{1, 2, 4, 6\}$ ، $T = \{1, 2, 3\}$ ، اكتب العلاقات التالية ثم مثل كل منها بخط سهمي :

- علاقة "ضعف" من S إلى T
- علاقة "أكبر من" من S إلى T

الحل :



أ) علاقـة "ضعف" $= \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$ ؛
 أي أن المـسـقط الأول من سـهـ ضـعـفـ المـسـقطـ
 الثاني من صـهـ ، وـيمـثـلـهـاـ الخـطـطـ
 السـهـمـيـ المرـسـومـ جـانـبـاـ فيـ
 الشـكـلـ (١ - ٣٠) .




ب) عـلـاقـةـ "أـصـغـرـ مـنـ"ـ مـنـ سـهـ إـلـىـ صـهــ هـيـ:

$\{(2, 1), (1, 4), (1, 6), (2, 4), (2, 6), (1, 3), (4, 2), (3, 6)\}$ ؛
 يـمـثـلـهـاـ الخـطـطـ السـهـمـيـ المرـسـومـ جـانـبـاـ .
 فـيـ الشـكـلـ (١ - ٣١) .

العلاقة من مجموعة إلى نفسها :

إذا كانت $S = \{7, 4\}$ ، فإن
 $S \times S = \{7, 4\} \times \{7, 4\} = \{(7, 4), (7, 7), (4, 7), (4, 4)\}$ ،
 إذا أخذنا المجموعة الجزئية $\{(4, 4)\}$ من $S \times S$ المكونة من الأزواج المرتبة التي
 مـسـقطـهـاـ الـأـوـلـ يـسـاوـيـ مـسـقطـهـاـ الثـانـيـ نـجـدـ أـنـ:



$\{(4, 4)\} = \{(7, 7)\}$ ،
 تكونـ هـذـهـ عـلـاقـةـ مـنـ مـجـمـوعـةـ سـهـ إـلـىـ نـفـسـهـاـ ،
 وـالـشـكـلـ (١ - ٣٢ـ)ـ يـمـثـلـ مـخـطـطـهـاـ السـهـمـيـ .

العلاقة \sqsubseteq من المجموعة S إلى نفسها هي مجموعة جزئية من $S \times S$ أي أن $\sqsubseteq \subseteq S \times S$
وتسمى مثل هذه العلاقة : \sqsubseteq علاقة على S

مثال (٢)

لتكن $S = \{1, 2, 3\}$ ؛ اكتب ما يلي :

a) $S \times S$

b) \sqsubseteq هي علاقة "أكبر من" على S ، ومثلها بخطط سهمي .

c) \sqsubseteq هي علاقة "يساوي" على S ، ومثلها بخطط سهمي .

الحل :

a) $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$


b) \sqsubseteq ، وهي علاقة "أكبر من" هي عبارة عن المجموعة الجزئية من

$S \times S$ والتي مسقطها الأول أكبر من مسقطها الثاني ؛

أي أن :

$\sqsubseteq = \{(2, 3), (1, 3), (1, 2)\}$

ويمثلها الخطط السهمي في الشكل (١ - ٣٣)




علاقة "أكبر من"

شكل (١ - ٣٣)

ج) \subseteq ، وهي علاقة "يساوي" هي المجموعة الجزئية من $S \times S$ والتي

مسقطها الأول يساوي مسقطها الثاني ؟ أي أن :



$$\{ (1, 1), (2, 2), (3, 3) \} = \subseteq$$

ويمثلها المخطط السهمي في الشكل (١ - ٣٤)

ćمارين ومسائل

علاقة "يساوي" شكل (١ - ٣٤)

$$[1] \text{ إذا كانت } S = \{ 4, 3, 6 \}, \text{ ص} = \{ 8, 6 \}$$

فاكتب أولاً $S \times S$ ، ثم اكتب العلاقات التالية من S إلى S :

أ) \subseteq علاقة "أصغر من" ، ومثلها بمخطط سهمي.

ب) \subseteq علاقة "نصف" ، ومثلها بمخطط سهمي .

ج) \subseteq علاقة "عامل من عوامل" ، ومثلها بمخطط سهمي .

$$[2] \text{ لتكن } L = \{ 2, 4, 6 \}, \text{ أوجد ما يلي :}$$

أ) $L \times L$
ب) \subseteq علاقة "يساوي"

ج) \subseteq علاقة "ثلاثة أمثال" . د) \subseteq علاقة "ضعف"

هـ) مثل كلًا من العلاقات $\subseteq, \subseteq, \subseteq$ بمخطط سهمي

$$[3] \text{ إذا كانت } S = \{ 1, 2, 4, 5, 7 \}, \text{ عن علاقه على } S, \text{ حيث } \subseteq \text{ علاقه يزيد}$$

بواحد عن". اكتب العلاقة \subseteq كأزواج مرتبة ثم مثلها بمخطط سهمي .

$$[4] \text{ لتكن } \subseteq \text{ علاقه "نصف" على المجموعة } S, \text{ حيث :}$$

$$S = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}, \text{ اكتب عناصر المجموعة } \subseteq, \text{ ثم ضع}$$

علامة (✓) أو (✗) في لتحصل على عبارة صحيحة :

ء) $\{3, 0\} \not\rightarrow \{4, 2\}$

أ) $\{4, 2\} \ni \{3, 0\}$

ب) $\{2, 1\} \ni \{1, 0, 5\}$


هـ) $\{1, 0, 5\} \not\rightarrow \{2, 1\}$

جـ) $\{2, 4\} \ni \{8, 4\}$

و) $\{8, 4\} \not\rightarrow \{2, 4\}$

[٥] من المخططات السهمية التالية في الشكل (١ - ٣٥) : اكتب العلاقات

بصورة أزواج مرتبة:



شكل (١ - ٣٥)

[٦] ارسم مخططاً سهلياً لعلاقة "ثلث" على المجموعة {١ ، ٢ ، ٣ ، ٦}

١١ : تمارين عامة

[١] أي المجموعات التالية منتهية وأيها غير منتهية:

أ) مجموعة مضاعفات العدد ٧ . ، ب) {٦، ١١٨، ١١٤، ١١٠، ١٠٦، ...}

جـ) {٨٠، ٢٠، ١٥، ١٠، ...} ، د) مجموعة أجزاء القرآن الكريم .

[٢] أي المجموعات التالية مجموعة خالية:

أ) مجموعة الطلبة في فصلك الذين يزيد وزنهم عن ٢٠٠ كيلو جرام.

ب) مجموعة الأعداد الطبيعية المحسوبة بين ٧ ، ٨

جـ) {٠} ، د) مجموعة الأعداد الطبيعية الأصغر من صفر .

[٣] اكتب المجموعات التالية بطريقة السرد :

- أ) مجموعة ألوان إشارات المرور
- ب) مجموعة القارات في العالم
- ج) مجموعة أرقام العدد ١٧١٧


[٤] اكتب المجموعات التالية بطريقة الصفة المميزة :

- أ) سه = {الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء}
- ب) صه = {٦، ٤}
- ج) ل = {٩، ٧، ٥، ٣}
- د) ع = {ك، ت، ا، ب}

[٥] ضع أحد الرموز \exists أو \notin أو \subset أو \supset أو $=$ في ○ لتحصل على عبارة صحيحة :

- ١) ○ ٧) مجموعه مدن الجمهوريه اليمانيه.
- ج) ○ {١٥}) مجموعه مدن المكلا

[٦] من الشكل (٣٦-١) ، اكتب عناصر المجموعات التالية بطريقة السرد :



- أ) سه ، صه
- ب) سه \cap صه
- ج) سه \cup صه

[٧] لتكن سه = {٢، ٣، ٥، ٦} ، صه = {١، ٢، ٣، ٥} ،

أ) أوجد سه \cap صه

ب) هل سه \subset صه ؟ اذكر السبب .

ج) ارسم شكلًا يمثل المجموعتين سه ، صه ثم ظلل سه \cap صه

[٨] إذا كانت $S = \{1, 2, 3\}$ ، فكُون ثلاثة مجموعات جزئية للمجموعة S
[٩] ضع علامة (✓) أو (✗) في لتحصل على عبارة صحيحة في
كل مما يلي :

أ) مجموعة أرقام العدد ٨٥٣ هي $\{3, 5, 2, 8\}$

ب) $\{4, 5, 13\}$ \subset مجموعة الأعداد التي أصغر من ١٠

ج) $\{M, L, N\} = \{N, L, M\}$

د) إذا كانت $(S, 4) = (4, 5)$ فإن $S = 5$

[١٠] إذا كانت $S = \{3, 6\}$ ، فأوجد ما يأتي :

أ) $S \times S$

ب) علامة وهي علاقة "ضعف" على S ، ومثلها بمخطط سهمي.

ج) علامة وهي علاقة "يساوي" على S ، ومثلها بمخطط سهمي.

[١١] اكتب عدداً يحل محل S لتكون كل من العبارات التالية صحيحة :

أ) $S \ni \{3\}$ $\ni \{10, 15\}$ ب) $5 \ni \{S, 10\}$

ج) $S \ni \{1, 2, 3\}$ د) $\{1, S\} \subset \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\}$

هـ) $\{13, 15, 17\} = \{10, 15, 25\}$ و) $(S, 25) = (25, 10)$

[١٢] إذا كانت $S = \{1, 2, 3\}$ ، فأوجد ما يأتي :

أ) $S \times S$ ؟

ب) علامة "يساوي" على S مثلها بمخطط سهمي .

[١٣] إذا كانت $L = \{7, 8\}$ ، $M = \{9, 10\}$ ؛ فأوجد :

أ) $L \times M$ ؟

ب) علامة "أصغر من" من L إلى M ومثلها بمخطط سهمي .

١٢ : اختبار الوحدة

[١] ضع علامة (✓) أو (✗) في لتحصل على عبارة صحيحة فيما يلي :

- أ) مجموعة الحروف الهجائية مجموعة منتهية
- ب) مجموعة الأعداد الطبيعية الأصغر من ٢٠٠٠ مجموعة غير منتهية
- ج) مجموعة سكان الكره الأرضية مجموعة غير منتهية

[٢] لتكن $M = \{ا, ب, ج, د\}$ ؛ ضع \exists أو \nexists أو \subset أو \supset في لتصبح العبارة صحيحة في كل مما يلي :

أ) $\{ا, ب, ج\} \subset M$ ج) $M \subset \{ا, ب, ج\}$

ب) $ه \in M$ د) $ا \in M$

[٣] مثل بأشكال قن المجموعتين : $S = \{30, 20, 10\}$ ، $C = \{60, 40, 20\}$ ؛ ثم أوجد :

أ) $S \cap C$ ب) $S \cup C$

[٤] اكتب المجموعات التالية بطريقة السرد :

S = مجموعة الأعداد الفردية الأكبر من ٤ وأصغر من ١٠

M = مجموعة ألوان علم اليمن .

[٥] اكتب المجموعتين التاليتين بطريقة ذكر الصفة المميزة :

$C = \{12, 14, 16, 18\}$.

ل = {السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة}.

[٦] لتكن $S = \{ا, ب\}$ ، $C = \{ج, د\}$ ، ثم أوجد :

أ) $S \times C$ ب) $C \times S$

ج) M ، وهي علاقة "يساوي" من S إلى C ، ومثلها بخطط سهمي .

الوحدة الثانية

مجموعة الأعداد الصحيحة

٢ : مجموعة الأعداد الطبيعية

تؤلف الأعداد: ..., ٠، ١، ٢، ٣، ..., ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ... مجموعه
نسميهها مجموعة الأعداد الطبيعية ونرمز لها بالرمز (ط) ؟ فتكون :

$$\text{ط} = \{ ..., ٢، ٣، ١٠٠, \dots \}$$


تلاحظ أن الصفر هو أصغر عدد طبيعي .

هل تستطيع تحديد أكبر عدد طبيعي ؟

هل مجموعة الأعداد الطبيعية منتهية أو غير منتهية ؟

هل العدد $\frac{3}{4}$ ؟ هل العدد $\frac{5}{2}$ ؟ هل العدد ط ؟

ويمكن تمثيل مجموعة الأعداد الطبيعية على خط الأعداد، كما في
الشكل (١-٢) التالي :



بحيث تمثل النقطة الأولى الصفر، وهي نقطة البداية ، والنقطة الثانية العدد واحد، الثالثة العدد اثنان . . . وهكذا .

لاحظ أن المسافات بين النقاط على خط الأعداد تكون متساوية .

خواص العمليات على مجموعة الأعداد الطبيعية (ط)

١ - خاصية الانغلاق

$$\text{تأمل} : ٨ = ٣ + ٥$$

$$٢٨ = ٤ \times ٧$$

لاحظ أن $5 \times 3 = 3 + 5$ ، عددان طبيعيان ، مجموعهما 8 ، هو عدد طبيعي أيضاً . وكذلك : العددان $7 \times 4 = 4 + 7$ ، عددان طبيعيان ، وحاصل ضربهما 28 ، هو عدد طبيعي أيضاً . وهذا ما نسميه "خاصية الانغلاق" . ولهذا نقول إن عمليتي الجمع والضرب مغلقتان على مجموعة الأعداد الطبيعية ، وعليه فإن :

مجموع أي عددين طبيعيين عدد طبيعي ؛ أي أنه :
لكل $a, b \in \mathbb{N}$ ، $a + b \in \mathbb{N}$

حاصل ضرب أي عددين طبيعيين عدد طبيعي ؛ أي أنه :
لكل $a, b \in \mathbb{N}$ ، $a \times b \in \mathbb{N}$

هل مجموعة الأعداد الطبيعية مغلقة تحت عملية الطرح؟ أعط مثالاً .
 هل مجموعة الأعداد الطبيعية مغلقة تحت عملية القسمة؟ أعط مثالاً .

٢ - خاصية الإبدال :

$$38 = 15 + 23 , \quad 38 = 23 + 15$$

$$63 = 9 \times 7 , \quad 63 = 7 \times 9$$

$$15 + 23 = 23 + 15$$

$$9 \times 7 = 7 \times 9$$

وهذا ما نسميه "**خاصية الإبدال**" . ولهذا نقول إن كلاً من عمليتي الجمع والضرب إبدالية ، في مجموعة الأعداد الطبيعية ؛ وعليه فإن :

لكل عددين طبيعيين $a, b \in \mathbb{N}$:

$$a + b = b + a , \quad a \times b = b \times a$$

هل عملية الطرح إبدالية في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثالاً .
 هل عملية القسمة إبدالية في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثالاً .

٣ - خاصية التجميع:**تأمل :**

(للضرب)

(للجمع)

$$\begin{array}{c|c} (5 \times 3) \times 7 & 5 \times (3 \times 7) \\ 15 \times 7 & 5 \times 21 \\ 105 & 105 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} (3 + 4) + 5 & 3 + (4 + 5) \\ 7 + 5 & 3 + 9 \\ 12 & 12 \end{array}$$

تلاحظ أن:**تلاحظ أن:**

$$(5 \times 3) \times 7 = 5 \times (3 \times 7) \quad (3 + 4) + 5 = 3 + (4 + 5)$$

وهذا ما نسميه "**خاصية التجميع**"؛ ولهذا نقول إن كلاً من عملية الجمع والضرب تجميعية في مجموعة الأعداد الطبيعية؛ وعليه فإن:

لأي ثلاثة أعداد طبيعية a, b, c :

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

هل عملية الطرح تجميعية في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثالاً.

هل عملية القسمة تجميعية في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثالاً.

٤ - العنصر المحادي:**تأمل :**

$$12 = 12 + 0, \quad 7 = 7 + 0, \quad 12 = 0 + 12, \quad 7 = 0 + 7$$

$$74 = 74 \times 1, \quad 8 = 8 \times 1, \quad 74 = 1 \times 74, \quad 8 = 1 \times 8$$

تلاحظ أن : عند جمع الصفر مع أي عدد طبيعي أو جمع أي عدد طبيعي مع الصفر يكون المجموع هو العدد الطبيعي نفسه.

وكذلك عند ضرب العدد (١) في أي عدد طبيعي أو ضرب أي عدد طبيعي في العدد (١) يكون حاصل الضرب هو العدد الطبيعي نفسه . ولهذا نقول إن في مجموعة الأعداد الطبيعية "الصفر عنصر محايد لعملية الجمع " في مجموعة الأعداد الطبيعية ، و"العدد واحد عنصر محايد بالنسبة لعملية الضرب " في مجموعة الأعداد الطبيعية . وعليه فإن :

$$\text{لأي عدد طبيعي: } 1 + 0 = 0 + 1 = 1$$

$$1 \times 1 = 1 = 1 \times 1$$

- هل الصفر عنصر محايد بالنسبة لعملية الطرح في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثلاً .

- هل العدد واحد عنصر محايد بالنسبة لعملية القسمة في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثلاً .

٥ - خاصية توزيع الضرب على الجمع :

$(4 \times 8) + (3 \times 8)$ $32 + 24$ 56	$(4+3) \times 8$ 7×8 56
--	--

تأمل :

$$\text{تلاحظ أن: } 8 \times (4 + 3) = (4 \times 8) + (3 \times 8)$$

وهذا ما نسميه "خاصية توزيع الضرب على الجمع " في مجموعة الأعداد الطبيعية ؛ ولهذا نقول إن عملية الضرب تتوزع على عملية الجمع في مجموعة الأعداد الطبيعية؛ وعليه فإن :

لأي ثلاثة أعداد طبيعية (a, b, c) يكون:

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

هل تتوزع عملية الضرب على عملية الطرح في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثالاً.

هل تتوزع عملية القسمة على عملية الجمع في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثالاً.

هل تتوزع عملية القسمة على عملية الطرح في مجموعة الأعداد الطبيعية؟ أعط مثالاً.

ćمارين ومسائل

[١] أي العبارات الآتية صحيحة ؟ وأيها خاطئة ؟ :

- أ) $\exists 5 \ni \text{ط} \quad \exists 0,5 \ni \text{ط}$
 ب) $\frac{1}{4} \notin \text{ط} \quad \{4,5,6\} \subset \text{ط}$
 ج) $\{0\} \not\subset \text{ط} \quad \{...,\underline{3},2,1\} \subset \text{ط}$
 د) $\{\frac{1}{2}, 1, 2\} \subset \text{ط} \quad \{2, 1, \frac{1}{2}\} \subset \text{ط}$
 هـ) $\{4,5,6\} \subset \text{ط} \quad \exists \frac{1}{4} \ni \text{ط}$
 ز) $\{2, 1, \frac{1}{2}\} \subset \text{ط} \quad \{...,\underline{3},2,1\} \subset \text{ط}$

ط) $\{...,6,4,2\} \not\subset \text{ط}$.

[٢] ضع الرمز \exists أو $\not\exists$ أو \subset أو $\not\subset$ في \square لتصبح العبارات التالية صحيحة :

- أ) $\exists \square 25 \ni \text{ط}$
 ب) $\{3,2,1\} \subset \square \text{ط}$
 ج) $\text{ط} \subset \square 12,5 \quad \{5,4,3\} \subset \text{ط}$

[٣] مثل المجموعات التالية على خط الأعداد :

- أ) $\{3,4,5,6,7\}$
 ب) $\{55,56,57,58\}$

[٤] حدد العمليات التي تتوفر فيها خاصية الانغلاق في (ط) من كل من العمليات التالية :

- أ) $62 + 37$
 ب) $125 - 132$
 ج) $304 + 375$
 د) 4×7
 هـ) 12×26
 و) $5 \div 18$

[٥] تحقق أيًّا من العمليات التالية إبدالياً :

$$\text{ج) } 12 - 54$$

$$\text{ب) } 36 + 12$$

$$\text{أ) } 3 \times 14$$

$$\text{و) } 10 \times 42$$

$$\text{ه) } 5 \div 25$$

$$\text{ـ) } 38 + 17$$

[٦] استخدم خاصية التجميع لإيجاد ناتج ما يلي :

$$11 + 19 + 36$$

$$\text{ج) } 48 + 16 + 24$$

$$\text{ب) } 12 + 3 + 5$$

$$20 \times 12 \times 7$$

$$\text{و) } 5 \times 8 \times 26$$

$$\text{هـ) } 12 \times 4 \times 5$$

[٧] استخدم خاصية التوزيع لإيجاد ناتج ما يلي :

$$\text{ب) } 43 \times (8 + 4)$$

$$\text{أ) } 6 \times (9 + 8)$$

$$\text{ـ) } 39 \times (7 + 5)$$

$$\text{ج) } (6 + 9) \times 32$$

[٨] أوجد ناتج ما يلي بأسهل الطرق :

$$\text{ب) } 73 \times 12 + 73 \times 8$$

$$\text{أ) } 4 \times 42 + 6 \times 42$$

$$\text{ـ) } 587 \times 32 + 413 \times 32$$

$$\text{ج) } 85 \times 19 + 15 \times 19$$


مجموعة الأعداد الصحيحة

٢ : ٢

تعرفت كيف تمثل الأعداد الطبيعية على خط الأعداد .

تخيل أن النقطة ١ عند العدد صفر ، تم تحريكها ثلاثة وحدات جهة اليمين ، ثم

تلى ذلك تحريكها أربع وحدات يمين العدد ٣ ، كما هو موضح في الشكل (٢-٢) التالي :




تجد أن نهاية حركة النقطة ١ عند العدد ٧ .

وعندما يشير السهم إلى جهة اليسار يعني أن الحركة في الاتجاه المعاكس ، فمثلاً


دعنا نرسم حركة نقطة ثلاثة وحدات يمين الصفر ، ثم تلى ذلك تحريكها أربع

وحدات يسار العدد ٣ ، كما هو واضح في الشكل (٣-٢) التالي :



لاحظ أن نهاية السهم على بعد وحدة واحدة يسار الصفر على خط الأعداد . وحيث أن النقطة على يسار الصفر لا يمكن تمثيلها بأي عدد طبيعي؛ إذن النقطة ١ تمثل عدد جديد وهي تبعد وحدة واحدة يسار الصفر . وبما أن العدد ١ يبعد وحدة واحدة يمين الصفر، لهذا نقول إن ١ تقع عند معكوس العدد ١ . وبالمثل يمكن أن نسمى النقطة على بعد وحدتين يسار الصفر معكوس العدد ١ . وهذا ... ٢

ويكتب معكوس العدد ١ بـ (١-) ويقرأ سالب ١ ، ومعكوس العدد ٢ هو (٢-) ويقرأ سالب ٢ . . . وهكذا ؛ فيصبح خط الأعداد الموسع كما في الشكل (٤-٢) التالي :



فتكون مجموعة الأعداد الجديدة هي $\{-1, -2, -3, \dots\}$. وتسمى هذه المجموعة بمجموعة الأعداد الصحيحة السالبة ويرمز لها بالرمز (صـ) وتقرأ عناصرها سالب واحد ، سالب اثنان ، سالب ثلاثة ، ... إلخ .


والأعداد السالبة لها استخدامات كثيرة في حياتنا اليومية ، وذلك للتعبير عن أوضاع متعاكسة فنعبر عن المكسب بالإشارة (+) ونعبر عن الخسارة بالإشارة (-) . ومن أمثلة الأوضاع المتعاكسة الارتفاع والانخفاض والاتجاه إلى اليمين

والاتجاه إلى اليسار، درجة الحرارة فوق الصفر ودرجة الحرارة تحت الصفر.. إلخ.

فمثلاً إذا قلنا إن درجة الحرارة الصغرى في محافظة ذمار ثلات درجات مئوية فوق الصفر فنعبر عنها بالرمز (${}^{\circ}30\text{ م}$) تقرأ موجب ثلات درجات مئوية ، أما إذا قلنا إن درجة الحرارة الصغرى في محافظة ذمار ثلات درجات مئوية تحت الصفر فنعبر عنها بالرمز (${}^{\circ}-30$) وتقرأ سالب ثلات درجات مئوية.

مجموعة الأعداد $\{1+, 2+, 3+, \dots\}$ تسمى مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة ويرمز لها بالرمز (ص^+) وتقرأ عناصرها موجب واحد، موجب اثنان ، موجب ثلاثة . . . وهكذا . الخ ، وحيث أن مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة هي نفسها مجموعة أعداد العد فيمكن كتابتها بدون الإشارة الموجبة $(+)$. أي أن: $\text{ص}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$
 والمجموعة الناتجة من $\text{ص}^+ \cup \{0\}$ تسمى مجموعة الأعداد الصحيحة ويرمز لها بالرمز ص
 $\therefore \text{ص} = \{\dots, 3, 2, 1, 0, 1-, 2-, 3-\}$

وتمثل مجموعة الأعداد الصحيحة على خط الأعداد كما في الشكل التالي:



شكل (٥-٢)

تذكرة:

$$\begin{aligned}\text{ط} &= \{ \dots, 3, 2, 1, 0 \} \\ \text{ص}^+ &= \{ \dots, 3, 2, 1 \} \\ \text{ص}^- &= \{ \dots, 1-, 2-, 3- \} \\ \text{ص} &= \{ \dots, 3, 2, 1, 0, 1-, 2-, 3- \}\end{aligned}$$

مثال (١)

عِيْن العبارات الصحيحة والعبارات الخطأ فيما يلي ، واذكر السبب :

أ) $\exists \text{ص}^- \text{ـ} ٤ \in \text{ص}$

ج) $\text{ص}^+ \cap \text{ص}^- = \{٠\}$

الحل :

أ) $\exists \text{ص}^- \text{ـ} ٤ \in \text{ص}$ عبارة صحيحة لأن (-4) عدد صحيح سالب ، ص^-

مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة .

ب) $\exists \text{ص}^- \text{ـ} ٨ \in \text{ص}$ عبارة خطأ لأن (8) عدد صحيح موجب ، ص^-

مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة .


ج) $\text{ص}^+ \cap \text{ص}^- = \{٠\}$ عبارة خطأ ؛ لأنه لا توجد عناصر مشتركة

بين ص^+ و ص^-

د) $\text{ط} \subset \text{ص}$ عبارة صحيحة ، لأن جميع عناصر ط تنتهي إلى ص

مثال (٢)

رسم خط الأعداد ، وحدد عليه النقاط التي تمثل الأعداد $٢ ، ١ ، ٢ - ، ٣ - ، ٣ - ٤$



الحل :

ćمارين ومسائل

[١] عِيْن العبارات الصحيحة ، والعبارات الخطأ فيما يلي ؛ واذكر السبب :

أ) $\exists \text{ص}^- \text{ـ} ٢ \in \text{ص}$

ج) $\text{ص}^- \cap \text{ط} = \{٠\}$

[٢] عِيْن العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة فيما يلي، واذكر السبب:



أ) {٤، ٢، ٠} صـ+ ب) {-١، ٠، ١} صـ

ج) {-١، -٣، -٥} صـ- هـ) صـ+ لـ صـ- = صـ

[٣] ارسم خط الأعداد وحدد عليه النقاط التي تمثل الأعداد التالية:

-٤ ، -٥ ، ٢ ، ٤

[٤] اكتب العدد الذي تمثله كل نقطة ملونة على خط الأعداد في الشكل (٧-٢) التالي:



شكل (٧-٢)

[٥] ضع الرمز \exists أو \nexists أو \subset أو $\not\subset$ في لتصبح العبارات التالية صحيحة:

أ) ط ب) صـ- ج) ط صـ

د) ١٣٨ هـ) صـ+ و) -٨٤٢ صـ-


٣ : مقارنة الأعداد الصحيحة

تعلم من دراستك السابقة أن العدد ٤ أكبر من العدد ٣، ونعبر عن ذلك

رمزيًا فنكتب : $4 > 3$.

وإذا نظرت إلى خط الأعداد في الشكل (٢-٨) أدنناه تجد أن : العدد ٤

يقع على يمين العدد ٣.



شكل (٨-٢)

وكذلك العدد $5 > 7$ لأن العدد 5 يقع على يسار العدد 7 ، والعدد $2 < 3$ لأن العدد 2 يقع على يمين العدد 3 .

تأمل: عند ترتيب الأعداد على خط الأعداد ، تلاحظ أن :

$$\dots < 3 - < 2 - < 1 - < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$$

ومن ذلك تجده أن : – كل عدد صحيح موجب أكبر من الصفر .

– كل عدد صحيح سالب أصغر من الصفر .

وبصورة عامة :

لأي عددين صحيحين a ، b :

إذا كان $a > b$ فإن العدد a يقع على خط الأعداد على اليمين من العدد b .

وإذا كان $a < b$ فإن العدد a يقع على خط الأعداد على اليسار من العدد b .

تدريب

أي العددين أكبر 678 أو 658 ؟

أي العددين أكبر -678 أو -658 ؟

مثال (١)

قارن بين كل زوج من الأعداد التالية باستخدام أحد الرموز: $<$ ، $>$ ، $=$:

$$(1) \quad 139 , 139 \quad \text{ب) } -4 , 0$$

$$\text{ج) } -15 , 15 \quad \text{د) } 72 - , 97 -$$

$$(2) \quad 139 = 139 \quad \text{ب) } 4 > 0$$

$$\text{ج) } 15 > 15 - \quad \text{د) } 97 - < 72 -$$

المحل:

مثال (۲)

عين العبارات الصحيحة والعبارات الخطأ فيما يلي ، مع ذكر السبب :

۳->۲-(ج) ، <۲- (ب) ۲ < ۳ (ا)

الحل:

٩) <٣> عبارة صحيحة ، لأن ٣ على يمين العدد ٢ على خط الأعداد .

ب) <٢>، عبارة خطأة ، لأن -٢ على يسار الصفر على خط الأعداد .

ج) \rightarrow ٣- عبارة خاطئة ، لأن - ٢ على يمين العدد - ٣ على خط الأعداد .

تاریخ و مسائل

[١] عِينَ العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة فيما يلي ، مع ذكر السبب :

، ۳->۷ (ج) ۳-<۴ (ب) ، <۵ (ا)

$$\therefore 12 = 12 - (0) \qquad \lambda < 0 - (-\lambda) \qquad \cdot < 0 - (-\zeta)$$

مع أحد الرموز < أو > أو = في □ كي تصبح العبارة صحيحة في كل مما
أ) □ ٢ = ٤ - ٤ ب) ٤ = □ - ٤ ج) □ = ٤ - □

۲۴۹-□ ۲۴۷(۹) ۲۵-□ ۲۵-(۵) ۶۶ □ ۸۲(۵)

١٧، ١٢-، ٣٢-، ١٥، ٢٠ ب) ٤) ٧-، ٢-، صفر، ٥، ٤-

[٤] رتب الأعداد التالية ترتيباً تناظرياً

٢٠) صفر، ١-، ١، ٢، ٢-، ٢) ب(٥-، ٥، ٢٥، ٨-، ٨

[٥] أكمل النمط: ١) ٧، ٥، ...، ٣، ...، ٥

ج) ٦، ٣، صفر، ...، ...، ...، ١٢-

۱۰۰-، ...، ...، ...، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰

٤ : جمع الأعداد الصحيحة

القيمة المطلقة للعدد:

إن العدد الطبيعي ٣ يسمى القيمة المطلقة للعددين الصحيحين $(+3)$ ، (-3) :

$$3 = |-3| \quad , \quad 3 = |+3| \quad \text{ونكتبها رمياً :}$$

تدريب

أوجد القيم المطلقة للأعداد 6 ، -4 ، 5 ، -5 .


$$\dots = |-9| \quad , \quad \dots = |-4| \quad , \quad \dots = |6|$$

$$\dots = |5| \quad , \quad \dots = |5| \quad , \quad \dots = |12|$$

تعلمت من دراستك السابقة تمثيل عملية جمع الأعداد الطبيعية على خط الأعداد .


هل بإمكانك تمثيل عملية جمع الأعداد الصحيحة على خط الأعداد؟

تأمل الشكل (٩-٢) التالي؛ أنه يبين عملية جمع $5 = 3 + 2$:



بدأنا بتحديد النقطة التي تمثل العدد 2 ، ثم تحركنا إلى اليمين بمقدار ثلاثة وحدات ؛ فوصلنا إلى النقطة التي تمثل المجموع وهو (5)


ويبيّن الشكل (١٠-٢) التالي عملية جمع $-5 = (-3) + (-2)$:



لقد بدأنا بتحديد النقطة التي تمثل العدد (-2) ، ثم تحركنا إلى اليسار

بمقدار ثلاثة وحدات ؛ فوصلنا إلى النقطة التي تمثل المجموع وهو (-5)

ويبيّن الشكل $(11-2)$ التالي عملية جمع $2 + (-3) = -1$



تلاحظ أننا بدأنا بتحديد النقطة التي تمثل العدد 2 ، ثم تحركنا إلى اليسار

بمقدار ثلاثة وحدات ؛ فوصلنا إلى النقطة التي تمثل المجموع وهو (-1) .

نستنتج مما سبق :

١) مجموع عددين صحيحين موجبين هو عدد صحيح موجب ،

ويساوي مجموع العددين .

٢) مجموع عددين صحيحين سالبين هو عدد صحيح سالب ،

يساوي مجموع العددين .

٣) مجموع عددين صحيحين أحدهما سالب والآخر موجب هو

عدد صحيح ، يساوي الفرق بين العددين ، وإشارته إشارة

أكبرهما من حيث قيمته المطلقة .

مثال (١)


استخدم خط الأعداد لتمثيل العمليات التالية ، وأوجد الناتج :

$$\text{أ) } 3 + (-5) \quad \text{ب) } (-4) + (-2) \quad \text{ج) } (-7) + 3$$

الحل :

أ) نرسم خط الأعداد ونحدد عليه العدد ٣ ، ثم نتحرك إلى اليسار


خمس وحدات ، فنصل إلى المجموع ، وهو العدد (-2) .



$$\therefore -2 = (-5) + 3$$

ب) نرسم خط الأعداد ونحدد عليه العدد (-2) ، ثم نتحرك إلى


اليسار أربع وحدات ، فنصل إلى المجموع ، وهو العدد (-6) .



$$\therefore -6 = (-4) + (-2)$$

ج) نرسم خط الأعداد ونحدد عليه العدد (-7) ، ثم نتحرك إلى

اليمين ثلاث وحدات ؛ فنصل إلى المجموع ، وهو العدد (-4)



$$\therefore -4 = 3 + (-7)$$

مثال (٢)

أوجد المجموع لكل مما يأتي :

$$\text{ب) } (-22) + (-36) \quad \text{أ) } 32 + 27$$

$$\text{ج) } (-23) + (-47) \quad \text{د) } 45 + (-92)$$

الحل : بتطبيق قواعد جمع الأعداد الصحيحة ، نحصل على :

$$14 = (22 -) + 36$$

$$59 = 32 + 27$$

$$70 = (23 -) + (47 -)$$

$$47 = 45 + (92 -)$$

ćمارين ومسائل

[١] مثل العمليات التالية على خط الأعداد ، وأوجد المجموع :

$$3 + (4 -) \quad \text{ج) } (- 6) + 3 \quad \text{ب) } (- 2) + 4$$

$$(4 -) + (3 -) \quad \text{ه) } (- 1) + (2 -) \quad \text{و) } (- 5) + (4 -)$$

[٢] اكتب القيمة المطلقة لكل مما يأتي :

$$\text{ج) } 247 - \quad \text{ب) } -64 \quad \text{أ) } 32$$

$$\text{و) } -103 \quad \text{ه) } -35 \quad \text{ط) } 35$$


[٣] أوجد مجموع العمليات التالية :

$$\text{ب) } (- 8) + (7 -) \quad \text{ج) } (- 8) + 4 \quad \text{أ) } (- 3) + 5$$

$$\text{ه) } (- 48) + (- 94) + (- 26) \quad \text{و) } (- 63) + (- 12) + (- 4)$$


$$\text{ز) } (- 47) + (- 63) \quad \text{ح) } (- 95) + (- 83) \quad \text{ط) } (- 32) + (- 87)$$

[٤] اكتب عمليات الجمع المماثلة بالأشكال (١٥-٢ ، ب ، ج) الآتية :




شكل (١٥-٢)

$$\dots = \dots + \dots$$



شكل (١٥-٢ ب)

$$\dots = \dots + \dots$$



شكل (١٥-٢ ج)

$$\dots = \dots + \dots$$


[٥] ما هو العدد الذي إذا أضيف إلى (-١٧) ، كان الناتج يساوي ١٢؟

[٦] ما هو العدد الذي إذا أضيف إلى ١٩ ، كان الناتج يساوي ١١؟

[٧] ما هو العدد الذي إذا أضيف إلى (-١٤) ، كان الناتج يساوي (-٣٢)؟

٢ : طرح الأعداد الصحيحة

النظير الجمعي :



شكل (١٦-٢)

تأمل الشكل (١٦-٢) ، تلاحظ أن :

العدد (١) يقع إلى اليمين من الصفر، والعدد (-١) يقع إلى اليسار من الصفر .

والعدد (٣) يقع إلى اليمين من الصفر، بينما العدد (-٣) يقع إلى اليسار من الصفر .

وبالمثل فإن العدد (٦) يقع إلى اليمين من الصفر ، والعدد (-٦) يقع إلى اليسار من الصفر .

وهكذا فإن لكل عدد صحيح معكوس على خط الأعداد. ويقع العدد ومعكوسه على بعدين متساوين عن يمين ويسار الصفر، ويسمى هذا المعكوس بالنظير الجمعي .

تدريب (١)

باستخدام خط الأعداد ، اذكر النظير الجمعي للأعداد :


$$١ ، (-٣) ، (-٤) ، ٥$$

مثال


باستخدام خط الأعداد ، أوجد ناتج جمع ما يلي :

$$٧ + ٧ - ج) ٤ + (-٤) \quad ب) ٢ + (-٢)$$


الحل:



من الشكل (١٧-٢) : نلاحظ أن ناتج جمع $2 + (-2) = 0$



من الشكل (١٧-٢ ب) : نلاحظ أن ناتج جمع $4 + (-4) = 0$



من الشكل (١٧-٢ ج) : نلاحظ أن ناتج جمع $7 + (-7) = 0$
ما سبق يتضح أن :

مجموع العدد ونظيره الجماعي يساوي صفر ؟

أي أنه : إذا كان $a \neq 0 \Rightarrow$ ص $\Leftrightarrow a + (-a) = 0$

العدد صفر هو النظير الجماعي للعدد صفر .

طرح الأعداد الصحيحة :

قارن بين الناتجين في كل من العمود (أ) ، والعمود (ب)

(ب)	(أ)
$1 = 4 - 5$	$1 = 4 - 5$
$5 = 3 + 2$	$5 = 3 - 2$
$5 = 1 + 6$	$5 = 1 - 6$

ماذا تلاحظ ؟

تلاحظ أن كل عملية طرح في العمود (أ) حولت إلى عملية جمع في العمود (ب) وذلك بإضافة النظير الجمعي للمطروح إلى المطروح منه . وهذا يعني أنه يمكن أن نجري أي عملية طرح بإضافة النظير الجمعي للعدد المطروح إلى العدد المطروح منه .

مثال (١)

اكتب ما يلي على صورة جمع :

$$\text{ج) } 9 - (-4) \quad \text{ب) } 14 - (7) \quad \text{أ) } 15 - 12$$

الحل :

$$\text{ج) } 9 + 4 \quad \text{ب) } 14 + 7 \quad \text{أ) } 15 + (-12)$$

مثال (٢)

أوجد ناتج طرح ما يلي :

$$\text{ج) } 4 - (-2) \quad \text{ب) } 5 - 8 \quad \text{أ) } 12 - 6$$

الحل :

$$\text{ج) } 6 = 2 + 4 \quad \text{ب) } 3 = (8 - 5) + 0 \quad \text{أ) } 6 = (-6) + 12$$

ćمارين ومسائل

[١] أ) اكتب النظير الجمعي لكل من الأعداد التالية :

$$1000, 25, 23, 29, 7, 3, 2$$

ب) ما مجموع كل عدد من الأعداد السابقة مع نظيره الجمعي ؟

[٢] استخدم خط الأعداد لإيجاد ناتج ما يلي :

$$أ) ٣ - ٢) ب) ٢ - ٣) ج) ٥ - ٩ - (٤ -)$$

[٣] حول عمليات الطرح التالية إلى عمليات جمع ثم أوجد الناتج :

$$أ) ١٥ - ١١) ب) ٢٥ - ٢٤) ج) ١٩ - (١٧ -)$$

$$د) ٤٥ - ٢٧) ه) ٤٥ - (٢٦ -) و) ٥٩ - (١١ -)$$

$$ز) ١٨ - ٠) ح) ٠ - (١٢ -) ط) ١٠٠ - (٩ -)$$

[٤] أوجد ناتج ما يلي :

$$أ) ١٢ - ٢٨) ب) ٥٤ - (٢٤ -) ج) ٣٥ - ١٣ -$$

$$ه) ٤٧ - (٠ - ١٥٠٠) و) ٠ - (١٠٠ -) ٦٠٠ -)$$

$$ز) ٦٩٢ - (٦٩٢ -) ح) ٧٢١٨ - ٥٧٨٩) ط) ٩٥٤٢٨ - ١٨٣٧٦ -$$

[٥] اطرح ٧٥ من (٢٢٠ -)

[٦] اطرح ٢٣ من ٣١٥


٦ : ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة

أولاً: ضرب الأعداد الصحيحة :

عرفت فيما سبق أن $٤ \times ٣ = ١٢$ هي عبارة عن اختصار للجمع المتكرر :

$$١٢ = ٤ + ٤ + ٤ ، \quad \text{أو} \quad ٤ = ٣ + ٣ + ٣ + ٣$$

وتمثل هذه العملية على خط الأعداد كما في الشكل (٢ - ١٨) التالي :



ملاحظة :

عند تمثيل حاصل ضرب عددين صحيحين على خط الأعداد لابد أن تكون نقطة البداية دائمًا الصفر .


تدريب (١)

مثل 4×3 على خط الأعداد في دفترك.

وكذلك عملية ضرب العدد $3 \times (-4)$

$$12 = (-4) + (-4) + (-4) =$$

وترسم على خط الأعداد على النحو التالي [انظر الشكل (١٩-٢)] :



$$12 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = (-3) \times 4$$

تدريب (٢)

مثل $(-4) \times 3$ على خط الأعداد في دفترك.

نشاط

أكمل النمط : (أ)

(ب)

١٢-	$3 \times (-4)$
٨-	$2 \times (-4)$
	$1 \times (-4)$
	$0 \times (-4)$
	$(-1) \times (-4)$
	$(-2) \times (-4)$
	$(-3) \times (-4)$

١٢	3×4
٨	2×4
	1×4
	0×4
	$(-1) \times 4$
	$(-2) \times 4$
	$(-3) \times 4$

من خلال التأمل فيما سبق نستنتج أن :

- حاصل ضرب أي عدد موجب في عدد سالب هو عدد سالب .
- حاصل ضرب أي عدد سالب في عدد موجب هو عدد سالب .
- حاصل ضرب أي عدد سالب في عدد سالب هو عدد موجب .
- حاصل ضرب أي عدد موجب في عدد موجب هو عدد موجب .

أوجد حاصل ضرب ما يلي :

$$(8-) \times (9-) (3) \quad 7 \times (-6) (2) \quad (-4) \times 5 (1)$$

الحل :

$$(-4) \times 5 = -20$$

$$(-6) \times 7 = -42$$

$$(8-) \times (9-) (3) = 72$$

ćمارين ومسائل

[١] أوجد ناتج ما يلي :

$$b) 6 \times (-9) (5) \quad (-5) \times 6 (1)$$

$$c) (-20) \times (-20) (6) \quad (-6) \times 18 (2)$$

$$d) (-500) \times (-500) (0) \quad (-12) \times 0 (h)$$

[٢] احسب ما يلي :

$$b) (-25) \times 25 (1) \quad 318 \times (-12) (2)$$

$$c) (-210) \times (-5460) (3) \quad (-30) \times (-2500) (4)$$

[٣] أكمل جدول حاصل الضرب التالي :

٤	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-	٤-	X
								١٦-	٤
			٣						٣
							٦-		٢
٤									١
						.			٠
					١				١-
		٤-							٢-
				.					٣-
	١٢-								٤-

[٤] ما حاصل ضرب :

- أ) ١٨ في (-٤٢٠))
 ب) (-٤٢) في ٧١٨
 ج) (-١٢٠) في (-٨٥٠)

ثانياً : قسمة الأعداد الصحيحة :

$$\text{تأمل ما يلي : } 24 = 3 \times 8, \text{ لأن } 8 = 3 \div 24$$

تعلم من دراستك السابقة أن القسمة عملية عكسية للضرب ؛ فإذا أردت أن تقسم (-٣٠) ÷ ٥ ، فإنك تبحث عن العدد الذي إذا ضربته في العدد (٥) نحصل على العدد (-٣٠) . وهذا العدد هو (-٦)

وهكذا نجد أن :

$$30 = (-6) \times 5 , \quad -6 = 5 \div (-30)$$

$$30 = 5 \times (-6) , \quad 5 = (-6) \div (-30)$$

$$30 = (-5) \times (-6) , \quad -5 = (-6) \div 30$$

ما سبق تستنتج أن :

خارج قسمة عدد موجب على عدد سالب هو عدد سالب .

وخارج قسمة عدد سالب على عدد موجب هو عدد سالب .

وخارج قسمة عدد سالب على عدد سالب هو عدد موجب .

وخارج قسمة عدد موجب على عدد موجب هو عدد موجب .

أوجد خارج قسمة ما يلي ، وتحقق من إجابتك :

مثال

$$(7- \div 84) \quad (1)$$

$$11 \div (99-) \quad (2)$$

$$(150-) \div (15-) \quad (3)$$

الحل:

$$84 = (7-) \times (12-) , \quad 12- = (7-) \div 84 \quad (1)$$

$$99- = (9-) \times 11 , \quad 9- = 11 \div (99-) \quad (2)$$

$$150- = (15-) \times 10 , \quad 10 = (15-) \div (150-) \quad (3)$$

ćمارين ومسائل

[١] أوجد خارج قسمة ما يلي :

$$(8- \div 32-) \quad (5- \div 25) \quad (1)$$

$$(11- \div 44-) \quad (2- \div 0) \quad (6 \div 30) \quad (5)$$

[٢] احسب :

$$\text{ب) } 16 \div (-3968) \quad \text{أ) } (-9) \div (-675)$$

$$\text{ج) } (-17) \div (-26044) \quad \text{د) } (-18) \div (-10152)$$

[٣] أكمل الجدول التالي :

المقسوم عليه	المقسوم	٢٥٢	(٧٥٦-)	(٥٠٤-)	١٢٦٠
	(٧-	٣٦-			
	٩				
	(١٢-				

[٤] أقسم -١٨٢ على -١٤

[٥] أوجد ناتج قسمة : -٣٧٥ على -١٥

٢ : خواص العمليات على الأعداد الصحيحة

أولاً: خاصية الانغلاق :

تأمل ما يلي ؛ ماذا تلاحظ ؟

$$، 11 = (5-) + 6- ، 7 = 10 + 3- ، 3- = (7-) + 4$$

$$، 1 = (9-) - 10- ، 13 = (7-) - 6- ، 15 = 8 - 7-$$

$$30 = (6-) \times (5-) ، 8- = 4 \times (2-) ، 24 = (4-) \times 6$$

تلاحظ أن :

ناتج العمليات السابقة أعداد صحيحة

ولذلك نقول إن مجموعة الأعداد الصحيحة ($a+b$) مغلقة تحت كل من العمليات التالية: ١) جمع الأعداد الصحيحة .
٢) طرح الأعداد الصحيحة .
٣) ضرب الأعداد الصحيحة .

أي أنه :

لكل $a, b \in \mathbb{Z}$ ، فإن :

$$(a+b) \in \mathbb{Z}, (a-b) \in \mathbb{Z}, (a \times b) \in \mathbb{Z}$$

هل مجموعة الأعداد الصحيحة مغلقة على عملية القسمة؟

للإجابة على هذا السؤال تأمل ما يلي :

$$\frac{3}{6} = 4 \div 27 , \quad 5 = 45 \div (9-)$$

لاحظ أن خارج قسمة $27 \div 4$ ليس عدداً صحيحاً؛ ولذلك نقول إن مجموعة الأعداد الصحيحة \mathbb{Z} ليست مغلقة على عملية القسمة .

ثانياً : خاصية الإبدال :

تأمل ما يلي؛ ماذا تلاحظ ؟

$$11 = 8 + 3 , \quad 11 = 3 + 8 \quad (1)$$

$$2 - = 7 + 9 - , \quad 2 - = (9-) + 7 \quad (2)$$

$$2 = 8 - 6 - , \quad 2 = 8 + 6 - \quad (3)$$

$$21 = 3 \times 7 , \quad 21 = 7 \times 3 \quad (4)$$

$$٨ = ٤ \times (٢-) , \quad ٨ = (٢-) \times ٤ (٥)$$

$$١٥ = (٥-) \times ٣ , \quad ١٥ = ٣ \times (٥-) (٦)$$

$$٣٦ = (٤-) \times (٩-) , \quad ٣٦ = (٩-) \times (٤-) (٧)$$

تلاحظ أن :

$$٨ + ٣ = ٣ + ٨ (١)$$

$$٧ + ٩ = (٩-) + ٧ (٢)$$

$$(٦-) + ٨ = ٨ + ٦- (٣)$$

$$٣ \times ٧ = ٧ \times ٣ (٤)$$

$$٤ \times (٢-) = (٢-) \times ٤ (٥)$$

$$(٥-) \times ٣ = ٣ \times (٥-) (٦)$$

$$(٤-) \times (٩-) = (٩-) \times (٤-) (٧)$$

إذن عمليتي الجمع والضرب إيداليتان في مجموعة الأعداد الصحيحة.

أي أنه :

لكل $a, b \in \mathbb{Z}$ فإن :

$$a \times b = b \times a , \quad a + b = b + a$$

هل عملية طرح الأعداد الصحيحة إيدالية؟ أعط مثالاً يوضح ذلك.

هل عملية قسمة الأعداد الصحيحة إيدالية؟ أعط مثالاً يوضح ذلك.

ثالثاً : خاصية التجميع :

أ) جمع الأعداد الصحيحة :

تأمل ما يلي ؟ ماذا تلاحظ ؟

$$\begin{array}{|c|c|} \hline (\infty + (-9)) + 4 & \infty + ((-9) + 4) \\ \hline (-1) + 4 & \infty + (5-) \\ \hline 3 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline (-4) + 5 + (-7) & (-4) + (5 + 7-) \\ \hline 1 + (-7-) & (-4) + (-2-) \\ \hline -6 & -6 \\ \hline \end{array}$$

تلاحظ أن:

تلاحظ أن:

$$(\infty + (-9)) + 4 = \infty + ((-9) + 4)$$

$$((-4) + 5) + (-7) = (-4) + (5 + 7-)$$

إذا كانت a ، b ، c أعداداً صحيحة ، فإن :

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

أي أنه :

تسمى هذه الخاصية خاصية التجميع بالنسبة لعملية جمع الأعداد الصحيحة.

ب) ضرب الأعداد الصحيحة

تأمل ما يلي : ماذا تلاحظ ؟

$$\begin{array}{|c|c|} \hline ((-4) \times 3) \times (-7) & (-4) \times (3 \times -7) \\ \hline (-12-) \times (-7-) & (-4) \times (-21-) \\ \hline 84 & 84 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline (2 \times (-9)) \times 4 & 2 \times ((-9) \times 4) \\ \hline (-18-) \times 4 & 2 \times (-36-) \\ \hline 72- & 72- \\ \hline \end{array}$$

تلاحظ أن:

تلاحظ أن:

$$((-4) \times 3) \times (-7) = (-4) \times (3 \times -7)$$

$$(2 \times (-9)) \times 4 = 2 \times ((-9) \times 4)$$

أي أنه :

إذا كانت a ، b ، c أعداداً صحيحة ، فإن :

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

وتسمى هذه الخاصية خاصية التجميع بالنسبة لعملية ضرب الأعداد الصحيحة.

هل عملية قسمة الأعداد الصحيحة تجمعية؟ أعط مثالاً يوضح ذلك.

رابعاً : خاصية التوزيع :

تأمل ما يلي ؟ ماذا تلاحظ ؟

(أ)

$$(5 \times 12-) + (6 \times 12-)$$

$$(60-) + (72-)$$

$$132-$$

$$(5 + 6) \times (12-)$$

$$11 \times (12-)$$

$$132-$$

تلاحظ أن:

$$(5 \times 12-) + (6 \times 12-) = (5 + 6) \times (12-)$$

(ب)

$$((10-)(7-)) + ((7-)(7-)) = ((10-)(7-)) \times (7-)$$

$$70 + 49$$

$$119$$

$$(17-)(7-)$$

$$119$$

تلاحظ أن:

$$((10-)(7-)) + ((7-)(7-)) = ((10-)(7-)) \times (7-)$$

أي أنه :

إذا كانت a, b, c أعداداً صحيحة؛ فإن :

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

نسمى هذه الخاصية خاصية توزيع الضرب على الجمع .

خامساً : العنصر المحادي :

تأمل ما يلي ؟ ماذا تلاحظ ؟

$$7 = 7 + 0 , \quad 7 = 0 + 7$$

$$12- = (12-) + 0 , \quad 12- = 0 + (12-)$$

تلاحظ أن :

$$(12-) = (12-) + 0 = 0 + (12-) , \quad 7 = 7 + 0 = 0 + 7$$

أي أنه :

لكل $a \in \mathbb{C}$ ؛ فإن :

$$1 = 1 + 0 = 0 + 1$$

الصفر هو العنصر المحادي الجمعي .

تأمل ما يلي ؟ ماذا تلاحظ ؟

$$15- = (15-) \times 1 , \quad 15- = 1 \times (15-)$$

$$\lambda = \lambda \times 1 , \quad \lambda = 1 \times \lambda$$

تلاحظ أن :

$$\lambda = \lambda \times 1 = 1 \times \lambda , \quad 15- = (15-) \times 1 = 1 \times (15-)$$

أي أنه :

لكل $a \in \mathbb{Z}$ فإن :

$$a = a \times 1 = 1 \times a$$

الواحد هو العنصر المحادي الضريبي .

ćمارين ومسائل

[١] أو جد ناتج ما يلي ، حدّد أيّاً من العمليات إبدالية :

ب) $(74 - 22) + 25 - 32$

ج) $(48 - 112) + 56 - 7$

هـ) $(10 - 34) \times (-12) \times (64 - 0)$

[٢] استخدم خاصية التجميع في إيجاد ناتج ما يلي :

ب) $(100 - 105) + (218 - 519) + 200$

جـ) $(432 - 513) + 98 - (12 - 18) \times 10$

هـ) $(13 - 25) \times 200 - (18 - 20) \times (24 - 0)$

[٣] استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج ما يلي :

ب) $(10 + 4) \times 17 \times 21 \times (20 + 7)$

جـ) $((5 - 15) \times 25) + ((9 - 29) \times (14 - 0))$

هـ) $(308 - 5) \times (27 \times 2005)$

الأسس (القوى)

٨ : ٢

تعلم من دراستك السابقة أن : $3^3 = 3 \times 3 \times 3$

$$5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5$$

وبالمثل عندما نضرب عدداً سالباً في نفسه عدة مرات فإننا نكتبه على النحو التالي : $(-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) = (-5)^4$
وبصورة عامة :

إذا كان : $a \in \mathbb{C}$ ، $\exists n \in \mathbb{N}$:

$a^n = a \times a \times \dots \times a$ n من المرات و تقرأ a أس n

أو a مرفوع للقوة n يسمى (a) الأساس ، (n) الأسس .

مثال (١) اكتب ما يلي على شكل قوى:

(أ) $5 \times 5 \times 3 \times 3 \times 3$

(ب) $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

الحل :

(أ) $5^3 \times 3^3 = 5 \times 5 \times 3 \times 3 \times 3$

(ب) $(-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) = (-7)^5$

مثال (٢) احسب قيمة كل مما يلي :

(أ) $2^3 \times 3^3$

(ب) $(-5)^3 \times 3^3$

(ج) إذا كان $a = -4$

الحل:

$$72 = 9 \times 8 = 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 = 3^3 \times 2^3 \quad (أ)$$

$$(5-) \times (5-) \times (5-) \times 3 \times 3 = 5^3 \times 3^2 \quad (ب)$$

$$1125 - = 125 - \times 9 =$$

$$(64-) = (4-) \times (4-) \times (4-) = 4^3 \quad (ج)$$

ضرب القوى المتحدة الأساسات:

$$\text{عرفت أن: } 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4$$

$$5 \times 5 \times 5 = 5^3$$

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^6 \quad \therefore$$

$$5^7 =$$

$$5^7 = 5^{3+4} = 5^3 \times 5^4 \quad \text{أي أن:}$$

وبصورة عامة:

إذا كان $a \in \mathbb{C}^*$ ، $m, n \in \mathbb{Z}$ ، فإن :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

عند ضرب القوى المتحدة الأساسات نجمع أساسها

قسمة القوى المتحدة الأساسات :

كيف يمكن أن نوجد خارج قسمة ${}^9 \overline{)3}$ ؟

$$\frac{{}^3 \times {}^3 \times {}^3 \times {}^3 \times {}^2 \times {}^2 \times {}^2 \times {}^2}{{}^2 \times {}^2 \times {}^2 \times {}^2 \times {}^2} = \frac{{}^9 \overline{)3}}{{}^5 \overline{)3}} = {}^9 \overline{)3} \div {}^5 \overline{)3}$$

تعلم أن :

إذا اختصرنا من البسط بقدر المقام فإن خارج قسمة :

$${}^4 \overline{)3} = {}^3 \times {}^3 \times {}^3 \times {}^3 = \frac{{}^3}{{}^4}$$

أي أن :

وبصورة عامة :

إذا كان $a \in \mathbb{C}$ ، $b, m \in \mathbb{Z}$ ، فإن :

$$a \div b^m = \frac{a}{b^m} , \quad b \leq m$$

عند قسمة القوى المتحدة الأساسات نطرح أساسها .

مثال (٣)

أوجد ناتج ما يلي :

أ) ${}^5 \overline{)2} \times {}^7$

ب) ${}^3 \overline{)7} \div {}^6 \overline{)7}$

ج) $({}^3 - {}^4) \times ({}^3 - {}^4)$

د) ${}^4 \overline{)2} \div {}^4 \overline{)2}$

الحل:

$$\textcircled{أ} \quad ١٢ = ٥ + ٧ = ٥ \times ٧$$

$$\textcircled{ب} \quad ٣٧ = ٣ - ٦٧ = \frac{٧}{٣٧} = ٧ \div ٦$$

$$\textcircled{ج} \quad ٧(٣-) = ٣+٤(٣-) = ٣(٣-) \times ٤(٣-)$$

$$\textcircled{د} \quad ٤ \cdot ١ = \frac{١٦}{١٦} = \frac{٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢}{٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢} = ٤ \times ٢ \div ٤ \times ٢$$

$$\textcircled{أي أن:} \quad ١ = ٤ \cdot ٢ = \frac{٤ \cdot ٢}{٤ \cdot ٢}$$

ملاحظة:

$$\textcircled{أ} \neq \textcircled{ب} \neq \textcircled{ج}$$

ćارين ومسائل

[١] اكتب ما يلي على شكل أسس:

$$\textcircled{أ} \quad ٧ \times ٧ \times ٧ \times ٨ \times ٨ \times ٨ \quad \textcircled{ب} \quad ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٥ \times ٥ \times ٥$$

$$\textcircled{ج} \quad (٦-) \times (٦-) \times (٦-) \times (٤-) \times (٤-) \times (٤-) \times (٤-) \times (٤)$$

[٢] اكتب ما يلي كحاصل ضرب :

$$\textcircled{أ} \quad ١٢ \times ٤٧ \quad \textcircled{ب} \quad ١١ \times ٦(٥-) \quad \textcircled{ج} \quad ٩(١)$$

[٣] احسب قيمة كل مما يلي :

٣٢×٢٩	$٤(٥-) \times ٧$
$٤١ \times ٥(٢-)$	$٢(٥-) \times ٦(٣-)$
$٣٢ \times (٣-)$	$٣(٧-) \times ٤$

[٤] حلل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية ، ثم اكتبها على شكل قوى:

$$\text{ج) } 19208$$

$$\text{ب) } 18000$$

$$\text{أ) } 864$$

[٥] أوجد ناتج ما يلي :

$$\begin{array}{lll}
 \text{ج) } 4^3 \times (-2)^{15} & \text{ب) } (-2)^{12} \times 7^3 & \text{أ) } 7^5 \times 7^3 \\
 \text{ه) } 23^8 \div 23^{12} & \text{د) } (-3)^4 \times (-3)^6 & \text{و) } (-5)^4 \div (-5)^6 \\
 \text{ز) } 6^{12} \div 6^3 \times 6^9 & \text{ي) } (-8)^{15} \div (-8)^9 & \text{ح) } 11^5 \div 11^3 \times 11^2
 \end{array}$$

[٦] إذا كان: $m = 6 - 4$ ، $n = 5 + 1$ ، $o = 9 \times 11$

فأوجد ناتج: ب) $o^n \div m^5$

ćمارين عامة

٩ : ٢

[١] اكتب النظير الجمعي لـ كل من الأعداد التالية:

$$19+ , 109+ , 98+ , 0 , (50-) , (970-)$$

[٢] ضع < أو > في لتجعل العبارات التالية صحيحة:

$$34 - \boxed{} \quad \text{ب) } 34 - \boxed{} \quad \text{أ) } 25 - \boxed{} \quad 38 - \boxed{}$$

$$16 - \boxed{} \quad \text{ج) } 27 - \boxed{} \quad 72 - \boxed{} \quad 72 - \boxed{}$$

[٣] استخدم خط الأعداد لإيجاد ناتج ما يلي:

$$\text{ب) } (8+) - 10 \quad \text{أ) } 4 + (8-)$$

$$\text{د) } (3-) + 7 - 5 \quad \text{ج) } 5 - (4-)$$

[٤] أوجد ناتج ما يلي :

$$\text{ب) } (982 - 632) + (425 - 728) \quad \text{أ) } (102 - 173) - (832 - 619)$$

$$\text{د) } (4 - 832) \div (5 - 70) \quad \text{ه) } (17 - 5) \times (12 - 3)$$

$$\text{و) } (5 - 17) \times (12 - 3) \quad \text{ز) } (11 - 382) \times (32 + 15) \times 8 \quad \text{ب) } 22 \times 55 \quad \text{ج) } 12 \times 542$$

[٥] استخدم خاصية التوزيع لإيجاد ناتج ما يلي :

$$\text{ب) } (11 \times 11) - (382 \times 11) \quad \text{أ) } (32 + 15) \times 8$$

$$\text{د) } 22 \times 55 \quad \text{ه) } 12 \times 542 \quad \text{ج) } 12 - 542$$

[٦] أوجد ناتج ما يلي :

$$\text{ج) } 3^4 \times 3^2 \quad \text{ب) } 4^2 \times 6^2 \quad \text{أ) } 3^2 \times 8^2$$

$$\text{د) } 6^3 \div 6^4 \quad \text{ه) } 16^2 - 16^2 \quad \text{ج) } 32 \div 32^8$$

[٧] اطرح ٩٥ من ٦٢

[٨] أضف (-٢٠) إلى (-٦٥)

[٩] اقسم -٣٢ على ٤

[١٠] أوجد حاصل ضرب (-١٠) في ١٢

٢ : اختبار الوحدة

[١] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارات

الخطأ لكل مما يأتي :

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| أ) $4 \in \mathbb{N}$ | ب) $2 \in \mathbb{Z}$ | ج) $18 \notin \mathbb{Z}$ |
| هـ) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$ | و) $\{4, 2\} \subset \mathbb{C}$ | د) $\{1, 0, -1\} \subset \mathbb{N}$ |

[٢] ضع < أو > أو = في لجعل العبارات التالية صحيحة :

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| أ) $12 - 24 = 7$ | ب) $7 - 24 = 12$ | ج) $7 - 12 = 24$ |
| . | | |

[٣] مثل العمليات التالية على خط الأعداد :

$$4 = 7 + (3 - 2) + (4 - 6)$$

[٤] أوجد ناتج ما يلي :

أ) $(5 - 7) + (9 + 6)$	ب) $(2 - 4) \times (12 - 6)$
ج) $6 \times (4 - 8) \div (32 - 42)$	هـ) $(3 \times 12) + (7 \times 12) + (3 + 4) \times 35 - 36$

[٥] أوجد ناتج ما يلي بأسط طرق :

$$(12 + 48) - 36 = 36$$

[٦] احسب قيمة ما يلي :

أ) $(7 - 2)^3$	ب) 4×4^2
ج) $(2 - 3)^4$	د) $8 \div 8^6$

الوحدة الثالثة

الحدود الجبرية

١ : ٣ الحدود الجبرية

الحد الجبري :

تعلم أنه: إذا كان طول ضلع مربع ٥ سم ؛ فإن: محيطه = 4×5 سم .
وإذا كان طول ضلع مربع ٧,٥ سم فإن : محيطه = $4 \times 7,5$ سم .
وإذا أردنا أن نعبر بشكل عام عن محيط مربع مهما كان طول ضلعيه ، فإننا نرمز لطول ضلعيه بحرف ولتكن "ل" سم ؛ فيكون محيطه = $4 \times l$ سم .
وإذا كان لدينا مستطيل : طوله س سم وعرضه ص سم ؛ فإن:
محيطه = $2 \times s + 2 \times c$ سم
أو محيط المستطيل = $2 \times (s + c)$ سم
ومساحة المستطيل = $s \times c$ سم^٢
وإذا كان ثمن كراسة ٤ ريال فإن ثمن ٥ كراسات = 5×4 ريال .
فإذا اشتري محمد س كراسة فإن مقدار ما يدفعه للبائع = $40 \times s$ ريالاً .
تلاحظ في الأمثلة السابقة أننا استخدمنا الأحرف لتتمثل أعداداً .
تسمى هذه الأحرف متغيرات لأنها غير محددة القيمة ، ويمكن أن تأخذ أي قيمة عددية .

وعند استخدام الأعداد والمتغيرات في حاصل الضرب نحصل على تعابير جبرية، يسمى كل منها حدّاً جبراً .
والتعبير الجبري ($40 \times s$) يكتب اختصاراً ($40s$) حيث يسمى العدد ٤٠ المعامل ، والحرف س المتغير .
وبالمثل $s \times c$ تكتب س ص ، معاملها واحد و س ، ص هي المتغيرات .
ومثل هذه التعابير تسمى حدود جبرية .

الحد الجبرى :

هو عبارة عن حاصل ضرب معامل في متغير أو أكثر .

وإذا اخترفي المتغير من الحد الجبرى نسمى العدد (المعامل) حداً مطلقاً

مثال (١)

اكتب مكونات الحدود الجبرية التالية:

$$-20\text{ص}^2, 5\text{ص}, 3, \text{علن}, \frac{1}{3}\text{ل}$$

المتغيرات	المعامل	الحد الجبرى
ص	٢٠-	٢٠ ص
س ، ص	٥	٥ س ص
لا يوجد	٣	٣
ع ، ل ، ن	١	علن
، ب ، ل	٣	$\frac{1}{3}ل$

الحل:

مثال (٢)

اكتب ما يأتي في صورة حد جبرى:

أ) ثمن خمسة أكياس قمح .

ب) ضعف عمر سعيد .

ج) ٧ أمثال عدد .

الحل:

أ) نفرض أن: ثمن كيس القمح = س ريال

∴ ثمن خمسة أكياس قمح = ٥ س ريال

ب) نفرض أن: عمر سعيد = ل سنة

٦) ضعف عمر سعيد = ٢ ل سنة

ج) نفرض أن العدد = ص

٧) أمثال العدد = ٧ ص

مثال (٣)

إذا كان طول مستطيل يساوي ل سم، وكان عرضه يساوي ربع طوله؛ فما عرض المستطيل.

الحل: ٨) طول المستطيل = ل سم

فإن عرض المستطيل = $\frac{1}{4}$ ل سم

قيمة الحد الجبري:

لقد سبق أن تعرفت على عملية التعويض في دراستك السابقة وتمثل هذه العملية في استبدال المتغيرات بقيم عددية. وفيما يلي نعرض بعض الأمثلة لإيجاد القيمة العددية للحدود الجبرية.

مثال (٤)

إذا كان $a = 2$ ، $b = \frac{1}{2}$ ، $c = -3$ ؛ فأحسب القيمة العددية لما يأتي:

أولاً: $16ab - 25b^2c$ ثانياً: $2a - b + c$

الحل:

أولاً: القيمة العددية للحد الجبري: $16 \times \frac{1}{2} \times 2 - 25 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times (-3) = 18$

ثانياً: القيمة العددية للحد الجبري: $2 \times 2 - \frac{1}{2} \times 5 \times 2^2 = 10$

مثال (٥)

أوجد مساحة الدائرة التي نصف قطرها ٧ سم؛ ($\pi = \frac{22}{7}$)

الحل:

$$\text{مساحة الدائرة} = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 7^2 = 7 \times 7 \times \frac{22}{7} = 154 \text{ سم}^2$$

الحدود الجبرية المتشابهة:

$$\text{تعرف أن: } 3^2 = 3 \times 3, \quad 5^3 = 5 \times 5 \times 5$$

نقول وبشكل عام إن s^n تعني أن الأساس هو s والأسس n .
وي يكن تسمية الأساس بدرجة الأساس أو المتغير.

درجة المتغير هي قيمةأس ذلك المتغير.

أي أن :

ملاحظة: درجة متغير الحد المطلق تساوي صفر فمثلاً:

$$9^0 = 9 \text{ صفر، } s \neq 0$$

تأمل الآن الحدود الجبرية التالية:

$5^5, 29^2, -30^3$ س تسمى حدود جبرية متشابهة ، لأن لها المتغير نفسه والدرجة نفسها.

والحدود: $s^3, 3^3, -25^3$ أيضاً متشابهة ، لأن لها المتغير نفسه والدرجة نفسها.

وكذلك الحدود: $2^2s^2, 5^2s^2, 3^2s^2, s^2$ متشابهة ، لأنها تتكون من المتغيرات نفسها ، ولكل متغير الدرجة نفسها.

أما الحدود: $13^4b^2, 10^2b^3, -17^2b^3$ فهي حدود غير متشابهة لاختلاف درجة المتغيرات في كل حد منها عن الآخر .

والحدود: $s^3, 12s^3, 5s^3, 13^3b$ أيضاً غير متشابهة ، لاختلاف المتغيرات في كل حد منها عن الآخر .

ما سبق نستنتج أن :

الحدود الجبرية المتشابهة هي الحدود المتفقة في المتغيرات ودرجتها.

مثال (٦) اذكر أيّاً من الحدود الجبرية الآتية متشابهة وأيها غير متشابهة:

- أ) $4s^2 - 5s^2 + s^2$
 ب) $\frac{1}{3}s^2b^2 + 3s^2a^2 - 9s^2c^2$

الحل: أ) $4s^2 - 5s^2 + s^2$

حدود جبرية متشابهة لأنها متفقة في المتغيرات لها الدرجات نفسها .

- ب) $\frac{1}{3}s^2b^2 + 3s^2a^2 - 9s^2c^2$

حدود جبرية غير متشابهة لاختلاف المتغيرات في كل منها عن الآخر .

ćمارين وسائل

[١] اكتب مكونات الحدود الجبرية التالية:

$$3s^2 - 5s^3 + ab + \frac{2}{2}s^6$$

[٢] عُبّر جبرياً عن كل ما يأتي :

أ) حاصل ضرب عدد ص في ١٥ ب) ثلاثة أمثال العدد س

[٣] عُبّر جبرياً عن كل ما يأتي باستخدام رموز المتغيرات :

أ) ضعف طول محمود ب) خمسة أمثال راتب سلوى

ج) ثلاثة أمثال عمر جميلة د) ربع مساحة مربع .

[٤] إذا كان ثمن كيلو جرام شاي = س ريال، ثمن كيلو جرام سكر

= ص ريال، فأوجد ما يلي :

أ) ثمن ربع كيلو جرام سكر ب) ثمن نصف كيلو جرام شاي

ج) ثمن تسعه كيلوجرامات شاي د) ثمن عشرون كيلو جراماً سكر

[٥] مستطيل طوله ل سم ، وعرضه ع سم ، فأوجد :

أولاً: مساحته ، ثانياً: محیطه.

[٦] مثلث طول قاعدته ق سم ، وارتفاعه ع سم ؟

أولاً: عبر جبرياً عن مساحة هذا المثلث ،

ثانياً: إذا كان $ق = 2,5$ سم ، $ع = 4$ سم ؟ فما مساحة المثلث ؟

[٧] أوجد حجم الاسطوانة التي نصف قطرها نق = ٣ سم ، وارتفاعها

$$ع = \frac{6}{\pi} \text{ سم} \quad \text{علمًا بأن حجم الاسطوانة} = \pi نق^2 ع$$

[٨] إذا كان $س = \frac{5}{3}$ ، $ص = -\frac{1}{2}$ ، $ع = \frac{5}{6}$ ؛ فأوجد القيمة العددية

لكل مما يأتي :

- أ) س ص ع ب) ٤ س ع ج) س ع د) س ع

[٩] أكمل الجدول التالي :

س	ص	س ص	س ص ^٢	س	س ^٢	س ص ^٥	ص	س ص
						٣٠	٢	٣
٢-					٢		٢-	١-
			٨				٣-	
١								١
				٢٧-			٢	٣-

[١٠] ضع خطأ تحت الحدود الجبرية المتشابهة لكل مما يأتي :

أ) ع س ل ، ٥ ل س ع ، ٢٠ ع س ل ، س ١ ب

ب) س ص^٢ ، ٢ ص^٢ س ، ٥ س^٢ ص ، ١٠ س ص^٢

ج) ع^٢ ل^٢ م^٢ ، ١٠ ل^٣ ع^٢ م^٢ ، ٣ ل^٣ م ع

[١١] فيما يلي صل الحد الجبري من العمود الأيمن بالحد الجبري المشابه له من العمود الأيسر :

س ^٢ ص	س ص
٢ ج ^٢	٣ ب ج
- س ص	٧ س ^٢ ص
٥ س ص	٩ ج ^٢
٤ ع ل م	- ع ل م
٢ ب ج	

[١٢] اكتب : ا) : حددين جبريين متتشابهين ،

ب) : حددين جبريين غير متتشابهين

٢ : ٣ جمع الحدود الجبرية المتشابهة

احسب ما يلي :

تدريب

$$= ٣ + ٥ , \quad = (٦ -) + (٧ -)$$

$$= ٢ + (٧ -) , \quad = (٥ -) + ٨$$

إن القواعد المستخدمة في عملية جمع الأعداد الصحيحة يمكن استخدامها في عملية جمع الحدود الجبرية المتشابهة ،

تأمل ما يلي :

$$٤ س + ٥ س = ٩ س , \quad ١١ - = (١٣ -) + (١٨ -)$$

$$(٣ - ب) + ٣ ب = -٢ ب , \quad (٢ - ص^٢) + ٩ ص^٢ = ٧ ص^٢$$

ما سبق تلاحظ التالي :

عند جمع الحدود الجبرية المتشابهة يكون الناتج حداً جبراً يشابه الحدود التي تم جمعها ، ومعامله يساوي مجموع معاملات هذه الحدود .

مثال (١) اجمع ما يأتي :

$$1) ٩س^٢ ، ب) (-٨س ص) ، (-٥س ص)$$

$$ج) ٧ل^٣ ، ٥س صع ، (-١١س صع)$$

الحل :

$$ب) (-٨س ص) + (-٥س ص) = ١٣س ص$$

$$ج) ٧ل^٣ + (-٣ل^٣) = ٤ل^٣$$

$$هـ) ٥س صع + (-١١س صع) = -٦س صع$$

مثال (٢) أوجد مجموع ما يأتي :

$$1) ٤اب + ٤اب + ١ب ، ٢) (-٢ج) + (-٥ج) + (-٤ج)$$

$$٣) ٦هـ^٣ + ٥هـ^٣ + (-٩هـ^٣) ، ٤) ٤م^٣ + (-١٥م^٣) + ٦م^٣$$

الحل :

$$1) ٤اب + ٤اب + ١ب = ٩اب$$

$$٢) (-٢ج) + (-٥ج) + (-٤ج) = -١٢ج$$

$$٣) ٦هـ^٣ + ٥هـ^٣ + (-٩هـ^٣) = ٢هـ^٣$$

$$٤) ٤م^٣ + (-١٥م^٣) + ٦م^٣ = -١٠م^٣$$

مثال (٣)

إذا علمت أنَّ ثمن قميص س ريالاً، وكان ثمن البنطلون ثلاثة أمثال ثمن

القميص فكم يكون ثمنهما؟

الحل :

$$\therefore \text{ثمن القميص} = \text{س ريالاً} , \therefore \text{ثمن البنطلون} = ٣ \text{س ريالاً} .$$

$$\therefore \text{ثمن القميص وثمن البنطلون معاً} = \text{س ريالاً} + ٣ \text{س ريالاً} = ٤ \text{س ريالاً} .$$

مثال (٤)

إذا علمت أن طول مستطيل س متراً، وعرضه ثلثي طوله فما محيطه؟

الحل :

$$\text{طول المستطيل} = \text{س متراً} , \quad \therefore \text{عرض المستطيل} = \frac{2}{3} \text{ س متراً} .$$

$$\text{محيط المستطيل} = 2 (\text{الطول} + \text{العرض})$$

$$\begin{aligned} & 2 \left(\text{س} + \frac{2}{3} \text{س} \right) = \\ & 2 \left(\frac{3\text{s} + 2\text{s}}{3} \right) = \\ & 2 \left(\frac{5}{3} \text{س} \right) = \left(\frac{10}{3} \text{س} \right) \text{ متراً} \end{aligned}$$

ćمارين ومسائل

[١] اجمع رأسياً :

$$\begin{array}{r} 7\text{س} \\ \underline{- 4\text{س}} \\ 3\text{س} \end{array} \quad \begin{array}{r} 15\text{ل}\text{م} \\ \underline{- 35\text{ل}\text{م}} \\ 20\text{ل}\text{م} \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 - 15\text{س}^2 \\ \underline{+ 25\text{س}^2} \\ 7\text{س} \end{array}$$

[٢] صل العملية من العمود

الأيمن بنتائجها من العمود

الأيسر ، في الجدول :

الناتج	العملية
14s^2	$11\text{s}^3 + \text{s}$
4s^3	$(-\text{s}^5) + (-\text{s}^9)$
-14s^2	$20\text{s}^6 + (-6\text{s}^2)$
14s^5	$(-\text{s}^9) + \text{s}^5$
-4s^3	$-(\text{s}^3 - 3\text{s}^2) + \text{s}^2$
-4s^2	

[٣] أوجد ناتج ما يأتي :

(١) $٢٣ - ٢٥ + ٢٦ - ٢٩$

(٢) $(-٧ - ٣) + (-٤ - ٣) + (-٣ - ٢)$

(٣) $٣١٧ + (-٣٩)$

(٤) $٢٣ - ١٥ + (-١٥ - ٢٣)$

[٤] أوجد ناتج ما يأتي :

(١) $٨ - ٩ + (-٩ - ٨)$

(ب) $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right)$

(ج) $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right)$

(د) $٣ + ٣ - ٢ + (-٢ - ٣) + (٥ - ٤)$

[٥] إذا كان $s = ٢$ ، $c = ٣$ ؛ فأوجد القيمة العددية للمجموع فيما يأتي :

(١) $٣s + ٥c$

(ب) $\frac{2}{3}s + \frac{1}{6}s$

[٦] إذا كان عمر هشام س سنة ، وعمر والده خمسة أمثال عمره ، فما عمر

كل منهما؟

[٧] مثلث أطوال أضلاعه $٣s$ ، $٥s$ ، $٧s$ من السنتيمترات ، أوجد محيطه.

[٨] مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه ٥ ل سم ، أوجد محيطه.

[٩] مستطيل عرضه س من الأمتار وطوله ضعف عرضه ، فكم يكون محيطه؟

[١٠] ثلاثة حدود جبرية إذا كان الحد الأول ٥ س ، الحد الثاني ضعف الحد الأول

والحد الثالث ثلاثة أمثال الحد الثاني ، فأوجد مجموع الحدود الثلاثة؟

٣ : طرح الحدود الجبرية المتشابهة

تأمل الأمثلة التالية :

$$12 = 5 + 7 = (5 -) - 7$$

$$12 - = (10 -) + 3 = 10 - 3$$

$$2 - = 7 + (9 -) = (7 -) - (9 -)$$

$$8 - = (5 -) + (3 -) = 5 - (3 -)$$

إن القواعد المستخدمة في عملية طرح الأعداد الصحيحة ، يمكن استخدامها في عملية طرح الحدود الجبرية المتشابهة ، وادرس الأمثلة التالية ، ماذا تلاحظ ؟

$$7s - 3s = 7s + (-3s) = 4s$$

$$3c - (-6c) = 3c + 6c = 9c$$

$$(2u^2 - 5u^2) + (4u^2 - 7u^2) = (-2u^2) - (5u^2)$$

$$(-3s^3) - 5s^3 = (-3s^3) + (-5s^3) = -8s^3$$

ومن مثل هذه الحالات نستنتج أن :

عملية طرح الحدود الجبرية المتشابهة هي عملية جمع للمطروح منه مع النظير الجمعي للمطروح ، ويكون الناتج حدًّا جبراًً مشابهاًً للحدود التي تم طرحها ، ومعامله يساوي المجموع الجبري لمعاملات هذه الحدود .

مثال (١)

أ) اطرح

$25s^2$ من $29s^2$

ب) اطرح $(-3c^3)$ من $(-9c^3)$

ج) من $(-13h)$ اطرح $(-15h)$

الحل:

- أ) $29 - 25 = 4$ س^٢ = س^٢ + (25 - 29)
- ب) (-9 ص^٣) - (-3 ص^٣) = (9 ص^٣) + (-3 ص^٣) = 6 ص^٣
- ج) (13 هـ و) - (15 هـ و) = (15 هـ و) + (-13 هـ و) = 2 هـ و

مثال (٢)

أوجد ناتج ما يأتي : أ) ٣ س٢ ص٢ - ٧ س٢ ص٢ + ٥ س٢ ص٢

$$\text{ب) } \frac{2}{3} s^2 - 5 s^2$$

$$\text{أ) } 3 s^2 c^2 - 7 s^2 c^2 + 5 s^2 c^2$$

الحل:

$$= 3 s^2 c^2 + (-7 s^2 c^2) + 5 s^2 c^2$$

$$= 8 s^2 c^2 + (-7 s^2 c^2) = s^2 c^2$$

$$\text{ب) } \frac{2}{3} s^2 - 5 s^2 + (-5 s^2)$$

$$= \frac{2 s^2 + (-15 s^2)}{3}$$

$$= \frac{13 s^2}{3}$$

مثال (٣)

حدان جبريان مجموعهما ٢٥ س، فإذا كان الحد الأول ١٢ س

فما هو الحد الثاني؟

الحل: مجموع الحدين = الحد الأول + الحد الثاني

$$12s + \boxed{\dots} = 25s$$

الحد الأول (١٢ س) أصبح المجموع (٢٥ س).

إذن هذا الحد الثاني هو الفرق بين المجموع والحد الأول.

$$\therefore \text{الحد الثاني} = 25s - 12s = 13s$$

ćمارين ومسائل

[١] أوجد ناتج ما يأتي :

- ب) $5 \text{ ص} - 12 \text{ ص}$
 ج) $(28 \text{ كم} - 25 \text{ كم}) - 3 \text{ س}^3$

[٢] أكمل المجدول التالي :

الناتج	المطروح	المطروح منه
.....	٣ س	٧ س
٣ س -	١٥ س
.....	٢ س٢ ص	٥ س٢ ص -
٤ س	٤ س٧
٩٨ ب	١٢ ب
.....	١٢ - ج٣	١٥ - ج٣
١١ س٣ ع٢	٦ س٣ ع٢

[٣] من 25 س^3 اطرح 12 س^2 ب) من $(\frac{2}{3} \text{ ه})$ اطرح $\frac{3}{5} \text{ ه}$

[٤] اطرح $(-\text{س}^2 \text{ ص})$ من $15 \text{ س}^2 \text{ ص}$

ب) (-12 ج) من (-125 ج)

[٥] أوجد ناتج ما يأتي :

أ) $8 \text{ س}^2 - 3 \text{ س}^2 - 11 \text{ س}^2$
 ب) $7 \text{ لـ م} - 5 \text{ لـ م} - \text{لـ م}$

ج) $5 \text{ بـ ٣} + 25 \text{ بـ ٢} - 13 \text{ بـ ١}$ د) $\frac{3}{5} \text{ س}^2 - \frac{2}{5} \text{ س}^2 - \text{س}^2$

[٦] حدان جيريان مجموعهما 15 س^3 فإذا كان أحدهما 7 س^3 ؟ فما هو الحد الآخر؟

- [٧] لدى تاجر ١٢٠ ص من العسل . باع منها ٧٥ ص ؟ فكم تبقى معه ؟
- [٨] ثلاثة حدود جبرية مجموعها ٥٣ كم . إذا كان الحد الأول ١٢ كم ، والحد الثاني ٢٥ كم ؟ فما هو الحد الثالث ؟
- [٩] حديقة منزل مستطيلة الشكل محيطها ٣٦ سمتراً ، وعرضها ٨ سمتراً ؛ فما طولها ؟

٤ : ضرب الحدود الجبرية

تأمل ما يلي :

$$7^2 = 7 \times 7 , \quad 6 = 3 \times 2$$

$$س \times ص = س ص , \quad س \times س = س^2$$

$$16 = 13 \times 2 \quad (1 \times 1) \times (3 \times 2)$$

$$(-س ص) \times (-2 - 8) = (-2 - 8) \times (س \times ص)$$

$$س^2 ص = 16$$

وعليه نستنتج أنه :

عند ضرب حد جبري في آخر : نضرب المعاملات في بعضها ، ثم نضرب التغييرات في بعضها ؛ فنحصل على حد جيري جديد .

وعند الضرب نستخدم القواعد نفسها التي توصلنا إليها في عملية ضرب الأعداد الصحيحة .

مثال (١) أوجد ناتج الآتي :

$$(1) ل \times 3 ل$$

$$(2) ٤٢ ب \times (-ب^2)$$

$$(3) -4 س^2 ص \times (-3 س ص)$$

الحل:

$$1) L \times 3L = (1 \times 3) \times (L \times L) = 3L^2$$

$$2) 4b \times (-ab^2) = 4b \times ((1-a)b^2) = 4b^3 - 4ab^3$$

$$= 4b^3 - 4ab^3$$

$$3) -4s^2c \times (s^3 - sc)$$

$$= (-4 \times s^3) \times (s^2c - sc) =$$

$$= 12s^3c$$

مثال (٢)

اضرب الحدود التالية:

$$1) 2sc, 7sc$$

$$2) -ab, -ab^2$$

$$3) \frac{1}{2}nm^2, nm^3$$

الحل:

$$1) 2sc \times 7sc =$$

$$= (2 \times 7) \times (sc \times sc) =$$

$$= 14s^2c^2$$

$$2) -ab \times (-ab^2) =$$

$$= ((-1) \times (-1)) \times (b \times b^2) =$$

$$= a^2b^3$$

$$3) \frac{1}{2}nm^2 \times nm^3 = (\frac{1}{2} \times n) \times (m^2 \times m^3) =$$

$$= \frac{1}{2}n^2m^5$$

مثال (٣) أوجد كلاً ما يأتي في أبسط صورة:

$$١) - ٢٣ \times ٤٣ \quad ، \quad ب) \frac{٢}{٩} س^٣ \times (-٣٦ س ص)$$

الحل:

$$١) - ٢٣ \times ٤٣ = (٤ \times ٣) \times (-٢٣ \times ب)$$

$$= ١٢٣ \times ب$$

$$ب) \frac{٢}{٩} س^٣ \times (-٣٦ س ص)$$

$$= (\frac{٢}{٩} \times (-٣٦)) \times (س^٣ \times س) \times (ص \times ص)$$

$$= -٨ س^٣ ص^٢$$

مستطيل طوله ٤ سم وعرضه نصف طوله ؛ أوجد مساحته.

الحل: طول المستطيل = ٤ سم

$$\therefore \text{عرض المستطيل} = \frac{\text{نصف الطول}}{٢}$$

$$\therefore \text{عرض المستطيل} = ٤ \text{ سم} \div ٢ = ٢ \text{ سم}$$

$$\text{مساحة المستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$= ٤ \text{ سم} \times ٢ \text{ سم}$$

$$= (٢ \times ٤) \times (س \times س) \text{ سم}^٢$$

$$= ٨ س^٢ \text{ سم}^٢$$

ćمارين ومسائل

[١] أوجد حاصل الضرب الآتي :

$$أ) ١٣ \times ١٥ \times ب$$

$$ب) ٤ س \times (-س ص)$$

$$ج) -ل م \times (-٣ ل م)$$

١٠٠

[٢] اضرب الحدود التالية:

$$\text{ب) } -2s^2, 3s, -s \quad \text{ج) } -\frac{2}{3}u, 9s^2$$

[٣] صل العمود الأيمن بما يساويه من العمود الأيسر:

$\begin{matrix} 15ab \\ 6s^2 \\ 15ab \\ -25ab \end{matrix}$	$\begin{matrix} -\frac{1}{6}s \\ -36s \\ 10b^2 \\ -5b \end{matrix}$
---	---

[٤] اكتب كلاً مما يأتي في أبسط صورة:

$$\begin{matrix} \text{ب) } -4m^2l^2b \\ \text{ج) } \frac{3}{5}h \times \frac{5}{3}h \end{matrix}$$

[٥] أوجد ناتج الآتي:

$$\begin{matrix} \text{ب) } s^2 \times s^3 \times 2s \\ \text{ج) } 3l^2m \times \left(-\frac{1}{2}l\right) \end{matrix}$$

[٦] أكمل الجدول التالي:

$-ab^2s^2$	$\frac{3}{2}b^2j$	$-2b^2bj$	a^2b	x	
			$2ab^3$	ab^2	



[٧] إذا كانت $s = 2$ ، $ch = 3$ ، $u = -1$ ؛ فأوجد القيمة العددية لحاصل

ضرب الحدود التالية:

$$2sc, \frac{1}{4}chu^2, 4su^2$$

- [٨] قطعة أرض مربعة الشكل طول ضلعها س متراً فما مساحتها ؟
- [٩] أوجد حاصل ضرب الحدود التالية : $3 \text{ سم} \times -\frac{1}{9} \text{ سم}$
- [١٠] إذا كانت $L = -1$ ، $m = 3$ ؛ فأوجد القيمة العددية لحاصل الضرب $(S \times C)$ ؛ علماً بأن: $S = 4L^2$ ، $C = -2L$

[١١] إذا كانت $S = 2$ ، $C = 3$ ؛ فأوجد القيمة العددية للآتي :

$$A) S^4 \quad B) S \times C^2 \quad C) S^{C+1} \times S^C$$


[١٢] في الشكل (٣ - ١) :

أ) ب ج مثلث طول قاعدته ب سم وارتفاعه ج سم

أ) عبر عن مساحة المثلث ب جرمياً .

ب) أوجد مساحة المثلث ب ج إذا كانت : ق = 8 سم ، ع = 4 سم .

علماً أن مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$.



شكل (٣ - ١)

٣ : قسمة الحدود الجبرية

نعرف أن:

$$14 \div 2 = 7 \quad \text{لأن } 7 \times 2 = 14$$

وبالمثل: $4s^2c \div 2s = 2c$ ، لأن $2s \times 2s = 4s^2$
 غالباً ما نتأكد من صحة ناتج القسمة بضرب خارج القسمة في المقسم على
 فنحصل على المقسم.

« لأن عملية القسمة عكسية بالنسبة لعملية الضرب »

ويمكن كتابة القسمة في صورة بسط ومقام ، حتى يمكن إجراء عملية
 الاختصار على النحو التالي:

$$\frac{25s^2c}{5sc} = \frac{25}{5} \times \frac{s \times s}{s} \times \frac{c}{c} = 5 \times 5sc = 25s^2c$$

التحقق:

ما سبق نجد أنه :

عند قسمة حد جبري على آخر نقسم معامل المقسم على معامل
 المقسم عليه ، ونقسم متغيرات المقسم على متغيرات المقسم عليه
 فنحصل على حد جبري جديد .

وعند القسمة نستخدم القواعد نفسها ، التي توصلنا إليها في عملية
 قسمة الأعداد الصحيحة .

مثال (١) أوجد ناتج الآتي :

$$(1) 8s^2 \div 4b \quad (2) -16b \div 4b$$

$$(1) 8s^2 \div 4b = \frac{8s^2}{4b} = \frac{s^2}{b}$$

الحل:

$$(2) -16b \div 4b = \frac{-16b}{4b} = -4$$

بسط الكسور التالية:

$$(1) \frac{4s^3c}{2sc} = \frac{2s^2}{1}$$

مثال (٢)

$$(2) \frac{2s^3c}{2sc} = \frac{s^2}{1}$$

الحل:

$$(3) \frac{m^2u^2l^2}{2ulm} = \frac{m^2u^2l}{2}$$

مثال (٣)

 اقسم $42s^2c^2u^2$ على $(-6su)$ ؛ ثم أوجد القيمة

 العددية لناتج القسمة إذا كانت $s=2$ ، $c=1$ ، $u=-2$
الحل:

$$\frac{42s^2c^2u^2}{(-6su)} = \frac{7s^2c^2u}{1}$$

 القيمة العددية = $(-2) \times 1 \times 2 \times (-7) = 28$

مثال (٤)

سجادة مستطيلة الشكل ، مساحتها 5 م^2 . فإذا كان طولها 1 م ، فما عرضها؟

الحل: عرض السجادة = مساحتها ÷ طولها

$$= 50 \text{ س ص سم}^2 \div 10 \text{ س سم}$$

$$\cdot \times \frac{5}{5} = 5 \text{ ص سم}$$

تاریخ و مسائل

[١] أوجد ناتج الآتي:

$$\text{ب) } -24b^5 \div 12b^2 \quad \text{ج) } 14s^2c \div 7s$$

[٢] بسْط الكسور التالية:

$$\frac{\frac{1}{2} ج ۳ ب ۲ ۱۲۰ -}{\frac{1}{2} ب ۲ ج ۷} \quad (ج) \quad \frac{\frac{۱}{۲} ن ۳ م ۴ -}{\frac{۱}{۲} ن ۲ ل ۴} \quad (ب) \quad \frac{\frac{۱}{۳} ص ۲ س ۳ }{\frac{۱}{۳} س ۲ ص }$$

[٣] أكمل الفراغ التالي :

$$١) س ع \times س ع = \times$$

$$\text{ب) } 15 = 5 \times \dots \dots$$

$$\text{و هـ}^2 = \dots \times \text{هـ}^2 (\rightarrow)$$

[٤] اختصر كلاً من الكسور التالية:

$$\frac{\frac{۳}{۲} هـ}{۲ هـ}) ج) \quad \frac{۱۶۴}{۱۲۵} سـ) ب) \quad \frac{۱۸}{۱۴} بـ) أ)$$

[٥] أكمل الجدول التالي :

$\frac{2}{4} \times \frac{2}{4}$	$\frac{2}{2} \times \frac{2}{2}$	$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$	$\frac{2}{12} \times \frac{2}{12}$	$\frac{2}{24} \times \frac{2}{24}$
			$\frac{2}{12} \times \frac{2}{12}$	$\frac{2}{24} \times \frac{2}{24}$

[٦] إذا كان حاصل ضرب حددين جبريين هو $100 \text{ س}^3 \text{ ع}$ ، وكان أحدهما يساوي $25 \text{ س} \text{ ع}$ ، فما الحد الآخر؟

[٧] اقسم $28 \text{ ل}^4 \text{ م}^3$ على $7 \text{ ل}^2 \text{ م}^2$ ، ثم تحقق من الناتج؟

[٨] إذا كانت $a = 2$ ، $b = 1$ ، $c = -3$ ، فأوجد القيمة العددية لخارج قسمة L على M ، علماً بأن : $L = 2 \times b^2 c^2$ ، $M = -1 \times b^2 c$

[٩] مستطيل مساحته $27 \text{ س}^2 \text{ سم}^2$ وعرضه $3 \text{ س} \text{ سم}$ ، فما طوله؟ ثم أوجد

القيمة العددية لمساحته إذا كانت $S = 2$

[١٠] مثلث مساحته $16 \text{ س}^2 \text{ سم}^2$ وطول قاعدته $8 \text{ س} \text{ سم}$ ، أوجد ارتفاعه ؟

علماً أن : [مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ القاعدة \times الارتفاع].

[١١] حاصل ضرب حددين جبريين $(-144 \text{ ل}^3 \text{ م}^2)$ ، وكان أحدهما

(-24 س ل م) ، فما هو الحد الآخر ؟

٣: المقدار الجبري

تأمل الحدين الجبريين: $3s + 5b$ ، تجد أنهما غير متشابهين فإذا جمعنا هذين الحدين نحصل على: $3s + 5b$ ؛ وإذا طرحنا هذين الحدين فإننا نحصل على: $3s - 5b$. وكل من هاتين النتيجتين تسمى مقداراً جبرياً، كذلك التعبير الجبرية الآتية:

$$\text{أ) } -s^4 + s^2 + s$$

$$\text{ب) } \frac{3}{4}UL^2$$

$$\text{ج) } 2s^2 + 2s^2 - 2s^2 + s^4$$

تسمى مقادير جبرية ، أي أن:

المقدار الجبري: هو ما تكون من حد أو أكثر

ويسمى المقدار المكون من حد واحد مقداراً ذا حد واحد (أو مقدار أحادي) ، والمقدار المكون من حدين يسمى مقداراً ذا حدين (أو مقدار ثنائي) ، والمقدار المكون من ثلاثة حدود يسمى مقداراً ذا ثلاثة حدود (أو مقدار ثلاثي) . . . وهكذا .

(١) مثال

اذكر عدد الحدود في المقادير الجبرية التالية :

$$\text{ب) } -4s^3 + 10s$$

$$\text{ج) } s^3 - 3s + 5$$

الحل:

- ١) $3s - 10s^2$ مقدار مكون من حدین .
- ب) $-4s^3 + 5s^2$ مقدار مكون من حد واحد .
- ج) $s^2 - 3s + 5$ مقدار مكون من ثلاثة حدود .
- د) $6s^2 + 5s - 10s^3$ مقدار مكون من أربعة حدود .

مثال (٢)

رتب المقدار التالي تنازلياً وتصاعدياً:

$$s^0 - 2s^2 + 5s^5 - 10s^3 + 4s^4 + 2s^2$$

الحل:

أولاً: الترتيب التنازلي حسب قوى س :

$$s^0 + 2s^2 + 5s^5 + 4s^3 - 2s^2 - 10s^4$$

ثانياً: الترتيب التصاعدي حسب قوى س :

$$-10s^4 + 4s^3 + 5s^5 + 2s^2 + s^0$$

تمارين ومسائل

[١] اذكر عدد الحدود في المقادير الآتية ، وسمّها وفقاً لعدد حدودها :

- أ) $3s^2$
- ب) $3s^3 - 2s^2 + 1$
- ج) $a^2b^2 - h^2$
- د) $s^2 - 3s^3 + 2s^2 + 5s^0$

[٢] عِيْن المقادير الثلاثية من المقادير الجبرية التالية :

أ) $14s + 10$ ب) $7s^3 + 5sc - s^2$

ج) $\frac{2}{3}s + \frac{3}{2}c$ د) $5s^4 - \frac{1}{2}s^2c + 5s^2$

[٣] رتب كلاً من المقادير الآتية :

مرةً تنازلياً حسب قوى ص ، ومرة أخرى تصاعدياً حسب قوى ص

أ) $s^3 + 3sc^2 - 4s^2c + 9c^3$

ب) $5hc^3 + 3hc^2 + 2hc - 4h$

[٤] ثمن قلم س ريال وثمن كراسة ص ريال ؛ فما ثمن ٣ أقلام و ٤ كراسات ؟

[٥] حديقة على شكل مستطيل طوله س متراً وعرضه ص متراً ، اكتب المقدار

الجبري الذي يمثل طول السياج الذي يمكن أن يحيط بالحديقة .

[٦] اكتب المقادير الجبرية لكل مما يأتي باستخدام المتغير س أو ص

أ) العدد ٤ مضافاً إلى عدد ب) ناتج طرح عدد من ١٠

ج) ضعف عدد مضافاً إليه ٥ د) $\frac{1}{2}$ حجم مكعب

[٧] إذا كان س = ٦ ، ص = ٤ ؛ فأوجد القيمة العددية لكل من المقادير

الجبرية الآتية :

أ) $s + c$ ب) $\frac{1}{3}s + 2$ ج) $s^2 + sc$

[٨] مثلث أطوال أضلاعه ل ، ع ، م ؛ عبر عن محيط هذا المثلث . ثم أوجد

محيط المثلث عددياً ،

إذا كان $L = \frac{2}{3}s$ سم ، $U = \frac{1}{2}s$ سم ، $M = \frac{5}{6}s$ سم .

٧ : جمع المقادير الجبرية

جمع المقادير الجبرية لا تختلف عن جمع الحدود الجبرية، حيث تجمع الحدود المشابهة في المقادير كل على حدة؛ فمثلاً التعبير الجبري التالي :

$$(3s^2 + 5s) + (2s^2 + 3s)$$

هو مجموع مقدارين الأول $3s^2 + 5s$ والثاني $2s^2 + 3s$ ولو ضعه في أبسط صورة ، نلاحظ أن فيه حدوداً مشابهة يمكن جمعها أفقياً فيكون :

$$\begin{aligned} & 3s^2 + 5s + 2s^2 + 3s \\ & = (3s^2 + 2s^2) + (5s + 3s) \\ & = 5s^2 + 8s \end{aligned}$$

وبذلك يكون مجموع مقدارين هو مقدار جيري آخر . كذلك لجمع المقدارين :

$$15s + 6s^2 - 9 , 3 - 2s + s^2$$

يفضل ترتيبهما إما تنازلياً أو تصاعدياً ثم نجمع الحدود المشابهة إن وجدت فنجد أن :

$$\begin{aligned} & 15s + 6s^2 - 9 = 6s^2 + 15s - 9 \quad (\text{الترتيب التنازلي}) \\ & \text{و } 3 - 2s + s^2 = s^2 - 2s + 3 \quad (\text{الترتيب التنازلي}) \\ & \text{ولجمعهما أفقياً :} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (15s + 6s^2 - 9) + (s^2 - 2s + 3) \\ & = (6s^2 + 15s - 9) + (s^2 - 2s + 3) \\ & = (6s^2 + s^2) + (15s - 2s) + (-9 + 3) \\ & = 7s^2 + 13s - 6 \end{aligned}$$

ويمكننا إيجاد ناتج جمع المقدارين السابقين بطريقة رئيسية بعد ترتيبهما تنازلياً أو تصاعدياً ووضع الحدود المشابهة تحت بعضها على النحو التالي :

$$\begin{array}{r} 6s^2 + 15s - 9 \\ 2s^2 - 2s \\ \hline 6s^2 + 13s - 6 \end{array}$$

المجموع

اجمع المقدارين :

مثال (١)

$$2s^3 - 4s \quad , \quad 2s^4 - 3s$$

الحل :

$$(2s^3 - 4s) + (2s^4 - 3s) = (2s^4 + 2s^3) + (-3s - 4s)$$

$$= 4s^7 - 8s$$

أوجد ناتج جمع المقادير :

مثال (٢)

$$4b - 5 \quad , \quad 5b - 13 \quad , \quad 5b - 12$$

الحل :

أولاً : بالطريقة الأفقيّة :

$$(4b - 5) + (5b - 12) + (4b - 13) =$$

$$(4b - 12) + (5b - 13) + (5b - 4) =$$

$$= 13b - 4$$

ثانياً : بالطريقة الرأسية : يترك للطالب إجراء الجمع بالطريقة الرأسية .

مثال (٣) اجمع ما يلي :

$$4x^3 - 3x^5 + 2x^2 , \quad 11x^2 + 2x^3 ,$$

$$6x^3 + 3x^2 - 8$$

الحل: نجمع رأسياً مع الترتيب تنازلياً حسب قوى ص:

$$-3x^5 + 4x^4 +$$

$$2x^2 - 11x^3 + 2x$$

$$-8 - 6x^3 + 3x^2$$

$$\text{المجموع } 5x^3 - 8x^2 + 6x^3 - 3x^2$$

لاحظ أننا تركنا فراغ للحد غير الموجود .

ويترك للطالب إيجاد المجموع بالطريقة الأفقية .

مثال (٤)

اكتب ما يلي بصورة مبسطة ثم أوجد القيمة العددية للنتائج ،

$$\text{إذا كان: } a = 1 , b = 2 , c = -1$$

$$+ 2b + 6c + 5b + 5c - 13b - 4c + 2c$$

الحل:

$$+ 2b + 6c + 5b + 5c - 13b - 4c + 2c$$

$$= (13 + 12) + (b + 5b - 3b) + (6c + 5c - 4c - 2c)$$

$$= 3 + 15b + 5c$$

$$\text{القيمة العددية للنتائج} = 5 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times 5 + 5 - 6 + 6 = 112$$

ćمارين ومسائل

[١] اجمع ما يأتي :

- أ) $5s + 7c - 3s - sc$
- ب) $1b + 2c - 13b + 2j$
- ج) $2u + n + 5m - 3un - 10u + 5m$
- د) $-12b + 17j$

[٢] اكتب ما يأتي في أبسط صورة :

- (١) $(13b + 15c - 2b) - (17b + 18c)$
- ج) $(-1b + 1c) + (b - 1) + (b - jc) + (j - 1)$

[٣] اجمع $(3s^3 + 4sc^2 + 5s^2c)$ مع $(7sc^2 - 8s^2c + 5s^3)$

[٤] رتب كلاً من المقادير التالية تصاعدياً، ثم أوجد ناتج الجمع بطريقتين:

$$s^5 + s^3 - s^2 + s^4 - 2s^3 - 4s^2$$

[٥] أوجد ناتج جمع ما يلي :

- أ) $3s^3 - 5s^2 - s^3 - 3s^2 + 7s^3 - 5s^2 + 3s^3 + 6s^2 - 3s^3 - 2s^2$
- ب) $3sc^2 - 2s^2 + 7sc^2 + 4s^2 - sc^2 + 3sc^2 - 5s^2$

[٦] أ) اجمع : $\frac{3}{4}s^2 + \frac{2}{3}s^2 - 7$ مع $\frac{5}{4}s^2 - \frac{2}{6}s^2 + 4$

ب) اجمع : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$ مع $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$

[٧] اجمع : $s^2 + sc^2$ ، $2s^3 + 3sc^2$

ثم أوجد القيمة العددية للمجموع عندما : $s = 1$ ، $c = 2$ ، $u = 3$

[٨] اجمع : $4L^3 + 2L^2 - 5L + 7$ مع $3 - 4L - 3L^2 + L^3$

ثم أوجد القيمة العددية للمجموع عندما : $L = 2$

[٩] أوجد $k + l$ ، إذا كان :

$$k = s^2 + 4su + u^2 ;$$

$$l = 4su + 3s^2 + 5u^2$$

[١٠] إذا كان $s = 15 + b + 2j$ ، $s = -13 - 5b - j$

أوجد $s + c$ ؟ ثم أوجد قيمته العددية عندما :

$$1 = 1 , \quad b = 2 , \quad j = -1$$

[١١] اكتب ما يأتي في أبسط صورة :

$$(1) 5s - 50c + 6s - 6c - 6s + 12c$$

$$(2) 5 - 5h - 3e + 10e + 5h - 2e$$

[١٢] عدداً صحيحان أحدهما ($5s - 2c$) ، والآخر يزيد عن الأول بمقدار

($2s + 1c$) . أوجد العدد الآخر، ثم أوجد مجموع هذين العدددين .

٨ : طرح المقادير الجبرية

إن القاعدة في طرح المقادير الجبرية لا تختلف عن طرح الحدود الجبرية، وذلك بأن تطرح الحدود المتشابهة في المقادير كل على حدة ؛ فمثلاً لو أردنا طرح المقدار $3s^3 + 4s$ من المقدار $7s + 15s$ ؟ نكتب :

$$(7s + 15s^3) - (3s^3 + 4s)$$

$$= (15s^3 + 7s) - (3s^3 + 4s)$$

$$= (15s^3 - 3s^3) + (7s - 4s)$$

$$= 12s^3 + 3s$$

ويمكننا إجراء عملية الطرح السابقة بالطريقة الرئيسية بعد ترتيب المقدارين تنازلياً (أو تصاعدياً) كما يلي :

$$\begin{array}{rcl} & 15s^2 + 7s & \\ \leftarrow & \underline{- (3s^2 + 4s)} & \\ & 12s^2 + 3s & = \text{الفرق} \end{array}$$

ويمكننا إيجاد الفرق بطريقة مباشرة، حيث نكتب المقدار الأول (المطروح منه) مرتبًا تصاعديًا أو تنازليًا حسب أحد متغيراته، ثم نكتب المقدار الثاني (المطروح) مرتبًا بالطريقة نفسها لترتيب المقدار الأول ، وبحيث يأتي كل حد من حدود المقدار الثاني (المطروح) تحت الحد المشابه له في المقدار الأول (المطروح منه)، ثم نغير إشارة كل حد من حدود المقدار الثاني (المطروح)، ثم نجمع المقدارين جبرياً .

مثال (١)

أوجد الفرق : $(13s^2 - 12s) - (-5s + s^2 - 7)$

الحل:

$$\begin{array}{rcl} & 13s^2 - 12s & \\ \hline & \pm s^2 \pm 5s & \\ & 12s^2 + 4s - 5 & = \text{الفرق} \end{array}$$

مثال (٢)

اطرح $3s^3 + 5s - 4$ من $7s^3 + 3s - 6$

الحل:

بالطريقة الأفقيّة :

$$\begin{aligned}
 & (7s^3 + 3s^2 - 4s) - (3s^5 + 3s^3 - 4s^2) \\
 & = (7s^3 - 3s^5) + (3s^3 - 3s^2) + (-4s^2 + 4s) \\
 & = 4s - 2s^2 + 2s^3
 \end{aligned}$$

بالطريقة الرأسية :

$$\begin{array}{r}
 7s^3 + 3s^2 - 4s \\
 3s^5 + 3s^3 - 4s^2 \\
 \hline
 4s - 2s^2 + 2s^3
 \end{array}$$

مثال (٣)

$$\text{اطرح } 7s^4 - 3s^3 + 5s^2 - 5 \text{ من } 10s^4 - s^3 + 3s^2 + 10s.$$

الحل:

الطريقة الأفقيّة :

$$\begin{aligned}
 & (10s^4 - s^3 + 3s^2 + 10) - (7s^4 - 3s^3 + 5s^2 - 5) \\
 & = (10s^4 - 7s^4) + (s^3 + 3s^2) + (3s^2 - 5s) + (10 + 5) \\
 & = 3s^4 + 2s^3 - 2s^2 + 15
 \end{aligned}$$

الطريقة الرأسية : يترك للطالب إيجاد الفرق بالطريقة الرأسية .

مثال (٤)

اطرح مجموع المقدارين :

$$\begin{aligned}
 & 3s^2 - 2s^3 + 3s^2 - 5s^2 + 4s^3 - 2s^2 \\
 & \text{من } 3s^3 + 7s^2 - 2s^3
 \end{aligned}$$

أولاً: نوجد مجموع المقدارين:

الحل:

$$\begin{array}{r} 3s^2 - 2sc + sc^2 \\ 5s^2 + 4sc - 2sc \\ \hline 2s^2 + 2sc + sc^2 \end{array}$$

ثانياً: نوجد الفرق بطرح هذا المجموع من $3s^2 + 7sc - 2c^2$ ؛
أي أن:

$$\begin{array}{r} 3s^2 + 7sc - 2c^2 \\ 2s^2 + 2sc + c^2 \\ \hline 5s^2 + 5sc - 3c^2 \end{array}$$

تمارين ومسائل

[١] ا) اطرح $19 - 3b$ من $115 - b$

ب) اطرح $2s - 3c + 3u$ من $7s - 3c + 11u$

[٢] ا) من $-b - 1$ اطرح $-1 - b$

ب) من $4a^2b^2 - 18ab + 16$ اطرح $a^2b^2 - 14ab + 25$

ج) من $5s^2 + 4sc - 9$ اطرح $s^2 - 3sc - 18c^2$

[٣] أوجد ناتج الطرح لكل مما يأتي:

ا) $(2s^2 - 5s - 7) - (3s^2 + 2s - 8 - s^3)$

ب) $(sc^2 - 8) - (sc^2 - 9)$

ج) $(-13l^0 + 4l^4 - l^3) - (2l^0 - l^4 + 2l^3)$

[٤] من $\frac{3}{5} + \frac{3}{4} - \frac{3}{4}$ اطرح

[٥] اطرح $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{5}{7}$ من $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{3}{7}$

[٦] بسط ما يأتي :

(١) $(1 - b) - (b - c) - (c - 1)$

(٢) $(7 - 6c) - (6c - 6)$

(٣) $(12 + 4c - 3c) - (15 - 2c + 3c)$

[٧] أوجد ناتج طرح ما يأتي بالطريقة الرئيسية :

$$(5s^2 - 7s^3 + 2s^2c - sc^3) - (-sc^3 - 9s^3 + sc^2)$$

[٨] ما زاده $-2 - 6 - 1$ عن $3 - 12 + 3$ ؟

[٩] إذا كان : $s = 3 + 2b - b^2$ ، $c = 4 - 3b + 2b^2$

فأوجد : (١) $s - c$ (٢) $s + c$

[١٠] اطرح من $3s^2 + 7sc - 2c^2$ مجموع المقدارين :

$$3s^2 - 2sc + 3c^2 , -5s^2 + 4sc - 2c^2$$

[١١] من مجموع $22 + 13 + 1 - 25 - 3$ ، اطرح مجموع

$$5 + 14 , 4 + 13 + 13$$

[١٢] اطرح $2b^2 - 3b - 1$ من $4b^2 + 2b - 7$

ثم أوجد القيمة العددية لناتج الطرح إذا كان $b = 1$ ، $c = 2$

[١٣] ضع المقدار الآتي لأبسط صورة:

$$٦ - ٤ ب - ٥ ب + ٤ ب + ٣ ب - ٢$$

ثم احسب قيمته العددية عندما: $b = 1$

٩: تمارين ومسائل عامة

[١] أوجد ناتج الآتي:

أ) $(-6 - 3h^3) + (-4 - 2h^3) + (11 - h^3)$

ب) $5s^3 + \frac{1}{2}s^3 + 8s^3 - \frac{1}{4}s^3$

ج) $\frac{3}{4}h \times 4h - \frac{1}{2}h$

د) $(1-b) - (b-1) + (1-b)$

[٢] أوجد ناتج الآتي:

أ) $(12b^2)(b^3)$

ب) $36s^2c^2 \div 6sc$

ج) $3s^2c \times 2sc$

د) $15m^2 \div 3m^2$

[٣] أ) اطرح $3s + 4c$ من $-5s - 2c$

ب) اطرح $b + c$ من $12 + 3b - 4c$

ج) اطرح $16 + 3s^2 - 2s$ من $s - 2s^2 + 5$

[٤] أ) اجمع $3s^2 - s^2 + 2s - 1$ ، $5s^3 - 7s + 4s^2 + 6$

ب) اجمع $1 - 2 + 2 + 12 - 14 - 13$

ج) اجمع $3sc - s^2 + 5c^2$ ، $2s^2 - 3c^2$ ، $5sc - sc^2 + 2s^2$

[٥] اطرح $2f - 3f^2$ من $6 + f^2 - f$.

[٦] من $4b + 2g - 13$ اطرح $16 - 3b + g$.

[٧] اجمع $5s^2 + 3s - 2s^2$ ، $4s^2 - s - s^2$ ، ثم أوجد القيمة العددية لنتائج الجمع عندما $s = 1$ ، $s = 2$.

[٨] إذا كان حاصل ضرب حدين جبريين هو $27s^3$ ، وكان أحدهما يساوي $9s^2$ ؟ فما هو الحد الآخر؟

[٩] عمر سامي الآن ثلاثة أمثال عمر محمد ، ما مجموع عمر سامي وعمر محمد بعد خمس سنوات؟

[١٠] مستطيل محیطه $25s$ سم ، وعرضه $5s$ سم ؟ فما طوله؟

[١١] إذا كانت مساحة حديقة مستطيلة الشكل $72s^2$ م^٢ ، وكان عرضها $8s$ م ؛ فما طولها؟

[١٢] عددان صحيحان أحدهما $7s - 3$ ، والآخر ينقص عن الأول بمقدار $4s + 2$ ؛ أوجد مجموع هذين العددين.

١٠: اختبار الوحدة

- [١] ا) اكتب الحدود المشابهة للحد $3x^2 + 5x - 10$ بـ مما يأتي :
- $3x^2 + 3x + 4$ ، $4x^2 - 5x + 10$ ، $2x^2 - 10x + 3$
- ب) اذكر مكونات كل حد في المقدار الآتي :
- $x^2 + 10x - 9$

[٢] أوجد ناتج الآتي :

- أ) $7x^2 - 11x^2$
- ب) $(x^2 + 4x^2 - 2x^2)$
- ج) $54x \div (-9x)$
- د) $12x \times x^2$

[٣] اقسم $36x^2 + 9x$ على $9x^2$ ؛ ثم تحقق من صحة الحل .

[٤] اجمع $-3x - 5x + 4x - x$ ، مع

[٥] اطرح $2x^3 - 3x^3 + 5x^3$ ، من $4x^3 + 5x^3$ ثم أوجد القيمة العددية لناتج الطرح عندما $x = 1$

[٦] مستطيل عرضه ٢ سم وطوله ٣ سم ، أوجد :

أ) محيطيه ب) مساحته



العادلات والمتراجحات

الوحدة الرابعة

٤ : الجملة المفتوحة

تأمل الجمل التالية ، ماذا تلاحظ ؟ :

- (١) ٣ عدد طبيعي فردي .
- (٢) ٤ عدد طبيعي فردي .
- (٣) س عدد طبيعي فردي .

ستجده أن الجملة الأولى صائبة ، والجملة الثانية خطأ؛ أما الجملة الثالثة فلن تستطيع الحكم عليها هي صائبة أم خطأ؟ ولكن إذا عوضت بدل المتغير (س) في الجملة الثالثة عددًا مثل: ٥ ، ٧ ، ٩ ، .. تكون الجملة صائبة؛ أما إذا وضعت بدل المتغير (س) عدداً مثل: ٤ ، ٦ ، ٨ ، .. تكون الجملة خطأ .

ولذا تسمى الجملة التي تحتوي على متغير جملة مفتوحة ، لأنها لا يمكن الحكم على صوابها أو خطئها إلا بعد التعويض عن المتغير .

الجملة المفتوحة هي جملة تحتوي على متغير أو أكثر .

تدريب

- صنف كلاً من الجمل التالية إلى جمل صائبة أو خطأ أو جمل مفتوحة:
- (١) القدس عاصمة فلسطين .
 - { ٦ ، ٣ } ≡ ٨ (٢)
 - (٣) ع أحد العشرة المبشرين بالجنة .
 - (٤) ص عدد صحيح زوجي .

مجموعة التعويض ومجموعة الحل :

تأمل الجملة : « س عدد طبيعي أصغر من ٥ ». .

ستجد أنه يمكنك أن تأخذ أي عدد من مجموعة الأعداد الطبيعية لتضمه بدلاً عن المتغير s . وهذه المجموعة التي يتم اختيار الأعداد أو العناصر منها تسمى **مجموعة التعويض** ؛ إذن مجموعة التعويض هنا هي مجموعة الأعداد الطبيعية .

مجموعة عناصر التعويض التي تجعل الجملة المفتوحة صائبة تسمى **مجموعة الحل** ، وهي مجموعة جزئية من مجموعة التعويض . وكل عنصر ينتمي إلى مجموعة الحل يسمى **حلًّا للجملة المفتوحة** ؛ إذن مجموعة الحل للجملة المفتوحة السابقة هي مجموعة الأعداد $\{4, 3, 2, 1\}$ وهي مجموعة جزئية من مجموعة التعويض(ط) .

(١) مثال :

أوجد مجموعة الحل لـ^{لكل} من الجمل المفتوحة التالية ؛ حيث مجموعة التعويض هي $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$:

(أ) س عدد فردي . (ب) س عدد أولي . (ج) س عدد زوجي .

الحل :

- أ) مجموعة حل الجملة «س عدد فردي» هي $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
- ب) مجموعة حل الجملة «س عدد أولي» هي $\{2, 3, 5, 7\}$
- ج) مجموعة حل الجملة «س عدد زوجي» هي $\{2, 4, 6, 8\}$

مثال (٢)

إذا كانت مجموعة التعويض هي مجموعة الأعداد الصحيحة (ص) :

فما مجموعة الحل للجملة المفتوحة ؟ : $3s = 27$

الحل :

نقوم بالتعويض عن المتغير في الجملة المفتوحة $3s = 27$ ؛ بأي عدد صحيح مثل الأعداد $(-6, -9, -8, \dots)$ ونبحث متى تصبح الجملة صائبة، وذلك على النحو التالي :

عندما $s = (-6)$ ، $3s = 3 \times (-6) = -18$ ؛ ∴ الجملة خطأ.

عندما $s = -8$ ، $3s = 8 \times 3 = 24$ ؛ ∴ الجملة خطأ.

عندما $s = -9$ ، $3s = 9 \times 3 = 27$ ؛ ∴ الجملة صائبة.

أي أن العدد الذي جعل الجملة صائبة هو العدد 9

∴ مجموعة الحل هي $\{9\}$

ćمارين ومسائل

[١] أوجد مجموعة حل الجمل المفتوحة الآتية ، علماً بأنّ مجموعة التعويض

: $\{8, 7, 5, 3\}$ هي

$$\text{ب) } L + 4 = 7 \quad 1) s - 3 = 2$$

$$\text{ج) } s - 4 = 5 \quad 2) s - 4 = 4$$

[٢] أوجد مجموعة حل الجمل المفتوحة الآتية ثم تحقق من صحة الحل حيث

أن مجموعة التعويض هي $\{ . , 4 , 7 , 9 \}$:

أ) $s + 5 = 5$ ب) $5s + 2s = 28$

ج) $4s - 14 = 2s + 4$ د) $2s - 10 = 4s - 4$

[٣] إذا كانت مجموعة التعويض هي $s = +$ ؛ فأوجد مجموعة حل الجمل

المفتوحة الآتية :

أ) $s - 4 = 9$ ب) $s - 5 = 6$ ج) $3 = 6 - s$

٤ : المعادلة

تأمل الجمل المفتوحة التالية :

(١) $s + 5 = 15$ (٢) $s - 6 = 4$

(٣) $6 = 2l$ (٤) $4 = u \div 3$

ستجد أن كل جملة من الجمل السابقة احتوت على متغير وإشارة المساواة (=) تسمى كل جملة من هذه الجمل «معادلة» .

أي أن :

المعادلة هي جملة مفتوحة تحتوي على إشارة المساواة (=)

ت تكون المعادلة من طرفين (مثل كفتي الميزان) : أحدهما يسمى

الطرف الأيمن ، ويسمى الآخر الطرف الأيسر .

مجموعة حل المعادلة :

مجموعة الحل لأي معادلة هي مجموعة العناصر التي تنتمي كل منها إلى مجموعة التعويض ، وإذا عوضنا بها عن المتغيرات في المعادلة نحصل على جملة صائبة . وكل عنصر في مجموعة الحل يسمى **حلًّا للمعادلة** ، وحل المعادلة يعني إيجاد قيم المتغيرات التي تجعل المعادلة جملة صائبة .

مثال

اكتب مجموعة التعويض ومجموعة الحل للمعادلة التالية :

$$2s - 6 = 0 \text{ ، حيث أن } s \in \mathbb{R}^+$$

الحل :

مجموعة التعويض هي مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة وهي :

$$\{s \in \mathbb{R}^+ \mid s = 3, 2, 1, \dots\}$$

وللحصول على مجموعة الحل نجرب التعويض عن المتغير في المعادلة $2s - 6 = 0$ ، بأي عدد صحيح موجب يجعل المعادلة جملة صائبة .

إذا عوضنا مثلاً بالأعداد 1 ، 2 ، 3 سنجد الآتي :

$$\text{عندما } s = 1 \text{ فإن } 2s - 6 = 2 - 6 = -4$$

$$\text{عندما } s = 2 \text{ فإن } 2s - 6 = 4 - 6 = -2$$

$$\text{عندما } s = 3 \text{ فإن } 2s - 6 = 6 - 6 = 0$$

∴ العدد (3) هو حل المعادلة وينتمي إلى مجموعة التعويض \mathbb{R}^+
∴ مجموعة الحل هي {3} .

قواعد التحويلات المكافئة :

لتكن لديك المعادلة $s + 7 = 16$ ، فحلها $s = 9$. فإذا قمنا بإجراء بعض العمليات مثل : (الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة) على طرفي هذه المعادلة بالعدد نفسه فستحصل على معادلات أخرى لها الحل نفسه لالمعادلة السابقة .

نسمى المعادلات التي لها الحل نفسه في مجموعة التعويض نفسها **المعادلات المكافئة** ، والعمليات والقواعد التي تحول معادلة ما إلى معادلة مكافئة لها تسمى **التحولات المكافئة** .

ويمكن توضيح ذلك من خلال إجراء العمليات الأربع على طرفي المعادلة السابقة مثلاً بالعدد ٤ ؛ على النحو التالي :

$$\begin{aligned} 1) \text{ الجمع : } s + 7 &= 16 \\ &\quad (\text{بإضافة العدد ٤ إلى طرفي المعادلة}) \\ s + 7 + 4 &= 16 + 4 \end{aligned}$$

$$s + 11 = 20 , \text{ وهي معادلة مكافئة وحلها } s = 9$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ الطرح : } s + 7 - 4 &= 16 - 4 \\ &\quad (\text{بطرح العدد ٤ من طرفي المعادلة}) \\ s + 3 &= 12 , \text{ وهي معادلة مكافئة، وحلها } s = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ الضرب : } 4(s + 7) &= 4 \times 16 \\ &\quad (\text{بضرب طرفي المعادلة في العدد ٤}) \\ 4s + 28 &= 64 , \text{ وهي معادلة مكافئة ، وحلها } s = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \text{ القسمة : } \frac{s + 7}{4} &= \frac{16}{4} \\ \frac{s}{4} + \frac{7}{4} &= 4 \\ \frac{s}{4} &= 4 - \frac{7}{4} \\ \frac{s}{4} &= \frac{9}{4} \end{aligned}$$

يمكن أن نحصل على معادلة مكافئة لمعادلة معطاة إذا :

- ١ - أضفنا العدد نفسه إلى كل من طرفي المعادلة .
- ٢ - طرحنا العدد نفسه من كل من طرفي المعادلة .
- ٣ - ضربنا طرفي المعادلة في العدد نفسه ، على ألا يساوي هذا العدد صفرًا .
- ٤ - قسمنا طرفي المعادلة على العدد نفسه ، على ألا يساوي هذا العدد صفرًا .

إننا نستخدم قواعد التحويلات المكافئة عندما نقوم بحل المعادلات لنحصل على معادلات مكافئة للمعادلات المطلوب حلها، تكون في صور أبسط حتى يسهل حلها .

مثال

إذا كانت مجموعة التعويض هي $\{2, 3, 4, 5\}$ ،
فأوجد مجموعة الحل للمعادلات التالية :

$$1) \quad s - 2 = 3 \quad b) \quad s + 5 = 9 \quad c) \quad 2s = 6$$

الحل : $s - 2 = 3$

$$s - 2 + 2 = 2 + 3 \quad (\text{بإضافة العدد } 2 \text{ إلى الطرفين}) .$$

$s = 5$ وهي معادلة مكافئة

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{5\}$$

$$b) \quad s + 5 = 9$$

$$s + 5 - 5 = 9 - 5 \quad (\text{بطرح العدد } 5 \text{ من الطرفين}) .$$

$s = 4$ وهي معادلة مكافئة .

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{4\}$$

$$جـ) 2s = 6$$

$$\frac{6}{2} s = \frac{6}{2} \text{ (بقسمة الطرفين على 2)}$$

$s = 3$ وهي معادلة مكافعة

ومجموعة حلها = {3}

تمارين ومسائل

[١] صنف كلاً من من الجمل التالية إلى جمل صائية أو جمل خطأ
أو جمل مفتوحة :

أ) ٢ عدد أولى وزوجي ب) ٢ $s = 14$

جـ) ع عدد سالب د) $\exists \{3, 5\} \ni$

هـ) س أحد الخلفاء الراشدين و) $4 + 1 = 8$

[٢] اكتب مجموعة الحل لكل من المعادلات التالية إذا كانت مجموعة التعويض هي {٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥، ١٨} :

ب) $l - 9 = 6$ أ) $s + 7 = 25$

جـ) $m + 4 = 10$ هـ) $2m = 30$

[٣] إذا كانت مجموعة التعويض هي مجموعة الأعداد الصحيحة صـ فأوجد
مجموعة الحل لكل من المعادلات التالية :

ب) $3c - 4 = 1$ أ) $2s - 3 = 7$

جـ) $2c + 3 = 25$ هـ) $4 - 3s = 24$

و) $2s + 15 = 7$ وـ) $1 - 2u = 29$

٤ : معادلة الدرجة الأولى في متغير واحد

تأمل المعادلات الآتية :

$$2s = 8 , \quad 4 + u = 7 , \quad 4s - 5 = 12$$

ستجده أن كلاً منها تتكون من متغير واحد، وقوته من الدرجة الأولى.

نسمى مثل هذه المعادلات **معادلات من الدرجة الأولى في متغير واحد**

وصورتها العامة هي :

$$as + b = c \quad \text{حيث } a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

نعتمد في حل هذه المعادلات على مادرسته من قواعد التحويلات المكافئة وما تتحاجه المعادلة من عمليات حسابية ولتجميع وتبسيط الحدود المتشابهة الموجودة في المعادلة .

ونقتصر في هذه الوحدة على مجموعة الأعداد الصحيحة كمجموعة تعويض ومن المفيد حل المعادلة والتحقق من صحة الحل وذلك عن طريق التعويض بالحل في المعادلة المعطاة ، كما في الأمثلة الآتية :

مثال (١)

حل المعادلة : $3s = 12$ ، وتحقق من صحة الحل .

الحل:

$$3s = 12$$

(بقسمة الطرفين على العدد ٣) .

$$\frac{12}{3} = \frac{s}{3}$$

$$4 = s$$

١٣٠

التحقق من صحة الحل :

$$\text{الطرف الأيمن} = 12 = 3 \times 4 = 3 \times 3$$

$$\text{الطرف الأيسر} = 12$$

∴ الطرف الأيمن = الطرف الأيسر

∴ الحل صحيح .

مثال (٢)

حل المعادلة : $s + 3 = 5$ ، وتحقق من صحة الحل .

الحل :

$$s + 3 = 5$$

$$s + 3 - 3 = 5 - 3 \quad (\text{بطرح العدد } 3 \text{ من الطرفين})$$

$$s = 2$$

التحقق من صحة الحل :

$$\text{الطرف الأيمن} = s + 2 = 3 + 2$$

$$\text{الطرف الأيسر} = 5$$

∴ الطرف الأيمن = الطرف الأيسر = 5

مثال (٣)

حل المعادلة $25 = s - 15$ ، وتحقق من صحة الحل .

$$15 = s - 25$$

(بإضافة العدد ١٥ للطرفين) .

$$15 + 15 = s - 25$$

$$40 = s$$

التحقق من صحة الحل : الطرف الأيمن = ٢٥

$$25 = 15 - 40 = 15$$

• الطرف الأيسر = الطرف الأيمن

• الحل صحيح .

مثال (٤)

حل المعادلة $5s + 2s = -4$

$$\text{الحل:}$$

$$5s + 2s = -4$$

(بجمع المحدود المتشابهة) .

$$7s = -4$$

$$\frac{s}{7} = \frac{-4}{7}$$

$$s = \frac{-4}{7}$$

• $\frac{-4}{7} \notin \mathbb{Z}$ (الحل لا ينتمي إلى مجموعة التعويض)

• لا يوجد حل للمعادلة في مجموعة الأعداد الصحيحة .

مثال (٥) حل المعادلة : $4 - 2s = 10$

الحل :

$$(4 - 2s) - 4 = 10 - 4$$

$$\begin{aligned} & 4 - 2s - 4 = 10 - 4 \\ & \frac{4 - 2s}{2} = \frac{10 - 4}{2} \\ & 2 - s = 3 \end{aligned}$$

ملحوظة : تتحقق من صحة الحل بنفسك .

مثال (٦) حل المعادلة : $6s + 4s + 60 = 962 - s$

الحل :

$$6s + 4s + 60 = 962 - s$$

$$10s + 60 = 962 - s$$

$$10s + 60 - 60 = 962 - s - 60$$

$$10s = 902 - s$$

$$10s + s = 902 - s + s$$

$$11s = 902$$

$$(11s) / 11 = 902 / 11$$

$$s = 82$$

أجري عملية التحقق بنفسك .

ćمارين ومسائل

حل المعادلات التالية في ص ، وتحقق من صحة الحل :

$$7 = 9 + L [2]$$

$$9 = 1 - S [1]$$

$$63 = 7 - S [4]$$

$$7S = 0 [3]$$

$$1 = 4 - S [6]$$

$$2M = 4 [5]$$

$$18 = 6S + 4S - S [8]$$

$$9S = 9 [7]$$

$$7 = 1 - L [10]$$

$$4S + 5 = 17 [9]$$

$$13 = 17 - 15S [12]$$

$$18 - 3 = 5S [11]$$

$$12 = 4S + S [14]$$

$$18 = 3S + 3 [13]$$

$$6S - 8 = 2S [16]$$

$$4S - 2 = 6S - 4 [15]$$

$$19 = 8 + S [18]$$

$$4S - 6 = S - 15 [17]$$

$$42 = 28 - S [20]$$

$$4S + 6S = 50 [19]$$

$$2S - 2S = 7 [21]$$

[٢٢] إذا كانت مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع التوسي تساوي

180° (ن - ٢) فأوجد عدد أضلاع مضلع مجموع قياسات زواياه

1080°

[٢٣] حديقة أطفال مستطيلة الشكل محاطتها (ح) يساوي ١٦٠ متراً.

إذا كان عرضها (ع) يساوي ٣٥ متراً ، فما طولها (ل) ؟

٤ : مسائل تطبيقية

لكل علم من العلوم تطبيقاته التي تربطه بالواقع المعاش. وعلم الرياضيات من أهم العلوم التي تعالج الكثير من المسائل التي تواجهنا في حياتنا اليومية، ومن ذلك استخدام العادلات في حل الكثير من المسائل التي تواجهنا في واقع الحياة.

فتكتب العلاقة في المسألة على صورة معادلة رياضية، ثم نقوم بحلها. ويجب علينا دائمًا التحقق من الحل حتى نتأكد بأنه لم يكن هناك خطأ في تكوين المعادلة نفسها، أو في خطوات الحل.

ولإعطاء صورة واضحة عن بعض التطبيقات ، علينا أولاً أن نتعلم كيفية إنشاء العادلات .

مثال (١)

كون العادلات المعبرة عما يأتي :

- ١) ثمن ثلاثة أقلام يساوي ٦٠ ريالاً
- ب) عددان الفرق بينهما ٥ ، ومجموعهما ١٣
- ج) ثلاثة اعداد متتالية مجموعها ١٥

الحل :

- ١) نفرض أن : ثمن القلم = س
ثمن ثلاثة أقلام = $3s$
العلاقة : ثمن ثلاثة أقلام = ٦٠ ريال ،
 \therefore المعادلة هي : $3s = 60$

ب) نفرض أن : العدد الأول = ص

لاحظ في هذا المثال وجود أكثر من علاقة

العلاقة الأولى : أن الفرق بين العددين = ٥

∴ العدد الثاني = العدد الأول - ٥

العدد الثاني = ص - ٥

العلاقة الثانية : أن مجموع العددين = ١٣

∴ العدد الأول + العدد الثاني = ١٣

$$\text{ص} + (\text{ص} - 5) = 13$$

وتكون المعادلة : ١٣ = ٢ ص - ٥

ج) نفرض أن العدد الأول = هـ

العلاقة الأولى ؛ أن الأعداد الثلاثة متتالية .

∴ العدد الثاني سيزيد عن الأول بمقدار ١

∴ العدد الثاني = هـ + ١

والعدد الثالث سيزيد عن العدد الثاني بمقدار ١

∴ العدد الثالث = (هـ + ١) + ١

$$= هـ + ٢$$

العلاقة الثانية : أن مجموعهم = ١٥

∴ هـ + (هـ + ١) + (هـ + ٢) = ١٥

∴ المعادلة هي : ١٥ = ٣ هـ + ٣

مثال (٢) ما العدد الذي إذا أُضيف إليه ٦ كان الناتج ٩ ؟

الحل: نفرض أن العدد = س

$$\therefore س + 6 = 9$$

$$س + 6 - 6 = 9 - 6 \quad (\text{بطرح 6 من طرفي المعادلة})$$

$$س = -15$$

$$\therefore \text{العدد} = -15$$

التحقق :

الطرف الأيمن للمعادلة (١) = س + 15 = 6 + 9 = 15 = الطرف الأيسر.

مثال (٣)

عددان صحيحان يزيد الأول عن الثاني بقدر ٤ ، ومجموعها يساوي ٨
فما العددان ؟

الحل: نفرض أن العدد الأول = ص

$$\therefore \text{العدد الثاني} : ص - 4$$

$$\therefore ص + (ص - 4) = 8$$

$$2ص - 4 = 8$$

$$2ص - 4 + 4 = 8 + 4 \quad (\text{بإضافة 4 إلى طرفي المعادلة})$$

$$2ص = 12$$

$$\frac{2ص}{2} = \frac{12}{2} \quad (\text{بقسمة طرفي المعادلة على 2})$$

$$ص = 6$$

∴ العدد الأول : ص = ٦

العدد الثاني : ص - ٤ = ٦ - ٤ = ٢

التحقق :

الفرق بين العددين = العدد الأول - العدد الثاني = ٦ - ٢ = ٤

مجموع العددين = العدد الأول + العدد الثاني = ٦ + ٢ = ٨

مثال (٤)

مثلث متساوي الساقين طول قاعدته يزيد عن طول أحد ساقية بمقدار ٢ سم؛ فإذا كان محيطه يساوي ٢٠ سم ، فأوجد أطوال أضلاعه.

الحل :

نفرض أن طول الضلع الأول = ع

∴ طول الضلع الثاني = ع

∴ طول القاعدة = ع + ٢

محيط المثلث = ٢٠

محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه = ٢٠

$$ع + ع + (ع + ٢) = ٢٠$$

$$٣ع + ٢ = ٢٠$$

٣ع = ١٨ (بقسمة طرفي المعادلة على ٣)

$$ع = \frac{١٨}{٣} \text{ سم}$$

∴ طول الضلع الأول : ع = ٦ سم ،

طول الضلع الثاني : ع = ٦ سم

طول القاعدة : ٦ + ٢ = ٨ ع = ٦ سم

: التحقق

$$\text{طول الضلع} = 6 \text{ سم}$$

$$\text{طول القاعدة} = 6 + 2 = 8 \text{ سم}$$

$$\text{محيط المثلث} = (6 + 6 + 8) \text{ سم}$$

$$= 20 \text{ سم}$$

ćمارين ومسائل

[١] كون المعادلات المعبرة عمماً يأتي :

أ) خمسة أمثال عدد يساوي ١٥

ب) الفرق بين ثمن كتابة وقلم ٦٥ ريال، وثمانية معاً ١٠٠ ريال .

ج) يزيد عمر أيمان عن عمر اخته سلوى بخمس سنوات ، ومجموع
عمريهما ٣١ سنة .

[٢] أوجد العدد الصحيح الذي ضعفه يساوي ٦

[٣] ما العدد الصحيح الذي إذا طرح منه خمسه كان الناتج - ٣ ؟

[٤] أوجد طول ضلع مثلث متساوي الأضلاع ؛ إذا علم أن محيطه يساوي ١٢ سم.

[٥] ما هو العدد الصحيح، الذي إذا أضفته إلى ثلاثة أمثاله كان الناتج (-٤) ؟

[٦] عددان صحيحان الفرق بينهما ٧ ، ومجموعهما ٣ ، فأوجد العددان.

[٧] مستطيل ثلاثة أمثال عرضه يزيد عن طوله بمقدار ٤ سم ، فإذا كان محيطه يساوي ٤٠ سم ، فأوجد طوله وعرضه.

[٨] عددان الفرق بين الأول والثاني ٥ ، والفرق بين أربعة أمثال الأول وثلاثة أمثال الثاني يساوي ٦ ، فأوجد العددان.

[٩] ثلاثة أعداد زوجية متتالية مجموعها ١٨ ، فما هي هذه الأعداد ؟

[١٠] اشترك ثلاثة أشخاص في رأس مال شركة ، فشارك الأول بضعف ما شارك به الثاني وشارك الثالث بأقل مما شارك به الأول بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال فإذا كان رأس مال الشركة ٢٠٠٠٠ ريال ، فأوجد ما شارك به كل منهم على حدة .

٤ : المراجحات

إذا سألك أحدهم أن تعطيه عدداً صحيحاً أكبر من الصفر فإن إجابتك ستكون طبعاً أي عدد صحيح موجب ، وإذا رمنا لهذا العدد بالمتغير A فيمكن أن نكتب ذلك على النحو $A > 0$ ، ويكون $A \in \{1, 2, 3, \dots\}$ ويكون في هذه الحالة $A \in \mathbb{N}$ تسمى « $A > 0$ » مراجحة ، تسمى $\{1, 2, 3, \dots\}$ مجموعة الحل ، حيث \mathbb{N} هي مجموعة التعويض . وفي حالة أن $A < 0$ ، فإن A يكون عدداً سالباً، وتكون مجموعة الحل هي $\{ -1, -2, -3, \dots\}$ وإذا طلب منك أن تذكر عدداً صحيحاً غير الصفر ، فإن هذا العدد: إما يكون عدداً موجباً أو عدداً سالباً، ونكتب ذلك على صورة مراجحة كالتالي: $A \neq 0$. وتكون مجموعة الحل هي $\{ \dots, -3, -2, -1, 1, 2, 3, \dots \}$

المراجحة هي جملة مفتوحة تحتوي إحدى علامات الترجيح $>$ ، $<$ ، \leq ، \geq ، \neq ؛ وتقرأ هذه الرموز على النحو التالي «أصغر من ، أكبر من ، أصغر من أو يساوي ، أكبر من أو يساوي ، لا يساوي» على الترتيب .

مجموعة الحل هي مجموعة كل العناصر التي تنتمي إلى مجموعة التعويض وتحقق المراجحة .

ومن صور المتراجحات :

$$(1) \text{ } s < 0$$

$$(2) \text{ } 2l + 4 < 0$$

$$(3) \text{ } 3h + 3 < 0$$

$$(4) \text{ } 5u + 4 < 0$$

$$(5) \text{ } 3s + 3 < 0$$

مثال

لتكن $S = \{ -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5 \}$ ، فـأوجد مجموعة الحل لـكل من المتراجحات التالية ، حيث S هي مجموعة التعويض .

$$(1) \text{ } 1 \geqslant 1 \quad (2) \text{ } s \leq 0 \quad (3) \text{ } -1 \geq u > 3$$

الحل:

$$(1) \text{ } \text{مجموعة الحل} = \{ -1, 0, 1, 3, 5 \}$$

$$(2) \text{ } \text{مجموعة الحل} = \{ 0, 3, 5 \}$$

$$(3) \text{ } \text{مجموعة الحل} = \{ -1, 0, 1 \}$$

ćمارين ومسائل

[1] اكتب المتراجحة ، مجموعة الحل ، مجموعة التعويض لما يأتي :

$$1) \text{ } s \text{ عدد طبيعي أكبر من } 5 ,$$

$$2) \text{ } u \text{ عدد صحيح أصغر من } 7 , \text{ وأكبر من أو يساوي } -8$$

[2] إذا كانت $u = \{-2, -1, 0, 2, 4, 6\}$ ، اكتب مجموعة الحل لـكل مما يأتي علمـاً بـأن u هي مجموعة التعويض .

$$1) \text{ } s < 2$$

$$2) \text{ } 2 \leq h \leq 4$$

$$3) \text{ } s \leq 4$$

٤ : حل المتراجحات من الدرجة الأولى في متغير واحد

لقد درست سابقاً حل المعادلات وقد استعنت في حلها باستخدام قواعد التحويلات المكافئة ، وفي هذا الدرس سنقوم بحل المتراجحات مستعينين أيضاً بقواعد التحويلات المكافئة للمتراجحات .

قواعد التحويلات المكافئة للمتراجحات :

لكل $s, b, h \in \mathbb{R}$:

$$ا) \text{إذا كان } s \geq b \quad \text{فإن } s + h \geq b + h$$

$$ب) \text{إذا كان } s \geq b \quad \text{فإن } s - h \geq b - h$$

$$ج) \text{إذا كان } s \geq b \quad , \quad h > 0, \text{ فإن } s - h \leq b - h$$

$$د) \text{إذا كان } s \geq b \quad , \quad h < 0, \text{ فإن } s - h \geq b - h$$

$$هـ) \text{إذا كان } s \geq b \quad , \quad h > 0, \text{ فإن } \frac{s}{h} \geq \frac{b}{h}$$

$$و) \text{إذا كان } s \geq b \quad , \quad h < 0, \text{ فإن } \frac{s}{h} \leq \frac{b}{h}$$

مثال (١)

حل المتراجحة : $3s + 9 - 6 \geq 0$ في s ، ومثل الحل على خط الأعداد .

الحل :

$$6 - \geq 9 + 3s$$

$$3s + 9 - 6 - \geq 9 - 9 \quad (\text{طرح } 9 \text{ من طرفي المتراجحة}) .$$


$$15 - \geq 3s$$

$$\frac{15 -}{3} \geq \frac{3s}{3}$$

$$5 - \geq s$$

\therefore مجموعة الحل = {... ، ٥ - ، ٦ - ، ٧ -}.

ويمثل الحل على خط الأعداد في الشكل (٤ - ١) :



مثال (٢)

حل المتراجحة: $s - 6 < 7$ في ص ، ومثلّ الحل على خط الأعداد.

الحل:

$$s - 6 < 7$$

$$s - 6 + 6 < 7 + 6 \quad (\text{بإضافة 6 إلى طرفي المتراجحة}).$$

$$s < 13$$

$$s - 6 < 7 \quad s < 13$$


(بقسمة طرفي المتراجحة على 6).

$$\frac{13}{6} < \frac{s}{6}$$

$$s < 2$$

\therefore مجموعة الحل = {... ، ٣ ، ٤ ، ٥}.

ويمثل الحل على خط الأعداد في الشكل (٤ - ٢) .



١٤٤

مثال (٣)

حل المتراجحة: $-3 \leq 4s + 5 < 17$ في ص، ومثل الحل على خط الأعداد.

الحل: $17 > 5 + 4s - 3 \geq 4s - 8$

$17 - 5 > 4s - 8$ (بطرح ٥ من أطراف المتراجحة).


$$12 > 4s \geq -8$$

(بقسمة أطراف المتراجحة على ٤).

$$\frac{12}{4} > \frac{4s}{4} \geq \frac{-8}{4}$$

$$3 > s \geq -2$$

\therefore مجموعة الحل = {٢، ١، ٠، -١، -٢}.



شكل (٤-٣) شكل (٤-٣) يمثل مجموعة الحل.


الشكل (٤-٣) يمثل مجموعة الحل.

مثال (٤)

أوجد مجموعة الحل المشترك للمتراجحتين التاليتين ومثل الحل على خط

$3s + 5 < 14$ $3s + 5 < 14$ $3s + 5 - 14 < 5 - 14$ $3s < -9$ $s < -\frac{9}{3}$ $s < -3$ $\text{مجموع الحل} = \{ \dots, 6, 5, 4 \}$	الأعداد: $2s - 5 > 7$ $2s - 5 > 7$ $2s - 7 > 7 + 5$ $2s > 12$ $\frac{2s}{2} > \frac{12}{2}$ $s > 6$ $\text{مجموع الحل} = \{ \dots, 5, 4, 3 \}$
---	---

مجموعه الحل المشترك للمتراجحتين = { ٤ ، ٥ }



شكل (٤ - ٤)

ćمارين ومسائل

[١] إذا كان $A \leq B$ فضع إشارة المتراجحة المناسبة في الفراغ :

أ) $1 + 4 \square B + 4$
ب) $6 - A \square B - 6$

ج) $\frac{1}{7} \square B$
 $\frac{1}{7} < B$

د) $B - 4 \square 4 - B$
 $B - \frac{1}{9} \square \frac{1}{9} - B$

ه) $12 \square B$

[٢] أوجد مجموعه الحل للمتراجحات التالية، ومَثَّلَ الحل على خط الأعداد .

أ) $12 < 4$ اعتبر مجموعه التعويض ط

ب) $-3 \leq S$ اعتبر مجموعه التعويض ص

ج) $12 \neq 16$ اعتبر مجموعه التعويض ص ≠

د) $0 < S + 7 < 17$ اعتبر مجموعه التعويض ص <

[٣] أوجد مجموعه الحل للمتراجحات التالية في ص، ومَثَّلَ الحل على خط الأعداد .

أ) $13S - 5 < 125$
 $13S < 130$

ب) $22 \geq 6 - 5h$
 $22 \geq 1 - 5h$

ج) $L - 5 \leq 3 + L$
 $-5 \leq 3$

[٤] أوجد مجموعة الحل المشترك لكل من المتراجحات التالية ، ومثل الحل على خط الأعداد :

أ) $19 < 4s - 7 < 17$ ، $s \in \mathbb{Z}$

ب) $125 < 5l + 2 < 125$ ، $l \in \mathbb{Z}$

ج) $6 < 5h - 3 \leq 15$ ، $h \in \mathbb{H}$

٤ : تمارين عامة ومسائل

[١] حل المعادلات التالية، وتحقق من صحة الحل ؛ علمًا بأن مجموعة التعويض هي مجموعة الأعداد الصحيحة :

أ) $40 = s - 3s = 7s$

ب) $12 = s - 3s = 5s$

ج) $38 = s + 5m = 3s$

[٢] حل المعادلات التالية وتحقق من صحة الحل ، علمًا بأن مجموعة التعويض هي ص

أ) $6s = 24$

ب) $36 + 7s = 12s + 13$

ج) $s - 12 = 7$

[٣] أوجد مجموعة الحل للجملة المفتوحة التالية :

س عدد زوجي مكون من رقم واحد، حيث $s \in \mathbb{Z}$

[٤] اكتب الجمل المفتوحة التالية على صورة متراجحات :

أ) طول حسين أصغر من مترين، وأكبر من متر .

ب) ثلاثة أمثال المسافة بين صنعاء وتعز تقل عن ٩٠٠ كيلومتر وتنزيد عن ٦٠ كيلو متر .

ج) أربعة أمثال ثمن كتاب تنزيد عن ١٠٠٠ ريال .

[٥] أوجد مجموعة الحل للمتراجحات التالية ، إذا كانت مجموعة التعويض هي {١، ٣، ٥، ٠٠٠، ١٩} :

$$1) ٣١ \leq ٧س - ٤$$

$$ج) ٢٠ \neq ٧ - ٩$$

[٦] حل المتراجحات التالية في ص ، ومثل الحل على خط الأعداد .

$$ب) ٢٣ \geq ٣س + ٥ < ٧$$

$$ج) ١٢ \leq ٣ + ٥ - ٥ \leq ٣ + ٥ - ٥$$

[٧] أوجد مجموعة الحل المشتركة لكل من المتراجحات التالية في ص ، ومثل الحل على خط الأعداد :

$$1) ١٢ < ٩ - ١٤ , ٣٩ < ٩ - ١٤$$

$$ب) س + ٥ > ٠ , س + ٢ > ٣$$

$$ج) ٤٦ < ٦ + ٥٥ \leq ٢٥ + ٥٨٠$$

[٨] إذا كان ثمن ساعة يزيد عن ثمن حقيبة بمقدار ١٢٠٠ ريال ، وكان ثمنهما معاً يساوي ٤٨٠٠ ريال ، فأوجد ثمن كل من الحقيبة وال ساعة .

[٩] مستطيل محيطه يساوي ٦٠ سم ، فأوجد كلاً من طوله وعرضه إذا علمت أن عرض المستطيل يقل عن طوله بمقدار ٨ سم .

[١٠] إذا كان الأجر اليومي لخمسة تجارين ، وسبعة حدادين يساوي ٢٠١٠٠ ريال ، فأوجد أجر كل من النجار والحادي إذا علمت أن أجر النجار يقل عن أجر الحداد بمقدار ٣٠٠ ريال .

٤: اختبار الوحدة

[١] صُنف كلاً من الجمل التالية إلى جمل صائبة أو خطأ أو جمل مفتوحة:

أ) $s = 0$

ب) $\exists x \in \{3, 5, 8, 10\}$

ج) $s \neq 0$

د) ع عدد صحيح فردي.

هـ) $2 < l \leq 3$

و) وجوب الجهاد ضد اليهود المحتلين في فلسطين.

[٢] إذا كانت مجموعة التعويض هي $\{15, 20, 25, 10, 15, \dots\}$ فإن مجموعة الحل للجملة المفتوحة « s عامل من عوامل العدد ١٥» هي:

أ) $\{15, 5\}$ ب) $\{15, 3\}$

جـ) $\{5, 3, 1\}$ دـ) $\{5, 3\}$

[٣] أوجد مجموعة الحل لكل مما يأتي، علماً بأنّ مجموعة التعويض هي صـ ثم تحقق من صحة الحل :

أ) $9 = 1 + 2s$

بـ) $10 = s - 2$

[٤] عدـان الفرق بين الأول والثاني ٥ ، ومجموعـهما ٢٣ ؛ فأـوجـدـ العـدـدينـ.


[٥] حلـ المـتـراـجـحةـ : $17s - 5 < 5s + 31$ في صـ

٥ : ١ أنواع الزوايا

سبق وأن تعرفت على أربعة أنواع من الزوايا هي : الزاوية الحادة ، الزاوية القائمة ، الزاوية المنفرجة ، الزاوية المستقيمة .

نشاط

قس الزوايا المرسومة في الشكل (٤١-٥) ، ب ، ج ، و ثم أكمل الجدول التالي :



شكل (٤١-٥)

رقم الشكل	(أ)	(ب)	(ج)	(و)
اسم الزاوية				
قياس الزاوية				
نوع الزاوية				

من الجدول يتبين لك أن :

﴿ أ ب ج زاوية حادة ، لماذا ؟ ﴾

﴿ س م ص زاوية قائمة ، لماذا ؟ ﴾

﴿ جم و زاوية منفرجة ، لماذا ؟

﴿ علـ زاوية مستقيمة ، لماذا ؟

تذكـر :

الزاوية الحادة قياسها أكبر من صفر وأصغر من 90° .

الزاوية القائمة قياسها يساوي 90° .

الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من 90° وأصغر من 180° .

الزاوية المستقيمة قياسها يساوي 180° .


الزاوية المـنـعـكـسـة :

الزاوية التي قياسها أكبر من 180° وأصغر من 360° تسمى زاوية منـعـكـسـة.

مثال (١)

أوجـدـ قـيـاسـ ﴿ أـ بـ جـ)ـ (ـ الـمـنـعـكـسـةـ)ـ فـيـ الشـكـلـ (ـ ٢ـ٥ـ)ـ

الـحـلـ :



لـإـيجـادـ قـيـاسـ ﴿ أـ بـ جـ)ـ (ـ الـمـنـعـكـسـةـ)ـ

قسـ الزـاوـيـةـ أـ بـ جـ التـيـ قـيـاسـهـ أـصـغـرـ

من 90° (استخدم المـنـقـلـةـ فـيـ الـقـيـاسـ)ـ .

ستـجـدـ أـنـ : وـ (ـ أـ بـ جـ)ـ = 75° ـ ،ـ


شـكـلـ (ـ ٢ـ٥ـ)ـ

مجموع قياسي الزاويتين $\angle A$ و $\angle C$ ، $\angle A + \angle C = 360^\circ$

$$\therefore \text{قياس } \angle A + \angle C (\text{المعكسبة}) = 360^\circ - 75^\circ = 285^\circ$$

$$\therefore \angle (A + C) (\text{المعكسبة}) = 285^\circ$$

مثال (٢)



شكل (٣-٥)

من الشكل (٣-٥) :

أوجد قياس الزاوية
س ص ع المعكسبة.


الحل:

\therefore مجموع قياسي الزاويتين س ص ع ، س ص ع المعكسبة = 360°

$$\angle (S + C) (\text{المعكسبة}) = 360^\circ - 135^\circ = 225^\circ$$

$$\therefore \angle (S + C) (\text{المعكسبة}) = 225^\circ$$

مثال (٣)



شكل (٤-٥)

من الشكل (٤-٥) : حدد نوع

الروايا التالية :





$\angle A$ و $\angle B$ ، $\angle B$ و $\angle C$ ، $\angle C$ و $\angle D$ ،

$\angle D$ و $\angle A$ ، $\angle A$ و $\angle B$ ، $\angle B$ و $\angle C$

نوعها	الزاوية
حادة	أ ب و
منفرجة	ب ج
قائمة	ه و
منعكسة	ه ول
مستقيمة	أ ب ج
منعكسة	ب و ه

قارين ومسائل




[١] أكمل الجدول التالي :

				الزاوية
.....	نوعها

شكل (٥-٥)



[٢] فس ، ثم حدد نوع كل من الزوايا في الشكل (٦-٥) :



نوع الزاوية ... نوع الزاوية ... نوع الزاوية ...

[٣][ا] إذا كان $\angle \text{بـ جـ} = 45^\circ$ فإن $\angle \text{بـ جـ}$ المنعكسة = ...

(ب) إذا كان $\angle \text{لـ مـ} = 110^\circ$ فإن $\angle \text{لـ مـ}$ المنعكسة = ...




شكل (٧ - ٥)

[٤] من الشكل (٧-٥) :

حدد نوع الزوايا التالية :

$\angle \text{جـ هـ}$ ، $\angle \text{بـ جـ}$ ، $\angle \text{جـ بـ}$



شكل (٨ - ٥)

ما نوع كل من الزوايا التالية :

أولاً : $\angle \text{مـ بـ}$


ثانياً : $\angle \text{مـ هـ}$

ثالثاً : $\angle \text{مـ وـ}$

رابعاً : $\angle \text{جـ مـ هـ}$

خامساً : $\angle \text{مـ صـ}$

[٦] من الشكل (٩-٥) ، سٌ :



- ٣ زوايا حادة .
- ٣ زوايا قائمة .
- ٣ زوايا منفرجة .
- ٣ زوايا مستقيمة .
- ٣ زوايا منعكسة .


شكل (٩ - ٥)

العلاقة بين الزوايا


٢ :

الزاويتان المجاورتان :


في الشكلين (١٠ - ٥) ، (١١ - ٥) الزاويتان $\angle B\text{ و } \angle B$ تشتراكان في الرأس B ، وفي الضلع B ، وتقعان في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك ، تسمى هاتان الزاويتان زاويتان مجاورتان .




شكل (١٠ - ٥)



شكل (١١ - ٥)




في الشكلين (١٢ - ٥)، (١٣ - ٥) : زاويتان مجموع قياسيهما 180° ، تسمى كل زاويتين مجموع قياسيهما 180° زاويتان متكاملتان .



الزاویتان المتكاملتان : في الشكل (١٤ - ٥) يمكننا أن نحدد زاويتين مجموع قياسيهما 90° ، تسمى كل زاويتين مجموع قياسيهما 90° زاويتان متكاملتان .

مثال (١)



في الشكل (١٥ - ٥) كل من $\angle B$ ، $\angle G$ بـ هـ قائمة ، فإذا كان $\angle 2 = 70^\circ$ هل $\angle 1 = \angle 3$ ؟ ولماذا ؟

$\therefore \text{نـ} \propto \text{أـ بـ جـ قـائـمـة}$

$$\therefore \text{نـ} \propto (\text{١ـ}) = ٧٠ - ٩٠ = ٢٠^\circ$$

$\therefore \text{نـ} \propto \text{وـ بـ هـ قـائـمـة}$

$$\therefore \text{نـ} \propto (\text{٣ـ}) = ٧٠ - ٩٠ = ٢٠^\circ$$


$$\therefore \text{نـ} \propto (\text{١ـ}) = \text{نـ} \propto (\text{٣ـ})$$

كرر الحل لنفس المثال عندما تكون $\text{نـ} \propto = ٥٠^\circ$ ، $\text{نـ} \propto (\text{٢ـ}) = ٦٠^\circ$

ما سبق تستنتج أن :

الزاويتين المتمممتين لزاوية واحدة متساويتان في القياس .

مثال (٢)



في الشكل (١٦-٥) :

$\text{أـ بـ جـ مـسـتـقـيمـةـ} ,$

$\text{وـ بـ هـ مـسـتـقـيمـةـ} ,$

$\text{فـهـلـ نـ} \propto (\text{١ـ}) = \text{نـ} \propto (\text{٢ـ}) ?$

ولماذا ؟

الحل:

$$\therefore \text{نـ} \propto (\text{١ـ}) + \text{نـ} \propto (\text{٣ـ}) = ١٨٠^\circ$$

$$\therefore \text{نـ} \propto (\text{١ـ}) = ١٨٠^\circ - \text{نـ} \propto (\text{٣ـ})$$

$$\therefore \angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$(2) \quad \angle A - \angle B = 180^\circ$$

بمقارنة (1) ، (2) نحصل على أن :

$$\angle A = \angle B$$

مما سبق نستنتج أن :

الزاويتين المكملتين لزاوية واحدة متساويتان في القياس

مبرهنة (1) :

الزاويتان المجاورتان الخادستان من تلاقي شعاع بمستقيم متكمالتان.


المعطيات :

في الشكل (١٧ - ٥) :

ج ، شعاع لاقى المستقيم ℓ ب

في ج

المطلوب :



شكل (١٧ - ٥)


إثبات أن : $\angle 1$ تكمل $\angle 2$

البرهان :

$\therefore \angle A + \angle B = \angle AGB$ المستقيمة .

$\therefore \angle 1$ تكمل $\angle 2$

مثال (٢)




شكل (١٨ - ٥)

من الشكل (١٨ - ٥) :

احسب $\angle LSC$

١٩-٥) سع ل تكمي ل عص . لأن سع ص مستقيمة .

$$\therefore \text{م}(\text{ل عص}) = ١٨٠ - ٧٠ = ١١٠$$



شكل (١٩ - ٥)

مثال (٣)

في الشكل (١٩-٥) ،

أوجد قياس $\angle GHD$


$$\therefore \text{م}(\angle HGD) + \text{م}(\angle HDG) = ١٤٠$$

$$\therefore \text{م}(\angle HGD) + \text{م}(\angle GHD) + \text{م}(\angle HDG) = ١٨٠$$

$$\therefore \text{م}(\angle GHD) = ١٨٠ - ١٤٠ = ٤٠$$

ćمارين ومسائل

[١] سَمِّ زوجين من الزوايا المتكاملة في
الشكل (٢٠ - ٥) .



شكل (٢٠ - ٥)

[٢] اذكر زاويتين مجموع قياسيهما ٩٠ درجة

[٣] اذكر زاويتين مجموع قياسيهما ١٨٠ درجة


[٤] ما قياس الزاوية المتممة للزاوية التي قياسها ٥٠ درجة ؟

[٥] ما قياس الزاوية المكملة للزاوية التي قياسها 80° ؟


[٦] املأ الفراغات التالية :

- الزاوية التي قياسها 80° تتممها زاوية قياسها
- الزاوية التي قياسها 120° تكملها زاوية قياسها
- الزاوية التي قياسها 45° تتممها زاوية قياسها


[٧] بدون استخدام المنقلة، أوجد قياس كل من الزوايا المجهولة في الأشكال (٥ - ٢١ ، ب ، ج) .



(ج)



(ب)



(أ)

شكل (٢١-٥)

[٨] أكمل الجدول التالي :

قياس الزاوية	180°	90°	35°	75°	140°	65°	70°
قياس متممها						20°	
قياس مكملتها						110°	

[٩] ما قياس الزاوية المتممة والزاوية المكملة للزاوية 60° ؟

[١٠] أكمل كما في المثال :

- متممة الزاوية الحادة **حادة** ، ومكملة الزاوية الحادة **منفرجة** .
- مكملة الزاوية القائمة ومكملة الزاوية المنفرجة

٥ : الزوايا المتقابلة بالرأس


تأمل الشكل (٢٢ - ٥) ،

$\angle A$ ، $\angle C$ يتقاطعان في م :

- هل الزاويتان $\angle A$ ، $\angle C$ متساوتان بالرأس . ولماذا ؟

- هل الزاويتان $\angle A$ ، $\angle B$ متساوتان بالرأس . ولماذا ؟

- هل الزاويتان $\angle C$ ، $\angle B$ متساوتان بالرأس . ولماذا ؟



شكل (٢٢ - ٥)

- استخدم المنقلة لقياس الزوايا الأربع ...

وقارن قياساتها ، ماذا تستنتج ؟

مبرهنة (٢) :

إذا تقاطع مستقيمان ، فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان في القياس .

المعطيات : $\overleftrightarrow{L_1}$ ، $\overleftrightarrow{L_2}$ يتقاطعان


في النقطة م ،

[انظر الشكل (٢٣ - ٥)]

المطلوب : إثبات أن :

$$(1) \angle 1 = \angle 3$$

$$(2) \angle 2 = \angle 4$$



شكل (٢٣ - ٥)


$$\begin{aligned} & \therefore m(\angle 1) + m(\angle 2) = 180^\circ, \text{ لماذا؟} \\ & \therefore m(\angle 3) + m(\angle 2) = 180^\circ, \text{ لماذا؟} \end{aligned}$$

$$\therefore m(\angle 1) + m(\angle 2) = m(\angle 3) + m(\angle 2)$$

وبطرح $m(\angle 2)$ من الطرفين

ينتظر أن : $m(\angle 1) = m(\angle 3)$ وهو المطلوب (١)

والمثل نجد أن : $m(\angle 2) = m(\angle 4)$ وهو المطلوب (٢)



مثال (١)

في الشكل (٢٤ - ٥) :
 \leftrightarrow ، ص \leftrightarrow يتقاطعان في م
إذا كان $m(\angle 4) = 48^\circ$
فاحسب $m(\angle 1)$ ، $m(\angle 2)$ ، $m(\angle 3)$

الحل:

$$\begin{aligned} & \because \angle 4 ، \angle 1 متكاملتان \\ & \therefore m(\angle 1) = 180^\circ - 48^\circ = 132^\circ \end{aligned}$$


$\therefore \angle 4 ، \angle 2$ متكاملتان بالرأس

$$\therefore m(\angle 4) = m(\angle 2) = 48^\circ$$

كما أن : $\angle 1 ، \angle 3$ متكاملتان بالرأس

$$\therefore m(\angle 1) = m(\angle 3) = 132^\circ$$

مثال (٢)



في الشكل (٥ - ٢٥) :

$\angle M$ ينصف $\angle W$ و $\angle M$

أوجد $\angle W$ ($\angle W$ و $\angle M$)

شكل (٢٥-٥)

الحل:

$$\therefore \angle W + \angle G + \angle H + \angle B = 180^\circ \quad \text{لماذا؟}$$

$$\therefore 180^\circ = 50^\circ + \angle G + \angle H$$

$$180^\circ = 104^\circ + \angle G + \angle H$$


بطرح 104° من الطرفين نجد أن

$$\angle G + \angle H = 180^\circ - 104^\circ = 76^\circ$$

$$\therefore \angle W = 76^\circ$$

$$\angle W = \angle V \quad \text{(لماذا؟)}$$

$$\therefore \angle V = \frac{76}{2} = 38^\circ \quad \text{(لماذا؟)}$$



تدريب

في الشكل (٥ - ٢٦) :

$\angle A + \angle G + \angle H$

+ $\angle B = 180^\circ$ ، (لماذا؟) (١)


شكل (٢٦-٥)

(٢) $180^\circ = (\text{.....} \times) + \text{و}(\text{لماذا؟})$

بجمع (١) ، (٢) ينتج أن :

$$\text{و}(\text{.....} \times) + \text{و}(\text{.....} \times) + \text{و}(\text{.....} \times) + \text{و}(\text{.....} \times) + \text{و}(\text{.....} \times) = 360^\circ , \text{ (لماذا؟)}$$

مجموع قياسات الزوايا حول نقطة تساوى 360°



من الشكل (٢٧-٥) :

أوجد $\text{و}(\text{ـ بـ هـ})$.

الحل:

$$\text{و}(\text{ـ بـ جـ}) + \text{و}(\text{ـ جـ بـ e}) + \text{و}(\text{ـ eـ بـ هـ}) + \text{و}(\text{ـ هـ بـ f}) = 360^\circ$$

$$360^\circ = 90^\circ + 45^\circ + \text{و}(\text{ـ eـ بـ هـ}) + 75^\circ$$

$$\text{و}(\text{ـ eـ بـ هـ}) + 210^\circ = 360^\circ$$


وبطريق 210° من الطرفين

$$\text{و}(\text{ـ eـ بـ هـ}) + 210^\circ = 360^\circ - 210^\circ$$


$$\therefore \text{و}(\text{ـ eـ بـ هـ}) = 150^\circ .$$

قارين ومسائل


[١] أوجد قيم ص بالدرجات في كل من الأشكال (٢٨-٥، ب، ج).



شكل (٢٨-٥ ج)




شكل (٢٨-٥ ب)



شكل (٢٨-٥ ج)

[٢] من الشكل (٢٩-٥) أكمل الفراغات التالية :



شكل (٢٩-٥)


أ) \angle د \angle ل تجاور كلاً من \angle ... ،

\angle ... ، وتقابلهما بالرأس \angle ... ،


ب) \angle د \angle ط تجاور كلاً من \angle ... ،

\angle ... ، وتقابلهما بالرأس \angle


[٣] من الأشكال (٤٣٠-٥، ب، ج)، أوجد قياس الزاوية ع بالدرجات:



شكل (٤٣٠-٥ ج)



شكل (٤٣٠-٥ ب)



شكل (٤٣٠-٥ ج)

من الشكل (٣١ - ٥) :

ووجد قياس كل من الزوايا التالية :

$\angle ١$ ، $\angle ٢$ ، $\angle ٣$ ، $\angle ٤$


مع العلم بأن: $\angle_١ = \angle_٢ = \angle_٣ = \angle_٤$

تقاطع في م.

[٥] من الشكل (٣٢ - ٥) :

أوجد قياس ($\angle A$ و $\angle B$)

بالدرجات.



شكل (٣٢ - ٥)


[٦] من الشكل (٣٣ - ٥) :

حدد كلاً من :

(أ) الزوايا المترادفة.

(ب) الزوايا المتكاملة.

(ج) الزوايا المتقابلة بالرأس.



شكل (٣٣ - ٥)

[٧] في الشكل (٥ - ٣٤) :


أ ج ، س ص يتقاطعان في ب ،
ب ج ، س ج

(١) احسب $\angle 1 + \angle 2$

(٢) سم زوجين من الزوايا المتقابلة بالرأس.


(٣) سم زاوية تتمم $\angle 1$

(٤) سم زوجاً من الزوايا التي تكمل $\angle 2$



شكل (٣٤ - ٥)


٤ : المستقيمات المتوازية



شكل (٣٥ - ٥)

- الشكل (٥ - ٣٥) يبين أن المستقيم

اب يقطع المستقيم ج في النقطة ه




شكل (٣٦ - ٥)

- الشكل (٥ - ٣٦) يبين أن المستقيم ب

يواري المستقيم ج وكذلك

ص ص يواري المستقيم ع م




ارسم المستقيم $أب$ ، ثم استخدم المثلث القائم لرسم مستقيمين $جـ$ ، $هـ$ و عموديين على المستقيم $أب$ ، انظر الشكل (٣٧-٥) ، ماذا تلاحظ على المستقيمين $جـ$ ، $هـ$ ؟

تعريف

أي مستقيمين في المستوى إما يكونان متقاطعين في نقطة واحدة أو متوازيين والمستقيمان المتوازيان لا يلتقيان أبداً . ونرمز للتوازي بالرمز \parallel فنكتب: $أب \parallel جـ$ [ويقرأ المستقيم $أب$ يوازي المستقيم $جـ$] .

مثال




في الشكل (٣٨-٥) سُمِّيَتْ زوجاً المستقيمات المتوازية .

الحل:


$أب \parallel جـ$ ، $أب \parallel هـ$ ، $جـ \parallel هـ$ ، $سـ \parallel عـ$

تدرییات و مسائل


[١] حدد أزواج المستقيمات المتوازية في كل من الأشكال (٥-٣٩، ب، ج) :



شكل (٥-٣٩ ج)




شكل (٥-٣٩ ب)




شكل (٥-٣٩ ج)

[٢] في أي من الشكلين (٥ - ٤٠ ، ب) تكون صورة المستقيم $أب$ في المراة توازي سطح المراة ؟



شكل (٥-٤٠ ب)



شكل (٥-٤٠ ج)


[٣] ارسم $أب \parallel جه$ ثم \leftrightarrow يوازي أحد المستقيمين $أب$ أو $جه$ ، هل \leftrightarrow يوازي المستقيم الآخر ؟

[٤] هل يمكن أن يمْرُّ عمودان على مستقيم واحد في نقطة واحدة ؟ لماذا ؟


الزوايا المتبادلة والزوايا المتناظرة والزوايا الداخلية

٥


١ - إذا قطع مستقيم أي مستقيمين في المستوى فإنه ينشأ من التقاطع ثلاث مناطق كما هو واضح من الشكلين (٤١ - ٥) ، (٤١ - ٥ ب).



شكل (٤١ - ٥ ب)





شكل (٤١ - ٥)




شكل (٤٢ - ٥)

٢ - الزاويتان ١ ، ٧ في الشكل (٤٢ - ٥) تقعان في المنطقة الداخلية وفي جهتين مختلفتين من القاطع لذا تسميان زاويتان متبادلتان ، وكذلك الزاويتين ٢ ، ٨ متبادلتين و يمكن تمييز الزاويتين المتبادلتين بتمثيلهما بالشكل (Z) في أوضاعه المختلفة :




ب - الزاويتان ٤ ، ٨ تقعان في جهة واحدة من القاطع وإحداهما في المنطقة الداخلية ، والأخرى في المنطقة الخارجية لذا تسميان زاويتان متناظرتان ويمكن تمثيلهما بالشكل F

في أوضاعه المختلفة :



ج - الزاويتان ١ ، ٨ تقعان في المنطقة الداخلية وفي جهة واحدة من القاطع لذا تسميان زاويتان داخليتان أو «متحالفتين» وكذلك الزاويتان ٢ ، ٧ زاويتان داخليتان .

مثال (١)





في الشكل (٤٣-٥) : س ص
يقطع كلاً من أ ب ، ج د في النقطتين
ه ، و على التوالي حدد :
أ - زوجين من الزوايا المتبادلة .
ب - زوجين من الزوايا المتناظرة .

ج - زوجين من الزوايا الداخلية .

الحل:

- ١ - أ ه و ، ب ه و ، ج و ه
- ب - س ه و ، أ ه و ج ، ج و ص
- ج - أ ه و ، ب ج و ه ، ج و ه

في كل من الشكلين (٤٤-٥ ، ب) أوجد كل أزواج الزوايا :
 ج) الداخلية . ب) المتناظرة . ا) المتبادلة .




شكل (٤٤-٥)

شكل (٤٤-٥ ب)

نشاط

أولاً : في الشكل (٤٥-٥) المستقيم L_1 قاطع للمستقيمين L_1 ، L_2 استخدم المنقلة لقياس كل من الزوايا المرقمة ، ثم أكمل الجدول الآتي :




الزاوية	قياسها
٤	
٣	
٢	
١	

شكل (٤٥-٥)

- ١ - هل $\angle(1) = \angle(4)$ ؟ الزاويتان ١ ، ٤ متبادلتان .
- ٢ - ما الزوج الآخر من الزوايا المتبادلة ؟ هل الزاويتان لهما القياس نفسه ؟
- ٣ - هل كل زاويتين متبادلتين متساويتان في القياس ؟
- ٤ - هل المستقيم $L_1 \parallel L_2$ المستقيم L_1 ؟

ثانياً : تأمل ماذا سيحدث إذا كان L_1 ، L_2 متوازيين :

- في الشكل (٤٦-٥) المستقيم L_1 // المستقيم L_2 ، والمستقيم L قاطع لهما، استخدم المنقلة لقياس كل من الروايا المرقمة ثم أكمل الجدول الآتي :



٤	٣	٢	١	الزاوية
				قياسها


شكل (٤٦-٥)

- ١ - هل كل زاويتين متبادلتين في الشكل (٤٦-٥) متساويتان في القياس؟
- ٢ - ماذا تستنتج من كل من أولاً وثانياً؟

حقيقة (١)

إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين متساويتان في القياس .

مثال (٢)



في الشكل (٤٧-٥) $s \parallel 1 \parallel 2$ ،
 $\angle 1 = \angle 2 = 60^\circ$ ،
أوجد قياس كل من $\angle 1$ ، $\angle 2$ ، $\angle 3$ ، $\angle 4$ ، $\angle 5$ ، $\angle 6$.

٤١ ب س ، ٤١ ب جـ متجاورتان ومتكمالتان .

$$\therefore \text{م}(\text{٤١ ب س}) + \text{م}(\text{٤١ ب جـ}) = ١٨٠^\circ$$

$$\text{أي أن } ٦٠^\circ + \text{م}(\text{٤١ ب جـ}) = ١٨٠^\circ$$


$$\therefore \text{م}(\text{٤١ ب جـ}) = ٦٠^\circ - ١٢٠^\circ = ٦٠^\circ$$

$\therefore \text{م}(\text{٤١ ب جـ}) = ٦٠^\circ$ ، $\text{ب} \parallel \text{جـ}$ ، جـ قاطع لهما .

$\therefore \text{م}(\text{٤١}) = \text{م}(\text{٤٢})$ لأنهما زاويتان متبادلتان

$$\therefore \text{م}(\text{٤١}) = \text{م}(\text{٤٢}) = ٦٠^\circ$$

نتيجة (١)



شكل (٥-٤٨)

إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن :

ـ كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس .

ـ مجموع قياسي كل زاويتين داخليتين وفي جهة واحدة من القاطع $= ١٨٠^\circ$

المعطيات :

$L_1 \parallel L_2$ ، L قاطع لهما .

المطلوب : إثبات أن :

$$1 - \text{م}(\text{٤١}) = \text{م}(\text{٤٢})$$

$$2 - \text{م}(\text{٤٢}) + \text{م}(\text{٤٣}) = ١٨٠^\circ$$

١ - $\angle(1) = \angle(4)$ (لماذا؟)

$\angle(2) = \angle(4)$ (لماذا؟)

$\therefore \angle(1) = \angle(2)$

ب - $\angle(1) + \angle(3) = 180^\circ$ (لماذا؟)

ولكن $\angle(1) = \angle(2)$ (لماذا؟)

وهو المطلوب . $\therefore \angle(2) + \angle(3) = 180^\circ$

تدريب

ماذا سيحدث إذا لم يكن المستقيمان لـ ، لـ ، متوازيين ؟


هل ستبقى الزوايا المتناظرة متساوية في القياس ؟

هل سيبقى مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين = 180° ؟

مثال (٣)

من الشكل (٤٩-٥) :

أوجد $\angle S$.



شكل (٤٩ - ٥)

الحل:

ارسم مستقيماً يوازي المستقيمين الأفقيين كما هو مبين في الشكل (٤٩-٥ ب) ،

$١٨٠ = (١٢٠ + ٦٠)$ (داخليتان)

$٦٠ = ١٢٠ - ١٨٠ = (١٤٤)$

$٦٣ = (٢٤) + ٦٣$ (لماذا؟)

$\therefore \text{م}(\text{جس}) = \text{م}(١) + \text{م}(٢)$

$١٢٣ = ٦٣ + ٦٠$

شكل (٥-٤٩ ب)

نشاط

- ارسم مستقيمين $أب$ ، $جي$ ، متتقاطعين في النقطة $م$ كما في الشكل (١٥٠-٥).

- أوجد قياس الزاوية $م م$.


- ارسم مستقيماً ثالثاً $هـ$ و يقطع

المستقيم $جي$ في $س$ كما في
الشكل (٥٠-٥ ب) بحيث يكون


$\text{م}(أم س) = \text{م}(أم س و)$.

هل $أب \parallel هـ$ ؟

استخدم المسطرة والمثلث للتأكد من إجابتك.



شكل (٥-٥)



شكل (٥-٥ ب)

عكس حقيقة (١)

إذا قطع مستقيم مستقيمين في المستوى وحدثت زاويتان متبادلتان
ومتساويتان في القياس كان المستقيمان متوازيين .

نتيجة (٢)

إذا قطع مستقيم مستقيمين في المستوى ، وحدثت زاويتان متناظرتان
ومتساويتان في القياس كان المستقيمان متوازيين .





نتيجة (٣)

إذا قطع مستقيم مستقيمين في المستوى ، وحدثت زاويتان داخليتان
مجموع قياسيهما = 180° كان المستقيمان متوازيين .

مثال (٤)

في الأشكال (٥١-٥) ، (٥٢-٥) ، (٥٣-٥) ، (٥٤-٥) ، هل

$L_1 \parallel L_2$ ؟ علل إجابتك .




في الشكل (٥١-٥) لأن $\angle 1 = \angle 2$ لأن $\angle 1 = \angle 2$ متبادلتان ومتتساوتان في القياس في الشكل (٥٢-٥) لأن $\angle 1 = \angle 2$ متناظرتان ومتتساوتان في القياس في الشكل (٥٣-٥) لأن $\angle 1 = \angle 2$ متناظرتان ومتتساوتان في القياس في الشكل (٥٤-٥) لا يوازي $\angle 1$ وذلك لأن $\angle 1 \neq \angle 2$ متناظرتان وغير متتساوتين في القياس.


الخلاصة :

مما سبق مناقشته يمكن تلخيص علاقة الزوايا بالمستقيمات المتوازية كما يلي:

الزوايا المتبادلة




شكل (٥٦-٥)



شكل (٥٥-٥)


إذا كان $\angle 1 = \angle 2$ فإن $\angle 1 = \angle 2$

إذا كان $\angle 1 = \angle 2$ فإن $\angle 1 = \angle 2$



شكل (٥٨-٥)


إذا كان $\angle 1 = \angle 2$ فإن $\angle 1 = \angle 2$




شكل (٥٧-٥)

إذا كان $\angle 1 = \angle 2$ فإن $\angle 1 = \angle 2$

الزوايا الداخلية



شكل (٥-٦٠)




شكل (٥-٥٩)


إذا كان $\angle 1 = \angle 2$ فإن $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$ وإذا كان $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ فإن $\angle 3 = \angle 4$

تدرییات و مسائیل


[١] في كل من الأشكال (٤٦١-٥، ب ، ج) $\angle 1 = \angle 2$ ، أوجد قيمة س بالدرجات مبيناً السبب في كل حالة .



شكل (٥-٦١ ج)



شكل (٥-٦١ ب)



شكل (٥-٦١ د)

[٢] في الشكل (٤٦٢-٥)


أجب على الأسئلة الآتية :

أ - هل $\angle 1 = \angle 2$ (ج)

= ف (ج - ه) ؟

ب - هل $\angle 3 = \angle 4$ (ج)

= ف (ج - ه) ؟




شكل (٥-٦٢)


→ هل $\text{و}(\text{أ}\text{ب}\text{ج}) = \text{و}(\text{ج}\text{أ}\text{ب})$ ؟ اذكر السبب .

→ ماذا تقول عن $\text{و}(\text{ب}\text{ج}\text{ه})$ ، $\text{و}(\text{ج}\text{ب}\text{ه})$ ؟ اذكر السبب .


[٣] أوجد قياس كل الزوايا المشار إليها بالحروف في الأشكال التالية :




شكل (٥-٦٣ ج)



شكل (٥-٦٣ ب)




شكل (٤٦٣-٥)



شكل (٤-٦٤)

[٤] في الشكل (٤-٦٤-٥) :
 $\overleftrightarrow{ب\ ج}$ ، $\overleftrightarrow{\ص\ ج}$

$$\text{احسب: } س + ص + ع$$



شكل (٥-٦٥)


[٥] في الشكل (٥-٦٥-٥) :
 $\overleftrightarrow{ب\ ج}$ ، $\overleftrightarrow{ب\ ه}$ ، $\overleftrightarrow{ج\ و}$

هل $\text{و}(\text{أ}\text{ب}\text{ج}) = \text{و}(\text{ج}\text{أ}\text{ب})$ ؟
 فسر إجابتك .

[٦] كون معادلة في س في كل حالة ثم حل المعادلة :



شكل (٥-٦٦ ب)



شكل (٤٦٦-٥)

[٧] مستعيناً بالشكل (٦٧-٥) أجب عن الأسئلة الآتية :


أ- إذا كان $\angle 1 = \angle 2$ ،

أي المستقيمين في الشكل يجب أن يكونا متوازيين ؟ ولماذا ؟

ب- إذا كان $\angle 2 = \angle 3$ ،

أي المستقيمين في الشكل يجب أن يكونا متوازيين ؟ ولماذا ؟

شكل (٦٧-٥)




شكل (٦٨-٥)

[٨] في الشكل (٦٨-٥) :

$w \leftrightarrow s$ ، \overline{AB} منصف

$\angle 1$ وجـ، $\angle 2$ منصف جـس

أثبت أن $\overline{AB} \parallel \overline{GH}$



شكل (٦٩-٥)

[٩] في الشكل (٦٩-٥)

$b \leftrightarrow h$

$\angle 1 = \angle 2$ (هـ و)

هل $b \leftrightarrow h$ مبيناً السبب .



سبق أن وجدنا بالقياس أن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180°

في هذا الدرس نقدم البرهان الهندسي على ذلك :


مبرهنة (٣) :

مجموع قياسات زوايا المثلث تساوى 180°

المعطيات : في الشكل (٧٠-٥) $\triangle ABC$ مثلث .

المطلوب : إثبات أن :

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



البرهان : نرسم $SC \parallel AB$ يمر بنقطة الرأس A

: $SC \parallel BG$, AB قاطع لهما ،

$\therefore \angle 4 = \angle 2$ لماذا ؟

وبالمثل $\angle 5 = \angle 3$. لماذا ؟

بالجمع $\angle 4 + \angle 5 + \angle 1 = \angle 2 + \angle 3 + \angle 1$


إضافة $\angle 1$ للطرفين نجد أن :

$$\angle 4 + \angle 5 + \angle 1 = \angle 2 + \angle 3 + \angle 1$$

$\therefore \angle 4 + \angle 5 + \angle 1 = 180^\circ \dots \text{لماذا ؟}$

$$\therefore \angle 2 + \angle 3 + \angle 1 = 180^\circ$$

وهو المطلوب $\therefore \text{مجموع قياسات زوايا المثلث} = 180^\circ$



شكل (٧١ - ٥)

في الشكل (٧١ - ٥) :

$\angle A = 45^\circ$ ، $\angle B = 35^\circ$ ، $\angle C = ?$

$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

الحل :

$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ (لأن مجموع زوايا المثلث = 180° «مبرهنة ٣»)

$$45^\circ + 35^\circ + \angle C = 180^\circ$$

$$80^\circ + \angle C = 180^\circ$$

طرح 80° من الطرفين نجد أن :

$$180^\circ - 80^\circ + \angle C = 100^\circ$$

$$\angle C = 100^\circ$$

الزاوية الخارجة عن المثلث :


تأمل الشكل (٧٢ - ٥) :

أ ب ج مثلث ، مدّ ب ج على

استقامتـه إلى نقطة و ،

أ ج و هي زاوية خارجة عن المثلث أ ب ج

إذا مدّت الأضلاع أ ب ، ب ج ، ج أ في اتجاه واحد .



شكل (٧٢ - ٥)

فما عدد الزوايا الخارجية عن المثلث أ ب ج ؟

إذا مد أحد أضلاع المثلث على استقامته فإن الزاوية المحسورة بين امتداد هذا الضلع والضلع المجاور له تسمى زاوية خارجة .

مبرهنة (٤) :

الزاوية الخارجية عن المثلث تساوى مجموع الزاويتين الداخليتين غير المجاورة لها .


المعطيات : في الشكل (٧٣-٥) أ ب ج مثلث ، مدّت ب ج على استقامتها إلى د .

المطلوب : إثبات أن :

$$\text{م}(\text{أ}\text{B}\text{C}) = \text{م}(\text{A}\text{D}\text{C}) + \text{م}(\text{B}\text{D}\text{C}) \quad (٢)$$

البرهان :


$$\text{م}(\text{A}\text{B}\text{C}) + \text{م}(\text{B}\text{D}\text{C}) = \text{م}(\text{A}\text{D}\text{C}) + \text{م}(\text{B}\text{D}\text{C}) \quad (٣)$$



شكل (٧٣ - ٥)

لكن $\text{م}(\text{A}\text{D}\text{C}) + \text{م}(\text{B}\text{D}\text{C}) + \text{م}(\text{A}\text{B}\text{C}) = 180^\circ$ ، (لماذا؟)
 $\therefore \text{م}(\text{A}\text{B}\text{C}) = \text{م}(\text{A}\text{D}\text{C}) + \text{م}(\text{B}\text{D}\text{C})$ (وهو المطلوب)

مثال (٢)



شكل (٧٤ - ٥)

في الشكل (٧٤-٥) :

ط ل ع مثلث فيه : $\text{م}(\text{A}\text{L}\text{C}) = 50^\circ$ ،

$$\text{م}(\text{A}\text{D}\text{C}) = 25^\circ$$

أوجد بالدرجات $\text{م}(\text{A}\text{D}\text{C})$

$$\begin{aligned} & \therefore \text{طلع مثلث ، طعم خارجة له} \\ & \therefore \text{و } (\text{طعم}) = \text{و } (\text{علط}) + \text{و } (\text{علط}) \\ & \quad {}^{\circ} 25 + {}^{\circ} 50 = \\ & \quad {}^{\circ} 75 = \\ & \therefore \text{و } (\text{طعم}) = {}^{\circ} 75 \end{aligned}$$

ćمارين ومسائل

[١] إذا كان كل زوج من الدرجات التالية يمثل قياسي زاويتين في مثلث ما .


احسب قياس الزاوية الثالثة :

$$(1) \quad \dots , {}^{\circ} 37 , \dots , {}^{\circ} 58 , \dots , {}^{\circ} 99 (2)$$


$$(3) \quad \dots , {}^{\circ} 70 , \dots , {}^{\circ} 80$$

[٢] أوجد قياس الزاوية ص بالدرجات في كل من الأشكال



(٤٧٥-٥، ب، ج، ه)



شكل (٤٧٥-٥ ب)




شكل (٤٧٥-٥ ج)




شكل (٤٧٥-٥ ه)


[٣] أوجد قياس الزاوية بالدرجات في كل من الأشكال (٥-٧٦، ب، ج).



شكل (٥-٧٦ ج)



شكل (٥-٧٦ ب)



شكل (٥-٧٦ ج)

[٤] أي من الثلثيات التالية تعتبر قياسات زوايا مثلث . اذكر السبب :


(أ) $42^\circ, 58^\circ, 90^\circ$ (ب) $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$

(ج) $24^\circ, 24^\circ, 113^\circ$ (د) $73^\circ, 82^\circ, 25^\circ$


(ه) $77^\circ, 66^\circ, 55^\circ$ (و) $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$

[٥] من الشكل (٥-٧٧) :

أوجد $\angle A$ ، $\angle B$.



شكل (٥-٧٧)



شكل (٥-٧٨)

[٦] في الشكل (٥-٧٨) :

بدون استخدام المنقلة أوجد

قياسات زوايا المثلث $A B C$

[٧] في الشكل (٧٩-٥) :

$$\begin{aligned} \text{صـ سـ} &\parallel \text{لـ عـ} , \text{وهـ (لاـسـ لـ عـ)} = ٤٥^\circ \\ \text{وهـ (لاـ عـ لـ وـ)} &= ٦٥^\circ \end{aligned}$$

بدون استخدام المنقلة ، أوجد
قياسات زوايا المثلث سـ صـ لـ

شكل (٧٩-٥)

[٨] بـ جـ مثلث مـدـت قاعدهـ بـ جـ من جهةـ جـ إـلـىـ وـ ، ومـدـت قاعدهـ جـ بـ من جهةـ بـ إـلـىـ هـ فإذا كانت $\angle جـ = ١٣٥^\circ$ ، $\angle بـ هـ = ١٥٠^\circ$.
أوجد قياس كل زاوية من زوايا المثلث .

تطابق المثلثات

٧ : ٥

تأمل الأشكال (٨٠-٥) ، بـ جـ ٣ سم ، بـ جـ ٣ سم ،

(٨١-٥ ، بـ) ستجد أن :


(١) القطعتين المستقيمتين بـ ، جـ وـ

متطابقتان لتساوي طوليهما .

(٢) الزاويتين بـ جـ ، سـ صـ عـ


متطابقتان لتساويهما في

القياس .



شكل (٨١-٥ بـ)

وتعـرف أنهـ إـذـا أـمـكـن وضعـ مـثـلـثـ عـلـىـ آخـرـ وـانـطـبـقـتـ رـؤـوسـ أـحـدـهـماـ عـلـىـ رـؤـوسـ الـآخـرـ نـقـولـ إـنـ المـثـلـثـيـنـ مـتـطـابـقـانـ .



$\Delta \Delta$ اب ج ، س ص ع متطابقان .

انظر الشكلين (١٨٢-٥ ، ب)

(١) استخدم المسطرة لقياس أطوال جـ صـ عـ بـ .

أضلاع المثلثين اـ بـ جـ ، سـ صـ عـ . شكل (١٨٢-٥)

(٢) استخدم المنقلة لقياس زوايا المثلثين اـ بـ جـ ، سـ صـ عـ . ماذا تلاحظ؟

ستلاحظ أن :

$$(1) |اب| = |سـ صـ| , |بـ جـ| = |صـ عـ| , |جـ اـ| = |سـ عـ|$$

$$(2) وـ(جـ) = وـ(عـ) , وـ(بـ) = وـ(صـ) , وـ(اـ) = وـ(سـ)$$

أي أن : (١) الأضلاع المتناظرة في المثلثين متطابقة .


(٢) الزوايا المتناظرة في المثلثين متطابقة .

حالات تطابق المثلثات :

للمثلث ستة عناصر هي : ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا يلزم معرفة ثلاثة منها

لرسم المثلث كما سيرد في الحالات التالية :

الحالة الأولى: تطابق الأضلاع الثلاثة :




شكل (١٨٣-٥) [انظر الشكل (١٨٣-٥)]

نشاط

(١) ارسم المثلث اـ بـ جـ الذي فيه :

$$|اب| = 2 \text{ سم} , |بـ جـ| = 4 \text{ سم} ,$$



شكل (٨٣-٥ ب)

(٢) ارسم المثلث و هو الذي فيه :
 $|هـ| = ٢ \text{ سم}$ ، $|هـ| = ٤ \text{ سم}$
 $|ءـ| = ٣ \text{ سم}$

[انظر الشكل (٨٣-٥ ب)]

(٣) انقل أحد المثلثين على ورق شفاف وطبقه على المثلث الآخر. ماذا تلاحظ؟

ستلاحظ أن المثلثين يتطابقان تمام الانطباق .


(٤) استخدم المنقلة لقياس الزوايا $\angle ١$ ، $\angle ٢$ ، $\angle ٣$ ، $\angle ٤$ ، $\angle ٥$ ، $\angle ٦$ ، $\angle ٧$ ، $\angle ٨$ و

ستجده أن :

$\angle ١ = \angle ٤$ ، $\angle ٢ = \angle ٥$ ، $\angle ٣ = \angle ٦$ ، $\angle ٧ = \angle ٩$ ، $\angle ٨ = \angle ٧$
 ماذا تستنتج ؟

تستنتج أنه : إذا تطابق مثلثان لتساوي أطوال أضلاعهما المتناظرة فإن زواياهما المتناظرة تتطابق أيضاً .

ينطبق المثلثان كل مع الآخر ، إذا طابق كل ضلع في المثلث الضلع المقابل له في المثلث الآخر . ونرمز لهذه الحالة بالرمز (ض ض ض) .



مثال (١)

من الشكل (٨٤-٥) أثبت أن :

$\angle ١ = \angle ٤$ ، $\angle ٢ = \angle ٣$ ،

المعطيات : الشكل الرباعي $أـبـجـهـ$ فيه :
 $|أـبـ| = |بـجـ|$ ، $|جـهـ| = |هـأـ|$ ،

$\overline{بـهـ}$ قطر فيه .

إثبات أن :

$$\cdot (\neg x) \sim = (\exists x) \sim$$

البرهان :

$$\Delta\Delta \{ \begin{array}{l} \text{أ ب و ج ب و فيهما } | ب ج | = | ب ا | \\ \text{معطى } | ج و ا | = | ج و ا | \\ \text{معطى } \bar{B} \text{ و ضلع مشترك } \end{array} \}$$

٤٠: ينطبق المثلثان وينتتج أن : $\angle A = \angle C$ وهو المطلوب

(٥) مبرهنة

زاویتا القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان

المعطيات :

| ج ب | = | ج ب | مثلاً فيه:

المطلوب : برهن أن :

$\sim(\neg x) \sim = (\neg x) \sim$

العمل : نصف بـ جـ في النقطة « و »

ثم نصل النقطة (١) بالنقطة (٥)

[٨٥-٥] انظر الشكل .


البرهان :

\therefore ينطبق $\Delta\Delta$ وينتظر أن :

$$هـ(\triangle ABC) = هـ(\triangle ADE)$$

أي أن : $هـ(\triangle B) = هـ(\triangle E)$ ،

وهو المطلوب .



شكل (٨٦-٥)

مثال (٢)

في الشكل (٨٦-٥)

$$|AB| = |AE|$$

$$هـ(\triangle B) = ٩٤^\circ$$

النقطة «E» تنصف \overline{B} \overline{E} ،

أوجد $هـ(\triangle A)$

الحل :

نصل النقطتين A ، E ونحصل على أن $\Delta ABE \cong \Delta AED$ ، لماذا ؟

$$\therefore هـ(\triangle ABE) = هـ(\triangle AED)$$

$$\therefore هـ(\triangle ABE) + هـ(\triangle AED) = ٩٤^\circ$$


$$\therefore هـ(\triangle A) = ٩٤^\circ$$

$$\therefore هـ(\triangle A) = \frac{٩٤^\circ}{٢} = ٤٧^\circ$$


وهو المطلوب




[١] في الأشكال (٨٧-٥، ٤، ب، ج، د) : سه مثليين متطابقين مع ذكر السبب .




شكل (٨٧-٥ ب)



شكل (٨٧-٥ د)



شكل (٨٧-٥ د)



شكل (٨٧-٥ ج)

[٢] في المعين ٤ ب ج د . أثبت أن :

$$اه(\triangle جاد) = ه(\triangle جد)$$

[٣] في متوازي الأضلاع ٤ ب ج د ، إذا كانت النقطة « س » تنصف \overline{AD} والنقطة « ص » تنصف \overline{Bc} ، فأثبت أن :

$\Delta\Delta ٤ ب ص ، ج د س$ متطابقان .

الحالة الثانية: تطابق ضلعين والزاوية المخصوصة:

(١) ارسم المثلث $\triangle ABC$ الذي فيه :

$$|AB| = 5 \text{ سم} , |AC| = 3 \text{ سم} , \angle B = 55^\circ$$

$$\angle C = 55^\circ$$

[انظر الشكل (٤٨٨-٥)]

(٢) ارسم المثلث $\triangle SCU$ الذي فيه :

$$|SC| = 5 \text{ سم} , |CU| = 3 \text{ سم} ,$$

$$\angle C = 55^\circ$$

[انظر الشكل (٤٨٨-٥ ب)]

(٣) انقل أحد المثلثين وطبقه على الآخر . ماذا تلاحظ ؟

ستلاحظ أن $\triangle \triangle$ يتتطابقان .

(٤) استخدم المسطرة لقياس طول \overline{AJ} ، وكذلك طول \overline{SU}

استخدم المنقلة لقياس \overline{AS} ، \overline{AJ} ، \overline{CS} ، \overline{CU}

ماذا تلاحظ ؟


ستلاحظ أن : (١) $|AJ| = |SU|$.

(٢) $|AS| = |CU|$ ، $|AJ| = |CU|$.

أي أن الأضلاع المتناظرة متطابقة ، وكذلك الزوايا المتناظرة متطابقة .

ينطبق المثلثان كل منهما على الآخر تمام الانطباق إذا تطابق زوجان من الأضلاع المتناظرة والزاوية المخصوصة بينهما ، ونرمز لهذه الحالة بالرمز

(ض ز ض)



شكل (٨٩ - ٥)

من الشكل (٨٩ - ٥) أثبت أن :

$$(1) \quad h(\triangle AB) = h(\triangle AD)$$

$$(2) \quad |AB| = |AD|$$

المعطيات :

من الشكل (٨٩ - ٥) :

$$|(AB)| = |AD|, \quad h(\triangle AB) = h(\triangle AD)$$

المطلوب : إثبات أن :

$$(1) \quad h(\triangle AB) = h(\triangle AD) \quad (2) \quad |AB| = |AD|$$

البرهان :

معطى

$$|(AB)| = |AD|$$

معطى

$$\Delta \Delta \quad h(\triangle AB) = h(\triangle AD) \quad \text{فيهما} \\ \overline{AD} \quad \overline{AJ}$$


ضلوع مشترك

∴ ينطبق المثلثان وينتظر أن :

$$(1) \quad h(\triangle AB) = h(\triangle AD)$$

$$(2) \quad |AB| = |AD| \quad \text{وهو المطلوب}$$

« منصف زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين ينصف القاعدة ويكون عمودياً عليها ». .



شكل (٥-٩٠)

المعطيات :

$$\Delta ABC \text{ حيث } |AB| = |AC| ,$$

ω ينصف $\angle A$ ، ويقطع \overline{BC}

في النقطة « ω »

المطلوب : إثبات أن :

$$(1) |AB\omega| = |AC\omega|$$

$$(2) \overline{AO} \perp \overline{BC}$$

البرهان :

$$\left. \begin{array}{l} \text{معطى } |AB| = |AC| \\ \text{معطى } \angle A = \angle A \text{ فيهما } \\ \text{ضلع مشترك } \overline{AO} \end{array} \right\} \Delta \Delta$$

\therefore ينطبق $\Delta \Delta$ (ض . ز . ض) وينتظر أن :

$$(1) |AB\omega| = |AC\omega| \quad \text{وهو المطلوب أولاً}$$

$$(2) \omega(A\omega B) = \omega(A\omega C)$$


ولكن $\omega(A\omega B) + \omega(A\omega C) = 180^\circ$ متكمالتان ،

$$\therefore \omega(A\omega B) = \omega(A\omega C) = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$$


أي أن : $\overline{AO} \perp \overline{BC}$ وهو المطلوب ثانياً .





[١] حدد في كل من الأشكال (١٩١-٥، ب ، ج) المثلثين المتطابقين مع ذكر السبب :




شكل (١٩١-٥)



شكل (١٩١-٥ ب)



شكل (١٩١-٥ ج)



شكل (١٩٢-٥)


[٢] في الشكل (١٩٢-٥) أثبت أن :

$$(أ) \text{ } م(١) = م(٢)$$

$$(ب) \text{ } م(٣) = م(٤)$$

$$(ج) \text{ } \overline{م} \perp \overline{ب}$$

[٣] في الشكل (٩٣-٥)



$$|AB| = |AC|$$

$$AB \parallel AH, \text{ و } (\angle A) = 40^\circ$$

المطلوب : إثبات أن :

النقطة H تنصب على ج

[٤] ا ب ج ه مستطيل ، M نقطة تنصب على ج

المطلوب : إثبات أن : ΔAM متساوي الساقين .

[٥] المثلث A B C متساوي الأضلاع . فيه \overline{AH} ينصف $\angle A$ ويقطع BC

في النقطة H ، مد AH إلى النقطة H

$$|AH| = |AH|$$

المطلوب : إثبات أن :

ΔAHG متطابقان .

الحالة الثالثة : تطابق زاويتين وضلع :


نشاط

(١) ارسم المثلث A B C الذي فيه :


$$|BC| = 6 \text{ سم} , \text{ و } (\angle B) = 60^\circ$$

$$\text{و } (\angle C) = 50^\circ ,$$

[انظر الشكل (١٩٤-٥)]



شكل (١٩٤-٥)



رسم المثلث س ص ع الذي فيه :
 | ص ع = ٦٠ سم ، و ه (أ ص) = ٦٠ ° ،
 و ه (أ ع) = ٥٠ ° ،
 [انظر الشكل (٥-٩٤ ب)]


(٣) انقل أحد المثلثين على ورقة شفافة وطبقه على المثلث الآخر ماذا تلاحظ؟

ستلاحظ أن $\Delta\Delta$ يتطابقان ، وأن :

$$| ب | = | س | ، | ج | = | ص | ، و ه (أ ج) = و ه (أ س) .$$

أي أن الأضلاع المتناظرة في المثلثين متطابقة وكذلك الزوايا المتناظرة فيهما متطابقة .

ينطبق المثلثان كل على الآخر إذا تطابق في أحدهما ضلع وزاويتان نظائرها في المثلث الآخر . ونرمز لهذه الحالة بالرمز (ز ض ز) .



مثال

$$| م ب | = | ب م | .$$

١٩٨

المعطيات : $|JM| = |ME|$ ، $\angle(MJ) = \angle(ME)$.

المطلوب : إثبات أن : $|AM| = |BM|$

البرهان :

ΔAJM ، ΔBEM فيهما :

$\angle(MJ) = \angle(EM)$ (معطى)

$\angle(MAJ) = \angle(EBM)$... لماذا؟


$|JM| = |EM|$ (معطى)

∴ ينطبق المثلثان (ZPZ) وينتظر أن : $|MA| = |BM|$.

ثريين مشهور

إذا تساوت في مثلث زاويان فإن الضلعين المقابلين لهما يكونان متطابقين»

المعطيات : في الشكل (٩٦-٥) :



شكل (٩٦-٥)

$\angle(B) = \angle(E)$

المطلوب : إثبات أن : $|AB| = |AE|$

العمل : ننصف زاوية A بالمنصف AM

الذي يلاقي القاعدة BE في M .

البرهان :

ΔABM ، ΔAEM فيهما :

عملاً

$\angle(BAM) = \angle(EAM)$

معطى

$\angle(B) = \angle(E)$

AM ضلع مشترك .


وهو المطلوب

| ب | = | ج |


قارين ومسائل

[١] حدد المثلثات المتطابقة في كل من الأشكال (١٩٧-٥ ، ب ، ج ، ه) ،


ثم اذكر السبب :




شكل (١٩٧-٥ ، م)




شكل (١٩٧-٥ ، ج)



شكل (١٩٧-٥ ، ب)



شكل (١٩٨-٥ ، م)



شكل (١٩٨-٥ ، ب)

[٢] في الشكل (١٩٨-٥ ، ب) :

هل يتطابق ΔABC هل هو ؟
اذكر السبب .


[٣] في الشكل (١٩٩-٥) :

$B \parallel J$

$A \parallel B$

أثبت أن : $| AB | = | AJ |$

$| BJ | = | AB |$



شكل (١٩٩-٥)

[٤] في الشكل (١٠٠-٥) :

$$|AB| = 4 \text{ سم} , |EG| = 2.5 \text{ سم}$$


$$w(GJ) = 100^\circ$$

$\angle E$ ينصف كلاً من $\angle ABG$ ،

$\angle AEG$

أوجد :

$$|BG| , |AE| , w(GJ)$$



شكل (١٠٠-٥)

نشاط

(١) ارسم المثلث ABG القائم الزاوية

$$\text{في } B , |AG| = 5 \text{ سم} , |BG| = 4 \text{ سم} ,$$

[انظر الشكل (١٠١-٥)]

(٢) ارسم المثلث EH و القائم الزاوية

$$\text{في } H , |EH| = 5 \text{ سم} , |EH| = 4 \text{ سم} ,$$

[انظر الشكل (١٠٢-٥)]

(٣) انقل أحد المثلثين على ورقة شفافة

وطبقه على المثلث الآخر ، ماذا تلاحظ؟


ستلاحظ أن : $\Delta\Delta$ يتطابقان ، وأن

$$|AB| = |EH| ,$$

$$w(A) = w(E) , w(G) = w(H)$$

ينطبق المثلثان القائمان الزاوية إذا طابق في أحدهما الوتر وصلع نظيريهما في المثلث الآخر . ونرمز لهذه الحالة بالرمز (و ه و ض) .

مثال (١)



شكل (١٠٣-٥)

في الشكل (١٠٣-٥)

أثبت أن : \overline{AC} ينصف $\angle B$

المعطيات :

$$|AB| = |AC| .$$

$$\angle B = \angle C = 90^\circ .$$

المطلوب : إثبات أن :

\overline{AC} ينصف $\angle B$

البرهان : ΔABC فيهما :

$$\angle B = \angle C = 90^\circ \quad (\text{معطى})$$

الوتر AC مشترك


$$|AB| = |AC| \quad (\text{معطى})$$

∴ ينطبق المثلثان القائمان الزاوية (و ه و ض) وينتظر أن :

$$\angle B = \angle C .$$

وهو المطلوب

أي أن \overline{AC} ينصف $\angle B$



شكل (٥ - ١٠٤)

في الشكل (٥ - ١٠٤) ، $\angle A = \angle C$ ، $\angle B = \angle M$ ، أثبت أن :

(١) المثلثين $\triangle A B C$ ، $\triangle M B C$ متطابقان .

(٢) $\triangle M B C$ متساوي الساقين .

المعطيات :

$$\angle A = \angle C , \angle B = \angle M , |B| = |M|$$

المطلوب : إثبات أن : (١) $\triangle A B C \cong \triangle M B C$

$$|M| = |B|$$

البرهان : $\Delta A B C$ ، $\Delta M B C$ فيهما :

$$|A| = |M| , |B| = |B| , \text{لماذا ؟}$$

$$|A| = |M|$$

B ضلع مشترك

.. ينطبق المثلثان القائمة الزاوية (وه وض) وهو المطلوب أولاً ،

ينتظر من تطابق المثلثين $\triangle A B C$ ، $\triangle M B C$ أن :


$$|A| = |M| , |B| = |B|$$

.. $|M| = |B|$ ترين مشهور


ومنه يكون $\triangle M B C$ متساوي الساقين وهو المطلوب ثانياً .




[١] حدد المثلثات المتطابقة في كل من الأشكال (٤١٠٥-٥، ب، ج، ه) واذكر السبب :




شكل (٤١٠٥-٥ج) شكل (٤١٠٥-٥ه)



شكل (٤١٠٥-٥ب)




شكل (٤١٠٥-٥ب)



شكل (٤١٠٥-٥ه)

[٢] في الشكل (٤١٠٦-٥) :



شكل (٤١٠٦-٥)


المطلوب: (١) هل $\Delta ABC \cong \Delta GEB$?
اذكر السبب .

$$AB = BG \quad |AB| = |BG|$$

$$EB = EB \quad EB = EB$$

$$\angle ABE = \angle GEB \quad \angle ABE = \angle GEB$$

(٢) أوجد $|BG|$ ، و $(\angle GEB)$.



شكل (٤١٠٧-٥)

[٣] في الشكل (٤١٠٧-٥) :

نقطة تنصف \overline{BG} ،


$\overline{BG} \perp \overline{AB}$ ، و $\overline{BG} \perp \overline{AC}$ ،

فإذا كان : $|BG| = |CG|$ و


(١) أثبت أن : $AB = BG$ (٢) $\angle GEB$

(٢) ما نوع المثلث ABC ؟

[٤] في الشكلين (١٠٨-٥ ، ب) :



شكل (١٠٨-٥ ب)



أَمْ تَوَجَّهُ، سَمَّا مَعَ

فَإِذَا كَانَ : | ب | = | سَص | ،

| ج | = | سَع | ، | ج | = | سَم |

أثبِتْ أَنْ :

$$\Delta ABC \cong \Delta SMS$$

٥ : نظام الإحداثيات

نظام الإحداثيات على خط مستقيم :

نشاط (١)

- ارسم مستقيماً في كراسك
[انظر الشكل (١٠٩-٥)]
- حدد نقطة على هذا المستقيم لتكن (و).
- حدد النقاط : ا ، ب ، ج على يمين (و) بحيث $| او | = ١\text{ سم}$ ،
- $| او | = ٢\text{ سم} ، | وج | = ٣\text{ سم}$
- حدد على يسار (و) النقاط : و ، ه ، م بحيث $| او | = ١\text{ سم}$ ،
 $| او | = ٢\text{ سم} ، | وم | = ٣\text{ سم}$.
- إذا كانت النقطة (و) تمثل العدد صفر ، فإن النقطة (ا) تمثل العدد (١) .
- ما الأعداد التي تمثلها النقطتان ب ، ج ؟
- ما الأعداد التي تمثلها النقطتان و ، ه ، م ؟

لما سبق تلاحظ أن المستقيم المرسوم هو خط الأعداد وأن النقاط التي تقع على يمين النقطة (و) تمثل الأعداد الموجبة وأن النقاط على يسار (و) تمثل الأعداد السالبة ونكون في هذه الحالة قد مثلنا نظاماً إحداثياً على الخط المستقيم وتسمى النقطة التي تمثل العدد صفر نقطة الأصل (مبدأ الإحداثيات)، ويسمى العدد التي تمثله أي نقطة بإحداثي تلك النقطة.

عندما نعين نقطتين مثل (١، ٢) على خط مستقيم تمثلان العددين صفر، (١) على الترتيب، فإننا نكون قد عرفنا نظاماً إحداثياً على الخط المستقيم.

نشاط (٢)


عرف نظاماً إحداثياً على خط مستقيم بحيث تمثل النقطة (و) العدد صفر وتمثل النقطة (١) العدد (١).

- حدد على هذا النظام إحداثي النقطتين (ب) ، (ج) على يمين النقطة (و) والنقاط (هـ) ، (مـ) ، (نـ) على يسار النقطة (و). إذا علمت أن :

$$|وب|=2, \quad |و_1|=|ب_ج|,$$

$$|و_هـ|=|هـ_مـ|=|مـ_نـ|=|و_نـ|$$

انظر الشكل (١١٠-٥)، ماذا تلاحظ؟




- تلاحظ أن إحداثي النقطة (ب) هو (٢) وإحداثي النقطة (هـ) هو (-١) ما إحداثي كل من النقاط : (ج) ، (هـ) ، (مـ) ، (نـ)؟

مثال

ارسم خطأً مستقيماً، وحدد عليه النقطة (و) التي تمثل العدد (صفر)


ثم حدد عليه النقاط ١ ، ب ، ج ، ه ، م بحيث تمثل الأعداد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٢ ، -٥ على الترتيب .

الحل: الشكل (١١١-٥) هو الشكل المطلوب .



تمارين ومسائل

[١] في الشكل (١١٢-٥) حدد إحداثي النقاط : ج ، و ، ه ، م ، ن




[٢] ارسم خطًّا مستقيماً، ثم حدد عليه النقطة (و) التي تمثل العدد صفر .

حدد على هذا المستقيم النقاط: ١، ب، ج على يمين (و)

والنقاط: و ، ه ، م على يسار (و) بحيث يكون: $|و| = ١$ سم ، $|و-ب| = ٣$ سم ، $|ب-ج| = ٢$ سم ، $|و-ه| = ٤$ سم ، $|ه-م| = ٥$ سم

[٣] في الشكل (١١٣-٥)




حدد النقاط :

ب ، ج ، و ، ه ، ل ، ل، إذا علمت أن: $|و-ب| = ٣$ ، $|ب-ج| = |ج-ل|$ ، $|و| = ٤$ و $|و-ه| = ٤$ حيث ب ، ج تقع على يمين (و) و تقع ه ، ل على يسار (و) .

٤) عرف نظاماً إحداثياً على خط مستقيم ، ثم حدّد في هذا النظام النقاط ب ، ج ، و ، هـ) التي تمثل الأعداد ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ على الترتيب .

نظام الإحداثيات المتعامدة في المستوى :



شكل (١١٤ - ٥)

نشاط (١)

ارسم على ورقة رسمياً بيانياً
سـ سـ تـ صـ صـ [انظر الشكل
(١١٤ - ٥)] ،

- سـ نـ قـ طـةـ تـقـاطـعـ لـ
سـ سـ ، صـ صـ بـ وـ

- حـ دـ نـ ظـ اـ مـ إـ حدـ اـ ثـ يـاـ عـلـىـ كـلـ مـنـ
سـ سـ ، صـ صـ بـ يـ بـ يـ تـ كـوـنـ

نـ قـ طـةـ الـ وـ حـ دـةـ عـلـىـ سـ سـ هـ يـ هـ بـ
يـ سـ مـيـ سـ سـ بـ الـ حـوـرـ الـ سـيـنـيـ وـيـ سـ مـيـ صـ صـ بـ الـ حـوـرـ الصـادـيـ .

- النـ قـاطـ عـلـىـ مـحـوـرـ الـ سـيـنـاتـ عـلـىـ يـمـينـ النـقـطـةـ (ـ وـ) تـمـثـلـ أـعـدـادـاـ مـوـجـبـةـ وـلـذـلـكـ
يـ سـ مـيـ وـ سـ سـ الـ اـتـجـاهـ الـ مـوـجـبـ الـ حـوـرـ الـ سـيـنـاتـ .

لـمـاـ يـ سـ مـيـ وـ سـ سـ الـ اـتـجـاهـ السـالـبـ الـ حـوـرـ الـ سـيـنـاتـ ؟

لـمـاـ يـ سـ مـيـ وـ صـ صـ الـ اـتـجـاهـ الـ مـوـجـبـ الـ حـوـرـ الـ صـادـاتـ ؟

لـمـاـ يـ سـ مـيـ وـ صـ صـ الـ اـتـجـاهـ السـالـبـ الـ حـوـرـ الـ صـادـاتـ ؟

- كلـ نـقـطـةـ عـلـىـ مـحـوـرـ الـ سـيـنـاتـ تـمـثـلـ عـدـداـ يـسـمـيـ إـ حدـ اـ ثـيـ الـ سـيـنـيـ لـهـذـهـ النـقـطـةـ .

وكل نقطة على محور الصادات تمثل عدداً يسمى الإحداثي الصادي لهذه النقطة .


- المحوران الإحداثيان يقسمان المستوى الإحداثي إلى أربعة أرباع [انظر الشكل (١١٤-٥)] لاحظ أن إحداثي كل نقطة تقع في الربع الأول أعداد موجبة .

ما إشارة كل من إحداثي نقطة تقع في الربع الثاني ؟

ما إشارة كل من إحداثي نقطة تقع في الربع الثالث ؟

ما إشارة كل من إحداثي كل نقطة تقع في الربع الرابع ؟

نشاط (٢)



شكل (١١٥-٥)

في الشكل (١١٥ - ٥) لاحظ أن بعد النقطة ب عن محور الصادات ٢ وحدات فيكون إحداثيها السيني ٢ ، كما تجد بعد النقطة ه عن محور السينات ٤ وحدات فيكون إحداثيها الصادي ٤ ، وتتجد بعد النقطة ط عن محور الصادات ٢ وحدات من اليسار فيكون إحداثيها السيني (-٢) لأنها تقع في الاتجاه السالب لمحور السينات ،

كما تجد بعد هذه النقطة ٣ وحدات عن محور السينات إلى الأعلى

إحداثياتها الصادي (٣) .

ما الإحداثي السيني لكل من النقطتين ج ، ل ؟

ما الإحداثي الصادي لكل من النقاط ئ ، م ، ن ؟

ما الإحداثي السيني للنقطة ع ؟ وما إحداثياتها الصادي ؟

كل نقطة في المستوى الإحداثي لها إحداثيان أحدهما يسمى الإحداثي السيني والآخر يسمى الإحداثي الصادي وقد اصطلاح على أن نكتب الإحداثيين لكل نقطة على صورة زوج مرتب ، بحيث نكتب الإحداثي السيني أولاً ثم نكتب الإحداثي الصادي (س ، ص) .

ملاحظات :

(١) أي نقطة تقع على محور السينات إحداثياتها الصادي صفر وأي نقطة تقع على محور الصادات إحداثياتها السيني صفر .

(٢) أي نقطة تقع في الربع الأول يكون كل من إحداثياتها السيني والصادي موجباً ، وأي نقطة تقع في الربع الثاني إحداثياتها السيني سالب والصادي موجب ، وأي نقطة تقع في الربع الثالث يكون كل من إحداثياتها السيني والصادي سالباً ، وأي نقطة تقع في الربع الرابع يكون إحداثياتها السيني موجباً وإحداثياتها الصادي سالباً .

مثال (١)

مثل النقاط الآتية في المستوى الإحداثي (٣، ٣)، (٠، ٣)، (٣، ٠)، (٠، -٣)، (-٣، ٠)

المحل :

الشكل (١١٦-٥)

يمثل النقاط المطلوب

تحديدها .

لاحظ أن :

١ (٣،٠) تقع


على المحور السيني ،

ج (٣،٠) تقع

على المحور الصادي ،

شكل (١١٦-٥)

صمة



ولتحديد النقطة (٢ ، -٤) نتحرك في الاتجاه الموجب لمحور السينات وحدتين ونقيم عموداً على محور السينات ثم نتحرك في الاتجاه السالب لمحور الصادات ٤ وحدات . ونقيم عموداً على محور الصادات فتكون نقطة تقاطع العمودين هي النقطة هـ

النقطة م تقع في الربع الأول ، والنقطة ن تقع في الربع الثاني ، والنقطة ل تقع في الربع الثالث ، والنقطة هـ تقع في الربع الرابع .

لاحظ أن: $\overline{هـ} \perp \overline{مـ جـ}$ وينصفه أي أن المثلث هـ جـ متساوي الساقين.


من الشكل (١١٧-٥)

اكتب إحداثيات النقاط الموضحة

فيه: أ، ب، ج، د، ه، م، ف

ثم ارسم الشكل الرباعي أ ب ج د،

وأين ما نوعه؟



شكل (١١٧-٥)

الحل:

أ (٢، ٢)، ب (-١، ٠)، ج (٠، ٣)، د (٣، ٠)
 ه (٣، ٣)، م (١، ٢)، ف (٤، ٤)، ولرسم الرباعي نرسم
 أ ب، ب ج، ج د، د أ، الشكل الناتج أ ب ج د متوازي اضلاع
 تأكيد من ذلك بنفسك باستخدام أدوات القياس.

ćمارين ومسائل


- [١] على ورق بياني ارسم المستوى الإحداثي ، ثم حدد عليه النقاط :
 و (٠، ٠)، أ (-٣، ٠)، ب (٥، ٢)، ج (٢، ٥)،
 د (-٥، ٢)، ه (-٥، ٢)، ل (٣، ١)، م (٠، ٥)،
 ف (٢، ٥)، . (١، ٢، ٥).

[٢] في الشكل (٥ - ١١٨)]

اكتتب إحداثيات النقاط :

أ، ب، ج، د، ه، ل

على شكل أزواج مرتبة .



شكل (٥ - ١١٨)

[٣] ارسم \overline{AB} ، \overline{DE} إذا كان : د (٣ ، ٢) ، ب (-١ ، ١) ، ج (٤ ، -٣) ، د (-١ ، -٣) .

[٤] ارسم د ه و م ن إذا كان : د (٢ ، ٢) ، ه (٠ ، ٢) ، م (٣ ، ٤) ، ن (-١ ، ٣) ثم أجب على الآتي :

- ماعلاقة د ه بالمحور السيني ؟ وإذا كانت د نقطة على د ه ما هو إحداثيها الصادي ؟

- ماعلاقة م ن بالمحور الصادي ؟ وإذا كانت ب نقطة على م ن ما هو إحداثيها السيني ؟

[٥] ارسم د ب // س س و يقطع المحور الصادي في النقطة (٠ ، -٣) ، ما الإحداثي الصادي لأي نقطة تقع على د ب ؟

سـم جـ و صـ // صـ و يقطع المحور السيني في النقطة (٢ ، ٠) ما هو الإحداثي السيني لأي نقطة تقع على جـ ؟

[٧] لتكن (١ ، ٥) ، ب (-٣ ، ١) ، ج (١ ، ٥) ارسم ΔABC ،

وحدد نقطة المنتصف لـ \overline{AB} ولتكن M ، ثم أجب على الآتي :

- ما علاقة M بالمحورين الإحداثيين ؟

- ما علاقة M بالمحورين الإحداثيين ؟


- احسب مساحة ΔMBC .

الانعكاس

٨ :

الانعكاس في المحورين الإحداثيين :


إذا وضعت مرآة مستوية أمامك ، وتأملت فيها تلاحظ صورتك فيقال بأن صورتك نتجت عن انعكاس في سطح المرأة فيكون بعده عن المرأة يساوي بعد صورتك عن المرأة .



شكل (١١٩-٥)

إذا كان لدينا خط الأعداد ووضعنا مرآة عليه عند نقطة الأصل (٠) بحيث يكون سطح المرأة عمودياً على خط الأعداد كما في الشكل (١١٩-٥) نلاحظ أن صورة العدد (١) هي (-١) أي أن صورة العدد (١) بالانعكاس في النقطة (٠) هي (-١) . فما صورة الأعداد ٢ ، ٤ ، -٤ ، -٥ بهذه الأنعكاس ؟


نشاط (١)



شكل (١٢٠-٥)

انظر الشكل (٥ - ١٢٠) . حدد صورة النقطة $(٢ ، ٣)$. تجد أنها
 $(٣ ، ٢)$ وضح ماذا عملت ؟

نشاط (٢)



شكل (١٢١-٥)

ضع مرآة مستوية منطبقة على محور السينات ما صورة النقطة $(٢ ، ٠)$ ؟
 نحدد بعد N عن محور السينات فنجد هذا البعد وحدتين فتكون صورة النقطة N في الجهة الأخرى للمرآة تبعد وحدتين ، فإذا رمزنا لصورة N بالرمز N' نجد أن $N = N'$.

- الانعكاس في محور السينات يربط كل نقطة n (s, c) بنقطة n , ($s, -c$) .
- الانعكاس في محور الصادات يربط كل نقطة n (s, c) بنقطة n_2 ($-s, c$) .

ملاحظة :

كل نقطة n ($s, 0$) صورتها بالانعكاس في محور السينات نفسها ($s, 0$) وكل نقطة m ($0, c$) صورتها بالانعكاس في محور الصادات نفسها .

مثال (١)

استخدم الانعكاس في محور السينات ، في إكمال الفراغات التالية :

- $$(1) \quad (1, 2) \leftarrow (5, 2)$$
- $$(2) \quad (1, 3) \leftarrow (4, 3)$$
- $$(3) \quad (1, 5) \leftarrow (2, 5)$$

الحل:

- $$(1) \quad (5, 2) \leftarrow (2, 2)$$
- $$(2) \quad (4, 3) \leftarrow (3, 3)$$
- $$(3) \quad (2, 5) \leftarrow (2, 5)$$

أوجد صورة النقاط $A(2, 5)$ ، $B(3, -4)$ ، $C(-5, -4)$ بالانعكاس في محور الصادات .

الحل:

$$A(2, 5) \rightarrow (-2, 5)$$

$$B(3, -4) \rightarrow (-3, -4)$$

$$C(-5, -4) \rightarrow (5, -4)$$


الانعكاس في نقطة الأصل :

- في المستوى الإحداثي حدد النقطة $(2, 3)$ ، لاحظ أن الإحداثي السيني لهذه النقطة هو ٣ .

- حدد النقطة $B(0, 3)$ وصورتها بالانعكاس في محور الصادات $B(-3, 0)$ ، لاحظ أن الإحداثي الصادي للنقطة A هو ٢ ، حدد النقطة

$J(0, 2)$ وصورتها بالانعكاس في

محور السينات $J(0, -2)$ ، أقم عموداً من B على محور السينات وعموداً من J على محور الصادات ثم حدد نقطة تقاطعهما $(-3, 2)$. تسمى النقطة $(-3, 2)$ صورة النقطة A بالانعكاس في نقطة الأصل و.



شكل (١٢٢-٥)



حدد نقاط أخرى لتكن م (٢ ، ٥) ، ب (٠ ، ٤) ، ع (١ ، ١) ثم صورها بالانعكاس في و

إذا كانت ن (س ، ص) نقطة في المستوى الإحداثي ، ما صورتها بالانعكاس في نقطة الأصل (و) ؟ تأكد من ذلك .
مما سبق نستنتج أن :

الانعكاس في نقطة الأصل يربط كل نقطة ن (س ، ص) بنقطة ن_٣ (-س ، -ص)

مثال (٣)

عَيْن صور النقاط ١ (٢ ، ٥) ، ب (٣ ، ٤) ، ج (-٤ ، ٥) بالانعكاس في نقطة الأصل .

الحل:

$$\begin{array}{l} ١ (٢ ، ٥) \leftarrow (٥ ، ٢) \\ \text{ب } (٣ ، ٤) \leftarrow (٤ ، ٣) \\ \text{ج } (-٤ ، ٥) \leftarrow (٥ ، ٤) \end{array}$$

ćمارين ومسائل

[١] حدد صور النقاط ١ (٥ ، ٣) ، ب (-٤ ، ٢) ، ج (٢ ، ٣) ، و (٠ ، ٤) ، ه (-٢ ، ٥) بالانعكاس في محور السينات .

- [٢] حدد صور النقاط ١ (٣، ٢)، ب (٥-، ٣-) ، ج (١، ٥-) ،
ه (١-، ١-) ، هـ (٣، ٠-) ، ل (٠، ٤-) بالانعكاس في محور الصادات.
- [٣] حدد صور النقاط ن١ (٣، ٢)، ن٢ (٥-، ١-) ، ن٣ (٣-، ٤-) ،
ن٤ (١، ٥-) ، ن٥ (١، ٠-) ، ن٦ (٢-، ٠-) ، ن٧ (٠، ٤-) ،
ن٨ (٠، ٥-) الانعكاس في نقطة الأصل .
- [٤] استخدم الانعكاس (س ، ص) \leftarrow (-س ، ص) في إكمال الفراغات الآتية :
- أ (٣ ، ٥) \leftarrow (٢- ، ٤-) ، ب (٤- ، ٣-) \leftarrow (٠ ، ٢-) ،
ج (٤ ، ٠) \leftarrow (٠ ، ٣-) ، د (٣- ، ٢-) \leftarrow (٢ ، ١-) ،
هـ (٢ ، ١-) \leftarrow (٣- ، ٠-) ، ل (٠ ، ٠-) \leftarrow (٥ ، ٥-) ، ع (٥- ، ٥-) \leftarrow (٥ ، ٥-) .
- [٥] استخدم الانعكاس (س ، ص) \leftarrow (س ، -ص) في إكمال الفراغات الآتية :
- أ (١ ، ٢) \leftarrow (٢- ، ٤-) ، ب (٤- ، ٦-) \leftarrow (٠ ، ٦-) ،
ج (٤ ، ٠) \leftarrow (٠ ، ٦-) ، د (٦ ، ٠) \leftarrow (٤ ، ٠-) ،
هـ (٢ ، ١-) \leftarrow (٣- ، ٠-) ، ل (٠ ، ٠-) \leftarrow (٥ ، ٥-) ، ع (٥- ، ٥-) \leftarrow (٥ ، ٥-) .
- [٦] استخدم الانعكاس (س ، ص) \leftarrow (-س ، -ص) في إكمال الفراغات الآتية :
- أ (١ ، ٢) \leftarrow (٢- ، ٥-) ، ب (١ ، ٥-) \leftarrow (٥ ، ١-) ،
ج (٣ ، ١-) \leftarrow (١- ، ٦-) ، د (٤- ، ٦-) \leftarrow (٦- ، ١-) ،
هـ (١- ، ٢-) \leftarrow (٦- ، ٠-) ، ل (٠ ، ١-) \leftarrow (١ ، ١-) .

أكمل الفراغات الآتية بما يجعل الجمل صحيحة :



- (٤ ، ٣) هي صورة (٤ ، ٣) بالانعكاس في
- ب) (٣ ، ٤) هي صورة (٤ - ٣ ، ٤) بالانعكاس في
- ج) (٣ ، ٤) هي صورة (- ٣ ، ٤) بالانعكاس في
- د) (٠ ، ٣) هي صورة (٣ ، ٠) بالانعكاس
- هـ) (- ٥ ، ٠) هي صورة (- ٥ ، ٠) بالانعكاس
- [٨] إذا كانت (٤ ، ٢)، ب (٣ ، ١)، ج (-١ ، ٢)، د (٢ ، -٤)، هـ (-٣ ، ١)، ل (١ ، ٢)، ع (٢ ، ٤)، م (٣ ، ١)، ن (-١ ، ٢)، ك (٢ ، -٤)، ط (٣ ، ١)، ظ (١ ، ٢)، المطلوب :

- حدد كل نقطتين أحدهما صورة الأخرى بالانعكاس في محور السينات.
- حدد كل نقطتين أحدهما صورة الأخرى بالانعكاس في محور الصادات.
- حدد كل نقطتين أحدهما صورة الأخرى بالانعكاس في نقطة الأصل.

١٠ : تارين ومسائل عامة


- [١] اذكر نوع كل من الزوايا التالية : ٩٠°، ٥٠°، ١٢٥°، ١٨٠°، ٢٧٠°
- [٢] ١) ما قياس الزاوية المتممة للزاوية التي قياسها ٧٠° ؟
ب) ما قياس الزاوية المكملة للزاوية التي قياسها ٦٠° ؟
ج) ما قياس الزاوية المتممة والزاوية المكملة للزاوية التي قياسها ٨٠° ؟




[٣] في الشكل (٥ - ١٢٣) :
 سُم المتممة والمكملة للزاوية $\angle B$ ،
 ثم أوجد قياسيهما .



د) ثلاثة أزواج من الزوايا المتقابلة بالرأس .


[٥] في الشكل (٥ - ١٢٥) : أوجد ما يلي :





[٧] في الشكل (٥ - ١٢٧) :
 أ ج ، س ص يتقاطعان في ب ،
 ب ؤ ت أ ج ، س ص ينصف
 ؤ ب ج .

احسب فه (ؤ ب س) ، فه (ؤ س ب ج) ، وكذلك
 فه (ؤ ص ب ج) ، فه (ؤ أ ب ص) .



[٨] في الشكل (٥ - ١٢٨) :
 النقطة م منتصف س ص ،
 أل س = أل م ، أل م = أل ص ،
 أثبت أن :
 فه (ؤ س ل م) = فه (ؤ ص ع م) .

[٩] في الشكل (٥ - ١٢٩) :

$\overline{مـ هـ} \perp \overline{أـ بـ}$ ، $\overline{مـ وـ} \perp \overline{جـ هـ}$ ،
 $\overline{مـ نـ} \perp \overline{أـ جـ}$.

فإذا كان $|مـ هـ| = |مـ نـ| = |مـ وـ|$ وأثبتت أن:


(١) $|هـ| = |نـ|$.

(ب) $\overline{مـ جـ}$ ينصف كل من $\angle جـ هـ$ ، $\angle نـ مـ$ و

[١٠] في الشكل (٥ - ١٣٠) :

احسب $وـ$ ($\angle أـ بـ هـ$) ،

$وـ$ ($\angle أـ جـ هـ$)



شكل (١٣٠-٥)

[١١] حدد النقاط الإحداثية (١، ٢)، (٢، ٣)، (-٤، ٣)، (-٢، ٠)، (١، ٣)، (٠، ٣) .

في مستوى إحداثي ثم أوجد صور هذه النقاط بالانعكاس :

أولاً : على محور السينات ، ثانياً : على محور الصادات .

ثالثاً : على مبدأ الإحداثيات .

[١٢] في مستوى إحداثي ارسم $\overline{أـ بـ}$ حيث $A(٢، ٣)$ ، $B(٣، ٢)$ ،

ارسم صورة $\overline{أـ بـ}$ في الانعكاس :



أولاً : في محور السينات ، ثانياً : في محور الصادات ،

ثالثاً : في مبدأ الإحداثيات .

[١٣] في مستوى إحداثي حدد النقطة $A(٣، ٤)$ ثم أوجد صورتها ،

بالانعكاس في محور السينات ثم صورتها ، بالانعكاس في محور

الصادات ، ما نوع المثلث $أـ بـ هـ$ ؟



في الشكل (١٣١-٥) إذا كان:
 $|AB| = |AC|$,
 $m(A) = m(B)$
 $M \bar{A}$ تنصف $\angle BAC$
فأثبت أن :

$$(1) |AB| = |AC|$$

$$(2) |MB| = |MC|$$


[١٥] في الشكل (١٣٢-٥)
أثبت أن :

$$(1) m(AHB) = m(AGH)$$

$$(2) |AH| = |HG|$$

١١ : اختبار الوحدة


[١] اذكر نوع كل من الزوايا التالية : 165° , 250° , 180° , 75°




شکل (١٣٣-٥)

[٢] في الشكل (٥ - ١٣٣) :

احسب قياس الزوايا ٣، ٢، ١



[٣] في الشكل (٥ - ١٣٤) :
احسب قياس ($\angle A$) ،
قياس ($\angle B$) .



شكل (١٣٥-٥)

[٤] في الشكل (٥ - ١٣٥) :
 $b \parallel d$ ، $b \parallel d$.

(أ) اذكر زاويتين متساويتين في
القياس مع ذكر السبب .

(ب) اذكر زاويتين مجموع
قياسيهما = 180° مع ذكر السبب .

[٥] (أ) اذكر الحالات التي تتطابق
فيها المثلثات .


(ب) في الشكل (٥ - ١٣٦) :
إذا كان $w(\angle 1) = w(\angle 3)$ ،
 $w(\angle 2) = w(\angle 4)$
أثبت أن $a \parallel b$.

[٦] ارسم المستوى الإحدائي وحدد عليه النقطة (٢ ، ٣) ثم أوجد صورتها
بالانعكاس في محور الصادات .




القياس


٦ : المضلعات



شكل (٦ - ١ ج)



شكل (٦ - ١ ب)



شكل (٦ - ١ ج)

تأمل الأشكال أعلاه ، تلاحظ أن كل شكل مكون من خط .
الخطان في الشكلين (٦ - ١ ، ب) مكوّنان من عدة قطع مستقيمة متتابعة كل قطعة ليست على استقامة القطعة التي تتصل بها مباشرة ، لذلك يسمى الخط في الشكل (٦ - ١) خطًّا منكسرًا ، ويسمى الخط في الشكل (٦ - ١ ب) خطًّا منكسرًا مغلقاً ، لماذا ؟ ويسمى كذلك مضلعاً بينما الشكل (٦ - ١ ج) عبارة عن خط منحنى (وقد يكون مغلقاً أو مفتوحاً) .

المضلع خط منكسر مغلق ويسمى حسب عدد أضلاعه .

يعتبر المثلث هو المضلع الأقل عدداً من القطع المستقيمة حيث يتكون فقط من ثلاثة قطع .

القطع المستقيمة المؤلفة لهذا المضلع هي أضلاع هذا المضلع وأطراف الأضلاع هي رؤوس المضلع .

عدد رؤوس المضلع تساوي عدد زواياه وتساوي عدد أضلاعه .


فالمثلث له ثلاثة رؤوس وثلاث زوايا وثلاثة أضلاع . ويُسمى مُضلعًاً ثلاثيًّا أو مثلثًا .

والشكل الرباعي له أربعة رؤوس . وأربع زوايا ، وأربعة أضلاع .

تدريب (١)

كم عدد رؤوس وأضلاع وزوايا كل من الأشكال التالية :

أ) الخماسي ب) التساعي ج) الثلاثي عشر .



شكل (٢ - ٦)

مثال

سم الشكل (٦ - ٢) ، وحدد عدد رؤوسه ، وعدد زواياه ، ثم سم هذه الرؤوس والزوايا .

الحل :

- الشكل (٦ - ٢) له خمسة أضلاع \overline{AB} ، \overline{BC} ، \overline{CD} ، \overline{DE} ، \overline{EA} ولذا يُسمى مُضلعًاً خماسيًّا .

- له خمسة رؤوس هي A ، B ، C ، D ، E

- وله خمس زوايا هي $\angle A$ ، $\angle B$ ، $\angle C$ ، $\angle D$ ، $\angle E$

$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = \angle E$

٥٠

٩٠

في الشكل (٦ - ٣) صل

النقاط أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و ،

لتحصل على مضلع ، ثم :

ب٠

قس أضلاع المضلع .

قس زواياه الداخلية ، ماذا تلاحظ ؟


ج٠

شكل (٦ - ٣)

تلاحظ أن : جميع الأضلاع متساوية في الطول ، وكذلك جميع الزوايا متساوية في القياس . مثل هذا المضلع يسمى مضلعاً منتظاماً .

المضلع المنتظم هو مضلع جميع أضلاعه وزواياه متطابقة .

نشاط (٢)



شكل (٦ - ٤)

في الشكل (٦ - ٤) قس زوايا

المضلع الداخلية ثم قارن قياس

ـ هـ أـ بـ ، مع قياس الزوايا الأخرى ، جـ

ماذا تلاحظ ؟

تلاحظ أن $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ وهي زاوية داخلية يسمى مثل هذا المضلع مضلعاً محدباً .

المضلع المحدب هو مضلع فيه على الأقل زاوية واحدة قياسها أكبر من 180°

المثلث المتساوي الأضلاع هو مضلع منتظم ، لماذا ؟


والمربع أيضاً مضلع منتظم ، لماذا ؟

في الشكل (٦-٥) : جـ ، بـ ، هـ ، وـ

هـ أقطار ،

ويمكن أن نرسم من أي رأس آخر
أيضاً شكلاً له ثلاثة أقطار


آخر .



شكل (٦ - ٥)

قطر المضلعل هو القطعة المستقيمة التي تصل بين رأسين غير متتاليين
في المضلعل .

تدريب (٢)



شكل (٦ - ٦)

في الشكل (٦ - ٦)


كم قطرأ يمكن رسمه من أي رأس
للحصائي دـ ، بـ ، جـ ، وـ ، هـ ؟

كم عدد أقطار الحصائي ؟

نشاط (٣)

ارسم مربعاً في دائرة مستعيناً

بالشكل (٦ - ٧) .



شكل (٦ - ٧)




أكمل ما يأتي :

- القطعة المستقيمة التي تصل بين رأسين متتاليين في المضلع تسمى
- في المضلع كل قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متتاليين تسمى
- من رأس واحد في المضلع السباعي يمكن رسم من الأقطار .
- في المضلع تتساوى عدد الأضلاع مع عدد مع عدد
- إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية للمضلع أكبر من 180° يسمى المضلع بالمضلع


[٢] أكمل الجدول التالي :

عدد زواياه	عدد رؤوسه	عدد أضلاع المضلع
		٧
	١٢	
٤٣		
		١٠٥


[٣] اكتب اسم كل مضلع في الأشكال (٦ - ١٨ ، ب ، ج) ثم عين أيًّا منها المضلع الحدب والمضلع غير الحدب .



شكل (٦ - ١٨ ج)



شكل (٦ - ١٨ ب)




شكل (٦ - ١٨ ج)


- [٤] ارسم شكلاً سداسيًا ثم اذكر كم عدد أقطاره ، وكم عدد زواياه ، وكم قطرًا يمكن رسمه من كل رأس ؟
- [٥] ما عدد أقطار خماسي غير محدب ؟
- [٦] ارسم سداسيًا منتظمًا داخل الدائرة م .
- [٧] ارسم ثلاثة أشكال رباعية مختلفة ، ثم احسب مجموع درجات الزوايا الداخلية لكل منها .
- [٨] إذا كان مجموع قياسات زوايا المثلث 180° ، احسب مجموع قياسات زوايا مضلع رباعي بتقسيمه إلى مثلثين .

٦ : قياسات الزوايا الداخلية للمضلع النوني


نشاط



شكل (٦ - ٩ ج)



شكل (٦ - ٩ ب)



شكل (٦ - ٩ ج)

في الأشكال (٦ - ٩ ، ب ، ج) ارسم من النقطة ١ أقطار كل مضلع .

ثم أجب على الآتي :

١ - كم مثلثاً في الشكل (٦ - ٩) ؟



مجموع قياسات زواياه	عدد المثلثات	عدد أضلاعه	اسم المضلع
١٨٠	١	٣	مثلث
			رباعي
			خماسي
			سداسي

– كم مثلثاً في المضلع المرسوم في الشكل (٦-٩ ب)؟

– كم مثلثاً في المضلع المرسوم في الشكل (٦-٩ ج)؟

٤ – أكمل الجدول المجاور .

حيث أن مجموع قياسات زوايا كل مثلث يساوي 180° ومن ذلك نجد مجموع قياسات زوايا كل مضلع .

نلاحظ أن : عدد المثلثات داخل كل مضلع تنقص اثنين عن عدد الأضلاع ومن ذلك يمكننا استنتاج مجموع قياسات زوايا المضلع النوني ، أي الذي عدد أضلاعه n من الأضلاع .

مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع النوني = $(n - 2) \times 180^\circ$
حيث n عدد أضلاع المضلع .

مثال (١)

أوجد قياس كل زاوية في مضلع سداسي منتظم ؟

الحل :

$$\begin{aligned} \text{مجموع قياسات المضلع السداسي المنتظم} &= (n - 2) \times 180^\circ \\ 180 \times (6 - 2) &= \\ 180 \times 4 &= \\ 720 &= \end{aligned}$$

• الشكل السادس منتظم فجميع زواياه متطابقة ،

$$\therefore \text{قياس كل زاوية} = \frac{360}{720} = 6^\circ$$

مثال (۲)

١٤٢ - مطلع خماسي فيه و (٩٨)، و (ب) = ٩٨° .
احسب قياس كل زاوية من الزوايا المتبقية إذا علمت أنها متساوية في القياس .
ثم أوجد قياس الزاوية الخارجية \angle

الحل:

مجموع قياسات زوايا المثلث الخامسي = $(5 - 2) \times 180^\circ$

$$\circ \xi = \circ \lambda \times \gamma =$$

ولكن $98 + 142 = 240$

$$\ddot{\gamma} = \dot{\gamma} - \dot{\phi} \xi = (-\omega_x) \gamma + (\omega_y) \gamma + (\omega_z) \gamma \quad \vdots$$

$$(\text{--} \otimes \text{id}) \circ = (\text{id} \otimes \text{--}) \circ = (\text{--} \otimes \text{id}) \circ \vdots$$

$$\therefore \text{قياس زاوية} = 300^\circ = 3 \div 300$$

٢٠: الزاوية الخارجية للزاوية α هي α' .

$$(1 \times) \sim - 18.0 = (1 \times) \sim \therefore$$

$$\overset{\circ}{\lambda} \gamma = \overset{\circ}{\alpha} \lambda - \overset{\circ}{\gamma} \alpha =$$

مثال (٣)

أو جد عدد أضلاع المضلعات التالية (إن أمكن) والتي مجموع قياسات زواياها الداخلية هي: ١٢٦٠° بـ ٨٨٠° جـ ١٨٠٠°

ا) ∵ مجموع قياسات زوايا المضلع التوسي = $(n - 2) \times 180^\circ$

$$180^\circ \times (2 - n) = 1260^\circ$$

$$360^\circ - 180^\circ = 1260^\circ$$

$$360^\circ + 1260^\circ = 180^\circ n$$

$$\therefore \text{عدد أضلاع المضلع } (n) = \frac{1620}{180} = 9 \text{ أضلاع}$$

ب) ∵ مجموع قياسات زوايا المضلع التوسي = $(n - 2) \times 180^\circ$

$$180^\circ \times (2 - n) = 880^\circ$$

$$360^\circ - 180^\circ = 880^\circ$$

$$1240^\circ = 180^\circ n$$

$$\therefore n = \frac{1240}{180} \approx 6,9 \text{ وهذا غير ممكن إذ لا يوجد مضلع}$$

عدد أضلاعه 6,9 ضلعاً.

ج) ∵ مجموع قياسات زوايا المضلع التوسي = $(n - 2) \times 180^\circ$

$$180^\circ \times (2 - n) = 1800^\circ$$

$$360^\circ - 180^\circ = 1800^\circ$$

$$\therefore \text{عدد أضلاع المضلع } (n) = \frac{2160}{180} = 12 \text{ ضلعاً .}$$

[١] أوجد مجموع قياسات زوايا مضلع عدد أضلاعه :

ب) اثنى عشر ضلعاً أ) تسعه أضلاع

ج) خمسة عشر ضلعاً د) سبعة عشر ضلعاً

[٢] أوجد قياس كل زاوية من زوايا المضلع المنتظم ، إذا كان عدد أضلاعه :

ب) احدى عشر ضلعاً أ) تسعه أضلاع

ج) ثلاثة عشر ضلعاً د) ستة عشر ضلعاً

[٣] ما عدد أضلاع المضلعات التالية إذا علمت أن مجموع قياسات زوايا ه هي :

١٩٨٠ ٧٢٠ ٥٤٠ ٣٦٠ ب) ج) د) أ)

[٤] ب ج د ه و شكل سداسي،

فيه $\angle A = 120^\circ$

$\angle B = 85^\circ$

$\angle C = 170^\circ$

$\angle D = 145^\circ$


أوجد قياسات الزوايا المتبقية إذا

علمت أنها متطابقة .

[٥] ب ج د ه و شكل سداسي فيه :

$\angle A = 120^\circ$ ، $\angle E = 70^\circ$ ، $\angle H = 145^\circ$


$\angle W = 160^\circ$ ، احسب قياس الزاويتين المتبقietين إذا كانت إحداهما ضعف الأخرى .



(٤٣ ج ب) في الشكل (٦-١٠)، أحسب قياس سداسي منتظم .

[٧] إذا كان قياس الزاوية الخارجية لمضلع منتظم 60° ، فما عدد أضلاع هذا المضلع إذا كان مجموع قياسات زواياه الداخلية 720°

٦ : متوازي المستطيلات



شكل (٦-١١)

انظر إلى الشكل (٦-١١) إنه يمثل مكعباً وتعرف أن المكعب هو متوازي مستطيلات أبعاده الثلاثة متساوية في الطول .

$$\text{حجم المكعب} = L \times L \times L = L^3$$

حيث L طول ضلع المكعب .

فمثلاً المكعب الذي طول ضلعه ٧ سم ، فإن حجمه $= 7^3 = 343 \text{ سم}^3$ وإذا كان حجم المكعب 125 سم^3 ، فهل بالإمكان إيجاد طول ضلعه ؟


لمعرفة ذلك علينا أن نبحث عن عدد إذا ضرب في نفسه ثلاثة مرات يكون

حاصل الضرب 125 سم^3 أي إننا نوجد الجذر التكعبي للعدد ١٢٥ . وبشكل عام إذا علمنا حجم المكعب ، فإن طول ضلعه يساوي الجذر التكعبي لحجمه.

$$\text{طول ضلع المكعب} = \sqrt[3]{\text{حجم المكعب}} .$$

أي أن طول ضلع المكعب الذي حجمه 125 سم^3 = $\sqrt[3]{125}$

$$= \sqrt[3]{5 \times 5 \times 5} = \sqrt[3]{5^3} = 5 \text{ سم}$$



شكل (٦-١)

الشكل (٦-١) يمثل متوازي مستطيلات فإذا علم حجم متوازي المستطيلات وعلم طولاً بعدين فيه يمكن حساب البعد الثالث .

$$\text{حجم متوازي المستطيلات} = \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$$

مثال (١)

متوازي مستطيلات حجمه 210 م^3 ؛ احسب عرضه إذا كان طوله ٧م ، وارتفاعه ٥م .

الحل:

$$\therefore \text{حجم متوازي المستطيلات} = \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$$

نفرض أن عرض متوازي المستطيلات = ل ، طوله = ط ، وارتفاعه = ع ،

$$\therefore \text{الحجم} = ط \times ل \times ع$$



$$٥ \times ٧ = ٣٥$$

$$٢١ = ٣٥ \div$$

∴ عرض متوازي المستطيلات = ل = $\frac{٢١٠}{٣٥}$ م

مثال (٢)

متوازي مستطيلات من المعدن أبعاده ٤ سم ، ٨ سم ، ٦ سم ، صُهر وحول إلى مكعب دون أن يفقد منه شيء . أوجد طول ضلع المكعب .

الحل:

: حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع

$$٣٥١٢ = ٦ \times ٨ \times ٤ =$$

وهو حجم المكعب .

∴ طول ضلع المكعب = ل = $\sqrt[٣]{٣٥١٢}$ =

$$\text{سم}٨ = \sqrt[٣]{٨ \times ٨ \times ٨} =$$

ćمارين ومسائل

[١] أوجد طول ضلع المكعب الذي حجمه يساوي ٧٢٩ سم^٣

[٢] أوجد طول حوض على شكل متوازي مستطيلات إذا علمت أن عرضه

٧ سم ، وارتفاعه ١٢ سم وحجمه ٧٥٦ سم^٣

[٣] مكعب مساحة أحد أوجهه ٢٥٦ سم^٢ ، ما حجمه ؟

[٤] حوض على شكل متوازي مستطيلات حجمه $١٢٠\text{م}^٣$ ، أوجد ارتفاعه إذا كان طول قاعدته ٦م وعرضها ٤م .

[٥] حوض ماء على شكل متوازي مستطيلات حجمه $٣٦٠\text{م}^٣$ ، احسب عرضه إذا كان طوله ١٢م ، وارتفاعه ٦م .

[٦] سبيكة من المعدن على شكل متوازي مستطيلات أبعادها : ٨سم ، ٨سم ، ٢٧سم صهرت وصُبّت على شكل مكعب أوجد طول ضلع هذا المكعب على فرض أن الجسم لم يفقد شيئاً أثناء عملية الصهر والصب .

[٧] صفيحة معدنية رقيقة مكعبة الشكل مساحة أحد أوجهها $٢٥\text{م}^٢$ مـ ما حجمها بالأمتار المكعبة؟ وما مقدار ما تسعه من لترات الماء؟
علماً بأن (اللتر = ديسيمتر مكعب = $١٠٠٠\text{سم}^٣$) .

[٨] متوازي مستطيلات حجمه $٤٣٧٤\text{م}^٣$ ، والنسبة بين أبعاده الثلاثة $١:٢:٣$ ، أوجد المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات .


٦: المنشور

تعرفت سابقاً أن المنشور القائم

عبارة عن مجسم متعدد السطوح وله قاعدتان متطابقتان ومتوازيتان ، وأوجهه الجانبية عبارة عن

مستطيلات ، وكل شكل من الأشكال (٦-١٣، ب، ج) يمثل منشوراً قائماً قاعدته تختلف من

شكل إلى آخر وارتفاعه «ع» يمثل أحد أطوال أحرفه .



شكل (٦-١٣) شكل (٦-١٣-أ) شكل (٦-١٣-ج)

$$\text{حجم المنشور} = \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{ومساحته الجانبية} = \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

بمعلومية حجم المنشور أو مساحته الجانبية يمكننا إيجاد الارتفاع أو مساحة القاعدة .

ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية :

مثال (١)

منشور قاعدته مثلث قائم الزاوية طولاً ضلعي القائمة ٤ سم ، ٣ سم ، حجمه ٢٤ سم^٣ ، أوجد ارتفاعه .

الحل:

$$\therefore \text{حجم المنشور} = \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$\therefore \text{مساحة القاعدة} = \frac{1}{2} \times ٤ \times ٣ = ٦ \text{ سم}$$

$$\therefore \text{الارتفاع} = \frac{\text{الحجم}}{\text{مساحة القاعدة}} = \frac{٢٤}{٦} = ٤ \text{ سم}$$

مثال (٢)

منشور أطوال اضلاع قاعدته رباعية ٣ سم ، ٤ سم ، ٥ سم ، ٦ سم ، ومساحته الجانبية ١٤ سم^٢ ، احسب ارتفاعه .

مساحة المنشور الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع

$$\text{ارتفاع المنشور} = \frac{\text{مساحتة الجانبية}}{\text{محيط قاعدته}} = \frac{144}{18} = 8 \text{ سم}$$

مثال (٣)

صفيحة على شكل منشور رباعي قاعدته مستطيل ابعاده ٢٠ سم ، ٣٠ سم و مساحتة الكلية ٥٧٠٠ سم٢ . أوجد ارتفاعه .

• المساحة الكلية للمنشور = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين

$$5700 = 2(30 + 20) + 2(30 \times 20)$$

$$1200 + 100 = 5700$$

$$4500 = \frac{1200 - 5700}{100} = \frac{-4500}{100} = 45 \text{ سم .}$$

ćمارين وسائل

[١] منشور ثلاثي قائم قاعدته مثلث قائم الزاوية طولاً ضلعي القائمة ٦ سم ، ٨ سم ، و حجمه ٢٤٠ سم٣ ، أوجد ارتفاعه .

[٢] احسب ارتفاع المنشور الرباعي الذي قاعدته مستطيل طولاً بعديه ٨ سم ، ١٠ سم و حجمه ٧٢٠ سم٣ ، أوجد مساحتة الجانبية و مساحتة الكلية .

[٣] منشور رباعي ارتفاعه ٧ سم وقاعدته مستطيلة الشكل عرضها ٤ سم .
أوجد طول القاعدة إذا علمت أن مساحته الجانبية ٩٨ سم^٢ ، ثم أوجد حجم المنشور .


[٤] منشور حجمه ٩٧٢ سم^٣ ، قاعدته مربعة الشكل وارتفاعه ١٢ سم ،
أوجد طول ضلع القاعدة ، ثم أوجد مساحته الجانبية والكلية .

[٥] منشور سداسي مساحة قاعدته ٢٦٠٠٠ سم^٢ ، وارتفاعه ٣ م . احسب حجمه بالمتر المكعب .

[٦] منشور رباعي مصنوع من المعدن قاعدته مستطيل بعدها ١٠ سم ، ٩ سم
فإذا كانت مساحته الكلية ٧٧٦,٦ سم^٢ ، احسب ارتفاع المنشور .

[٧] منشور قاعدته على شكل معين طولا قطرية ٨ سم ، وحجمه
٤٠٨ سم^٣ ، أوجد ارتفاعه .

٦ : الاسطوانة



في الشكل (٦ - ١٤) اسطوانة
قائمة قاعدتها دائرة نصف
قطرها نق وارتفاعها ع

$$\text{حجم الاسطوانة القائمة} = \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع} = \pi r^2 \times h$$

$$\text{المساحة الجانبية للاسطوانة القائمة} = \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= 2\pi r \times h$$

$$\text{المساحة الكلية} = \text{المساحة الجانبية} + \text{ضعف مساحة القاعدة}$$

ومن ذلك يمكننا أن نحسب أيّاً من المتغيرات في هذه القواعد بمعلومية المتغيرات الأخرى .

ويتضح لنا ذلك من خلال الأمثلة التالية :

مثال (١)

حوض إسطواني الشكل حجمه $377,3$ دسم 3 ونصف قطر قاعدته 9 دسم ، أوجد ارتفاعه .

الحل :

$$\text{ارتفاع الحوض} = \frac{\text{الحجم}}{\text{مساحة القاعدة}}$$

$$(\frac{49}{10} \times \frac{49}{10} \times \frac{22}{7}) \div 377,3 =$$

$$\frac{10}{49} \times \frac{10}{49} \times \frac{7}{22} \times 377,3 =$$

$$\frac{700}{49 \times 49 \times 22} \times \frac{3773}{10} =$$

$$= \frac{264110}{52822} \text{ دسم} =$$

اسطوانة حجمها $٩٢٤ \text{ سم}^٣$ وارتفاعها ٦ سم ، أوجد قطر قاعدتها ومساحتها الجانبية .

الحل :

$$\therefore \text{حجم الاسطوانة} = \pi \times \text{نقط}^٢ \times \text{ارتفاع}$$

$$\frac{٢٢}{٧} \times \text{نقط}^٢ \times ٦ = ٩٢٤$$

$$\therefore \text{نقط}^٢ = \frac{٦٤٦٨}{١٣٢} = \frac{٧}{٦ \times ٢٢} \times ٩٢٤ = ٤٩ \text{ سم}^٢$$

$$\therefore \text{نقط} = \sqrt{٤٩} = ٧ \text{ سم} .$$

$$\therefore \text{قطر قاعدة الاسطوانة} = ٧ \times ٢ = ١٤ \text{ سم} .$$

$$\therefore \text{ المساحة الجانبية للاسطوانة} = \text{محيط القاعدة} \times \text{ارتفاع}$$

$$\therefore ٦ \times ٧ \times \frac{٢٢}{٧} \times ٢ = ٢٦٤ \text{ سم}^٢ .$$

اسطوانة دائيرية طول قطر قاعدتها ١٤ سم ومساحتها الجانبية $٦١٦ \text{ سم}^٢$.
أوجد ارتفاعها ومساحتها الكلية وحجمها .

الحل :

$$\therefore \text{ المساحة الجانبية للاسطوانة} = \text{محيط القاعدة} \times \text{ارتفاع}$$

$$22 \times 7 \times 2 = 616$$

$$\therefore \text{ارتفاع الاسطوانة} = \frac{616}{44} = 14 \text{ سم} .$$

$$\therefore \text{مساحة قاعدة الاسطوانة} = \pi \times 7 \times 7 = 49\pi \text{ سم}^2 ,$$

$$\text{المساحة الكلية للاسطوانة} = 154 \times 2 + 616 = 270 \text{ سم}^2 ,$$

$$\text{حجم الاسطوانة} = \pi \times 7 \times 7 \times 22 = 14 \times 7 \times 7 \times 22 = 98 \times 22 = 2156 \text{ سم}^3$$

$$= 2156 \text{ سم}^3$$

ćمارين وسائل

- [١] اسطوانة نصف قطرها ٧ سم ، وحجمها ١٨٤٨ سم^٣ . احسب ارتفاعها .
- [٢] اسطوانة مساحتها الجانبية ١٥٨,٤ سم^٢ ، ونصف قطر قاعدتها ١٢ سم ،
أوجد ارتفاعها .
- [٣] حوض اسطواني الشكل حجمه ٣٣٢٧٥ دسم^٣ ، فكم ارتفاعه إذا كان
قطر قاعدته ٥,٥ دسم .
- [٤] خزان ماء على شكل اسطوانة سعته ٦٢٨ لتر . وإذا كان ارتفاعه
١,٢٥ متر ، احسب طول نصف قطر قاعدته علماً بأن
 $\pi = 3,14$ ، اللتر = ١٠٠٠ سم^٣) .

[٦] سبيكة من الرصاص على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ٣٣ سم ، ٢٥ مم ، ٤٨ سم صُهرت وحَولت إلى اسطوانة دائيرية قائمة مُصْمَّته ارتفاعها ٥٦ سم، أوجد نصف قطر قاعدة الاسطوانة علماً بأنه لم يُفقد شيء من الرصاص أثناء صهر السبيكة .

[٧] قطعة من الرصاص على شكل اسطوانة نصف قطر قاعدتها ٧ سم وارتفاعها ١١ سم صُهرت وحَولت إلى متوازي مستطيلات طوله ٢٢ سم وعرضه ٧ سم ، احسب ارتفاعه .



٦: حجم الهرم

في الشكلين (٦ - ١١٥ ، ب)

منشور وهرم . قاعدة كل منها سداسية ، قاعدة الهرم وقاعدة المنشور متطابقتان وارتفاعهما متطابقان « ع » .

من الواضح أن حجم الهرم لا يساوي حجم المنشور للتأكد أجر النشاط

التالي :



شكل (٦ - ١١٥ ب) شكل (٦ - ١١٥ ب)

– أملأ الهرم تماماً بالسائل أو التراب وأفرغه في المنشور ، كرر ذلك إلى أن يمتليء المنشور تماماً .

كم مرة ملأت الهرم وأفرغته في المنشور ليتمتليء المنشور تماماً .

تلاحظ أن :

$$\text{حجم الهرم القائم} = \frac{1}{3} \text{ حجم المنشور}$$

$$\frac{1}{3} \text{ مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع} =$$

مثال (١)

هرم سداسي القاعدة مساحة قاعدته 8م^2 ، وارتفاعه 12م ، أوجد حجمه .

الحل:

$$\text{حجم الهرم} = \frac{1}{3} \text{ مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$12 \times 8 \times \frac{1}{3} =$$

$$32 \times 8 =$$

مثال (٢)

هرم رباعي ارتفاعه 9سم وقاعدته مربعة الشكل طول ضلعها 10سم ،
أوجد حجم الهرم .

٤- مساحة قاعدة الهرم = ١٠ سم × ١٠ سم = ١٠٠ سم^٢





∴ حجم الهرم = $\frac{1}{3}$ مساحة القاعدة × الارتفاع

$$\frac{1}{3} \times ١٠٠ \times \frac{٣}{٢} = ٣٠٠ \text{ سم}^٣$$




ćمارين وسائل

- [١] أوجد حجم هرم رباعي ارتفاعه ٣٠ سم ، ومساحة قاعدته ٦٢٠ سم^٢ .
- [٢] هرم رباعي قاعدته مستطيلة الشكل ، أبعادها ٦ سم ، ٥ سم ، أوجد حجم الهرم إذا علمت أن ارتفاعه ١٥ سم .
- [٣] هرم قاعدته مربعة الشكل ارتفاعه ٩ سم ، وحجمه ٢٧ سم^٣ . أوجد طول ضلع قاعدته .
- [٤] احسب حجم هرم ثلاثي قاعدته مثلث قائم طولاً ضلعي القائمة فيه ٦٥ م ، ٤٢ م ، ارتفاع الهرم ١٤ م .
- [٥] هرم ثلاثي حجمه ٣٩٢ سم^٣ ، وارتفاعه ٨ سم ، أوجد مساحة قاعدته .
- [٦] هرم ثمانى ، مساحة قاعدته ٢٦٥ م^٢ ، وحجمه ٩٨٤٥ سم^٣ ، احسب ارتفاعه مقرباً إلى أقرب عشرة .
- [٧] هرم رباعي معدني ارتفاعه ١٦ سم ومساحة قاعدته ٣٠٠ سم^٢ صُهر وحوّل إلى متوازي مستطيلات له ارتفاع الهرم نفسه ، أوجد مساحة متوازي المستطيلات .

[٨] احسب حجم الأهرامات في الأشكال (٦-١٦، ب، ج، د) كل على حده وفق البيانات على كل الأشكال .




٦ : حجم المخروط




الأشكال (٦-١٧ـبـ، جـ، دـ) تمثل مضلعات مرسومة داخل دوائر وهي


وعليه فالهرم القائم سيكون مخروطاً دائرياً قائماً إذا أصبح عدد أضلاع قاعدته عدداً كبيراً جداً كما في الأشكال (٦ - ١٨ ، ب ، ج) .



شكل (٦ - ١٨ - ب)



شكل (٦ - ١٨ - ج)



شكل (٦ - ١٨ - ج)

وبما أن حجم الهرم القائم = $\frac{1}{3}$ مساحة القاعدة × الارتفاع
فإن :

$$\text{حجم المخروط القائم} = \frac{1}{3} \text{ مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

حيث r نصف قطر القاعدة و h ارتفاع المخروط .

مثال (١)

أوجد حجم المخروط الذي نصف قطر قاعدته ١٢ سم وارتفاعه ٤ سم .

٢٥٠

الحل:

$$\text{حجم المخروط} = \frac{1}{3} \pi \times \text{نقط}^2 \times \text{ارتفاع}$$

$$\frac{2}{14} \times 12 \times \frac{4}{12} \times \frac{22}{7} \times \frac{1}{3} =$$

$$\therefore \text{حجم المخروط} = 2112 \text{ سم}^3$$

مثال (٢)

مخروط دائري حجمه 770 سم^3 وارتفاعه 15 سم . أوجد نصف قطر قاعدته.

الحل:

$$\text{حجم المخروط} = \frac{1}{3} \pi \times \text{نقط}^2 \times \text{ارتفاع}$$

$$\frac{22}{7} \times \frac{1}{3} \times \frac{5}{15} \times \text{نقط}^2 \times 770 = 770$$

$$\therefore \frac{110}{7} \times \text{نقط}^2 = 770$$


$$\therefore \text{نقط}^2 = \frac{7}{110} \times 770 = 49 \text{ سم}^2$$

$$\therefore \text{نقط} = \sqrt{49} = 7 \text{ سم}$$




ćمارين ومسائل

- [١] أوجد حجم المخروط الذي نصف قطر قاعدته ٢١ سم وارتفاعه ١٢ سم .
- [٢] مخروط حجمه $٤٠٨ \text{ م}^٣$ ، وارتفاعه ٢١ سم . أوجد طول قطر قاعدته .
- [٣] مخروط حجمه $٣٥٠ \text{ م}^٣$ ، ومساحة قاعدته $٢٥ \text{ م}^٢$. أوجد ارتفاعه .
- [٤] مخروط حجمه $٦٦٢ \text{ سم}^٣$ وارتفاعه ٢١ سم . أوجد قطر قاعدته .
- [٥] مخروط حجمه $٩٢٤ \text{ سم}^٣$ وارتفاعه ١٨ سم . أوجد مساحة قاعدته .
- [٦] منشور خماسي قائمه ارتفاعه ٦ سم ومساحة قاعدته $٩٨ \text{ سم}^٢$ ، وحجمه يساوي حجم مخروط ارتفاعه ١٤ سم ، أوجد طول قطر قاعدة المخروط .
- [٧] في الأشكال (٦ - ١٩ ، ب ، ج ، د) ، أوجد حجم كل مخروط على حده وفق البيانات على كل شكل .




شكل (٦ - ١٩ ب)



شكل (٦ - ١٩ د)

$$h = 14 \text{ سم}$$


$$\text{مساحة القاعدة} = 15 \text{ سم}^٢$$



شكل (٦ - ١٩ د)

$$\text{مساحة القاعدة} =$$

$$١٣٢ \text{ سم}^٢$$





شكل (٦ - ١٩ ج)

- [١] ما أقل عدد من القطع المستقيمة التي يكون اتحادها مضلعاً ؟ ارسم مضلعاً يتكون من أقل عدد من القطع المستقيمة .
- [٢] أوجد عدد أضلاع المضلوعات التالية إذا علمت أن مجموع قياسات زواياها هي : 1080° ب) 1440° ج) 720°) ١
- [٣] أوجد قياسي الزاويتين المتبعتين . علمًا أنهما متطابقتان .
- [٤] إذا كان حجم مكعب 3375 سم^3 ، أوجد طول ضلعه .
- [٥] أوجد حجم هرم رباعي قائم ارتفاعه 20 سم ومساحة قاعدته 450 سم^2 .
- [٦] مخروط قائم ارتفاعه 10 سم ، قطر قاعدته 14 سم ، أوجد حجمه .
- [٧] المساحة الجانبية لاسطوانة قائمة 1408 سم^2 ، وارتفاعها 16 سم . أوجد نصف قطر قاعدتها .
- [٨] إثناء على شكل اسطوانة دائرية نصف قطر قاعدتها 14 سم ومساحتها الجانبية 2376 سم^2 . أوجد ارتفاعها .
- [٩] عمود من الخرسانة المسلحة على شكل متوازي مستويات حجمه 36 م^3 ، ومساحة قاعدته 0.75 م^2 ، أوجد ارتفاع العمود .
- [١٠] سبيكة من النحاس على شكل منشور رباعي قائم : ارتفاعه 18 سم ، وقاعدته على شكل متوازي الأضلاع طول قاعدته 12 سم وارتفاعه 8 سم . صُهرت السبيكة وحوّلت إلى مكعب . احسب طول ضلع المكعب علمًا بأنه لم يفقد شيء من النحاس أثناء الصهر .

٣٧٥٤،٦ حفر عامل حفرة على شكل اسطوانة دائيرية قائمة حجمها $61,6 \text{ م}^3$ ومحيط قاعدتها . كم تكون أجرة العامل الذي حفر الحفرة إذا علمت أن أجرة المتر علواً في هذه الحفرة ١٥٠٠ ريال ؟

٩ : اختبار الوحدة

[١] تأمل الشكلين (٢٠ - ٢١) ، ثم أجب عن الآتي :



أ) أي الشكلين مضلع منتظم ؟

ب) كم رأساً لكل منهما ؟

ج) كم قطرًا يمكن رسمه من الرأس الواحد للكل منهما ؟

شكل (٢٠ - ٢١) .

[٢] ارسم شكلاً سداسيًا منتظمًا داخل دائرة نصف قطرها ٣ سم ، ثم أوجد قياس كل زاوية .

[٣] كم عدد أضلاع المضلع الذي مجموع قياسات زواياه الداخلية ١٤٦٠ ° ؟

[٤] مكعب حجمه ٥١٢ سم³ ، ما مساحته الجانبية ؟

[٥] قطعة من الرصاص على شكل اسطوانة نصف قطر قاعدتها ١٤ سم وارتفاعها ١١ سم ، صُهرت وحولت إلى متوازي مستطيلات طوله ٤ سم وعرضه ٧ سم ، احسب ارتفاعه .

[٦] هرم رباعي قاعدته مستطيلة الشكل ، أبعادها ١٢ سم ، ١٠ سم .
أوجد حجم الهرم إذا علمت أن ارتفاعه ٧,٥ سم .

[٧] مخروط حجمه ٤٦٢ سم³ ، وارتفاعه ٩ سم ، أوجد مساحة قاعدته ؟

مقدمة :

بدأ استخدام كلمة الإحصاء لأول مرة في مجالات متعلقة بشؤون الدول والحكومات، وخاصة تلك المتعلقة بقضايا التنظيم وجمع الضرائب وما شابه ذلك . وقد استخدم العرب الإحصاء في العصور الإسلامية ، وخاصة ما قام به الخليفة المأمون من عمليات تعداد بين الحين والآخر لأفراد جيشه وتصنيفهم وفقاً لهمائهم العسكرية . أما في الوقت الحاضر فقد أصبح الإمام بالأساليب الإحصائية ضرورة لكل باحث مهما كان مجال تخصصه أو نوع دراسته ؛ فقد تعددت استخداماته في كثير من المجالات والميادين مثل : الطب ، والزراعة ، والصناعة ، والسكان ، كما يستخدم الإحصاء في علوم الفلك والأحياء والوراثة والفيزياء وغيرها من العلوم .

ويرجع السبب في تسمية عصرنا الحاضر بعصر المعلومات إلى علم الإحصاء؛ حيث يُقاس مدى تقدم بلد ما بما يوليه هذا البلد من أهمية لهذا العلم .

٧ : تبويب وتنظيم البيانات الإحصائية

سبق وأن تعرفت على بعض الأساليب (أو الطرق) الإحصائية في الصف السادس ، وفي هذا البند سوف تتعرف على طريقة هامة من الطرق الإحصائية، هي طريقة تبويب البيانات الإحصائية في جداول ، تسمى جداول إحصائية، هذه الجداول تمكّننا من استخراج المعلومات بسهولة ويسر ، والمثال التالي يوضح ذلك .

مثال

الأعداد التالية تمثل بيانات أولية (غير مبوبة) ، وهي لدرجات اختبار شهري لثمانية عشر طالباً ، حيث الدرجة العظمى (٣٠ درجة) :



۲۹	۲۸	۲۶	۲۲	۲۴
۲۷	۲۲	۲۰	۲۰	۲۳
۲۴	۲۰	۲۰	۲۹	۲۳

البيانات السابقة يمكن تبويبها في جدول إحصائي على النحو التالي :

الرتبة	الدرجة الحاصل عليها	الفرز	عدد الطلاب
٣٠	٢٩	٢٨	٢٧
٢٦	٢٥	٢٤	٢٣
٢٢	٢١	٢٠	١٨
١			١
١			١
٣			٣
٢	٠	٠	٢
٢	٢	٢	٢
٠		٠	١

البيانات السابقة تم تبويبها في جدول إحصائي يحتوي الدرجة التي حصل عليها الطالب ، ويناظرها الصف الثاني الذي يمثل عملية الفرز (التكرار) . والفرز عبارة عن خطوط تمثل عدد الطلاب الحاصلين على تلك الدرجة بينما نجد في الصف الثالث عدد الطلاب الحاصلين على تلك الدرجة وقد كتبت أرقاماً . والغرض من استخدام الجدول هو تسهيل استخراج المعلومات ؛ فمثلاً : عدد الطلاب الحاصلين على درجة أقل من (٢٦) هو : $٣ + ٣ + ٢ + ٢ + ٢ = ١٤$ طالباً .

تدریب

تسابق ٢٧ طالباً لمسافة محددة وتم تسجيل الزمن الذي استغرقه كل متسابق في قطع تلك المسافة بالدقائق فكانت النتائج كالتالي :

八 七 八 九 七 一〇 〇 八
七 七 八 〇 七 七 〇 一〇
七 八 八 七 九 〇 七 七 〇

لتبويب هذه البيانات ، ننشئ الجدول الإحصائي التالي :

الزمن بالدقائق	الفرز	عدد المتسابقين
٤		١
٥		٥
٦		
٧		
٨		
٩		
١٠		
٢٧ متسابقاً		المجموع

بالاعتماد على الجدول السابق أجب عن الأسئلة التالية بعد إكمال العمود الثالث:

أ) ما عدد المتسابقين الذين قطعوا المسافة في أقل من (٧) دقائق ؟

ب) ما الزمن الذي استغرقه أسرع متسابق ؟

ج) ما عدد الطلاب الذين قطعوا المسافة في زمن تجاوز ٨ دقائق ؟

الجواب : (١) ١٣ طالب (٢) ٤ طالب (٣) ٤ طلاب

ملاحظة : عند استخدام الفرز كل خمسة خطوط تسمى رزمة **||||** : تكتب ٤ خطوط والخط الخامس مائل ، عدا ذلك تكتب منفردة .

ćمارين ومسائل

[١] الجدول التالي يبيّن عدد الأهداف التي سجلها فريق كرة قدم في سبع مباريات :

أ) أكمل الجدول :

ب) ما عدد الأهداف المسجلة في المباراة الرابعة؟

ب) ما النسبة المئوية للأهداف في المباراة الأولى؟

المباراة	الفرز	عدد الأهداف
١		
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		
٧		
المجموع		هدفًا

[٢] تمثل البيانات الآتية درجات ٢٥ طالباً في اختبار الرياضيات :

٩١ ٨٣ ٨٧ ٩٠ ٩١

٨٦ ٩٠ ٩٤ ٩١ ٨٩

٩٠ ٩٦ ٨٧ ٩٠ ٩١

٨٧ ٨٣ ٩٤ ٩٠ ٩٠

٩١ ٨٧ ٩١ ٨٧ ٩١

أ) أنشئ جدولًا إحصائيًا لهذه البيانات .

ب) ما الدرجة التي حصل عليها أكبر عدد من الطلبة ؟

[٣] تمثل البيانات التالية أوزان (١٥) طالباً لأقرب كجم :

٤٨ ٥٠ ٤٨ ٥٠ ٥١

٥٢ ٤٩ ٥١ ٤٩ ٥١

٤٨ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥١

١) ما أصغر وزن وما أكبر وزن ؟

ب) ما عدد الطلبة الذين تجاوزت أوزانهم ٥٠ كجم .

ج) كم تكرر الوزن ٥١ كجم ؟

[٤] أحصى أحمد عدد الكتب المدرسية الموجودة بمكتبة منزله وأنشأ البيان الآتي :

نحو	رياضيات	قرآن	وطنية	جغرافيا	قرآن	علوم	رياضيات	نحو	رياضيات
علوم	جغرافيا	قرآن	تاريخ	تاريخ	قرآن	نحو	نحو	نحو	نحو
نحو	نحو	تاريخ	نحو	علوم	علوم	نحو	نحو	علوم	علوم
علوم	قرآن	علوم	نحو	نحو	نحو	علوم	علوم	قرآن	قرآن
نحو	تاريخ	علوم	قرآن	رياضيات	قرآن	علوم	نحو	نحو	نحو

١) قم بتبويب هذه البيانات في جدول .

ب) ما الكتاب الذي تكرر ظهره أكثر من غيره ؟

٢ : التمثيل البياني لبيانات إحصائية


يعتبر التمثيل البياني مكملاً لعرض البيانات جدولياً وهناك طرق كثيرة لتمثيلها وسنقتصر في هذا الصف على واحدة منها ، وهي التمثيل البياني بالأعمدة .

مثال (١)

يمثل الجدول التالي أوزان (٣٠) طالباً لأقرب كيلوجرام .


الوزن / كجم	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	المجموع
عدد الطلاب	٢	٢	٦	٤	٧	٨	١	٣٠ طالباً	٥٤

لتمثيل هذه البيانات بالأعمدة ، نحدد الأوزان على المحور السيني وتكراراتها (عدد الطلاب) على المحور الصادي بحيث نرسم كل عمود على شكل مستطيل وبين كل عمود وآخر مسافات مناسبة ومتقاربة وعدد الأعمدة تساوي عدد الأوزان ، والمستطيلات قواعدها كلها متساوية وارتفاعاتها تمثل عدد الطلاب المقابل لكتل وزن كما هو في الشكل (١-٧) .



مثال (٢)

الشكل (٢-٧) يمثل بيانات بالأعمدة لدرجات (٢٢) طالباً في اختبار قصير في مادة الرياضيات درجته الكاملة (١٠ درجات) :



شكل (٢-٧)

أجب عن الأسئلة التالية :

- كم عدد الطلاب الحاصلين على أعلى درجة ؟
- ما أدنى درجة حصل عليها الطلاب ؟
- ما عدد الطلاب الواقعة درجاتهم بين (٥) ، (٧) درجات ؟

الحل :


- أعلى درجة (٨) في الشكل يقابلها العدد (٣) وهو عدد الطلاب .
∴ عدد الطلاب الحاصلين على أعلى درجة = ٣ طلاب .
- أدنى درجة حصل عليها الطلاب هي ٥ درجات .
- الدرجة الواقعة بين (٥) ، (٧) هي (٦) على محور الدرجات ويفي بالمعايير
على المحور الآخر ٧ طلاب .
- عدد الطلبة الواقعة درجاتهم بين (٥) ، (٧) = ٧ طلاب .



تمارين وسائل

شكل (٧ - ٣) يبيّن عدد حوادث السيارات كما سجلها القائمون على

المرور بمدينة صنعاء خلال أسبوع معين :



بالاعتماد على الأعمدة البيانية أجب عن الأسئلة التالية :

- كم عدد الحوادث ليوم الاثنين ؟
 - ما اليوم الذي حصل فيه أكثر الحوادث ؟
 - ما أقل عدد حوادث السيارات ؟ وفي أي يوم حصلت ؟
 - نظم المعلومات المبوبة في الأعمدة البيانية في جدول إحصائي .
- [٢] الجدول الآتي يبيّن عدد رياض الأطفال في بعض محافظات الجمهورية اليمنية لعام ١٩٩٠ م .

المحافظة	عدن	لحج	أبين	شبوة	حضرموت	المهرة	الجموع
١٤	٢	٧	٣	١٠	٣	٣	٣٩

عدد رياض
الاطفال

مثل هذه البيانات بطريقة الأعمدة .

[٣] يمثل الجدول التالي المادة الدراسية المفضلة لدى (٩٥) طالب وطالبة

المادة المفضلة	الفرز (التكرار)	عدد الطلبة
الرياضيات		
العلوم		
العربي		
الإنجليزي		
الإسلامية		

في الصف السابع الأساسي :

٤) أكمل الجدول .

ب) أى المداد أكث تفضيلاً لـ

الطلبة؟

ب) مثل هذا الجدول بالأعمدة.

[٤] يمثل الجدول التالي توزيع أيام السنة على الفصول الأربع :

الصيف	الربيع	الشتاء	الخريف	الفصل
٩٦	٩٢	٨٨	٨٨	الأيام

مثّل هذه البيانات بالأعمدة .

[٥] إذا كان لدينا درجات ٤ طالباً في اختبار رياضيات درجته (٣٠) درجة

کما یلی:

۲۳ ۲۰ ۲۲ ۲۷ ۲۳ ۲۴ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۴

۲۴ ۲۰ ۲۷ ۲۴ ۳۰ ۲۵ ۲۸ ۲۱ ۲۹ ۲۳

۲۵ ۲۶ ۲۳ ۲۹ ۲۰ ۳۰ ۲۴ ۲۷ ۲۲ ۲۴

۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱

בבב



فأوجد ما يلي : ١) كم عدد الطلاب الحاصلين على أعلى درجة ؟

ب) ما أدنى درجة حصل عليها الطلاب ؟

ج) اكتب هذه الدرجات في جدول ثم مثلها بالأعمدة .

المتوسط الحسابي


٣ : ٧

طلب من (٤) طلاب حمل أكواام الكتب المبيّنة في الشكل (٤-٧) إلى مخزن المدرسة . لتوزيع هذه الكتب بين الطلاب الأربعه ، تقسم هذه الكتب بالتساوي بين الطلاب الأربعه .

- ما مجموع هذه الكتب ؟

- كم كتاباً يحمل كل طالب ؟

- ما المتوسط الحسابي في هذه
الحالة ؟



شكل (٤-٧)

كي توزع هذه الكتب بين الطلاب الأربعه يجب أن يكون عدد الكتب

في كل كوم =

$$\text{مجموع الكتب} \rightarrow 24 = \frac{2+5+8+9}{4} = \frac{6}{4}$$

عدد الطلاب

وبالتالي فإن العدد ٦ هو المتوسط الحسابي أي عدد الكتب التي يجب أن يحملها كل طالب .

المتوسط الحسابي لمجموع أعداد يساوي نسبة مجموع هذه الأعداد إلى عدد عناصر المجموعة ، أي أن :

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع الأعداد}}{\text{عددها}}$$

أيًّاً أن المتوسط الحسابي هو عبارة عن قيمة عددية تصف مجموعه من الأعداد ككل وليس بصورة منفردة .

إِذَا كانت أطوال ٤ طلاب لأقرب عدد صحيح هي :

مثال (١)

١٥٦ سم ، ١٦٧ سم ، ١٥٥ سم ، ١٧٠ سم .

ما المتوسط الحسابي لأطوالهم ؟

الحل :

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع اطوال الطلبة}}{\text{عدد الطلبة}}$$

$$\frac{١٧٠ + ١٥٥ + ١٦٧ + ١٥٦}{٤} =$$

$$= ١٦٢ \text{ سم}$$

ملاحظة : أحياناً يطلق على المتوسط الحسابي «المعدل» وكلاهما يعني، في الواقع ، الشيء نفسه .

مثال (٢)

المتوسط الحسابي لفريق كرة قدم ١٣ هدفاً في ٨ مباريات ، فما مجموع هذه الأهداف ؟



$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع الأعداد}}{\text{عددتها}}$$

ومنها المجموع = المتوسط × العدد

$$104 = 8 \times 13 =$$

∴ مجموع الأهداف = ٤٠ هدفاً

مثال (٣) مجموع أعداد (٦٣٠) ومتوسطها الحسابي (١٠,٥)، فكم عددها؟

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع الأعداد}}{\text{عدد الأعداد}}$$

الحل:

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع الأعداد}}{\text{عدد الأعداد}}$$

$$\frac{630}{10,5} =$$

$$\text{عدد الأعداد} = ٦٠$$

ćمارين ومسائل

[١] إذا كان دخل (٦) موظفين في الشهر يساوي (٩٣٠٠٠) ريال، ما معدّل

(متوسط) دخل الموظف الواحد ؟

[٢] حصل أَحمد في الامتحان النهائي على الدرجات التالية :

٨٠ ، ٧٥ ، ٩٠ ، ٨٥ بينما كان مجموع درجاته في السنة

السابقة (٥٦٠) درجة لسبع مواد

١) ما المتوسط الحسابي لدرجاته الحالية ؟

٢٦٦

ب) ما المتوسط الحسابي لدرجاته للسنة السابقة ؟

ج) أي من المتوسطين أكبر ؟

[٣] سجلت الأرصاد الجوية درجات الحرارة لمدة (١٥) يوماً متتالية لإحدى

مناطق الجمهورية كما يلي :

٢١ ٢٥ ١٥ ١٨ ١٨

٢٥ ٢١ ١٧ ١٩ ٢١

٢٢ ٢٥ ٢٥ ٢١ ٢٢

أوجد المتوسط الحسابي لدرجات الحرارة لهذه المنطقة خلال هذه المدة.

[٤] إذا كان المتوسط الحسابي لدرجات أحمد في اللغة الانجليزية في ثلاثة اختبارات هو (٨٧) ، وكانت الدرجتان الأولى والثانية على التوالي ،

٨٩ ، فما الدرجة الثالثة ؟

[٥] أكمل الجدول التالي :

المتوسط	العدد	المجموع
	٤	٤٢٠
٢,٥		٢٢,٥
٣٣,٣	١١	
٣٥		٥٢٥
١٩	٣١	

[٦] معدّل عدد الطلبة في الفصل في إحدى المدارس ٦٥ طالباً فإذا كان

بالمدرسة ٨ فصول فما مجموع طلاب المدرسة ؟

[٧]

٥	٦	١١	٦	٤	٢	٩	٣	٦	١٥
٥	٦	١٦	١٥	٤	٩	٥	٧	٤	١٠
٥	٦	١١	١١	٤	٩	٨	٧	٤	١٥
٥	٦	١١	١١	٤	٩	٨	٧	٤	١٥

أوجد المتوسط الحسابي لعدد المخالفات في اليوم الواحد .

[٨] متوسط هطول الأمطار خلال ثلاثة أيام متتالية ٣,٥ مليمتر فإذا كان قد هطل في اليوم الأول ٣,٧ مليمتر وفي اليوم الثاني ٣,٦ مليمترات . فما كمية الأمطار التي هطلت في اليوم الثالث ؟

٧ : تمارين عامة ومسائل

[١] الأعداد الآتية هي درجات (٢٥) طالباً في اختبار شهري درجته العظمى

٧ ٨ ٩ ٥ ٥

(١٠ درجات) :

٦ ٥ ٧ ٤ ٧

ا) نظم هذه البيانات في جدول إحصائي يحتوي على الدرجة ، الفرز وعدد الطلاب .

٤ ٥ ٧ ٨ ٧

ب) ما مجموع الدرجات الكلية ؟

٤ ٤ ٦ ١٠ ٥

ج) احسب المتوسط الحسابي لهذه الدرجات


٥ ٩ ٦ ١٠ ٨

[٢] الجدول الآتي يبيّن عدد الأخطاء التي ارتكبها (٣٠) سائقاً في اختبار قيادة السيارات :

الخطأ المرتكب	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	المجموع
عدد الأخطاء (عدد السائقين)	٦	٦	٤	٤	٤	٢	٦	١	٣٠

- ١) مثل هذه البيانات بالأعمدة .
- ب) ما عدد السائقين الذين ارتكبوا أكثر من (٣) أخطاء ؟
- [٣] بلغت درجات بلقيس لمجموعة اختبارتها في اللغة العربية كما يلي :
- ٨٨ ، ٧٥ ، ٧٠ ، ٩٨ ، ٧٤ ، ٥٣ ، ٧٢
- ٤) ما المتوسط الحسابي لدرجات بلقيس ؟

- ب) فإذا حذف المدرس أدنى درجة (٥٣) ، فما المتوسط الحسابي الجديد ؟
- ج) أي المتوسطين أعلى ؟ وكيف تفسر ذلك ؟
- [٤] الشكل (٥-٧) يبيّن المسافات لرحلات سيارةأجرة في إحدى المدن خلال يوم عمل واحد .



- ١) ما مجموع رحلات هذه السيارة اليومي (التكرار اليومي) ؟
- ب) بالاعتماد على الشكل البياني السابق ، كون جدولًا إحصائيًا يضم المسافة (كلم) والتكرار اليومي للرحلات .
- ج) احسب المتوسط الحسابي لرحلات هذه السيارة في ذلك اليوم .

- [٥] كان متوسط درجات أحد الطلبة في ثلاثة اختبارات هو (٨٠ درجة) وكانت الدرجاتان الثانية والثالثة على التوالي ٩٠ ، ٨٠ فما الدرجة الأولى؟
- [٦] أكمل الجدول التالي :

المتوسط الحسابي	العدد	المجموع
	٥	٥٨٢
٢٨٨		٨٦٤
٦٣	١٥	
٣١,١		٦٢,٢
٥٩,٢٥	٠,٨	

[٧] فيما يلي الأجر اليومي بالريال لعشرين عاملاً في أحد المصانع ، والمطلوب عمل جدول يحتوي الأجرة وعدد العمال، ثم مثله بالأعمدة.

٤٠٠	٤٥٠	٣٠٠	٤٥٠	٣٠٠
٣٠٠	٤٥٠	٣٥٠	٤٠٠	٥٠٠
٣٠٠	٥٠٠	٣٥٠	٤٠٠	٤٥٠
٣٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٣٥٠	٤٠٠

٧ : اختبار الوحدة

[١] البيانات التالية تمثل عدد الأخطاء التي ارتكبها فريق كرة السلة في (٢٨) مباراة:

٧	٦	٤	٦	٥	٣	١
١	٢	١	٣	٦	٢	٧
٦	٣	١	٣	٢	١	٤
٢	٥	٦	٢	٤	٣	٥

- ١) رتب هذه البيانات في جدول إحصائي حسب عدد الأخطاء وعدد المباريات .
 ب) مثل هذه البيانات بالأعمدة البيانية .

[٢] الجدول التالي يبيّن درجات اختبار شهري في اللغة العربية :

الدرجة	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	المجموع
عدد الطلاب	٣	٥	٨	٧	٤	٣	٣٠

- ا) ما الدرجة التي حصل عليها أغلب الطلاب ؟
 ب) ما عدد الطلاب الذين حصلوا على أقل من ٨ درجات ؟
 ج) ما نسبة الطلاب الحاصلين على الدرجة العظمى ؟
 د) أوجد المتوسط الحسابي لهذه الدرجات .

[٣] صرف أحمد وصالح في خمسة أيام المبالغ التالية (بالريال) :

ما صرفه أحمد : ٧٥ ، ٨٥ ، ٩٥ ، ٧٥ ، ٨٠

ما صرفه صالح : ٩٥ ، ٩٥ ، ٦٥ ، ٨٥ ، ٩٠

ا) أوجد متوسط ما صرفه كل واحد على حده .

ب) أيهما له أعلى متوسط في الصرف اليومي ؟

[٤] إذا كان مجموع أعداد (٨١٠) ومتوسطها الحسابي (٢٧) ، فكم عدد هذه الأعداد ؟



جَزَاكُمُ اللَّهُ عَزَّلَهُمْ بِرًا

٢٧٢

el-online.net



الادارة العامة للتعليم الالكتروني

el-online.net

el-online.net

