

مقدمه في نظرية الأعداد

أ.د. فالح بن عمران بن محمد الدوسري
قسم العلوم الرياضية - كلية العلوم التطبيقية
جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الطبعة الأولى

١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م

المقدمة

الحمد لله الذي علّم بالقلم ، علّم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقُدوتنا محمد (ﷺ) وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد فالعدد لغة العلم ، وأفضل وسيلة للتعبير عنه هي الرموز ، والأرقام هي أشكال تكتب بها رموز الأعداد ، والحساب أو نظرية الأعداد هو علم العدد ، جانبه النظري يعالج الأرقام والأعداد ، مراتبها والنسب التي بينها وتكرارها على نسق معين ، أنواعها وكيفية بنائها ودراسة خواصها والعلاقات بينها ، وجانبه العملي يتناول الحساب ، معرفة المطلوب بالعمليات الأربعة ، وتكثر الحاجة إلى الحساب بإستخراج المطلوب من صلة بعض الأشياء ببعض ولولا الحساب لعجز الإنسان عن تسجيل أحداث الزمن ولما وجدت التقويم والنقود ، ولما جاء عن ابن سِراقة : أن الحساب علم قديم فوائده جمه منها ما في الميقات من أوقات الصلاة وحساب الأعوام والشهور والأيام وحركات الشمس في البروج والكواكب وحلول القمر في المنازل المقدرة له ومعرفة الساعات وغير ذلك ، ومنها في علم الفقه في حساب الزكاة وما يحسبه المكلف في الصيام وأعمال الحج وقسمة الغنائم والمساقاة والإجارة وغير ذلك مما يحتاج إليه غالب الناس ، ومنها ما في علم الفرائض من التأجيل والتصحيح وقسمة التركات، بل أن الله تعالى قال بحق نفسه " وهو أسرع الحاسبين " ولأهمية علم الحساب في حياة الناس اليومية جعله الجاحظ يشمل على معان كثيرة ومنافع جليلة والجهل به فساد جل النعم وفقدان جمهور المنافع واختلال كل ما جعله الله عز وجل لنا قواماً ومصلحة ونظاماً ، وقال جاوز الرياضيات ملكة العلوم والحساب ملك الرياضيات ، وعليه ولقلة المراجع في هذا المجال ، نقدم هذا الكتاب الذي يضم ثمانية فصول يحتوي على أساسيات نظرية الأعداد وبعض تطبيقاتها ، ندرس في الفصل الأول منها خواص الأعداد الصحيحة والأستقراء الرياضي وقاعدة الترتيب الجيد . وقد بدأ الأستقراء

الرياضي مع الكرخي (ت ١٠٢٠م) ، لأنه أول من أثبت بشكل من الأستقراء

الرياضي أن $\sum_{i=1}^n i^3 = (\sum_{i=1}^n i)^2$ ، $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ، أما كل من الحسن

ابن الهيثم والسمؤال المغربي وابن البنا المراكشي ، فقد أثبت تلك العلاقات بطرق

مختلفة ، أما العلاقة $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$ ، فقد أثبت من

قبل كل من أبو جعفر القبيصي أحد رياضي القرن العاشر للميلاد ، وأبو منصور عبد

القادر البغدادي والحسن ابن الهيثم وغيث الدين الكاشي . أما قاعدة الترتيب الجيد

فقد وضعت من قبل كانتور وزرملو كإحدى طرق البرهان المكافئة للأستقراء الرياضي

من جهة ولمسلمه الأختيار من جهة أخرى .

ونظراً لأهمية القسمة والقاسم المشترك الأعظم والمضاعف المشترك البسيط وكيفية

إيجادهما ، الأعداد الأولية وخواصها والمبرهنة الأساسية في الحساب وتطبيقاتها ،

خصّص الفصل الثاني لدراستها . أما في الفصل الثالث ، فندرس التطابقات ، التي تقدم

مفهوماً آخراً للقسمة قدمت من قبل جاوس عام ١٨٠١م بطريقة جعلتها أداة فعالة

لتسهيل البراهين ووسيلة أخرى لدراسة نظرية الأعداد وضم هذا الفصل خواص

التطابق وفصوله وبعض تطبيقاته ، البواقى التامة والمختزلة والتطابقات الخطية ومبرهنة

الباقى الصينية ، إضافة إلى مبرهنتي أويلر وفيرما ومبرهنة ابن الهيثم " ولسن " .

وندرس في الفصل الرابع الدوال العددية مثل القواسم وعددها لعدد صحيح والتي

ظهرت في أبحاث أبو جعفر الخازن وأبو سعيد السجزي من رياضي القرن العاشر

للميلاد ، ثم ندرس دالة أويلر وخواصها ، دالة موبصص والدالة زيتا .

وندرس في الفصل الخامس أنواعاً خاصة من الأعداد وهي أعداد فيرما ومرسين ،

الأعداد التامة المعرفة من قبل إقليدس ، الأعداد المتحابة المعرفة من قبل فيثاغورس

الأعداد المتعادلة المعرفة من قبل عبد القادر البغدادي .

أما في الفصل السادس فندرس الجذور البدائية التي وردت في أبحاث أويلر

سنة ١٧٧٣م ولجنر سنة ١٧٨٥م وجاوس سنة ١٧٩٦م ، ثم ندرس البواقى

التربيعية وخواصها ورمز لجندر ، ثم قانون التعاكس لجاوس ، والذي خُمن من قبل أويلر سنة ١٧٤٢م وُبرهن جزئياً من قبل لجندر سنة ١٧٨٥م ثم أثبت من قبل جاوس سنة ١٧٩٦م ونشر سنة ١٨٠١م .

أما الفصل السابع فيحتوي على بعض المعالات الديوفنتية مثل المعادلات الديوفنتية الخطية التي بدأت مع ديوفنتس وطورت من قبل ابن أسلم المصري والكرخي والسؤال المغربي والحازن والسجزي ثم فيرما وأويلر ، أما المعادلة $x^2 + y^2 = z^2$ وثلاثيات فيثاغورس أو ما يسمى المثلثات العددية قائمة الزاوية ، فقد بدأت مع البابلين والمصريين ، ثم فيثاغورس ، أبو جعفر الحازن أحد رياضي القرن العاشر للميلاد، أما في البند الثالث من هذا الفصل فقد درست بعض الحالات الخاصة لمبرهنة فيرما الأخيرة والتي تعتبر من أهم وأشهر المبرهنات في نظرية الأعداد ، والتي تنص على عدم وجود أعداد صحيحة غير صفرية تحقق العلاقة $x^n + y^n = z^n$ ، $n \geq 3$.

مؤكدين على تعامل الرياضيين المسلمين أمثال الكرخي والحجندي والحازن والخيام وابن سينا مع الحالتين الخاصتين $x^3 + y^3 = z^3$ ، $x^4 + y^4 = z^4$. وأخيراً ندرس كيفية التعبير عن عدد طبيعي كمجموع مربعين أو أكثر والتي بدأت مع ديوفنتس وتطورت مع الحازن وباشيه و فيرما ، لاجرانج وأويلر .

ونظراً لأهمية الكسور المستمرة ، لعلاقتها بالأعداد الحقيقية من جهة وكثرة تطبيقاتها من جهة أخرى خصص الفصل الأخير لدراسة هذا النوع من الكسور والذي ظهر في أبحاث الإيطاليين بومبيلي سنة ١٥٧٢م ، كاتالدي سنة ١٦١٣م ، الإنجليزي جون ايلس سنة ١٦٥٣م وأويلر و لاجرانج و جاوس .

وأخيراً أود أن أشكر زميلي الأخ الدكتور محمود بن عبد القادر خليفة على مساعدته لي في الحصول على بعض المراجع ، سائلاً الله العلي القدير إن يرحمنا ويرحم والدينا ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين ،،،

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٨هـ

١٥ إبريل ٢٠٠٧م

المحتوى

| | |
|-----|--|
| هـ | المقدمة : |
| ١ | الفصل الأول : مفاهيم أساسية |
| ١ | ١-١ : خواص الأعداد الصحيحة |
| ٧ | ٢-١ : قاعدة الترتيب الجيد والأستقراء الرياضي |
| ١٨ | تمارين : |
| ٢١ | الفصل الثاني : قابلية القسمة |
| ٢١ | ١-٢ : القسمة الخوارزمية والقاسم المشترك الأعظم |
| ٣٩ | تمارين : |
| ٤٢ | ٢-٢ : الأعداد الأولية |
| ٥٣ | تمارين : |
| ٥٤ | ٣-٢ : المبرهنة الأساسية في الحساب وبعض تطبيقاتها |
| ٦٤ | تمارين : |
| ٦٧ | الفصل الثالث : التطابقات |
| ٦٧ | ١-٣ : مفهوم التطابق وخواصه الأساسية |
| ٧٥ | تمارين : |
| ٧٦ | ٢-٣ : قابلية القسمة على 2,3,5,9,11,13 |
| ٨٣ | تمارين : |
| ٨٤ | ٣-٣ : أنظمة البواقي |
| ٩١ | تمارين : |
| ٩٢ | ٤-٣ : التطابقات الخطية ومبرهنة الباقي الصينية |
| ١٠٦ | تمارين : |
| ١٠٧ | ٥-٣ : مبرهنتي أويلر وفيرما |
| ١١٧ | تمارين : |
| ١١٨ | ٦-٣ : مبرهنة ابن الهيثم (ولسن) |
| ١٢٥ | تمارين : |

| | |
|-----|---|
| ١٢٧ | الفصل الرابع : الدوال العددية |
| ١٢٧ | ٤-١: تعاريف وخواص |
| ١٣٠ | تمارين : |
| ١٣١ | ٤-٢: الدوال σ, τ, σ_m |
| ١٣٨ | تمارين : |
| ١٣٩ | ٤-٣: دالة أويلر |
| ١٤٨ | تمارين : |
| ١٤٩ | ٤-٤: دالة موبص |
| ١٥٤ | تمارين : |
| ١٥٥ | ٤-٥: الدالة زيتا |
| ١٦٠ | تمارين : |
| ١٦١ | الفصل الخامس : أعداد خاصة |
| ١٦١ | ٥-١: أعداد فيرما وأعداد مرسين |
| ١٦٨ | تمارين : |
| ١٦٨ | ٥-٢: الأعداد التامة |
| ١٧٦ | تمارين : |
| ١٧٧ | ٥-٣: الأعداد المتحابية والأعداد المتعادلة |
| ١٨٤ | تمارين : |
| ١٨٥ | الفصل السادس : البواقي التربيعية وقانون التعاكس الثنائي |
| ١٨٥ | ٦-١: الجذور البدائية |
| ١٩٥ | تمارين |
| ١٩٦ | ٦-٢: البواقي التربيعية |
| ٢٠٦ | تمارين : |
| ٢٠٧ | ٦-٣: قانون التعاكس الثنائي |
| ٢٢٢ | تمارين : |

| | |
|-----|--|
| ٢٢٥ | الفصل السابع : بعض المعادلات الديوفنتية |
| ٢٢٩ | ١-٧ : المعادلات الديوفنتية الخطية |
| ٢٤٠ | تمارين : |
| ٢٤٢ | ٢-٧ : المعادلة $x^2 + y^2 = z^2$ وثلاثيات فيثاغورس |
| ٢٥٢ | تمارين : |
| ٢٥٣ | ٣-٧ : حالات خاصة من مبرهنة فيرما الأخيرة |
| ٢٥٩ | ١-٣-٧ : المعادلة $x^4 + y^4 = z^4$ |
| ٢٦١ | ٢-٣-٧ : المعادلة $x^3 + y^3 = z^3$ |
| ٢٧٥ | تمارين : |
| ٢٧٦ | ٤-٧ : مجموع مربعين أو أكثر |
| ٢٨٧ | تمارين : |
| ٢٨٩ | الفصل الثامن : الكسور المستمرة |
| ٢٩٣ | ١-٨ : الكسور المستمرة البسيطة المنتهية |
| ٣٠٣ | تمارين : |
| ٣٠٥ | ٢-٨ : الكسور المستمرة البسيطة غير المنتهية |
| ٣١٩ | تمارين : |
| ٣٢١ | المراجع |
| ٣٢٣ | جدول الأعداد الأولية الأقل من 10000 |
| ٣٢٧ | دليل الرموز |
| ٣٢٩ | دليل المصطلحات |

مفاهيم أساسية (Basic Concepts)

يضم هذا الفصل بندان تناولنا فيهما بعض خواص الأعداد الصحيحة وقاعدتي الإستنتاج (الأستقراء) الرياضي والترتيب الجيد .

١-١ : خواص الأعداد الصحيحة

يمكن بناء الأعداد الصحيحة $Z = \{0, \mp 1, \mp 2, \dots\}$ من مجموعة الأعداد الطبيعية $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ، وإثبات خواص جمعها وضربها كما في [١] ، لكننا سنورد تلك الخواص دون إثبات لأي منها ، ثم نستنتج منها خواصاً أساسية أخرى .

فإذا كان $a, b, c \in Z$ ، فإن :

$$(١) \quad a + b = b + a , \quad a \cdot b = b \cdot a . \text{ أي أن جمع وضرب الأعداد}$$

الصحيحة إبدالي (تبديلي Commutative) .

$$(٢) \quad (a + b) + c = a + (b + c) , \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) . \text{ أي أن جمع}$$

وضرب الأعداد الصحيحة تجميعي (Associative) .

$$(٣) \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a , \quad a + 0 = 0 + a = a$$

$$(٤) \quad \text{لكل } a \in Z , \text{ يوجد } -a \in Z \text{ بحيث أن } a + (-a) = (-a) + a = 0$$

$$(٥) \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c , \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c . \text{ أي أن}$$

الضرب توزيعي على الجمع .

$$(٦) \quad \text{إذا كان } a + b = a + c , \text{ فإن } b = c$$

$$(٧) \quad \text{لكل } a, b \in N , \text{ نجد أن } a + b \in N , \quad a \cdot b \in N$$

والآن إلى المبرهنة الآتية :

مبرهنة ١-١-١ : إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ فإن

$$(-a) \cdot b = a(-b) = -(ab) \quad (\text{ب}) \quad , \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \quad (\text{أ})$$

$$(-a)(-b) = ab \quad (\text{د}) \quad , \quad -(-a) = a \quad (\text{ج})$$

البرهان :

(أ) بما أن $0 + 0 = 0$. إذاً $a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0$ ، وعليه فإن $a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0$

لكن $a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$. إذاً $a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$ ، وعليه فإن

$a \cdot 0 = 0$ (حسب الخاصية ٦) . لكن $a \cdot 0 = 0 \cdot a$ (حسب الخاصية ١) .

$$\text{إذاً } a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

(ب) بما أن $(-a) \cdot b = (-a) \cdot b + 0$ (حسب الخاصية ٣) . وبما أن

$ab + (-ab) = 0$ (حسب الخاصية ٤) . إذاً بإستخدام الخواص

(٢)، (٣)، (٥) نجد أن

$$(-a) \cdot b = (-a)b + [ab + (-ab)] = [(-a)b + ab] + (-ab)$$

$$((-a) + a)b + (-ab) = 0 \cdot b + (-ab) = 0 + (-ab) = -(ab)$$

وبنفس الطريقة يمكن أن نبرهن على أن $a(-b) = -(ab)$. إذاً

$$(-a)b = a(-b) = -(ab)$$

(ج) بما أن $-(-a) = -(-a) + 0$ و $(-a) + a = 0$. إذاً

$$-(-a) = -(-a) + [(-a) + a] = [-(-a) + (-a)] + a = 0 + a = a$$

(د) $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$ (حسب (ب) ، (ج) .

□

تعريف ١-١-١ :

إذا كان $N^* = N - \{0\} = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{Z}^+$ وكان $a, b \in \mathbb{Z}$ فيقال عن

(أ) a أنها أصغر من b أو أن b أكبر من a ونكتب $a < b$ إذا كان

$$b - a \in N^*$$

(ب) a أنها أصغر أو تساوي b أو أن b أكبر أو تساوي a ونكتب $a \leq b$ إذا كان $b - a \in \mathbb{N}$.

ميرھنة ٢-١-١ :

(أ) إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ وكان $a < b$ و $b < c$ فإن $a < c$.

(ب) إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، $a < b$ ، $c > 0$ ، فإن $ac < bc$.

(ج) إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ فواحدة فقط مما يأتي صحيحة : إما $a < b$ أو $a = b$ أو $a > b$.

البرهان :

(أ) بما أن $a < b \Leftrightarrow b - a \in \mathbb{N}^*$ ، $b < c \Leftrightarrow c - b \in \mathbb{N}^*$ إذاً $(c - b) + (b - a) \in \mathbb{N}^*$ ، وعليه فإن $c - a \in \mathbb{N}^*$ ومنه ينتج أن $a < c$.

(ب) بما أن $a < b \Leftrightarrow b - a \in \mathbb{N}^*$ وبما أن $c \in \mathbb{N}^*$ إذاً $(b - a)c = bc - ac \in \mathbb{N}^*$ ، وعليه فإن $ac < bc$.

(ج) نفرض أن $a < b$ و $a = b$. إذاً $b < b$ وهذا تناقض . وإذا كان $a > b$ و $a = b$. فإن $b > b$ وهذا تناقض أيضاً . أما إذا كان $a < b$ و $a > b$ فإن $a < a$ حسب (أ) وهذا تناقض أيضاً . إذاً واحدة فقط من العبارات أعلاه صحيحة .

□

تعريف ٢-١-١ :

إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ فيقال عن $|a|$ أنها القيمة المطلقة (Absolute value)

للعدد a إذا كان

$$|a| = \begin{cases} a & \forall a \geq 0 \\ -a & \forall a < 0 \end{cases}$$

مبرهنة ١-١-٣ : إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، فإن

$$\begin{aligned} (أ) \quad & |a| \geq 0 \quad ، \quad (ب) \quad |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0 \quad ، \quad (ج) \quad -|a| \leq a \leq |a| \\ (د) \quad & |-a| = |a| \quad ، \quad (هـ) \quad |ab| = |a||b| \quad ، \quad (و) \quad |a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b \\ (ز) \quad & |a+b| \leq |a| + |b| \quad ، \quad (ح) \quad |a-b| \geq |a| - |b| \end{aligned}$$

البرهان : سنثبت أ ، ج ، هـ ، ز ،

(أ) إذا كان $a \geq 0$ ، فإن $|a| = a \geq 0$. وإذا كان $a < 0$ ، فإن $|a| = -a > 0$ ،
إذاً $|a| \geq 0$.

(ج) نفرض أن $a \geq 0$. إذاً $|a| = a$ ، وعليه فإن $|a| \geq 0$ ومنه ينتج أن
 $-|a| \leq 0 \leq a = |a|$. إذاً $-|a| \leq 0 \leq a = |a|$ وعليه فإن $-|a| \leq a \leq |a|$. أما إذا
كان $a < 0$ ، فإن $-a > 0$ وعليه فإن $|a| = -a > 0$ ومنه ينتج أن
 $-|a| < 0$. إذاً $-|a| = a < 0 < -a = |a|$ وعليه فإن $-|a| \leq a \leq |a|$.

(هـ) إذا كان $a \geq 0$ ، $b \geq 0$ ، فإن $ab \geq 0$ وعليه فإن $|a| = a$ ، $|b| = b$ ،
ومنه ينتج أن $|ab| = ab = |a||b|$. وإذا كان $a \geq 0$ ، $b < 0$ ، فإن $ab < 0$ ،
وعليه فإنه $|a| = a$ ، $|b| = -b$ ، إذاً $|ab| = a(-b) = |a||b|$.
وإذا كان $a < 0$ ، $b \geq 0$ ، فإن $ab < 0$ و $|a| = -a$ و $|b| = b$ ، وعليه
فإن $|ab| = -(ab) = (-a)b = |a||b|$. وإذا كان $a < 0$ ، $b < 0$ ،
فإن $ab > 0$ ، $|a| = -a$ ، $|b| = -b$ ، وعليه فإن $|ab| = ab$ ومنه ينتج
أن $|ab| = |a||b|$

(ز) بما أن $-|a| \leq a \leq |a|$ و $-|b| \leq b \leq |b|$ - حسب (ج) . إذاً
 $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$ وحيث أن $a, b \in \mathbb{Z}$. إذاً إما
 $a + b \geq 0$ أو $a + b < 0$ فإذا كان $a + b \geq 0$ ، فإن $|a + b| = a + b$
وعليه فإن $|a + b| \leq |a| + |b|$ أما إذا كان $a + b < 0$ ، فإن
 $|a + b| = -(a + b)$. لكن $-(|a| + |b|) \leq a + b$. إذاً
 $|a + b| \leq |a| + |b|$ ، وعليه فإن $|a + b| \leq |a| + |b|$.

٢-١ : قاعدة الترتيب الجيد والاستنتاج (الأستقراء) الرياضي

Well-ordering principle and Mathematical Induction

سنركز اهتمامنا في هذا الجزء على قاعدة الترتيب الجيد وعلاقتها بالأستنتاج الرياضي ، ونبدأ بالآتي :

تعريف ١-٢-١ :

يقال عن علاقة \leq على مجموعة غير خالية A أنها علاقة ترتيب جزئي (partial order relation) إذا كانت :

(أ) \leq علاقة منعكسة (reflexive) على A . أي أن $a \leq a$ لكل $a \in A$.

(ب) \leq علاقة متخالفة أو تخالفية (Antisymmetric) على A . أي أنه إذا كان $a \leq b$ و $b \leq a$ فإن $a = b$.

(ج) \leq علاقة متعدية (transitive) على A . أي أنه إذا كان $a \leq b$ و $b \leq c$ ، فإن $a \leq c$.

ويقال عن (A, \leq) أنها مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً (partially ordered set) ، إذا كانت $A \neq \emptyset$ و \leq علاقة ترتيب جزئي على A .

مثال ١-٢-١ :

(أ) إذا كان $A \in \{N, Z, Q, R\}$ ، وكان $a \leq b \Leftrightarrow a \leq b$ فإن (A, \leq) مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً .

(ب) إذا كانت $X \neq \emptyset$ ، فإن $(P(X), \subseteq)$ مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً لأن $P(X) \neq \emptyset$ و \subseteq علاقة ترتيب جزئي على $P(X)$.

(ج) إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ،

$\leq = \{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3), (2,4), (1,4) \}$

، فإن \leq علاقة ترتيب جزئي على A .

(د) إذا كانت \leq معرفة على N^* كالآتي : $a \leq b \Leftrightarrow b \setminus a$ ، فإن \leq علاقة ترتيب جزئي على N^* ، وعليه فإن (N^*, \leq) مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً .

تعريف ١-٢-٢ :

إذا كانت (A, \preceq) مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً ، فيقال عن $a \in A$ أنه عنصر أول أو عنصر أصغر (first or least or smallest element) للمجموعة A ونكتب $l(A) = a$ إذا كان $a \preceq x$ لكل $x \in A$.

مثال ١-٢-٢ :

(أ) (N, \leq) مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً ، $l(N) = 0$.

(ب) إذا كانت $X \neq \emptyset$ ، فإن $(P(X), \subseteq)$ مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً ، $l(P(X)) = \emptyset$ ، لأن $\emptyset \subseteq A$ لكل $A \in P(X)$.

(ج) إذا كانت $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ ، فإن (A, \leq) مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً لكنها لا تملك عنصر أول .

(د) إذا كانت $A = \{2, 4, 6\}$ وكانت \preceq معرفة على A كالآتي :
 $a, b \in A$ ، $a \preceq b \Leftrightarrow a \setminus b$ ، إذاً (A, \preceq) مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً
 و $l(A) = 2$.

تعريف ١-٢-٣ :

يقال عن مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً (A, \preceq) أنها مجموعة مرتبة ترتيباً جيداً (well-ordered Set) إذا كانت كل مجموعة جزئية غير خالية من A تحوي عنصراً أولاً .

مثال ١-٢-٣ :

(أ) إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، فإن (A, \leq) مجموعة مرتبة ترتيباً جيداً لأن (A, \leq) مجموعة مرتبة ترتيباً جزئياً وكل مجموعة جزئية من A تحوي عنصراً أولاً .

(ب) إذا كانت $A = \{1, 2, 4, 8\}$ ، $a \leq b \Leftrightarrow a \setminus b$ ، فإن (A, \leq) مجموعة مرتبة ترتيبياً جيداً لأن (A, \leq) مجموعة مرتبة ترتيبياً جزئياً وكل مجموعة جزئية تحوي عنصر أول .

(ج) لكل $n \in \mathbb{N}$ ، نجد أن $A = (\{r \in \mathbb{N} \mid r < n\}, \leq)$ مجموعة مرتبة ترتيبياً جيداً .

(د) إذا كانت $A = [0, 1]$ فإن A مجموعة ليست مرتبة ترتيبياً جيداً لأن $B =]0, 1[\subsetneq A$ لا تحوي عنصر أول .

(هـ) إذا كانت $A = \mathbb{N}^2$ ، \leq معرفة A كالآتي :
إذا كانت $(a, b), (c, d) \in A$ فإن

$$(a, b) \leq (c, d) \Leftrightarrow 2^d(2a+1) \leq 2^b(2c+1) \text{ فإن } (A, \leq) \text{ مجموعة ليست}$$

مرتبة ترتيبياً جيداً لأن $(a, b+1) \leq (a, b)$ لكل $a, b \in \mathbb{N}$ ، وعليه إن A لا تملك عنصر أول .

(و) (\mathbb{Z}, \leq) مجموعة ليست مرتبة ترتيبياً جيداً ، لأن $\{\dots, -3, -2, -1\}$ مجموعة جزئية منها لا تحوي على عنصر أول (عنصر أصغر) .

قاعدة الترتيب الجيد (Well-ordering principle)

(\mathbb{N}, \leq) مجموعة مرتبة ترتيبياً جيداً .

والآن إلى المبرهنة الآتية التي تبين بعض تطبيقات قاعدة الترتيب الجيد .

مبرهنة ١-٢-١ :

(أ) لا يوجد عدد صحيح بين الصفر والواحد .

(ب) الواحد أصغر عدد موجب .

(ج) إذا كان $n \in \mathbb{Z}$ ، فلا يوجد $m \in \mathbb{Z}$ ، بحيث أن $n < m < n+1$.

البرهان :

(أ) نفرض وجود $x \in \mathbb{N}$ بحيث أن $0 < x < 1$. إذا

، $S = \{m \in \mathbb{N} \mid 0 < m < 1\} \neq \emptyset$. لكن \mathbb{N} مرتبة جيداً ،

$\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{N}$. إذا S تملك عنصر أول (أصغر) وليكن n . إذا

$0 < n < 1$ ، وعليه فإن $0 < n^2 < n < 1$ ، وهذا يعني أن $n^2 \in S$ و

$n^2 < n$ وهذا يناقض كون n عنصر أول في S . إذا $S = \emptyset$.

(ب) بما أن $S = \{m \in \mathbb{N} \mid 0 < m < 1\} = \emptyset$ حسب (أ) . إذا الواحد هو

أصغر عدد صحيح موجب .

(ج) نفرض وجود $m \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $n < m < n+1$. إذا

$0 < (m - n) < 1$ وهذا يناقض (أ) . إذا لا يوجد $m \in \mathbb{Z}$ بحيث أن

$$n < m < n+1$$

□

ولتوضيح العلاقة بين قاعدة الترتيب الجيد والاستقراء الرياضي نورد المبرهنة الآتية :

مبرهنة ١-٢-٤ : العبارات الآتية متكافئة .

(أ) قاعدة الاستقراء الرياضي (principle of Mathematical Induction)

إذا كانت B مجموعة جزئية من \mathbb{N}^* وكان $1 \in B$ و

$$B = \mathbb{N}^* \text{ فإن } (n \in B \Rightarrow n+1 \in B) .$$

(ب) القاعدة العامة للاستقراء الرياضي (Transfinite Induction) .

إذا كانت B مجموعة جزئية من \mathbb{N}^* ، وكان $1 \in B$ و $n \in B$ عندما

$$m \in B \text{ لكل } m < n \text{ ، فإن } B = \mathbb{N}^* .$$

(ج) لكل مجموعة جزئية غير خالية من \mathbb{N}^* عنصر أول (أصغر) .

البرهان : سنثبت أن (أ) \Leftrightarrow (ب) \Leftrightarrow (ج) \Leftrightarrow (أ) .

(أ) \Leftrightarrow (ب) لتكن $B \subseteq \mathbb{N}$ بحيث أن $1 \in B$ و $n \in B$ عندما $m \in B$

لكل $m < n$. ولنفرض $E = \{x \in \mathbb{N} \mid y \in B \forall y \leq x\}$.

إذا $E \subseteq B$ وعليه يتم المطلوب إذا أثبتنا أن $E = \mathbb{N}^*$.

ولإثبات ذلك لاحظ أن $1 \in E$ لأن $1 \in B$ وإذا كان $n \in E$ ، فإن $y \in B$ لكل $y \leq n$. إذا $(n+1) \in B$ وعليه فإن $y \in B$ لكل $y \leq n+1$ وهذا يعني أن $n+1 \in E$. إذا $E = N^*$ حسب (أ) .

(ب) \Leftrightarrow (ج) لتكن B مجموعة جزئية من N^* و B لا تملك عنصر أول . إذا $1 \notin B$ وعليه فإن $1 \in N^* - B$. إذا كانت $m \in N^* - B$ لكل $m < n$ ، فإن $n \in N^* - B$ لأنه إذا كان العكس فإن n هي العنصر الأول للمجموعة B وهذا يناقض الفرض . إذا $N^* - B = N^*$ حسب (ب) ومنه ينتج أن $B = \emptyset$. إذا لكل مجموعة جزئية غير خالية من N^* عنصر أول

(ج) \Leftrightarrow (أ) لتكن B مجموعة جزئية من N^* بحيث أن $1 \in B$ و $(n \in B \Rightarrow n+1 \in B)$ ولتكن $B' = N^* - B$ إذا إذا كانت $B' \neq \emptyset$ ، فإن B' تملك عنصر أول وليكن m . إذا $m \neq 1$ لأن $1 \in B$ وعليه فإن $m > 1$. لكن $m-1 < m$. إذا $(m-1) \notin B'$ ، وعليه فإن $m-1 \in B$ ، وبالتالي فإن $m = (m-1) + 1 \in B$. إذا $m \notin B'$ وهذا تناقض . إذا $B' = \emptyset$ وعليه فإن $B = N^*$.

□

ملاحظة :

لإثبات صحة العبارة $P(n)$ لجميع قيم $n \in N^*$ يكفي أن نبرهن على $P(1)$ عبارة صحيحة ونثبت أن صدق العبارة $P(m)$ يؤدي إلى صدق العبارة $P(m+1)$ ، لأنه إذا كانت $\{ P(n) \text{ عبارة صحيحة} \mid n \in N^* \}$ ، فإن $1 \in S$ ، كما أنه إذا كان $m \in S$ فإن $m+1 \in S$ ، وعليه فإن $S = N^*$.

مثال (1) :

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{أثبت أن}$$

أن أول من أثبت صحة تلك العلاقة هو أبو بكر الكوشي ، أما الحسن بن الهيثم والسمؤل المغربي وابن البناء المراكشي فقد أثبتوها بطرق مختلفة ، أنظر [٣] .

الإثبات :

نفرض أن $P(n) \equiv \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ إذاً عندما $n=1$ نجد أن الطرف الأيمن $= \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$ ، والطرف الأيسر $= 1^2 = 1$ أيضاً وعليه فإن $P(1)$ عبارة صادقة .

والآن أفرض أن $P(m)$ عبارة صادقة . نجد أن

$$\sum_{i=1}^m i^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$$

ولإثبات صحة العبارة $P(m+1)$ لاحظ أن

$$\sum_{i=1}^m i^2 + (m+1)^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} + (m+1)^2$$

وعليه فإن

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{m-1} i^2 &= \frac{(m+1)[m(2m+1) + 6(m+1)]}{6} = \frac{(m+1)[2m^2 + 7m + 6]}{6} \\ &= \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6} = \frac{(m+1)[(m+1)+1][2(m+1)+1]}{6} \end{aligned}$$

إذاً $P(m+1)$ عبارة صادقة ، وعليه فإن $P(n)$ عبارة صادقة لجميع قيم n الصحيحة الموجبة .

مثال (٢) :

إذا كان a, b عددين حقيقيين ، $n \in \mathbb{N}^*$ ، فأثبت أن

$$\frac{a^n - b^n}{a - b} = \sum_{i=1}^n a^{n-i} b^{i-1}$$

الإثبات :

نفرض أن $P(n) : \frac{a^n - b^n}{a - b} = \sum_{i=1}^n a^{n-i} b^{i-1}$ إذاً عندما $n=1$ نجد أن

، $L.H.S. = 1$ ، $R.H.S. = \sum_{i=1}^1 a^{1-i} b^{i-1} = 1$ ، وعليه فإن الطرفين متساويان ،

وبالتالي فإن $P(1)$ عبارة صادقة (صحيحة) .

والآن لنفرض أن $P(m)$ عبارة صادقة . إذاً $\frac{a^{m+1} - b^{m+1}}{a - b} = \sum_{i=1}^m a^{m-i} b^{i-1}$

ولإثبات صحة $P(m+1)$ ، لاحظ أن

$$\frac{a^{m+1} - b^{m+1}}{a - b} = \frac{a^{m+1} - ab^m + ab^m - b^{m+1}}{a - b} = a \left(\frac{a^m - b^m}{a - b} \right) + b^m$$

$$= a \cdot \sum_{i=1}^m a^{m-i} b^{i-1} + b^m = a \left(a^{m-1} + a^{m-2}b + \dots + ab^{m-2} + b^{m-1} \right) + b^m$$

$$= a^m + a^{m-1}b + \dots + ab^{m-1} + b^m = \sum_{i=1}^{m+1} a^{(m+1)-i} b^{i-1}$$

و عليه فإن $P(m+1)$ صادقة وبالتالي فإن $P(n)$ صادقة لكل $n \in \mathbb{N}^*$.

مثال (٣) : أثبت أن

$$a + (a+r) + (a+2r) + \dots + [a + (n-1)r] = \frac{n}{2} [2a + (n-1)r]$$

لاحظ أن الطرف الأيسر يمثل متتابعة عددية حدها الأول a وأساسها r ، وعدد

حدودها n . وأول من أثبت صحة تلك العلاقة أبا بكر فخر الدين الكرخي

المتوفي عام ٤٢١هـ .

الإثبات :

لتكن $P(n) : a + (a+r) + (a+2r) + \dots + [a + (n-1)r] = \frac{n}{2} [2a + (n-1)r]$

فإذا كان $n=1$ فإن $L.H.S. = a$ ، $R.H.S. = a$ و عليه فإن $P(1)$ صحيحة .

نفرض أن $P(m)$ صحيحة إذاً

$$a + (a+r) + (a+2r) + \dots + [a + (m-1)r] = \frac{m}{2} [2a + (m-1)r]$$

و عليه فإن

$$a + (a+r) + (a+2r) + \dots + [a + (m-1)r] + (a+mr)$$

$$= \frac{m}{2} [2a + (m-1)r] + (a+mr)$$

$$a + (a + r) + (a + 2r) + \dots + (a + mr) = (m + 1)a + \frac{[m(m - 1) + 2m] \cdot r}{2}$$

$$= (m + 1)a + \frac{m(m + 1)r}{2} = \frac{m + 1}{2}(2a + mr)$$

وعليه فإن $P(m + 1)$ صحيحة . إذاً $P(n)$ صحيحة لكل $n \in \mathbb{Z}^*$.

مثال (٤) :

إذا كان $ab = ba$ ، فإن $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ لكل $n \in \mathbb{N}^*$ ، حيث

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!} .$$

يسمى هذا القانون "مبرهنة ذي الحدين" والتي يجب

أن تنسب إلى أبي بكر الكرخي .

الإثبات :

لتكن $P(n): (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. إذاً إذا كانت $n = 1$ ، فإن

$$\text{R.H.S.} = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^{1-k} b^k = \binom{1}{0} a + \binom{1}{1} b = a + b , \text{ L.H.S.} = a + b$$

وعليه فإن $P(1)$ صحيحة . والآن لنفرض أن $P(m)$ ، إذاً

$$(a + b)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^{m-k} b^k$$

وعليه فإن

$$(a + b)^{m+1} = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^{m-k} b^k (a + b)$$

$$= \left[\binom{m}{0} a^m + \binom{m}{1} a^{m-1} b + \binom{m}{2} a^{m-2} b^2 + \dots + \binom{m}{m} b^m \right] (a + b)$$

$$= \binom{m}{0} a^{m+1} \left[\binom{m}{0} + \binom{m}{1} \right] a^m b + \dots + \left[\binom{m}{i} + \binom{m}{i-1} \right] a^{m+1-i} b^i + \dots + \binom{m}{m} b^{m+1}$$

$$\text{لكن } \binom{m+1}{k} = \binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} \text{ ، إذاً}$$

$$\begin{aligned} (a+b)^{m+1} &= \binom{m+1}{0} a^{m+1} + \dots + \binom{m+1}{i} a^{m+1-i} b^i + \dots + \binom{m+1}{m+1} b^{m+1} \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^{(m+1)-k} b^k \end{aligned}$$

إذاً $P(m+1)$ صحيحة . وعليه فإن $P(n)$ صحيحة لكل $n \in \mathbb{Z}^*$.

مثال (٥): متتابعة فيبوناشي (Fibonacci Sequence)

تتسب المتتابعة $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$ إلى الايطالي ليوناردو فيبوناشي (١١٧٠ - ١٢٥٠م) ، الذي نقل في كتابه (Liber Abaci) الأرقام العربية إلى أوروبا عام ١٢٠٢م ، ويقول البعض أن تلك المتتابعة معروفة من قبل وتعرف كالاتي :

$$f_{n+2} = f_{n+1} + f_n , f_1 = f_2 = 1 \text{ لكل } n \in \mathbb{N}^*$$

أثبت أن

$$(أ) \text{ كلاً من } f_{3n-1} , f_{3n-2} \text{ عدد فردي بينما } f_{3n} \text{ عدد زوجي لكل } n \in \mathbb{N}^*$$

$$(ب) f_{n+1}^2 - f_n f_{n+2} = (-1)^n \text{ لكل } n \in \mathbb{N}^*$$

البرهان : (بالإستقراء الرياضي على n)

$$(أ) \text{ إذا كان } n=1 \text{ ، فإن } f_{3n-2} = f_1 = 1 , f_{3n-1} = f_2 = 1 \text{ بينما}$$

$$f_{3n} = f_3 = 2 . \text{ إذاً عندما } n=1 \text{ نجد أن كلاً من } f_{3n-1} , f_{3n-2} \text{ عدد فردي}$$

بينما f_{3n} عدد زوجي .

والآن لنفرض أن العبارة صحيحة (صادقة) عندما $n=m$ ، إذاً كل من

$$f_{3m-1} , f_{3m-2} \text{ عدد فردي بينما } f_{3m} \text{ عدد زوجي . ولإثبات صحة العبارة}$$

$$\text{عندما } n=m+1 \text{ ، لاحظ أن } f_{3(m+1)-2} = f_{3m+1} = f_{3m} + f_{3m-1} \text{ حسب}$$

تعريف متتابعة فيبوناشي لكن f_{3m} عدد زوجي ، f_{3m-1} عدد فردي بالفرض ،
ومجموع عددين أحدهما فردي والآخر زوجي يكون عدداً فردياً .
إذاً f_{3m+1} عدد فردي . وحيث أن

$f_{3(m+1)-1} = f_{3m+1} = f_{3m+1} + f_{3m}$ عدد فردي ، f_{3m} عدد زوجي
إذاً f_{3m+2} عدد فردي . وحيث أن

$f_{3(m+1)} = f_{3m+3} = f_{3m+2} + f_{3m+1}$ حسب تعريف متتابعة فيبوناشي لكن
كلاً من f_{3m+1} ، f_{3m+2} عدد فردي ، كما أثبتنا ، إذاً f_{3m+3} عدد زوجي
وعليه فإن العبارة أعلاه صحيحة عندما $n = m + 1$ ، وبالتالي فإن كلاً من
 f_{3n-1} ، f_{3n-2} عدد فردي بينما f_{3n} عدد زوجي
لكل $n \in \mathbb{N}^*$.

(ب) نفرض أن $P(n) : f_{n+1}^2 - f_n f_{n+2} = (-1)^n$. إذاً عندما $n = 1$ نجد أن
 $R.H.S = (-1)^1 = -1$ ، $L.H.S = f_2^2 - f_1 f_3 = 1^2 - 1(2) = -1$
فإن الطرفين متساويان وبالتالي فإن $P(1)$ صحيحة .

والآن لنفرض أن $P(m)$ صحيحة . إذاً $f_{m+1}^2 - f_m f_{m+2} = (-1)^m$
ولإثبات صحة $P(m+1)$ ، لاحظ أن

$f_{m+2} = f_{m+1} + f_m$ ، $f_{m+3} = f_{m+2} + f_{m+1}$ حسب تعريف متتابعة
فبوناشي ، وبالتالي فإن

$$\begin{aligned} f_{m+2}^2 - f_{m+1} f_{m+3} &= f_{m+2}^2 - f_{m+1}(f_{m+2} + f_{m+1}) \\ &= f_{m+2}^2 - f_{m+1} f_{m+2} - f_{m+1}^2 \\ &= f_{m+2}(f_{m+2} - f_{m+1}) - f_{m+1}^2 = f_{m+2} f_m - f_{m+1}^2 \\ &= -(f_{m+1}^2 - f_{m+2} \cdot f_m) = -(-1)^m = (-1)^{m+1} \end{aligned}$$

إذاً $P(m+1)$ صحيحة ، وعليه فإن $P(n)$ صحيحة لكل $n \in \mathbb{N}^*$.

□

والآن إلى المبرهنة الآتية التي توضح بأنه قد يكون من المفيد أحياناً إثبات صحة

علاقة لكل $a \geq b$.

مبرهنة ١-٢-٣ : العبارتان الآتيتان متكافئتان

(أ) قاعدة الإستنتاج (الاستقراء) الرياضي .

(ب) لتكن $b \in \mathbb{Z}$ ، $S \subseteq T = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \geq b\}$ ، بحيث أن $b \in S$ وإذا كان $n \in S$ فإن $n+1 \in S$ ، فإن $S = T$.

البرهان :

(أ) \Leftrightarrow (ب)

لتكن $E = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \in E \Leftrightarrow (a-1) + b \in S\}$. إذا $1 \in E$ ، لأن $(1-1) + b = b \in S$. وحيث أن $(a-1) + b \in S \Rightarrow a \geq 1$ ، $\forall a \in E$. إذا $n+1 \in E$ ، وعليه فإن $E = \mathbb{N}^*$ حسب قاعدة الاستقراء الرياضي ، وبالتالي فإن $n \in E$ لكل $n \in \mathbb{N}^*$ ، وعليه فإن $(n-1) + b \in S$ لكل $n \in \mathbb{N}^*$ لكن أي $a \geq b$ يمكن التعبير عنه بالشكل $a = (n-1) + b$ ، إذا $T \subseteq S$ ، وعليه فإن $S = T$.

(ب) \Leftrightarrow (أ)

لتكن $E \subseteq \mathbb{N}^*$ تحقق فرضيتي الاستقراء الرياضي ، ولكي نثبت أن $E = \mathbb{N}^*$ نفرض أن S مجموعة معرفة كالآتي : $a \in S \Leftrightarrow a - b + 1 \in E$. إذا $b \in S$ ، لأن $(b-b) + 1 = 1 \in E$ ، لكن $a \geq b \Leftrightarrow a - b + 1 \in E$ ، فإذا فرضنا أن $a \in S$ ، فإن $a - b + 1 \in E$ ، وعليه فإن $a - b + 2 \in E$ وبالتالي فإن $a+1 \in S$ ، إذا $S = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \geq b\}$ حسب (ب) . لكن أي عدد صحيح موجب m يمكن التعبير عنه بالشكل $m = (r-b) + 1$ ، $r \geq b$. إذا $1 \leq m \in E$ ، وعليه فإن $E = \mathbb{N}^*$.

□

مثال (٦):

أثبت أن (أ) $2^n > n$ لكل $n \in \mathbb{N}^*$

(ب) $2^n > 5n$ لكل $n \geq 5$

الإثبات :

(أ) إذا كان $n = 1$ ، فإن $2^1 = 2 > 1$ وعليه فإن العبارة أعلاه صحيحة عندما

$n = 1$. والآن لنفرض أن العبارة صحيحة عندما $n = m$. إذاً $2^m > m$ ،

لكن $2^{m+1} > 2m$ ، $2m \geq m+1$ ، إذاً $2^{m+1} > m+1$ وعليه فإن العبارة

أعلاه صحيحة عندما $n = m+1$ ، وبالتالي فإن $2^n > n$

لكل $n \in \mathbb{N}^*$.

(ب) لتكن $P(n) : \forall n \geq 5 , 2^n > 5n$. إذاً عندما $n = 5$ ، نجد أن

$2^5 = 32 > 25$ وعليه فإن $P(5)$ عبارة صحيحة ، والآن لنفرض أن

$P(m)$ صحيحة . إذاً $2^m > 5m$ لكل $5 \leq m < k$ ، ولإثبات صحة العبارة

$P(m+1)$ ، لاحظ أن

$2^{m+1} > 10m = 5m + 5m > 5m + 5 = 5(m+1)$ ، وعليه،

فإن $P(m+1)$ عبارة صحيحة . إذاً $2^n > 5n$ لكل $n \geq 5$.

□

مثال (٧):

أثبت أن $\forall n \geq -1 , 2n^3 - 9n^2 + 13n + 25 > 0$

الإثبات :

لتكن $P(n) : \forall n \geq -1 , 2n^3 - 9n^2 + 13n + 25 > 0$. إذاً عندما $n = 1$ ،

نجد أن $2(-1)^3 - 9(-1)^2 + 13(-1) + 25 = 1 > 0$ ، وبالتالي فإن $P(1)$

صحيحة . والآن لنفرض أن $P(m)$ صحيحة . إذاً

$-1 \leq m < n , 2m^3 - 9m^2 + 13m + 25 > 0$

ولإثبات صحة $P(m+1)$ لاحظ أن

$$2(m+1)^3 - 9(m+1)^2 + 13(m+1) + 25 = (2m^3 - 9m^2 + 13m + 25) + 6(m-1)^2$$

لكون $3m^3 - 9m^2 + 13m + 25 > 0$ ، لأن $P(m)$ صحيحة ،

$$6(m-1)^2 \geq 0 \text{ ، إذا } m \in \mathbb{N}^*$$

$$P(m+1) \text{ ، وعليه فإن } 2(m+1)^3 - 9(m+1)^2 + 13(m+1) + 25 > 0$$

صحيحة وبالتالي فإن $P(n)$ صحيحة لكل $n \geq -1$ ،

□

مثال (٨) :

$$\text{إذا كان } r, n \in \mathbb{N} \text{ ، فأثبت أن } \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \in \mathbb{N} \text{ لكل } 0 \leq r \leq n$$

الإثبات :

$$\text{إذا كانت } n=0,1 \text{ ، فإن } \binom{1}{1} = 1 \in \mathbb{N} \text{ ، } \binom{1}{0} = 1 \in \mathbb{N} \text{ ، } \binom{0}{0} = 1 \in \mathbb{N}$$

وعليه فإن العلاقة أعلاه صحيحة عندما $n=0,1$. والآن لنفرض أن

$$0 \leq r \leq (m+1) \text{ ، } \binom{m+1}{r} \in \mathbb{N} \text{ ، ولكي نثبت أن } r \leq m \leq n \text{ ، } \binom{m}{r} \in \mathbb{N}$$

$$\text{لاحظ أن } \binom{m+1}{m+1} = 1 \in \mathbb{N} \text{ ، } \binom{m+1}{0} = 1 \in \mathbb{N} \text{ ، كما أن}$$

$$1 \leq r \leq m \text{ لكل } \binom{m+1}{r} = \binom{m}{r} + \binom{m}{r-1} \quad \dots (1)$$

تسمى العلاقة (1) قاعدة باسكال والتي يجب أن تسمى قاعدة الكرخي أنظر [٣]

لكن $\binom{m}{r} \in \mathbb{N}$ ، $\binom{m}{r-1} \in \mathbb{N}$ حسب فرضية الأستنتاج الرياضي . إذاً

$$0 \leq r \leq n \text{ لكل } \binom{n}{r} \in \mathbb{N} \text{ ، وعليه فإن } 1 \leq r \leq m+1 \text{ لكل } \binom{m+1}{r} \in \mathbb{N}$$

□

تمارين

(١) أثبت أن

$$\cdot n \in \mathbb{N}^* \text{ لكل } \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad (\text{أ})$$

$$\cdot n \in \mathbb{N}^* \text{ لكل } \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2 \quad (\text{ب})$$

$$\cdot n \in \mathbb{N}^* \text{ لكل } \sum_{i=1}^n (4i+1) = 2n^2 + 3n + 1 \quad (\text{ج})$$

$$\cdot n \in \mathbb{N}^* \text{ لكل } \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \quad (\text{د})$$

$$\cdot \sum_{i=1}^n a^i = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} \text{ فإن } a \neq 1 \text{ إذا كان } a \neq 1 \quad (\text{هـ})$$

$$\cdot n \in \mathbb{N}^* \text{ لكل } \sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(6n^3 + 9n^2 + n - 1)}{30} \quad (\text{و})$$

$$\cdot \sum_{i=1}^n i^5 = \frac{1}{6}n^6 + \frac{1}{2}n^5 + \frac{5}{12}n^4 - \frac{1}{12}n^2 \quad (\text{ز})$$

$$\cdot \sum_{i=1}^n (2i-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} \quad (\text{ح})$$

$$\cdot n \in \mathbb{N} \text{ لكل } \sum_{i=1}^n (2i-1)^3 = n^2(2n^2 - 1) \quad (\text{ط})$$

$$\cdot n \in \mathbb{N} \text{ لكل } \sum_{i=1}^n i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \quad (\text{ي})$$

$$\cdot n \in \mathbb{N}^* \text{ لكل } \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1} \quad (\text{ك})$$

(٢) أثبت أن

$$\sum_{r=1}^n (r^2 + 1)r! = n(n+1)! \quad (\text{ب})$$

$$\sum_{r=1}^n r(r!) = (n+1)! - 1 \quad (\text{أ})$$

$$\prod_{r=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^r}\right) = \frac{\sin x}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)} \quad (د)$$

$$\sum_{r=1}^n \frac{r}{(r+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!} \quad (ج)$$

$$n \geq 5 \quad 2^n > 6n \quad (و)$$

$$n \geq 5 \quad n^2 < 2^n < n! \quad (هـ)$$

$$n \geq 2 \quad n! < n^n \quad (ز)$$

(٣) إذا كان $-1 < x \in \mathbb{R}$ ، فأثبت أن $(1+x)^n \geq 1+nx$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

(٤) إذا كان $m \in \mathbb{N}$ ، $A \subseteq B = \{b \in \mathbb{N} \mid b \geq m\}$ ، بحيث أن $m \in A$ و $A = B$ ، فأثبت أن $(m \in A \Rightarrow n+1 \in A)$.

(٥) أثبت أن العبارتين الآتيتين متكافئتان :

(أ) قاعدة الترتيب الجيد (الحسن) . (ب) القاعدة العامة للأستقراء الرياضي.

(٦) "خاصية أرخميدس Archimedean Property"

إذا كان $a, b \in \mathbb{N}^*$ ، فبرهن على وجود $n \in \mathbb{N}^*$ بحيث أن $na \geq b$.

(٧) إذا كانت f_1, f_2, f_3, \dots متتابعة فيبوناشي فأثبت أن

$$f_{n+1} f_{n+2} - f_n f_{n+3} = (-1)^n \quad (أ)$$

$$f_n = \frac{a^n - b^n}{\sqrt{5}} \quad \text{لكل } n \in \mathbb{N}^* \text{ ، حيث } a = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ ، } b = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \quad (ب)$$

$$\sum_{i=1}^n f_i = f_{n+2} - 1 \quad (ج)$$

(٨) تسمى المتتابعة $1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, \dots$ متتابعة لوكاس

(Lucas sequence) نسبة للرياضي الفرنسي لوكاس (١٨٤٢ - ١٨٩١)

والتي تعرف كالاتي

$$L_1 = 1, L_2 = 3, L_{n+2} = L_{n+1} + L_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

(أ) كلاً من $L_{3n-2}, L_{3n-1}, L_{3n}$ عدد فردي بينما L_{3n} عدد زوجي .

$$\cdot L_{n+1}^2 - L_n L_{n+2} = 5(-1)^{n+1} \quad (\text{ب})$$

$$\cdot n \in \mathbb{N}^* \text{ لكل } L_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \quad (\text{ج})$$

(٩) أثبت أن

$$\cdot n \geq 2 \text{ لكل } \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{n+1}{2n} \quad (\text{أ})$$

(ب) $x^n - y^n$ يقبل القسمة على $(x - y)$ لجميع قيم n الزوجية .

$$\cdot \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \quad (\text{ج})$$

$$\cdot \prod_{i=1}^n a_i \cdot b_i = \prod_{i=1}^n a_i \cdot \prod_{i=1}^n b_i \quad (\text{د})$$

(١٠) إذا كان $a_i, b_i \in \mathbb{N}^*$ ، فأثبت أن

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \sum_{i=1}^n a_i \cdot \sum_{i=1}^n b_i \quad (\text{ب}) \quad \prod_{i=1}^n (a_i + b_i) \geq \prod_{i=1}^n a_i + \prod_{i=1}^n b_i \quad (\text{أ})$$

قابلية القسمة (Divisibility)

يضم هذا الفصل ثلاثة بنود ندرس فيها القسمة الخوارزمية والقاسم المشترك الأعظم ، الأعداد الأولية والمبرهنة الأساسية في الحساب وبعض تطبيقاتها .

١-٢ : القسمة الخوارزمية والقاسم المشترك الأعظم

القسمة هي إيجاد عدد نسبته إلى الواحد كنسبة المقسوم إلى المقسوم عليه ، أما القاسم المشترك الأعظم لعددتين أو أكثر فهو أكبر العوامل المشتركة بينهما ، ومن الطبيعي وجود خواص لكل منهما وهذا ما نرغب بدراسته في هذا الجزء .

تعريف ١-١-٢ :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $b \neq 0$ ، فيقال عن a أنه يقبل القسمة (divisible) على b أو أن b تقسم a (divides) إذا وجد $m \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $a = bm$.
 إذا كان a يقبل القسمة على b فيعبر عن ذلك بالشكل $b \mid a$ أو $\frac{a}{b}$ ،
 أما إذا كان a يقبل القسمة على b فيعبر عن ذلك بالشكل $b \nmid a$.

مثال (١) :

(أ) $3 \mid 6$ ، لأن $6 = 2 \times 3$ بينما $4 \nmid 6$ لعدم وجود $m \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $6 = 4m$.

(ب) $a \mid 0$ لكل $a \in \mathbb{Z}^*$ ، (ج) $\nexists a \mid a$ لكل $a \in \mathbb{Z}^*$

(د) $\nexists 1 \mid a$ لكل $a \in \mathbb{Z}$

(هـ) إذا كان $a_n = 2^{2n-1} + 3^{2n-1}$ ، فإن $5 \mid a_n$ لكل $n \in \mathbb{N}^*$ ويمكن أثبات

ذلك بالاستقراء (الاستنتاج) الرياضي ، لأنه إذا كان $n = 1$ ، فإن $a_1 = 5$

يقبل القسمة على 5 . إذا فرضنا أن $5 \mid a_m$ فإن

$$2^{2m} = 10k - 2 \times 3^{2m-1} \text{ ، وعليه فإن } \frac{a_m}{5} = \frac{2^{2m-1} + 3^{2m-1}}{5} = k$$

ولكي نثبت أن $5 \mid a_{m+1}$ ، لاحظ أن

$$\frac{a_{m+1}}{5} = \frac{2^{2m+1} + 3^{2m+1}}{5} = \frac{2(10k - 2 \times 3^{2m-1}) + 3^{2m+1}}{5} = 4k + 3^{2m-1}$$

وعليه فإن $5 \mid a_{m+1}$. إذاً $5 \mid a_n$ لكل $n \in \mathbb{N}^*$.

والآن إلى بعض خواص القسمة

مبرهنة ١-١-٢ :

إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، فإن

$$(b \mid a \wedge c \mid b) \Rightarrow c \mid a \quad (\text{ب}) \quad a = \bar{1} \Leftrightarrow a \mid \bar{1} \quad (\text{أ})$$

$$(b \mid a) \wedge c \neq 0 \Rightarrow bc \mid ac \quad (\text{د}) \quad (b \mid a) \wedge (a \mid b) \Leftrightarrow a = \bar{1}b \quad (\text{ج})$$

$$c \mid a \wedge c \mid b \Rightarrow c \mid ax + by \quad \forall x, y \in \mathbb{Z} \quad (\text{هـ})$$

البرهان :

سنثبت (أ) ، (ج) ، (هـ) ونترك الباقي للقارئ .

(أ) نفرض أن $a \mid \bar{1}$. إذاً يوجد $b \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $ab = \bar{1}$ ، وعليه فإن

$$|ab| = |a||b| = 1 \text{ . لكن كلاً من } a, b \text{ لا يساوي صفرًا . إذاً } |a| \geq 1 \text{ و}$$

$$|b| \geq 1 \text{ فإذا كانت } |a| > 1 \text{ أو } |b| > 1 \text{ ، فإن } |ab| > 1 \text{ . إذاً } |a| = |b| = 1 \text{ ومنه}$$

$$\text{ينتج أن } a = \bar{1} \text{ ، } b = \bar{1} \text{ .}$$

وإذا كان $a = \bar{1}$ فمن الواضح أن $a \mid \bar{1}$.

(ج) إذا كان $a = \bar{1}b$ فمن الواضح أن $b \mid a$ و $a \mid b$. ولإثبات العكس نفرض

أن $b \mid a$ و $a \mid b$. إذاً $a = mb$ ، $b = na$ ، حيث $m, n \in \mathbb{Z}$ ، وعليه فإن

$$a = mna \text{ ومنه ينتج أن } mn = 1 \text{ . إذاً } m = n = \bar{1} \text{ حسب (أ) ، وعليه}$$

$$\text{فإن } a = \bar{1}b \text{ .}$$

(هـ) بما أن $a \in c \setminus b$ و $c \setminus b$ بالفرض، إذاً $a = mc$ ، $b = nc$ حيث $m, n \in \mathbb{Z}$ ،
وعليه فإن $ax = mcx = (mx)c$ لكل $x \in \mathbb{Z}$ و $by = (nc)y = (ny)c$ لكل $y \in \mathbb{Z}$.
إذاً $ax + by = (mx + ny)c$ لـ $mx + ny \in \mathbb{Z}$. إذاً $c \mid ax + by$.

□

مبرهنة ٢-١-٢ : " القسمة الخوارزمية Division Algorithm "

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $b \neq 0$ فيوجد عددين صحيحين وحيدين m, r بحيث أن
 $a = mb + r$ ، $0 \leq r < |b|$.

البرهان :

(١) لتكن $b > 0$. إذاً

(أ) إذا كان $0 \leq a < |b|$ ، فإن $a = 0 \cdot b + a$.

(ب) إذا كان $a \geq b > 0$ ، فافرض أن $S = \{ a - xb \mid x \in \mathbb{Z} , a - xb \geq 0 \}$

إذاً $b \geq 1$ حسب مبرهنة (١-٢-١) ، كما أن $|a| b \geq |a|$ ، وعليه فإن

$a - (-|a|)b = a + |a|b \geq 0$ ، ومنه ينتج أن $a - xb \in S$ عندما

$x = -|a|$ ، وعليه فإن $S \neq \emptyset$. لكن S مجموعة جزئية من \mathbb{N} و \mathbb{N}

مرتبة جيداً حسب قاعدة الترتيب الجيد . إذاً S تحوي عنصر أول (أصغر)

وليكن r . إذاً يوجد $m \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $r = a - mb$ ، وعليه فإن

$a = mb + r$ ، $r \geq 0$. ولكي نثبت أن $r < b$ نفرض أن $r \geq b$. إذاً

$a - (m+1)b = (a - mb) - b = r - b \geq 0$ ، وعليه فإن $r - b \in S$.

لكن $r - b < r$ يناقض كون r عنصر أصغر في S . إذاً $r < b$ ، وعليه

فإن $a = mb + r$ ، $0 \leq r < |b|$.

(ج) إذا كان $a < 0$ فإن $-a > 0$ وعليه يوجد $n, t \in \mathbb{Z}$ بحيث أن

$-a = nb + t$ حيث $0 \leq t < b$ حسب (ب) . إذاً $a = (-n)b - t$ ،

$-b < -t \leq 0$. فإذا كان $t=0$ فإن $a = -nb$ ، أما إذا كان $b > 0$ ، $t > 0$ فإن $a = (-n-1)b + (b-t)$ وعليه فإن $a = mb + r$ حيث $0 < r = b - t < b$ ، $m = -n - 1 \in \mathbb{Z}$.

(٢) إذا كان $b < 0$ فإن $|b| = -b$ ، $-b > 0$ ، وعليه يوجد $n, r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $a = n|b| + r = -nb + r$ ، $0 \leq r < |b|$ حسب (ب) . وبوضع $m = -n$ نجد أن $a = mb + r$ حيث $0 \leq r < |b|$.

ولإثبات وحدانية m, r ، لاحظ أنه إذا كان $a = mb + r = m_1b + r_1$ ، $0 \leq r < |b|$ ، $0 \leq r_1 < |b|$ فإن $r_1 - r = b(m - m_1)$ ، وعليه فإن $|r_1 - r| = |b| |m - m_1|$ ولكن $|r_1 - r| < |b|$. إذاً $0 \leq |m - m_1| < 1$ ، وعليه فإن $|m - m_1| = 0$ حسب مبرهنة (١-٢-١) . إذاً $m = m_1$ حسب مبرهنة (١-٢-١) ، وعليه فإن $r = r_1$.

□

مثال (٢) :

(أ) إذا كان $a = 57$ ، $b = 5$ ، فإن $a = 11b + 2$ ، $0 < 2 < 5$.

(ب) إذا كان $a = 81$ ، $b = -14$ ، فإن $a = -5b + 11$ ، $0 < 11 < |b|$.

(ج) إذا كان $a = -273$ ، $b = 17$ ، فإن $a = -17b + 16$ ، $0 < 16 < 17$.

(د) إذا كان $a = 24$ ، $b = 6$ ، فإن $a = 4b + 0$.

والآن إلى بعض تطبيقات القسمة الخوارزمية .

مبرهنة ٣-١-٢ :

(أ) إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ ، فإما $a^2 = 4m$ أو $a^2 = 4m + 1$ ، $m \in \mathbb{Z}$.

(ب) إذا كان a عدداً صحيحاً فردياً ، فإن $a = 4m + 1$ أو $a = 4m + 3$ حيث

$m \in \mathbb{Z}$ ، وأن $a^2 = 8n + 1$ ، $n \in \mathbb{Z}$.

(ج) $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in \mathbb{Z}$ لكل $n \in \mathbb{Z}$.

(أ) بقسمة a على 2 ، نجد أن $a = 2n + r$ ، $0 \leq r < 2$ ، وعليه
 فإن $r = 0, 1$. فإذا كان $r = 0$ ، فإن $a = 2n$ ، وعليه فإن
 $a^2 = 4n^2 = 4m$ ، حيث $m = n^2$. أما إذا كان $r = 1$ ، فإن $a = 2n + 1$
 وعليه فإن $a = 4(n^2 + n) + 1$ ، وعندما $m = n^2 + n$ ، نجد أن
 $a^2 = 4m + 1$.

(ب) بما أن $a = 4m + r$ ، $0 \leq r < 4$ ، حسب مبرهنة القسمة الخوارزمية ، إذاً
 $r = 0, 1, 2, 3$ وعليه فإن $a = 4m$ أو $a = 4m + 1$ ، أو $a = 4m + 2$ أو
 $a = 4m + 3$. لكن a عدد فردي بالفرض . إذاً $a = 4m + 1$ أو
 $a = 4m + 3$. فإذا كان $a = 4m + 1$ ، فإن
 $a^2 = 16m^2 + 8m + 1 = 8(2m^2 + 1) + 1$ وبوضع $n = 2m^2 + 1$ ، نجد
 أن $a^2 = 8n + 1$. أما إذا كان $a = 4m + 3$ ، فإن
 $a^2 = 8(2m^2 + 3m + 1) + 1$ ، وبوضع $n = 2m^2 + 3m + 1$ نجد أن
 $a^2 = 8m + 1$.

(ج) بقسمة n على 6 نجد أن $n = 6m + r$ ، $0 \leq r < 6$ ، $m \in \mathbb{Z}$ ، وعليه فإن
 $r = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. فإذا كان $r = 0$ ، فإن $n = 6m$ ، وعليه فإن

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = m(6m+1)(12m+3) \in \mathbb{Z}$$

وإذا كان $r = 1$ ، فإن $n = 6m + 1$ ، وعليه فإن

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = (6m+1)(3m+1)(4m+1) \in \mathbb{Z}$$

أما إذا كان $r = 2$ ، فإن $n = 6m + 2$ ، وعليه فإن

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = (3m+1)(2m+1)(12m+5) \in \mathbb{Z}$$

وإذا كان $r = 3$ ، فإن $n = 6m + 3$ ، وعليه فإن

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = (2m+1)(3m+2)(12m+7) \in \mathbb{Z}$$

وإذا كان $r = 4$ ، فإن $n = 6m + 4$ ، وعليه فإن

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6} = (3m+2)(6m+5)(4m+3) \in \mathbb{Z}$$

وإذا كان $r = 5$ ، فإن $n = 6m + 5$ ، وعليه فإن

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = (m+1)(6m+5)(12m+11) \in \mathbb{Z}$$

$$\text{إذاً } \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in \mathbb{Z} \text{ لكل } n \in \mathbb{Z}$$

□

وقبل تقديم تطبيق آخر للقسمة الخوارزمية ، نورد ما يلي :

تعريف ٢-١-٢ :

لتكن $0 < a \in \mathbb{Z}$ ، $b \geq 2$. يقال عن $(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b$ أنه تمثيل

للعدد a بالنسبة للأساس b ، ونكتب $a = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b$ إذا وجد $n \geq 0$ ،

حيث $a = \sum_{i=0}^n a_i b^i$ ، $a_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$ ، $i = 0, 1, \dots, n$. تسمى a_i

أرقام (digits) العدد a ، وإذا كان $b = 2$ ، يسمى التمثيل

التمثيل الثنائي (Binary Representation) والذي يستخدم في الحاسبات

ويكون $a_i \in \{0, 1\}$.

وإذا كان $b = 3$ يسمى التمثيل الثلاثي (Ternary Representation)

وتكون $a_i \in \{0, 1, 2\}$.

وإذا كان $b = 8$ يسمى التمثيل الثماني (Octal Representation)

وتكون $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

وإذا كان $b = 10$ يسمى التمثيل العشري (Decimal Representation)

وتكون $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

قابلية القسمة

وإذا كان $b=16$ يسمى التمثيل : التمثيل الستة عشري (Hexadecimal Representation) والذي يستخدم في علوم الحاسب وتكون $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 15\}$ ، وتُستبدل الأعداد 10,11,12,13,14,15 بالحروف A,B,C,D,E,F على التوالي .

وإذا كان $b=60$ يسمى التمثيل التمثيل الستيني الذي استخدمه البابليون وتكون $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 59\}$.

مثال (٣) :

$$47 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^2 + 1 \quad \text{لأن } 47 = (101111)_2 \quad (\text{أ})$$

$$167 = 3 \times 7^2 + 2 \times 7 + 6 \quad \text{لأن } 167 = (326)_7 \quad (\text{ب})$$

$$1547 = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 4 \times 10 + 7 \quad \text{لأن } 1547 = (1547)_{10} \quad (\text{ج})$$

والآن إلى المبرهنة الآتية التي تثبت أن أي عدد صحيح أكبر من الواحد يمكن أن يكون أساساً لنظام عددي .

مبرهنة ٢-١-٤ :

إذا كان a عدداً صحيحاً موجباً ، وكان $1 < b \in \mathbb{Z}$ فيمكن التعبير عن a بطريقة وحيدة على الشكل $a = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0$ ، حيث $a_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$ ، $a_n > 0$.

البرهان :

باستخدام القسمة الخوارزمية m من المرات نجد أن

$$a = r_0 b + a_0 \quad , \quad 0 \leq a_0 < b \quad \dots (1)$$

$$r_0 = r_1 b + a_1 \quad , \quad 0 \leq a_1 < b \quad \dots (2)$$

$$r_1 = r_2 b + a_2 \quad , \quad 0 \leq a_2 < b \quad \dots (3)$$

.....

.....

.....

$$r_{m-1} = r_m b + a_m \quad , \quad 0 \leq a_m < b \quad \dots (m)$$

وإذا كان $r_m > 0$ ، فإن $a > r_0 > r_1 > \dots > r_m$ وهذه المتوالية تناقصية ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية . إذاً يوجد n بحيث أن $r_n = 0$ وبالتالي فإن $r_{n-1} = b \cdot 0 + a_n$.

سنثبت أن $a = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b$ ، لإثبات ذلك لاحظ أن من (1) ، (2) ينتج أن

$$a = b(r_1 b + a_1) + a_0 = r_1 b^2 + b a_1 + a_0 \quad \dots (*)$$

ومن (*) ، (3) نجد أن

$$a = r_2 b^3 + a_2 b^2 + a_1 b + a_0$$

وبنفس الطريقة يمكن أن نثبت أن

$$a = r_n b^{n+1} + a_n b^n + \dots + a_2 b^2 + a_1 b + a_0$$

لكن $r_n = 0$. إذاً

$$a = a_n b^n + \dots + a_2 b^2 + a_1 b + a_0 = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0) \quad \dots (I)$$

ولإثبات وحدانية ذلك التعبير ، نفرض أن

$$0 \leq c_i \leq b-1 \quad , \quad a = c_m b^m + c_{m-1} b^{m-1} + \dots + c_1 b + c_0 \quad \dots (II)$$

فإذا كان $n \geq m$ ، يمكننا إضافة معاملات صفرية في التعبير (II) ليكون

$n = m$ ، ثم نطرح (II) من (I) فنجد أن

$$(a_n - c_n) b^n + (a_{n-1} - c_{n-1}) b^{n-1} + \dots + (a_1 - c_1) b + (a_0 - c_0) = 0 \quad \dots (III)$$

وإذا فرضنا أن (II) ، (I) مختلفتان ، فإن ذلك يعني وجود i بحيث أن

$a_i - c_i \neq 0$ ، وبالتالي فإن

$$(a_n - c_n) b^n + (a_{n-1} - c_{n-1}) b^{n-1} + \dots + (a_{i+1} - c_{i+1}) b^{i+1} = (c_i - a_i) b^i$$

ومنها نجد أن $b \mid (c_i - a_i)$ ، وعليه فإن $b \mid |a_i - c_i|$ ، وبالتالي فإن

$$|a_i - c_i| \geq b \quad \dots (IV)$$

لكن $0 \leq c_i \leq b-1$ ، $0 \leq a_i \leq b-1$ ، إذاً $|a_i - c_i| < b$ وهذا

□

يناقض (IV) ، وعليه فإن ذلك التعبير وجيد .

مثال (٤) :

عبر عن العدد 41 بدلالة الأساس $b = 2$.

الحل :

$$\begin{aligned} \text{بمـا أن } 10 &= 5(2) + 0, \quad 20 = 10(2) + 0, \quad 41 = 2(20) + 1 \\ \text{إذاً } 1 &= 0(2) + 1, \quad 2 = 1(2) + 0, \quad 5 = 2(2) + 1 \\ 41 &= 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2 + 1 = (101001)_2 \end{aligned}$$

مثال (٥) :

عبر عن العدد 21483 بدلالة الأساس $b = 8$.

الحل :

$$\begin{aligned} \text{بما أن } 335 &= 41 \times 8 + 7, \quad 2685 = 335 \times 8 + 5, \quad 21483 = 2685 \times 8 + 3 \\ \text{إذاً } 5 &= 0 \times 8 + 5, \quad 41 = 5 \times 8 + 1 \\ 21483 &= 5 \times 8^4 + 1 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 5 \times 8 + 3 = (51753)_8 \end{aligned}$$

مثال (٦) :

عبر عن العدد 31827 بدلالة الأساس $b = 16$.

الحل :

$$\begin{aligned} 124 &= 7 \times 16 + 12, \quad 1989 = 124 \times 16 + 5, \quad 31827 = 1989 \times 16 + 3 \\ \text{إذاً } 7 &= 0 \times 16 + 7 \\ 31827 &= 7 \times (16)^3 + 12 \times (16)^2 + 5 \times (16) + 3 \times (16)^0 = (7C53)_{16} \end{aligned}$$

والآن إلى تعريف القاسم المشترك الأعظم لعددتين صحيحين أو أكثر ودراسة خواصه واستخدام القسمة الخوارزمية لإيجاده .

تعريف ٢-١-٣ :

(أ) إذا كان واحد على الأقل من العددين الصحيحين a, b لا يساوي صفراً ، فيقال عن $d \in \mathbb{N}^*$ أنه قاسم مشترك أعظم (greatest common divisor) أو عامل مشترك أعلى (highest common multiple) لهما إذا كان $d \mid a$ و $d \mid b$ (١)

(٢) إذا كان $c \in \mathbb{N}^*$ وكان $c \mid a$ و $c \mid b$ ، فإن $c \mid d$.
 إذا كان d قاسماً مشتركاً أعظماً لعددين a, b ، فقد يعبر عن ذلك بالشكل
 $d = g \cdot c \cdot d(a, b)$ أو $d = h \cdot c \cdot m(a, b)$ أو $d = (a, b)$.

(ب) إذا كانت a_1, a_2, \dots, a_n أعداداً صحيحة ليست كلها أصفاراً ، فيقال عن
 $d = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^*$ أنه قاسم مشترك أعظم للأعداد $a_i \in \mathbb{Z}^*$ إذا كان

$$(١) \quad d \mid a_i \quad \text{لكل } i = 1, \dots, n .$$

(٢) إذا كان $c \in \mathbb{N}^*$ وكان $c \mid a_i$ لكل i ، فإن $c \mid d$.

مثال (٧) :

$$(١) \quad (12, 18) = (-12, 18) = (12, -18) = (-12, -18) = 6$$

$$(ب) \quad (12, 14, 91) = 7$$

والآن إلى المبرهنة الآتية التي تضمن وجود القاسم المشترك الأعظم وتعبر عنه
 كتركيبية خطية بدالتهما .

مبرهنة ٢-١-٥ :

(أ) إذا كان واحد على الأقل من العددين $a, b \in \mathbb{Z}$ لا يساوي صفراً ، فيوجد
 لهما قاسم مشترك أعظم وحيد d ، كما يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن
 $d = am + bn$.

(ب) إذا كان كل من a, b عدد صحيح غير صفري ، وكان $a = bm + r$ ،
 $0 \leq r < m$ ، فإن $(a, b) = (b, r)$.

البرهان :

(أ) لتكن $S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$. إذاً إذا كان $b = 0$ فإن
 $0 < ax + by = |a| \in S$ عندما $x = 1$ ، $a > 0$ ، أو $x = -1$ ، $a < 0$.
 وإذا كان $a = 0$ فإن $0 < ax + by = |b| \in S$ عندما $y = 1$ ، $b > 0$ ،
 أو $y = -1$ ، $b < 0$ ، وإذا كان $a \neq 0$ ، $b \neq 0$ ، فإن $0 < a^2 + b^2 \in S$
 عندما $x = a$ ، $y = b$ ، إذاً S مجموعة جزئية غير خالية من \mathbb{N} .

وبالتالي فإن S تحوي عنصر أول (أصغر) وليكن d ، إذا يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = am + bn$.

ولكي نثبت أن $d = g.c.d(a, b)$ ، لاحظ أنه باستخدام القسمة الخوارزمية يمكننا إيجاد $r, t \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $a = dt + r$ ، $0 \leq r < |b|$. إذا $r = a - dt$ ، لكن $d = am + bn$. إذا $r = a(1 - mt) + b(-nt)$ ، وعليه فإن $r \in S$ ، $r < d$ وهذا يناقض كون d عنصر أول في S . إذا $r = 0$ ، وعليه فإن $d \mid a$. وبنفس الطريقة يمكن أن نبرهن على أن $d \mid b$. إذا d قاسم مشترك للعديدين a, b ، وإذا كان $c \in \mathbb{Z}^+$ ، $c \mid a$ ، $c \mid b$ فإن $d \mid (am + bn)$ حسب مبرهنة (٢-١-١هـ) ، وعليه فإن $d \mid c$. إذا d قاسم مشترك أعظم للعديدين a, b . ولإثبات وحدانية d ، نفرض أن $e \in \mathbb{Z}^+$ قاسم مشترك أعظم آخر للعديدين a, b . إذا $d \mid e$ و $e \mid d$ وعليه فإن $e = d$.

(ب) نفرض أن $d = (a, b)$. إذا $d \mid a$ ، $d \mid b$ ، وعليه فإن $d \mid a - mb$ وهذا يعني أن $d \mid r$ ، وبالتالي فإن d قاسم مشترك لكل من r, b . والآن ليكن $c \in \mathbb{N}^*$ و $c \mid r$ ، $c \mid b$. إذا $c \mid bm + r$ ، وعليه فإن $c \mid a$ ، وبالتالي فإن c قاسم مشترك للعديدين a, b . إذا $d \mid c$ ، وعليه فإن $d = (b, r)$.

□

نتيجة : إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، $c > 0$ ، فإن $(ac, bc) = c(a, b)$.

البرهان :

ليكن $d = (a, b)$. إذا يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = am + bn$ حسب مبرهنة (٢-١-٥) . لكن $d \mid a$ و $d \mid b$ ، إذا $d \mid ac$ ، $d \mid bc$ ، وعليه فإن dc قاسم مشترك للعديدين ac, bc . والآن لنفرض أن $e \mid ac$ ، $e \mid bc$. إذا $e \mid acx + bcy$ لكل $x, y \in \mathbb{Z}$ حسب مبرهنة (٢-١-١هـ) ، وعليه فإن $e \mid acm + bcn$ وهذا يعني أن $e \mid (am + bn)c$ ، وعليه فإن $e \mid dc$. إذا $(ac, bc) = dc = c(a, b)$.

ملاحظة :

إذا كان $d = (a, b) = am + bn$ ، فإن m, n ليسا وحيدتين كما يوضح ذلك المثال الآتي .

ليكن $a = 18$ ، $b = 27$. إذاً

$$9 = (18, 27) = (-1)(18) + 27 = 2(18) + 27(-1)$$

وعلى الرغم من كون مبرهنة (٢-١-٥) تضمن وجود القاسم المشترك الأعظم لأي عددين صحيحين غير صفريين ، فإنها لا تعطي طريقة لإيجاده ، لذا سنورد المبرهنة الآتية (الطريقة الخوارزمية) التي تضمن وجود القاسم المشترك الأعظم وكيفية إيجاده وإيجاد m, n أيضاً .

مبرهنة ٢-١-٦ :

إذا كان a, b عددين صحيحين غير صفريين واستخدمنا القسمة الخوارزمية المتتالية الآتية :

$$a = bm_1 + r_1 \quad , \quad 0 < r_1 < |b|$$

$$b = r_1m_2 + r_2 \quad , \quad 0 < r_1 < r_1$$

$$r_1 = r_2m_3 + r_3 \quad , \quad 0 < r_2 < r_1$$

$$r_2 = r_3m_4 + r_4 \quad , \quad 0 < r_4 < r_3$$

.....

.....

$$r_{i-2} = r_{i-1}m_i + r_i \quad , \quad 0 < r_i < r_{i-1}$$

$$r_{i-1} = r_i m_{i+1} + 0$$

فإن $r_i = \text{g.c.d}(a, b)$. كما أنه يمكن استخدام نفس المعادلات ابتداءً من الأخيرة إلى الأولى لإيجاد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث $r_i = am + bn$.

البرهان :

بما أن $|b| > r_1 > r_2 > \dots$. إذاً عدد البواقي لا يمكن أن يزيد عن $(|m| - 1)$ ، وعليه يوجد $i \in \mathbb{N}$ بحيث أن $r_{i+1} = 0$. ولكي نثبت أن $r_i = \text{g.c.d}(a, b)$.

لاحظ أن $r_{i-1} = r_i m_{i+1}$ يعني أن $r_i \mid r_{i-1}$. لكن $r_i = r_{i-1} m_i + r_i$. إذاً $r_{i-2} = r_{i-1} m_i + r_i$.
 وحيث أن $r_{i-3} = r_{i-2} m_{i-1} + r_{i-1}$. إذاً $r_i \mid r_{i-3}$ ، وعليه يمكن الإستمرار بنفس الأسلوب لنثبت أن $r_i \mid a$ و $r_i \mid b$. إذاً r_i قاسم مشترك للعددين a, b . وإذا كان $c \in \mathbb{Z}^+$ و $c \mid a$ ، $c \mid b$ فمن المعادلة $a = b m_1 + r_i$ نجد أن $c \mid r_i$. ومن المعادلة $b = r_1 m_2 + r_2$ نجد أن $c \mid r_2$ وهكذا يمكن استخدام جميع المعادلات الواحدة بعد الأخرى ونصل إلى أن $c \mid r_i$. إذاً $r_i = \text{g.c.d}(a, b)$.

ولإيجاد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $r_i = am + bn$ استخدم المعادلات الواردة في المبرهنة من الأسفل إلى الأعلى تجد أن

$$\begin{aligned} r_i &= r_{i-2} - r_{i-1} m_i = r_{i-2} - (r_{i-3} - r_{i-2} m_{i-1}) m_i \\ &= -r_{i-3} m_i + r_{i-2} (1 + m_{i-1} m_i) = \dots = am + bn \end{aligned}$$

□

مثال (٨) :

(أ) أوجد القاسم المشترك الأعظم للعددين 252 ، 90 ثم أوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = 252m + 90n$.

لإيجاد d لاحظ أن $252 = 2(90) + 72$ ، $90 = 1(72) + 18$ ، $72 = 4(18)$. إذاً $d = 18$. ولإيجاد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = 252m + 90n$ لاحظ أن $72 = 90 - d$. إذاً

$$\begin{aligned} 252 = 2(90) + 90 - d \Rightarrow d = 252(-1) + 90(3) \\ \therefore n = 3 , m = -1 \end{aligned}$$

(ب) أوجد القاسم المشترك الأعظم للعددين 2746 ، 335 ثم عبر عنه بالشكل $2746m + 335n$.

لإيجاد القاسم المشترك الأعظم لاحظ أن $2746 = 8(335) + 66$ ، $335 = 5(66) + 5$ ، $66 = 13(5) + 1$ ، $5 = 5 \times 1$.

$$\begin{aligned} \text{إذا } d=1 \text{ . ولإيجاد } m, n \text{ لاحظ أن} \\ 1 = 66 - 5(13) = 66 - 13[335 - 5(66)] = -13 \times 335 + 66 \times 66 \\ = -13 \times 335 + 66(2746 - 8 \times 335) = 2746 \times 66 + 335(-541) \\ \text{إذا } n = -541 \text{ ، } m = 66 \end{aligned}$$

ملاحظة :

يمكن حساب القاسم المشترك الأعظم d للعددين a, b وإيجاد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث
أن $d = am + bn$ باستخدام طريقة بلانكنشيب (Blankinship) .
American Mathematical Monthly (1963) وهي :

نفرض أن $a > b > 0$ ، وأن $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ونضيف (بالتعاقب)

مضاعفات أحد الصفوف إلى الصف الآخر "يسمى مثل تلك العمليات -عمليات
صفوف أوليه $\alpha r_i + r_j$ " إلى أن نصل إلى مصفوفة بالشكل

$$d = (a, b) = am + bn \text{ فيكون } \begin{pmatrix} d & m & n \\ 0 & x & y \end{pmatrix} \text{ أو } \begin{pmatrix} 0 & x & y \\ d & m & n \end{pmatrix}$$

ونوضح هذه الطريقة بالأمثلة الآتية :

مثال (٩) :

أوجد $d = (a, b)$ ثم أوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = am + bn$ عندما
(أ) $a = 39$ ، $b = 18$ ، (ب) $a = 1976$ ، $b = 365$.

الحل :

(أ) بما أن $A = \begin{pmatrix} 39 & 1 & 0 \\ 18 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ، وبما أن $39 = 2(18) + 3$ إذا نضرب الصف

الثاني r_2 في (-2) ونجمعه مع الصف الأول r_1 فنجد أن

$$A = \begin{pmatrix} 39 & 1 & 0 \\ 18 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2r_2 + r_1} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 18 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

لكن $18 = 6(3)$. إذاً نضرب الصف الأول في (-6) ونجمعه مع الصف الثاني فنجد أن

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 18 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-6r_1+r_2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & -6 & 13 \end{pmatrix}$$

إذاً $d = 3 = 39(1) + 18(-2)$.

(ب) $A = \begin{pmatrix} 1976 & 1 & 0 \\ 365 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ، $1976 = 365(5) + 151$. إذاً

لكن $365 = 2(151) + 63$ ، إذاً $A \xrightarrow{-5r_2+r_1} \begin{pmatrix} 151 & 1 & -5 \\ 365 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 151 & 1 & -5 \\ 365 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2r_1+r_2} \begin{pmatrix} 151 & 1 & -5 \\ 63 & -2 & 11 \end{pmatrix}$$

وحيث أن $151 = 2(63) + 25$ ، إذاً

$$\begin{pmatrix} 151 & 1 & -5 \\ 63 & -2 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2r_2+r_1} \begin{pmatrix} 25 & 5 & -27 \\ 63 & -2 & 11 \end{pmatrix}$$

وبما أن $63 = 2(25) + 13$ ، إذاً

$$\begin{pmatrix} 25 & 5 & -27 \\ 63 & -2 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2r_1+r_2} \begin{pmatrix} 25 & 5 & -27 \\ 13 & -12 & 65 \end{pmatrix}$$

وحيث أن $25 = 13(1) + 12$ ، إذاً

$$\begin{pmatrix} 25 & 5 & -27 \\ 13 & -12 & 65 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_1} \begin{pmatrix} 12 & 17 & -92 \\ 13 & -12 & 65 \end{pmatrix}$$

لكن $13 = 12(1) + 1$ ، إذاً

$$\begin{pmatrix} 12 & 17 & -92 \\ 13 & -12 & 65 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_1+r_2} \begin{pmatrix} 12 & 17 & -92 \\ 1 & -29 & 157 \end{pmatrix}$$

وحيث أن $12 = 12 \cdot 1$ ، إذاً

$$\begin{pmatrix} 12 & 17 & -92 \\ 1 & -29 & 157 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_1} \begin{pmatrix} 0 & 46 & -249 \\ 1 & -29 & 157 \end{pmatrix}$$

وعليه فإن $d = (1976, 365) = 1 = 1976(-29) + 365(157)$

والآن إلى المبرهنة الآتية التي توضح كيفية إيجاد القاسم المشترك الأعظم لأكثر من عددين صحيحين .

مبرهنة ٧-١-٢ :

إذا كان a_1, a_2, \dots, a_n أعداد صحيحة غير صفرية ، $n \geq 3$ فإن :

$$d = \text{g.c.d}(a_1, \dots, a_n) = \text{g.c.d}(\text{g.c.d}(a_1, \dots, a_n), a_n) \quad (أ)$$

$$(ب) \text{ يوجد } r_i \in \mathbb{Z} \text{ بحيث أن } d = \sum_{i=1}^n a_i r_i$$

البرهان :

(أ) نفرض أن $c = \text{g.c.d}(a_1, \dots, a_{n-1})$ ، $d = \text{g.c.d}(a_1, \dots, a_n)$

$e = \text{g.c.d}(c, a_n)$. إذاً $d \mid a_i$ لكل $i = 1, \dots, n$ ، وعليه فإن $d \mid c$ ومنه

ينتج أن $d \mid e$. وحيث أن $e \mid c$ ، $e \mid a_n$ ، إذاً $e \mid a_i$ لكل $i = 1, \dots, n$ ،

وعليه فإن $e \mid d$. لكن $e, d \in \mathbb{Z}^+$. إذاً $e = d$.

(ب) أستخدم الاستقراء الرياضي على $n \geq 3$ والمبرهنة (٥-١-٢) تحصل على المطلوب .

□

مثال (١٠) :

أوجد القاسم المشترك الأعظم d للأعداد 30, 21, 66 ثم أوجد $m, n, r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = 30m + 21n + 66r$.

الحل :

بما أن $d = (30, 21, 66) = ((30, 21), 66)$ ، $g = (30, 21) = 3$. إذاً

$d = (3, 66) = 3 = (-21)3 + (1)(66)$. لكن $g = -2(30) + 3(21)$. إذاً

$$d = (-21)[(-2)(30) + 3(21)] + 66(1) = 42(30) + (-66)(21) + 66(1)$$

مثال (١١) :

أوجد $d = (570, 810, 465, 175)$ ثم أوجد m, n, r, s بحيث أن

$$d = 570m + 810n + 495r + 175s$$

الحل :

بالقسمة الخوارزمية نوجد $d_1 = (570, 810)$ ، فنجد أن

$$240 = 2(90) + 60 , 570 = 2(240) + 90 , 810 = 1(570) + 240$$

$$60 = 2(30) , 90 = 1(60) + 30$$

$$d_1 = 30 = 90 - 60 = 90 - [240 - 2(90)] = 3(90) - 240$$

$$= 3[570 - 2(240)] - 240 = 3(570) - 7(240)$$

$$= 3(570) - 7(810 - 570) = 10(570) + (-7)(810)$$

والآن نحسب $d_2 = (d_1, 495) = (30, 495)$ ، فنجد أن $495 = 16(30) + 15$ ،

$$30 = 2(15) , \text{ و عليه فإن}$$

$$d_2 = 15 = 495 - 16d_1 = 495 - 16[10(570) + (-7)(810)]$$

$$= 495 + (-160)(570) + 112(810)$$

لكن $d = (d_2, 175)$ ، إذاً

$$d = (15, 175) = 5 = 12(15) + (-1)(175) = 12d_2 + (-1)(175)$$

$$= 12[495 + (-160)(570) + 112(810)] + (-1)(175)$$

$$= 570(-1920) + 1344(810) + 12(495) + (-1)(175)$$

□

ولدراسة خواص أخرى للقاسم المشترك الأعظم نورد ما يلي :

تعريف ٢-١-٤ :

يقال عن عددين صحيحين غير صفريين أنهما أوليان نسبياً

(relatively prime) إذا كان قاسمهما المشترك الأعظم يساوي واحد .

مثال (١٢) :

(أ) 5, 2 أوليان نسبياً ، لأن $(2, 5) = 1$.

(ب) 6, 11 أوليان نسبياً ، لأن $(11, 6) = 1$.

(ج) 8, 15 أوليان نسبياً ، لأن $(8, 15) = 1$.

(د) 335, 2746 أوليان نسبياً ، لأن $(335, 2746) = 1$ كما أثبتنا في مثال ٨ ب .

مبرهنة ٢-١-٨ :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}^*$ فإن a, b أوليان نسبياً إذا وإذا فقط وجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $am + bn = 1$.

البرهان :

نفرض أن a, b أوليان نسبياً . إذاً $(a, b) = 1$ ، وعليه يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $am + bn = 1$ حسب مبرهنة (٢-١-٥) .
ولإثبات العكس نفرض وجود $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $am + bn = 1$ ولنفرض $d = (a, b)$. إذاً $d \mid a$ و $d \mid b$. لكن $d \mid am + bn = 1$.
(٢-١-١٥) . إذاً $d \mid 1$ ، لكن $d \in \mathbb{N}^*$. إذاً $d = 1$ ، وعليه فإن a, b أوليان نسبياً .

□

نتيجة (١) :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ و $d = (a, b)$ ، فإن $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$

البرهان :

بما أن $d = (a, b)$. إذاً يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = am + bn$ حسب مبرهنة (٢-١-٥) ، وعليه فإن $1 = \frac{a}{d}m + \frac{b}{d}n$ ، وبالتالي فإن $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$ حسب مبرهنة (٢-١-٨) .

□

نتيجة (٢) :

إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ وكان $b \mid a$ ، $c \mid a$ ، و $(b, c) = 1$ ، فإن $bc \mid a$.

البرهان :

بما أن $b \mid a$ و $c \mid a$. إذاً يوجد $r, s \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $a = br = cs$. لكن $(b, c) = 1$. إذاً يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $bm + cn = 1$ حسب مبرهنة (٢-١-٥) ، عليه فإن $a = a bm + a cn = bcs m + bcr n = bc(sm + rn)$ ، وبالتالي فإن $bc \mid a$.

مبرهنة ٢-١-٩ : لتكن $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

(أ) إذا كان $(a, b) = 1$ و $(a, c) = 1$ ، فإن $(a, bc) = 1$.

(ب) إذا كان $c \nmid ab$ ، وكان $(b, c) = 1$ فإن $c \nmid a$.

البرهان :

(أ) بما أن $(a, b) = 1$ ، $(a, c) = 1$ بالفرض . إذاً يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن

$am + bn = 1$ ، ويوجد $r, s \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $ar + cs = 1$ حسب مبرهنة

(٢-١-١٥) ، وعليه فإن $am + bn(ar + cs) = 1$ ، ومنه ينتج أن

$a(m + bnr) + bc(ns) = 1$ ، وعليه فإن $(a, bc) = 1$ حسب مبرهنة (٢-١-٨)

(ب) بما أن $(b, c) = 1$ بالفرض . إذاً يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $bm + cn = 1$

حسب مبرهنة (٢-١-١٥) ، وعليه فإن $abm + acn = a$. لكن $c \nmid ab$

بالفرض و $c \nmid ac$. إذاً $c \nmid abm + acn$ حسب مبرهنة (٢-١-١٥) ،

وعليه فإن $c \nmid a$.

تمارين

(١) إذا كان $n \in \mathbb{N}^*$ ، فأثبت أن :

(أ) $5^n - 2^n$ يقبل القسمة على 3 .

(ب) $(7^n - 5^n)$ عدد زوجي .

(ج) $3^{2n-1} + 4^{2n-1}$ يقبل القسمة على 7 .

(د) $2^{2n} - 1$ يقبل القسمة على 3 .

(هـ) $(5^{2n} - 1)$ يقبل القسمة على 24 .

(و) $2^{3n} - 1$ يقبل القسمة على 7 .

(ز) $3^{2n} + 7$ يقبل القسمة على 8 .

(ح) $2^n + (-1)^{n+1}$ يقبل القسمة على 3 .

(ط) $10^{n+1} - 9n - 10$ يقبل القسمة على 81 .

(٢) أثبت باستخدام القسمة الخوارزمية أن :

- (أ) كل عدد صحيح فردي يكون على الشكل $4m+3$ ، $4m+1$ ، $m \in \mathbb{Z}$.
 (ب) يمكن التعبير عن مربع أي عدد صحيح بالشكل $3m$ أو $3m+1$ ،
 $m \in \mathbb{Z}$.
 (ج) يمكن التعبير عن مكعب أي عدد صحيح بالشكل $9m$ أو $9m+1$ أو
 $m \in \mathbb{Z}$ ، $9m+8$.

(٣) أثبت أن $\forall n \in \mathbb{Z}$ ، $a_n \in \mathbb{Z}$ عندما :

$$(أ) \quad a_n = \frac{n(n+1)}{2} \quad ، \quad (ب) \quad a_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$(ج) \quad a_n = \frac{n^3 + 5n}{6}$$

(٤) إذا كان n عدداً فردياً ، فأثبت أن $n^2 - 1$ يقبل القسمة على 8 .

(٥) أثبت أن أي عدد في حدود المتتابعة $11, 111, 1111, \dots$ لا يمكن أن يكون مربعاً كلياً . " لاحظ أن أي حد من حدود المتتابعة يمكن كتابته بالشكل
 $4m+3$ "

(٦) إذا كان a, b عددين صحيحين فرديين فأثبت $a^2 + b^2$ عدد زوجي لا يقبل القسمة على 4 .

(٧) عبر عن كل من الأعداد 179 ، 527 ، 13429 ، 31535 بدلالة الأساس
 $b=2$ ، $b=7$ ، $b=8$ ، $b=12$ ، $b=16$.

(٨) لتكن $(a_2 b) = 1$ ، $a, b, c \in \mathbb{Z}$. فأثبت أن .

(أ) إذا كان $c \setminus a$ ، فإن $(b, c) = 1$.

(ب) $(ac, b) = (c, b)$.

(ج) $(a+b, a-b) = 1$ أو $(a+b, a-b) = 2$.

" ملاحظة : أفرض أن $d = (a+b, a-b)$ ثم أثبت أن $d \setminus 2a$ و $d \setminus 2b$ "

وبالتالي فإن $(d \leq (2a, 2b)) = 2$.

(د) $n \in \mathbb{N}^*$ ، $(a^n, b^n) = 1$.

(هـ) إذا كان $c \setminus (a+b)$ ، فإن $(a,c) = (b,c) = 1$.

(٩) (أ) إذا كان $(a, bc) = 1$ ، فأثبت أن $(a, b) = 1$ ، $(a, c) = 1$.

(ب) إذا كان $c \neq 0$ ، فأثبت أن $(ac, bc) = |c|(a, b)$.

(ج) إذا كان $b \setminus c$ ، فأثبت أن $(a, b) = (a+c, b)$.

(د) إذا كان $(b, c) = 1$ ، فأثبت أن $(a, bc) = (a, b)(a, c)$.

(هـ) إذا كان $c = am + bn$ ، $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ، فأثبت أن $(a, b) \setminus c$.

(١٠) أوجد $d = (a, b)$ ، ثم أوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = am + bn$ عندما :

(أ) $a = 288$ ، $b = 51$ (ب) $a = 1292$ ، $b = 884$

(ج) $a = 8633$ ، $b = 7209$ (د) $a = 7469$ ، $b = 2387$

(١١) أوجد $d = (a, b, c)$ ، ثم أوجد $m, n, r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = am + bn + cr$

عندما :

(أ) $a = 33$ ، $b = 143$ ، $c = 8749$ (ب) $a = 120$ ، $b = 60$ ، $c = 165$

(ج) $a = 1131$ ، $b = 594$ ، $c = 2907$.

(١٢) أوجد $d = (a, b, c, e)$ ، ثم أوجد $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$ بحيث أن

$d = am + bn + cr + es$ عندما :

(أ) $a = 116$ ، $b = 248$ ، $c = 148$ ، $e = 152$

(ب) $a = 113$ ، $b = 594$ ، $c = 2907$ ، $e = 1517$

(ج) $a = 21355$ ، $b = 17801$ ، $c = 11503$ ، $e = 8752$

(١٣) يمكن استخدام الطريقة الآتية للتعبير عن العدد a بدلالة الأساس 2 وهي :

ليكن 2^{n_1} أكبر عدد صحيح بحيث أن $2^{n_1} \leq a$ ، وليكن 2^{n_2} أكبر عدد

صحيح بحيث أن $2^{n_2} \leq a - 2^{n_1}$ ، وليكن 2^{n_3} أكبر عدد صحيح بحيث أن

$2^{n_3} \leq a - 2^{n_1} - 2^{n_2}$. إذاً

$0 \leq a - (2^{n_1} + 2^{n_2} + 2^{n_3}) < a - (2^{n_1} + 2^{n_2}) < a - 2^{n_1} < a$

وبنفس الأسلوب يمكن أن نصل إلى الآتي :

$$a - (2^{n_1} + 2^{n_2} + \dots + 2^{n_r}) \Rightarrow a = 2^{n_1} + 2^{n_2} + \dots + 2^{n_r}$$

فمثلاً للتعبير عن العدد 147 بدلالة الأساس 2 ، لاحظ أن $2^7 < 147$ ، وبالتالي فإن $147 - 2^7 = 19$ ، $2^4 < 19$ ، وعليه فإن $19 - 2^4 = 3$ ، $2 < 3$ ومنها نجد أن $3 - 2 = 1$ و $1 = 2^0$. إذاً

$$147 = 2^7 + 19 = 2^7 + 2^4 + 3 = 2^7 + 2^4 + 2 + 1$$

$$= 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2 + 1$$

وعليه فإن $147 = (10010011)_2$.

عبر باستخدام هذه الطريقة عن كل من 388 ، 945 بدلالة الأساس 2 .

□

٢-٢ : الأعداد الأولية Prime Numbers

تكن أهمية الأعداد الأولية في تطبيقاتها الهندسية من جهة ، وأعتبارها حجر الأساس في بناء الأعداد الصحيحة من جهة أخرى ، وهذا ما نرغب بدراسته في هذا الجزء الذي يضم تعريف العدد الأولي ودراسة خواصه الأساسية

تعريف ٢-٢-١ :

(أ) يقال عن $P \in \mathbb{N}^*$ أنه عدد أولي (Prime Number) ، إذا كان $p > 1$ ولا يقبل القسمة إلا على P و 1 .

(ب) يقال عن $a \in \mathbb{Z}$ ، $1 < a$ ، أنه عدد مؤلف (Composite number) ، إذا كان a عدداً غير أولي .

مثال (١) :

(أ) $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23$ أعداد أولية بينما 6 عدد مؤلف لأن 6 يقبل القسمة على 2 .

(ب) $5! + 2$ عدد مؤلف ، لأن $5! + 2$ يقبل القسمة على 2 . لاحظ أن $5! + 2 = 2(61)$.

(ج) $5! + 3$ عدد مؤلف ، لأنه يقبل القسمة على 3 ، كما أن $5! + 3 = 3(41)$ ،
 $1 < 3 < (5! + 3)$ ، $1 < 41 < (5! + 3)$.

مبرهنة ٢-٢-١ :

إذا كان $n > 2$ ، فإن عدد مؤلف إذاً وإذا فقط وجد $a, b \in \mathbb{Z}$ ، بحيث أن
 $1 < b < n$ ، $1 < a < n$ ، $n = ab$
 " يسمى كل من a, b عامل من عوامل n "

البرهان :

إذا كان $1 < b < n$ ، $1 < a < n$ ، $n = ab$ فمن الواضح أن عدد مؤلف .
 ولإثبات العكس نفرض أن عدد مؤلف n . إذاً يوجد $1 \neq a \neq n$ و $a \mid n$
 وعليه يوجد $b \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $n = ab$ ، لكن $n, a \in \mathbb{Z}^+$. إذاً $b \in \mathbb{Z}^+$ ،
 وعليه فإن $1 \leq a$ ، $1 \leq b$. لكن $a \mid n$ و $b \mid n$. إذاً $a \leq n$ و $b \leq n$. لكن
 $a \neq n$ ، $a \neq 1$. إذاً $1 < a < n$. وإذا كان $b = 1$ ، فإن $n = a$ وهذا غير
 ممكن . إذاً $b \neq 1$. وإذا كان $b = n$ ، فإن $a = 1$ وهذا غير ممكن .
 إذاً $1 < b < n$.

□

ملاحظة :

كل الأعداد الأولية فردية ما عدا العدد 2 ، وكل منها على الشكل $4m + 1$ أو
 $4m - 1$ حيث $m \in \mathbb{Z}^+$ ، لأن أي عدد صحيح يمكن كتابته بالشكل
 $m \in \mathbb{Z}$ ، $4m$ ، $4m + 1$ ، $4m + 2$ ، $4m + 3$
 لكن $4m$ ليس أولياً ، كما أن $2 \mid 4m + 2$ ، وعليه فإن $4m + 2$ عدد أولي
 عندما $m = 0$ و 2 عدد أولي زوجي . إذاً أي عدد أولي فردي على الشكل
 $4m + 1$ ، $4m + 3$. لكن $\{ 4m - 1 \mid m \in \mathbb{N}^* \} = \{ 4m + 3 \mid m \in \mathbb{N} \}$
 إذاً كل عدد أولي فردي على الشكل $4m - 1$ أو $4m + 1$ ، $m \in \mathbb{N}^*$.

ولأهمية الأعداد الأولية وضع العلماء تخمينات (Conjectures) كثيرة عليها
منها :

(أ) يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الأولية على الشكل $n^2 + 1$ ، $n \in \mathbb{N}^*$ ،
وهذا الحدس أو التخمين لم يثبت بعد . لاحظ أن $2 = 1^2 + 1$ ، $5 = 2^2 + 1$ ،
 $17 = 4^2 + 1$ ، $37 = 6^2 + 1$ ، $197 = (14)^2 + 1$.

(ب) حدس جولدباخ (١٦٩٠-١٧٦٤م) عام ١٧٤٢م :
يمكن التعبير عن أي عدد صحيح زوجي أكبر من 2 كمجموع عددين
أوليين .

لاحظ أن $4 = 2 + 2$ ، $6 = 3 + 3$ ، $8 = 3 + 5$ ، $1 = 3 + 7$ ،
 $12 = 5 + 7$ ، $14 = 7 + 7$ ، $16 = 5 + 11$.

وإذا كان حدس جولدباخ صحيحاً ، فإن ذلك يعني أنه يمكن التعبير عن أي
عدد فردي أكبر في 5 كمجموع ثلاثة أعداد فردية ، لأن إذا كان $n > 5$
عدداً فردياً فإن $n - 3$ عدد زوجي أكبر من 2 وعليه فإن $n - 3 = p + q$ ،
حيث p, q عددين أوليين وبالتالي فإن $n = p + q + 3$.

(ج) يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الأولية على الشكل $p, p + 2$ ، حيث p
عدد أولي . يسمى مثل تلك الأعداد أعداد أولية توأميه
(Twin primes) مثل 3,5 ، 11,13 ، 17,19 .

(د) تخمين أو حدس الفرنسي لاجرانج (١٧٣٦-١٨١٣) عام ١٧٧٥م : إذا كان
 n عدداً صحيحاً فردياً أكبر من 5 ، فإن $n = p_1 + 2p_2$ ، حيث p_1, p_2
عددين أوليين .

والآن إلى التعريف الآتي :

تعريف ٢-٢-٢ :

الترتيب الطبيعي للأعداد الأولية هو $p_1 = 2, p_3 = 5, \dots, p_n, \dots$ ويسمى p_n العدد الأولي النوني في الترتيب الطبيعي .
ويمكن أن نبرهن ما يلي .

مبرهنة ٢-٢-٢ :

$$p_n \leq 2^{2^{m-1}} \text{ لكل } n \in \mathbb{N}^*$$

البرهان : (بالاستقراء على n)

إذا كان $n = 1$ ، فإن $p_1 = 2$ وعليه فإن العلاقة صحيحة عندما $n = 1$.
والآن لنفرض أن العلاقة أعلاه صحيحة عندما $n = m$ ، إذاً $p_m \leq 2^{2^{m-1}}$.
ولإثبات صحة العلاقة عندما $n = m + 1$. لاحظ أن

$$p_{m+1} \leq p_1 p_2 \dots p_m + 1 \leq 2 \cdot 2^2 \dots 2^{2^{m-1}} + 1$$

$$\text{لكن } 2 \cdot 2^2 \dots 2^{2^{m-1}} = 2^{1+2+\dots+2^{m-1}} = 2^m - 1 ، \text{ إذاً } 1 + 2 + \dots + 2^{m-1} = 2^m - 1 .$$

$$p_{m+1} \leq 2^{2^{m-1}} + 1 \text{ لكن } 1 \leq 2^{2^{m-1}} \text{ لكل } m \in \mathbb{N} . \text{ إذاً}$$

$$p_{m+1} \leq 2^{2^{m-1}} + 2^{2^{m-1}} = 2 \cdot 2^{2^{m-1}} = 2^{2^m}$$

$$\text{عندما } n = m + 1 . \text{ إذاً } p_n \leq 2^{2^{n-1}} \text{ لكل } n \in \mathbb{N}^*$$

□

نتيجة :

إذا كان $n \geq 1$ عدداً صحيحاً ، فيوجد على الأقل $n + 1$ من الأعداد الأولية كل منها أقل من 2^{2^n} .

البرهان :

بما أن كلاً من p_1, p_2, \dots, p_{n+1} أقل من 2^{2^n} حسب مبرهنة (٢-٢-٢) .
إذاً يوجد على الأقل $(n + 1)$ من الأعداد الأولية كل منها أقل من 2^{2^n} .

□

مبرهنة ٣-٢-٢ :

- (أ) إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، p عدداً أولياً كان $p \mid ab$ فإما $p \mid a$ أو $p \mid b$.
 (ب) إذا كان $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ و p عدداً أولياً وكان $p \mid a_1 a_2 \dots a_n$ فإن $p \mid a_i$ لبعض قيم $1 \leq i \leq n$.

البرهان :

- (أ) نفرض أن $p \mid ab$ ، $p \nmid b$. إذا $(b, p) = 1$ ، وعليه فإن $p \mid a$ حسب مبرهنة (٢-١-٩) .
 (ب) (بالاستقراء الرياضي على n) .

فإذا كان $n = 1$ فإن $p \mid a_1$ بالفرض ، وعليه فإن النتيجة صحيحة في هذه الحالة . والآن لنفرض أن النتيجة صحيحة عندما $n = m$. ولكي نثبت صحة النتيجة عندما $n = m + 1$. لاحظ أنه إذا كان $p \mid (a_1 a_2 \dots a_{m+1})$ فإن $p \mid a_1 (a_2 \dots a_{m+1})$ وعليه إما $p \mid a_1$ أو $p \mid (a_2 \dots a_{m+1})$ حسب (أ) فإذا كان $p \mid a_1$ فقد أنتهى البرهان ، أما إذا كان $p \nmid a_1$ ، فإن $p \mid a_2 \dots a_{m+1}$ ، وعليه يوجد $2 \leq i \leq m + 1$ بحيث أن $p \mid a_i$ حسب فرضية الاستقراء الرياضي . إذا النتيجة صحيحة عندما $n = m + 1$. وعليه فإنها صحيحة لجميع قيم $n \in \mathbb{N}^*$.

□

مبرهنة ٤-٢-٢ :

- (أ) كل عدد صحيح أكبر من الواحد يقبل القسمة على عدد أولي .
 (ب) مجموعة الأعداد الأولية لا نهائية .

البرهان :

- (أ) نفرض أن $S = \{n \in \mathbb{Z}^+ \mid n \text{ أكبر من الواحد ولا يقبل القسمة على عدد أولي}\} \neq \emptyset$

إذا S تحوي عنصر أول (أصغر) وليكن m . إذا m أكبر من الواحد ولا يقبل القسمة على عدد أولي فإذا كان m عدداً أولياً فإن $m \setminus m$ وهذا خلاف الفرض، أما إذا كان m غير أولي ، فإن $r \setminus m$ ، $r \neq m$ ، $1 \neq r$ ، وعليه فإن $r < m$ ، ومنه ينتج أن $r \notin S$ ، وبالتالي فإن r يقبل القسمة على عدد أولي وليكن p ، وعليه فإن $p \setminus m$ وهذا خلاف الفرض أيضاً . إذا $S = \emptyset$.

(ب) نفرض أن مجموعة الأعداد الأولية مجموعة منتهية وأن عنصرها هي p_1, p_2, \dots, p_n . وليكن $n = 1 + (p_1 \dots p_n)$. إذا $n > 1$ ، وعليه فإن n يقبل القسمة على عدد أولي مثل p (حسب أ) . فإذا كان $p = p_i$ لبعض قيم $1 \leq i \leq n$ ، فإن $p \setminus n$ و $p \setminus (p_1 p_2 \dots p_n)$ ، وعليه فإن $p \setminus 1$ ، ومنه ينتج أن $p = 1$ وهذا يناقض كون p عدداً أولياً . إذا $p \neq p_i$ لكل $i = 1, 2, \dots, n$ ، وعليه فإن مجموعة الأعداد الأولية مجموعة لا نهائية .

□

نتيجة (١) :

لكل عدد مؤلف n قاسم أولي p بحيث أن $p \leq \sqrt{n}$.

البرهان :

بما أن n عدد مؤلف . إذا $n = ab$ ، $1 < a \leq b$ ، وعليه فإن $a^2 \leq n$ ، وبالتالي فإن $a \leq \sqrt{n}$. وبتطبيق مبرهنة (٢-٢-٤) يمكننا إيجاد عدد أولي p بحيث أن $p \setminus a$. لكن $a \setminus n$. إذا $p \setminus n$ و $p \leq a$ ، وعليه فإن $p \leq \sqrt{n}$.

□

والآن إلى النتيجة المهمة الآتية والتي يجب أن تنسب إلى ابن طاهر البغدادي (المتوفي سنة ١٠٣٧ م ، بدلاً من فيبوناشي (١١٨٠-١٢٥٠ م) .

نتيجة (٢) :

إذا لم يكن للعدد $n > 1$ قاسماً أولياً أقل من أو يساوي \sqrt{n} ، فإن n عدد أولي .

البرهان :

نفرض أن n عدد غير أولي . إذا n عدد مؤلف وعليه يوجد عدد أولي p بحيث أن $p \mid n$ ، $p \leq \sqrt{n}$ ، حسب نتيجة (١) ، وهذا خلاف الفرض .

□

مثال (٢) :

أثبت أن 257 عدد أولي .

الإثبات :

بما أن $16 < \sqrt{257} < 17$ ، إذا الأعداد الأولية الأقل من أو تساوي $\sqrt{257}$ هي 2,3,5,7,11,13 . لكن $257 = 128(2) + 1$ ، $257 = 85(3) + 2$ ، $257 = 51(5) + 2$ ، $257 = 36(7) + 5$ ، $257 = 23(11) + 4$ ، $257 = 9(13) + 10$. إذا 257 لا يقبل القسمة على أي من 2,3,5,7,11,13 وعليه فإن 257 عدد أولي حسب (نتيجة ٢) .

وهذا ولنتيجة (٢) تطبيق آخر إذ باستخدامها وإستخدام ما يسمى " غربال أيراتوستين Crible d' Eratosthene ، (٢٧٦-١٦٤ ق.م) ، أمين مكتبة الإسكندرية وأول من حسب محيط الأرض بطريقة هندسية " . يمكننا إيجاد الأعداد الأولية الأقل من أو تساوي العدد n .

فإذا كان المطلوب إيجاد الأعداد الأولية الأقل من 90 نكتب جميع الأعداد بين 2 ، 90 ، ثم نشطب مضاعفات الأعداد الأولية التي تقل عن أو تساوي $\sqrt{90}$ وهي مضاعفات الأعداد 2,3,5,7 ، فما بقي من تلك الأعداد يكون أعداد أوليه . إذا الأعداد الأولية الأقل من $\sqrt{90}$ هي :

2,3,5,7,11,13,19,23,29,31,37,41,43,47,53,
59,61,67,71,73,79,83,89

وبإستخدام غربال إيراتوستين ونتيجة (٢) ، نلاحظ أن الأعداد الأولية الواقعة بين 120 ، 180 هي :

127,131,137,139,149,151,157,163,167,173,179

وحيث أن لكل عدد صحيح موجب n يوجد على الأقل n من الأعداد المؤلفة
 $(n+1)!, (n+1)!+3, \dots, (n+1)!+(n+1)$ لأن $m \setminus (n+1)!+m$ لكل
 $2 \leq m \leq n+1$. إذاً توزيع الأعداد الأولية غير منتظم بين الأعداد الصحيحة ،
 والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل يمكن إحصاء الأعداد الأولية $\pi(x)$ التي
 تقل عن أو تساوي العدد الحقيقي x ؟ وللإجابة على السؤال : لاحظ أن
 $\pi(x) = \left| \{ p \in \mathbb{N} : p \leq x, p \text{ عدد أولي} \} \right|$ ، وعليه فإن $\pi(8) = 4$ ، وقد حسب
 الألماني جـاوس (1777-1850م) $\pi(3 \times 10^6)$ فوجد أن
 $\pi(3 \times 10^6) = 216816$ ، ولاحظ عام (1791م) أن معدل ازدياد $\pi(x)$ هو
 نفس معدل ازدياد كل من $\frac{x}{\ln x}$ ، $\text{Lin}(x) = \int_2^x \frac{du}{\ln u}$ ، وتوقع صحة المبرهنة
 الآتية والتي تسمى مبرهنة الأعداد الأولية "The prime number theorem".

مبرهنة ٥-٢-٢ :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x} = 1$$

هذا ولقد خمن الفرنسي لجندر (1752-1833م) عام 1798 بأن

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x - 1.08366}$$

ومن مبرهنة (٥-٢-٢) ، نجد أن $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln x} = 0$ ، وعليه

فإن لكل a نجد أن

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) (\ln x - a)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{\pi(x) \ln x}{x} - \frac{a \pi(x)}{x} \right] = 1$$

وعليه فإن $\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x - a}$ لكل a .

أما أول محاولة لإثبات مبرهنة الأعداد الأولية فقط كانت من قبل الروسي شبيشيف (Tchebychef) (١٨٢-١٨٩٤م) ببرهانه على وجود ثابتين a, b ، $a < 1 < b$ بحيث أن $a \left(\frac{x}{\ln x}\right) < \pi(x) < b \left(\frac{x}{\ln x}\right)$ عندما x كبيرة كبراً كافياً ، ثم أثبت أنه إذا كان $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x} = 1$ موجوداً فإن $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x} = 1$ ، لكنه لم يتمكن من إثبات وجود تلك النهاية .

هذا وقد أثبت شبيشيف عام ١٨٥٠م بأن

$$\frac{0.89x}{\ln x} < \pi(x) < \frac{1.11x}{\ln x}$$

وفي عام ١٨٥٩م وسع الألماني ريمان (١٨٢٦-١٨٦٦م) مفهوم دالة زيتا

(Zeta function) $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ ، $s \in \mathbb{C}$ ، والمعرفة من قبل السويسري

أويلر (١٧٠٧-١٧٨٣م) بالنسبة للأعداد الحقيقية ، موضحاً العلاقة بين توزيع

الأعداد الأولية . وسلوك الدالة $\zeta(s)$ مبيناً العلاقة بين $\pi(x)$ وجذور الدالة

$\zeta(s)$ في المستوى s (s-plane) ، ولريمان العديد من التخمينات الخاصة

بتوزيع جذور الدالة زيتا أشهرها ما يسمى فرضية ريمان

(Riemann Hypothesis) التي تنص على أن جميع الجذور (أصفار) غير

الحقيقية للدالة زيتا والتي جزئها الحقيقي موجب تقع على المستقيم $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$

هذا وقد خمن العلماء أن $|\pi(x) - \text{Lin}(x)| \leq \sqrt{2 \ln(x)}$ لكل $x \geq 2.01$ ، وفي

عام ١٨٩٦م قدم كل من الفرنسي هادمارد (١٨٦٥-١٩٦٣م) والبلجيكي فالييه

بواسون (١٨٦٦-١٩٦٢م) أول إثبات لمبرهنة الأعداد الأولية ، ثم تعددت

البراهين المعتمدة على الدوال المركبة إلى أن قدم النرويجي سلبرج (٧١٩١-

عام ١٩٤٩م برهاناً لا يعتمد على الدوال المركبة إطلاقاً منح عليه جائزة فيلد في

الرياضيات عام ١٩٥٠م .

والآن إلى المبرهنة الآتية :

مبرهنة ٢-٢-٦ :

إذا كان $a > 1$ ، $n > 1$ عددين صحيحين وكان $a^n - 1$ عدداً أولياً ، فإن $a = 2$ و n عدد أولي .

البرهان :

بما أن $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + \dots + a + 1)$. إذاً عندما $a > 2$ ، $n > 1$ نجد أن $a-1 > 1$ و $a^{n-1} + \dots + a + 1 > a + 1 > 3$ ، وعليه فإن $a^n - 1$ ليس أولياً وهذا خلاف الفرض . إذاً إذا كان $a^n - 1$ أولياً ، فإن $a = 2$.
والآن لنفرض أن $2^n - 1$ عدد أولي وأن n ليس أولياً . إذاً $n = rs$ ، $1 < r < n$ ، $1 < s < n$ حسب مبرهنة (٢-٢-١) ، وعليه فإن $2^n - 1 = 2^{rs} - 1 = (2^r)^s - 1$ ، $a^n - 1$ عدداً أولياً ، فإن $a = 2$. إذاً $2^r = 2$ ، وعليه فإن $r = 1$ ، $s = n$ ، وبالتالي فإن n غير مؤلف . إذاً n عدد أولي .

□

وأخيراً نورد المبرهنة الآتية والتي تعتمد عليها ما يسمى طريقة فيرما

(١٦٦٥-١٦٠١م) لتحليل الأعداد الفردية إلى عواملها الأولية .

مبرهنة ٢-٢-٧ :

يمكن التعبير عن أي عدد فردي موجب كحاصل ضرب عدد بين موجبين إذاً وإذا فقط أمكن التعبير عنه كفرق بين مربعين .

البرهان :

نفرض أن n عدد فردي موجب ، $n = ab$. إذاً $n = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$ وكل من a, b عدد فردي . ولإثبات العكس نفرض أن $n = c^2 - e^2 = (c-e)(c+e)$. إذاً n هو حاصل ضرب عددين موجبين .

ملاحظة :

لتطبيق مبرهنة (٢-٢-٧) نبحث عن حل للمعادلة $a^2 - b^2 = n$ ، وذلك بإيجاد مربع كامل على الصورة $a^2 - n$ ، وعليه يجب البحث عن مربع كامل بين حدود المتتابعة $m^2 - n, (m+1)^2 - n, \dots$ ، حيث m أصغر عدد صحيح موجب بحيث أن $\sqrt{n} < m$.

مثال (٣) :

حل العدد 133 إلى عوامله الأولية .

الحل :

بما أن $11 < \sqrt{133} < 12$. إذاً $12^2 - 133 = 11$ ، $13^2 - 133 = 36 = 6^2$ ، وعليه فإن $133 = 13^2 - 6^2 = (13+6)(13-6) = 19 \times 7$ من عدد أولي .

مثال (٤) :

حل العدد 13345 إلى عوامله الأولية .

الحل :

بما أن $115 < \sqrt{13345} < 116$. إذاً 111 ليست مربعاً كاملاً ، و $116^2 - 13345 = 13456 - 13345 = 111$ ، و $117^2 - 13345 = 13689 - 13345 = 344$ ليست مربعاً كاملاً ، و $118^2 - 13345 = 13924 - 13345 = 679$ ليست مربعاً كاملاً ، و $119^2 - 13345 = 14161 - 13345 = 816$ ليست مربعاً كاملاً ، و $120^2 - 13345 = 14400 - 13345 = 1045$ ليست مربعاً كاملاً ، إذاً $(121)^2 - 13345 = 14641 - 13345 = 1296 = (36)^2$ ، إذاً $n = 13345 = (121)^2 - (36)^2 = (121+36)(121-36) = 157 \times 85$

لكن 157 عدد أولي ، لأن $12 < \sqrt{157} < 13$ والأعداد الأولية الأقل من أو تساوي $\sqrt{157}$ هي :

2,3,5,7,11 و $157 = 77(2) + 1$ ، $157 = (52)(3) + 1$ ، $157 = 31(5) + 2$ ،
 $157 = (22)(7) + 3$ ، $157 = 14(11) + 3$ ، وبالتالي فإن 157 لا يقبل القسمة
 على أي من 2,3,5,7,11 . أما $9 < \sqrt{85} < 10$ ، وعليه فإن
 $15 = (10)^2 - 85 = 36 = 121 - 85 = 11^2 - 85$ ، وعليه فإن
 إذاً $85 = 11^2 - 6^2 = (11+6)(11-6) = 17 \times 5$

$$n = 13345 = 157 \times 17 \times 5$$

تمارين

- (١) أثبت أن كلاً من 197,239,313,461 عدد أولي .
- (٢) أوجد الأعداد الأولية الواقعة بين 270 ، 320 .
- (٣) أثبت صحة حدس جولباخ لكل من الأعداد الآتية 32,98,460,1024 .
- (٤) إذا كان $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ وكان p عدداً أولياً ، و $ab = cd$ ، $p \mid a$ فأثبت أن $p \mid c$ أو $p \mid d$.
- (٥) إذا كان $n > 1$ ، فأثبت أن $n^4 + 4$ عدد مؤلف .
- (٦) إذا كان $p \geq 5$ عدداً أولياً ، فأثبت أن $p^2 + 2$ عدد مؤلف " لاحظ أن أما $p = 6m + 1$ أو $p = 6m + 5$ "
- (٧) برهن على وجود عدد لا نهائي من الأعداد الأولية على الصورة $6r - 1$ ، $r \in \mathbb{N}^*$. "ملاحظة : أفرض وجود عدد منتهي p_1, \dots, p_n من تلك الأعداد وضع $m = 6(p_1 \cdots p_n) - 1$ ، وأثبت أن $p \mid m$ لكن $p \neq p_i$ لكل $i = 1, \dots, n$.

(٨) إذا كان p عدداً أولياً فردياً لا يساوي 5 ، فأثبت أن $10 \mid p^2 - 1$ أو $10 \mid p^2 + 1$. لاحظ أن $p \in \{5m+1, 5m+2, 5m+3, 5m+4\}$

(٩) إذا كان p عدداً أولياً وكان $a \mid p$ ، فأثبت أن $a^n \mid p^n$.

(١٠) إذا كان $5 \leq q \leq p$ عددين أوليين ، فأثبت أن $24 \mid p^2 - q^2$.

(١١) حقق تخمين لاجرانج لكل الأعداد الفردية الأكبر من 5 وأقل من 37 .

(١٢) أثبت عام ١٩٥٠م أنه يمكن التعبير عن أي عدد صحيح أكبر من 9 كمجموع أعداد أولية فردية . عبر عن كل من الأعداد 25,69,81,125 كمجموع أعداد أولية فردية .

(١٣) أستخدم طريقة فيرما لتحليل كل من الأعداد الآتية إلى عواملها الأولية
237 ، 343 ، 1745 ، 18531 .

(١٤) أثبت أن 307 عدد أولي ، ثم أثبت أنه كان

$$209 \times \dots \times 306 \times 307 = n \times (1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 99) , \text{ فأن } n \mid 307 .$$

٢-٣ : المبرهنة الأساسية في الحساب وبعض تطبيقاتها

تنص المبرهنة الأساسية في الحساب على إمكانية تحليل أي عدد صحيح أكبر من الواحد (بطريقة وحيدة) إلى عوامله الأولية .

ويعتقد البعض بأن القضية الرابعة عشرة (14-IX) في الجزء التاسع من كتاب الأصول " إذا كان عدد ما هو أقل عدداً تعدّه أعداد أولية ، فلا يعده أي

عدد أولي آخر غير هذه الأعداد التي تعدّه "بأنها المبرهنة الأساسية في الحساب لكن تلك القضية تكافئ قولنا أن المضاعف المشترك الأصغر لأعداد أولية لا يقبل قواسم أولية إلا تلك الأعداد وهذه ليست المبرهنة الأساسية بأي حال من الأحوال لأنه لا الفارسي ولا الكرخي ولا شراح إقليدس ممن هم بتميز ابن الهيثم قد تعرفوا في القضية (14-IX) إلى ما سوف يصبح لاحقاً المبرهنة الأساسية

أنظر [٦ ، ص ٣١٩-٣٢٢] ، هذا ويؤكد كل من هاردي ورايت عام (١٩٣٨م) عدم ذكر إقليدس لأي نص للمبرهنة الأساسية ، كما تؤكد بورباكي الفرنسية في (أسس الرياضيات ص ١١٠) أن إقليدس لم يتمكن من صياغة هذه المبرهنة بسبب نقص المصطلحات والرموز المناسبة للقوى من أية درجة كانت . ويقول الألماني إيتارد في كتابه (الحساب عند إقليدس ص ٨٦) يجب أن لا نبحث في كتاب الأصول عن التبديل ولا عن التجميع في حاصل ضرب عدة عوامل ، ولا عن تحليل العدد إلى عوامله الأولية ولا عن كافة قواسمه .

إذاً المبرهنة الأساسية ليست لإقليدس بل هي لرياضي آخر هو كمال الدين الفارسي ، وردت في بحثه " تذكرة الأحاباب في تمام التحاب " للتمكن من إدخال الطرق التوافقية ومعرفة القواسم الفعلية لعدد . ونورد فيما يأتي نص الفارسي وإثباته لتلك المبرهنة [٣ أو ٤ ، ص ٣١٨] .

" كل مؤلف فإنه لابد وأن ينحل إلى أضلاع أوائل متناهية هو متآلف من ضربها بعضها في بعض .

أي أن كل عدد طبيعي يمكن التعبير عنه كحاصل ضرب عدد منتهي من الأعداد الأولية " .

البرهان : (الفارسي)

ليكن n عدداً طبيعياً أكبر من الواحد وله قاسم أولى p_1 . إذاً $n = ap_1$ ، $1 \leq a < n$ حسب القضية الثالثة عشر في الجزء الثامن من الأصول لإقليدس ، فإذا كان a عدداً أولياً فقد انتهى البرهان ، وإلا كان للعدد a قاسم أولى p_2 بحيث $n = bp_1 p_2$ ، $1 \leq b \leq a$ ، فإذا كان b عدداً أولياً ، فإن $n = bp_1 p_2$ ، وأنتهى البرهان ، وإلا فإننا نكرر الطريقة نفسها لعدد منتهي من المرات حتى نصل إلى عدد أولى p_r بحيث أن $n = p_1 p_2 \cdots p_r$.

ويكتب الفارسي " وإن لم ينحل إلى ضلعين أوليين أبداً لزم تأليف المتناهي من ضرب المتناهي من ضرب أعداد غير منتهية بعضها في بعض وهذا محال "

وهكذا بعد أن يثبت الفارسي وجود تحليل بعد منتهي من العوامل الأولية يحاول بطريقة غير موفقة أن يثبت وحدانية التحليل ولا نجد إثباتاً تاماً للمبرهنة الأساسية في الحساب إلا عام ١٨٠١م عند الألماني جاوس (١٧٧٧-١٨٥٥م) .

لاحظ أن وحدانية التحليل (Unique factorization) ، تحتاج إلى إثبات ، لأنها قد لا تتحقق في بعض المجموعات العددية ، فمثلاً إذا كانت $S = \{4m+1 | m \in \mathbb{N}\}$ ، وعرفنا العدد الأولي في S بأنه ذلك العدد الأكبر من الواحد ولا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد ، فإن كلاً من $5, 9, 21, 33, 49, 77 \in S$ عدد أولى بينما $25 \in S$ عدد مؤلف كما أن $441 = 9 \times 49 = 21 \times 21$ ، $693 = 21 \times 33 = 9 \times 77$.

والآن إلى طريقة أخرى لإثبات التحليل إلى العوامل الأولية وإثبات وحدانيته .

مبرهنة ٢-٣-١ : " المبرهنة الأساسية في الحساب

" The Fundamental Theorem of Arithmetic

يمكن التعبير بطريقة وحيدة (عدا الترتيب) عن أي عدد صحيح أكبر من الواحد كحاصل ضرب عدد منتهى من الأعداد الأولية .

البرهان : (بالاستقراء الرياضي)

نفرض أن $1 < n \in \mathbb{Z}$. إذا عندما $n=2$ ، فقد تم المطلوب لأن 2 عدد أولي . والآن لنفرض أن العبارة صحيحة لكل $2 \leq m \leq n$ ولإثبات صحتها عندما $n = m+1$. لاحظ أن إذا كان $m+1$ عدداً أولياً فقد تم المطلوب ، أما إذا كان $m+1$ عدداً مؤلفاً ، فيوجد $a, b \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $m+1 = ab$ ، $1 < a < m+1$ ، $1 < b < m+1$ ، حسب مبرهنة (٢-٢-١) . لكن كلاً من a, b يمكن التعبير عنه كحاصل ضرب منتهى من الأعداد الأولية حسب فرضية الاستقراء الرياضي. إذاً يمكن التعبير عن $(m+1)$ كحاصل ضرب أعداد أولية، وعليه فإن العبارة صحيحة عندما $n = m+1$. إذاً العبارة صحيحة لكل $n > 1$.

ولإثبات وحدانية التعبير نفرض أن $n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$ حيث p_i, q_j أعداد أولية لجميع قيم $1 \leq i \leq r$ ، $1 \leq j \leq s$. سنثبت بالاستقراء الرياضي على r بأن $r = s$ ، $p_i = q_i$ لكل i . فإذا كان $r = 1$ فإن $n = p_1 = q_1 (q_2 \cdots q_2)$ لكن p_1 عدد أولي ، إذاً $s = 1$ ، $p_1 = q_1$.
والآن لنفرض أن $r > 1$ وأنه عندما يعبر عن n كحاصل ضرب أعداد أولية عددها أقل من r يكون ذلك التعبير وحيداً . وحيث أن $p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$ ، $1 \leq m < s$. إذاً يوجد $1 \leq m < s$ بحيث أن $p_1 \mid q_m$ حسب مبرهنة (٢-٢-٣) وحيث أنه يمكن أن نفرض دون التأثير على عمومية البرهان أن $p_1 \mid q_1$ فنجد أن $p_1 = q_1$ لأن q_1 عدد أولي .
لكن $p_1 = q_1$ يعني أن $p_2 p_3 \cdots p_r = q_2 q_3 \cdots q_s$. وعليه فإن عدد عوامل الطرف الأيسر من هذه المعادلة يساوي $(r-1)$. إذاً $p_2 = q_2, p_3 = q_3, \dots, q_s$ حسب فرضية الاستقراء الرياضي .

□

ملاحظة :

(أ) بما أن بعض الأعداد الأولية التي تظهر عند التعبير عن أي عدد صحيح أكبر من الواحد تكون متساوية . إذاً يمكن التعبير بطريقة وحيدة (عدا الترتيب) عن أي عدد صحيح $n > 1$ بالصورة الآتية ، والتي تسمى الصورة القياسية

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i} \quad \text{حيث } p_i \text{ أعداد أولية مختلفة لكل } i = 1, \dots, r .$$

(ب) إذا كان $n < (-1)$ ، فإن $-n > 1$ وعليه يمكن التعبير عن $-n$ بطريقة

$$\text{وحيدة كحاصل ضرب أعداد أولية ، إذاً } -n = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i} \quad \text{، وعليه فإن}$$

$$n = (-1) \prod_{i=1}^s p_i \quad \text{حيث } p_i \text{ أعداد أولية مختلفة لجميع قيم } 1 \leq i \leq s .$$

ومن (أ) ، (ب) نجد أنه إذا كان $n \in Z - \{-1, 0, 1\}$ ، فيمكن التعبير عن n كحاصل ضرب أعداد أولية .

مثال (1) :

$$90 = 2 \times 3^2 \times 5 \quad (\text{أ}) \quad , \quad 720 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \quad (\text{ب})$$

$$-138600 = (-1) \times 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \quad (\text{ج})$$

والآن إلى بعض تطبيقات المبرهنة الأساسية في الحساب .

مبرهنة ٢-٣-٢ :

إذا كان a, b عددين صحيحين ، $(a, b) = 1$ وكان c قاسماً موجباً للعدد ab فيوجد عددان موجبان وحيدان d, e بحيث أن

$$c = de \quad (\text{أ}) \quad \text{و} \quad (d, e) = 1 \quad , \quad d \mid a \quad \text{و} \quad e \mid b$$

البرهان :

بما أن $a = \prod_{i=1}^n p_i^{r_i}$ ، $b = \prod_{j=1}^m q_j^{s_j}$ حسب المبرهنة الأساسية ، وبما أن

$$(a, b) = 1 \quad . \quad \text{إذاً} \quad p_i \neq q_j \quad \text{لكل} \quad i, j \quad \text{وعليه فإن} \quad \left(\prod_{i=1}^n p_i^{r_i} \right) \left(\prod_{j=1}^m q_j^{s_j} \right) = ab$$

لكن $c \mid ab$ ، بالفرض . إذاً $c = \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i} \cdot \prod_{j=1}^m q_j^{\beta_j}$ ، حيث $0 \leq \alpha_i \leq r_i$ ،

$0 \leq \beta_j \leq s_j$ لكل $1 \leq i \leq n$ ، $1 \leq j \leq m$. والآن إذا كان

$$c = de \quad \text{و} \quad (d, e) = 1 \quad \text{فإن} \quad d = \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i} \quad , \quad e = \prod_{j=1}^m q_j^{\beta_j}$$

ولإثبات وحدانية d, e نفرض $c = de = rs$ ، $(d, e) = 1$ ، $(r, s) = 1$ ، $d \mid a$ ، $s \mid b$ ، $e \mid b$ ، $r \mid a$.

قابلية القسمة

سنثبت أن $(d,s)=1$ ولإثبات ذلك نفرض أن $(d,s) \neq 1$. إذا يوجد عدد أولي p بحيث أن $p \mid d$ ، $p \mid s$ حسب مبرهنة (٢-٢-٤) . لكن $d \mid a$ و $s \mid b$. إذا $p \mid a$ و $p \mid b$ ، وعليه فإن $(a,b) \neq 1$ وهذا خلاف الفرض . إذا $(d,s)=1$ ، وعليه يوجد $x,y \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $dx+sy=1$ ، وبالتالي فإن $rdx+rsy=r$ و $d \mid rs$. إذا $d \mid r$. وبنفس الطريقة يمكن أن نبرهن على أن $r \mid d$. لكن كلاً من r,d عدد صحيح موجب . إذا $r=d$ ، وعليه فإن $e=s$.

□

مبرهنة ٢-٣-٣ :

إذا كان a,n عددين صحيحين ، فإن $\sqrt[n]{a}$ عدد نسبي إذا وإذا فقط كان $\sqrt[n]{a}$ عدداً صحيحاً .

البرهان :

إذا كان $\sqrt[n]{a}$ عدداً صحيحاً ، فمن البديهي أن $\sqrt[n]{a}$ عدد نسبي . ولإثبات العكس نفرض أن $\sqrt[n]{a}$ عدد نسبي . إذا يوجد $b,c \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $\sqrt[n]{a} = \frac{b}{c}$ و $(b,c)=1$. لكن $a = \frac{b^n}{c^n}$ ، وبالتالي فإن $b^n = ac^n$ ، وعليه فإن $c \mid b^n$. فإذا كان $c \neq \pm 1$ ، فيوجد عدد أولي p بحيث أن $p \mid c$ حسب المبرهنة الأساسية في الحساب ، وعليه فإن $p \mid b^n$ ، وبالتالي فإن $p \mid b$ حسب مبرهنة (٢-٢-٣) . إذا $(b,c) \geq p \neq 1$ وهذا يناقض كون $(b,c)=1$. إذا $c = \pm 1$ ، وعليه فإن $\sqrt[n]{a} = b$ عدد صحيح .

□

مثال (٢) :

$\sqrt{2}$ ، $\sqrt[3]{30}$ ، $\sqrt[3]{6}$ ، $\log_6 3$ أعداد غير نسبية .

الحل :

(أ) بما أن $1 < \sqrt{2} < 2$ ولا يوجد عدد صحيح بين 1 ، 2 حسب مبرهنة

(١-٢-١) . إذا $\sqrt{2}$ عدد غير نسبي حسب مبرهنة (٢-٣-٤) .

(ب) بما أن $3 < \sqrt[3]{30} < 4$ ولا يوجد عدد صحيح بين 3 ، 4 حسب مبرهنة (1-2-1) ج . إذاً $\sqrt[3]{30}$ عدد غير نسبي حسب مبرهنة (2-3-4) .

(ج) بما أن $1 < \sqrt[5]{6} < 2$ ولا يوجد عدد صحيح بين 1 ، 2 . إذاً $\sqrt[5]{6}$ عدد غير نسبي حسب مبرهنة (2-3-4) .

(د) نفرض أن $\log_6(3) = \frac{a}{b}$ ، $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $b \neq 0$. إذاً $6^a = 3^b$ ، وعليه فإن $2^a \cdot 3^a = 3^b$ وهذا يناقض وحدانية التحليل في المبرهنة الأساسية في الحساب . إذاً $\log_6(3)$ عدد غير نسبي .

□

والآن إلى تعريف ودراسة خواص المضاعف المشترك البسيط .

تعريف ١ :

يقال عن $m \in \mathbb{Z}^+$ ، أنه مضاعف مشترك أصغر أو بسيط (Least common multiple) للأعداد $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^*$ ، إذا كان :

$$(أ) \quad a_i \mid m \quad \text{لكل } i = 1, \dots, r .$$

$$(ب) \quad \text{إذا كان } c > 0 \text{ ، } a_i \mid c \text{ ، لكل } i = 1, \dots, r \text{ ، فإن } m \mid c .$$

يعبر عادة عن المضاعف المشترك البسيط للأعداد a_1, \dots, a_r بالشكل $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ أو $\text{l.c.m}(a_1, a_2, \dots, a_n)$. ويمكن أن نبرهن على أن المضاعف المشترك البسيط لأي عددين غير صفريين أو أكثر يكون وحيداً .

مثال (٣) :

$$(أ) \quad [4, 15] = 60 .$$

(ب) إذا كان $a = 195$ ، $b = -273$ ، فإن $a = 3 \times 5 \times 13$ ، $b = (-1) \times 3 \times 7 \times 13$ ، وعليه فإن $[a, b] = 3 \times 5 \times 7 \times 13 = 1365$.

(ج) إذا كان $a = -1287$ ، $b = -507$ ، فإن $a = (-1)3^2 \times 11 \times 13$ ، أما $[a, b] = 3^2 \times 11 \times 13^2$ ، وعليه فإن $b = (-1) \times 3 \times 13^2$ وبصورة عامة نجد أن $[a, b] = [-a, b] = [a, -b] = [-a, -b]$.

(د) لإيجاد القاسم المشترك الأعظم والمضاعف المشترك البسيط للعددين 936 ، 1176 . لاحظ أن $936 = 2^2 \times 3^2 \times 13$ ، $1176 = 2^2 \times 3 \times 7^2$ ، $936 = 2^2 \times 3^2 \times 13$ ، $1176 = 2^2 \times 3 \times 7^2$ ، وبينما $(a, b) = 2^2 \times 3 = 24$ ، وبصورة

عامة إذا كان $a = \prod_{i=1}^n p_i^{r_i}$ ، $b = \prod_{i=1}^n p_i^{s_i}$ ، فإن

$$[a, b] = \prod_{i=1}^n p_i^{\max\{r_i, s_i\}} ، \quad (a, b) = \prod_{i=1}^n p_i^{\min\{r_i, s_i\}}$$

والآن إلى خواص المضاعف المشترك البسيط والمبرهنات الآتية "

مبرهنة ٢-٣-٤ : ليكن $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

(أ) إذا كان $c > 0$ ، فإن $[ac, bc] = c[a, b]$.

(ب) $[a, b] \cdot (a, b) = |ab|$.

البرهان :

(أ) نفرض أن $m = [a, b]$ ، $n = [ac, bc]$. إذاً cm من مضاعفات ac ، bc ،

وعليه فإن cm يقبل القسمة على n وهذا يعني أن $cm \geq n$ لكن $\frac{n}{bc} = \frac{n}{c} \cdot \frac{1}{a}$ ،

و $\frac{n}{ac} = \frac{n}{c} \cdot \frac{1}{a}$ ، وعليه فإن $\frac{n}{c}$ يقبل القسمة على كل من a, b ، وبالتالي فإن $\frac{n}{c}$

يقبل القسمة على m ، وعليه فإن $\frac{n}{c} \geq m$ ، ومنها نجد أن $n \geq cm$.

إذاً $n = cm$.

(ب) بما أن $[a, b] = [a, -b] = [-a, b] = [-a, -b]$ ، إذا يكفي أن نبرهن النتيجة عندما $a, b \in \mathbb{N}^*$ ، ولإثبات ذلك نفرض أن $d = (a, b)$. إذا $d \mid a$ ، $d \mid b$ ، وعليه يوجد $r, s \in \mathbb{N}$ بحيث أن $a = dr$ ، $b = ds$. والآن لنفرض أن $m = \frac{ab}{d}$ ، إذا $m = as = br$. وإذا كان $a \mid c$ ، $b \mid c$ فإن $c = au = bv$ حيث أن $u, v \in \mathbb{N}$. لكن $d = (a, b)$. إذا يوجد $x, y \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $d = ax + by$ ، وعليه فإن

$$\frac{c}{m} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(ax + by)}{ab} = \frac{c}{b}x + \frac{c}{a}y = vx + uy$$

إذا $m \mid c$ ، وعليه فإن $m \leq c$ ، وبالتالي فإن $m = [a, b]$ ، ومنها نجد أن $[a, b] \cdot (c, d) = ab$.

□

نتيجة :

$$[a, b] = |ab| \text{ إذا وإذا فقط كان } (a, b) = 1 .$$

البرهان :

طبق مبرهنة (٢-٣-٤ب) تحصل على المطلوب .

□

ملاحظة :

إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، فإن $[a, b, c] \cdot (a, b, c) \neq |abc|$ ، كما يوضح ذلك المثال الآتي :

لنكن $a = 18$ ، $b = 24$ ، $c = 36$. إذا $a = 2 \times 3^2$ ، $b = 2^3 \times 3$ ، $c = 2^2 \times 3^2$ ، وعليه فإن $[a, b, c] = 2^3 \times 3^2$ ، $(a, b, c) = 2 \times 3$ ، $[a, b, c] \cdot (a, b, c) = 2^4 \times 3^3$ ، $abc = 2^6 \times 3^5$ ، وبالتالي فإن $[a, b, c] \cdot (a, b, c) \neq abc$.

وأخيراً إلى المبرهنة الآتية التي توضح كيفية إيجاد المضاعف المشترك البسيط لأكثر من عددين .

مبرهنة ٢-٣-٥ :

ليكن $a_i \in \mathbb{Z} \neq 0$ لكل $i=1, \dots, n$ ، فإن

$$[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n] = [[a_1, \dots, a_{n-1}], a_n]$$

البرهان :

نفرض أن $s = [r, a_n]$ ، $r = [a_1, \dots, a_{n-1}]$ ، $m = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ إذاً ، $r \mid s$ و $a_n \mid s$ وبالتالي فإن $a_i \mid s$ لكل $i=1, \dots, n-1$ ، لكن $a_n \mid s$ ، إذاً $a_i \mid s$ لكل $i=1, \dots, n$. وحيث أن $m = [a_1, \dots, a_n]$ ، إذاً $m \mid s$ ، وعليه فإن $m \leq s$. والآن $a_i \mid m$ لكل $i=1, \dots, n-1$ و $a_n \mid m$ لكن $r = [a_1, \dots, a_{n-1}]$ يعني أن $r \mid m$. إذاً $s = [r, a_n]$ ، إذاً $s \mid m$. وعليه فإن $s \leq m$. وبالتالي فإن $m = s$.

مثال (٤) :

أوجد المضاعف المشترك البسيط للأعداد 234, 192, 345 .

الحل :

بما أن $[234, 192, 345] = [[234, 192], 345]$ ، $234 = 2 \times 3^2 \times 13$ ، $192 = 2^6 \times 3$ ، $345 = 3 \times 5 \times 23$ لكن $[234, 192] = 2^6 \times 3^2 \times 13$. إذاً $[234, 192, 345] = 2^6 \times 3^2 \times 5 \times 13 \times 23$ إذاً $m = [[234, 192], 345] = 2^6 \times 3^2 \times 5 \times 13 \times 23$

لاحظ أنه يمكن حساب المضاعف المشترك البسيط كالاتي :

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 2 | 234 | , 192 | , 345 |
| 2 | 117 | , 96 | , 345 |
| 2 | 117 | , 48 | , 345 |
| 2 | 117 | , 24 | , 345 |
| 2 | 117 | , 12 | , 345 |
| 2 | 117 | , 6 | , 345 |
| 3 | 117 | , 3 | , 345 |
| 3 | 39 | , 1 | , 115 |
| 5 | 13 | , 1 | , 115 |
| 13 | 13 | , 1 | , 23 |
| 23 | 1 | , 1 | , 23 |
| | 1 | , 1 | , 1 |

إذا $[234,192,345] = 2^6 \times 3^2 \times 5 \times 13 \times 23$

تمارين

(1) أوجد القاسم المشترك الأعظم والمضاعف المشترك البسيط للعددين a,b عندما :

(أ) $b = 2947$ ، $a = 3997$

(ب) $b = 5421$ ، $a = 11328$

(ج) $b = 2^6 \cdot 3 \cdot 7^4 \cdot (19)^3 \cdot (23)^7$ ، $a = 2^{30} \cdot 5^{21} \cdot 19 \cdot (23)^3$

(٢) أوجد القاسم المشترك الأعظم والمضاعف المشترك البسيط للأعداد a, b, c عندما :

(أ) $a = 1128$, $b = 936$, $c = 648$.

(ب) $a = 26542$, $b = 10190$, $c = 1234$.

(٣) أوجد $[1176, 588, 492, 1024]$ ، $[18, 28, 20, 35]$.

(٤) أثبت أن $\sqrt[3]{2}$ ، $\sqrt{68}$ ، $\sqrt[4]{21}$ ، $\log_{10}(4)$ أعداد نسبية .

(٥) أثبت باستخدام المبرهنة الأساسية في الحساب أن :

(أ) إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ وكان $a \setminus c$ ، $b \setminus c$ ، $(a, b) = 1$ ، فإن $ab \setminus c$.

(ب) إذا كان $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ وكان $ab \setminus cd$ و $(a, b) = 1$ فإن $a \setminus c$.

(٦) إذا كان a, b عددين صحيحين موجبين وكان $(a, b) = 1$ و $c^n = ab$

فبرهن على وجود عددين صحيحين e, d بحيث أن $a = d^n$ ، $b = e^n$.

(٧) إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ وكان $b \setminus c$ ، فأثبت أن $[a, b] \leq [a, c]$.

(٨) إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}^*$ ، فأثبت أن $b \setminus a \Leftrightarrow [a, b] = |a|$.

(٩) إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، فأثبت أن $[(a, c), (b, c)] = ([a, b], c)$ ، وحقق

ذلك عندما $c = 225$ ، $b = 270$ ، $a = 120$.

(١٠) إذا كان a, b, c, m, r, v أعداداً صحيحة موجبة وكان $[a, b] = m$ ،

$m = vc$ ، $a = rb + c$ ، فأثبت أن :

(أ) يوجد $u \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $vc = ub$ ، (ب) $b \setminus va$.

(ج) $[a, b] \setminus va$ ، (د) $va = [a, b]$.

(١١) إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، فأثبت أن $[a, b, c](ab, ac, bc) = |abc|$ ، وحقق

ذلك عندما $a = 24$ ، $b = 60$ ، $c = 14$.

(١٢) إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، فأثبت أن $[a, b, c] \cdot (a, b, c) \leq |abc|$

(١٣) إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، وكان $[a, b, c] \cdot (a, b, c) = |abc|$ ، فأثبت أن

$$(a, b) = (b, c) = (a, c) = 1$$

الفصل الثالث

التطبيقات (Congruences)

التطابق هو تعبير آخر لمفهوم القسمة ، قُدّم من قبل الألماني جاس (1777-1855م) عام 1801م بطريقة جعلته أداة فعالة لتسهيل البراهين ووسيلة أخرى لدراسة نظرية الأعداد ويضم هذا الفصل ستة بنود ندرس فيها تعريف التطابق وخواصه الأساسية وبعض تطبيقاته وفصول التطابق وأنظمة البواقي التامة والمختزلة ، التطابقات الخطية ومبرهنة الباقي الصينية ومبرهنتي أولر وفيرما ومبرهنة ابن الهيثم (ولسن) .

١-٣ : مفهوم التطابق وخواصه الأساسية

سنركز اهتمامنا في هذا الجزء على تعريف التطابق ودراسة خواصه الأساسية .

تعريف ١-٣-١ :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $n \in \mathbb{N}^*$ ، فيقال عن a أنه يطابق أو يوافق b (Congruent) قياس n (modulo) ، ونكتب $a \equiv b \pmod{n}$ أو $a \equiv_n b$ إذا كان $a - b$ يقبل القسمة على n .

إذا كان a لا يطابق b قياس n ، فيعبر عن ذلك بالشكل $a \not\equiv b \pmod{n}$.

مثال (١) :

(أ) $31 \equiv 1 \pmod{2}$ ، لأن $31 - 1 = 30$ يقبل القسمة على 2 .

(ب) $31 \not\equiv 1 \pmod{4}$ ، لأن $31 - 1 = 30$ يقبل القسمة على 4 .

تعريف ٢-١-٣ :

يقال أن a قياس n يساوي r ، ونكتب $a \pmod{n} = r$ ، إذا كان

$$0 \leq r < n ، a = ns + r$$

مثال (1) :

$$(أ) \quad 5 \pmod{3} = 2 \quad , \quad 5 = 1 \times 3 + 2 \quad , \quad \text{لأن} \quad 2 \pmod{3} = 2 \quad , \quad \text{لأن}$$

$$. \quad 3 = 1 \times 3 + 0 \quad , \quad 3 \pmod{3} = 0 \quad , \quad 2 = 0 \times 3 + 2$$

$$(ب) \quad 31 \equiv 1 \pmod{3} \quad \text{و} \quad 31 \pmod{3} = 1 \quad , \quad \text{لأن} \quad 31 = 10 \times 3 + 1$$

$$4 \pmod{3} = 1 \quad , \quad \text{لأن} \quad 4 = 1 \times 3 + 1 \quad , \quad \text{وعليه فإن}$$

$$. \quad 31 \pmod{3} = 4 \pmod{3}$$

وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي .

مبرهنة 3-1-1 :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $n \in \mathbb{N}^*$ ، فإن $a \equiv b \pmod{n}$ ، إذاً وإذا فقط كان

$$a \pmod{n} = b \pmod{n} . \quad \text{أي أن}$$

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow (\text{باقي قسمة } a \text{ على } n) = (\text{باقي قسمة } b \text{ على } n)$$

البرهان :

نفرض أن $a \equiv b \pmod{n}$ ، إذاً $a - b \in n\mathbb{Z}$ ، وعليه يوجد $r \in \mathbb{Z}$ بحيثأن $a = b + nr$. لكن $b, n \in \mathbb{Z}$ إذاً باستخدام القسمة الخوارزمية يمكننا أننوجد $m, s \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $b = mn + s$ ، $0 \leq s < n$ ، وعليه فإن $(m+r) \in \mathbb{Z}$ ، $a = (m+r)n + s$. إذاً باقي قسمة a على n يساوي باقيقسمة b على n ، وعليه فإن $a \pmod{n} = b \pmod{n}$.ولإثبات العكس نفرض أن $a \pmod{n} = b \pmod{n}$. إذاً $a = nr + t$ ، $b = ns + t$ ، وبالتالي فإن $a - b = (r-s)n$ ، $r-s \in \mathbb{Z}$ وهذا يعني أن $a - b \in n\mathbb{Z}$ ، وعليه فإن $a \equiv b \pmod{n}$.

□

وقبل دراسة الخواص الأخرى لعلاقة التطابق نورد ما يلي :

تعريف 3-1-3 :

يقال عن علاقة R على مجموعة A أنها علاقة تكافؤ(Equivalence Relation) على A ، إذا كان :

- (أ) علاقة منعكسة (reflexive) على A ، أي أن aRa ، $\forall a \in A$.
 (ب) علاقة متناظرة (symmetric) . أي أن إذا كان $a, b \in A$ وكان aRb ،
 فإن bRa .
 (ج) علاقة متعدية (transitive) . أي أن إذا كان $a, b, c \in A$ ، aRb و
 bRa فإن aRc .

مثال (٣) :

- (أ) إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ ، فإن كلاً من $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ ،
 $R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$ ،
 $R_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (3,1)\}$ ،
 $R_4 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (2,3), (3,2)\}$ ،
 $R_5 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)\}$
 علاقة تكافؤ على A .

- (ب) إذا كان $A = Z$ وكانت R معرفة كالاتي : $a, b \in Z$ ، $aRb \Leftrightarrow |a| = |b|$ ،
 فإن R علاقة تكافؤ على Z .

والآن إلى المبرهنة الآتية :

مبرهنة ٣-٢-٢ :

التطابق قياس n علاقة تكافؤ على Z . أي أن :

$$(أ) \quad a \equiv a \pmod{n} \quad \text{لكل } a \in Z$$

$$(ب) \quad \text{إذا كان } a, b \in Z \text{ ، وكان } a \equiv b \pmod{n} \text{ ، فإن } b \equiv a \pmod{n}$$

$$(ج) \quad \text{إذا كان } a, b, c \in Z \text{ ، وكان } a \equiv b \pmod{n} \text{ ، } b \equiv c \pmod{n} \text{ ، فإن}$$

$$a \equiv c \pmod{n}$$

البرهان :

(أ) بما أن $a - a = 0$ لكل $a \in \mathbb{Z}$ ، وبما أن $n \setminus 0$ لكل $n \neq 0$. إذاً
 $a \equiv a$ لكل $a \in \mathbb{Z}$.

(ب) بما أن $a \equiv b \pmod{n}$. إذاً $a - b = nr$ ، وعليه يوجد $r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن
 $a - b = nr$ ، وعليه فإن $b - a = n(-r)$ ، $-r \in \mathbb{Z}$ ، وبالتالي فإن
 $b \equiv a \pmod{n}$.

(ج) بما أن $a \equiv b \pmod{n}$ و $b \equiv c \pmod{n}$. إذاً يوجد $r, s \in \mathbb{Z}$ بحيث
 أن $a - b = nr$ ، $b - c = ns$ ، ومنها نجد أن $a - c = n(r + s)$.
 لكن $r, s \in \mathbb{Z}$. إذاً $a \equiv c \pmod{n}$.

□

مبرهنة ٣-١-٣ :

إذا كان $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ وكان $n \in \mathbb{N}^*$ ، $a \equiv b \pmod{n}$ ، $c \equiv d \pmod{n}$ ، فإن :

$$(أ) \quad a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad ، \quad (ب) \quad ac \equiv bd \pmod{n}$$

(ج) $a + e \equiv b + e \pmod{n}$ لكل $e \in \mathbb{Z}$ ، (د) $ae \equiv be \pmod{n}$ لكل $e \in \mathbb{Z}$

$$(هـ) \quad ar + cs \equiv br + ds \quad \text{لكل } r, s \in \mathbb{Z}$$

البرهان :

(أ) ، (ب) بما أن

$$a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \exists x \in \mathbb{Z} : a = b + nx \quad \dots (1)$$

$$c \equiv d \pmod{n} \Rightarrow \exists y \in \mathbb{Z} : c = d + ny \quad \dots (2)$$

إذاً بجمع المعادلتين (1) ، (2) ينتج أن $a + c = b + d + n(x + y)$ لكن

$$. \quad a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad \text{إذاً } x + y \in \mathbb{Z}$$

وبطرح المعادلة (2) من (1) ينتج أن $a - c = b - d + n(x - y)$ ،

$$. \quad a - b \equiv c - d \pmod{n} \quad \text{إذاً } x - y \in \mathbb{Z}$$

وبضرب المعادلتين (1) ، (2) ينتج أن $ac = bd + n(by + xd + nxy)$ لكن $by + xd + nxy \in \mathbb{Z}$. إذاً $ac \equiv bd \pmod{n}$.

(ج) ، (د) بما أن $a \equiv b \pmod{n}$ ، $e \equiv e \pmod{n}$ لكل $e \in \mathbb{Z}$. إذاً $a + e \equiv b + e \pmod{n}$ و $ae \equiv be \pmod{n}$ حسب (أ ، ب) .

(هـ) بما أن $a \equiv b \pmod{n}$ ، $c \equiv d \pmod{n}$ بالفرض. إذاً $ar \equiv dr \pmod{n}$ و $cs \equiv ds \pmod{n}$ لكل $r, s \in \mathbb{Z}$ حسب (د) ، وعليه فإن $ar + cs \equiv br + ds \pmod{n}$ حسب (أ) .

□

ملاحظة :

إذا كان $ac \equiv bc \pmod{n}$ ، فإن $a \not\equiv b \pmod{n}$ ، كما يوضح ذلك المثال الآتي : $7 \times 4 \equiv 6 \times 4 \pmod{2}$ بينما $7 \not\equiv 6 \pmod{2}$. لكن يمكن أن نبرهن ما يلي :

مبرهنة ٣-١-٤ :

إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ وكان $n \in \mathbb{N}^*$ ، $d = (c, n)$ ، فإن $ac \equiv bc \pmod{n}$ إذاً وإذا فقط كان $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$.

البرهان :

نفرض أن $ac \equiv bc \pmod{n}$. إذاً يوجد $r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $(a - b)c = ac - bc = nr$ ، وعليه فإن $\frac{c}{d} = \frac{n}{d}r$. لكن

$d = (c, n)$. إذاً $\left(\frac{c}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$ حسب نتيجة (١) من المبرهنة (٢-١-٨) ، وعليه

فإن $a - b = \frac{nr}{d}$ حسب مبرهنة (٢-١-٩) وهذا يعني أن $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$

ولإثبات العكس نفرض أن $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$. إذاً يوجد $r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن

$s \in \mathbb{Z}$ ، إذا يوجد $d \mid c$ ، لكن $ac - bc = \frac{ncr}{d}$ ، وعليه فإن $a - b = \frac{nr}{d}$

بحيث أن $c = ds$ ، وعليه فإن $ac - bc = n(rs)$ ، وهذا يعني أن $ac \equiv bc \pmod{n}$

□

نتيجة :

إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، $n \in \mathbb{N}^*$ وكان $(c, n) = 1$ ، فإن $ac \equiv bc \pmod{n}$ ، فإن $a \equiv b \pmod{n}$

البرهان :

□

يترك للقارئ .

مبرهنة ٣-١-٥ :

إذا كان $a_i \equiv b_i \pmod{n}$ ، لكل $i = 1, \dots, m$ ، فإن :

$$\prod_{i=1}^m a_i \equiv \prod_{i=1}^m b_i \pmod{n} \quad (\text{ب}) \quad ، \quad \sum_{i=1}^m a_i \equiv \sum_{i=1}^m b_i \pmod{n} \quad (\text{أ})$$

البرهان : (بالاستقراء على m) وسنثبت (أ) ونترك (ب) للقارئ .

(أ) لتكن $P(m) : \sum_{i=1}^m a_i \equiv \sum_{i=1}^m b_i \pmod{n}$. إذاً عندما $m = 1$ نجد أن

$a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ بالفرض ، وعليه فإن $P(1)$ عبارة صحيحة . والآن

لنفرض أن $P(r)$ صحيحة . إذاً $\sum_{i=1}^r a_i \equiv \sum_{i=1}^r b_i \pmod{n}$ ولإثبات صحة

$P(r+1)$ ، لاحظ أن $\sum_{i=1}^r a_i \equiv \sum_{i=1}^r b_i \pmod{n}$ و $a_{r+1} \equiv b_{r+1} \pmod{n}$

بالفرص إذاً $\sum_{i=1}^{r+1} a_i = \sum_{i=1}^r a_i + a_{r+1} \equiv \sum_{i=1}^r b_i + b_{r+1} = \sum_{i=1}^{r+1} b_i \pmod{n}$

حسب مبرهنة (٣-١-٣) ، وعليه فإن $P(r+1)$ صحيحة ، وبالتالي فإن

$P(m)$ صحيحة لكل $m \in \mathbb{N}^*$

نتيجة :

إذا كان $a \equiv b \pmod{n}$ وكان $m \in \mathbb{N}^*$ ، فإن $a^m \equiv b^m \pmod{n}$.

البرهان :

أفرض أن $a_i = a$ و $b_i = b$ لكل $i = 1, \dots, m$ وطبق مبرهنة (٣-١-٥)
تجد أن $a^m \equiv b^m \pmod{n}$.

□

مبرهنة ٣-١-٦ :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $n_i \in \mathbb{N}^*$ لكل $i = 1, \dots, r$ ، وكان $m = [n_1, \dots, n_r]$
فإن $a \equiv b \pmod{n_i}$ لكل i إذاً وإذا فقط كان $a \equiv b \pmod{m}$.

البرهان :

بما أن $a \equiv b \pmod{n_i}$ لكل $i = 1, \dots, r$. إذاً $n_i \mid a - b$ لكل i لكن
 $m = [n_1, \dots, n_r]$. إذاً $m \mid a - b$ ، وعليه فإن $a \equiv b \pmod{m}$.
ولإثبات العكس نفرض أن $a \equiv b \pmod{m}$. إذاً $m \mid a - b$. لكن $n_i \mid m$
لكل i ، إذاً $n_i \mid a - b$ لكل i ، وعليه فإن $a \equiv b \pmod{n_i}$ لكل i .

□

نتيجة :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $n_i \in \mathbb{N}^*$ و $(n, r) = 1$ وكان $a \equiv b \pmod{n}$ و
 $a \equiv b \pmod{r}$ ، فإن $a \equiv b \pmod{nr}$.

البرهان :

بما أن $a \equiv b \pmod{n}$ و $a \equiv b \pmod{r}$ بالفرض ، إذاً
 $a \equiv b \pmod{(n, r)}$ ، حيث $m = [n, r]$ حسب مبرهنة (٣-١-٦) . لكن
 $m \cdot (n, r) = |nr|$ حسب مبرهنة (٢-٣-٥) و $|nr| = nr$ لأن $n, r \in \mathbb{N}^*$.
إذاً $m = nr$ ، وعليه فإن $a \equiv b \pmod{nr}$.

□

والآن إلى بعض التطبيقات والأمثلة الآتية .

مثال (٤) :

أوجد باقي قسمة $5^{439} \equiv 1$ على 3 .

الحل :

بما أن $5^2 \equiv 1 \pmod{3}$. إذاً $5^{438} = (5^2)^{219} \equiv 1 \pmod{3}$ حسب نتيجة مبرهنة $(3-1-5)$. لكن $5 \equiv 5 \pmod{3}$. إذاً $5^{439} \equiv 5 \pmod{3}$ حسب مبرهنة $(3-1-3)$. وحيث أن $5 \equiv 2 \pmod{3}$. إذاً $5^{439} \equiv 2 \pmod{3}$ حسب مبرهنة $(3-1-2)$ ، وعليه فإن باقي قسمة 5^{439} على 3 يساوي 2 .

مثال (٥) :

أوجد باقي قسمة $\sum_{n=1}^{100} n!$ على 15 .

الحل :

بما أن $5! \equiv 0 \pmod{15}$. إذاً $n! \equiv 0 \pmod{15}$ ، وعليه فإن

$$\sum_{n=1}^{100} n! \equiv 1!+2!+3!+4!+0+\dots+0 \pmod{15} \equiv 33 \pmod{15}$$

لكن $33 \equiv 3 \pmod{15}$. إذاً $\sum_{n=1}^{100} n! \equiv 3 \pmod{15}$ ، وعليه فإن باقي قسمة

$$\sum_{n=1}^{100} n! \text{ على } 15 \text{ يساوي } 3 .$$

مثال (٦) :

أثبت أن $2^{32} + 1$ يقبل القسمة على 641 .

الإثبات :

بما أن $2^{16} \equiv 154 \pmod{641}$ ، إذاً $2^{32} \equiv (154)^2 \pmod{641}$ ، وعليه فإن $2^{32} + 1 \equiv (154)^2 + 1 \pmod{641}$. لكن $(154)^2 + 1 = 23717$ و

23717 يقبل القسمة على 641 . إذاً $23717 \equiv 0 \pmod{641}$ ، وعليه فإن

$$2^{32} + 1 \equiv 0 \pmod{641} \text{ ، وبالتالي فإن } 641 \mid (2^{32} + 1)$$

مثال (٧) :

أوجد أصغر عدد صحيح m بحيث أن $33 \times (37)^2 + m$ يقبل القسمة على 17 .

الحل :

بمما أن $37 \equiv 3 \pmod{17}$. إذاً $(37)^2 \equiv 9 \pmod{17}$ لكن
 $33 \equiv -1 \pmod{17}$. إذاً $33 \times (37)^2 \equiv -9 \pmod{17}$ ، وعليه فإن
 $(33 \times (37)^2 + 9)$ يقبل القسمة على 17 وبالتالي فإن $m = 9$.

تمارين

(١) إذا كان $a \equiv b \pmod{n}$ و $c > 0$ ، فأثبت أن $\frac{a}{c} \equiv \frac{b}{c} \pmod{n}$.

(٢) إذا كان $a \equiv b \pmod{n}$ ، فأثبت أن $(a, n) = (b, n)$.

(٣) أوجد باقي قسمة كل من 2^{150} و 10^{38} على 7 .

(٤) أوجد باقي قسمة $1^5 + 2^5 + \dots + (99)^5$ على 4 .

(٥) أثبت أن $63 \mid 2^{96} - 1$ ، $97 \mid 2^{48} - 1$.

(٦) بين بمثال على أن $a^2 \equiv b^2 \pmod{n} \not\Rightarrow a \equiv b \pmod{n}$.

(٧) أوجد أصغر عدد صحيح موجب m بحيث أن $m - (53)^2(79)^2$ يقبل القسمة على 19 .

(٨) إذا كان n عدداً فردياً، فأثبت بالاستقراء على n أن $a^{2^n} \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$.

(٩) (أ) إذا كان $a \equiv b \pmod{n}$ وكان $m \mid n$ ، فأثبت أن $a \equiv b \pmod{m}$.

(ب) بين بمثال على أن $a \equiv b \pmod{n}$ و $m \mid n$ لا يعني أن

$a \equiv b \pmod{m}$.

(١٠) إذا كان $ab \equiv cd \pmod{n}$ و $b \equiv d \pmod{n}$ ، $(b,n)=1$ ، فأثبت أن $a \equiv c \pmod{n}$.

(١١) إذا كان $a \equiv b \pmod{r}$ و $a \equiv c \pmod{s}$ ، $n = (r,s)$ ، فأثبت أن $b \equiv c \pmod{n}$.

(١٢) أي مما يأتي عبارة صحيحة ؟ أذكر السبب .

(أ) $a \equiv 3 \pmod{5} \Rightarrow (a,5) = 1$.

(ب) $a \equiv 4 \pmod{8} \Rightarrow (a,8) = 4$.

(ج) $12a \equiv 15 \pmod{35} \Rightarrow 4a \equiv 5 \pmod{7}$.

(د) $5a \equiv 5b \pmod{7} \Rightarrow a \equiv b \pmod{7}$.

(هـ) $3a \equiv b \pmod{4} \Rightarrow 15a \equiv 5b \pmod{20}$.

(و) $12a \equiv 12b \pmod{15} \Rightarrow a \equiv b \pmod{5}$.

□

٢-٣ : قابلية القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13

من التطبيقات المهمة للتطابقات ، إيجاد قواعد تبين ما إذا كان عدد صحيح يقبل القسمة على عدد صحيح آخر . وتعتمد تلك القواعد على تحديد العلاقة بين أرقام المقسوم المعبر عنها بالنظام العشري أو أي نظام آخر والمقسوم عليه . ولمعرفة تلك القواعد نورد ما يلي :

مبرهنة ١-٢-٣ :

إذا كان $f(x) = \sum_{i=0}^m c_i x^i$ ، $c_i \in \mathbb{Z}$ وكان $a \equiv b \pmod{n}$ ، فإن

$f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$.

البرهان :

بما أن $a \equiv b \pmod{n}$ بالفرض . إذاً $a^i \equiv b^i \pmod{n}$ لكل $i = 0, 1, \dots, m$ حسب نتيجة مبرهنة (3-1-5) . وعليه فإن $c_i a^i \equiv c_i b^i \pmod{n}$ لكل $i = 0, 1, \dots, m$ حسب مبرهنة (3-1-3د) .

وبالتالي فإن $\sum_{i=0}^m c_i a^i \equiv \sum_{i=0}^m c_i b^i \pmod{n}$ حسب مبرهنة (3-1-5أ) . لكن

$$f(a) \equiv f(b) \pmod{n} \text{ إذاً } f(b) = \sum_{i=0}^m c_i b^i , \quad f(a) = \sum_{i=0}^m c_i a^i$$

□

نتيجة :

إذا كان $f(x) = \sum_{i=0}^m c_i x^i$ ، $c_i \in \mathbb{Z}$ وكان $a \equiv b \pmod{n}$ و

$$f(a) \equiv 0 \pmod{n} , \quad \text{فإن } f(b) \equiv 0 \pmod{n}$$

البرهان :

بما أن $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$ حسب مبرهنة (3-2-1) ، و

$$f(a) \equiv 0 \pmod{n} \text{ إذاً } f(b) \equiv 0 \pmod{n}$$

□

تعريف 3-2-1 :

يقال عن $x = a$ أنه حل لكثيرة الحدود $f(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i \equiv 0 \pmod{n}$ ،

$$\text{إذا كان } c_i \in \mathbb{Z} \text{ ، } f(a) \equiv 0 \pmod{n}$$

مثال (1) :

لتكن $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$ ، $11 \equiv 3 \pmod{8}$ إذاً

$$f(3) = 3(9) + 2(3) - 5 = 28 , \quad f(11) = 3(11)^2 + 2(11) - 5 = 380$$

و $380 \equiv 28 \pmod{8}$. وعليه فإن $f(11) \equiv f(3) \pmod{8}$. وإذا كان

$$f(1) = 0 \equiv 0 \pmod{8} \text{ ، فإن } x = 1, 5 , \quad f(x) \equiv 0 \pmod{8}$$

$$f(5) = 80 \equiv 0 \pmod{8}$$

مثال (٢) :

إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ ، فإن أحاد العدد a^2 ينتمي إلى المجموعة $\{0,1,4,5,6,9\}$.

الحل :

بما أن $10 \equiv 0 \pmod{10}$. إذاً $a = \sum_{i=0}^n a_i 10^i \equiv a_0 \pmod{10}$ حسب مبرهنة

(١-٢-٣) . وعليه فإن $a^2 \equiv a_0^2 \pmod{10}$. لكن

$a_0 \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. إذاً $a_0^2 \pmod{10} = \{0,1,4,5,6,9\}$ وهذا يعني

أن أحاد العدد a^2 ينتمي إلى المجموعة $\{0,1,4,5,6,9\}$.

مبرهنة ٢-٢-٣ : "قابلية القسمة على 2,3,5,9,11"

إذا كان $a = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$ وكان $s = \sum_{i=0}^n a_i$ ، $t = \sum_{i=0}^n (-1)^i a_i$ ، فإن

$$2 \mid a_0 \Leftrightarrow 2 \mid a \quad (\text{أ}) \quad ، \quad 5 \mid a_0 \Leftrightarrow 5 \mid a \quad (\text{ب})$$

$$3 \mid s \Leftrightarrow 3 \mid a \quad (\text{ج}) \quad ، \quad 9 \mid s \Leftrightarrow 9 \mid a \quad (\text{د})$$

$$11 \mid T \Leftrightarrow 3 \mid a \quad (\text{هـ})$$

البرهان :

سنثبت (أ) ، (ج) ، (هـ) ونترك إثبات الباقي للقارئ .

لتكن $c_i \in \mathbb{Z}$ ، $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$

(أ) بما أن $10 \equiv 0 \pmod{2}$. إذاً $f(10) \equiv f(0) \pmod{2}$ حسب

مبرهنة (١-٢-٣) . لكن $f(10) = \sum_{i=0}^n a_i 10^i = a$ و $f(0) = a_0$. إذاً

$a \equiv a_0 \pmod{2}$ ، وعليه فإن $2 \mid a \Leftrightarrow 2 \mid a_0$ حسب مبرهنة (١-١-٣) .

(ج) بما أن $10 \equiv 1 \pmod{3}$. إذاً $f(10) \equiv f(1) \pmod{3}$ حسب مبرهنة

(١-٢-٣) . لكن $f(10) = a$ و $f(1) = \sum_{i=0}^n a_i = s$. إذاً $a \equiv s \pmod{3}$ ،

وعليه فإن $3 \mid a \Leftrightarrow 3 \mid s$ حسب مبرهنة (١-١-٣) .

(هـ) بما أن $10 \equiv -1 \pmod{11}$. إذاً $f(10) \equiv f(-1) \pmod{11}$ حسب مبرهنة (٣-٢-١) . لكن $f(10) = a$ و $f(-1) = t$. إذاً $a \equiv t \pmod{11}$ ، وعليه فإن $11 \mid a \Leftrightarrow 11 \mid t$.

□

مثال (٣) : أثبت أن

- (أ) 147381 يقبل القسمة على 3 ، (ب) 2358792 يقبل القسمة على 9 .
(ج) 61457 يقبل القسمة على 11 .

الإثبات :

(أ) بما أن $s = 1 + 8 + 3 + 7 + 4 + 1 = 24$ و $3 \mid 24$. إذاً 147381 يقبل القسمة على 3 حسب مبرهنة (٣-٢-٢) .

(ب) بما أن $s = 2 + 9 + 7 + 8 + 5 + 3 + 2 = 36$ و $9 \mid 36$. إذاً 2358792 يقبل القسمة على 9 .

(ج) بما أن $t = \sum_{i=0}^n a_i = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4$. إذاً

$t = (7 - 5) + (4 - 1) + 6 = 11$. إذاً 61457 يقبل القسمة على 11 .

مثال (٤) :

أثبت أن 874326 يقبل القسمة على 2 و 3 لكنه لا يقبل القسمة على 9 .

الإثبات :

ليكن $a = 874326$ ، $a_0 = 6$ و 6 تقبل القسمة على 2 ، إذاً a يقبل القسمة على 2 حسب مبرهنة (٣-٢-٢) . وحيث أن

$s = 6 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 = 30$ و $3 \mid s$ لكن $9 \nmid s$. إذاً $3 \mid a$ ، بينما $9 \nmid a$ حسب مبرهنة (٣-٢-٣) .

□

مبرهنة ٣-٢-٣: "قابلية القسمة على 7، 13"

إذا كان $a = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$ و

$$b = \frac{a - a_0}{10} = a_n 10^{n-1} + a_{n-1} 10^{n-2} + \dots + a_1$$

$$13 \mid (b - 9a_0) \Leftrightarrow 13 \mid a \quad (\text{ب}) \quad , \quad 7 \mid (b - 2a_0) \Leftrightarrow 7 \mid a \quad (\text{أ})$$

الإثبات :

(أ) بما أن $b = \frac{a - a_0}{10}$. إذاً $a = 10b + a_0$ ، وعليه فإن

$$b \equiv -20b \pmod{7} \text{ إذاً } 1 \equiv -20 \pmod{7} \text{ لكن } -2a = -20b - 2a_0$$

وعليه فإن $-2a \equiv b - 2a_0 \pmod{7}$ ، وبالتالي فإن

$$7 \mid (b - 2a_0) \Leftrightarrow 7 \mid -2a \text{ لكن } 2 \mid -2a \text{ و } (7, -2) = 1 \text{ ، إذاً}$$

$$7 \mid a \text{ حسب مبرهنة (٢-١-٩ب) ، وعليه فإن } 7 \mid (b - 2a_0) \Leftrightarrow 7 \mid a$$

(ب) بما أن $a = 10b + a_0$. إذاً $-9a = -90b - 9a_0$. لكن

$$1 \equiv -90 \pmod{13} \text{ إذاً } b \equiv -90 \pmod{13} \text{ ، وعليه فإن}$$

$$13 \mid b - 9a_0 \Leftrightarrow 13 \mid -9a \text{ لكن } 13 \mid -9a \text{ و } (13, -9) = 1 \text{ . إذاً}$$

$$13 \mid a \text{ حسب مبرهنة (٢-١-٩ب) ، وعليه فإن}$$

$$13 \mid (b - 9a_0) \Leftrightarrow 13 \mid a$$

□

مثال (٥) :

أثبت أن $7 \mid 153279$ بينما $7 \nmid 65435$.

الإثبات :

بما أن $7 \mid (b - 2a_0) \Leftrightarrow 7 \mid a$ إذاً

$$7 \mid 153279 \Leftrightarrow 7 \mid (15327 - 18) \Leftrightarrow 7 \mid 15309 \Leftrightarrow 7 \mid (1530 - 18)$$

$$\Leftrightarrow 7 \mid 1512 \Leftrightarrow 7 \mid (151 - 4) \Leftrightarrow 7 \mid 147 \Leftrightarrow 7 \mid (14 - 14) \Leftrightarrow 7 \mid 0$$

$$\text{إذاً } 7 \mid 153279$$

$$\begin{aligned} 7 \setminus 65435 &\Leftrightarrow 7 \setminus (6543 - 10) \Leftrightarrow 7 \setminus 6533 \Leftrightarrow 7 \setminus (653 - 6) \\ &\Leftrightarrow 7 \setminus 647 \Leftrightarrow 7 \setminus (64 - 14) \Leftrightarrow 7 \setminus 50 \Leftrightarrow 7 \setminus 5 \\ &\text{و } 7 \setminus 5 \text{ . إذا } 7 \setminus 65435 \end{aligned}$$

مثال (٦) :

أثبت أن 104741 يقبل القسمة على 13 .

الإثبات :

$$\begin{aligned} \text{بما أن } 13 \setminus a &\Leftrightarrow 13 \setminus (b - 9a_0) \text{ حسب مبرهنة (٣-٢-٣) . إذا} \\ 13 \setminus 104741 &\Leftrightarrow 13 \setminus (10474 - 9) \Leftrightarrow 13 \setminus 10465 \Leftrightarrow 13 \setminus (1046 - 45) \\ &\Leftrightarrow 13 \setminus 1001 \Leftrightarrow 13 \setminus (100 - 9) \Leftrightarrow 13 \setminus 91 \Leftrightarrow 13 \setminus 0 \\ &\text{وعليه فإن } 104741 \text{ يقبل القسمة على } 13 . \end{aligned}$$

ملاحظة :

يورد ابن البنا المراكشي (٦٥٤-٧٢١هـ) في مخطوطة " المقالات في علم الحساب تحقيق أحمد سليم سعيدان (١٤٧-١٤٨) " طريقتين لمعرفة ما إذا كان عدد يقبل القسمة على سبعة .

الطريقة الأولى :

تعتمد هذه الطريقة على القاعدة الآتية وهي أن " باقي قسمة عشرة على سبعة هو ثلاثة ، وباقي قسمة مائة على سبعة هو اثنان ، وباقي قسمة الألف على سبعة هو ستة ، وباقي قسمة العشرة آلاف على سبعة هو أربعة ، وباقي قسمة المائة ألف على سبعة هو خمسة ، وباقي قسمة المليون على سبعة هو واحد ، ومن ثم يعود الدور بمعنى أن باقي قسمة العشرة ملايين على سبعة هو ثلاثة وهكذا . والعمل بهذه الطريقة هو :

" ننزل العدد في سطر ونضع تحته هذه الأعداد الواحد تحت الأحاد ، والثلاثة تحت العشرات ، والاثنين تحت المئات ، والستة تحت الآلاف ، والأربعة تحت عشرات الآلاف ، والخمسة تحت مئات الألوف ، والواحد تحت الملايين . "

ثم نكرر هذه الأعداد الستة بعينها تحت باقي المراتب على التوالي ، فإذا فعلت ذلك ، فأضرب ما في كل مرتبة من العدد ، فيما تحته وأطرح الخارج ، سبعة سبعة (أقسمه على سبعة) فما بقي فأثبته على رأسها فإذا تمت المراتب بهذا العمل ، فأرجع إلى الباقي فوق الخط ، فأجمع بعضه إلى بعض ، كالأحاد ، وأقسم المجتمع على سبعة فما بقي هو الجواب .

مثال (٧) : أثبت أن

(أ) 7865431 يقبل القسمة على 7 ، (ب) 65463 لا يقبل القسمة على 7 .

الإثبات :

(أ) بما أن $\begin{array}{r} 0532121 \\ 7865431 \\ 1546231 \end{array}$ و $0+5+3+2+1+2+1=14 \equiv 0 \pmod{7}$.

إذا $7 \nmid 7865431$

(ب) بما أن $\begin{array}{r} 32143 \\ 65463 \\ 46231 \end{array}$ و $3+2+1+4+3=13 \equiv 6 \pmod{7}$. إذا

$7 \nmid 65463$

الطريقة الثانية :

إذا كان $a = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$ ، وكان

$$[[[3(3a_n + a_{n-1}) + a_{n-2}] \times 3 + a_{n-3}] \times 3 + \dots] \times 3 + a_1] \times 3 + a_0$$

يقبل القسمة على 7 . فإن a يقبل القسمة على 7 .

مثال (٨) :

أثبت أن 14378 يقبل القسمة على 7 .

الإثبات :

بما أن $[[[3(3 \times 1 + 4) + 3] \times 3 + 7] \times 3 + 8 = 245$ ولكي نثبت أن 245 يقبل

القسمة على 7 ، لاحظ أن $3(3 \times 2 + 4) + 5 = 77$ و $7 \nmid 77$. إذا $7 \nmid 245$

وعليه فإن $7 \nmid 14378$.

تمارين

- (١) إذا كان $f(x) = x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ وكان $7 \equiv 2 \pmod{5}$ ، فأثبت أن $f(a) \equiv 0 \pmod{5}$ ، وأوجد $a \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $f(7) \equiv f(2) \pmod{5}$
- (٢) أثبت أن 42726132117 يقبل القسمة على 3 ، 9 .
- (٣) هل أن العدد 1120378 يقبل القسمة على 2 ، 7 ، 11 ، 13 ؟
- (٤) ليكن $a = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$
- (أ) إذا كان $2 \nmid a$ ، فأثبت أن $a_0 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$.
- (ب) إذا كان $5 \nmid a$ ، فأثبت أن $a_0 \in \{0, 5\}$.
- (٥) إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ وكان أحاد العدد a^3 يساوي r ، فأثبت أن $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
- (٦) إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ وكان أحاد العدد a^4 يساوي r ، فأثبت أن $r \in \{0, 1, 5, 6\}$.
- (٧) أثبت أن كلاً من العددين 521125 ، 74833847 يقبل القسمة على 11 .
- (٨) هل أن العدد 1010908899 يقبل القسمة على 7 ، 11 ، 13 ؟
- (٩) إذا كان $f(a) \equiv b \pmod{n}$ ، فأثبت أن $f(a + nr) \equiv b \pmod{n}$ لكل $r \in \mathbb{Z}$. " لاحظ أن $a + nr \equiv a \pmod{n}$ لكل $r \in \mathbb{Z}$ " .
- (١٠) إذا كان $a = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b$ ، $s = \sum_{i=0}^n a_i$ ، فأثبت أن $b-1 \mid s \Leftrightarrow b-1 \mid a$.
- (١١) إذا كان $a = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_9$ ، فأثبت $3 \nmid a \Leftrightarrow 3 \nmid a_0$.

(١٢) إذا كان $a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_9$ ، فهل أن a يقبل القسمة على 3 ، 8 ،
عندما :

(أ) $a = 16485$ ، (ب) $a = 447836$

(ج) $a = 65423$ ، (د) $a = 54321$

(١٣) إذا كان $a = (a_n a_{n-1} \cdots a_m a_{m-1} \cdots a_1 a_0)_{10}$ ، وكان
 $b = (a_{m-1} a_{m-2} \cdots a_1 a_0)_{10}$ ، فأثبت أن .

(أ) $2^m \mid a \Leftrightarrow 2^m \mid b$ " لاحظ أن $2^m \mid a \Leftrightarrow a \equiv 0 \pmod{2^m}$. "

(ب) $5^m \mid a \Leftrightarrow 5^m \mid b$ " لاحظ أن $5^m \mid a \Leftrightarrow a \equiv 0 \pmod{5^m}$. "

(ج) أوجد أعلى قوة m للعدد 2 بحيث أن 53468148 يقبل القسمة
على 2^m .

(د) أوجد أعلى قوة m للعدد 5 بحيث أن 18436375 يقبل القسمة
على 5^m .

(١٤) (أ) إذا كان $a = 1000m + r$ ، $0 \leq r < 1000$ وكان $b = 7, 11, 13$ ،

فأثبت أن $b \mid a \Leftrightarrow b \mid (m - r)$.

" ملاحظة $a = 1001m - (m - r)$ "

(ب) أستخدم (أ) وأثبت أن 984211536217 يقبل القسمة على 7, 13 ولا

يقبل القسمة على 11 .

٣-٣ : أنظمة البواقي Residue systems

أثبتنا في مبرهنة (٣-٢-٢) أن علاقة التطابق قياس n هي علاقة تكافؤ

على المجموعة Z . وحيث أن كل علاقة تكافؤ تجزئ المجموعة المعرفة عليها

إلى فصول أو صفوف تكافؤ (Equivalent classes) . إذاً

$$Z/\equiv_n = \{[a] \mid a \in Z\}$$

لكن صف أو فصل التكافؤ [a] والذي يحول العنصر a هو

$$\begin{aligned}\bar{a} = [a] &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a \pmod{n}\} \\ &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b = a + nr, r \in \mathbb{Z}\} = \{a + nr \mid r \in \mathbb{Z}\}\end{aligned}$$

إذاً

$$\begin{aligned}\bar{0} = [0] &= \{nr \mid r \in \mathbb{Z}\}, \quad \bar{1} = [1] = \{1 + nr \mid r \in \mathbb{Z}\} \\ \bar{2} = [2] &= \{2 + nr \mid r \in \mathbb{Z}\}, \dots, \quad \overline{n-1} = [n-1] = \{-1 + (n+1)r \mid r \in \mathbb{Z}\} \\ \bar{n} = [n] &= \{n + nr \mid r \in \mathbb{Z}\} = \{(r+1)n \mid r \in \mathbb{Z}\} = [0] \\ [n+1] &= \{n+1 + nr \mid r \in \mathbb{Z}\} = \{1 + (r+1)n \mid r \in \mathbb{Z}\} = [1], \dots \\ [2n-1] &= [n-1], [2n], [0], [2n+1] = [1], \dots\end{aligned}$$

وعليه فإذا رمزنا للمجموعة \mathbb{Z}/\equiv_n بالرمز \mathbb{Z}_n ، نجد أن $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ والتي تسمى مجموعة البواقي (Residue classes) قيساً لـ n ، وعندما $n=4$ ، نجد أن

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_4 &= \{[0], [1], [2], [3]\} \text{ حيث} \\ [0] &= \{0, \bar{4}, \bar{8}, \dots\}, \quad [1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\} \\ [2] &= \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}, \quad [3] = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}\end{aligned}$$

والآن إلى بعض خواص فصول التطابق

مبرهنة ٣-٣-١:

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}_n$ وكان $a \not\equiv b \pmod{n}$.

البرهان:

بما أن $a \not\equiv b$ ، إذاً إما $a > b$ أو $a < b$ ، فإذا كان $a > b$ ، فإن $0 < a - b < n - 1 - b = n - (1 + b) < n$ ، وعليه فإن $0 < a - b < n - 1 - b = n - (1 + b) < n$ ، وبالتالي فإن $a - b \not\equiv 0 \pmod{n}$ ، وعليه فإن $a \not\equiv b \pmod{n}$. وإذا كان $a < b$ فإن $0 < b - a < n$ ، وعليه فإن $b - a \not\equiv 0 \pmod{n}$ وهذا يعني أن $a \not\equiv b \pmod{n}$.

مبرهنة ٣-٣-٢ :

كل عدد صحيح يطابق عدداً وحيداً من الأعداد $0, 1, \dots, n-1$.
أي أن إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ فيوجد عنصر وحيد $r \in \mathbb{Z}_n$ بحيث $a \equiv r \pmod{n}$.

البرهان :

بالقسمة الخوارزمية يمكننا إيجاد عددين وحيدين $m, r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن
 $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ، $a = mn + r$ ، وعليه فإن $a \equiv r \pmod{n}$ ،
ولإثبات وحدانية r نفرض وجود عدد آخر $s \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ و
 $a \equiv s \pmod{n}$. إذاً $s \equiv r$ ، وعليه فإن $s = r$ حسب مبرهنة (٣-٣-١).
□

نستنتج من المبرهنتين (٣-٣-١) و (٣-٣-٢) أن لكل عدد صحيح موجب n
يوجد n من فصول التكافؤ قياس n وهي $[0], [1], \dots, [n-1]$ يطلق عليها
البواقي قياس n (Residue classes modulo n).

تعريف ٣-٣-١ :

يقال $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ أنها نظام بواقٍ تام أو مكتمل
(Complete Residue system) قياس n ، إذا كان كل عدد صحيح يطابق
عدداً وحيداً من الأعداد a_0, \dots, a_{n-1} قياس n .
إذاً $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ نظام بواقٍ تام قياس n إذا وإذا فقط كان
 $a \in \mathbb{Z}$ لكل $a \in \{[a_0], \dots, [a_{n-1}]\}$.
يطلق أحياناً على المجموعة $\{[a_0], \dots, [a_{n-1}]\}$ مجموعة البواقي التامة
قياس n .

مثال (١) :

(أ) $\{0, 1, \dots, n-1\}$ نظام بواقٍ تام قياس n و $\mathbb{Z}_n = \{[0], \dots, [1]\}$
مجموعة بواقٍ تامة قياس n .

(ب) $c = \{0,1,2,3,4\}$ نظام بواقي تام قياس 5 ، لأن
 $Z_5 = \{[0],[1],[2],[3],[4]\}$ مجموعة بواقي تامة قياس n .

(ج) $c = \{0,-9,12,8,14\}$ نظام بواقي تام قياس 5 ، لأن $0 \equiv 0 \pmod{5}$ ،
 $14 \equiv 4 \pmod{5}$ ، $8 \equiv 3 \pmod{5}$ ، $12 \equiv 2 \pmod{5}$ ، $-9 \equiv 1 \pmod{5}$
 وبالتالي فإن $S = \{[0],[14],[8],[12],[14]\}$ مجموعة بواقي تامة
 قياس 5 .

(د) $\{2,4,6,8,11\}$ نظام بواقي قياس 5 غير تام (مكتمل) ، لأن
 $\{[2],[4],[6],[8],[11]\}$ مجموعة بواقي غير تامة ، وذلك لأن
 $8 \equiv 3 \pmod{5}$ ، $6 \equiv 1 \pmod{5}$ ، $4 \equiv 4 \pmod{5}$ ، $2 \equiv 2 \pmod{5}$
 . $11 \equiv 1 \pmod{5}$

مبرهنة ٣-٣-٣ :

$C = \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ نظام بواقي تام (مكتمل) قياس n إذاً وإذا فقط كان
 $a_i \neq a_j$ لكل $1 \leq i, j \leq n-1, i \neq j$

البرهان :

$C = \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ نظام بواقي تام (مكتمل) قياس n إذاً وإذا فقط كانت
 $\{[a_0], \dots, [a_{n-1}]\}$ مجموعة بواقي تامة قياس n إذاً وإذا فقط كان $a_i \neq a_j$
 لكل $1 \leq i, j \leq n-1, i \neq j$ حسب مبرهنة (٣-٣-١) .

□

نتيجة (١) :

أي n من الأعداد الصحيحة المتتالية تمثل نظام بواقي تام قياس n .

البرهان :

ليكن a عدداً صحيحاً . إذاً $S = \{a, a+1, \dots, a+n-1\}$ مجموعة من الأعداد
 الصحيحة المتتالية و $|S| = n$.

وإذا كان $a + b, a + c \in S$ ، $b, c \in C = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ، فإن
 $a + b \equiv a + c \pmod{n}$ و $b \equiv c \pmod{n}$ يعني أن $b \neq c$ وهذا يناقض
 $a + b \equiv b + c \pmod{n}$ إذاً $a + b \neq b + c$. إذاً $C = \{0, 1, \dots, n-1\}$ نظام بواقي تام قياس n .
 وعليه فإن S نظام بواقي تام قياس n حسب مبرهنة (٣-٣-٣) .

□

نتيجة (٢) :

إذا كان C نظام بواقي تام قياس n وكان $a \in \mathbb{Z}$ ، $(a, n) = 1$ ، فإن
 $D = \{ax + b \mid x \in C\}$ نظام بواقي تام قياس n لكل $b \in \mathbb{Z}$.

البرهان :

نفرض أن $x, y \in C$ ، $ax + b \equiv ay + b \pmod{n}$. إذاً $ax \equiv ay \pmod{n}$.
 لكن $(a, n) = 1$ ، إذاً $x \equiv y \pmod{n}$ حسب مبرهنة (٤-١-٣) ، وهذا يناقض
 كون C ، $x, y \in C$ ، نظام بواقي مكتمل قياس n . إذاً $ax + b \neq ay + b$ لكل
 $x \neq y$ ، $x, y \in C$ ، وعليه فإن D نظام بواقي تام قياس n حسب
 مبرهنة (٣-٣-٣) .

□

مثال (٢) :

(أ) $C = \{0, 1, -3, -7, 17\}$ نظام بواقي تام قياس 5 ، لأن $a \not\equiv b \pmod{5}$ لكل
 $a, b \in C$ و $a \neq b$ حسب مبرهنة (٣-٣-٣) .
 (ب) $C = \{7, 8, 9, 10, 11\}$ نظام بواقي تام قياس 5 ، لأن C مجموعة من
 الأعداد الصحيحة المتتالية و $|C| = 5$ حسب نتيجة (١) من
 مبرهنة (٣-٣-٣) .

(ج) $D = \{15, 21, 27, 33, 39\}$ نظام بواقي تام قياس 5 ، حسب نتيجة (٢) ،
 مبرهنة (٣-٣-٣) ، $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ، نظام بواقي تام قياس 5 و
 $D = \{6x + 15 \mid x \in C\}$.

ولدراسة أنظمة البواقي المختزلة نورد ما يلي :

تعريف ٣-٣-٢ : " دالة أويلر Euler phi function "

دالة أويلر $\phi(n)$ هي عدد الأعداد الصحيحة الموجبة الأقل من أو تساوي n والأولية نسبياً مع n .

$$\phi(n) = |\{m \in \mathbb{Z} | 1 \leq m \leq n, (m, n) = 1\}|$$

مثال (٣) :

$$\phi(4) = |\{1, 3\}| = 2, \quad \phi(3) = |\{1, 2\}| = 2$$

$$\phi(8) = |\{1, 3, 5, 7\}| = 4, \quad \phi(9) = |\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}| = 6$$

تعريف ٣-٣-٣ :

إذا كان C نظام بواقي تام قياس n ، فيقال عن مجموعة جزئية R من C أنها نظام بواقي مختزل قياس n (Reduced residue system modulo n) ، إذا كان $R = \{a \in C | (a, n) = 1\}$.
إذا R نظام بواقي مختزل قياس n ، إذا كان :

$$|R| = \phi(n) \quad (\text{ب}) \quad , \quad a \in R \text{ لكل } (a, n) = 1 \quad (\text{أ})$$

$$a \neq b \pmod{n} \text{ لكل } a, b \in R \text{ و } a \neq b \quad (\text{ج})$$

مثال (٤) :

(أ) إذا كان $n = 6$ ، فإن $R = \{1, 5\}$ نظام بواقي مختزل قياس 6 ، لأن $(1, 6) = (5, 6) = 1$ و $|R| = \phi(6) = 2$ ، $1 \not\equiv 5 \pmod{6}$.

(ب) إذا كان $n = 10$ ، فإن $R = \{1, 3, 7, 9\}$ نظام بواقي مختزل قياس 10 ، لأن $(1, 10) = (3, 10) = (7, 10) = (9, 10) = 1$ و $|R| = 4 = \phi(10)$ و $a \not\equiv b \pmod{10}$ لكل $a, b \in R$ ، $a \neq b$.

(ج) $R = \{-3, -11, 3, 9\}$ ليس نظام بواقي مختزل قياس 10 ، لأن $9 \equiv -11 \pmod{10}$.

وأخيراً إلى خواص الأنظمة المختزلة .

مبرهنة ٣-٣-٤ :

إذا كانت R نظام بواقي مختزل قياس n ، وكان $(a,n)=1$ ، فيوجد عنصر وحيد $b \in R$ بحيث أن $a \equiv b \pmod{n}$.

البرهان :

ليكن C نظام بواقي تام قياس n وأن $R \subseteq C$. إذاً $(a,n)=1$ يعني وجود عنصر وحيد $b \in C$ بحيث أن $a \equiv b \pmod{n}$ ، وعليه فإن $(a,n)=(b,n)$ ، لكن $(a,n)=1$. إذاً $(b,n)=1$ وبالتالي فإن $b \in R$.

□

مثال (٥) :

$R = \{1, 3\}$ نظام بواقي مختزل قياس 4 ، لأن $(1,4)=(3,4)=1$ و $|R|=2=\phi(4)$ ، $1 \not\equiv 3 \pmod{4}$. والآن إذا كان $a=5$ ، فإن $(a,4)=1$ و $aR = \{5, 15\}$ نظام بواقي مختزل قياس 4 لأن $(5,4)=(15,4)=1$ ، كما أن $|aR|=2=\phi(4)$ ، $5 \not\equiv 15 \pmod{4}$. وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي .

مبرهنة ٣-٤-٥ :

إذا كان R نظام بواقي مختزل قياس n ، وكان $(a,n)=1$ ، فإن $aR = \{ar \mid r \in R\}$ نظام بواقي مختزل قياس n .

البرهان :

بما أن R نظام بواقي مختزل قياس n و $r \in R$ ، إذاً $(r,n)=1$. لكن $(a,n)=1$ بالفرض ، إذاً $(ar,n)=1$ حسب مبرهنة (٢-١-١٩) . لكن $|R|=|aR|$ و $|R|=\phi(n)$. إذاً $|aR|=\phi(n)$. والآن إذا كان $r_1, r_2 \in R$ و $ar_1 \equiv ar_2 \pmod{n}$ ، فإن $r_1 \equiv r_2 \pmod{n}$ حسب مبرهنة (٣-١-٤) . وهذا يناقض كون R نظام بواقي مختزل قياس n . إذاً $ar_1 \not\equiv ar_2$ لكل $r_1, r_2 \in aR$ ، وعليه فإن aR نظام بواقي مختزل قياس n .

□

تمارين

- (١) أثبت أن كلاً من $\{0,1,2,3,4,5\}$ ، $\{6,13,26,39,10,17\}$ نظام بواقلي تام قياس 6 .
- (٢) أثبت أن كلاً من $\{-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$ ، $\{0,3,6,9,12,15,18,21\}$ نظام بواقلي تام قياس 8 ، بينما $\{0,2,4,6,8,10,12,14\}$ نظام بواقلي غير تام قياس 8 .
- (٣) (أ) أثبت أن كلاً من $\{7,11,13,17,19,23,29\}$ ، $\{0,3,3^2,3^3,3^4,3^5,3^6\}$ ، $\{4,8,12,16,20,24,28\}$ نظام بواقلي تام قياس 7 .
 (ب) أثبت أن كلاً من $\{0,3,2^2,2^3,2^4,2^5,2^6\}$ ، $\{a, a+2^{n-1} \mid a \in \mathbb{Z}, n=1,2,\dots,7\}$ نظام بواقلي غير تام قياس 7 .
- (٤) أي مما يأتي نظام بواقلي تام قياس 9
 $\{0,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1\}$ ، $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$
 $\{1,3,5,7,9,11,13,15,17\}$ ، $\{0,2,4,6,8,10,12,14,19\}$
- (٥) إذا كان p عدداً أولياً و $a \in \mathbb{Z}$ ، $p \nmid a$ ، فأثبت أن $\{0,2a,3a,\dots,(p-1)a\}$ نظام بواقلي تام قياس p .
- (٦) إذا كان $n = 2m$ ، فأثبت أن $\{0,1,2,\dots,m-1,m,-(m-1),\dots,-2,-1\}$ نظام بواقلي تام قياس n .
- (٧) إذا كان $n = 2m + 1$ ، فأثبت أن $\{0,1,2,\dots,m,-m,\dots,-2,-1\}$ نظام بواقلي تام قياس n .
- (٨) أثبت أن $\{-31,-16,-8,13,25,80\}$ نظام بواقلي مختزل قياس 9 .

(٩) أثبت أن $\{3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6\}$ نظام بواقي مختزل قياس 14 .

(١٠) إذا كان p عدداً أولياً ، فأثبت أن

نظام بواقي مختزل قياس p $\left\{ -\frac{p-1}{2}, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2} \right\}$

(١١) أثبت أن $\{4, 8, 12, 16, 20, 24\}$ نظام بواقي مختزل قياس 7 .

(١٢) أي مما يأتي بنظام بواقي مختزل قياس 8 :

$\{-1, 8, 11, 17\}$ ، $\{3, 15, 21, 23\}$ ، $\{11, 33, 55, 77\}$ ، $\{-5, -7, 5, 7\}$

٣-٤ : التطابقات الخطية ومبرهنة الباقي الصينية .

سنركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة التطابقات الخطية بمتغير واحد

ومتغيريين وأنظمة التطابقات الخطية إضافة إلى مبرهنة الباقي الصينية .

تعريف ٣-٤-١ :

يقال عن علاقة تطابق أنها علاقة تطابق خطي بمتغير واحد إذا كان

$$ax \equiv b \pmod{n} \quad \dots (1)$$

ويقال عن $x_1 \in \mathbb{Z}$ أنه حل للتطابق الخطي (1) ، إذا كان $ax_1 \equiv b \pmod{n}$

ويقال عن حلين $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ أنهما متطابقين (congruent solutions) ، إذا كان

$x_1 \equiv x_2 \pmod{n}$ ، ويقال عن حلين $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ أنهما غير متطابقين

(incongruent solutions) ، إذا كان $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{n}$.

مثال (١) :

(أ) إذا كان $3x \equiv 1 \pmod{4}$ ، فإن 3,7 حلان متطابقان لذلك التطابق ، لأن

$$3 \times 3 \equiv 1 \pmod{4} \text{ و } 7 \times 3 \equiv 1 \pmod{4} ، 7 \equiv 3 \pmod{4}$$

(ب) إذا كان $2x \equiv 6 \pmod{8}$ ، فإن 7,3 حلان غير متطابقين ، لأن

$$2 \times 3 \equiv 6 \pmod{8} \text{ و } 2 \times 7 \equiv 6 \pmod{8} \text{ بينما } 7 \not\equiv 3 \pmod{8}$$

ولدراسة نوعية الحلول ، نورد الآتي :

مبرهنة ٣-٤-١ :

إذا كان $(a, n) = 1$ ، فإن للتطابق الخطي $ax \equiv b \pmod{n}$ حل وحيد قياس n .

البرهان :

ليكن R نظام بواقي تام قياس n . إذاً $aR = \{ ax \mid x \in R \}$ نظام بواقي تام قياس n حسب مبرهنة (٣-٣-١) ، وعليه يوجد عنصر وحيد $ax \in aR$ بحيث أن $ax \equiv b \pmod{n}$.

□

ملاحظة :

أن مبرهنة (٣-٤-١) تعني أنه إذا كان $c \in \mathbb{Z}$ حلاً للتطابق الخطي $ax \equiv b \pmod{n}$ ، فإن $ac \equiv b \pmod{n}$ ، وأن أي عدد صحيح $e \in \mathbb{Z}$ يكون حلاً للتطابق الخطي $ax \equiv b \pmod{n}$ إذاً وإذا فقط كان $c \equiv e \pmod{n}$ ، لأن $ac \equiv b \pmod{n}$ و $ae \equiv b \pmod{n}$ يعني أن $ac \equiv ae \pmod{n}$. لكن $(a, n) = 1$ ، إذاً $c \equiv e \pmod{n}$ حسب نتيجة (٣-٣-١) .

وقبل أن نعطي نتيجتين مهمتين للمبرهنة (٣-٤-١) ، نورد التعريف الآتي .

تعريف ٣-٤-٢ :

يقال عن $b \in \mathbb{Z}$ أنه معكوس أو نظير (Inverse) ضربي للعدد $a \in \mathbb{Z}$ قياس n ، إذا كان $ab \equiv 1 \pmod{n}$.

مثال (٢) :

$2 \in \mathbb{Z}$ معكوس ضربي للعدد $3 \in \mathbb{Z}$ قياس 5 ، لأن $3 \times 2 \equiv 1 \pmod{5}$ و $4 \in \mathbb{Z}$ معكوس ضربي للعدد $4 \in \mathbb{Z}$ قياس 5 ، لأن $4 \times 4 \equiv 1 \pmod{5}$.

نتيجة (١) :

إذا كان p عدداً أولياً و $p \nmid a$ فإن للتطابق الخطي $ax \equiv b \pmod{n}$ حل وحيد قياس p .

البرهان :

يترك للقارئ .

نتيجة (٢) :

يكون للعدد $a \in \mathbb{Z}$ معكوساً ضربياً قياس n إذاً وإذا فقط كان $(a, n) = 1$.

البرهان :

نفرض $b \in \mathbb{Z}$ هو المعكوس الضربي للعدد a قياس n . إذاً $ab \equiv 1 \pmod{n}$ ، وعليه فإن $n \mid ab - 1$ وهذا يعني وجود $r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $ab - 1 = nr$ ومنا نجد أن $ab + n(-r) = 1$ ، عليه فإن $(a, n) = 1$ حسب مبرهنة (٢-١-٨).

ولإثبات العكس نفرض أن $(a, n) = 1$. إذاً يوجد عنصر وحيد $b \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $ab \equiv 1 \pmod{n}$ حسب مبرهنة (٣-٤-١)، وعليه يوجد للعنصر $a \in \mathbb{Z}$ معكوس ضربى قياس n .

□

مثال (٣) :

حل كلاً من التطابقات الخطية الآتية :

$$(أ) \quad 4x \equiv 9 \pmod{7} \quad ، \quad (ب) \quad 11x \equiv 25 \pmod{60}$$

الحل :

(أ) بما أن $(4, 7) = 1$. إذاً للتطابق الخطي أعلاه حل وحيد هو $x \equiv 9 \cdot 4^{-1} \pmod{7}$. لكن $Z_7 = \{0, 1, 2, \dots, 6\}$ و $4^{-1} = 2 \in Z_7$ لأن $4 \times 2 = 1 \in Z_7$. إذاً $x \equiv 9 \times 2 \equiv 4 \pmod{7}$.

(ب) بما أن $(11,60)=1$. إذاً للتطابق الخطي $11x \equiv 25 \pmod{60}$ حل وحيد هو $x \equiv 25 \times 11^{-1} \pmod{60}$ لكن $11^{-1} = 11 \in \mathbb{Z}_{60}$. إذاً $x \equiv 25 \pmod{60}$ ، ومنها نجد أن $x \equiv 25 \pmod{60}$.

مثال (٤) :

حل التطابق الخطي

$$17x \equiv 60 \pmod{94} \quad \dots (2)$$

الحل :

بما أن $(17,94)=1$. إذاً يوجد حل وحيد للتطابق الخطي في (2) هو $x \equiv 25 \times (17)^{-1} \pmod{94}$ وقد يكون حساب $(17)^{-1} \in \mathbb{Z}_{94}$ صعباً لذلك يمكن حل المسألة بالطرق الآتية :

(أ) بما أن $(17,94)=1$. إذاً نوجد $r,s \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $94r + 17s = 1$ ، ولإيجاد r,s نستخدم القسمة الخوارزمية ، فنجد أن $94 = 5 \times 17 + 9$ ، $17 = 9 \times 1 + 8$ ، $9 = 8 \times 1 + 1$ ، $8 = 8 \times 1 + 0$ ، وعليه فإن $1 = 9 - 8$ لكن $8 = 17 - 9$. إذاً $1 = 9 - (17 - 9) = 2 \times 9 - 17$ لكن $9 = 94 - 5 \times 17$. إذاً $1 = 2 \times (94 - 5 \times 17) - 17 = 2 \times 94 - 11 \times 17$ ومنها نجد أن $17 \times (-11) \equiv 1 \pmod{94}$. لكن $-11 \equiv 83 \pmod{94}$. إذاً $17 \times 83 \equiv 1 \pmod{94}$ ، وعليه فإن $17^{-1} = 83 \in \mathbb{Z}_{94}$ ، وبالتالي فإن $x \equiv 60 \times (17)^{-1} \equiv 60 \times 83 \equiv 92 \pmod{94}$ حل للتطابق (2) .

(ب) بما أن $17x \equiv 60 \pmod{94}$ و $60 \equiv -34 \pmod{94}$. إذاً $17x \equiv -34 \pmod{94}$ لكن $(17,94)=1$. إذاً $x \equiv -2 \pmod{94}$. حسب نتيجة مبرهنة (٣-١-٤) . لكن $92 \equiv -2 \pmod{94}$. إذاً $x \equiv 92 \pmod{94}$ حل للتطابق (2) .

وقبل أن نعطي طريقة أخرى لحل ذلك التطابق ، نورد ما يلي

ملاحظة: $ax \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow ax - b = ny, y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow ny \equiv -b \pmod{a}$

فإذا كان y_1 حلاً للتطابق الخطي $ny \equiv -b \pmod{a}$ فإن

$ny_1 \equiv -b \pmod{a}$ يعني أن $ny_1 + b = ax_1, x_1 \in \mathbb{Z}$ ، ومنها نجد أن

$$x_1 = \frac{ny_1 + b}{a} \text{ حل للتطابق الخطي } ax \equiv b \pmod{n} .$$

وبالرجوع إلى التطابق الخطي $17x \equiv 60 \pmod{94}$ ، نجد أن

$94y \equiv -60 \pmod{17}$. لكن $-60 \equiv 8 \pmod{17}$. إذاً

$94y \equiv 8 \pmod{17}$. لكن $85y \equiv 0 \pmod{17}$. إذاً $9y \equiv 8 \pmod{17}$

حسب مبرهنة $(3-1-3)$ ، ومنها نجد أن $y \equiv 8(9)^{-1} \pmod{17}$. لكن

$9^{-1} = 2 \in \mathbb{Z}_{17}$. إذاً $y \equiv 16 \pmod{17}$ ، وعليه فإنه

$$17x \equiv 60 \pmod{94} \text{ حل للتطابق الخطي } x = \frac{ny + b}{a} = \frac{94 \times 16 + 60}{17}$$

وهذا يعني أن $x \equiv 92 \pmod{94}$ حل للتطابق الخطي $17x \equiv 60 \pmod{94}$

والآن إلى كيفية تحديد الحلول غير المتطابقة والمبرهنة الآتية .

مبرهنة ٣-٤-٢: ليكن $d = (a, n)$ ،

$$ax \equiv b \pmod{n} \quad \dots (3)$$

(أ) يوجد للتطابق الخطي (3) حل إذا وإذا فقط كان $d \mid b$.

(ب) إذا كان $d \mid b$ فيوجد للتطابق (3) ، d من الحلول غير المتطابقة قياس n .

البرهان:

(أ) نفرض أن x حل للتطابق الخطي (3) . إذاً $ax - b = nd$. لكن $d \mid n$ و

$d \mid a$. إذاً $d \mid b$. ولإثبات العكس لاحظ أن

$$ax \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow \frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}} .$$

لكن كل من a, b, n يقبل القسمة على d . إذا $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}, \frac{n}{d} \in \mathbb{Z}$ ، وحيث أن

$\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$ حسب نتيجة مبرهنة (٢-١-٨). إذا يوجد حل وحيد للتطابق

الخطي $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$ حسب مبرهنة (٣-٤-١). وعليه يوجد حل

للتطابق الخطي $ax \equiv b \pmod{n}$.

(ب) نفرض أن $\frac{a}{d} = c$ ، $\frac{n}{d} = m$ ، $\frac{b}{d} = e$. إذا

$$ax \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow cx \equiv e \pmod{m}, (c, m) = 1$$

وعليه يوجد حل وحيد $x \equiv x_0 \pmod{m}$ للتطابق الخطي

$cx \equiv e \pmod{m}$ حسب مبرهنة (٣-٤-١). لكن $0 \equiv mr \pmod{m}$

لكل $r \in \mathbb{Z}$. إذا $x \equiv x_0 + mr \pmod{m}$ حسب مبرهنة (٣-١-١٣)،

وعليه فإن جميع الحلول المتطابقة للتطابق الخطي $cx \equiv e \pmod{m}$ على

الشكل $x \equiv x_0 + mr \pmod{m}$ ، $r \in \mathbb{Z}$. لكن ليس كل الأعداد

الصحيحة على الشكل $x_0 + mr$ متطابقة قياس n . إذا الأعداد غير

المتطابقة قياس n تمثل الحلول غير المتطابقة للتطابق الخطي

$ax \equiv b \pmod{n}$. فإذا كان $x_0 + rm \equiv x_0 + sm \pmod{m}$ ، فإن

ذلك يعني أن $rm \equiv sm \pmod{n}$ ومنه نجد أن $r \equiv s \pmod{d}$ ، وعليه

إذا كان $r \in D = \{0, 1, \dots, d-1\}$ ، فإن $(m, d) = 1$ ،

$R = \{mr + x_0 \mid r \in D\}$ نظام بواقي تام قياس d كما أن $|R| = d$ ،

وعليه يوجد d من الحلول غير المتطابقة للتطابق الخطي (3) وهي:

$$x_0, x_0 + m, x_0 + 2m, \dots, x_0 + (d-1)m$$

إذا يوجد d من الحلول غير المتطابقة للتطابق الخطي (3) وهي:

$$x_0, x_0 + \frac{n}{d}, \dots, x_0 + \frac{(d-1)n}{d}$$

مثال (٥) :

أوجد الحلول غير المتطابقة للتطابق الخطي

$$32x \equiv 8 \pmod{42} \quad \dots (4)$$

الحل :

بما أن $(32,42) = 2$ و $2 \mid 8$. إذاً يوجد حلان غير متطابقين للتطابق

الخطي (4) حسب مبرهنة (٣-٤-٢) . لكن

$$32x \equiv 8 \pmod{42} \Rightarrow 16x \equiv 4 \pmod{21} \quad \dots (5)$$

وحيث أن $(16,21) = 1$. إذاً يوجد حل للتطابق الخطي (5) هو $x \equiv 4(16)^{-1} \pmod{21}$

لكن $16^{-1} = 4 \in \mathbb{Z}_{21}$. إذاً $x_0 \equiv 16 \pmod{21}$ ، لكن $D = \{0,1\}$ نظام

بواقفي تام قياس 2 . إذاً $R = \{x_0 + 21r \mid r \in D\}$ تمثل مجموعة الحلول غير

المتطابقة للتطابق الخطي (4) ومنها نجد أن $x = 16, 37$ حلان غير متطابقين

الخطي (4) .

مثال (٦) :

إذا كان $5x \equiv 8 \pmod{15}$ ، فإن $(5,15) = 3$ و $3 \nmid 8$. إذاً لا يوجد حل

للتطابق الخطي $5x \equiv 8 \pmod{15}$.

مثال (٧) :

حل التطابق الخطي

$$6x \equiv 9 \pmod{21} \quad \dots (6)$$

الحل :

بما أن $(6,21) = 3$ و $3 \mid 9$. إذاً يوجد ثلاثة حلول غير متطابقة للتطابق

الخطي (6) ، ولإيجادها لاحظ أن

$$6x \equiv 9 \pmod{21} \Leftrightarrow 2x \equiv 3 \pmod{7} \quad \dots (7)$$

وعليه فإن $x_0 \equiv 3(2^{-1}) \pmod{7}$. لكن $2^{-1} = 4 \in \mathbb{Z}_7$.

إذاً $x_0 = 3(4) \equiv 5 \pmod{7}$ وحيداً ث أن $D = \{0, 1, 2\}$ و
 عليه ، $R = \{5, 12, 19\}$. إذاً $R = \{7r + x_0 \mid r \in D\} = \{5 + 7r \mid r \in D\}$
 فإن الحلول غير المتطابقة للتطابق الخطي (6) هي 5, 12, 19 .

مثال (٨) :

حل التطابق

$$15x \equiv 25 \pmod{35}$$

... (8)

الحل :

بما أن $(15, 35) = 5$ و $5 \mid 25$. إذاً يوجد خمسة حلول غير متطابقة
 للتطابق الخطي (8) ، ولإيجاد تلك الحلول ، لاحظ أن

$$15x \equiv 25 \pmod{35} \Leftrightarrow 3x \equiv 5 \pmod{7} \quad \dots (9)$$

لكن $(3, 7) = 1$. إذاً $3^{-1} = 5 \in \mathbb{Z}_7$ ، وعليه فإن $x_0 \equiv 3^{-1}(5) \equiv 4 \pmod{7}$ لكن
 لكن $D = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ نظام بـواقـي تـام قـياس 5 ، إذاً
 $R = \{4 + 7r \mid r \in D\} = \{4, 11, 18, 25, 32\}$
 المتطابقة للتطابق (8) .

والآن إلى المبرهنة الآتية .

مبرهنة ٣-٤-٣ :

إذا كان $a_1, a_2, n, r \in \mathbb{Z}$ ، $n, r > 0$ ، فيوجد حل لنظام التطابق الخطي

$$x \equiv a_1 \pmod{n} \quad \dots (10)$$

$$x \equiv a_2 \pmod{r} \quad \dots (11)$$

إذاً وإذا فقط كان $(n, r) \mid (a_2 - a_1)$.

وإذا كان x حلاً للنظام أعلاه فإن $x \equiv x_1 \pmod{m}$ ، حيث $m = [n, r]$.

البرهان :

بما أن $x \equiv a_1 \pmod{n}$. إذاً يوجد $s \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $x = a_1 + ns$ ،

وبالتعويض في (11) ينتج أن $a_1 + ns \equiv a_2 \pmod{r}$ ، ومنها نجد أن

$$ns \equiv a_2 - a_1 \pmod{r} \quad \dots (12)$$

إذاً يوجد حل للتطابق الخطي (12) إذا وإذا فقط كان $(n,r) \mid a_2 - a_1$ حسب مبرهنة (3-4-2). والآن لنفرض أن x_0 حل للتطابق الخطي (12). إذاً جميع الحلول غير المتطابقة للتطابق الخطي (12) على الشكل

$$t \in \mathbb{Z}, \quad s = x_0 + \frac{tr}{(n,r)}$$

ومنها نجد أن

$$x = a_1 + ns = a_1 + \left(x_0 + \frac{rt}{(n,r)}\right)n = a_1 + x_0 n + \frac{nrt}{(n,r)}$$

لكن $x_1 = a_1 + x_0 n \in \mathbb{Z}$ و $\frac{nr}{(n,r)} = m$ حسب مبرهنة (2-3-5). إذاً

$$x = x_1 + mt, \quad x \equiv x_1 \pmod{m}$$

□

مثال (9):

$$x \equiv 3 \pmod{6} \quad \dots (13)$$

$$x \equiv 9 \pmod{15} \quad \dots (14)$$

الحل:

بما أن $(6,15) = 3$ و $3 \mid (9-3)$. إذاً يوجد حل للنظام المعطي، ولإيجاد ذلك الحل، لاحظ أن

$$r \in \mathbb{Z}, \quad x = 3 + 6r \quad \dots (15)$$

وبالتعويض في (14) ينتج أن $3 + 6r \equiv 9 \pmod{15}$ ومنها نجد أن

$$6r \equiv 6 \pmod{15}, \quad \text{وعليه فإن } r \equiv 1 \pmod{\left(\frac{15}{(6,15)}\right)}$$

وهذا يعني أن

$$r \equiv 1 \pmod{5}, \quad \text{وعليه فإن}$$

$$t \in \mathbb{Z}, \quad r = 1 + 5t \quad \dots (16)$$

ومن (16)، (15) ينتج أن $x = 3 + 6(1 + 5t) = 9 + 30t$ ، $t \in \mathbb{Z}$ ، وعليه

$$x \equiv 9 \pmod{30}$$

والآن إلى مبرهنة الباقي الصينية والتي سُميت بهذا الاسم لأن الرياضي الصيني Sun - Tsu سأل في القرن الأول قبل الميلاد عن العدد الذي إذا قُسم على 3 كان الباقي 2 ، وإذا قُسم على 5 كان الباقي 3 ، وإذا قُسم على 7 كان الباقي 2 ، وهذه المسألة تكافئ إيجاد الحل لنظام التطابق $x \equiv 2 \pmod{3}$ ، $x \equiv 2 \pmod{7}$ ، $x \equiv 3 \pmod{5}$.

" مبرهنة الباقي الصينية Chinese Remainder Theorem : ٤-٤-٣ "

إذا كان n_1, n_2, \dots, n_r أعداداً صحيحة موجبة وكان $(n_i, n_j) = 1$ لكل $i \neq j$ ، فيوجد للنظام

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{n_2}$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$x \equiv a_r \pmod{n_r}$$

حل وحيد قياس $n = \prod_{i=1}^r n_i$

" البرهان : " بالاستقراء على r

فإذا كان $r=1$ فلا يوجد ما نبرهنه ، أما إذا كان $r=2$ فإن $x \equiv a_1 \pmod{n_1}$ ، $x \equiv a_2 \pmod{n_2}$ و $(n_1, n_2) = 1$. ومبرهنة (٣-٤-٣) تضمن وجود حل وحيد لذلك النظام قياس $n_1 n_2$ وعليه فإن المبرهنة صحيحة عندما $r=2$.

والآن أفرض أن المبرهنة صحيحة إلى $(r-1)$ من المعادلات ، تجد وجود حل وحيد $x \equiv c \pmod{\left(\prod_{i=1}^{r-1} n_i\right)}$. ولإثبات صحة المبرهنة إلى r من المعادلات،

لاحظ أن $x \equiv c \pmod{\left(\prod_{i=1}^{r-1} n_i\right)}$ و $x \equiv a_r \pmod{n_r}$. لكن

$\left(\prod_{i=1}^{r-1} n_i, n_r\right) = 1$. إذاً يوجد حل وحيد قياس $n = \prod_{i=1}^{r-1} n_i$ حسب

مبرهنة (٣-٤-٣) .

مثال (١٠) :

حل النظام

$$\left. \begin{array}{l} x \equiv 2 \pmod{3} \quad \dots (17) \\ x \equiv 3 \pmod{5} \quad \dots (18) \\ x \equiv 2 \pmod{7} \quad \dots (19) \end{array} \right\} \dots (I)$$

الحل :

بما أن $(3,5) = (5,7) = (3,7) = 1$. إذا يوجد للنظام (I) حل وحيد قياس $(3 \times 5 \times 7 = 105)$ ، حسب مبرهنة الباقي الصينية . ولإيجاد ذلك الحل ،

لاحظ أن

$$x \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow x = 2 + 3r , r \in \mathbb{Z} \quad \dots (20)$$

وبالتعويض في (18) ينتج أن $2 + 3r \equiv 3 \pmod{5}$ ، ومنها نجد أن

$3r \equiv 1 \pmod{5}$ ، وعليه فإن $r = 3^{-1} = 2 \in \mathbb{Z}_5$ ، وبالتالي فإن

$r \equiv 2 \pmod{5}$ ، وعليه فإن $r = 2 + 5t$ ، $t \in \mathbb{Z}$ ، وبالتعويض في (20)

ينتج أن

$$x = 8 + 15t \quad \dots (21)$$

ومن (19) ، (21) نجد أن

$$8 + 15t \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow 15t \equiv -6 \pmod{7}$$

$$\Rightarrow 5t \equiv -2 \equiv 5 \pmod{7} \Rightarrow t \equiv 1 \pmod{7}$$

وعليه فإن $t = 1 + 7m$ ، $m \in \mathbb{Z}$ ، وبالتعويض في (21) ينتج أن

$$x = 23 + 105m \Rightarrow x \equiv 23 \pmod{105}$$

مثال (١١) :

أوجد أصغر عدد صحيح موجب إذا قُسم على 2 كان الباقي 3 ، وإذا قُسم على 5

كان الباقي 2 ، وإذا قُسم على 3 كان الباقي 5 ، وإذا قُسم على 7 كان الباقي 11 .

الحل :

بما أن

$$x \equiv 3 \pmod{2} \quad \dots (22)$$

$$x \equiv 2 \pmod{5} \quad \dots (23)$$

$$x \equiv 5 \pmod{3} \quad \dots (24)$$

$$x \equiv 11 \pmod{7} \quad \dots (25)$$

و $(2,5) = (2,3) = (2,5) = (5,3) = (5,7) = (3,7) = (2,7) = 1$ ، إذاً يوجد

حل وحيد للنظام أعلاه $x \equiv x_1 \pmod{210}$ ، ولإيجاد ذلك الحل ، لاحظ أن

$$x \equiv 3 \pmod{2} \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Z} : x = 3 + 2r \quad \dots (26)$$

وبالتعويض في (23) ينتج أن

$$3 + 2r \equiv 2 \pmod{5} \Rightarrow 2r \equiv -1 \pmod{5} \Rightarrow r \equiv 2 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow \exists t \in \mathbb{Z} : r = 2 + 5t \quad \dots (26)$$

ومن (27) ، (26) ينتج أن

$$x = 7 + 10t \quad \dots (28)$$

ومن (28) ، (24) ينتج أن

$$7 + 10t \equiv 5 \pmod{3} \Rightarrow 10t \equiv -2 \pmod{3} \Rightarrow 10t \equiv 1 \pmod{3}$$

$$\Rightarrow t \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow \exists s \in \mathbb{Z} : t = 1 + 3s$$

وبالتعويض في (28) ينتج أن

$$x = 17 + 30s \quad \dots (29)$$

ومن (29) ، (25) ينتج أن

$$17 + 30s \equiv 11 \pmod{7} \Rightarrow 30s \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow 2s \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\Rightarrow s \equiv 2^{-1} = 4 \in \mathbb{Z}_7$$

وعليه فإن $s = 4 + 7n$ ، $n \in \mathbb{Z}$ ، وبالتعويض في (29) ينتج أن

$x = 137 + 210n$ ، وعليه فإن $x \equiv 137 \pmod{210}$. إذاً أصغر عدد

صحيح موجب يحقق المطلوب هو 137 .

مثال (١٢) :

حل التطابق الخطي $13x \equiv 17 \pmod{42}$

الحل :

لاحظ أن

$$13x \equiv 17 \pmod{2} \Leftrightarrow x \equiv 1 \pmod{2} \quad \dots (30)$$

$$13x \equiv 17 \pmod{42} \Leftrightarrow 13x \equiv 17 \pmod{3} \Leftrightarrow x \equiv 2 \pmod{3} \quad \dots (31)$$

$$13x \equiv 17 \pmod{7} \Leftrightarrow x \equiv 4 \pmod{7} \quad \dots (32)$$

لأن

$$13x \equiv 17 \pmod{7} \Leftrightarrow 13x \equiv 3 \pmod{7} \Leftrightarrow 14x \equiv x + 3 \pmod{7}$$

$$\Leftrightarrow 0 \equiv x + 3 \pmod{7} \Leftrightarrow x \equiv -3 \pmod{7} \Leftrightarrow x \equiv 4 \pmod{7}$$

وحيث أن $(2,3) = (2,7) = (3,7) = 1$. إذاً للنظام أعلاه حل وحيد حسب

مبرهنة الباقي الصينية ، ولإيجاد ذلك الحل ، لاحظ أن

$$r \in \mathbb{Z} , \quad x = 1 + 2r \quad \dots (33)$$

ومن (31) ، (33) ينتج أن

$$r \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow r = 2 + 3t , \quad t \in \mathbb{Z}$$

وبالتعويض في (33) ، نجد أن

$$x = 5 + 6t \quad \dots (34)$$

ومن (34) ، (32) ، نجد أن

$$t \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow t = 1 + 7n , \quad n \in \mathbb{Z}$$

وبالتعويض في (34) ينتج أن $x = 11 + 42n$ ، وعليه فإن $x \equiv 11 \pmod{42}$.

وأخيراً إلى دراسة التطابق الخطي بمتغيرين والمبرهنة الآتية .

مبرهنة ٣-٤-٥ : يكون للتطابق الخطي

$$ax + by \equiv c \pmod{n} \quad \dots (35)$$

حلاً إذاً وإذا فقط كان $d \mid c$ حيث $d = (a, b, n)$.

البرهان :

بما أن $ax + by \equiv c \pmod{n} \Leftrightarrow by \equiv c - ax \pmod{n}$. إذا يوجد حل للتطابق الخطي (35) ، إذا وإذا فقط كان $(b,n) \mid (c - ax)$ حسب مبرهنة (3-4-2) . لكن

$$(b,n) \mid (c - ax) \Leftrightarrow ax \equiv c \pmod{(b,n)} \quad \dots (36)$$

وبتطبيق مبرهنة (3-4-2) مرة أخرى نجد أن للتطابق (36) حل إذا وإذا فقط كان $(a,(b,n)) \mid c$. لكن $(a,(b,n)) = (a,b,n) = d$. إذا للتطابق الخطي (35) حل إذا وإذا فقط كان $d \mid c$.

□

مثال (13) :

حل التطابق الخطي

$$5x + 7y \equiv 11 \pmod{9} \quad \dots (37)$$

الحل :

بما أن $(5,7,9) = 1$. إذا يوجد حل للتطابق الخطي (37) حسب مبرهنة (3-4-5) . ولإيجاد ذلك الحل ، لاحظ أن

$$5x \equiv 11 - 7y \pmod{9} \equiv 2 + 2y \pmod{9} \quad \text{لكن } 18 + 18y \equiv 0 \pmod{9}$$

$$\text{إذاً } 5x \equiv 2 + 2y + 18 + 18y \pmod{9}, \text{ وعليه فإن } 5x \equiv 20 + 20y \pmod{9}$$

$$\text{لكن } (5,9) = 1 \text{ . إذاً } x \equiv 4 + 4y \pmod{9} \text{ . لكن أي قيمة من قيم } y \in \mathbb{Z}_9$$

تعطي قيمة إلى $x \in \mathbb{Z}_9$. إذا مجموعة الحلول غير المتطابقة للتطابق الخطي

(37) هي

$$s = \{ (4 + 4y, y) \mid y \in \mathbb{Z}_9 \}$$

$$= \{ (4,0), (8,1), (3,2), (7,3), (2,4), (6,5), (1,6), (7,7), (0,8) \}$$

□

تمارين

(١) أوجد مجموعة الحل لكل من التطابقات الخطية الآتية :

$$\begin{array}{l} 8x \equiv 3 \pmod{27} \text{ (ب) ، } 3x \equiv 4 \pmod{5} \text{ (أ)} \\ 64x \equiv 83 \pmod{105} \text{ (د) ، } 20x \equiv 30 \pmod{4} \text{ (ج)} \\ 14x \equiv 18 \pmod{24} \text{ (و) ، } 15x \equiv 24 \pmod{35} \text{ (هـ)} \end{array}$$

(٢) حل كلاً من الأنظمة الآتية :

$$\begin{array}{l} x \equiv 8 \pmod{9} \text{ (ب) ، } x \equiv 4 \pmod{6} \text{ (أ)} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \quad x \equiv 13 \pmod{15} \\ x \equiv 2 \pmod{15} \text{ (د) ، } x \equiv 7 \pmod{21} \text{ (ج)} \\ x \equiv 7 \pmod{16} \quad x \equiv 3 \pmod{8} \end{array}$$

(٣) حل كلاً من الأنظمة الآتية :

$$\begin{array}{l} x \equiv 2 \pmod{6} \quad x \equiv 1 \pmod{11} \\ x \equiv 4 \pmod{11} \text{ (ب) ، } x \equiv 1 \pmod{6} \text{ (أ)} \\ x \equiv 3 \pmod{17} \quad x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{10} \quad x \equiv 7 \pmod{9} \\ x \equiv 11 \pmod{13} \text{ (د) ، } x \equiv 10 \pmod{4} \text{ (ج)} \\ x \equiv 15 \pmod{17} \quad x \equiv 1 \pmod{7} \\ 2x \equiv 1 \pmod{5} \quad x \equiv 2 \pmod{5} \\ 3x \equiv 9 \pmod{6} \quad x \equiv 3 \pmod{7} \\ 4x \equiv 1 \pmod{7} \text{ (و) ، } x \equiv 4 \pmod{9} \text{ (هـ)} \\ 5x \equiv 9 \pmod{11} \quad x \equiv 5 \pmod{11} \end{array}$$

(٤) أوجد أصغر عدد صحيح إذا قُسم على 3 كان الباقي 1 ، وإذا قُسم على 4

كان الباقي 2 ، وإذا قُسم على 5 كان الباقي 3 .

(٥) باستخدام مبرهنة الباقي الصينية ، أوجد حل كل من التطابقات الخطية الآتية

$$(أ) \quad 7x \equiv 1 \pmod{180} , \quad (ب) \quad 8x \equiv 7 \pmod{165}$$

(٦) برهن على وجود حل للنظام :

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{n_2}$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$x \equiv a_r \pmod{n_r}$$

إذا وإذا فقط كان $(a_i - a_j) \setminus (n_i, n_j)$ لكل i, j حيث $1 \leq i < j \leq r$ ، ثم أثبت أنه إذا كان ذلك الحل موجوداً فإنه على الشكل $x \equiv x_1 \pmod{m}$ حيث $m = [n_1, \dots, n_r]$.

(٧) حل كلاً مما يأتي :

$$(أ) \quad x \equiv 8 \pmod{9} , \quad (ب) \quad x \equiv 4 \pmod{6}$$

$$x \equiv 2 \pmod{3} \quad x \equiv 13 \pmod{15}$$

$$x \equiv 5 \pmod{7} \quad x \equiv 8 \pmod{14}$$

$$x \equiv 1 \pmod{7}$$

٥-٣ : "مبرهنتي أويلر وفيرما Euler and Fermat Theorems"

يعرف الصينيون قبل أكثر من 2000 سنة بأن $(2^p - 2)$ يقبل القسمة على p لأي عدد أولي p ، وقد عمم فيرما تلك الحقيقة بدون إثبات عام ١٦٤٠م إلى ما يسمى مبرهنة فيرما الصغيرة "Fermat's Little Theorem" والتي تنص على أن "إذا كان a عدداً صحيحاً لا يقبل القسمة على العدد الأولي p ، فإن $(a^{p-1} - 1)$ يقبل القسمة على p ."

وقد حصل الألماني ليبنز (١٦٤٦-١٧١٦) على نفس النتيجة وأثبتها بالأستقراء الرياضي سنة ١٦٨٣م "ولم ينشر البرهان". أما أول إثبات منشور لتلك المبرهنة فقد كان لأويلر سنة ١٧٣٦م ، ثم عمم أويلر تلك المبرهنة سنة ١٧٦٠م .
وسنركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة تلك المبرهنتين وبعض تطبيقاتهما .

مبرهنة ١-٥-٣ : " Euler's Theorem "

إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً وكان $a \in \mathbb{Z}$ ، $(a, n) = 1$ فإن

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

البرهان :

ليكن $R = \{r_1, \dots, r_{\phi(n)}\}$ نظام بواقلي مختزل قياس n . إذاً
 $aR = \{ar_1, \dots, ar_{\phi(n)}\}$ نظام بواقلي مختزل قياس n حسب مبرهنة (٥-٣-٣) ،
 كما أن $|R| = |aR| = \phi(n)$. وعليه فإن كل عنصر من عناصر aR يطابق
 عنصراً وحيداً من عناصر R ، وبالتالي فإن

$$\prod_{i=1}^{\phi(n)} (ar_i) \equiv \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \pmod{n} \text{ ، وعليه فإن}$$

$$a^{\phi(n)} \cdot \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \pmod{n} \text{ . لكن}$$

لكل $(r_i, n) = 1$ ، $1 \leq i \leq \phi(n)$. إذاً $(\prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i, n) = 1$ حسب

مبرهنة (١٩-١-٢) ، وعليه فإن $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ حسب نتيجة
 مبرهنة (٤-١-٣) .

□

نتيجة (١) : " مبرهنة فيرما الصغرى Fermat's Little Theorem "

إذا كان p عدداً أولياً وكان $a \in \mathbb{Z}$ و $p \nmid a$ ، فإن $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

البرهان :

بما أن $p \nmid a$. إذاً $(a, p) = 1$ ، وعليه فإن $a^{\phi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ حسب مبرهنة أويلر . لكن

$$\phi(p) = \left| \{ m \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq m \leq p : (m, p) = 1 \} \right| = \left| \{ 1, 2, 3, \dots, p-1 \} \right|$$

$$= p-1$$

إذاً $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

□

نتيجة (٢) :

إذا كان p عدداً أولياً فإن $a^p \equiv a \pmod{p}$.

البرهان :

أما $p \nmid a$ أو $p \mid a$. إذا كان $p \nmid a$ فإن $a \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $a^p \equiv 0 \pmod{p}$ حسب نتيجة مبرهنة (٣-١-٥) . وبالتالي فإن $a^p \equiv a \pmod{p}$.
أما إذا كان $p \mid a$ ، فإن $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ حسب مبرهنة فيرما ، ومنها نجد أن $a^p \equiv a \pmod{p}$ حسب مبرهنة (٣-١-٣) .

□

نتيجة (٣) :

إذا كان $(a, n) = 1$ ، فإن $a^{\phi(n)-1}$ معكوس ضربي للعدد الصحيح a قياس n .

البرهان :

بما أن $(a, n) = 1$. إذاً $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ ، وعليه فإن $a \cdot a^{\phi(n)-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ، ومنها نجد أن $a^{\phi(n)-1}$ معكوس ضربي للعدد a قياس n .

□

نتيجة (٤) :

إذا كان $(a, n) = 1$ ، فإن الحل الوحيد للتطابق $ax \equiv b \pmod{n}$ هو $x \equiv a^{\phi(n)-1} b \pmod{n}$.

البرهان :

بما أن $(a, n) = 1$. إذاً الحل الوحيد للتطابق الخطي $ax \equiv b \pmod{n}$ هو $x \equiv a^{-1}b \pmod{n}$ حسب مبرهنة (٣-٤-١) . لكن $a^{-1} = a^{\phi(n)-1}$ حسب نتيجة (٣) . إذاً الحل الوحيد هو $x \equiv a^{\phi(n)-1} \cdot b \pmod{n}$.

□

نتيجة (٥) :

إذا كان $(a, n) = (a-1, n) = 1$ ، فإن

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{\phi(n)-1} \equiv 0 \pmod{n}$$

البرهان :

بما أن $(a, n) = 1$. إذاً $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ حسب مبرهنة أولر . لكن $a^{\phi(n)} - 1 \equiv 0 \pmod{n}$ و $a^{\phi(n)} - 1 = (a-1)(a^{\phi(n)-1} + \dots + a^2 + a + 1)$ إذاً $(a-1)(a^{\phi(n)-1} + \dots + a^2 + a + 1) \equiv 0 \pmod{n}$ لكن $(a-1, n) = 1$ إذاً $(a^{\phi(n)-1} + \dots + a^2 + a + 1) \equiv 0 \pmod{n}$ حسب نتيجة مبرهنة (٣-٤-١) .

□

ملاحظة :

عكس مبرهنة فيرما ليس صحيحاً . أي أنه إذا كان $(a, p) = 1$

$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ فقد لا يكون p عدداً أولياً كما يوضح ذلك المثال الآتي :

$$5^3 \equiv 1 \pmod{4} \text{ و } (5, 4) = 1 \text{ بينما } 4 \text{ ليس أولياً .}$$

والآن إلى بعض التطبيقات والمبرهنة الآتية .

مبرهنة ٣-٥-٢ :

إذا كان p, q عددين أوليين مختلفين وكان $a^p \equiv a \pmod{q}$ ،

$$a^q \equiv a \pmod{p} \text{ ، فإن } a^{pq} \equiv a \pmod{pq}$$

البرهان :

بما أن $(a^q)^p \equiv a^q \pmod{p}$ حسب نتيجة (٢) من مبرهنة أولير ، وبما أن $a^q \equiv a \pmod{p}$ بالفرض . إذاً $a^{pq} \equiv a \pmod{p}$.
وبنفس الطريقة يمكن أن نبرهن على أن $a^{pq} \equiv a \pmod{q}$. إذاً $a^{pq} \equiv a \pmod{pq}$ حسب نتيجة (٢) مبرهنة (٢-١-٨) .

□

والآن إلى الأمثلة الآتية

مثال (١) :

أثبت أن $a^{37} \equiv a \pmod{1729}$.

الإثبات :

بما أن $1729 = 7 \times 13 \times 19$. إذاً إذا كان $(a,7) = (a,13) = (a,19) = 1$ ، فإن $a^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ ، $a^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ، $a^{18} \equiv 1 \pmod{19}$ حسب مبرهنة فيرما . وعليه فإن $a^6 \cdot a^{12} \cdot a^{18} \equiv 1 \pmod{1729}$ وهذا يعني أن $a^{36} \equiv a \pmod{1729}$ حسب مبرهنة (٢-١-٣) ، إذاً $a^{37} \equiv a \pmod{1729}$ حسب مبرهنة (٣-١-٣) .

مثال (٢) :

أوجد المعكوس الضربي للعدد 5 قياس 8 .

الحل :

بما أن $(5,8) = 1$. إذاً $5^{-1} = 5^{\phi(8)-1}$. لكن $\phi(8) = 4$. إذاً $5^{-1} = 5^3 = 125 \equiv 5 \pmod{8}$.

مثال (٣) :

حل التطابق الخطي $3x \equiv 5 \pmod{8}$.

الحل :

بما أن $(3,8) = 1$. إذاً الحل والوحيد للتطابق $3x \equiv 5 \pmod{8}$ هو
 $x \equiv 3^{\phi(8)-1} \cdot 5 \pmod{8}$. لكن $\phi(8) = 4$. إذاً $x \equiv 3^3 \cdot 5 \pmod{8}$. لكن
 $3^3 \cdot 5 = 135 \equiv 7 \pmod{8}$. إذاً $x \equiv 7 \pmod{8}$ حل للتطابق المعطى .

مثال (٤) :

أوجد باقي قسمة 3^{439} على 5 .

الحل :

بما أن $(3,5) = 1$. إذاً $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$ حسب مبرهنة فيرما ، وعليه فإن
 $3^{436} \times 3^3 \equiv 3^3 \times 1 \pmod{5}$ ، ومنها نجد أن $(3^4)^{109} = 3^{436} \equiv 1 \pmod{5}$
 حسب مبرهنة $(3^3 - 1 - 3)$. إذاً $3^{439} \equiv 27 \pmod{5}$. لكن $27 \equiv 2 \pmod{5}$
 إذاً $3^{439} \equiv 2 \pmod{5}$ ، وعليه فإن باقي قسمة 3^{439} على 5 يساوي 2 .

مثال (٥) :

أوجد باقي قسمة $(1234)^{8765434}$ على 11 .

الحل :

بما أن $1234 \equiv (4 - 3) + (2 - 1) = 2 \pmod{11}$ حسب مبرهنة
 $(3-2-2-هـ)$. إذاً

$$(1) \dots (1234)^{8765434} \equiv 2^{8765434} \pmod{11} \text{ . لكن}$$

$(2,11) = 1$. إذاً $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ حسب مبرهنة فيرما . لكن
 $8765434 = 876543 \times 10 + 4$. إذاً

$2^{8765434} = 2^{876543 \times 10} \cdot 2^4 = (2^{10})^{876543} \cdot 2^4$ ، وعليه فإن
 $(2^4) \pmod{11} \equiv 1(2^4) \pmod{11}$. لكن $2^4 \equiv 5 \pmod{11}$. إذاً

$$(2) \dots 2^{8765434} \equiv 5 \pmod{11}$$

ومن (1) ، (2) ينتج أن $(1234)^{8765434} \equiv 5 \pmod{11}$ ، وعليه فإن باقي
 القسمة يساوي 5 .

مثال (٦) :

أوجد مرتبي الأحاد والعشرات للعدد $(23)^{442}$.

الحل :

لإيجاد مرتبي الأحاد والعشرات نوجد باقي قسمة العدد على 100 ، ولإيجاد ذلك ، لاحظ أن $(100,23)=1$ ، $\phi(100)=40$. إذاً $(23)^{40} \equiv 1 \pmod{100}$ حسب مبرهنة أولير . وعليه فإن $(23)^{40 \times 11} \equiv 1 \pmod{100}$ وهذا يعني أن $(23)^{440} \equiv 1 \pmod{100}$. إذاً $(23)^{440} \times (23)^2 \equiv (23)^2 \pmod{100}$ حسب مبرهنة $(3-1-3)$ ، وعليه فإن $(23)^{442} \equiv (23)^2 \pmod{100}$. لكن $(23)^2 = 529 \equiv 29 \pmod{100}$. إذاً $(23)^{442} \equiv 29 \pmod{100}$ ، وعليه فإن مرتبي الأحاد والعشرات هما 9 ، 2 على التوالي .

والآن إلى المبرهنة الآتية التي توضح الشوط التي يجب توفرها ليكون عكس مبرهنة فيرما صحيحاً .

مبرهنة ٣-٥-٣ : " عكس مبرهنة فيرما "

إذا كان $n \geq 2$ وكان $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ لكل $1 \leq a \leq n-1$ ، فإن n عدد أولي .

البرهان :

بمــــا أن $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ لكل $1 \leq a \leq n-1$. إذاً $a^{n-2} \cdot a \equiv 1 \pmod{n}$ لكل $1 \leq a \leq n-1$ ، وعليه فإن للعنصر a معكوس ضربي هو a^{n-2} ، وبالتالي فإن $(a,n)=1$ لكل $1 \leq a \leq n-1$ حسب نتيجة (٢) مبرهنة $(١-٤-٣)$. والآن إذا كان n عدداً غير أولي ، فإن $n = ab$ ، $1 < a < n$ ، $1 < b < n$ حسب مبرهنة $(١-٢-٢)$ ، وعليه فإن $(a,n) = a > 1$ وهذا يناقض كون $(a,n)=1$. إذاً n عدد أولي .

□

نستج من مبرهنة فيرما ومبرهنة (3-5-3) أن عدد أولي إذاً وإذا فقط كان
 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ لكل $a \neq 0 \pmod{n}$.

ونستج من مبرهنة (3-5-3) أنه إذا كان $2^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ ، فإن n
 ليس أولياً .

مثال (٧) :

(أ) 8 عدد غير أولي ، لأن $2^7 \not\equiv 1 \pmod{8}$ ، $1 < 2 < 7$.

(ب) 323 ليس أولياً ، لأن $2^{322} \not\equiv 1 \pmod{323}$.

(ج) إذا كان

$n = 95468093486093450983409583409850434850938459083$

فإن n ليس أولياً لأن $2^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$.

ولمزيد من التطبيقات نورد الآتي :

تعريف ١-٥-٣ :

يقال عن عدد صحيح مؤلف موجب n أنه شبه أولي (Pseudoprime) بالنسبة

للأساس $a \in \mathbb{Z}^*$ ، إذا كان $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

مثال (٢) :

341 شبه أولي للأساس 2 .

الإثبات :

بما أن $341 = 11 \times 31$ و $(2,11) = (2,31) = 1$ إذاً

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow 2^{340} \equiv 1 \pmod{11}$$

$$2^{30} \equiv 1 \pmod{31} \Rightarrow 2^{340} \equiv 1 \pmod{31}$$

$$\Rightarrow 2^{340} \equiv 2^{10} \pmod{31}$$

لكن $2^{10} \not\equiv 1 \pmod{31}$. إذاً $2^{340} \equiv 1 \pmod{31}$ ، وعليه فإن

$2^{340} \equiv 1 \pmod{11 \times 31}$. أي أن $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$ ، وعليه فإن

341 عدد شبه أولي .

طريقة أخرى : بما أن $2^{11} \equiv 1 \pmod{31}$ و $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. إذاً
 $2^{30} \equiv 1 \pmod{11}$ ، وعليه فإن $2^{31} \equiv 2 \pmod{11}$ ، وبالتالي فإن
 $2^{1 \times 31} \equiv 2 \pmod{11 \times 31}$ حسب مبرهنة (٣-٥-٢) . إذاً $2^{341} \equiv 2 \pmod{341}$
 لكن $(2,341) = 1$. إذاً $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$ ، وعليه فإن 341 عدد شبه أولي .

مثال (٣) :

645 شبه أولي للأساس 2 .

الإثبات : بما أن

$$\text{إذاً} \cdot (2,3) = (3,5) = (2,43) = 1 \cdot 645 = 3 \times 5 \times 43$$

$$2^{42} \equiv 1 \pmod{43} \Rightarrow 2^{630} = (2^{42})^{15} \equiv 1 \pmod{43}$$

$$2^2 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2^{14} \equiv 1 \pmod{3}$$

وعليه فإن $2^{644} = 2^{630} \cdot 2^{14} \equiv 1 \pmod{3 \times 43}$. لكن $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$.

إذاً $2^{644} = (2^4)^{161} \equiv 1 \pmod{5}$ ، وعليه فإن $2^{644} \equiv 1 \pmod{3 \times 43 \times 5}$

أي أن $2^{644} \equiv 1 \pmod{645}$ ، وعليه فإن 645 عدد شبه أولي .

والآن إلى المبرهنة الآتية :

مبرهنة ٣-٥-٤ :

يوجد عدد لا نهائي من الأعداد شبه الأولية لأي أساس أكبر من الواحد .

البرهان :

ليكن $a > 1$ و p أي عدد أولي فردي لا يقسم $a(a^2 - 1)$ ، وليكن

$$n = \frac{a^{2p} - 1}{a^2 - 1} = \frac{(a^p - 1)(a^p + 1)}{a - 1} \cdot \frac{(a^p + 1)}{a + 1}$$

كما أن a, a^p لكن $(a^2 - 1)(n - 1) = a^{2p} - a^2 = a(a^{p-1} - 1)(a^p + a)$

فرديان معاً أو زوجيان معاً ، $2 \nmid a^p + a$. لكن $p - 1$ عدد زوجي . إذاً

$(a^{p-1} - 1)$ يقبل القسمة على p وعلى $(a^2 - 1)$. لكن $(a^2 - 1)$ لا يقبل

القسمة على p بالفرض . إذاً $(a^{p-1} - 1)$ يقبل القسمة على $(a^2 - 1)$ ،
وبالتالي فإن $(n - 1)(a^2 - 1)$ يقبل القسمة على $2p(a^2 - 1)$ ، وعليه فإن
 $2p \setminus (n - 1)$. إذاً يوجد $r \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $n = 1 + 2pr$ ، وعليه فإن
 $a^{n-1} = a^{2pr} \equiv 1 \pmod{n}$ ، ومنها نجد أن $a^{2p} = 1 + n(a^2 - 1) \equiv 1 \pmod{n}$
وعليه فإن n عدد شبه أولي للأساس a .

□

وأخيراً إلى دراسة أعداد كارمايكل .

تعريف ٣-٥-٢ :

يقال عن مؤلف صحيح موجب n أنه عدد كارمايكل ، إذا كان
 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ لكل $a \in \mathbb{Z}$ ، $(a, n) = 1$.

مثال (٤) :

561 عدد كارمايكل .

الحل :

بما أن $561 = 3 \times 11 \times 17$. إذاً إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ و $(a, 3) = (a, 11) = (a, 17) = 1$ فإن
 $a^2 \equiv 1 \pmod{3}$ ، $a^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ ، $a^{16} \equiv 1 \pmod{17}$ حسب
مبرهنة فيرما ، وعليه فإن $a^{560} = (a^2)^{280} \equiv 1 \pmod{3}$ ،
 $a^{560} = (a^{10})^{56} \equiv 1 \pmod{11}$ ، $a^{560} = (a^{16})^{35} \equiv 1 \pmod{17}$ ، وبالتالي
فإن $a^{560} \equiv 1 \pmod{3 \times 11 \times 17}$ وهذا يعني أن $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ ،
وعليه فإن 561 عدد كارمايكل .

□

مثال (٥) :

1729 عدد كارمايكل .

الحل :

بما أن $1729 = 7 \times 13 \times 19$. إذاً إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ ، $(a, 7) = (a, 13) = (a, 19) = 1$ ،
فإن

$$a^6 \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow a^{1728} = (a^6)^{288} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$a^{12} \equiv 1 \pmod{13} \Rightarrow a^{1728} = (a^{12})^{144} \equiv 1 \pmod{13}$$

$$a^{18} \equiv 1 \pmod{19} \Rightarrow a^{1728} = (a^{18})^{96} \equiv 1 \pmod{19}$$

وعليه فإن $a^{1728} \equiv 1 \pmod{7 \times 13 \times 19}$ وهذا يعني أن $a^{1728} \equiv 1 \pmod{1728}$ وعليه فإن 1729 عدد كارمايكل .

ملاحظة :

يوجد عدد لا نهائي من أعداد كارمايكل أصغرها 561 ولإثبات ذلك أنظر
Ann.Math.139,703 – 722 (1994) .

تمارين

(١) أوجد مرتبة آحاد العدد 3^{100} .

(٢) أثبت أن $2^{4n} \equiv 1 \pmod{15}$ ، $2^{3n} \equiv 1 \pmod{15}$ ، $2^{2n} \equiv 1 \pmod{3}$ لكل $n \geq 1$.

(٣) إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $p \nmid a$ ، $p \nmid b$ ، فأثبت أن :

(أ) $a^p \equiv b^p \pmod{p} \Rightarrow a \equiv b \pmod{p}$.

(ب) $a^p \equiv b^p \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv b^p \pmod{p^2}$.

" ملاحظة : أستخدم (أ) تجد أن $a = b + p^r$ ، $r \in \mathbb{Z}$ ، وعليه فإن $a^p - b^p = (b + p^r)^p - b^p$ ، ثم اثبت أن $(b + p^r)^p - b^p$ يقبل القسمة على p^2 .

(٤) حل كلاً مما يأتي :

(أ) $2x \equiv 1 \pmod{31}$ ، (ب) $3x \equiv 17 \pmod{29}$

(٥) إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فأثبت أن :

(أ) $1^{p-1} + 2^{p-1} + 3^{p-1} + \dots + (p-1)^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$

$$1^p + 2^p + \dots + (p-1)^p \equiv 0 \pmod{p} \quad (\text{ب})$$

$$" \text{لاحظ أن } 1 + 2 + \dots + p - 1 = \frac{p(p-1)}{2} "$$

$$(6) \quad m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{mn} \text{ ، فأثبت أن } (m, n) = 1 \text{ إذا كان}$$

$$(7) \quad \text{إذا كان } p, q \text{ عددين أوليين مختلفين وكان } (p-1) \mid (q-1) \text{ ،}$$

$$\cdot a^{q-1} \equiv 1 \pmod{pq} \text{ ، فأثبت أن } (a, pq) = 1$$

$$(8) \quad \text{إذا كان } (a, 35) = 1 \text{ ، فأثبت أن } a^{12} \equiv 1 \pmod{35}$$

$$(9) \quad \text{إذا كان } (a, 42) = 1 \text{ ، فأثبت أن } 168 \mid (a^6 - 1)$$

$$(10) \quad \text{إذا كان } (a, 133) = (b, 133) = 1 \text{ ، فأثبت أن } 133 \mid (a^{18} - b^{18})$$

$$(11) \quad \text{أوجد باقي قسمة } (28)^{1202} \text{ على } 13$$

$$(12) \quad \text{أثبت أن } a^{2m-1} \equiv a^{2n-1} \pmod{3} \text{ لكل } a \in \mathbb{Z} \text{ ، } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

$$(13) \quad \text{أثبت أن كلاً من } 1105 \text{ ، } 1905 \text{ ، } 4080 \text{ عدد شبه أولي للأساس } 2$$

$$(14) \quad \text{أثبت أن كلاً من } 2730 \text{ ، } 6601 \text{ عدد كارمايكل}$$

$$(15) \quad \text{إذا كان } p \text{ عدداً أولياً ، فأثبت أن } (a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$$

٦-٣ : مبرهنة ابن الهيثم " ولسن "

جون ولسن (١٧٤١-١٧٩٣م) رياضي إنجليزي تنسب له المبرهنة الآتية :

إذا كان p عدداً أولياً ، فإن $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ والتي نشرت بدون

برهان من قبل الرياضي الإنجليزي إدوارد وارنغ (١٧٣٤-١٧٨٩م)

عام ١٧٧٠م ويجمع الكل على أن كلاً من ولسن ووارنغ لا يمتلك برهاناً ، لكن

الفرنسي لاجرانج (١٧٣٦-١٨١٣م) أثبت تلك المبرهنة عام ١٧٧١م بطريقتين

إحدهما مباشرة والأخرى تقوم على استنتاج مبرهنة ولسن من مبرهنة فيرما .

وبدراسة أعمال الرياضي والفيزيائي والفيلسوف الألماني ليبر
(١٦٤٦-١٧١٦م) وجدت صيغة مكافئة وبدون إثبات لمبرهنة ولسن وهي :
إذا كان p عدداً أولياً ، فإن $(p-2)!+1 \equiv 0 \pmod{p}$.

وبدراسة أعمال الرياضي والفيزيائي الشهير الحسن بن الهيثم
(٩٦٥-١٠٤٠م) تبين [٦ ، ٢٦٨-٢٧٥] أو [٣ ، ٧٠-٧١] أنه قد قدم أثناء حله
للنظام الآتي : $x \equiv 1 \pmod{m_i}$ ، $x \equiv 0 \pmod{p}$ حيث p عدد أولي و
 $1 < m_i \leq (p-1)$ ، ما يعرف الآن بمبرهنة ولسن كقضية تعبر بدقة عن
خاصية تمتاز بها الأعداد الأولية ، وبالصيغة الآتية : إذا كان p عدداً أولياً ، فإن
 $[2 \times 3 \times \dots \times (p-1) + 1]$ يقبل القسمة على p ، وإذا قسمنا هذا المجموع على
أي من الأعداد $(p-1), 3, 2, \dots$ لكان الباقي واحد .

من الواضح أن هذه المبرهنة تعطي حلاً للنظام أعلاه ، وهذا يعني أن
 $x \equiv (p-1)!+1 \pmod{p}$ تحقق معادلتى النظام أعلاه .

لاحظ أن ابن الهيثم برهن على وجود حل أو عدة حلول للنظام أعلاه
بطريقتين ، وما يهمننا هنا هو إثباته لما يسمى مبرهنة ولسن . وسنقدم برهان ابن
الهيثم بعد إعادة صياغته ، ثم نعطي برهان لاجرانج لتلك المبرهنة ثم نثبت عكس
تلك المبرهنة .

مبرهنة ٣-٦-١ : "مبرهنة ابن الهيثم"

إذا كان p عدداً أولياً ، فإن $(p-1)!+1 \equiv 0 \pmod{p}$.

البرهان : " ابن الهيثم "

لتكن $a \in A = \{1, 2, \dots, (p-1)\}$ سنبرهن على وجود عنصر وحيد
 $b \in A$ بحيث أن $ab \equiv 1 \pmod{p}$ ، لإثبات ذلك لاحظ أن $(a, p) = 1$ يعني
وجود عددين صحيحين x, y بحيث أن $ax + py = 1$. إذاً $ax \equiv 1 \pmod{p}$

وإذا كان b باقي القسمة x على p فإن b وحيد ، وأن $b \in A$ ويحقق العلاقة $ab \equiv 1 \pmod{p}$ لكن a, b قد يكونان متساويين وفي هذه الحالة نجد أن $a \equiv -1 \pmod{p}$ أو $a \equiv 1 \pmod{p}$ ، $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ ، $a \neq 1$ إذاً $a = p-1$ أو $a = 1$ ، وعليه فإن لكل $a \in A$ بحيث أن $a \neq 1$ ، وهذا يعني $a \neq p-1$ يوجد $b \in A$ ، $b \neq a$ بحيث أن $ab \equiv 1 \pmod{p}$ ، وهذا يعني أنه بعد ضرب كل عنصر من عناصر المجموعة $\{2, 3, \dots, p-2\}$ في معكوسة ، نجد أن $2 \cdot 3 \cdots (p-2) \equiv 1 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $2 \cdot 3 \cdots (p-2) (p-1) \equiv p-1 \pmod{p}$ ، ومنها نجد أن $(p-1)! \equiv p-1 \pmod{p}$. لذا $(p-1)! \equiv 0 \pmod{p}$. إذاً $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ ، وهذا يعني أن $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

□

برهان لاجرانج :

بما أن $x^p \equiv x \pmod{p}$ حسب مبرهنة فيرما . إذاً $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ لكل $x \in A = \{1, 2, \dots, p-1\}$ ، وعليه فإن $x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ لكل $x \in A$ ، وبالتالي فإن $x^{p-1} - 1 \equiv (x-1)(x-2) \cdots [x-(p-1)] \equiv 0 \pmod{p}$ وبمقارنة المعاملات نجد أن معامل الحد الخالي من x في الطرفين هو $(-1)(-2)(-3) \cdots (-1)(p-1) \equiv -1 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $(-1)^{p-1} (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

فإذا كان $p = 2$ ، فإن $1 \equiv -1 \pmod{2}$. أما إذا كان p عدداً فردياً ، فإن $(p-1)$ عدد زوجي ، وعليه فإن $(-1)^{p-1} = 1$ ، وبالتالي فإن $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. إذاً $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ لأي عدد أولي p .

□

مبرهنة ٣-٦-٢ : " عكس مبرهنة ابن الهيثم "

إذا كان n عدداً موجباً ، وكان $(n-1)!+1 \equiv 0 \pmod{n}$ ، فإن n عدد أولي .

البرهان :

نفرض أن $(n-1)!+1 \equiv 0 \pmod{n}$. لكن n ليست أولياً . إذاً يوجد عدد أولي p بحيث أن $p \mid n$ حسب مبرهنة (٢-٢-٤) ، وعليه فإن $p < n$ وبالتالي فإن $(n-1)! \mid (n-1)!$ ، وهذا يعني أن $(n-1)! \equiv 0 \pmod{p}$. لكن $(n-1)!+1 \equiv 0 \pmod{n}$ و $p \mid n$. إذاً $(n-1)! \equiv 0 \pmod{p}$ ، عليه فإن $1 \equiv 0 \pmod{p}$ وهذا غير ممكن . إذاً n عدد أولي .

□

مثال (١) :

أوجد باقي قسمة $96!$ على 97 .

الحل :

بما أن 97 عدد أولي . إذاً $(97-1)! \equiv -1 \pmod{97}$ حسب مبرهنة ابن الهيثم ، وعليه فإن $96! \equiv -1 \pmod{97}$. لكن $96 \equiv -1 \pmod{97}$. إذاً $96! \equiv 96 \pmod{97}$ ، وعليه فإن باقي قسمة $96!$ على 97 يساوي 96 .

مثال (٢) :

إذا كان p عدداً أولياً ، $a \in \mathbb{Z}$ ، فأثبت أن $a^p + (p-1)! a \equiv 0 \pmod{p}$.

الإثبات :

بما أن $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ حسب مبرهنة ابن الهيثم . إذاً $(p-1)! a \equiv -a \pmod{p}$ حسب مبرهنة (٣-١-٣) ، وعليه فإن $a^p + (p-1)! a \equiv a^p - a \pmod{p}$ حسب مبرهنة (٣-١-٣) (ج) .

والآن إلى بعض تطبيقات مبرهنة ابن الهيثم والمبرهنة الآتية :

مبرهنة ٣-٦-٣ :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فيوجد للتطابق $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ حل إذاً إذا فقط كان $p \equiv 1 \pmod{4}$.

البرهان :

نفرض أن a حل للتطابق $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. إذاً $a^2 \equiv -1 \pmod{p}$ ،
وعليه فإن $a^{p-1} = (a^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$. لكن $a \not\equiv 0 \pmod{p}$. إذاً
 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ حسب مبرهنة فيرما ، وعليه فإن $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$
لكن p عدد أولي فردي . إذاً $(p-1)$ عدد زوجي ، وعليه فإن $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$
أو $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$. فإذا كان $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$ ، فإن $-1 \equiv 1 \pmod{p}$ يعني
أن $p \mid 2$ ، ومنها نجد أن $p=2$ وهذا خلاف الفرض . إذاً $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \neq -1$ ،
وعليه فإن $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$ وهذا يعني أن $\frac{p-1}{2}$ عدد زوجي . إذاً يوجد
 $m \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $\frac{p-1}{2} = 2m$ ، وعليه فإن $p-1 = 4m$ ، وهذا يعني أن
 $p \equiv 1 \pmod{4}$.

ولإثبات العكس ، لاحظ أن

$$p-1 \equiv -1 \pmod{p} ، (p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \cdot \frac{p+1}{2} \cdot \dots \cdot (p-2) (p-1)$$

$$\text{إذاً} ، \frac{p+1}{2} \equiv -\frac{p-1}{2} \pmod{p} ، \dots ، p-2 \equiv -2 \pmod{p}$$

$$\text{وعليه فإن} (p-1)! \equiv 1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-2) \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \cdot \left(-\frac{p-1}{2}\right) \pmod{p}$$

$$\text{إذاً} ، p \equiv 1 \pmod{4} \text{ لكن} (p-1)! \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left[\left(\frac{p-1}{2}\right)!\right]^2 \pmod{p}$$

يوجد $m \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $p-1=4m$ ، وعليه فإن $\frac{p-1}{2}=2m$ ، وبالتالي

فإن $(-1)^{\frac{p-1}{2}}=1$. إذاً $(p-1)! \equiv [(\frac{p-1}{2})!]^2 \pmod{p}$. لكن

$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ حسب مبرهنة ابن الهيثم . إذاً

$[(\frac{p-1}{2})!]^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. فإذا كان $x = (\frac{p-1}{2})!$ ، فإن

$x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $x = (\frac{p-1}{2})!$ حل للتطابق

$$. x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

□

نتيجة :

يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الأولية التي على الشكل $4n+1$.

البرهان :

نفرض وجود عدد منتهي الأعداد الأولية التي على الشكل $4n+1$ وهي

p_1, p_2, \dots, p_r ولنفرض أن $a = (2 \prod_{i=1}^r p_i)^2 + 1$. إذاً $a > 1$ ، عليه يوجد عدد

أولي $p > 2$ بحيث أن $p \nmid a$ حسب مبرهنة (٢-٢-٤) ، وعليه فإن

$a \equiv 0 \pmod{p}$ ، ومنها ينتج أن $(2 \prod_{i=1}^r p_i)^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن

على الشكل $4n+1$ حسب مبرهنة (٣-٦-٣) . لكن p_1, \dots, p_r هي جميع

الأعداد الأولية على الشكل $(4n+1)$. إذاً يوجد $1 \leq j \leq r$ بحيث أن $p = p_j$ ،

وعليه فإن $p_j \nmid a$. لكن $p_j \mid (2 \prod_{i=1}^r p_i)^2$. إذاً $p_j \nmid 1$ وهذا غير ممكن . إذاً

يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الأولية التي على الشكل $(4n+1)$.

□

مثال (٣) :

$$\text{حل التطابق } x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{13}$$

الحل :

بما أن $13 \equiv 1 \pmod{4}$. إذاً يوجد حل للتطابق أعلاه وهو

$$x = -5 = 8 \pmod{13} \text{ . لاحظ أن } x = \left(\frac{p-1}{2}\right)! = 6! = 5 \pmod{13}$$

آخر لذلك التطابق .

ملاحظة : لحل التطابق

$$(1) \dots ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{n} , (a, p) = 1 , p \text{ عدد أولي فردي .}$$

لاحظ أن $(4a, p) = 1$. إذاً

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{n} \Rightarrow 4a(ax^2 + bx + c) \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow 4a^2x^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow 4a^2x^2 + 4abx + b^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$$

$$\Rightarrow (2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$$

فإذا فرضنا أن $y = 2ax + b$ ، $d = b^2 - 4ac$ ، فإن

$$y^2 \equiv d \pmod{p} \dots (2)$$

وإذا كان $x \equiv x_1 \pmod{p}$ حلاً للعلاقة (1) ، فإن $y = 2ax_1 + b \pmod{p}$

تحقق العلاقة (2) ، وبالعكس إذا كان $y \equiv y_1 \pmod{p}$ حلاً للعلاقة (2) ، فإن

حل التطابق $2ax \equiv y_1 - b \pmod{p}$ يعطي حلاً للتطابق (1) .

إذاً وجود حل للتطابق (1) يكافئ وجود حل لتطابق خطي وحل للتطابق على

$$\text{الشكل } x^2 \equiv a \pmod{p} .$$

مثال (٤) :

$$\text{حل التطابق } 3x^2 - 4x + 2 \equiv 0 \pmod{11}$$

الحل :

$$\begin{aligned}
 3x^2 - 4x + 2 &\equiv 0 \pmod{11} \Rightarrow 3(3x^2 - 4x + 2) \equiv 0 \pmod{11} \\
 &\Rightarrow 9x^2 - 12x + 6 \equiv 0 \pmod{11} \\
 &\Rightarrow (3x - 2)^2 + 2 \equiv 0 \pmod{11} \\
 &\Rightarrow (3x - 2)^2 \equiv -2 \equiv 9 \pmod{11} \\
 &\Rightarrow 3x - 2 \equiv 3 \pmod{11} \vee 3x - 2 \equiv -3 \pmod{11} \\
 &\Rightarrow 3x \equiv 5 \pmod{11} \vee 3x \equiv 10 \pmod{11} \\
 &\Rightarrow x \equiv 5 \cdot 3^{-1} \pmod{11} \vee x \equiv 10 \cdot 3^{-1} \pmod{11}
 \end{aligned}$$

لكن $3^{-1} = 3^9 = 4 \pmod{11}$ حسب نتيجة (٣) من مبرهنة (٣-٥-١) . إذًا
 $x \equiv 5 \cdot 3^{-1} = 20 \equiv 9 \pmod{11} \vee x \equiv 10 \cdot 4 = 40 \equiv 4 \pmod{11}$

مثال (٥) :

حل التطابق $x^2 + 3x - 2 \equiv 0 \pmod{13}$

الحل :

$$\begin{aligned}
 x^2 + 3x - 2 &\equiv 0 \pmod{13} \Rightarrow 4(x^2 + 3x - 2) \equiv 0 \pmod{13} \\
 &\Rightarrow 4x^2 + 12x - 8 \equiv 0 \pmod{13} \Rightarrow (2x + 3)^2 \equiv 4 \pmod{13} \\
 &\Rightarrow 2x + 3 \equiv 2 \pmod{13} \vee 2x + 3 \equiv -2 \pmod{13} \\
 &\Rightarrow 2x \equiv -1 \pmod{13} \vee 2x \equiv -5 \equiv 8 \pmod{13} \\
 &\Rightarrow x \equiv 6 \pmod{13} \vee x \equiv 4 \pmod{13} \quad \left((2,13) = 1 \text{ لأن} \right)
 \end{aligned}$$

تمارين

- (١) إذا كان p عدداً أولياً ، فأثبت أن $(p-2)! \equiv 1 \pmod{p}$.
- (٢) أوجد باقي قسمة $100!$ ، $99!$ على 101 .
- (٣) أثبت أن $(29!)^2 \equiv 1 \pmod{59}$ ، بينما $(30!)^2 \equiv -1 \pmod{61}$.
- (٤) إذا كان p عدداً أولياً ، فأثبت أن $(p-1)! \equiv p-1 \pmod{\frac{p(p-1)}{2}}$.

(٥) أوجد باقي قسمة $2(34)!$ على 37 .

" لاحظ أن $2(p-3)! \equiv -1 \pmod{p}$ لكل عدد أولي p أكبر من 3 . "

(٦) أوجد عددين أوليين فرديين أقل من أو يساوي 17 بحيث
 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p^2}$.

(٧) إذا كان p عدداً أولياً فردياً و m عدداً صحيحاً موجباً ، $m \leq p$ ، فأثبت
 أن $(p-m)!(m-1)! \equiv (-1)^m \pmod{p}$.

(٨) إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فأثبت أن :

$$(أ) \quad 1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$$

$$(ب) \quad 3^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2 \cdots (p-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$$

" لاحظ أن $m = -(p-1) \pmod{p}$

$$\Rightarrow 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (p-1) \equiv (-1)^{p-1} \cdot 3 \cdot 5 \cdots (p-2) \pmod{p}$$

(٩) إذا كان $p \equiv 3 \pmod{4}$ عدداً أولياً و $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{p}$ ، فأثبت

أن $a \equiv b \equiv 0 \pmod{p}$. " لاحظ أنه إذا كان $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ، فإن

$(a, p) = 1$ ، وعليه يوجد $c \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $ac \equiv 1 \pmod{p}$. ثم

أستخدم تلك العلاقة لمناقضة مبرهنة (٣-٦-٣) . "

(١٠) حل كلاً مما يأتي

$$(أ) \quad x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{29} ، (ب) \quad x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{37}$$

$$(ج) \quad x^2 + 7x + 10 \equiv 0 \pmod{11} ، (د) \quad 4x^2 + x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$(هـ) \quad 7x^2 - x + 11 \pmod{7} ، (و) \quad 5x^2 - 6x + 2 \equiv 0 \pmod{17}$$

$$(ز) \quad 3x^2 + 5x - 9 \equiv 0 \pmod{13} ، (ح) \quad 5x^2 + 6 + 1 \equiv 0 \pmod{23}$$

الدوال العددية Arithmetic Functions

تكمن أهمية الدوال العديدة في تطبيقاتها في العلوم الرياضية والفيزيائية والفلك ، ويضم هذا الفصل خمسة بنود ، ندرس فيها مفهوم الدالة العددية وخواصها ثم الدوال العددية الأساسية : مجموع وعدد قواسم عدد طبيعي ، دالة أويلر ، دالة موبيس ، دالة زيتا .

٤-١ : تعريف وخواص

سنركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة مفهوم الدالة العددية ، الدوال الضربية وخواصها .

تعريف ٤-١-١ :

يقال عن دالة $f : Z^+ \rightarrow B$ أنها دالة عددية

(Arithmetic or number theoretic or numerical function) ، إذا

كانت $B \leq C$ ، حيث $C = \{a + ib \mid a, b \in R\}$ مجموعة الأعداد المركبة (Complex numbers) .

مثال (١) :

$$\phi(n) = \left| \left\{ m \in Z^+ : 1 \leq m \leq n , (m, n) = 1 \right\} \right| \quad (أ)$$

(ب) كل من $f, g : Z^+ \rightarrow N$ ، حيث $f(a) = a^n$ ، $g(a) = \log(a)$ لكل $a \in Z^+$ دالة عددية .

تعريف ٤-١-٢ :

يقال عن دالة عددية غير صفيرية أنها دالة ضربية (multiplicative function) إذا كان $f(ab) = f(a) \cdot f(b)$ لكل $(a, b) = 1$ و $a, b \in Z^+$.

أما إذا كان $f(ab) = f(a) \cdot f(b)$ لكل $a, b \in \mathbb{Z}^+$ فتسمى f دالة ضربية كلياً أو تماماً (Totally or completely multiplicative function).

مثال (1) :

(أ) $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ حيث $f(a) = a^n$ لكل $a \in \mathbb{Z}^+$ دالة ضربية كلياً ، لأن

$$f(ab) = (ab)^n = a^n \cdot b^n = f(a) \cdot f(b) \quad . \quad a, b \in \mathbb{Z}^+$$

(ب) $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $f(a) = \log(a)$ دالة عددية ليست ضربية ، لأن

$$f(ab) = \log(ab) \neq \log(a) \cdot \log(b) = f(a) \cdot f(b)$$

والآن إلى بعض خواص الدوال العددية .

مبرهنة ١-١-٤ :

إذا كانت f دالة ضربية ، فإن $f(1) = 1$.

البرهان :

بما أن f دالة ضربية بالفرض ، إذا يوجد $a \in \mathbb{Z}^+$ ، بحيث أن $f(a) \neq 0$

وعليه فإن $f(a) = f(a \cdot 1) = f(a) \cdot f(1)$ ، ومنها نجد أن $f(1) = 1$.

□

ملاحظة :

عكس مبرهنة (١-١-٤) ليس صحيحاً كما يوضح ذلك المثال الآتي :

لتكن $p : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ حيث $p(n)$ يساوي عدد طرق تجزئة العدد n

"يقال عن متتابعة $1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_r$ أنها تجزئة للعدد n ، إذا

$$n = \sum_{i=1}^r n_i \quad . \quad \text{لاحظ أن}$$

$p(1) = 1$ لكن p ليست دالة ضربية ، لأن $(2,3) = 1$

$$11 = p(6) = p(2 \times 3) \neq p(2) \times p(3) = 2 \times 3 = 6$$

تعريف ٣-١-٤ :

$$\sum_{d|a} f(d) = (\text{مجموعة قيم الدالة } f \text{ لكل قواسم العدد } a)$$

فمثلاً إذا كان $a = 8$ ، فإن $\sum_{d|8} f(d) = f(1) + f(2) + f(4) + f(8)$

مبرهنة ٢-١-٤ :

إذا كانت f, g دالتين عدديتين ، فإن $\sum_{c|a, d|b} f(c)g(d) = \sum_{c|a} f(c) \cdot \sum_{d|b} g(d)$

البرهان :

لتكن d_1, d_2, \dots, d_r جميع قواسم العدد b . إذا

$$\begin{aligned} \sum_{c|a, d|b} f(c)g(d) &= \sum_{c|a} f(c) \cdot g(d_1) + \sum_{c|a} f(c)g(d_2) + \dots + \sum_{c|a} f(c)g(d_r) \\ &= \sum_{c|a} f(c) [g(d_1) + g(d_2) + \dots + g(d_r)] \\ &= \sum_{c|a} f(c) \cdot \sum_{d|b} g(d) \end{aligned}$$

□

والآن لتكن f دالة ضربية ، $a = 12$. إذا $a = 4 \times 3$ ، $(4,3) = 1$ ، وعليه فإن

$$\begin{aligned} g(12) &= \sum_{d|12} f(d) = f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(6) + f(12) \\ &= f(1 \cdot 1) + f(2 \cdot 1) + f(3 \cdot 1) + f(4 \cdot 1) + f(2 \cdot 3) + f(4 \cdot 3) \\ &= f(1) \cdot f(1) + f(2) \cdot f(1) + f(3) \cdot f(1) + f(4) \cdot f(1) + f(2) \cdot f(3) + f(4) \cdot f(3) \\ &= [f(1) \cdot f(1) + f(3) \cdot f(1)] + [f(1) \cdot f(2) + f(2) \cdot f(3)] + [f(4) \cdot f(1) + f(4) \cdot f(3)] \\ &= f(1)[f(1) + f(3)] + f(2)[f(1) + f(3)] + f(4)[f(1) + f(3)] \\ &= [f(1) + f(3) + f(4)][f(1) + f(3)] \\ &= \sum_{d|4} f(d) \cdot \sum_{d|3} f(d) = g(4) \cdot g(3) \end{aligned}$$

وعليه فإن g دالة ضربية وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي :

مبرهنة ٣-١-٤ :

إذا كانت f دالة ضربية ، فإن $g(a) = \sum_{d|a} f(d)$ دالة ضربية .

البرهان :

نفرض أن $g(ab) = \sum_{d|ab} f(d)$ ، إذا $(a,b)=1$ ، $a, b \in \mathbb{Z}^+$. لكن
 إذا يوجد عدنان موجبان وحيدان c, e بحيث أن $c \setminus a$ ، $d \setminus ab$ ، $(a,b)=1$
 حسب مبرهنة (٢-٣-٢) ، وعليه فإن $(c,e)=1$ ، $d=ce$ ، $e \setminus b$
 $g(ab) = \sum_{\substack{c|a \\ e|b}} f(ce)$. لكن f دالة ضربية . إذاً $f(ce) = f(c) \cdot f(e)$ ، وعليه
 فإن $g(ab) = \sum_{\substack{c|a \\ e|b}} f(c) \cdot f(e)$. لكن $\sum_{c|a} f(c) \cdot \sum_{e|b} f(e)$
 حسب مبرهنة (٢-١-٤) . إذاً $g(ab) = \sum_{a|c} f(c) \cdot \sum_{e|b} f(e) = g(a) \cdot g(b)$ ،
 وعليه فإن g دالة ضربية .

□

تمارين

(١) إذا كانت f, g دالتين ضربيتين ، $g(a) \neq 0$ لكل $a \in \mathbb{Z}$ ، فأثبت أن كلاً
 من $f \cdot g$ ، f/g دالة ضربية .

(٢) إذا كانت f دالة ضربية وكان $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{Z}^+$ ، $(a_i, a_j) = 1$ لكل
 $i \neq j$ ، فأثبت بالاستقراء أن $f(\prod_{i=1}^r a_i) = \prod_{i=1}^r f(a_i)$. واستنتج من ذلك

أنه إذا كان $a = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ ، p_i أعداد أولية ، فإن $f(a) = \prod_{i=1}^r f(p_i^{\alpha_i})$.

(٣) إذا كانت

$\wedge(n) = \begin{cases} \ln p & n = p^m \\ 0 & n \neq p^m \end{cases}$. تسمى هذه الدالة دالة مانجولد

(Mangoldt) . فأثبت أن \wedge دالة ليست ضربية و $\sum_{d|n} \wedge(d) = \ln(n)$

(٤) لتكن f دالة معرفة كالاتي

$$f(a) = \begin{cases} 0 & \text{عدد زوجي } a \\ 1 & \text{عدد فردي } a \end{cases} \text{ . ولتكن } g(a) = \sum_{d|a} f(a)$$

(أ) أثبت أن كلاً من f ، g دالة ضربية . (ب) أحسب $g(16)$ ، $g(2^m)$.

(ج) أحسب $g(81)$ ، $g(p^m)$ لكل عدد أولي فردي p .

(٥) إذا كان λ دالة معرفة كالاتي

$$\lambda(n) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } n=1 \\ (-1)^{e_1+e_2+\dots+e_r} & \text{إذا كان } n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} > 1 \end{cases}$$

تسمى λ دالة ليوفيلي نسبة للفرنسي جوزيف ليوفيلي (١٨٠٩-١٨٨٢م) .

(أ) أحسب $\lambda(39)$ ، $\lambda(180)$ ، $\lambda(4500)$.

(ب) أثبت أن λ دالة ضربية .

(ج) أثبت أن

$$\sum_{d|n} \lambda(d) = \begin{cases} 1 & n = m^2, m \in \mathbb{Z} \\ 0 & n \neq m^2 \end{cases}$$

٢-٤ : الدالتان مجموع وعدد قواسم عدد طبيعي

Sum and number of divisors

لقد جمع العالم الفيزيائي والرياضي كمال الدين الفارسي (ت ١٣٢٠م) في بحثه "تذكره الأحاباب في تمام التحاب ، [٣] أو [٥، ٤٩١-٥٣٨] " القضايا الضرورية لتمييز الدالتين العدديتين مجموع قواسم عدد صحيح وعدد هذه القواسم ، ومع أن الفارسي لم يعالج سوى $\sigma^*(n)$ التي تمثل مجموع أجزاء أو القواسم الفعلية للعدد n ، نلاحظ معرفته للدالة العددية $\sigma(n)$ التي تمثل مجموع قواسم العدد n على أنها دالة ضربية ، فقد أثبت :

(١) إذا كان $(a, b) = 1$ ، $n = ab$ ، فإن

$$\sigma^*(n) = a\sigma^*(b) + b\sigma^*(a) + \sigma^*(a) \cdot \sigma^*(b)$$

بالعبارة $\sigma(ab) = \sigma(a) \cdot \sigma(b)$.

(٢) إذا كان $(a, p) = 1$ ، p عدداً أولياً ، $n = ap$ ، فإن

$$\sigma^*(n) = p\sigma^*(a) + \sigma^*(a) + a$$

$$\sigma^*(n) = \sum_{k=0}^{r-1} p^k = \frac{p^r - 1}{p - 1} \text{ فإن } p \text{ عدداً أولياً ، } n = p^r \text{ (٣)}$$

وهذه القضايا منسوبة إلى الفرنسي ديكارت (١٥٩٦-١٦٥٠م) .

(٤) إذا كان $n = p_1 p_2 \cdots p_r$ حيث p_1, \dots, p_r أعداد أولية مختلفة فإن عدد

$$1 + \binom{r}{1} + \cdots + \binom{r}{r-1}$$

أجزاء n المسمى $\tau_0(n)$ يساوي

وهذه قضية منسوبة إلى الفرنسي دايدري Deidrierr .

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^r (e_i + 1) \text{ ، فإن عدد قواسم } n \text{ هو } n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} \text{ (٥)}$$

$\tau_0(n) = \tau(n) - 1$ وهذه قضية منسوبة إلى جون كيرسي

(John kersy) ومونتمرت (Montmort) .

والآن إلى دراسة خواص الدالتين σ ، τ .

تعريف ٤-٢-١ :

إذا كان n عدد صحيحاً موجباً ، فيرمز لعدد قواسم n بالرمز $\tau(n)$ ولمجموع

قواسم n بالرمز $\sigma(n)$.

$$\tau(n) = \sum_{d|n} 1 \text{ ، } \sigma(n) = \sum_{d|n} d \text{ إذا}$$

مثال (١) :

$$\sigma(1) = 1 \text{ ، } \sigma(2) = 1 + 2 = 3 \text{ ، } \sigma(3) = 1 + 3 = 4 \text{ (أ)}$$

$$\sigma(4) = 1 + 2 + 4 = 7 \text{ ، } \sigma(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$$

- (ب) $\tau(1) = 1$, $\tau(2) = 2$, $\tau(4) = 3$, $\tau(6) = 4$
 (ج) إذا كان $n = 2^3$ ، فإن $\tau(n) = 4$ ،
 $\sigma(n) = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 = 2^4 - 1 = 17$

ملاحظة :

- (١) $\sigma(n) = n + 1 \Leftrightarrow n$ عدد أولي .
 (٢) $\tau(n) = 2 \Leftrightarrow n$ عدد أولي .

مبرهنة ٤-٢-١ :

كل من τ ، σ دالة ضربية .

البرهان :

(أ) لتكن $f(n) = 1$ لكل $n \in \mathbb{Z}^+$. إذا f دالة ضربية لأن
 $\tau(n) = \sum_{d|n} f(d) = \sum_{d|n} 1$ ، وعليه فإن $f(mn) = 1 = 1 \cdot 1 = f(m) \cdot f(n)$
 دالة ضربية حسب مبرهنة (٤-١-٣) .

(ب) لتكن $g(n) = n$ لكل $n \in \mathbb{Z}^+$. إذا g دالة ضربية وعليه فإن
 $\sigma(n) = \sum_{d|n} g(d) = \sum_{d|n} d$ دالة ضربية حسب مبرهنة (٤-١-٣) .

□

ملاحظة :

يمكن أن نثبت أن σ دالة ضربية بدون استخدام مبرهنة (٤-٢-٣) كالآتي :
 نفرض أن $(a, b) = 1$ ، $a, b \in \mathbb{Z}^+$. إذا d/ab إذا وإذا فقط كان
 $d = ce$ ، $d = ce$ ، $c \setminus a$ ، $e \setminus b$ و $(c, e) = 1$ حسب مبرهنة (٢-٣-٢) .
 وعليه فإن قواسم ab هي ضرب قواسم a في قواسم b . فإذا كانت
 $1, a_1, \dots, a_r$ هي جميع قواسم a و $1, b_1, \dots, b_s$ هي جميع قواسم b ، فإن
 قواسم ab هي :

$$\left. \begin{array}{l} 1, a_1, \dots, a_r \\ b_1, a_1 b_1, \dots, a_r b_1 \\ b_2, a_1 b_2, \dots, a_r b_2 \\ \vdots \\ b_s, a_1 b_s, \dots, a_r b_s \end{array} \right\} \dots (1)$$

لكن $(a, b) = 1$. إذا $a_i b_j = a_k b_t \Rightarrow a_i = a_k, b_j = b_t$ ، وعليه لا يوجد تكرار في (1) . والآن

$$\begin{aligned} \sigma(ab) &= (1 + a_1 + \dots + a_r) + (b_1 + a_1 b_1 + \dots + a_r b_1) + \dots \\ &\quad + (b_1 + a_1 b_s + \dots + a_r b_s) \\ &= (1 + a_1 + \dots + a_r) + b_1(1 + a_1 + \dots + a_r) + \dots \\ &\quad + b_s(1 + a_1 + \dots + a_r) \\ &= (1 + a_1 + \dots + a_r) (1 + b_1 + \dots + b_s) = \sigma(a) \cdot \sigma(b) \end{aligned}$$

□

مبرهنة ٤-٢-٢ :

إذا كان $n = p^r$ ، عددًا أولياً فإن :

$$\sigma(n) = \frac{p^{r+1} - 1}{p - 1} \quad (\text{ب}) \quad , \quad \tau(n) = r + 1 \quad (\text{أ})$$

البرهان :

بما أن p عدد أولي . إذا قواسم n هي $1, p, p^2 + \dots + p^r$ ، وعليه فإن

$$\tau(n) = r + 1 \quad , \quad \sigma(n) = 1 + p + p^2 + \dots + p^r = \frac{p^{r+1} - 1}{p - 1}$$

□

مبرهنة ٤-٢-٣ : " الفارسي "

إذا كان $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$ ، فإن :

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1} \quad (\text{ب}) \quad , \quad \tau(n) = \prod_{i=1}^r (e_i + 1) \quad (\text{أ})$$

البرهان : (بالاستقراء) على r .

إذا كان $r = 1$ ، فإن العبارة صحيحة حسب مبرهنة (٤-٢-٢) .

والآن لنفرض أن العبارة صحيحة عندما $1 \leq r \leq m$ ، ولإثبات صحتها عندما

$r = m + 1$. لنفرض أن $n = \prod_{i=1}^{m+1} p_i^{e_i}$. إذاً $n = (\prod_{i=1}^m p_i^{e_i}) \cdot p_{m+1}^{e_{m+1}}$. لكن

$$\left(\prod_{i=1}^{m+1} p_i^{e_i}, p_{m+1}^{e_{m+1}} \right) = 1 \text{ وكلاً من } \tau, \sigma \text{ دالة ضربية . إذاً}$$

$$\tau(n) = \tau\left(\prod_{i=1}^m p_i^{e_i}\right) \cdot \tau(p_{m+1}^{e_{m+1}})$$

$$\sigma(n) = \sigma\left(\prod_{i=1}^m p_i^{e_i}\right) \cdot \sigma(p_{m+1}^{e_{m+1}})$$

لكن $\tau\left(\prod_{i=1}^m p_i^{e_i}\right) = \prod_{i=1}^m (e_i + 1)$ ، $\sigma\left(\prod_{i=1}^m p_i^{e_i}\right) = \prod_{i=1}^m \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}$ حسب فرضية

الاستقراء ، و $\tau(p_{m+1}^{e_{m+1}}) = e_{m+1} + 1$ ، $\sigma(p_{m+1}^{e_{m+1}}) = \frac{p_{m+1}^{e_{m+1}+1} - 1}{p_{m+1} - 1}$. إذاً

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^m (e_i + 1)(e_{m+1} + 1) = \prod_{i=1}^{m+1} (e_i + 1)$$

$$\sigma(n) = \left(\prod_{i=1}^m \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1} \right) \cdot \frac{p_{m+1}^{e_{m+1}+1} - 1}{p_{m+1} - 1} = \prod_{i=1}^{m+1} \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

وعليه فإن العبارة صحيحة عندما $r = m + 1$ ، وبالتالي فإن العبارة صحيحة

لكل $r \geq 1$

مثال (٢) :

أحسب $\tau(120)$ ، $\sigma(120)$

الحل :

بما أن $120 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1$ ، $\tau(n) = \prod_{i=1}^r (e_i + 1)$. إذاً

$$\tau(120) = (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 16$$

وحيث أن $\sigma(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}$. إذاً

$$\sigma(120) = \frac{2^4 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{3^2 - 1}{3 - 1} \cdot \frac{5^2 - 1}{5 - 1} = 17 \cdot 4 \cdot 6 = 408$$

مثال (٣) :

أوجد أصغر عدد صحيح موجب n بحيث أن $\tau(n) = 10$.

الحل :

بما أن $10 = 10 \cdot 1 = 5 \cdot 2$ ، إذاً $\tau(n) = (e_1 + 1)(e_2 + 1) = 10 \cdot 1$ ، وعليه
فإن $e_1 = 9, e_2 = 0 \vee e_1 = 4, e_2 = 1$. لكن $2^4 \cdot 3 < 2^9$. إذاً أصغر عدد
صحيح هو $n = 2^4 \cdot 3 = 48$.

وأخيراً إلى الدالة العددية $\sigma_m(n)$ والتي تعمم الدالتين $\tau(n), \sigma(n)$.

تعريف ٤-٢-٢ :

$$\sigma_m(n) = \sum_{d|n} d^m$$

مثال (٤) :

$$\sigma_2(6) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 6^2 = 50 \quad (\text{أ})$$

$$\sigma_3(10) = 1^3 + 2^3 + 5^3 + 10^3 = 1134 \quad (\text{ب})$$

$$\sigma_1(n) = \sum_{d|n} d = \sigma(n) , \quad \sigma_0(n) = \sum_{d|n} 1 = \tau(n)$$

مبرهنة ٤-٢-٤ :

(أ) $\sigma_m(n)$ دالة ضربية .

$$\sigma_m(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{m(e_i+1)} - 1}{p_i^m - 1} \quad \text{فإن} , \quad n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

البرهان :

(أ) لتكن $f(a) = a^r$ لكل $a \in \mathbb{Z}^+$. إذاً f دالة ضربية ، وعليه فإن

$$\sigma_m(n) = \sum_{d|n} f(d) = \sum_{d|n} d^m \quad \text{دالة ضربية حسب مبرهنة (٤-١-٣) .}$$

(ب) بما أن $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$. إذاً قواسم n هي $d = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ حيث $0 \leq \alpha_i \leq e_i$ ،

وعليه فإن

$$\begin{aligned} \sigma_m(n) &= \sum_{\alpha_1=0}^{e_1} \sum_{\alpha_2=0}^{e_2} \cdots \sum_{\alpha_r=0}^{e_r} \left(\prod_{i=1}^r p_i^{m\alpha_i} \right) \\ &= \prod_{i=1}^r (1 + p_i^m + \cdots + p_i^{me_i}) \end{aligned}$$

لكن $1, p_i^m, p_i^{2m}, \dots, p_i^{me_i}$ متوالية هندسية حدها الأول واحد وأساسها p_i^m

$$\sigma_m(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{(e_i+1)m} - 1}{p_i^m - 1} \quad \text{إذاً} \quad S = \frac{p_i^{(e_i+1)m} - 1}{p_i^m - 1} \quad \text{عنها}$$

□

مثال (٥) :

أحسب باستخدام مبرهنة (٤-٢-٤) $\sigma(60)$ ، $\sigma(360)$.

الحل :

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \quad \text{إذاً} \quad p_1 = 2 , p_2 = 3 , p_3 = 5 \quad \text{(أ)}$$

$$e_1 = 2 , e_2 = 1 , e_3 = 1 \quad \text{لكن}$$

$$\sigma(60) = \sigma_1(60) = \prod_{i=1}^3 (1 + p_i + p_i^2 + \cdots + p_i^{e_i})$$

$$= (1 + p_1 + p_1^2) (1 + p_2) (1 + p_3)$$

$$= (1 + 2 + 2^2) (1 + 3) (1 + 5) = 7 \times 4 \times 6 = 168$$

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \quad \text{إذاً} \quad e_1 = 3 , e_2 = 2 , e_3 = 1 \quad \text{(ب)}$$

$$p_1 = 2 , p_2 = 3 , p_3 = 5 \quad \text{لكن}$$

$$\sigma(360) = \sigma_1(360) = (1 + 2 + 2^2 + 2^3) (1 + 3 + 3^2) (1 + 5)$$

$$= 15 \times 13 \times 6 = 1170$$

تمارين

- (١) أحسب $\tau(n)$ ، $\sigma(n)$ لكل من 28,32,220,496,945 .
- (٢) أحسب $\sigma_2(n)$ ، $\sigma(n) = \sigma_1(n)$ لكل من 192,600 .
- (٣) أثبت أن $\sigma(n) = \sigma(n+1)$ عندما $n = 206,957$.
- (٤) إذا كان $n = 14$ ، فأثبت أن $\sigma(n) = \sigma(n+1)$ ، $\tau(n) = \tau(n+1)$.
- (٥) أوجد أصغر عدد صحيح موجب يحقق العلاقة $\tau(n) = 6$.
- (٦) إذا كان $n = 2^{m-1}$ ، $m \geq 2$ ، فأثبت أن $\sigma(n) = 2n - 1$.
- (٧) إذا كان $n = 2^{m-1}(2^m - 3)$ وكان $2^m - 3$ عدداً أولياً ، $m > 2$ ،
فأثبت أن $\sigma(n) = 2n + 2$.
- (٨) أثبت أن $\frac{\sigma(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{1}{d}$ ، ثم حقق ذلك عندما $n = 14$ ، $n = 36$.
- (٩) إذا كان $n > 1$ ، فأثبت أن $n^{\frac{\tau(n)}{2}} = \prod_{d|n} d$ ، ثم حقق ذلك عندما $n = 12$.
- (١٠) "الفارسي" إذا كانت $\sigma^*(n)$ تساوي مجموع أجزاء أو القواسم الفعلية للعدد n ، وكان $n = ab$ ، $(a,b) = 1$ ، b عدداً أولياً ، فأثبت أن
 $\sigma^*(ab) = b\sigma^*(a) + \sigma^*(a) + a$ ، ثم أحسب $\sigma^*(84)$ ، $\sigma^*(284)$.
- (١١) "الفارسي" إذا كان $n = ab$ ، $(a,b) = 1$ ، فأثبت أن
 $\sigma^*(ab) = a\sigma^*(b) + b\sigma^*(a) + \sigma^*(a) \cdot \sigma^*(b)$ ، ثم أحسب
 $\sigma^*(84)$ ، $\sigma^*(60)$.

٣-٤ : " دالة أويلر Euler phi function "

عرفنا دالة أويلر $\phi: Z^+ \rightarrow Z^+$ كالآتي :

$$\phi(n) = \left| \left\{ a \in Z^+ \mid 1 \leq a \leq n, (a, n) = 1 \right\} \right|$$

وسنركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة خواص تلك الدالة وبعض

$$\phi(n) = \sum_{\substack{(a,n)=1 \\ 1 \leq a \leq n}} 1 \quad \text{تطبيقاتها . لاحظ أن}$$

مبرهنة ١-٣-٤ :

إذا كان $n > 1$ ، فإن $\phi(n) = n - 1$ إذا وإذا فقط كان n عدداً أولياً .

البرهان :

نفرض أن n عدد أولي . إذا $1, 2, \dots, n-1$ أعداد أولية نسبياً مع n ، وعليه
فإن $\phi(n) = \left| \{ 1, 2, \dots, n-1 \} \right| = n - 1$.

ولإثبات العكس نفرض أن $\phi(n) = n - 1$ ، لكن n عدد مؤلف . إذا $n = ab$ ،
 $1 < a < n$ ، $1 < b < n$ حسب مبرهنة (٢-٢-١) ، وعليه فإن $(n, a) = a \neq 1$ ،
 $(n, b) = b \neq 1$. إذا يوجد على الأقل عددين من بين الأعداد $1, \dots, n-1$ ،
ليسا نسبيا أولياً مع n ، وعليه فإن $\phi(n) \leq n - 2$ وهذا يناقض الفرض .
إذا n عدد أولي .

□

مبرهنة ٢-٣-٤ :

إذا كان p عدداً أولياً ، فإن $\phi(p)^m = p^m - p^{m-1}$.

البرهان :

لستكن $A = \{ 1, 2, \dots, p^m \}$. إذا $|A| = p^m$. ولحساب
 $\phi(p)^m = \left| \{ a \in A \mid (a, p^m) = 1 \} \right|$ ، نفرض أن $B = \{ b \in A \mid (b, p^m) = d \neq 1 \}$
إذا d عامل من عوامل p^m ، وعليه فإن $p \nmid d$ وهذا يعني وجود $r \in Z^+$
بحيث أن $d = pr$ ، لكن $p \leq b \leq p^m$. إذا $p \leq rp \leq p^m$ ، وعليه فإن
 $1 \leq r \leq p^{m-1}$. إذا $B = \{ p, 2p, 3p, \dots, rp, \dots, p^{m-1} \cdot p \}$ ، وعليه فإن
 $|B| = p^{m-1}$ ، وبالتالي فإن $\phi(p)^m = p^m - p^{m-1}$.

مثال (١) :

$$\cdot \phi(2^5) = 2^5 - 2^4 = 16 \quad (\text{أ})$$

$$\cdot \phi(3^4) = 3^4 - 3^3 = 3^3(3-1) = 3^3 \cdot 2 = 24 \quad (\text{ب})$$

ولحساب $\phi(n)$ لأي عدد طبيعي n ، نورد ما يلي .

مبرهنة ٤-٣-٣ :

ϕ دالة ضربية .

البرهان :

نفرض أن $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ، $(m, n) = 1$ ، ولنفرض أن $f: \mathbb{Z}_{mn}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$

دالة معرفة كالآتي :

$$f(b) = (b \pmod m, b \pmod n) \quad \text{لكل } b \in \mathbb{Z}_{mn}^* = \{1, 2, \dots, mn-1\}$$

$$\mathbb{Z}_m^* = \{1, 2, \dots, m-1\} \quad , \quad \mathbb{Z}_n^* = \{1, 2, \dots, n-1\} \quad . \quad \text{إذاً } f \text{ دالة متباينة}$$

(أحادية) ، لأن $f(b) = f(c)$ يعني أن $m \mid b-c$ و $n \mid b-c$. لكن

$$(m, n) = 1 \quad . \quad \text{إذاً } mn \mid b-c \quad \text{حسب نتيجة (٢) مبرهنة (٢-١-٨) ، وعليه}$$

$$\text{فإن } b \equiv c \pmod{mn} \quad \text{وهذا يعني أن } b = c \in \mathbb{Z}_{mn}^* .$$

f دالة شاملة لأن لكل $(a, c) \in \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ ، $(a, m) = 1$ ، $(c, n) = 1$ يوجد

$$b \in \mathbb{Z} \quad \text{بحيث أن } b \equiv a \pmod m \quad , \quad b \equiv c \pmod n \quad \text{حسب مبرهنة الباقي}$$

الصينية . لكن $(b, m) = (a, m) = 1$ ، $(b, n) = (c, n) = 1$ ، إذاً

$$(b, mn) = 1 \quad , \quad \text{وعليه فإن } f(b) = (a, c) \quad \text{فإن } b \in \mathbb{Z}_{mn}^* \quad , \quad \text{إذاً } f \text{ تقابل .}$$

$$\text{وعليه فإن } |\mathbb{Z}_{mn}^*| = |\mathbb{Z}_m^*| \times |\mathbb{Z}_n^*| \quad , \quad \text{وبالتالي فإن } \phi(mn) = \phi(m) \cdot \phi(n) .$$

□

نتيجة (١) :

إذا كان $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}^+$ ، $(n_i, n_j) = 1$ لكل $i \neq j$ ، فإن

$$\phi\left(\prod_{i=1}^r n_i\right) = \prod_{i=1}^r \phi(n_i)$$

البرهان :

بالإستقراء على r ويترك للقارئ .

□

نتيجة (٢) :

$$\phi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \text{ ، فإن } n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

البرهان :

إذا كان $r=1$ ، فإن $n = p_1^{e_1}$ ، وعليه فإن $\phi(n) = p_1^{e_1} - p_1^{e_1-1}$ حسب

$$\phi(n) = p_1^{e_1} (1 - p_1^{-1}) = p_1^{e_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \text{ . إذاً (٢-٣-٤) مبرهنة}$$

وعليه فإن النتيجة صحيحة عندما $r=1$. أما إذا كان $r \geq 2$ ، فإن

$$(p_i^{e_i}, p_j^{e_j}) = 1 \text{ لكل } i \neq j \text{ ، وعليه فإن}$$

$$\phi(n) = \phi\left(\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}\right) = \prod_{i=1}^r \phi(p_i^{e_i}) \quad \text{" حسب نتيجة (١) "$$

$$= \prod_{i=1}^r (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}) \quad \text{" حسب مبرهنة (٢-٣-٤) "$$

$$= \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

$$= n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

□

مثال (٢) :

أحسب $\phi(45)$ ، $\phi(192)$ ، $\phi(3600)$.

الحل :

(أ) بما أن $45 = 3^2 \cdot 5$. إذاً

$$\phi(45) = \phi(3^2 \cdot 5) = \phi(3^2) \cdot \phi(5) = 3^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot 4 = 3^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 = 24$$

(ب) بما أن $192 = 2^6 \cdot 3$. إذاً

$$\phi(192) = \phi(2^6 \cdot 3) = \phi(2^6) \cdot \phi(3) = 2^6 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot 2 = 2^5 \cdot 2 = 2^6 = 64$$

(ج) بما أن $3600 = 3^2 \cdot 2^4 \cdot 5^2$. إذاً

$$\begin{aligned} \phi(3600) &= \phi(3^2) \cdot \phi(2^4) \cdot \phi(5^2) = 3^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot 2^4 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot 5^2 \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 3^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 2^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 5^2 \cdot \frac{4}{5} = 6 \cdot 8 \cdot 20 = 960 \end{aligned}$$

ملاحظة :

ϕ دالة ليست ضربية كلياً كما يوضح ذلك المثال الآتي

$$4 = \phi(12) = \phi(6 \cdot 2) \neq \phi(6) \cdot \phi(2) = 2 \cdot 1 = 2$$

والآن إلى خواص أخرى للدالة ϕ .

مبرهنة ٤-٣-٤ :

إذا كان $n > 2$ ، فإن $\phi(n)$ عدد زوجي .

البرهان :

إذا كان $n = 2^m$ ، $m \geq 2$ ، فإن $\phi(n) = \phi(2^m) = 2^m \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 2^{m-1}$ عدد

زوجي . أما إذا كان $n \neq 2^m$ ، فإن $p \mid n$ ، و p عدد أولي فردي ، وعليه

يمكن أن يكون $n = ap^r$ ، $r \geq 1$ ، $(a, p^r) = 1$ ، وعليه فإن

$\phi(n) = \phi(a) \cdot \phi(p^r) = p^{r-1} (p-1) \cdot \phi(a)$. لكن $2 \mid p-1$ ، لأن p عدد

أولي فردي ، إذاً $\phi(n)$ عدد زوجي .

□

مبرهنة ٤-٣-٥ :

إذا كان $n > 1$ ، وكان R نظام بواقي مختزل قياس n ، فإن $\sum_{a \in R} a = \frac{n}{2} \cdot \phi(n)$.

البرهان :

بما أن R نظام بواقى مختزل قياس n . إذاً $|R| = \phi(n)$ ، وعليه يمكن أن نفرض أن $R = \{a_1, \dots, a_{\phi(n)}\}$ ، وبالتالي فإن $S = \sum_{a \in R} a = \sum_{i=1}^{\phi(n)} a_i$. لكن

$(n - a_i, n) = 1 \Leftrightarrow (a_i, n) = 1$. إذاً $S = \sum_{i=1}^{\phi(n)} (n - a_i)$ ، وعليه فإن

$$S = \frac{n}{2} \cdot \phi(n) \quad \text{إذاً} \quad 2S = \sum_{i=1}^{\phi(n)} a_i + \sum_{i=1}^{\phi(n)} (n - a_i) = \sum_{i=1}^{\phi(n)} n = n \cdot \phi(n)$$

□

مثال (٣) :

حقق مبرهنة (٤-٣-٥) عندما $n = 12$.

الحل :

بما أن $\phi(12) = 12(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$. إذاً توجد أربعة

أعداد أقل من 12 وقاسمها المشترك الأعظم مع 12 يساوي واحد وهي 1, 5, 7, 11 ، وعليه فإن

$$S = 1 + 5 + 7 + 11 = 24 \quad , \quad \frac{n}{2} \cdot \phi(n) = \frac{12}{2} \cdot \phi(12) = 24$$

وبالتالي فإن $S = \frac{n}{2} \cdot \phi(n)$

مبرهنة ٤-٣-٦ :

إذا كان $n \in \mathbb{Z}^+$ ، فإن $\sum_{d|n} \phi(d) = n$.

البرهان :

لتكن $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$. سنبرهن بالاستقراء على r أن $\sum_{d|n} \phi(d) = n$. إذا كان

$r = 1$ ، فإن $n = p_1^{e_1}$ ، وعليه فإن قواسم n هي $1, p_1, p_1^2, \dots, p_1^{e_1}$

إذاً

$$\begin{aligned}
\sum_{d|n} \phi(d) &= \phi(1) + \phi(p_1) + \phi(p_1^2) + \dots + \phi(p_1^{e_1}) \\
&= 1 + (p_1 - 1) + p_1(p_1 - 1) + \dots + p_1^{e_1-1}(p_1 - 1) \\
&= 1 + (p_1 - 1)[1 + p_1 + \dots + p_1^{e_1-1}] = 1 + (p_1 - 1) \cdot \frac{p_1^{e_1} - 1}{p_1 - 1} \\
&= p_1^{e_1}
\end{aligned}$$

وعليه فإن المبرهنة صحيحة عندما $r = 1$. والآن لنفرض أن المبرهنة صحيحة

$$\text{عندما } r = m \text{ . إذاً } \sum_{d|n} \phi(d) = n \text{ . } n = \prod_{i=1}^m p_i^{e_i} \Rightarrow$$

ولإثبات صحة المبرهنة عندما $r = m + 1$. لاحظ أن

$$a = \prod_{i=1}^{m+1} p_i^{e_i} = \left(\prod_{i=1}^m p_i^{e_i} \right) \cdot p_{m+1}^{e_{m+1}} = n \cdot p_{m+1}^{e_{m+1}}$$

فإذا فرضنا أن $p_{m+1} = p$ ، $e_{m+1} = t$ ، فإن $a = n \cdot p^t$ ، $(p, n) = 1$ ،
 $(p^t, n) = 1$ ، وعليه إذا كان d قاسماً للعدد n ، فإن كلاً من
 d, dp, dp^2, \dots, dp^t قاسم للعدد a ، وعليه فإن

$$\sum_{d|a} \phi(d) = \sum_{d|n} \phi(n) + \sum_{d|n} \phi(p^2 d) + \dots + \sum_{d|n} \phi(dp^t)$$

لكن $(p^t, n) = 1$ ، دالة ضربية . إذاً

$$\begin{aligned}
\sum_{d|a} \phi(d) &= \sum_{d|n} \phi(d) [1 + \phi(p) + \dots + \phi(p^t)] \\
&= \sum_{d|n} \phi(d) \cdot \sum_{b|p^t} \phi(b) = n \cdot p^t = a
\end{aligned}$$

وعليه فإن المبرهنة صحيحة عندما $r = m + 1$. إذاً المبرهنة صحيحة لكل

$$r \geq 1$$

□

مثال (٤) :

حقق مبرهنة (٤-٣-٦) عندما $n = 3^2 \cdot 5$.

الحل :

بما أن $\tau(n) = 3 \cdot 2 = 6$. إذاً كل من $1, 3, 3^2, 5, 15, 45$ قاسم للعدد n ،
وعليه فإن

$$\begin{aligned} \sum_{d \mid n} \phi(d) &= \phi(1) + \phi(3) + \phi(3^2) + \phi(5) + \phi(15) + \phi(45) \\ &= 1 + 2 + 3^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) + 4 + \phi(3) \cdot \phi(5) + \phi(3^2) \cdot \phi(5) \\ &= 1 + 2 + 6 + 4 + 2(4) + 6(4) = 13 + 8 + 24 = 45 = n \end{aligned}$$

□

ملاحظة (١) :

لحل المعادلة $\phi(x) = m$ ، لاحظ أن :

$$x = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} \Rightarrow \phi(x) = \prod_{i=1}^r (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}) = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i-1} (p_i - 1)m$$

إذاً إذا كان $d_i = p_i - 1$ ، فإن $i = 1, \dots, r$ ،

$$\prod_{i=1}^r p_i^{e_i-1} d_i = m \Rightarrow \prod_{i=1}^r \left(\frac{p_i^{e_i}}{p_i}\right) d_i = m \Rightarrow \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} \left(\frac{d_i}{p_i}\right) = m$$

$$\Rightarrow \left(\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}\right) \cdot \prod_{i=1}^r \left(\frac{d_i}{p_i}\right) = m \Rightarrow x \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} \left(\frac{d_i}{p_i}\right) = m \Rightarrow x = \frac{m}{\prod_{i=1}^r d_i} \cdot \prod_{i=1}^r p_i$$

وعليه فإن لحل المعادلة $\phi(x) = m$ ، نوجد d_i بحيث أن $d_i \mid m$ و $(d_i + 1)$

عدد أولي . كما أن $\frac{m}{\prod_{i=1}^r d_i}$ عدد صحيح موجب لا يحوي أي قاسم أولي غير

موجود في $\prod_{i=1}^r p_i$.

ولتوضيح هذه الطريقة نورد الأمثلة الآتية :

مثال (٥) :

حل المعادلة $\phi(x) = 12$.

الحل :

بما أن قواسم العدد $12 = 2^2 \cdot 3$ هي $1, 2, 3, 4, 6, 12$. إذا $d \setminus 12$ و $d+1$ عدد أولي يعني أن $d \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. وبتطبيق الشروط أعلاه نجد أن

| $\prod_{i=1}^r d_i$ | $\frac{6}{\prod_{i=1}^r d_i}$ | $\prod_{i=1}^r p_i$ | $x = \frac{6}{\prod_{i=1}^r d_i} \cdot \prod_{i=1}^r p_i$ |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 1·2 | 2·3 | 2·3 | $2^2 \cdot 3^2 = 36$ |
| 1·6 | 2 | 2·7 | $2^2 \cdot 7 = 28$ |
| 1·12 | 1 | 2·13 | $1 \cdot 2 \cdot 13 = 26$ |
| 12 | 1 | 13 | $1 \cdot 13 = 13$ |
| 2·6 | 1 | 3·7 | $3 \cdot 7 = 21$ |
| 1·2·6 | 1 | 2·3·7 | $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$ |

إذا مجموعة حل المعادلة $\phi(x) = 12$ هي $\{13, 21, 26, 28, 36, 42\}$.

مثال (٦) :

حل المعادلة $\phi(x) = 6$.

الحل :

بما أن قواسم العدد 6 هي $1, 2, 3, 6$. إذا $d \setminus 6$ و $d+1$ عدد أولي يعني أن $d \in \{1, 2, 6\}$ وبتطبيق الشرط $\frac{6}{\prod_{i=1}^r d_i}$ عدد صحيح موجب لا يحوي أي قاسم

أولي غير موجود في $\prod_{i=1}^r p_i$ نجد أن

| $\prod_{i=1}^r d_i$ | $\frac{6}{\prod_{i=1}^r d_i}$ | $\prod_{i=1}^r p_i$ | $x = \frac{6}{\prod_{i=1}^r d_i} \cdot \prod_{i=1}^r p_i$ |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 2 | 3 | 3 | $3 \cdot 3 = 9$ |
| 6 | 1 | 7 | $1 \cdot 7 = 7$ |
| 1·2 | 3 | 2·3 | $2 \cdot 3^2 = 18$ |
| 1·6 | 1 | 2·7 | $1 \cdot 2 \cdot 7 = 14$ |

وعليه فإن مجموعة الحل هي $\{9, 7, 14, 18\}$.

ملاحظة (٢) :

إذا كان عدد الحلول معلوماً أو أن m صغيرة ، فيمكن تطبيق مبرهنة (٤-٣-٣) لإيجاد عددين أوليين نسبياً a, b بحيث أن $\phi(x = ab) = \phi(a) \cdot \phi(b) = m$ وبالرجوع إلى المثال (٦) ، لاحظ أن

$$(1,7) = 1 \Rightarrow \phi(7) = \phi(1)\phi(7) = 6 \Rightarrow x = 7$$

$$(1,9) = 1 \Rightarrow \phi(9) = 6 \Rightarrow x = 9$$

$$(2,7) = 1 \Rightarrow \phi(14) = \phi(2) \cdot \phi(7) = 1 \cdot 6 = 6 \Rightarrow x = 14$$

$$(2,9) = 1 \Rightarrow \phi(18) = \phi(2) \cdot \phi(9) = 1 \cdot 6 = 6 \Rightarrow x = 18$$

وعليه فإن مجموعة الحل هي $\{7,9,14,18\}$

مثال (٧) :

حل المعادلة $\phi(x) = 10$

الحل :

$$(1,11) = 1 \Rightarrow \phi(1 \cdot 11) = \phi(1) \cdot \phi(11) = 1 \cdot 10 = 10 \Rightarrow x = 11$$

$$(2,11) = 1 \Rightarrow \phi(2 \cdot 11) = \phi(2) \cdot \phi(11) = 1 \cdot 10 = 10 \Rightarrow x = 22$$

وعليه فإن مجموعة الحل هي $\{11,22\}$

وبتطبيق الطريقة الواردة في الملاحظة (١) نحصل على نفس الجواب ، لأن

قواسم العدد 10 هي 1,2,5,10 و $d \setminus 10 \Leftrightarrow d+1$ عدد أولي يعني أن

$d \in \{1,2,10\}$ ، وبالتالي فإن

| $t = \prod_{i=1}^r d_i$ | $\frac{10}{t}$ | $\prod_{i=1}^r p_i$ | $x = \frac{10}{t} \cdot \prod_{i=1}^r p_i$ |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| 10 | 1 | 11 | 11 |
| 1 · 10 | 1 | 2 · 11 | 22 |

تمارين

- (١) أحسب $\phi(n)$ عندما $n = 360, 540, 8316, 245000$.
- (٢) أوجد أصغر عدد أولي p بحيث أن $7 \mid \phi(p)$.
- (٣) إذا كان n عدداً فردياً ، فأثبت أن $\phi(2n) = \phi(n)$.
- (٤) (أ) إذا كان p عدداً أولياً ، $n \in \mathbb{Z}^+$ وكان $p \mid n$ ، فأثبت أن $p-1 \mid \phi(n)$.
- (ب) بين بمثال على أن $p-1 \mid \phi(n)$ لا يعني أن $p \mid n$.
- (٥) إذا كان $n, d \in \mathbb{Z}^+$ و $d \mid n$ ، فأثبت أن $\phi(d) \mid \phi(n)$.
- (٦) إذا كان $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$ ، فأثبت أن $\sum_{d \mid n} d \phi(d) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{2e_i+1} + 1}{p_i + 1}$.
- (٧) حقق مبرهنة (٥-٣-٤) عندما $n = 48$.
- (٨) حقق مبرهنة (٦-٣-٤) عندما $n = 78$ وعندما $n = 150$.
- (٩) إذا كان $d = (m, n)$ ، فأثبت أن $\phi(mn) = \frac{d \phi(m) \cdot \phi(n)}{\phi(d)}$.
- ثم حقق ذلك عندما $m = 28$ ، $n = 42$.
- (١٠) إذا كان n عدداً زوجياً ، فأثبت أن $\phi(2n) = 2\phi(n)$.
- (١١) أثبت أن $\phi(n^2) = n\phi(n)$ ، ثم أثبت أن $\phi(n^m) = n^{m-1} \phi(n)$ لكل $m \geq 2$.
- (١٢) إذا كان $m, n \in \mathbb{Z}^+$ و $m\phi(m) = n\phi(n)$ ، فأثبت أن $m = n$.
- (١٣) حل المعادلة $\phi(x) = m$ عندما $m = 4, m = 16, m = 24, m = 72$.

(١٤) إذا كان p عدداً أولياً وكان $2p+1$ عدداً مؤلفاً ، فبرهن على عدم وجود حل للمعادلة $\phi(x) = 2p$.

(١٥) برهن على عدم وجود حل لكل مما يأتي :
 . $\phi(x) = 124$ ، $\phi(x) = 34$ ، $\phi(x) = 26$

٤-٤ : دالة موبيس " The Möbius function $\mu(n)$ "

ظهرت الدالة $\mu(n)$ بصورة غير مباشرة في أعمال أويلر سنة ١٧٤٨م لكن الألماني موبيس (١٧٩٠-١٨٦٨) هو أول من درس خواصها سنة ١٨٣٢م . وسنركز اهتمامنا في هذا الجزء على تعريف هذه الدالة ودراسة خواصها وعلاقتها بالدوال العددية الأخرى .

تعريف ٤-٤-١ :

إذا كان $n \in \mathbb{Z}^+$ ، فتعرف $\mu(n)$ كالآتي :

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } n=1 \\ 0 & \text{إذا كان } p \text{ عدداً أولياً ، } p^2 \mid n \\ (-1)^r & \text{إذا كان } n = \prod_{i=1}^r p_i \text{ أعداد أولية مختلفة} \end{cases}$$

مثال (١) :

(أ) $\mu(1) = 1$ ، $\mu(2) = -1$ ، $\mu(10) = (-1)^2 = 1$ ، $\mu(16) = 0$
 (ب) إذا كان p عدداً أولياً ، فإن $\mu(p) = -1$ و $\mu(p^m) = 0$ لكل $m \geq 2$

والآن إلى دراسة خواص دالة موبيس .

مبرهنة ٤-٤-١ :

μ دالة ضربية .

البرهان :

نفرض أن $(a, b) = 1$ ، $a, b \in \mathbb{Z}^+$. إذا :

(أ) إذا كان $a=1$ أو $b=1$ ، يمكننا أن نفرض أن $b=1$ فنجد أن

$$\mu(ab) = \mu(a) = \mu(a) \cdot 1 = \mu(a) \cdot \mu(b)$$

(ب) إذا كان p عدداً أولياً و $p^2 \nmid a$ أو $p^2 \nmid b$ ، فإن $p^2 \nmid ab$ كما أن $\mu(a) = 0$ أو $\mu(b) = 0$ ، وعليه فإن $\mu(ab) = 0 = \mu(a) \cdot \mu(b)$.

(ج) إذا كان $a = \prod_{i=1}^r p_i$ ، $b = \prod_{j=1}^s q_j$ و p عدد أولي، فإن $p^2 \nmid a$ أو $p^2 \nmid b$ حيث p_i, q_j أعداد أولية مختلفة، إذاً

$$\begin{aligned} \mu(ab) &= \mu(p_1 p_2 \cdots p_r \cdot q_1 q_2 \cdots q_s) = (-1)^{r+s} \\ &= (-1)^r \cdot (-1)^s = \mu(a) \cdot \mu(b) \end{aligned}$$

□

مثال (٢) :

ليكن $n = 30$. إذاً $n = 2 \cdot 3 \cdot 5$ ، وعليه فإن قواسم n هي $1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$ وبالتالي فإن

$$\begin{aligned} \sum_{d \mid 30} \mu(d) &= \mu(1) + \mu(2) + \mu(5) + \mu(6) + \mu(10) + \mu(15) + \mu(30) \\ &= 1 + (-1) + (-1) + (-1) + 1 + 1 + 1 + (-1) = 4 - 4 = 0 \end{aligned}$$

وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي :

مبرهنة ٤-٤-٢ :

إذا كان $n \geq 1$ ، فإن

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{عندما } n = 1 \\ 0 & \text{عندما } n > 1 \end{cases}$$

البرهان :

$$F(1) = \sum_{d \mid 1} \mu(d) = \mu(1) = 1 \text{ . إذاً } F(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d)$$

وإذا كان $n = p^m$ حيث p عدد أولي، فإن

$$F(p^m) = \sum_{d \mid p^m} \mu(d) = \mu(1) + \mu(p) + \mu(p^2) + \cdots + \mu(p^m)$$

لكـ _____ $\mu(p^m) = 0$ لـ _____ $m \geq 2$ ، $\mu(p) = -1$ ، $\mu(1) = 1$.

$$\text{إذاً } F(p^m) = 1 - 1 = 0$$

والآن لنفرض أن $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$. إذاً $F(n) = F(\prod_{i=1}^r p_i^{e_i})$. لكن دالة ضربية

حسب مبرهنة (٣-١-٤) ، إذاً $F(n) = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} F(p_i^{e_i}) = 0$ ، وعليه فإن

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{عندما } n = 1 \\ 0 & \text{عندما } n > 1 \end{cases}$$

□

مبرهنة ٣-٤-٤ :

إذا كان $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$ وكانت f دالة ضربية ، فإن

$$\sum_{d|n} \mu(d) f(d) = \prod_{i=1}^r (1 - f(p_i))$$

البرهان :

نفرض أن $g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f(d)$. إذاً g دالة ضربية حسب مبرهنة (٣-١-٤)

وعليه فإن $g(n) = g(\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}) = \prod_{i=1}^r g(p_i^{e_i})$. لكن

$$g(p_i^{e_i}) = \sum_{d|p_i^{e_i}} \mu(d) f(d)$$

$$= \mu(1)f(1) + \mu(p_i)f(p_i) + \mu(p_i^2)f(p_i^2) + \dots + \mu(p_i^{e_i})f(p_i^{e_i})$$

لكن f دالة ضربية ، إذاً $f(1) = 1$ كما أن $\mu(1) = 1$ ، $\mu(p_i) = -1$ ،

$\mu(p_i^{e_i}) = 0$ لكل $e_i \geq 2$ ، وعليه فإن $g(p_i^{e_i}) = 1 - f(p_i)$ ، وبالتالي فإن

$$g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f(d) = \prod_{i=1}^r g(p_i^{e_i}) = \prod_{i=1}^r (1 - f(p_i))$$

" مبرهنة ٤-٤-٤ : قانون التعاكس لموبيص Möbus Inversion formula "

إذا كانت f, g دالتين عدديتين وكانت $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$ ، فإن

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d)$$

البرهان :

$$\sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \cdot \sum_{b|\frac{n}{d}} f(b) = \sum_{d|n} \left(\sum_{b|\frac{n}{d}} \mu(d) f(b) \right)$$

لكن $d|n$ و $b|\frac{n}{d} \Leftrightarrow b|n$ و $d|\frac{n}{b}$. إذاً

$$\sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{b|n} \left(\sum_{d|\frac{n}{b}} f(b) \cdot \mu(d) \right) = \sum_{b|n} f(b) \cdot \sum_{d|\frac{n}{b}} \mu(d)$$

لكن $\sum_{d|\frac{n}{b}} \mu(d) = 0$ لكل $\frac{n}{b} \neq 1$ و $\sum_{d|\frac{n}{b}} \mu(d) = 1$ عندما $\frac{n}{b} = 1$

حسب مبرهنة (٤-٤-٢) . إذاً

$$\sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{b=n} f(b) \cdot 1 = \sum_{b=n} f(b) = f(n)$$

وحيث أن $\sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d)$ لأنه إذا كان d قاسماً للعدد n فإن

$\frac{n}{d}$ قاسم للعدد n أيضاً وعدد القواسم d يساوي عدد القواسم $\frac{n}{d}$. إذاً

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d)$$

□

نتيجة (١) :

$$\sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \sigma(d) = n \quad (\text{ب}) \quad , \quad \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \tau(d) = 1 \quad (\text{أ})$$

$$\cdot \frac{\phi(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} \quad (\text{ج})$$

البرهان :

(أ) بما أن $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$. إذاً $\sum_{d|n} \mu(d) \tau\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \tau(d) = 1$.
قانون موبص للتعاكس .

(ب) بما أن $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$. إذاً $\sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \sigma(d) = \sum_{d|n} \mu(d) \sigma\left(\frac{n}{d}\right) = n$.
حسب قانون موبص للتعاكس .

(ج) بما أن $n = \sum_{d|n} \phi(d) = \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right)$. إذاً
حسب قانون موبص للتعاكس ، وعليه فإن
$$\phi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \cdot \frac{n}{d}$$
$$\cdot \frac{\phi(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$$

□

نتيجة (٢) : " عكس مبرهنة ٤-١-٣ "

إذا كانت g دالة ضربية و $f(n) = \sum_{d|n} f(d)$ ، فإن f دالة ضربية .

البرهان :

ليكن $a, b \in \mathbb{Z}^+$ و $(a, b) = 1$. إذاً $f(ab) = \sum_{d|ab} \mu(d) g\left(\frac{ab}{d}\right)$ حسب قانون موبص للتعاكس لكن $d \mid ab$. إذاً وإذا فقط وجد عدان وحيدان $c, e \in \mathbb{Z}^+$ بحيث أن $c \mid a$ و $e \mid b$ ، $(c, e) = 1$ ، $d = ce$ ، حسب مبرهنة (٢-٣-٢) .

$$\cdot f(ab) = \sum_{\substack{d|a \\ e|b}} \mu(ce) g\left(\frac{ab}{ce}\right) \text{ إذاً}$$

لكن كلاً من μ, g دالة ضربية . إذاً

$$f(ab) = \sum_{\substack{c|a \\ e|b}} \mu(c) \mu(e) g\left(\frac{a}{c}\right) \cdot g\left(\frac{b}{e}\right) = \sum_{c|a} \mu(c) g\left(\frac{a}{c}\right) \cdot \sum_{e|b} \mu(e) g\left(\frac{b}{e}\right) = f(a) \cdot f(b)$$

وعليه فإن f دالة ضربية .

تمارين

- (١) أحسب $\mu(n)$ عندما $n = 18, 23, 34, 35, 48, 90$.
- (٢) أوجد $n \in \mathbb{Z}^+$ بحيث أن $\mu(n) + \mu(n+1) + \mu(n+2) = 3$.
- (٣) أثبت أن $\mu(n)\mu(n+1)\mu(n+2)\mu(n+3) = 1$ لكل $n \in \mathbb{Z}^+$.
- (٤) أثبت أن $\sum_{k=1}^n \mu(k!) = 1$ لكل $n \geq 3$.
- (٥) إذا كان $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$ ، فأثبت بتطبيق مبرهنة (٤-٤-٣) أن :
- (أ) $\sum_{d|n} \mu(d) \sigma(d) = (-1)^r \prod_{i=1}^r p_i$ ، (ب) $\sum_{d|n} \mu(d) \tau(d) = (-1)^r$ (ج) $\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \prod_{i=1}^r p_i (1 - \frac{1}{p_i})$ (د) $\sum_{d|n} d \mu(d) = \prod_{i=1}^r (1 - p_i)$ (هـ) حقق " أ ، ب ، ج ، د " عندما $n = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2$.
- (٦) إذا كان
- $$\wedge(n) = \begin{cases} \ln p & \text{أولياً، } m \geq 1 \\ 0 & n \neq p^m \end{cases}$$
- ، فأثبت أن $\wedge(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \ln(d) = -\sum_{d|n} \mu(d) \ln(d)$. تسمى هذه الدالة دالة مانجولد " لاحظ أن $\sum_{d|n} \wedge(d) = \ln(n)$ وبتطبيق قانون موبيرس للتعاكس تحصل على المطلوب " .
- (٧) أثبت أن $f(n) = n\mu(n)$ دالة ضربية ، ثم أثبت أن
- $$\sum_{d|n} d \mu(d) = \frac{(-1)^r \phi(n) \prod_{i=1}^r p_i}{n}$$
- ، ثم حقق ذلك عندما $n = 40500$.
- (٨) إذا كانت λ دالة ليوفيلي ، فأثبت أن $\sum_{d|n} \mu(d) \lambda(d) = 2^r$.

٤-٥ : الدالة زيتا $\zeta(s)$ The Zeta function

عُرِّفت $\zeta(s)$ من قبل أويلر سنة ١٧٣٧م لكل $s \in \mathbb{R}^+$ ، ثم وسَّع ريمان التعريف سنة ١٨٥٩م لكل $s \in \mathbb{C} - \{1\}$ ، ولهذا تسمى هذه الدالة دالة زيتا الريمانية (Riemann Zeta function) وتمكن أهمية هذه الدالة في كثرة تطبيقاتها في نظرية الأعداد والفيزياء النظرية . وسنركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة بعض الخواص الأساسية لهذه الدالة .

تعريف ٤-٥-١ :

إذا كان $s = a + ib \in \mathbb{C}$ ، فتعرف الدالة زيتا كالتالي :

$$\cdot R(s) = a > 0 , \quad \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

مثال (١) : " أويلر "

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} , \quad \zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

مبرهنة ٤-٥-١ : " أويلر "

إذا كان $R(s) > 1$ ، فإن $\zeta(s) = \prod_{p \in P} (1 - p^{-s})^{-1}$ ، حيث P مجموعة جميع

الأعداد الأولية .

البرهان :

$$\begin{aligned} \zeta(s) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \dots + \frac{1}{n^s} + \dots \\ &= (1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{2^{2s}} + \dots)(1 + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{3^{2s}} + \dots)(1 + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{5^{2s}} + \dots) \dots \\ &= \prod_{p \in P} (1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \dots) = \prod_{p \in P} \sum_{m=0}^{\infty} p^{-ms} \end{aligned}$$

لكن $p \geq 2$ و $R(s) > 1$. إذا $\sum_{m=0}^{\infty} p^{-ms}$ متقاربة بصورة مطلقة

$$\zeta(s) = \prod_{p \in P} (1 - p^{-s})^{-1} \text{ ، وعليه فإن } \sum_{m=0}^{\infty} p^{-ms} = (1 - p^{-s})^{-1} \text{ و}$$

□

ولحساب بعض قيم $\zeta(s)$ نورد الآتي .

تعريف ٤-٥-٢ :

تعرف أعداد برنولي (Bernoulli numbers) B_m بالمعاملات في متسلسلة القوى

$$\frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{x}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} B_m \frac{x^{2m}}{(2m)!}$$

ومنها نجد أن

$$B_1 = \frac{1}{6} , B_2 = \frac{1}{30} , B_3 = \frac{1}{42} , B_4 = \frac{1}{30} , B_5 = \frac{5}{66}$$

$$, B_6 = \frac{691}{2730} , B_7 = \frac{7}{6} , B_8 = \frac{3617}{510} , B_9 = \frac{43867}{798}$$

$$B_{10} = \frac{283617}{330} , B_{11} = \frac{11131593}{138}$$

ملاحظة :

يمكن تعريف أعداد برنولي كالاتي $\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{b_m x^m}{m!}$ ، ومنها نجد أن

$$b_0 = 1 , b_1 = -\frac{1}{2} , b_{2m+1} = 0 \forall m > 1 , b_{2m} = (1-)^{m-1} B_m$$

مبرهنة ٤-٥-٢ :

إذا كان m عدداً صحيحاً موجباً أكبر من الواحد ، فإن

$$\zeta(2m) = \frac{2^{2m-1}}{(2m)!} B_m \pi^{2m}$$

البرهان :

من تعريف أعداد برنولي ووضع $x = 2iz$ ، نجد أن

$$z \cot z = 1 - \sum_{m=1}^{\infty} B_m \frac{2^{2m} z^{2m}}{(2m)!} \dots (1)$$

لكن إذا . $\sin z = z \cdot \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2})$

و عليه فإن ، $\ln(\sin z) = \ln(z) + \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2})$

ومن هنا نجد أن ، $\frac{1}{\sin z} \cdot \cos z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2})} \cdot \frac{-2z}{n^2 \pi^2}$

$z \cot z = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^2}{z^2 - n^2 \pi^2} = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2})} \cdot \frac{z^2}{n^2 \pi^2}$

$= 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2})^{-1} \cdot \frac{z^2}{n^2 \pi^2} = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^{2m}}{n^{2m} \pi^{2m}} \dots (2)$

ومن (1) ، (2) ينتج أن

$\sum_{m=1}^{\infty} B_m \cdot \frac{2^{2m} \cdot z^{2m}}{(2m)!} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2m}} \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^{2m}}{\pi^{2m}}$

و عليه فإن

$B_m \cdot \frac{2^{2m-1}}{(2m)!} \cdot \pi^{2m} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2m}} = \zeta(2m)$

□

مثال (٢) :

• $\zeta(2) = B_1 \cdot \frac{2}{2!} \pi^2 = \pi^2 B_1 = \frac{\pi^2}{6}$ (أ)

• $\zeta(4) = \frac{2^3}{4!} \pi^4 \cdot B_2 = \frac{\pi^4}{3} \cdot B_2 = \frac{\pi^4}{3} \cdot \frac{1}{30} = \frac{\pi^2}{90}$ (ب)

• $\zeta(6) = \frac{2^5}{6!} \pi^6 \cdot B_3 = \frac{32 \pi^6}{6!} \cdot \frac{1}{42} = \frac{\pi^6}{3^3 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{\pi^6}{945}$ (ج)

مبرهنة ٤-٥-٣ :

إذا كان $R(s) > 0$ ، فإن $\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{1-s}} \cdot \eta(s)$ ، حيث $\eta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$ تسمى $\eta(s)$ دالة ايتا ديركليه (Dirichlet eta function) نسبة للألماني ديركلي (١٨٠٥-١٨٥٩م) .

البرهان :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} &= 2 \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m)^s} \\ &= 2^{1-s} \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^s} \end{aligned}$$

وعليه فإن $\eta(s) + \zeta(s) = 2^{1-s} \cdot \zeta(s)$ ، ومنها نجد أن $\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{1-s}} \cdot \eta(s)$

□

مبرهنة ٤-٥-٤ :

$$\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$$

" $\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta(s) = 1$ يعني $\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$ "

البرهان :

بما أن $(s-1)\zeta(s) = (1-2^{1-s})\zeta(s) \cdot \frac{s-1}{1-2^{1-s}}$ ، إذاً

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta(s) &= \lim_{s \rightarrow 1} (1-2^{1-s})\zeta(s) \cdot \lim_{s \rightarrow 1} \frac{s-1}{1-2^{1-s}} \\ &= \lim_{s \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s} \cdot \lim_{s \rightarrow 1} \frac{s-1}{1-2^{1-s}} = \ln 2 \cdot \frac{1}{\ln 2} = 1 \end{aligned}$$

وعليه فإن $\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$

□

والآن إلى دراسة علاقة الدالة زيتا بالدوال العددية الأخرى .

مبرهنة ٤-٥-٥ :

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} \quad \text{إذا كان } R(s) > 1 \text{ فإن}$$

البرهان :

$$\begin{aligned} \text{بما أن } \frac{1}{\zeta(s)} &= \prod_{p \in P} (1 - p^{-s}) \quad \text{حسب مبرهنة (٤-٥-١)} \\ &= \prod_{p \in P} [1 + \mu(p)p^{-s} + \mu(p^2)p^{-2s} + \dots] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} \end{aligned}$$

□

مبرهنة ٣-٥-٦ :

$$\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi(n)}{n^s} \quad \text{إذا كان } R(s) > 2 \text{ فإن}$$

البرهان :

$$\begin{aligned} \text{بما أن } \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^s} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} \quad \text{حسب تعريف } \zeta \text{ ومبرهنة (٤-٥-٥)} \\ \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \cdot \sum_{d|n} d \mu\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi(n)}{n^s} \quad \text{إذا} \end{aligned}$$

□

مبرهنة ٤-٥-٧ :

$$\zeta(s)\zeta(s-m) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_m(n)}{n^s} \quad \text{فإن ، } s > m+1 \text{ و } s \in \mathbb{R} \text{ إذا كان}$$

البرهان :

$$\begin{aligned} \zeta(s)\zeta(s-m) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^m}{n^s} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \cdot \sum_{d|n} d^m = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_m(n)}{n^s} \end{aligned}$$

نتيجة (١) :

$$\cdot \zeta^2(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tau(n)}{n^s} \quad \text{فإن } 1 < s \in \mathbb{R}$$

$$\cdot \zeta(s)\zeta(s-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} \quad \text{فإن } 2 < s \in \mathbb{R}$$

البرهان :

$$\cdot \text{بما أن } \zeta(s)\zeta(s-m) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_m(n)}{n^s} \quad \text{حسب مبرهنة (٤-٥-٧)}$$

$$\zeta^2(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_0(n)}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tau(n)}{n^s} \quad \text{نجد أن } m=0$$

$$\cdot \zeta(s) \cdot \zeta(s-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_1(n)}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} \quad \text{وعندما } m=1$$

□

تمارين

$$(١) \quad \text{أحسب } \zeta(8) , \zeta(10) , \zeta(12)$$

$$(٢) \quad \text{أثبت أن}$$

$$\zeta^2(2) = \frac{\pi^4}{36} \quad \text{(ب)} , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{6}{\pi^2} \quad \text{(أ)}$$

$$\cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_4(n)}{n^2} = \zeta(2) \cdot \zeta(4) = \frac{\pi^6}{540} \quad \text{(ج)}$$

$$(٣) \quad \text{إذا كان } s > 1 , \text{ فأثبت أن } \frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{n^s} \quad \text{حيث } m \text{ يساوي عدد}$$

العوامل الأولية في n .

$$\cdot \frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)} = \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(\frac{1-p^{-s}}{1-p^{-2s}} \right) = \prod_{p \in \mathbb{P}} (1+p^{-s})^{-1} \quad \text{"لاحظ أن"}$$

$$\cdot \frac{\zeta^4(s)}{\zeta(2s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma^2(n)}{n^s} \quad \text{إذا كان } s > 1 , \text{ فأثبت أن} \quad (٤)$$

أعداد خاصة Special Numbers

سنركز اهتمامنا في هذا الفصل على دراسة أنواع معينة من الأعداد هي أعداد فيرما وأعداد مرسين ، الأعداد التامة والأعداد المتحابية والأعداد المتعادلة .

١-٥ : أعداد فيرما وأعداد مرسين Fermat and Mersenne Numbers

من إحدى طرق إيجاد أعداد أولية كبيرة هي دراسة الأعداد التي على الصورة $a^m - 1$ أو $a^m + 1$ ، وقد أثبتنا في مبرهنة (٢-٢-٦) ، أنه إذا كان $a^m - 1$ عدداً أولياً ، فإن m عدد أولي و $a = 2$. أما إذا كان $a^m + 1$ عدداً أولياً ، فإن a عدد زوجي و $m = 2^n$ ، ومن هنا كان التعريف الآتي .

تعريف ١-١-٥ :

يقال عن عدد F_n أنه عدد فيرما ، إذا كان $F_n = 2^{2^n} + 1$ ، $n \in \mathbb{N}$.
وإذا كان F_n عدداً أولياً ، فيسمى F_n عدد فيرما الأولي .

مثال (١) :

$$F_4 = 2^{16} + 1 = 65537 , F_3 = 257 , F_2 = 17 , F_1 = 5 , F_0 = 3$$

وهي أعداد أولية ، وعلى الرغم من أن فيرما لم يحسب إلا تلك الأعداد فقد أعتقد أن F_n عدد أولي لكل $n \in \mathbb{N}$ ، لكن أويلر أثبت عدم صحة ذلك بإثباته بأن $F_5 = 2^{32} + 1$ يقبل القسمة على 641 . ونعلم اليوم وبإستخدام برنامج " Maple " بأن F_n عدد مؤلف لكل $5 \leq n \leq 30$ ، وعندما $n = 36, 38, 39, 55, 63, 73, 382447$.

ولم يُكتشف لحد الآن أي عدد فيرماتي أولي غير F_n ، $0 \leq n \leq 4$ ولذلك يعتقد العلماء عدم وجود أعداد فيرما أولية غير تلك الأعداد .

وتبرز أهمية أعداد فيرما الأولية بعد إثبات جاوس سنة ١٧٩٦م بأنه يمكن أن نرسم بالمسطرة والفرجال مضلعاً منتظماً عدد أضلاعه p إذاً وإذا فقط كان p عدد فيرما أولي .

ولدراسة خواص أعداد فيرما ، نورد المبرهنات الآتية .

مبرهنة ١-١-٥ :

$$\cdot n \in \mathbb{Z}^+ \text{ لكل } \prod_{i=0}^{n-1} F_i = F_n - 2$$

البرهان : " بالإستقراء على n "

إذا كان $n=1$ ، فإن $L.H.S. = F_1 = 3$ ، $R.H.S. = F_1 - 2 = 5 - 2 = 3$ ،
وعليه فإن الطرفين متساويان وبالتالي فإن العلاقة صحيحة عندما $n=1$
والآن لنفرض أن العلاقة صحيحة عندما $n=m$. إذاً

$$\prod_{i=0}^{m-1} F_i = F_m - 2$$

ولكي نثبت صحة العلاقة عندما $n=m+1$ ، لاحظ أن

$$\begin{aligned} \left(\prod_{i=0}^{m-1} F_i \right) \cdot F_m &= (F_m - 2) F_m = (2^{2^m} - 1)(2^{2^m} + 1) \\ &= (2^{2^{m+1}} - 1) = (2^{2^{m+1}} + 1 - 2) = F_{m+1} - 2 \end{aligned}$$

إذاً العلاقة صحيحة عندما $n=m+1$ ، وعليه فإن العلاقة صحيحة
لكل $n \in \mathbb{Z}^+$.

□

مبرهنة ٢-١-٥ :

$$\cdot m \neq n \text{ و } m, n \geq 0 \text{ لكل } (F_m, F_n) = 1$$

البرهان :

بدون فقدان عمومية البرهان يمكن أن نفرض أن $m < n$. إذاً $n = m + r$ ،
وعليه إذا كان $d = (F_m, F_n)$ ، $x = 2^{2^m}$ ، فإن

$$\frac{F_n - 2}{F_m} = \frac{F_{m+r} - 2}{F_m} = \frac{x^{2^r} - 1}{x + 1} = x^{2^r-1} - x^{2^r-2} - \dots - 1$$

وعليه فإن $(F_m \setminus (F_n - 2))$. لكن $d \setminus F_m$. إذاً $d \setminus (F_n - 2)$ ، لكن $d \setminus F_n$ ،
 إذاً $d \setminus 2$ ، وعليه فإن $d = 1$ أو $d = 2$. لكن أعداد فيرما هي أعداد فردية ،
 إذاً $d \neq 2$ ، وعليه فإن $d = 1$.

□

ولمعرفة طبيعة القواسم الأولية لأعداد فيرما نورد ما يلي .

تعريف ٥-١-٢ :

إذا كان $n > 1$ عدداً صحيحاً وكان $a \in \mathbb{Z}$ و $(a, n) = 1$ ، فيقال عن m أنها
 رتبة العدد a قياس n ، Order of a modulo n ، ونكتب $m = \text{ord}_n(a)$ ،
 إذا كان m أصغر عدد صحيح موجب بحيث أن $a^m \equiv 1 \pmod{n}$.

مثال (٢) :

إذا كان $n = 7$ ، فإن $\text{ord}_7(1) = 1$ لأن $1 \equiv 1 \pmod{7}$ ، $\text{ord}_7(2) = 3$ ،
 لأن $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ ، $\text{ord}_7(3) = 6$ لأن $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ،
 $\text{ord}_7(4) = 3$ لأن $4^3 \equiv 1 \pmod{7}$ ، $\text{ord}_7(5) = 6$ لأن $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ،
 $\text{ord}_7(6) = 2$ لأن $6^2 \equiv 1 \pmod{7}$.

مبرهنة ٥-١-٣ :

إذا كان p عدداً أولياً ، $a \in \mathbb{Z}$ ، $(a, p) = 1$ ، $\text{ord}_p(a) = n$ ، وكان
 $a^m \equiv 1 \pmod{p}$ ، فإن $n \setminus m$.

البرهان :

نفرض أن $d = (m, n)$. إذاً يوجد $r, s \in \mathbb{Z}$ بحيث $d = mr + ns$ حسب
 مبرهنة (٢-١-٥) . لكن $a^n \equiv a^m \equiv 1 \pmod{p}$. إذاً $a^{mr} \equiv a^{nr} \equiv 1 \pmod{p}$ ،
 وعليه فإن $a^d \equiv a^{mr+ns} \equiv 1 \pmod{p}$. لكن n أصغر عدد صحيح موجب
 بحيث أن $a^n \equiv 1 \pmod{p}$. إذاً $n \leq d$. لكن $d \setminus n$ يعني أن $d \leq n$. إذاً
 $n = d$. لكن $d \setminus m$ ، إذاً $n \setminus m$.

□

نتيجة : إذا كان $p \setminus F_n$ ، فإن $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$.

البرهان :

بما أن $p \setminus F_n$. إذاً $2^{2^n} + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن
 $2^{2^n} \equiv -1 \pmod{p}$ ومنها نجد أن $(2^{2^n})^2 = 2^{2^{n+1}} \equiv 1 \pmod{p}$.
والآن أفرض أن $m = \text{ord}_p(2)$. إذاً $m \setminus 2^{n+1}$ حسب مبرهنة (٣-١-٥) و
 $2^m \equiv 1 \pmod{p}$ و $2^{2^{n+1}} \equiv 1 \pmod{p}$ يعني أن $m = 2^{n+1}$. لكن p عدد
فردى ، لأن أعداد فيرما أعداد فردية ، إذاً $(p, 2) = 1$ ، وعليه فإن
 $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ حسب مبرهنة فيرما ، وبالتالي فإن $2^{n+1} \setminus (p-1)$ حسب
مبرهنة (٣-١-٥) ، ومنها نجد أن $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$

□

مثال (٣) :

أثبت أن $F_4 = 2^{16} + 1 = 65537$ عدد أولى .

الإثبات :

نفرض أن $p \setminus F_4$. إذاً $p = m \cdot 2^5 + 1$ حسب نتيجة مبرهنة (٣-١-٥) .
وعليه فإن $p = 3 \cdot 2^5 + 1 = 97$ أو $p = 8(2^5) + 1 = 257$ لكن $97 \setminus F_4$ و
 $p = 257 > \sqrt{F_4} \approx 256.0019$. إذاً F_4 عدد أولى حسب نتيجة (٢)
مبرهنة (٤-٢-٢) .

□

مثال (٤) :

أثبت أن $F_5 = 2^{2^5} + 1$ عدد مؤلف .

الإثبات :

إذا كان $p \setminus F_5$ ، فإن $p = m \cdot 2^6 + 1$ حسب نتيجة مبرهنة (٣-١-٥) ،
وعليه فإن $p = 4(64) + 1 = 257$ أو $p = 10(64) + 1 = 641$. لكن
 $F_5 = 4294967297$ لا يقبل القسمة على 257 و $641 < \sqrt{F_5} = 65537$ و
كما أن $F_5 = 641 \times 6700417$. إذاً F_5 عدد مؤلف .

والآن إلى تعريف ودراسة خواص أعداد مرسين .

تعريف ٥-١-٣ :

يقال عن عدد صحيح موجب M_n أنه عدد مرسين (Mersenne number) نسبة للفرنسي مرسين (١٥٨٨-١٦٤٨م) ، إذا كان $M_n = 2^n - 1$ ، $n \geq 2$.
 وإذا كان M_n عدداً أولياً فيسمى M_n عدد مرسين الأولي .
 لاحظ أنه إذا كان M_n عدداً أولياً ، فإن n عدد أولي حسب مبرهنة (٢-٢-٦) ،
 كما أن هذا النوع من الأعداد معروف لأقليدس (٣٥٠ق.م) ونيقوماخوس (١٠٠ق.م) وثابت بن قرة (٨٢٦-٩٠١م) وغيره من الرياضيين العرب والمسلمين .

مثال (٥) :

$M_2 = 3$ ، $M_3 = 7$ ، $M_5 = 31$ ، $M_7 = 127$ أعداد أولية ، بينما
 $M_4 = 15$ ، $M_6 = 2047$ ليست أعداد أولية .
 ونعرف حالياً وباستخدام الحاسب الآلي أربعين عدد مرسين أولي M_p عندما

$$p \in \left\{ \begin{array}{l} 2, 3, 5, 7, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521, 607, 1279, 2203 \\ 2281, 3217, 4253, 4423, 9689, 9941, 11213, 19937, 21701 \\ 23209, 44497, 86243, 110503, 132049, 216091, 756839 \\ 859433, 1257787, 1398269, 2976221, 3021377, 6972593 \\ 13466917, 25964951 \end{array} \right\}$$

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل يوجد عدد لان نهائي من أعداد مرسين الأولية ؟

والآن إلى بعض خواص أعداد مرسين وأحدى طرق حسابها .

مبرهنة ٥-١-٤ :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً وكان q عدداً أولياً و $q \mid M_p$ ، فإن

$$q \equiv 1 \pmod{2p}$$

البرهان :

بما أن $q \mid M_p$ بالفرض . إذا $q \mid 2^p - 1$ ، وعليه فإن $2^p \equiv 1 \pmod{q}$.
الآن أفرض أن $\text{ord}_q(2) = m$ نجد أن $m \mid p$ حسب مبرهنة (٥-١-٣) . لكن
 p عدد أولي . إذا $m = p$ وعليه فإن $\text{ord}_q(2) = p$. لكن $2^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ ،
حسب مبرهنة فيرما . إذا $q-1 \mid p$. لكن $(p, 2) = 1$. إذا $2p \mid q-1$ ،
وعليه فإن $q \equiv 1 \pmod{2p}$.

□

مثال (٦) :

أثبت أن كلاً من $M_7 = 127$ ، $M_{13} = 8191$ عدد أولي بينما M_{11} ليس أولياً.

الإثبات :

(أ) بما أن $\sqrt{127} < 12$. إذا بتطبيق نتيجة (٢) مبرهنة (٢-٢-٤) يكفي أن
نبحث عن الأعداد الأولية الأقل من 12 والتي تقسم 127 . لكن $q \mid 127$
يعطي أن $q = 1 + 14r$ ، $r \geq 1$ حسب مبرهنة (٥-١-٤) . وحيث أن
 $q > 12$ إذا لا توجد قواسم للعدد M_7 ، وعليه فإن M_7 عدد أولي .

(ب) بما أن $\sqrt{8191} < 91$. إذا يكفي أن نبحث عن الأعداد الأولية الأقل من 91
والتي على الشكل $q = 1 + 26r$ ، $r \geq 1$ وهذه الأعداد هي
 $q = 1 + 26 \times 2 = 53$ أو $q = 1 + 26 \times 3 = 79$. لكن $53 \nmid M_{13}$ و
 $79 \nmid M_{13}$. إذا M_{13} عدد أولي .

(ج) بما أن $M_{11} = 2047$ ، $\sqrt{2047} < 46$ ، $q \mid M_{11}$ يعني أن
 $q = 1 + 22r$ ، $r \geq 1$ ، وعليه فإن $q = 23 < 46$. لكن $23 \nmid M_{11}$ ،
وعليه فإن M_{11} ليس أولياً .

مبرهنة ٥-١-٥ :

إذا كان $r \nmid n$ ، فإن $M_r \nmid M_n$

البرهان : بما أن $n = rs$. إذاً

$$M_n = M_{rs} = 2^{rs} - 1 = (2^r - 1)(2^{r(s-1)} + 2^{r(s-2)} + \dots + 2^r + 1)$$

لكن $M_r = 2^r - 1$. إذاً $M_r \setminus M_n$.

□

نتيجة : إذا كان M_n عدداً أولياً ، فإن n عدد أولي .

البرهان :

نفرض أن n عدد مؤلف . إذاً $n = rs$ ، $1 < r, s < n$ ، وعليه فإن $M_r \setminus M_n$ حسب مبرهنة (٥-١-٥) . إذاً $M_n = tM_r$. لكن $r > 1$ ، إذاً $M_r > 1$ وحيث أن $r < n$ ، إذاً $M_r < M_n$ ، وبالتالي فإن $t > 1$. إذاً M_n عدد غير أولي وهذا خلاف الفرض . إذاً n عدد أولي .

□

وأخيراً نورد المبرهنة الآتية بدون أثبات لصعوبة البرهان وهذه المبرهنة تبين ما إذا كان M_n عدداً أولياً أم لا .

مبرهنة ٥-١-٦ : " Lucas Criterion 1876 "

إذا كان p عدداً أولياً فردياً وعرفنا المتتابعة L_1, L_2, \dots, L_{p-1} بالقاعدة $L_1 = 4$ و $L_k = (L_{k-1} - 2) \bmod M_p$ لكل $k \geq 2$ ، فإن M_p عدد أولي إذاً وإذا فقط كان $L_{p-1} = 0$.

مثال (٧) : أثبت أن $M_7 = 127$ عدد أولي .

الإثبات :

$$L_1 = 4 , L_2 = (4^2 - 2) \bmod 127 = 14$$

$$L_3 = [(14)^2 - 2] \bmod 127 = 194 \bmod 127 = 67$$

$$L_4 = [(67)^2 - 2] \bmod 127 = 4487 \bmod 127 = 42$$

$$L_5 = [(42)^2 - 2] \bmod 127 = 1762 \bmod 127 = 111$$

$$L_6 = [(111)^2 - 2] \bmod 127 = 12319 \bmod 127 = 0$$

إذاً $M_7 = 127$ عدد أولي حسب مبرهنة (٥-١-٦) .

تمارين

- (١) أثبت أن F_3 عدد أولي ، (ب) F_6 عدد مؤلف .
- (٢) أثبت باستخدام مبرهنة (٥-١-٢) على وجود عدد غير منتهي من الأعداد الأولية.
- (٣) برهن باستخدام مبرهنة (٥-١-١) أن $(F_m, F_n) = 1$ لكل $m \neq n \geq 0$.
- (٤) إذا كان $d = (m, n)$ وكان $(M_m, M_n) = M_d$ فأوجد القاسم المشترك الأعظم لكل من :
- (أ) M_{11}, M_{23} ، (ب) M_8, M_{10} ، (ج) M_{61}, M_{122}
- (٥) إذا كان $\sqrt{M_{17}} < 1145$ ، فأثبت باستخدام مبرهنة (٥-١-٤) أن M_{17} عدد أولي.
- (٦) أثبت باستخدام مبرهنة (٥-١-٦) أن $M_{19} = 524281$ عدد أولي .

□

٥-٢ : الأعداد التامة Perfect Numbers

سنركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة الأعداد التامة والمعرفة من قبل إقليدس .

تعريف ٥-٢-١ :

إذا كانت $\sigma^*(n)$ تمثل مجموع القواسم الفعلية (أجزاء) للعدد الطبيعي n ، فيقال عن n أنه :

- (أ) عد زائد (Abundent number) ، إذا كان $\sigma^*(n) > n$.
- (ب) عدد ناقص (Deficient number) ، إذا كان $\sigma^*(n) < n$.

لاحظ أن $\sigma(n) = \sigma^*(n) + n$. إذاً

$$\sigma(n) > 2n \Leftrightarrow \text{عدد زائد } n$$

$$\sigma(n) < 2n \Leftrightarrow \text{عدد ناقص } n$$

مثال (١) :

(أ) عدد زائد ، لأن $\sigma(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}$ يعني أن

$$\sigma(12) = \sigma(2^2 \cdot 3) = \frac{2^3 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{3^2 - 1}{3 - 1} = 28 > 2(12)$$

(ب) 15 عدد ناقص ، لأن $\sigma(15) = 30 < 2(15) = 30$ ، $\sigma(15) = \sigma(3 \cdot 5) = \sigma(3) \cdot \sigma(5) = 4(6)$

(ج) 945 عدد زائد ، لأن

$$\sigma(945) = \sigma(3^3 \cdot 5 \cdot 7) = \frac{3^4 - 1}{3 - 1} \cdot \frac{5^2 - 1}{5 - 1} \cdot \frac{7^2 - 1}{7 - 1} = 40 \cdot 6 \cdot 8 = 1920 > 2(945)$$

ويقول أبو منصور عبد القادر البغدادي (ت ١٠٣٧م) في مخطوطه " التكملة في الحساب " أن أول عدد زوجي زائد اثنا عشر وكل فرد (عدد فردي) دون تسعمائة وخمسة وأربعين ناقص وأول فرد زائد تسعمائة وخمسة وأربعين " .

مبرهنة ١-٢-٥ : إذا كان $M_p = 2^p - 1$ عدداً أولياً ، فإن

(أ) $2^p \cdot M_p$ عدد زائد ، (ب) $2^{p-2} \cdot M_p$ عدد ناقص .

البرهان :

(أ) ليكن $n = 2^p \cdot M_p$. بما أن $(2^p, M_p) = 1$. إذاً

$$\sigma(n) = \sigma(2^p \cdot M_p) = \sigma(2^p) \cdot \sigma(M_p) = (2^{p+1} - 1) \cdot \sigma(M_p)$$

لكن M_p عدد أولي . إذاً $\sigma(M_p) = M_p + 1$ ، وعليه فإن

$$\sigma(n) = (2^{p+1} - 1) \cdot (M_p + 1) = (2^{p+1} - 1) \cdot 2^p = 2^{2p+1} - 2^p$$

لكن $2^{p+1} > 2^p$. إذاً

$$\sigma(n) = 2^{2p+1} - 2^p > 2^{2p+1} - 2^{p+1}$$

$$= 2^{p+1} (2^p - 1) = 2 \cdot 2^p (2^p - 1) = 2n$$

وعليه فإن n عدد زائد .

(ب) ليكن $m = 2^{p-2} \cdot M_p$. بما أن $(2^{p-2}, M_p) = 1$ إذاً

$$\begin{aligned}\sigma(m) &= \sigma(2^{p-2}) \cdot \sigma(M_p) = (2^{p-1} - 1)(M_p + 1) = (2^{p-1} - 1) \cdot 2^p \\ &= 2^{2p-1} - 2^p < 2^{2p-1} - 2^{p-1} = 2^{p-1}(2^p - 1) \\ &= 2 \cdot 2^{p-2}(2^p - 1) = 2m\end{aligned}$$

وبالتالي فإن m عدد ناقص .

□

مبرهنة ٥-٢-٢ :

(أ) يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الناقصة .

(ب) يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الزائدة .

البرهان :

(أ) ليكن $n = p^m$ ، حيث p عدد أولي فردي و $m \geq 1$. إذاً

$$\sigma(n) = (1 + p + p^2 + \dots + p^{m-1}) + p^m < p^m + p^m = 2p^m = 2n$$

وعليه فإن n عدد ناقص . لكن $\{p^m \mid m \geq 1 \text{ عدد أولي فردي و } m \geq 1\}$

مجموعة غير منتهية . إذاً يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الناقصة .

(ب) ليكن $n = 945m$ ، $m > 1$ ، $(945, m) = 1$. إذاً

$$\sigma(n) = \sigma(945) \cdot \sigma(m)$$

لكن 945 عدد زائد . إذاً $\sigma(945) > 2(945)$. كما أن $\sigma(m) > m$ لكل

$m > 1$. إذاً $\sigma(n) > 2(945m) = 2n$ ، وعليه فإن n عدد زائد . لكن

$S = \{945m \mid m > 1, (945, m) = 1\}$ مجموعة غير منتهية . إذاً يوجد عدد

غير منتهي من الأعداد الزائدة .

□

والآن إلى تعريف الأعداد الطبيعية التامة ودراسة خواصها .

تعريف ٥-٢-٢ :

يقال عن عدد طبيعي n أنه عدد تام (Perfect number) إذا كان $\sigma^*(n) = n$.

إذا n عدد تام $\Leftrightarrow \sigma(n) = 2n$.

مثال (٢) : كل من 6, 28, 496, 8128 عدد تام ، لأن

$$\sigma(6) = \sigma(2 \cdot 3) = \frac{2^2 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{3^2 - 1}{3 - 1} = 3 \cdot 4 = 12 = 2(6)$$

$$\sigma(28) = \sigma(2^2 \cdot 7) = \frac{2^3 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{7^2 - 1}{7 - 1} = 7 \cdot 8 = 56 = 2(28)$$

$$\begin{aligned} \sigma(496) &= \sigma(2^4 \cdot 31) = \sigma(2^4) \cdot \sigma(31) = (2^5 - 1) \cdot 31 = 31 \cdot 32 \\ &= 2(2^4 \cdot 31) = 2(496) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma(8128) &= \sigma(2^6 \cdot 127) = \sigma(2^6) \cdot \sigma(127) = (2^7 - 1) \cdot 127 = 127 \cdot 128 \\ &= 2(2^6 \cdot 127) = 2(8128) \end{aligned}$$

ولقد وردت تلك الأعداد عند ميناخوس اليوناني حوالي (١٠٠ م).

والآن إلى قاعدة تحديد الأعداد التامة الزوجية والتي تعود إلى إقليدس .

ميرهنة ٥-٢-٣ : " إقليدس "

إذا كان $M_p = 2^p - 1$ عدداً أولياً ، فإن $n = 2^{p-1} \cdot M_p$ عدد تام .

البرهان :

بما أن $(2^{p-1}, M_p) = 1$. إذاً

$$\begin{aligned} \sigma(n) &= \sigma(2^{p-1} \cdot M_p) = \sigma(2^{p-1}) \cdot \sigma(M_p) = (2^p - 1) (M_p + 1) \\ &= (2^p - 1) \cdot 2^p = 2 \cdot 2^{p-1} \cdot M_p = 2n \end{aligned}$$

وعليه فإن n عدد تام .

□

واستناداً لتلك القاعدة ، نجد أن

العدد التام الأول هو 6 ، لأن $M_2 = 3$ عدد أولي و $6 = 2 \cdot M_2$.

العدد التام الثاني يساوي 28 ، لأن $M_3 = 2^3 - 1 = 7$ عدد أولي و
 $2^2 \cdot M_3 = 2^2 \cdot 7 = 28$

العدد التام الثالث يساوي 496 ، لأن $M_5 = 2^5 - 1 = 31$ عدد أولي
 $2^4 \cdot M_5 = 2^4 \cdot 31 = 496$

العدد التام الرابع يساوي 8128 ، لأن $M_7 = 2^7 - 1 = 127$ عدد أولي و
 $2^6 \cdot M_7 = 2^6 \cdot 127 = 8128$

العدد التام الخامس يساوي 33550336 ، لأن $M_{13} = 2^{13} - 1 = 8191$ عدد أولي و
 $2^{12} \cdot M_{13} = (4096) \cdot 8191 = 33550336$

العدد التام السادس يساوي 8589869056 ، لأن $M_{17} = 2^{17} - 1 = 131071$ عدد أولي و
 $8589869056 = 2^{16} \cdot M_{17}$

هذا ويُعرف إلى الآن سبعة وعشرين عدداً تماماً تنتج عندما يكون

$$P \in \left\{ \begin{array}{l} 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 257, 521, 607 \\ 1279, 2203, 2281, 3217, 4253, 4423, 9689 \\ 9941, 11213, 19937, 21701, 23209, 44497 \end{array} \right\}$$

لاحظ أن عكس مبرهنة (٥-٢-٣) صحيح أيضاً، وهذا ما توضحه المبرهنة الآتية .

مبرهنة ٥-٢-٤ : " ابن الهيثم - أولر "

إذا كان n عدداً زوجياً تماماً ، فإن $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ و $(2^p - 1)$ عدد أولي .

البرهان :

بما أن n عدد زوجي . إذاً $n = 2r$ ، $r \in \mathbb{Z}^+$ ، وعليه بعد تجميع جميع قوى

العدد 2 في r يُمكننا أن نعبر عن n بالشكل الآتي $n = 2^{p-1} \cdot m$ ، $p \geq 2$ ، m ،

عدد فردي . إذاً $(2^{p-1}, m) = 1$ ، وعليه فإن

$$\sigma(n) = \sigma(2^{p-1} \cdot m) = \sigma(2^{p-1}) \cdot \sigma(m) = (2^p - 1) \sigma(m) \quad \dots (1)$$

لكن n عدد تام . إذاً

$$\sigma(n) = \sigma(2^{p-1} \cdot m) = 2(2^{p-1} \cdot m) = 2^p \cdot m \quad \dots (2)$$

ومن (1) ، (2) ينتج أن

$$(2^p - 1)\sigma(m) = 2^p \cdot m \quad \dots (3)$$

ومنها نجد أن $(2^p - 1) \setminus 2^p \cdot m$. لكن $(2^p, 2^p - 1) = 1$ ، إذاً $m \setminus (2^p - 1)$ ، وحسب مبرهنة (٢-١-٩ب) ، وعليه فإن

$$t \in \mathbb{Z}^+ ، m = (2^p - 1)t = 2^p \cdot t - t \quad \dots (4)$$

ومن (3) ، (4) ينتج أن $\sigma(m) = 2^p \cdot t$. لكن كلاً من t, m قاسم للعدد m و $t < m$ يعني أن $2^p \cdot t = \sigma(m) \geq m + t$.

ومن (4) نجد أن $m + t = 2^p \cdot t$ ، إذاً

$$2^p \cdot t = \sigma(m) \geq m + t = 2^p \cdot t = \sigma(m)$$

وعليه فإن $\sigma(m) = m + t$ وهذا يعني أن $\tau(m) = 2$ ، وعليه فإن m عدد أولي.

إذاً $t = 1$ ، وعليه فإن $m = 2^p - 1$ عدد أولي و $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$.

□

هذا ونود أن نشير إلى أن عبدالقادر البغدادي قد ذكر في مخطوطه " التكملة في

الحساب " ما يلي :

" وقد غلط من قال في كل عقد من العقود عدد واحد تام وأصاب من قال كل عدد تام لابد أن يكون في أوله ستة أو ثمانية " ثم يذكر بعد ذلك قاعدة تشكيل الأعداد التامة السابقة ، ويقترح القاعدة الآتية والتي تنص على الآتي :

" إذا كان أجزاء زوج الزوج أوليه ، فإن مجموع أحادها من الواحد إليها يكون تاماً " .

أي أنه إذا كان $M_n = 2^n - 1$ عدداً أولياً ، فإن $[1 + 2 + 3 + \dots + (2^n - 1)]$ عدد تام . لأن $1, 2, 3, \dots, 2^n - 1$ متوالية عددية حدها الأول واحد وحدها الأخير $(2^n - 1)$ ، وعليه فإن مجموعها هو

$$\frac{2^n - 1}{2} [1 + 2^n - 1] = 2^{n-1} (2^n - 1)$$

وحسب قاعدة البغدادي يكون العدد التام الأول (6) والثاني (28) والثالث (496) وهكذا

مبرهنة ٥-٢-٥ : " البغدادي "

كل عدد زوجي تام لابد أن يكون أحاده ستة أو ثمانية .
أي أن إذا كان n عدداً زوجياً تاماً، فإن $n \equiv 6 \pmod{10}$ أو $n \equiv 8 \pmod{10}$

البرهان :

بما أن n عدد زوجي تام . إذاً $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ و $(2^p - 1)$ عدد أولي حسب مبرهنة (٥-١-٤) . لكن $(2^p - 1)$ عدد أولي يعني أن p عدد أولي حسب مبرهنة (٢-٢-٦) .

فإذا كان $p = 2$ ، فإن $n = 6$ و $6 \equiv 6 \pmod{10}$ ، وعليه فإن المبرهنة صحيحة . أما إذا كان $p > 2$ ، فإن p عدد أولي فردي ، وعليه فإن $p = 4m + 1$ أو $p = 4m + 3$ حسب مبرهنة (٢-١-٣) .

فإذا كان $p = 4m + 1$ ، فإن

$$n = 2^{4m} (2^{4m+1} - 1) = 2^{8m+1} - 2^{4m} = 2 \cdot 2^{8m} - 2^{4m} = 2 \cdot (16)^{2m} - (16)^m$$

لكن $(16)^r \equiv 6 \pmod{10}$ لكل $r \in \mathbb{Z}^+$. إذاً

$$n \equiv 2 \cdot 6 - 6 \equiv 6 \pmod{10}$$

أما إذا كان $p = 4m + 3$ ، فإن

$$n = 2^{4m+2} (2^{4m+3} - 1) = 2^{8m+5} - 2^{4m+2} = 2(16)^{2m+1} - 4(16)^m$$

$$\equiv 2 \cdot 6 - 4 \cdot 6 \equiv -12 \equiv 8 \pmod{10}$$

□

لاحظ أن المبرهنات السابقة تصف الأعداد الزوجية التامة إما الأعداد الفردية التامة ، فلم يستطع أحد حتى الآن أن يجيب على سؤال الرياضي والفلكي والفيزيائي أبو جعفر الخازن أحد علماء القرن العاشر للميلاد وهو :

هل يوجد عدد تام فردي ؟

وعلى الرغم من ذلك فقد حدد أويلر خواص الأعداد الفردية التامة في المبرهنة الآتية .

مبرهنة ٦-١-٥ : " أولر "

إذا كان n عدداً فردياً تاماً ، فإن $n = p_1^{e_1} p_2^{2\alpha_2} \dots p_r^{2\alpha_r}$ ، حيث p_i أعداد أولية فردية مختلفة و $p_i \equiv e_i \equiv 1 \pmod{4}$.

البرهان :

نفرض أن $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$. بما أن n عدد تام . إذاً $\sigma(p_i^{e_i})$ إذاً $2n = \sigma(n) = \prod_{i=1}^r \sigma(p_i^{e_i})$ لكن n عدد فردي ، إذاً $n \equiv 1 \pmod{4}$ أو $n \equiv 3 \pmod{4}$ حسب مبرهنة (٢-١-٣ب) ، وفي كلتا الحالتين نجد أن $2n \equiv 2 \pmod{4}$ ، وعليه فإن $\sigma(n) = 2n$ يقبل القسمة على 2 ولا يقبل القسمة على 4 . إذاً $2 \mid \sigma(p_i^{e_i})$ لبعض قيم i حسب مبرهنة (٢-٢-٣ب) ، وعليه فإن $\sigma(p_i^{e_i})$ عدد زوجي لبعض قيم i ، وبدون فقدان عمومية البرهان يمكن أن نفرض أن $\sigma(p_i^{e_i})$ عدد زوجي لا يقبل القسمة على 4 بينما $\sigma(p_i^{e_i})$ عدد فردي لكل $i \neq 1$.
والآن $p_i \equiv 1 \pmod{4}$ أو $p_i \equiv 3 \pmod{4}$ حسب مبرهنة (٢-١-٣ب) فإذا كان $p_i \equiv 3 \equiv -1 \pmod{4}$ ، فإن

$$\begin{aligned} \sigma(p_i^{e_i}) &= 1 + p_i + p_i^2 + \dots + p_i^{e_i} \\ &\equiv 1 + (-1) + (-1)^2 + \dots + (-1)^{e_i} \pmod{4} \\ &\equiv \begin{cases} 0 \pmod{4} & \text{إذا كان } e_i \text{ عدد فردي} \\ 1 \pmod{4} & \text{إذا كان } e_i \text{ عدد زوجي} \end{cases} \end{aligned}$$

لكن $\sigma(p_1^{e_1}) \equiv 2 \pmod{4}$ يعني أن $p_1 \not\equiv 3 \pmod{4}$ ، وعليه فإن $p_1 \equiv 1 \pmod{4}$. وحيث أن $\sigma(p_i^{e_i}) \equiv 0 \pmod{4}$ يعني أن $4 \mid \sigma(p_i^{e_i})$ وهذا غير ممكن كما أثبتنا أعلاه . إذاً إذا كان $p_i \equiv 3 \pmod{4}$ لكل

$i = 2, \dots, r$ ، فإن e_i عدد زوجي . أما إذا كان $p_i \equiv 1 \pmod{4}$ ، فإن

$$\begin{aligned} \sigma(p_i^{e_i}) &= 1 + p_i + p_i^2 + \dots + p_i^{e_i} \equiv 1 + 1 + 1^2 + \dots + 1^{e_i} \pmod{4} \\ &\equiv e_i + 1 \pmod{4} \end{aligned}$$

لكن $\sigma(p_1^{e_1}) \equiv 2 \pmod{4}$ يعني أن $e_1 \equiv 1 \pmod{4}$. أما لكل $i = 2, \dots, r$ فإن $\sigma(p_i^{e_i}) \equiv 1 \pmod{4}$ أو $\sigma(p_i^{e_i}) \equiv 3 \pmod{4}$ ، وذلك يعني أن $e_i \equiv 0 \pmod{4}$ أو $e_i \equiv 2 \pmod{4}$ وفي كلتا الحالتين نجد أن عدد زوجي . إذاً $e_i = 2\alpha_i$ لكل $i = 2, \dots, r$ ، وعليه فإن $n = p_1^{e_1} \left(\prod_{i=2}^r p_i^{2\alpha_i} \right)$ و

$$p_1 \equiv e_1 \equiv 1 \pmod{4}$$

□

نتيجة :

إذا كان n عدداً فردياً تماماً ، فإن $n = p^r m^2 \equiv 1 \pmod{4}$ و p عدد أولي و

$$p \equiv r \equiv 1 \pmod{4} ، p \nmid m$$

البرهان :

بما أن $n = p_1^{e_1} \prod_{i=2}^r p_i^{2\alpha_i}$ حسب مبرهنة (٥-١-٦) . إذاً

$n = p_1^{e_1} \left(\prod_{i=2}^r p_i^{2\alpha_i} \right)^2 = p^r \cdot m^2$ ، حيث $m = \prod_{i=2}^r p_i^{\alpha_i}$ ، $p_1^{e_1} = p^r$. لكن

$p \equiv 1 \pmod{4}$ يعني أن $p^r \equiv 1 \pmod{4}$. أما m عدد فردي فإن ذلك يعني

أن $m \equiv 1 \pmod{4}$ أو $m \equiv 3 \pmod{4}$ حسب مبرهنة (٢-١-٣) ، وعليه

فإن $m^2 \equiv 1 \pmod{4}$ ، وبالتالي فإن $n = p^r \cdot m^2 \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{4}$.

□

تمارين

- (١) برهن على وجود عدد غير منتهي من الأعداد الفردية الناقصة .
- (٢) برهن على وجود عدد غير منتهي من الأعداد الفردية الزائدة وعدد غير منتهي من الأعداد الزوجية الزائدة .

- (٣) أثبت أن $2^{10}(2^{11} - 1)$ عدد غير تام .
- (٤) أثبت أن كلاً من $2^{606}(2^{607} - 1)$ ، $2^{1278}(2^{1279} - 1)$ عدد تام .
- (٥) إذا كان $n = p^m$ ، $m \geq 1$ ، p عدد أولي ، فأثبت أن n عدد غير تام .
- (٦) إذا كان $n = a^2$ ، $a \in \mathbb{Z}^+$ ، فأثبت أن n عدد غير تام .
- (٧) إذا كان n عدداً تاماً ، فأثبت أن nr عدد تام لكل $r \geq 1$.
- (٨) إذا كان n عدداً تاماً ، فأثبت أن $\sum_{d|n} \frac{1}{d} = 2$ وحقق ذلك عندما $n = 6$ و $n = 22$.
- (٩) إذا كان n عدداً زوجياً تاماً ، فأثبت أن $\phi(n) = 2^{p-1}(2^p - 1)$.
- (١٠) إذا كان p, q عددين أوليين فرديين مختلفين وكان $n = pq$ ، فأثبت أن n عدد غير تام . "لاحظ أن $\sigma(n) = pq + p + q + 1$ و $pq > p + q + 1$ "
- (١١) إذا كان $(2^p - 1)$ عدداً أولياً ، فأثبت أن $(2^{p-1} + 2^p + 2^{p+1} + \dots + 2^{2p-2})$ عدد تام .
- (١٢) إذا كان $n > 6$ عدداً زوجياً تاماً ، فأثبت أن $n \equiv 4 \pmod{6}$. "لاحظ أن $n = 2^{p-1}(2^p - 1) > 6$ يعني أن $p > 3$ ، وعليه فإن $p = 4m + 3$ أو $p = 4m + 1$ " .
- (١٣) إذا كان n عدداً فردياً تاماً ، فأثبت أن $n = pa^2$ حيث p عدد أولي .
- (١٤) إذا كان $n = pa^2$ عدد فردياً تاماً ، فأثبت أن $n \equiv p \pmod{8}$.

٣-٥ : الأعداد المتحابة والأعداد المتعادلة

نتناول في هذا الجزء الأعداد المتحابة المعروفة من قبل فيثاغورس والأعداد المتعادلة المعروفة من قبل عبد القادر البغدادي في القرن العاشر للميلاد.

تعريف ١-٣-٥ :

يقال عن عددين طبيعيين m, n أنهما متحابان (Amicable) . إذا كان

$$\sigma^*(n) = m \text{ و } \sigma^*(m) = n$$

$$\sigma(m) = \sigma(n) = m + n \Leftrightarrow m, n \text{ متحابان}$$

مثال (١) :

220 ، 284 متحابان ، لأن $220 + 284 = 504$ و

$$\sigma(220) = \sigma(2^2 \cdot 5 \cdot 11) = \frac{2^3 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{5^2 - 1}{5 - 1} \cdot \frac{11^2 - 1}{11 - 1} = 7 \cdot 6 \cdot 12 = 504$$

$$\sigma(284) = \sigma(2^2 \cdot 71) = \sigma(2^2) \cdot \sigma(71) = \frac{2^3 - 1}{2 - 1} \cdot (72) = 7 \cdot 72 = 504$$

ملاحظة :

إذا كان $\sigma(m) = \sigma(n)$ فإن ذلك لا يعني أن m, n متحابان كما يوضح ذلك

المثال الآتي .

ليكن $m = 6$ ، $n = 11$. إذا $\sigma(m) = \sigma(n) = 12$. لكن $6, 11$ غير متحابين

لأن $\sigma^*(m) = 6 \neq 11 = n$ ، وعليه فإن الشرط $\sigma(m) = \sigma(n) = m + n$

ضروري .

والآن إلى قاعدة تحديد بعض الأعداد المتحابية والتي تنسب إلى ثابت بن قرة

الحراني (٨٢٦ م _ ٩٠١ م) .

مبرهنة ١-٣-٥ : "قاعدة بن قرة"

إذا كان $a = 3 \cdot 2^n - 1$ ، $b = 3 \cdot 2^{n-1} - 1$ ، $c = 9 \cdot 2^{2n-1} - 1$ أعداداً

أولية فإن $2^n ab$ ، $2^n c$ عدنان متحابان .

البرهان

بما أن $a, b, 2^n$ أعداد أولية نسبياً مثلثاً مثني و σ داله ضربية. إذاً
 $\sigma(2^n ab) = \sigma(2^n) \cdot \sigma(a) \cdot \sigma(b)$ لكن $\sigma(2^n) = 2^{n+1} - 1$ و b, a
عددان أوليان . إذاً $\sigma(a) = a + 1 = 3 \cdot 2^{n-1}$ ، $\sigma(b) = b + 1 = 3 \cdot 2^{n-1}$ ،
وعليه فإن

$$\sigma(2^n ab) = (2^{n+1} - 1) \cdot 9 \cdot 2^{2n-1} = 9 \cdot 2^{2n-1} (2^{n+1} - 1) \quad \dots (1)$$

وحيث أن $(2^n, c) = 1$. إذاً

$$\begin{aligned} \sigma(2^n c) &= \sigma(2^n) \cdot \sigma(c) = (2^{n+1} - 1) \cdot 9 \cdot 2^{2n-1} \\ &= 9 \cdot 2^{2n-1} \cdot (2^{n+1} - 1) \quad \dots (2) \end{aligned}$$

ومن (1) ، (2) نجد أن

$$\sigma(2^n ab) = \sigma(2^n c) \quad \dots (3)$$

$$\begin{aligned} 2^n ab + 2^n c &= 2^n (ab + c) = 2^n (9 \cdot 2^{2n-1} - 9 \cdot 2^{n-1} + 1 + 9 \cdot 2^{2n-1} - 1) \\ &= 2^n (9 \cdot 2^{2n} - 9 \cdot 2^{n-1}) = 9 \cdot 2^{2n-1} (2^{n+1}) \quad \dots (4) \end{aligned}$$

ومن (3) ، (4) نجدان $\sigma(2^n ab) = \sigma(2^n c) = 2^n ab + 2^n c$ ، وعليه فإن
 $2^n ab$ ، $2^n c$ عددان متحابان.

□

هذا وقد درست الأعداد التامة والأعداد المتحابة في النصف الثاني من القرن
العاشر للميلاد من قبل أبو صقر القبيصي في بحثه " في جمع أنواع من الأعداد "
ذاكراً قاعدة تشكيل الأعداد التامة ومبرهنة بن قرة عن الأعداد المتحابة بالشكل
الآتي :

إذا كان $a = (2^{n+1} - 1) + 2^n$ ، $b = (2^{n+1} - 1) - 2^{n-1}$ ،
 $c = 2^{n+1} (2^{n+1} + 2^{n-2}) - 1$ أعداداً أولية ، فإن $2^n ab$ ، $2^n c$ عددان
متحابان .

كما أفرد الكرخي (ت ٤٢١هـ) في كتابة (البدیع في الحساب : تحقيق عادل أنبوبا) فصلاً عن الأعداد المتحابة قدم فيه برهاناً عاماً لقاعدة بن قرة مستنتجاً ما يلي :

إذا كان (m, n) زوج من الأعداد المتحابة فمن الضروري أن يكون أحدهما ناقصاً والآخر زائداً ، كما أن $m - \sigma^*(m) = \sigma^*(n) - n$. ثم يثبت أنه إذا كان a, b, c ثلاثة أعداد أولية فردية بحيث أن

$$2 > s = \sum_{i=0}^n 2^i \quad , \quad c - s = (1 + a + b)s - ab$$

فإن $2^n ab$ ، $2^n c$ عددان متحابان و $2^n c$ عدد ناقص بينما $2^n ab$ عددان زائد .

أما عبد القادر البغدادي فقد تعرض في كتابه " التكملة في الحساب " للأعداد المتحابة ومبرهنة بن قرة . وأما ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧م) فقد ذكر في كتابه (الشفاء : الطبيعيات) ما يلي :

إذا كانت $(2^{n+1} - 1)$ ، $a = 3 \cdot 2^n - 1$ ، $b = 3 \cdot 2^{n-1} - 1$ أعداداً أولية ، فإن $2^n ab$ ، $2^n (a + b + ab) = 2^n (9 \cdot 2^{2n-1} - 1)$ عددان متحابان ، فإذا أضفنا الشرط $(9 \cdot 2^{2n-1} - 1)$ عدد أولي نجد مبرهنة بن قرة مع الشرط الزائد $(2^{n+1} - 1)$ هو أولي .

أما الزنجاني (ت ٢٥٧م) فقد أعاد في بحثه "عمدة الحساب" نتائج البغدادي وأعطى مبرهنة بن قرة حول الأعداد المتحابة .

أما كمال الدين الفارس (ت ٣٢٠م) فقد أعاد في مخطوطه "تذكرة الأحباب في تمام التحاب" أثبات مبرهنة بن قرة ، كما وردت مبرهنة بن قرة عند زين الدين التتوخي وابن يعيش الأموي ، كما وردت عند الكاشي (ولد في كاشان سنة ٦٥٤هـ) في كتابه "مفتاح الحساب" وعند شرف الدين اليزدي ومحمد باقر اليزدي.

هذا وبتطبيق مبرهنة بن قره عندما $n = 2$ نجد أن $a = 11$ ، $b = 5$ ، $c = 71$ وهي أعداد أولية ، وعليه فإن $2^2 ab = 220$ ، $2^2 c = 284$ عدنان متحابان .
 وإذا كان $n = 4$ ، فإن $a = 47$ ، $b = 23$ ، $c = 1151$ ، وعليه فإن
 $2^4 ab = 2^4 \cdot 47 \cdot 23 = 17296$ ، $2^4 \cdot c = 2^4 \cdot 1151 = 18416$ عدنان متحابان .
 وقد حسب هذين العددين كل من كمال الدين الفارسي في كتابه (تذكرة الأحاباب في بيان التحاب) - وعلي بن عبد القادر بن هيدور السادلي (ت ٤١٣م) قبل الفرنسي فيرما (١٦٠١ - ١٦٦٥م) الذي ينسب إليه ، ولقد بين الفارسي أن
 $\sigma^*(17296) = 18416$ ، $\sigma^*(18416) = 17296$ كالآتي :
 $\sigma^*(17296) = \sigma^*(2^4 \cdot 23 \cdot 47) = \sigma^*(2^4) \sigma^*(23 \cdot 47) + 2^4 \sigma^*(23 \cdot 47)$
 $= 15(71 + 1081) + 16(71) = 18416$

إما

$$\sigma^*(18416) = \sigma^*(2^4 \cdot 1151) = \sigma^*(2^4)(1151 + 1) + 2^4$$

$$= 15 \cdot 1152 + 16 = 17296$$

أما الزوج (9363584, 9437056) والذي ينسب إلى الفرنسي ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠م) فقد حُسبَ من قبل محمد باقر اليزدي (ت ١٦٣٠م) بتطبيق مبرهنة بن قره عندما $n = 7$ فوجد أن $a = 383$ ، $b = 191$ ، $c = 73727$ أعداد أولية ، وعليه فإن $2^7 ab = 9363584$ ، $2^7 c = 9437056$ عدنان متحابان .

وأخيراً نود أن نشير إلى أن أويلر قد عمم مبرهنة بن قره واكتشف فيما بين (١٧٤٧ - ١٧٥٠م) تسعة وخمسين زوجاً من الأعداد المتحابية منها .

$$(2924, 2620) ، (5020, 5564) ، (6368, 6232) ، (10856, 10744)$$

واكتشف الزوج (1210, 1184) والذي لا يمكن الحصول عليه بتطبيق قاعدة بن قره عام ١٨٦٧م من قبل الإيطالي نيقولو باغيني ، واكتشف لحد الآن 900 زوج من الأعداد المتحابية .

والآن إلى تعريف الأعداد المتعادلة المعرفة منذ القرن العاشر للميلاد من قبل عبد القادر البغدادي في كتابه "التكملة في الحساب".

تعريف ٥-٣-٢ :

يقال عن عددين طبيعيين m, n أنهما متعادلان (Numbers of equal weight) إذا كان $\sigma^*(m) = \sigma^*(n)$.

إذا n, m متعادلان $\Leftrightarrow \sigma^*(m) + n = \sigma(n) + m$

ويقال عن a_1, \dots, a_n أنها أعداد متعادلة ، إذا كان

$$\sigma^*(a_1) = \sigma^*(a_2) = \dots = \sigma^*(a_n)$$

مثال (٢) :

(أ) العددان 39 ، 5 متعادلان ، لأن

$$\sigma^*(39) = 1 + 3 + 13 = 17 \quad , \quad \sigma^*(55) = 1 + 5 + 11 = 17$$

(ب) الأعداد $a = 111$ ، $b = 319$ ، $c = 391$ متعادلة ، لأن

$$\sigma^*(391) = 1 + 23 + 17 = 41 \quad , \quad \sigma^*(319) = 1 + 11 + 29 = 41$$

$$\sigma^*(a) = 1 + 3 + 37 = 41$$

ولقد ذكر البغدادي أنه : إذا كان معنا عدد مفروض ، وأردنا أن نعلم الأعداد التي مجموع أجزاء كل واحد منها مثل هذا العدد المفروض ، أنقصنا من العدد المفروض واحداً ثم جزئنا الباقي بعددين أوليين وقسمنا أيضاً بعددين آخرين أوليين وهكذا ، ثم نضرب القسمين في التقسيم الأول أحدهما في الآخر ، ونضرب القسمين في التقسيم الثاني أحدهما في الآخر وكذلك نفعل بقسمي التقسيم الثالث والرابع ... ، وما يعدّ مما أصبح من هذه الضروب ، وكل منها أجزاء مثل ذلك العدد المفروض أي أن :

إذا كان a عدداً طبيعياً معلوماً ، وكان المطلوب إيجاد جميع الأعداد المتعادلة المرتبطة بالعدد a ، يُعبر عن a بالشكل الآتي :

$a = 1 + p_i + q_i$ حيث p_i, q_i أعداد أولية مختلفة لكل $i = 1, 2, \dots$ فنجد أن $\{p_i, q_i\}$ أعداد مختلفة مجموع أجزائها متساوي .

ويعطي البغدادي المثال الآتي :

مثال (٣) :

إذا كان $a = 57$ ، فإن $a - 1 = 56$ و $56 = 3 + 53$ و $56 = 13 + 43$ ،
 و $m = 3 \cdot 53 = 159$ ، وعليه فإن أعداد أولية مختلفة ،
 $n = 13 \cdot 43 = 559$ عدنان متعادلان ، لأن $\sigma^*(m) = \sigma^*(n) = 57$.

لاحظ أن الزنجاني في "عمدة الحساب" أعطى نفس التعريف السابق ونفس المثال
 مثبتاً أن 159 ، 559 ، 703 أعداد متعادلة ، لأن

$$\sigma^*(703) = 1 + 19 - 37 = 57$$

مثال (٤) :

أوجد جميع الأعداد المتعادلة المرتبطة بالعدد 49 .

الحل :

لاحظ أن المطلوب هو إيجاد جميع الأعداد التي مجموع القواسم الفعلية لكل
 منها يساوي 49 ، ولإيجاد تلك الأعداد نعبر عن العدد 49 بالشكل
 $49 = 1 + p_i + q_i$ حيث p_i, q_i أعداد أولية مختلفة ، وعليه فإن
 $p_i + q_i = 48$ وبالتالي فإن

$$(p_i, q_i) = (5, 43) , (7, 41) , (11, 37) , (17, 31) , (19, 29)$$

وعليه فإن الأعداد هي

$$a_1 = p_i q_i = 5 \cdot 43 = 215 , a_2 = 7 \cdot 41 = 287 , a_3 = 11 \cdot 37 = 407$$

$$a_4 = 17 \cdot 31 = 527 , a_5 = 19 \cdot 29 = 551$$

هذا ونجد فيما بعد دراسة للأعداد المتعادلة في الكثير من الأبحاث الحسابية ،
 ويحدد محمد باقر اليزدي (ت ٦٣٧م) العلاقة الآتية : إذا عبرنا عن عدد زوجي
 كمجموع عددين أوليين وضربناهما في بعضهما وسمي العدد الناتج m ثم عبرنا عن
 ذلك العدد الزوجي بطريقة أخرى وضربناهما في بعضهما ، وسمي العدد الناتج n ،
 لوجدنا أن العددين m, n متعادلان .

مثال (٥) :

و $16 = 5 + 11 \Rightarrow m = 5 \cdot 11 = 55$, $16 = 3 + 13 \Rightarrow n = 3 \cdot 13 = 39$ (أ)

m, n متعادلان

(ب) إذا كان $a = 36$ ، فإن

$36 = 5 + 31 \Rightarrow a_1 = 5 \cdot 31 = 155$, $36 = 7 + 29 \Rightarrow a_2 = 7 \cdot 29 = 203$

$36 = 13 + 23 \Rightarrow a_3 = 13 \cdot 23 = 299$, $36 = 17 + 19 \Rightarrow a_4 = 17 \cdot 19 = 323$

و a_1, a_2, a_3, a_4 أعداد متعادلة ، لأن

$$\sigma^*(a_1) = \sigma^*(a_2) = \sigma^*(a_3) = \sigma^*(a_4) = 37$$

تمارين

(١) برهن أن كل زوج من الأعداد الآتية يمثل عددين متحابين :

(أ) 1184، 1210 ، (ب) 5564، 5020 ، (ج) 6232، 6368

(د) 14595، 12285

(٢) إذا كان m, n عددين متحابين وكان $m > n$ ، فأثبت أن m عدد ناقص بينما

n عدد زائد .

(٣) إذا كان m, n عددين متحابين ، فأثبت أن $(\sum_{d|m} \frac{1}{d})^{-1} + (\sum_{d|n} \frac{1}{d})^{-1} = 1$ ،

وحقق تلك العلاقة عندما $m = 220$ ، $n = 284$.

(٤) أوجد جميع الأعداد المتعادلة المرتبطة بالعدد n عندما

$n = 90$ ، $n = 65$ ، $n = 61$

الفصل السادس

البواقي التربيعية وقانون التعاكس الثنائي

Quadratic Residues and Quadratic Reciprocity Law

يضم هذا الفصل ثلاثة بنود ندرس فيها الجذور البدائية ووجودها ، البواقي التربيعية وخواصها ورمزي لجندر وجاكوبي وقانون التعاكس وبعض تطبيقاتها .

١-٦ : الجذور البدائية Prmitive Roots

سنركز اهتمامنا في هذا الجزء على تعريف وتحديد الجذور البدائية والتي وردت في أبحاث أويلر عام ١٧٧٣م ولجندر (١٧٥٢-١٨٣٣) عام ١٧٨٥م وجاوس عام ١٨٠١م ، وسنبرهن على وجود مثل تلك الجذور لأي عدد أولي ، ثم ندرس الشروط التي يجب توفيرها لكي يكون لعدد طبيعي أكبر من الواحد جذراً بدائياً .

تعريف ١-١-٦ :

ليكن a, n عددين طبيعيين . يقال عن a أنه جذر بدائي أو إبتدائي (Primitive Root) قياس n (جذر بدائي للعدد n) إذا كان $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ بينما $a^m \not\equiv 1 \pmod{n}$ لكل $m < \phi(n)$.
إذا a جذر بدائي قياس $n \Leftrightarrow \text{ord}_n(a) = \phi(n)$.

مثال (١) :

(أ) $2, 3$ جذران بدائيان قياس 5 ، لأن $\phi(5) = 4$ و $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$ ، $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$.
(ب) $5, 3$ جذر بدائيان قياس 7 ، لأن $\phi(7) = 6$ و $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ، $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$.

مثال (٢) :

إذا كان $n = 9$ ، فإن $2, 5$ جذران بدائيان قياس 9 ، لأن $\phi(9) = 6$ و $2^6 \equiv 1 \pmod{9}$ ، $5^6 \equiv 1 \pmod{9}$.

مثال (٣) :

2 ليست جذراً بدائياً قياس 257 ، لأن $16 = \text{ord}_{257}(2) \neq \phi(257) = 2^8$.

مثال (٤) :

لا يوجد جذر بدائي قياس 8 ، لأن $\phi(8) = 4$ و $\text{ord}_8(a) \neq 4$ لكل

$$a \in \mathbb{Z}_8^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي .

مبرهنة ١-١-٦ :

إذا كان $m \geq 3$ ، فليس للعدد 2^m جذر ابتدائي .

البرهان :

ليكن $(a, 2^m) = 1$. إذا a عدد فردي . سنثبت بالإستقراء على m أن

$$a^{2^{m-2}} \equiv 1 \pmod{2^m} \quad \dots (1)$$

فإذا كان $m = 3$ ، فإن (1) تعني أن $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$ وهذه علاقة صحيحة ،

$$\text{لأن } 1^2 = 3^2 = 5^2 = 7^2 \equiv 1 \pmod{8} .$$

والآن لنفرض أن العلاقة (1) صحيحة عندما $m = k$. إذاً

$$a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}$$

ولإثبات صحة العلاقة عندما $m = k + 1$ ، لاحظ أن

$$a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k} \Leftrightarrow a^{2^{k-2}} = 1 + b \cdot 2^k , b \in \mathbb{Z}$$

وعليه فإن

$$\begin{aligned} a^{2^{k-1}} &= (a^{2^{k-2}})^2 = (1 + b \cdot 2^k)^2 = 1 + 2b \cdot 2^k + b^2 \cdot 2^{2k} \\ &= 1 + 2^{k+1}(b + b^2 \cdot 2^{k-1}) \equiv 1 \pmod{2^{k+1}} \end{aligned}$$

وبالتالي فإن العلاقة (1) صحيحة عندما $m = k + 1$. إذاً العلاقة (1) صحيحة

لكل $m \geq 3$. لكن $\phi(2^m) = 2^{m-1}$ و $a^{2^{m-2}} \equiv 1 \pmod{2^m}$.

يعني أن $a^{\phi(2^m)} \equiv 1 \pmod{2^m}$ ، وعليه فإن $\text{ord}_{2^m}(a) \neq \phi(2^m)$ إذا لا يوجد جذر بدائي قياس 2^m .

□

الآن إلى المبرهنة الآتية التي تساعدنا في تحديد عدد الجذور البدائية لعدد طبيعي n .

مبرهنة ٦-١-٢ :

ليكن $(a, n) = 1$ و $R = \{a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}\}$ نظام بواقي مختزل قياس n . إذا كان a جذراً بدائياً للعدد n ، فإن كل عنصر من عناصر $S = \{a, a^2, \dots, a^{\phi(n)}\}$ يوافق عنصر وحيد من عناصر R .

البرهان :

بما أن $(a, n) = 1$. إذا $(a^m, n) = 1$ لكل $m = 1, \dots, \phi(n)$. لكن $a^i \not\equiv a^j \pmod{n}$ لكل $i \neq j$ و R نظام بواقي مختزل قياس n . إذا $a_r \not\equiv a_s \pmod{n}$ لكل $r \neq s$ ، وعليه فإن لكل a^m يوجد عنصر وحيد $a_i \in R$ بحيث أن $a^m \equiv a_i \pmod{n}$.

□

نتيجة :

إذا كان للعدد n جذراً بدائياً فإن عدد الجذور البدائية للعدد n يساوي $\phi(\phi(n))$.

البرهان :

نفرض أن a جذر بدائي للعدد n ، إذا الجذور البدائية الأخرى للعدد n تنتمي إلى المجموعة $S = \{a, a^2, \dots, a^{\phi(n)}\}$ حسب مبرهنة (٦-١-٢) . لكن

$$\left| \{a^m \mid 1 \leq m \leq \phi(n), \text{ord}_n(a^m) = \phi(n)\} \right| \\ = \left| \{m : 1 \leq m \leq \phi(n), (m, \phi(n)) = 1\} \right| = \phi(\phi(n))$$

وهذا يعني أن عدد الجذور البدائية للعدد n يساوي $\phi(\phi(n))$.

□

مثال (٥) :

حقق مبرهنة (٦-١-٢) ونتيجتها عندما $n = 9$.

الحل :

بما أن $\phi(9) = 6$ ، 2 جذر بدائي قياس 9 . إذا
 $R = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ ، $S = \{2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6\}$
 $2 \equiv 2 \pmod{9}$ ، $2^2 \equiv 4 \pmod{9}$ ، $2^3 \equiv 8 \pmod{9}$ ، $2^4 \equiv 7 \pmod{9}$
 $2^5 \equiv 5 \pmod{9}$ ، $2^6 \equiv 1 \pmod{9}$
 لكن $\phi(\phi(9)) = \phi(6) = 2$ ، وعليه يوجد جذر بدائي آخر قياس 9
 ولإيجاده ، لاحظ أن $(1, 6) = (5, 6) = 1$. إذا $r = 5$ جذر بدائي قياس 9 .

مثال (٦) :

إذا كان 2 جذراً بدائياً للعدد 27 ، فأوجد الجذر البدائي الآخر .

الحل :

بما أن $\phi(27) = 3^3(1 - \frac{1}{3}) = 18$ ، $\phi(\phi(27)) = \phi(18) = 6$. إذا توجد
 خمسة جذور بدائية أخرى للعدد 27 ، ولإيجادها لاحظ أن
 $(1, 18) = (5, 18) = (7, 18) = (11, 18) = (13, 18) = (17, 18) = 1$
 وعليه فإن كلاً $2, 5, 7, 11, 13, 17$ جذر بدائي للعدد 27 .

ولكي نبرهن على وجود جذور بدائية ، ونحدد طبيعة الأعداد التي تملك مثل تلك الجذور نورد المبرهنات الآتية .

مبرهنة ٦-١-٣ : " لاجرانج "

إذا كان p عدداً أولياً ، وكانت $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ، $a_i \in \mathbb{Z}$ ،
 $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ كثيرة حدود من الدرجة n ، فإن للعلاقة
 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ ، على الأكثر n من الحلول غير المتطابقة قياس p .

البرهان : "بالإستقراء على n "

إذا كان $n=1$ ، فإن $f(x) = a_0 + a_1x$ و $(a_1, p) = 1$ ، وعليه فإن للعلاقة الخطية $a_1x \equiv -a_0 \pmod{p}$ حل وحيد قياس p حسب مبرهنة (3-4-1) . إذا المبرهنة صحيحة عندما $n=1$.

والآن لنفرض أن المبرهنة صحيحة عندما $n=k$ ولإثبات صحتها عندما $n=k+1$ ، لاحظ أنه أما $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ لا تملك حلاً أو أنها تملك على الأقل حل واحد وليكن $x=a$. إذاً

$$\deg(g(x)) = k \quad , \quad f(x) \equiv (x-a)g(x) \pmod{p}$$

وحيث أن $f(b) \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow g(b) \equiv 0 \pmod{p}$ لكل $a \not\equiv b \pmod{p}$ إذاً أي حل للعلاقة $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ هو حل للعلاقة $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ لكن للعلاقة $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ ، على الأكثر k من الحلول غير المتطابقة قياس p حسب فرضية الإستقراء الرياضي . إذاً للعلاقة $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ على الأكثر $(k+1)$ من الحلول غير المتطابقة قياس p ، وعليه فإن المبرهنة صحيحة عندما $n=k+1$. إذاً المبرهنة صحيحة لكل $n \geq 1$.

□

نتيجة :

إذا كان p عدداً أولياً و $n \mid (p-1)$ ، فإن للعلاقة $x^n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، n من الحلول .

البرهان :

بما أن $n \mid (p-1)$. إذاً يوجد $m \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $p-1 = mn$ ، وعليه فإن

$$x^{p-1} - 1 = (x^n)^m - 1 = (x^n - 1)[x^{n(m-1)} + x^{n(m-2)} + \dots + x^n + 1]$$

$$= (x^n - 1)g(x)$$

حيث $\deg(g(x)) = n(m-1) = p-1-n$ ، $g(x) = x^{n(m-1)} + \dots + x^n + 1$ لكن $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ تملك على الأكثر $(p-1-n)$ من الحلول غير

المتطابقة قياس p حسب مبرهنة (٦-١-٣) ، ومن مبرهنة فيرما نجد أن للعلاقة
 $x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، من الحلول غير المتطابقة قياس p وهي
 $1, 2, 3, \dots, p-1$ ، كما أن $a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ و $g(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$
 يعني أن $a^n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه يجب أن يكون للعلاقة
 $x^n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، على الأقل n من الحلول . لكن للعلاقة
 $x^n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، على الأكثر n من الحلول حسب مبرهنة (٦-١-٣) .
 إذا يوجد للعلاقة $x^n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، n من الحلول .

□

والآن إلى المبرهنة الآتية والتي أثبتها أويلر سنة ١٧٧٣م وحسب جميع الجذور
 البدائية لكل الأعداد الأولية $p \leq 37$.

مبرهنة ٦-١-٤ :

يوجد جذر بدائي لأي عدد أولي p .

البرهان :

إذا كان $p = 2$ ، فإن $\text{ord}_2(1) = \phi(2) = 1$ ، وعليه فإن الواحد جذر بدائي
 قياس 2 . وإذا كان $p > 2$ فإن $(p-1) > 1$ ، وعليه فإن $p-1 = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$ حسب
 المبرهنة الأساسية في الحساب . ومن نتيجة مبرهنة (٦-١-٣) نجد أن للعلاقة
 $x^{p_i^{e_i}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، بالضبط $p_i^{e_i}$ من الجذور (من الحلول غير المتطابقة)،
 ولكثيرة الحدود $x^{p_i^{e_i-1}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ بالضبط $p_i^{e_i-1}$ من الحلول غير
 المتطابقة ، وعليه يوجد $p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1} = p_i^{e_i-1}(p_i - 1)$ عنصراً رتبة كل منها
 تساوي $p_i^{e_i}$. إذاً لكل $i = 1, \dots, r$ يمكن نختار عنصر a_i ، $\text{ord}_p(a_i) = p_i^{e_i}$ ،
 وعليه إذا كان $a = a_1 a_2 \dots a_r$ ، فإن $\text{ord}_p(a) = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} = p-1 = \phi(p)$ ،
 وعليه فإن a جذر بدائي قياس p .

مثال (٧) :

لستكن $p=13$. إذا $p-1=12=2^2 \cdot 3$ ، ولكثيرة الحدود
 $x^4 - 1 = 0 \pmod{13}$ أربعة جذور هي 1,5,8,12 أما لكثيرة الحدود
 $x^2 - 1 = 0 \pmod{13}$ جذران هما 1,12 . إذاً يمكن أن يكون $a_1 = 5$ لكن
لكثيرة الحدود $x^3 - 1 = 0 \pmod{13}$ ثلاثة جذور هي 1,3,9 ، وعليه يمكن
أن نضع $a_2 = 3$ ويكون $a = a_1 a_2 = 5 \cdot 3 = 15 \equiv 2 \pmod{13}$ جذراً بدائياً
قياس 13 . لأن $\text{ord}_{13}(2) = \phi(13) = 12$. لاحظ أن بقية الجذور البدائية هي
 $8 \cdot 3 = 11 \pmod{13}$, $8 \cdot 9 = 7 \pmod{13}$, $5 \cdot 9 = 6 \pmod{13}$
لأن $\text{ord}_{13}(11) = 12$, $\text{ord}_{13}(7) = 12$, $\text{ord}_{13}(6) = 12$

مبرهنة ٦-١-٥ :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً وكان r جذراً بدائياً قياس p ، فإن r أو $r+p$ جذر
بدائي قياس p^m لكل $m \geq 1$.

البرهان :

بما أن r جذر بدائي قياس p . إذاً $\text{ord}_p(r) = p-1$. فإذا كان
 $r^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ ، فإن

$$(r+p)^{p-1} = r^{p-1} + \binom{p-1}{1} r^{p-2} \cdot p + \dots + p^{p-1}$$

$$\equiv 1 + (p-1)pr^{p-2} \pmod{p^2}$$

$$\equiv (1 - p \cdot r^{p-2}) \pmod{p^2} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$$

إذاً إذا وضعنا r بدلاً من $r+p$ ، يمكننا أن نفرض أن $r^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.
وحيث أن $r^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. إذاً $r^{p-1} = 1 + ap$ ، $a \in \mathbb{Z}$ ، $p \nmid a$. لكن

$$(1+ap)^{p^{m-1}} \equiv (1+ap)^m \pmod{p^{m+1}} \text{ إذاً } m \geq 1$$

فإن $\text{ord}_{p^m}(r^{p-1}) = \text{ord}_{p^m}(1+ap) = p^{m-1}$ ، وعليه فإن

أصغر عدد صحيح موجب k يجعل $(r^{p-1})^k \equiv 1 \pmod{p^m}$ هو $k = p^{m-1}$ وبالتالي فإن أصغر عدد صحيح موجب t بحيث أن $r^t \equiv 1 \pmod{p^m}$ هو $t = (p-1)k = (p-1)p^{m-1}$. لذا $\phi(p^m) = (p-1)p^{m-1}$.
 ، وعليه فإن $r^{\phi(p^m)} \equiv 1 \pmod{p^m}$ ، وقياس p^m بدائي لكل $m \geq 1$.
 □

نتيجة :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فإن للعدد $2p^m$ جذور بدائية لكل $m \geq 1$.

البرهان :

بما أن p عدد أولي فردي . إذاً يوجد جذر بدائي قياس p^m لكل $m \geq 1$ حسب مبرهنة (٦-١-٥) ، وعليه نفرض أن r جذر بدائي قياس p^m .

إذا كان r عدداً زوجياً ، فإن $r + p^m$ عدد فردي . ومن الواضح أن $r + p^m$ جذر بدائي قياس p^m ، وعليه يمكن أن نفرض أن r عدد فردي .
 إذاً $(r, 2p^m) = 1$ ، وعليه فإن $r^{\phi(2p^m)} \equiv 1 \pmod{2p^m}$ حسب مبرهنة أولر .
 فإذا كان $\text{ord}_{2p^m}(r) = n$ ، فإن $n \mid \phi(2p^m)$ حسب مبرهنة (٥-١-٣) .

وحيث أن $\phi(2p^m) = \phi(2)\phi(p^m) = \phi(p^m)$ و

$$r^n \equiv 1 \pmod{2p^m} \Rightarrow r^n \equiv 1 \pmod{p^m}$$

إذاً $\text{ord}_{p^m}(r) = \phi(p^m) = \phi(2p^m)$ حسب مبرهنة (٥-١-٣) .

وعليه فإن $n = \phi(2p^m)$ وبالتالي فإن r جذر بدائي قياس $2p^m$.
 □

مبرهنة ٦-١-٦ :

إذا كان $a > 2$ ، $b > 2$ أعداداً طبيعية ، $(a, b) = 1$ ، فإن ab لا يملك جذراً بدائياً .

البرهان :

ليكن $c \in \mathbb{Z}$ و $(ab, c) = 1$. إذا $(a, c) = (b, c) = 1$ ، وعليه إذا كان $m = [\phi(a), \phi(b)]$ و $d = (\phi(a), \phi(b))$ ، فإن كلا من $\phi(a), \phi(b)$ عدد

زوجي حسب مبرهنة (٤-٣-٤) ، كما أن $d \geq 2$ ، وبالتالي فإن

$$m = \frac{\phi(a) \phi(b)}{d} \leq \frac{\phi(ab)}{2} \quad \dots(1)$$

لكن $c^{\phi(a)} \equiv 1 \pmod{a}$ حسب مبرهنة أولر . إذا

$$c^m = (c^{\phi(a)})^{\frac{\phi(b)}{d}} \equiv 1 \pmod{a}$$

وبالمثل نجد أن $c^m \equiv 1 \pmod{b}$. لكن $(a, b) = 1$. إذا $c^m \equiv 1 \pmod{ab}$

وعليه فإن $\phi(ab) < \frac{\phi(ab)}{2} \leq m \leq \text{ord}_{ab}(c) \leq m$ حسب (١) . وبالتالي فإن c

ليست جذراً بدائياً قياس ab . إذا ab لا يملك جذر بدائي .

□

نتيجة :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فإن $n = 2^m p^k$ ، $m \geq 2$ ، لا يملك جذراً بدائياً .

البرهان :

بما أن $2^m > 2$ ، $p^k > 2$ ، $(2^m, p^k) = 1$. إذا $n = 2^m p^k$ لا يملك جذراً بدائياً حسب مبرهنة (٦-١-٦) .

□

والآن إلى المبرهنة التي تحدد طبيعة الأعداد التي تملك جذور بدائية .

مبرهنة ٦-١-٧ : " جاوس ١٨٠١م "

إذا كان $n > 1$ فإن n يملك جذراً بدائياً ، إذا وإذا فقط كان

$n = 2, 4, p^m, 2p^m$ ، حيث p عدد أولي فردي و $m \geq 1$.

البرهان :

من المبرهنين (٦-١-٦) و (٦-١-٦) ، نجد أن الأعداد التي تملك جذوراً بدائية هي $2, 4, p^m, 2p^m$ حيث p عدد أولي فردي و $m \geq 1$.

ولإثبات العكس لاحظ أن الواحد جذر بدائي للعدد 2 أما 3 فهو جذر بدائي للعدد 4 ، لأن $\text{ord}_4(3) = \phi(4) = 2$. وإذا كان $n = p^m$ أو $n = 2p^m$ ، حيث p عدد أولي فردي و $m \geq 1$ فإن مبرهنة (٦-١-٤) و مبرهنة (٦-١-٥) ونتيجتها تضمن وجود جذر بدائي للعدد n .

□

وكتطبيق على ما سبق نورد المثال الآتي .

مثال (٨) :

إذا كان 3 جذراً بدائياً للعدد 43 ، فأوجد جميع الأعداد الموجبة a الأقل من 43 ، بحيث $\text{ord}_{43}(a) = 6$.

الحل :

بما أن $\phi(6) = 2$. إذاً يوجد عدنان رتبة كل منهما تساوي 6 قياس 43 . ولمعرفة هذين العددين ، لاحظ أن 3 جذر بدائي للعدد 43 . ورتبة 3^m ، $1 \leq m \leq 42$ هي

$$\text{ord}_{43}(3^4) = \frac{42}{(m, 42)} = 6 \Leftrightarrow (m, 42) = 7$$

إذاً $m = 7, 35$. لكن $3^4 \equiv -5 \pmod{43}$ ، $3^3 \equiv -16 \pmod{43}$ يعني أن $3^7 \equiv 80 \equiv 37 \pmod{43}$ ، وعليه فإن أحد العددين هو 37 . ولتحديد العدد الثاني .

لاحظ أن $3^7 \equiv -6 \pmod{43} \Rightarrow 3^{35} \equiv (3^7)^5 \equiv (-6)^5 \pmod{43}$. لكن $(-6)^4 \equiv 49 \equiv 6 \pmod{43} \Rightarrow (-6)^2 \equiv -7 \pmod{43}$. إذاً

$(-6)^5 \equiv -36 \equiv 7 \pmod{43}$ ، وعليه فإن $3^{35} \equiv 7 \pmod{43}$. وبالتالي فإن العدد الثاني هو 7 . إذاً $a = 7, 37$.

وأخيراً إلى تخميني جاوس وارتين حول الجذور البدائية واللذين لم تثبت صحتهما أو خطأهما إلى الآن .

وينص تخمين جاوس (Gauss Conjecture) والذي نشر عام 1801م على

الآتي " يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الأولية يكون العدد 10 جذراً بدائياً لكل منها "

إما تخمين الألماني ارتين (1893-1962) والذي نشر عام 1927م فهو تعميم

لتخمين جاوس ، وينص على الآتي

" إذا كان $a \in \mathbb{Z}$ ، $a \neq \pm 1$ و a ليس مربعاً كاملاً ، فيوجد عدد غير منتهى من

الأعداد الأولية يكون a جذراً بدائياً لكل منها " .

تمارين

(1) أثبت أن 2 جذر بدائي للعدد 19 ، ثم أوجد بقيمة الجذور البدائية للعدد 19 .

(2) أثبت أن 15 لا يملك جذراً بدائياً .

(3) أوجد الجذور البدائية للعدد 17 ، علماً بأن 3 واحد منها .

(4) أوجد جذرين بدائيين للعدد 10 .

(5) إذا كان $F_n = 2^{2^n} + 1$ عدداً أولياً ، فأثبت أن 2 ليست جذراً بدائياً

للعدد F_n . " لاحظ أن $(2^{2^{n+1}} - 1) \in F_n$ " .

(6) أوجد الجذور البدائية لكل من 26 ، 25 ، 81 .

(7) أثبت أن 3 جذر بدائي لكل من 7^m ، $2 \cdot 7^m$ لكل $m \geq 1$.

(8) إذا كان n يقبل القسمة على عددين أوليين مختلفين ، فأثبت أن n لا تملك

جذراً ابتدائياً . " طبق مبرهنة (6-1-6) " .

(٩) إذا كان p عدداً أولياً فردياً وكان r جذراً بدائياً إلى p^n ، فأثبت أن r جذر بدائي للعدد p .

(١٠) (أ) إذا كان $\text{ord}_n(a) = r$ وكان $s > 0$ ، فأثبت أن $\text{ord}_n(a^s) = \frac{r}{(r,s)}$ ثم أستنتج من ذلك أن $\text{ord}_n(a^s) = r \Leftrightarrow (r,s) = 1$.

(ب) إذا كان 3 جذراً بدائياً لكل من 31, 43 فأوجد جميع الأعداد الموجبة a الأقل من 31 بحيث أن $\text{ord}_{31}(a) = 6$ ، ثم أوجد جميع الأعداد الموجبة b الأقل من 43 بحيث أن $\text{ord}_{31}(a) = 21$.

(١١) إذا كان p عدداً أولياً فردياً وكان r جذر بدائي إلى p^m ، فأثبت أن r جذر بدائي إلى $2p^m$ ، إذاً وإذا فقط كان r عدداً صحيحاً فردياً ، ثم أستنتج من ذلك أن $3, 3^3, 3^5, 3^9$ جذور بدائية إلى $578 = 2(17)^2$.

(١٢) إذا كان r جذراً بدائياً للعدد الأولي p وكان $(r + tp)^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ ، فأثبت أن $(r + tp)$ جذر بدائية إلى p^m لكل $m \geq 1$.

(١٣) إذا كان $a, n \in \mathbb{Z}$ وكان $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ و $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ لكل a قاسم أولي q للعدد $(p-1)$ ، فأثبت أن n عدد أولي و a جذر بدائي له .

(١٤) إذا كان r جذراً بدائياً للعدد n ، فأثبت أن r^m جذر بدائي للعدد n . إذاً وإذا فقط كان $(m, \phi(n)) = 1$.

٦-٢: البواقي التربيعية Quadratic Residues

أن وجود أو عدم وجود حل للتطابق $x^2 \equiv a \pmod{n}$ ، $(a, n) = 1$ يقود إلى ما يسمى البواقي التربيعية وغير التربيعية ، والتي ظهرت في أبحاث أويلر سنة ١٧٧٣م وأبحاث الفرنسي لجندر ١٧٨٥م ، وأبحاث جاوس ١٨٠١م وهذا ما نرغب بدراسته في هذا الجزء .

تعريف ٦-٢-١ :

إذا كان $n \in \mathbb{Z}^+$ ، فيقال عن $a \in \mathbb{Z}$ أنه باقي تربيعي (Quadratic Residue) قياس n ، إذا كان $(a, n) = 1$ ويوجد $x \in \mathbb{Z}$ بحيث

$$x^2 \equiv a \pmod{n} .$$

أما إذا كان $(a, n) = 1$ ولا يوجد $x \in \mathbb{Z}$ بحيث $x^2 \equiv a \pmod{n}$ فيقال عن a أنه باقي غير تربيعي (Quadratic Nonresidue) قياس n .

إذا كان a باقياً تربيعياً قياس n فيعبر عن ذلك بالشكل aR_n . أما إذا كان a باقياً غير تربيعي قياس n ، فيعبر عن ذلك بالشكل aN_n . لاحظ أن

$$a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow (aR_n \Leftrightarrow bR_n)$$

مثال (١) :

إذا كان $n = 5$ ، فإن $1^2 \equiv 4^2 \equiv 1 \pmod{5}$ ، $2^2 \equiv 3^2 \equiv 4 \pmod{5}$ ، $(1, 5) = (4, 5) = 1$. إذاً aR_5 لكل $a \in \{1, 4\}$ و aN_5 لكل $a \in \{2, 3\}$. لاحظ أن

$$\left| \{a \in \mathbb{Z}_5^* : aR_5\} \right| = \left| \{a \in \mathbb{Z}_5^* : aN_5\} \right| = \frac{5-1}{2} = 2$$

مثال (٢) :

إذا كان $n = 7$ ، فإن $1^2 \equiv 6^2 \equiv 1 \pmod{7}$ ، $3^2 \equiv 4^2 \equiv 2 \pmod{7}$ ، $2^2 \equiv 5^2 \equiv 4 \pmod{7}$ ، $(1, 7) = (2, 7) = (4, 7) = 1$. إذاً aR_7 لكل $a \in \{1, 2, 4\}$. وحيث أن $(3, 7) = (5, 7) = (6, 7) = 1$ و $x^2 \not\equiv 3 \pmod{7}$ ، $x^2 \not\equiv 5 \pmod{7}$ ، $x^2 \not\equiv 6 \pmod{7}$ لكل $x \in \mathbb{Z}_7^*$ إذاً aN_7 لكل $a \in \{3, 5, 6\}$. لاحظ أن

$$\left| \{a \in \mathbb{Z}_7^* : aR_7\} \right| = \left| \{a \in \mathbb{Z}_7^* : aN_7\} \right| = \frac{7-1}{2} = 3$$

مثال (٣) :

إذا كان $n = 9$ ، فإن $(1,9) = (2,9) = (4,9) = (5,9) = (7,9) = (8,9) = 1$ ،
 و $2^2 \equiv 7^2 \equiv 4 \pmod{9}$ ، $1^2 \equiv 8^2 \equiv 1 \pmod{9}$ ،
 $4^2 \equiv 5^2 \equiv 7 \pmod{9}$. إذاً aR_9 لكل $a \in \{1,4,7\}$ أما aN_9 فلكل
 $a \in \{3,5,8\}$. لاحظ أن

$$\left| \{a \in Z_9^* : aR_9\} \right| = \left| \{a \in Z_9^* : aN_9\} \right| = \frac{3(3-1)}{2} = 3$$

مثال (٤) :

إذا كان $n = 11$ ، فإن $(a,n) = 1$ لكل $a \in \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ ،
 كما أن $2^2 \equiv 9^2 \equiv 4 \pmod{11}$ ، $3^2 \equiv 8^2 \equiv 9 \pmod{11}$ ،
 $4^2 \equiv 7^2 \equiv 5 \pmod{11}$ ، $5^2 \equiv 6^2 \equiv 3 \pmod{11}$ ، $1^2 \equiv 10^2 \equiv 1 \pmod{11}$ ،
 إذاً aR_{11} لكل $a \in \{1,3,4,9\}$ بينما aN_{11} لكل $a \in \{2,6,7,8,10\}$ وأن

$$\left| \{a \in Z_{11}^* : aR_{11}\} \right| = \left| \{a \in Z_{11}^* : aN_{11}\} \right| = \frac{(11-1)}{2} = 6$$

مثال (٥) :

إذا كان $n = 15 = 3 \cdot 5$ ، فإن $\phi(15) = \{1,2,4,7,8,11,13,14\}$ و
 $1^2 \equiv 4^2 \equiv (11)^2 \equiv (14)^2 \equiv 1 \pmod{15}$ و $2^2 \equiv 7^2 \equiv 8^2 \equiv (13)^2 \equiv 4 \pmod{15}$ ،
 إذاً aR_{15} لكل $a \in \{1,4\}$ بينما aN_{15} لكل $a \in \{2,7,8,11,13,14\}$. لاحظ
 أن

$$\left| \{a \in Z_{15}^* : aR_{15}\} \right| = \frac{\phi(15)}{2^2} = 2$$

وبصورة عامة إذا كان $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$ عدداً صحيحاً فردياً فإن

$$\left| \{a \in Z_n^* : aR_n\} \right| = \frac{\phi(n)}{2^r}$$

مثال (٦) :

إذا كان $n = 27 = 3^3$ ، فإن $\phi(27) = 18$ ، $(a, 27) = 1$ لكل $a \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26\}$ و

$$2^2 \equiv (25)^2 \equiv 4 \pmod{27} , 4^2 \equiv 23^2 \equiv 16 \pmod{27}$$

$$5^2 \equiv (22)^2 \equiv 25 \pmod{27} , 1^2 \equiv (26)^2 \equiv 1 \pmod{27}$$

$$10^2 \equiv (17)^2 \equiv 19 \pmod{27} , 7^2 \equiv (20)^2 \equiv 22 \pmod{27}$$

$$13^2 \equiv (14)^2 \equiv 7 \pmod{27} , 8^2 \equiv (19)^2 \equiv 10 \pmod{27}$$

$$(11)^2 \equiv (16)^2 \equiv 13 \pmod{27}$$

وعليه فإن aR_{27} لكل $a \in \{1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25\}$ و aN_{27} لكل $a \in \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26\}$ كما أن

$$|\{a \in Z_{27}^* : aR_{27}\}| = |\{a \in Z_{27}^* : aN_{27}\}| = \frac{3^2(3-1)}{2} = 9$$

وبصورة عامة إذا كان $n = p^m$ عدد فردياً فإن

$$|\{a \in Z_{p^m}^* : aR_{p^m}\}| = |\{a \in Z_{p^m}^* : aN_{p^m}\}| = \frac{(p-1)p^{m-1}}{2}$$

وهذا ما توضحه المبرهنة الآتية

مبرهنة ٦-٢-١ :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً وكان $a \in Z$ و $(a, p^m) = 1$ ، $m \geq 1$ ، فإن

$$a^{\frac{p^{m-1}(p-1)}{2}} \equiv 1 \pmod{p^m} \text{ إذا وإذا فقط كان (أ)}$$

$$a^{\frac{p^{m-1}(p-1)}{2}} \equiv -1 \pmod{p^m} \text{ إذا وإذا كان (ب)}$$

$$aR_p \text{ إذا وإذا فقط كان (ج)}$$

البرهان

(أ) نفرض أن $aR p^m$. إذاً يوجد حل x_1 للتطابق $x^2 \equiv a \pmod{p^m}$ ،
وعليه فإن $x_1^2 \equiv a \pmod{p^m}$. لكن $(a, p^m) = 1$. إذاً $(x_1, p^m) = 1$ ،
وعليه فإن

$$a^{p^{m-1} \cdot \frac{p-1}{2}} = (x_1^2)^{p^{m-1} \cdot \frac{p-1}{2}} = x_1^{p^{m-1}(p-1)} = x_1^{\phi(p^m)} \equiv 1 \pmod{p^m}$$

حسب مبرهنة أويلر (٣-٥-١) .

ولإثبات العكس نفرض أن $a^{p^{m-1} \cdot \frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p^m}$ وأن r جذر بدائي
قياس p^m . إذاً $a = r^k$ لبعض قيم k حيث $1 \leq k \leq (p^m - 1)$ ، وعليه فإن

$$r^{p^{m-1} \cdot \frac{p-1}{2} k} \equiv a^{p^{m-1} \cdot \frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p^m}$$

لكن $\text{ord}_{p^m}(r) = \phi(p^m) = p^{m-1}(p-1)$. إذاً $k p^{m-1} \cdot \frac{p-1}{2}$ يقبل
القسمة على $p^{m-1}(p-1)$ حسب مبرهنة (٥-١-٣) ، وعليه فإن $k = 2t$ ،
 $t \in \mathbb{Z}$ وبالتالي فإن $(r^t)^2 = r^k \equiv a \pmod{p^m}$ ، وعليه فإن r^t حل
للتطابق $x^2 \equiv a \pmod{p^m}$ ، وبالتالي فإن $aR p^m$.

(ب) نفرض أن $aN p^m$ ، $(a, p^m) = 1$. إذاً $a^{\phi(p^m)} \equiv 1 \pmod{p^m}$ حسب
مبرهنة أويلر (٣-٥-١) . لكن

$$a^{\phi(p^m)} - 1 = a^{p^{m-1}(p-1)} - 1 = (a^{\frac{p-1}{2} p^{m-1}} - 1)(a^{\frac{p-1}{2} p^{m-1}} + 1) \equiv 0 \pmod{p^m}$$

و $a^{\frac{p-1}{2} p^{m-1}} - 1 \not\equiv 0 \pmod{p^m}$ ، لأنه إذا كان

$$a^{\frac{p-1}{2} p^{m-1}} - 1 \equiv 0 \pmod{p^m}$$

فإن $aR p^m$ حسب (أ) وهذا خلاف الفرض .
إذاً $a^{\frac{p-1}{2} p^{m-1}} \equiv -1 \pmod{p^m}$.

ولإثبات العكس أفرض أن $aR p^m$ نجد أن $a^{\frac{p-1}{2} p^{m-1}} \equiv 1 \pmod{p^m}$ ،
وعليه إذا كان $a^{\frac{p-1}{2} p^{m-1}} \equiv -1 \pmod{p^m}$ ، فإن $aN p^m$.

(ج) نفرض أن $aR p^m$. إذا $a^{\frac{p-1}{2} \cdot p^{m-1}} \equiv 1 \pmod{p^m}$ ، وعليه فإن
 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ وبالتالي فإن $a^{\frac{p-1}{2} \cdot p^{m-1}} \equiv 1 \pmod{p}$ حسب مبرهنة
 فيرما . وبوضع $m=1$ في (أ) نجد أن $aR p \Leftrightarrow a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.
 ولإثبات العكس نفرض أن $aR p$ إذا $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. وحيث أن
 $\forall m \geq 1, a \equiv b \pmod{p^m} \Rightarrow a^p \equiv b^p \pmod{p^{m+1}}$
 إذا $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow a^{\frac{p-1}{2} \cdot p^{m-1}} \equiv 1 \pmod{p^m}$ ، وعليه فإن
 $aR p^m$ حسب (أ) .

□

نتيجة : (Euler's Criterion)

إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، $(a, p) = 1$ فإن

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow aR p \quad (\text{أ})$$

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p} \Leftrightarrow aNp \quad (\text{ب})$$

البرهان :

ضع $m=1$ في مبرهنة (٦-٢-١) تحصل على النتيجة .

□

مثال (٧) :

إذا كان $p=13$ ، فإن $2^{\frac{13-1}{2}} = 2^6 \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13}$ ، وعليه فإن
 $2N_{13}$ أما $3^6 = (3^3)^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{13}$ ، وعليه فإن $3R_{13}$ ، بينما $4R_{13}$
 لأن $4^6 \equiv 2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$.

مثال (٨) :

إذا كان $n=5^2=25$ ، فإن $\frac{p(p-1)}{2} = 10$ ، $2^{10} \equiv -1 \pmod{25}$ ،
 $3^{10} \equiv -1 \pmod{25}$ ، وعليه فإن $2N_{25}$ ، $3N_{25}$ بينما $4R_{25}$ لأن
 $4^{10} \equiv 1 \pmod{25}$ كما أن $11R_{25}$ ، لأن $11^{10} \equiv 1 \pmod{25}$.

والآن إلى تعريف رمز لجندر ودراسة خواصه .

تعريف ٦-٢-٢ : (الجندر ١٧٩٨)

إذا كان p عدداً أولياً فردياً و $(a, p) = 1$ ، فيعرف رمز لجندر

: (a/p) (Legendre Symbol) كالآتي :

$$(a/p) = \begin{cases} 1 & a \in R_p & \text{إذا كان} \\ -1 & a \in N_p & \text{إذا كان} \\ 0 & a \equiv 0 \pmod{p} & \text{إذا كان} \end{cases}$$

مثال (٩) :

(أ) إذا كان $p = 7$ ، فإن $(1/7) = (2/7) = (4/7) = 1$ ، لأن كلاً من 1, 2, 4

باقي تربيعي قياس 7 . أما $(3/7) = (5/7) = (6/7) = -1$ ، لأن كلاً من

3, 5, 6 باقي غير تربيعي قياس 7 .

(ب) إذا كان $p = 11$ ، فإن

$(1/11) = (3/11) = (4/11) = (5/11) = (9/11) = 1$ ، لأن $a \in R_{11}$ عندما

$a = 1, 3, 4, 5, 9$. أما

$(2/11) = (6/11) = (7/11) = (8/11) = (10/11) = -1$ ، لأن $a \in N_{11}$ عندما

$a = 2, 6, 7, 8, 10$.

مبرهنة ٦-٢-٢ :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً وكان $a, b \in Z$ ، $(a, p) = (b, p) = 1$ ، فإن

$$(a/p) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \quad (\text{أ})$$

(ب) إذا كان $a \equiv b \pmod{p}$ ، فإن $(a/p) = (b/p)$.

(ج) $(a^2/p) = 1$ ، (د) $(ab/p) = (a/p)(b/p)$ ،

(هـ) $(1/p) = 1$ ، $(-1/p) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ ، (و) $(ab^2/p) = (a/p)$.

البرهان :

(أ) بتطبيق مبرهنة (٦-٢-١) أو نتیجتها نجد أن $(a/p) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$.

(ب) بما أن $a \equiv b \pmod{p}$ إذاً إذا وجد حل لكل من $x^2 \equiv a \pmod{p}$ و

$x^2 \equiv b \pmod{p}$ ، فإن لكل منهما نفس الحلول وعليه أما لكل من

$x^2 \equiv a \pmod{p}$ ، $x^2 \equiv b \pmod{p}$ حل أو ليس لكل منهما حل .

إذاً $(a/b) = (b/p)$.

(ج) بما أن a حل للعلاقة $x^2 \equiv a^2 \pmod{p}$. إذاً $(a^2/p) = 1$.

(د) بما أن $(ab/p) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \cdot b^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \equiv (a/p)(b/p)$

حسب (أ) . وبما أن لرمز لجندر القيم 1 أو -1 . إذاً إذا كان

$(ab/p) \neq (a/p)(b/p)$ ، فإن $1 \equiv -1 \pmod{p}$ ، وعليه فإن

$2 \equiv 0 \pmod{p}$ ، ومنها نجد أن $p = 2$ وهذا يناقض كون p عدداً أولياً

فردياً . إذاً $(ab/p) = (a/p)(b/p)$.

(هـ) بما أن $(1/p) = 1$. إذاً بوضع $a = 1$ في (ج) ، نجد أن $(1/p) = 1$ ،

وبوضع $a = -1$ في (أ) نجد أن $(-1/p) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$. لكن

إذا كان $(-1/p) = 1$ ، فإن $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$. وإذا كان $(-1/p) = -1$ ،

فإن $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$ ، وعليه فإن $(-1/p) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$.

(و) بما أن $(ab^2/p) = (a/p)(b^2/p)$ حسب (د) ، وبما أن $(b^2/p) = 1$

حسب (ج) . إذاً $(ab^2/p) = (a/p)$. □

نتيجة : إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فإن

$$(-1/p) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

البرهان :

إذا كان $p = 4m + 1$ ، فإن $\frac{p-1}{2} = 2m$ عدد زوجي . لكن

إذا $(-1/p) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{2m} = 1$ حسب مبرهنة (٦-٢-٢) . إذا

أما إذا كان $p = 4m + 3$ ، فإن $\frac{p-1}{2} = 2m + 1$ عدد فردي ، وعليه فإن $(-1/p) = (-1)^{2m+1} = -1$.

□

وكتطبيق للمبرهنة (٦-٢-٢) ونتيجتها نورد ما يلي .

مثال (١٠) :

أثبت أن للتطابق $x^2 \equiv -38 \pmod{17}$ حل .

الإثبات :

بما أن $p = 17 = 4 \cdot 4 + 1$. إذا $(-1/p) = 1$ حسب نتيجة مبرهنة (٦-٢-٢) ،

وعليه فإن $(38/17) = (-1/17)(38/17) = (-38/17)$. لكن

$38 \equiv 4 \pmod{17}$. إذا $(38/17) = (4/17)$ حسب مبرهنة (٦-٢-٢) .

لكن $(4/17) = (2^2/17) = 1$ حسب مبرهنة (٦-٢-٢) . إذا $(38/17) = 1$ ،

وعليه فإن $38 R_{17}$ وبالتالي فإن للتطابق $x^2 \equiv -38 \pmod{17}$ حل .

مثال (١١) :

برهن على عدم وجود أعداد صحيحة x, y بحيث أن $y^2 = x^3 + 11$.

الإثبات :

نفرض وجود $x, y \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $y^2 = x^3 + 11$. إذا

$y^2 \equiv x^3 + 11 \pmod{4}$ ، وعليه فإن $y^2 \equiv x^3 + 3 \pmod{4}$ ، ومنه نجد أن

$x^3 + 3 \equiv 0 \pmod{4}$ ، وبالتالي فإن $x^3 \equiv -3 \equiv 1 \pmod{4}$ وعليه فإن

$x \equiv 1 \pmod{4}$. إذا $y^2 + 16 = x^3 + 27 = (x+3)(x^2 - 3x + 9)$. لكن

$x \equiv 1 \pmod{4}$. إذاً $x^2 - 3x + 9x \equiv 3 \pmod{4}$ ، وعليه يوجد عدد أولي $p \equiv 3 \pmod{4}$ و $x^2 - 3x + 9 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وبالتالي فـإن $y^2 + 16 \equiv 0 \pmod{p}$ ، ومنها نجد أن $\frac{y^2}{16} + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $(\frac{y}{4})^2 \equiv -1 \pmod{p}$. إذاً $(\frac{y}{4})^2 \equiv -1 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $(-1/p) = 1$ و $p \equiv 3 \pmod{4}$ وهذا يناقض نتيجة المبرهنة (٢-٢-٦) . إذاً لا يوجد $x, y \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $y^2 = x^3 + 11$.

والآن إلى المبرهنة الآتية التي تبين بأن عدد البواقي التربيعية قياس p يساوي عدد البواقي غير التربيعية قياس p ، كما توضح كيفية حسابها .

مبرهنة ٤-٢-٦ :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فإن $\sum_{a=1}^{p-1} (a/p) = 0$

البرهان :

ليكن r جذراً بدائياً قياس p . إذاً كل عنصر في $S = \{r, r^2, \dots, r^{p-1}\}$ يطابق عنصراً وحيداً في $Z_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$ حسب مبرهنة (٢-١-٦) ، وعليه فإن لكل $1 < a < p-1$ يوجد عنصر وحيد k ، بحيث $1 \leq k \leq p-1$ بحيث أن $a \equiv r^k$ ، وبالتالي فإن $(a/p) = (r^k/p)$ حسب مبرهنة (٢-٢-٦) . لكن $(r^k/p) \equiv (r^k)^{\frac{p-1}{2}} = (r^{\frac{p-1}{2}})^k \pmod{p}$ حسب مبرهنة (١٢-٢-٦) .

وحيث أن r جذر بدائي قياس p . إذاً $r^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $(r^k/p) = (-1)^k$. إذاً $(a/p) = (-1)^k$ ، وعليه فإن

$$\sum_{a=1}^{p-1} (a/p) = \sum_{k=1}^{p-1} (-1)^k = 0$$

نستنتج من مبرهنة (٦-٢-٤) ، أنه إذا كان p عدداً فردياً أولياً وكان r جذراً بدائياً إلى p ، فإن $r^{2m} \pmod{p}$ باقي تربيعي قياس p و $r^{2m+1} \pmod{p}$ باقي غير تربيعي قياس p ، حيث $m \in \mathbb{Z}^+$.

□

مثال (١٢) :

إذا كان $p = 11$ ، فإن 2 جذر بدائي قياس 11 ، لأن $\text{ord}_{11}(2) = \phi(11) = 10$ ، وبالتالي فإن البواقي التربيعية قياس 11 هي

$$2^2 \equiv 4 , 2^4 \equiv 5 , 2^6 \equiv 9 , 2^8 \equiv 3 , 2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

أما البواقي غير التربيعية قياس 11 فهي

$$2^1 \equiv 2 , 2^3 \equiv 5 , 2^5 \equiv 10 , 2^7 \equiv 7 , 2^9 \equiv 6 \pmod{11}$$

تمارين

(١) أوجد البواقي التربيعية وغير التربيعية لكل من 13, 23, 29, 31 .

(٢) أوجد البواقي التربيعية لكل من 21, 25, 35, 105 .

(٣) حقق مبرهنة (٦-٢-٤) عندما $p = 13$ ، $p = 17$.

(٤) إذا كان 2 جذراً بدائياً إلى 19 ، فأوجد جميع البواقي التربيعية إلى 19 .

(٥) برهن على عدم وجود أعداد صحيحة x, y بحيث أن $y^2 = x^3 + 7$.

(٦) إذا كان p عدداً أولياً فردياً وكان $a \in \mathbb{R}_p$ ، فأثبت أن :

(أ) a ليست جذراً بدائياً إلى p .

(ب) إذا كان $p \equiv 1 \pmod{4}$ ، فإن $(p-a) \in \mathbb{R}_p$.

(ج) إذا كان $p \equiv 3 \pmod{4}$ ، فإن $(p-a) \in \mathbb{N}_p$.

(٧) إذا كان $p = 2^n + 1$ عدداً أولياً ، وكان $a \in \mathbb{N}_p$ ، فأثبت أن a جذر بدائي

إلى p " طبق مبرهنة (٦-٢-١) " .

(٨) إذا كان كل من p ، $q = 4p + 1$ عدداً أولياً وكان $a \in \mathbb{N}_q$ ، فأثبت أن :

(أ) أما أن يكون a جذراً بدائياً إلى q أو أن $\text{ord}_q(a) = 4$.

"لاحظ أن $a \in \mathbb{N}_q$ يعني $(a/q) \equiv a^{2p} \pmod{q} = -1$ ، وعليه فإن

$$\text{ord}_q(a) = 1, 2, 4, p, 2p, 4p$$

(ب) 2 جذر بدائي إلى q .

(٩) إذا كان $p > 3$ عدداً أولياً ، فأثبت أن

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{3} \text{ إذا كان} \\ -1 & p \equiv 2 \pmod{3} \text{ إذا كان} \end{cases}$$

ثم أحسب $(-3/13)$ ، $(-3/17)$ ، $(-3/19)$ ، $(-3/23)$

(١٠) أحسب كلاً من

$$(2/13) , (3/13) , (7/13) , (6/13)$$

٦-٣ : " قانون التعاكس الثنائي Quadratic Reciprocity Law "

ينص قانون التعاكس الثنائي على أنه " إذا كان p, q عددين أوليين مختلفين ،
فأما لكلا التطابقين $x^2 \equiv p \pmod{q}$ و $x^2 \equiv q \pmod{p}$ حل أو ليس
لكليهما حل بشرط أن p, q ليسا على الصورة $4k + 3$. أما إذا كان كل منهما
على الصورة $4k + 3$ ، فإن لأحد التطابقين حل بينما لا يوجد حل للآخر " .

وقد خمن أويلر قانون التعاكس سنة ١٧٤٢م نتيجة لبحثه عن القواسم الأولية
للأعداد التي على الشكل $a^n \mp b^n$ ، ثم أعاد صياغته دون إثبات سنة ١٧٨٣م ،
وقدم لجندر أثباتياً جزئياً (غير مكتمل) لذلك القانون سنة ١٧٨٥م ، ثم أعاد
جاوس اكتشاف قانون التعاكس وهو في سن ١٨ سنة وأثبتته سنة ١٧٩٦م ونشر
البرهان سنة ١٨٠١م ، ثم قدم جاوس سبعة براهين أخرى لذلك القانون ، ويوجد
اليوم 200 برهان لهذا القانون .

ولإثبات قانون التعاكس وتناول بعض تطبيقاته نورد الآتي :

مبرهنة ٦-٣-١: "Gauss Lemma"

إذا كان p عدداً أولياً فردياً و $a \in \mathbb{Z}^+$ ، $(a, p) = 1$ وكانت $A = \{a, 2a, 3a, \dots, \frac{(p-1)a}{2}\}$ وكان n يمثل عدد عناصر A التي باقي قسمة كل منها على p أكبر من $\frac{p}{2}$ ، فإن $(a \setminus p) = (-1)^n$.

البرهان:

بما أن $(a, p) = 1$. إذاً $x \not\equiv 0 \pmod{p}$ لكل $x \in A$ ، كما أن $x, y \in A$ لكل $x \not\equiv y \pmod{p}$.

والآن لنفرض أن r_1, r_2, \dots, r_m هي بواقي قسمة عناصر A على p والتي تحقق العلاقة $0 < r_i < p/2$ ، وأن s_1, s_2, \dots, s_n هي بواقي قسمة عناصر A على p والتي تحقق العلاقة $\frac{p}{2} < s_i < p$ إذاً $m + n = \frac{p-1}{2}$ ، كما أن $r_1, \dots, r_m, p - s_1, p - s_2, \dots, p - s_n$ أعداد صحيحة موجبة كل منها أقل من $\frac{p}{2}$.

والآن لنفرض أن $p - s_i = r_j$ لبعض قيم i, j . إذاً يوجد $u, v \in \mathbb{Z}$ ، $1 \leq u, v \leq \frac{p-1}{2}$ ، بحيث أن $r_j = va \pmod{p}$ ، $s_i = ua \pmod{p}$ ، وعليه فإن $(u + v)a \equiv s_i + r_j = p \equiv 0 \pmod{p}$. لكن $(a, p) = 1$. إذاً $u + v \equiv 0 \pmod{p}$ وهذا غير ممكن لأن $1 < u + v \leq p - 1$. إذاً $p - s_i \neq r_j$ لكل i, j ، وبالتالي فإن

$$B = \{r_1, r_2, \dots, r_m, p - s_1, p - s_2, \dots, p - s_n\} = \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$$

وعليه فإن

$$\left(\prod_{i=1}^m r_i \right) \left(\prod_{j=1}^n (p - s_j) \right) = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} = \left(\frac{p-1}{2} \right) !$$

$$\text{إذاً } \prod_{i=1}^m r_i \cdot \prod_{j=1}^n (-s_j) \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p} \text{ ، وعليه فإن}$$

$$(-1)^n \left(\prod_{i=1}^m r_i \right) \left(\prod_{j=1}^n s_j \right) \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p}$$

لكن لكل $b \in B$ يوجد $c \in A$ بحيث أن $b \equiv c \pmod{p}$. إذاً

$$\text{فإن } (-1)^n \cdot a \cdot 2a \cdot 3a \cdots \left(\frac{p-1}{2}\right)a \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p} \text{ ، وعليه فإن}$$

$$\cdot \left(\left(\frac{p-1}{2}\right)! , p \right) = 1 \text{ لكن } (-1)^n \cdot a^{\frac{p-1}{2}} \cdot \left(\frac{p-1}{2}\right)! \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p}$$

$$\cdot a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod{p} \text{ ، وعليه فإن } (-1)^n \cdot a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\text{لكن } (a/p) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \text{ حسب مبرهنة (٦-٢-١٢) . إذاً } (a/p) = (-1)^n$$

□

مثال (١) : أحسب $(3/11)$ ، $(7/11)$.

الحل :

$$\text{بما أن } \frac{p-1}{2} = \frac{11-1}{2} = 5 \text{ . إذاً عندما } a = 3 \text{ ، نجد أن}$$

$$A = \{3, 6, 9, 12, 15\}$$

$$= \{3 \pmod{11}, 6 \pmod{11}, 9 \pmod{11}, 1 \pmod{11}, 4 \pmod{11}\}$$

وعنصرين من عناصر A أكبر من $\frac{11}{2}$. إذاً $n = 2$ ، وعليه فإن

$$\cdot (3/11) = (-1)^2 = 1$$

أما عندما $a = 7$ ، فإن

$$A = \{7, 14, 21, 28, 35\}$$

$$= \{7 \pmod{11}, 3 \pmod{11}, 10 \pmod{11}, 6 \pmod{11}, 2 \pmod{11}\}$$

وثلاثة من عناصر A أكبر من $\frac{11}{2}$. إذاً $n = 3$ ، وعليه فإن

$$\cdot (7/11) = (-1)^3 = -1$$

ومن تطبيقات مبرهنة (٦-٣-١) ما يلي :

مبرهنة ٦-٣-٢ :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فإن

$$(2/p) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv \bar{1}(\text{mod } 8) \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv \bar{3}(\text{mod } 8) \end{cases}$$

البرهان :

بما أن $a = 2$. إذاً $A = \{1, 4, 6, \dots, p-1\}$. ولحساب n ، لاحظ أن p عدد فردي . إذاً $p = 4m + 1$ ، $p = 4m + 3$ ، فإذا كان $p = 4m + 1$ ، فإن

$$\begin{aligned} & \{x \in A \mid x = tp + r, r > p/2\} \\ & = \left\{ x \in A \mid x = \left(\frac{p-1}{2}\right) + 2k, k = 1, \dots, \frac{p-1}{4} \right\} \end{aligned}$$

وعليه فإن $n = \frac{p-1}{4}$. لكن $(2/p) = (-1)^n$ حسب مبرهنة (٦-٣-١) . إذاً

$$(2/p) = (-1)^{\frac{p-1}{4}} = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv 1(\text{mod } 8) \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv -3(\text{mod } 8) \end{cases}$$

أما إذا كان $p = 4m + 3$

$$\begin{aligned} & \{x \in A \mid x = tp + r, r > p/2\} \\ & = \left\{ x \in A \mid x = \left(\frac{p-1}{2}\right) + 2k - 1, k = 1, 2, \dots, \frac{p+1}{4} \right\} \end{aligned}$$

وعليه فإن $n = \frac{p+1}{4}$ ، وبالتالي فإن

$$(2/p) = (-1)^{\frac{p+1}{4}} = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv -1(\text{mod } 8) \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv 3(\text{mod } 8) \end{cases}$$

إذاً

$$(2/p) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv \bar{1}(\text{mod } 8) \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv \bar{3}(\text{mod } 8) \end{cases}$$

نتيجة (١) :

إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فإن $(2/p) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$

البرهان :

بما أن

إذا كان $p \equiv \mp 1 \pmod{8}$ $(2/p) = 1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٢) .
 إذا كان $p \equiv \mp 3 \pmod{8}$ $(2/p) = -1$
 إذاً ، إذا كان $p = 8m \mp 1$ ، فإن

$$\frac{p^2 - 1}{8} = \frac{(8m \mp 1)^2 - 1}{8} = 8m^2 \mp 2m$$

وعليه فإن $\frac{p^2 - 1}{8}$ عدد زوجي ، وبالتالي فإن $(-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = 1$.

أما إذا كان $p = 8m \mp 3$ ، فإن

$\frac{p^2 - 1}{8} = 8m^2 \mp 6m + 1$ عدد فردي ، وعليه فإن $(-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = -1$. إذاً

$$(2/p) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

□

نتيجة (٢) :

إذا كان $p = (2q + 1) \equiv -1 \pmod{8}$ عدداً أولياً ، فإن p/M_q .

البرهان :

بما أن $p \equiv -1 \pmod{8}$. إذاً $(2/p) = 1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٢) . لكن

$(2/p) \equiv 2^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ حسب نتيجة مبرهنة (٦-٢-١) . إذاً

$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. لكن $2^{\frac{p-1}{2}} = 2^q$ ، إذاً $2^q \equiv 1 \pmod{p}$ ، وعليه فإن

$p \mid (2^q - 1)$. لكن $M_q = 2^2 - 1$. إذاً p/M_q .

□

مثال (٢) :

- (أ) $167 \in M_{83}$ ، لأن $167 = 2(83) + 1 \equiv -1 \pmod{8}$ ، عدد أولي .
 (ب) $359 \in M_{179}$ ، لأن $359 = (2 \cdot 179 + 1) \equiv -1 \pmod{8}$ ، عدد أولي .
 (ج) $151 \in M_{75}$ ، لأن $151 = (75) + 1 \equiv -1 \pmod{8}$ ، عدد أولي .

مبرهنة ٣-٣-٦ :

إذا كان كل من $p, 2p+1$ عدداً أولياً فردياً ، فإن $2(-1)^{\frac{p-1}{2}}$ جذر بدائي إلى $2p+1$.

البرهان :

نفرض أن $q = 2p + 1$. بما أن p عدد فردي . إذاً $p \equiv 1 \pmod{4}$ أو $p \equiv 3 \pmod{4}$.

(أ) إذا كان $p \equiv 1 \pmod{4}$ ، فإن $2(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 2$ لكن $\phi(q) = 2p$. إذاً $\text{ord}_q(2) = 1, 2, p, 2p$. فإذا كان $\text{ord}_q(2) = 1$ ، فإن ذلك يعني أن $2 \equiv 1 \pmod{q}$ ، وبالتالي فإن $q \mid 1$ وهذا غير ممكن . إذاً $\text{ord}_q(2) \neq 1$. وإذا كان $\text{ord}_q(2) = 2$ ، فإن $2^2 \equiv 1 \pmod{q}$ ، وعليه فإن $q \mid 3$ وهذا غير ممكن لأن $q = 2p + 1$. إذاً $\text{ord}_q(2) \neq 2$.
 وحيث أن $(2/q) = 2^{\frac{q-1}{2}} = 2^p \pmod{q}$ حسب مبرهنة (٢-٢-٦) و $q = 2p + 1 \equiv 3 \pmod{8}$. إذاً $(2/p) = -1$ مبرهنة (٢-٣-٦) ، وعليه فإن $2^p \equiv -1 \pmod{q}$ ، وبالتالي فإن $\text{ord}_q(2) \neq p$. إذاً $\text{ord}_q(2) = 2p$ ، وعليه فإن 2 جذر بدائي إلى q .

(ب) إذا كان $p \equiv 3 \pmod{4}$ ، فإن $2(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -2$.
 إذاً $(-2)^p \equiv (-2/q) = (-1/q)(2/q)$ لكن $q = 2p + 1$.

$q \equiv 3 \pmod{4}$ ، وعليه فإن $(-1/q) = -1$ حسب نتيجة مبرهنة $(2-2-6)$ و $(2/q) = 1$ حسب مبرهنة $(2-3-6)$ ، وبالتالي فإن $(-2)^p \equiv -1 \pmod{q}$ ، وعليه فإن $\text{ord}_q(-2) \neq p$.
 وإذا كان $\text{ord}_q(2) = 1, 2$ ، فإن ذلك يعني أن $q \nmid 3$ وهذا غير ممكن .
 إذاً $\text{ord}_q(-2) \neq 1, 2$ ، وعليه فإن $\text{ord}_q(-2) = 2p = \phi(q)$ ، وبالتالي فإن -2 جذر بدائي إلى q .

□

مثال (3) :

(أ) 2 جذر بدائي إلى 179 ، لأن $179 = 2(89) + 1$ وكل من $89, 179$ عدد أولي فردي ، كما أن $2(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 2(-1)^{44} = 2$.

(ب) -2 جذر بدائي إلى 167 ، لأن $167 = 2(83) + 1$ وكل $83, 167$ عدد أولي فردي و $2(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 2(-1)^{\frac{83-1}{2}} = 2(-1)^{41} = -2$.

وقبل إثبات المبرهنة الآتية ، لاحظ أن $[x]$ يمثل أكبر عدد صحيح أصغر من أو يساوي x .

مبرهنة 6-3-4 :

إذا كان p عدد فردياً أولياً ، وكان a عدداً فردياً ، $(a, p) = 1$ ، فإن

$$(a/p) = (-1)^{\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} [ka/p]}$$

البرهان :

لتكن $A = \{a, 2a, \dots, (\frac{p-1}{2})a\}$. إذاً أي عنصر من عناصر A على الشكل ka . وبقسمة ka على p نجد أن $ka = q_k \cdot p + t_k$ ، حيث $1 \leq t_k \leq p-1$ ، وعليه فإن $ka/p = q_k + (t_k/p)$ ، ومنها نجد أن $[ka/p] = q_k$

وعليه إذا كان $1 \leq k \leq \frac{p-1}{2}$ ، فإن

$$ka = [ka/p] + t_k \quad \dots(1)$$

والآن لتكن $B = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ مجموعة بواقي قسمة عناصر A على p التي تحقق العلاقة $0 < r_i < p/2$ ، ولتكن $C = \{s_1, \dots, s_n\}$ مجموعة بواقي قسمة عناصر A على p التي تحقق العلاقة $\frac{p}{2} < s_i < p$. إذاً $t_k < p/2$ يعني أن $t_k \in B$. أما إذا كان $t_k > p/2$ ، فإن $t_k \in C$ ، وعليه من (1) نجد أن

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} ka = \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} [ka/p] + \sum_{k=1}^m r_k + \sum_{k=1}^n s_k \quad \dots (2)$$

لكن $D = \{r_1, \dots, r_m, p-s_1, p-s_2, \dots, p-s_m\} = \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ إذاً

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k = \sum_{k=1}^m r_k + \sum_{k=1}^n (p-s_k) = p \cdot n + \sum_{k=1}^m r_k - \sum_{k=1}^n s_k \quad \dots(3)$$

وبطرح (3) من (2) نجد أن

$$(a-1) \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k = p \left(\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} [ka/p] - n \right) + 2 \sum_{k=1}^n s_k$$

لكن $p \equiv a \equiv 1 \pmod{2}$. إذاً $a-1 \equiv 0 \pmod{2}$ ، وعليه فإن

$$(a-1) \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k \equiv 0 \pmod{2}$$

وبالتالي فإن $\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} ([ka/p] - n) \equiv 0 \pmod{2}$ ، ومنها نجد أن

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} [ka/p] \equiv n$$

لكن $(a/p) = (-1)^n$ حسب مبرهنة (٦-٣-١) . إذاً

$$(a/p) = (-1)^{\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} [ka/p]}$$

□

والآن إلى قانون التعاكس والمبرهنة الآتية .

مبرهنة ٥-٣-٦ : "قانون التعاكس لجاوس"

إذا كان p, q عددين أوليين فرديين مختلفين ، فإن

$$(p/q)(q/p) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

البرهان :

لتكن

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 1 \leq x \leq \frac{p-1}{2}, 1 \leq y \leq \frac{q-1}{2}\}$$

إذا لا يوجد $(x, y) \in S$ بحيث $qx = py$ ، وعليه يمكن تجزئة S إلى مجموعتين

S_1, S_2 ، حيث

$$S_1 = \{(x, y) \in S \mid qx > py\} , S_2 = \{(x, y) \in S \mid qx < py\}$$

إذاً

$$(x, y) \in S_1 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq \frac{p-1}{2}, 1 \leq y \leq [qx/p]$$

وعليه فإن

$$|S_1| = \sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} [qx/p]$$

$$|S_2| = \sum_{y=1}^{\frac{q-1}{2}} [py/q] \quad \text{وبالمثل نجد أن}$$

$$\sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} [qx/p] + \sum_{x=1}^{\frac{q-1}{2}} [py/q] = |S_1| + |S_2| = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$$

لكن

$$(q/p) = (-1)^{\sum_{y=1}^{\frac{q-1}{2}} [py/q]} , (p/q) = (-1)^{\sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} [qx/p]}$$

$$(p/q)(q/p) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \quad \text{حسب مبرهنة (٤-٣-٦) . إذاً}$$

نتيجة (١) :

إذا كان p, q عددين أوليين فرديين مختلفين ، فإن

$$(p/q) (q/p) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ أو } q \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

البرهان :

بما أن p, q عددان فرديان . إذاً $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ عدد زوجي إذاً وإذا فقط كان واحد على الأقل من العددين p, q على الشكل $4k + 1$ ، وعليه فإن

$$(p/q) (q/p) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} = 1$$

أما إذا كان $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ ، فإن $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ عدد فردي ، وعليه فإن

$$(p/q) (q/p) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} = -1$$

□

نتيجة (٢) :

إذا كان p, q عددين أوليين فرديين مختلفين ، فإن

$$(p/q) = \begin{cases} (q/p) & \text{إذا كان } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ أو } q \equiv 1 \pmod{4} \\ -(q/p) & \text{إذا كان } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

البرهان :

إذا كان $p \equiv 1 \pmod{4}$ أو $q \equiv 1 \pmod{4}$ ، فإن $(p/q) (q/p) = 1$ حسب نتيجة (١) . وعليه فإن $(p/q) (q/p)^2 = (q/p)$ لكن $(q/p^2) = 1$ إذاً $(p/q) = (q/p)$.

أما إذا كان $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ ، فإن $(p/q) (q/p) = -1$ حسب نتيجة (١) ، وعليه فإن $(p/q) (q/p)^2 = -(q/p)$ ، وبالتالي فإن $(p/q) = -(q/p)$ إذاً .

$$(p/q) = \begin{cases} (q/p) & \text{إذا كان } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ أو } q \equiv 1 \pmod{4} \\ -(q/p) & \text{إذا كان } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

مبرهنة ٦-٣-٦ :

إذا كان $p \neq 3$ عدداً أولياً فردياً ، فإن

$$(3/p) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv \mp 1 \pmod{12} \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv \mp 5 \pmod{12} \end{cases}$$

البرهان :

بما أن $3 \equiv 3 \pmod{4}$. إذاً بتطبيق نتيجة (٢) من مبرهنة (٦-٣-٦) نجد أن

$$(3/p) = \begin{cases} (p/3) & \text{إذا كان } p \equiv 1 \pmod{4} \\ -(p/3) & \text{إذا كان } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases} \dots (1)$$

وبتطبيق قانون التعاكس نجد أن

$$\begin{aligned} (-3/p) &= (-1/p)(3/p) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} (p/3) (-1)^{\frac{(3-1)p-1}{4}} \\ &= (-1)^{p-1} \cdot (p/3) = (p/3) \end{aligned}$$

وعليه فإن

$$(p/3) = (-3/p) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv 1 \pmod{3} \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv 2 \pmod{3} \end{cases} \dots (2)$$

ومن (1) ، (2) نجد أن

$$\begin{aligned} (3/p) = 1 &\Leftrightarrow (p \equiv 1 \pmod{4} \wedge p \equiv 1 \pmod{3}) \\ &\vee (p \equiv 3 \pmod{4} \wedge p \equiv 2 \pmod{3}) \\ &\Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{12} \vee (p \equiv 3 \equiv -1 \pmod{4} \wedge p \equiv 2 \equiv -1 \pmod{3}) \\ &\Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{12} \vee p \equiv -1 \pmod{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3/p) = -1 &\Leftrightarrow (p \equiv 1 \pmod{4} \wedge p \equiv 2 \pmod{3}) \\ &\vee (p \equiv 1 \pmod{3} \wedge p \equiv 3 \pmod{4}) \\ &\Leftrightarrow (p \equiv 5 \pmod{4} \wedge p \equiv 5 \pmod{3}) \\ &\vee (p \equiv -5 \pmod{3} \wedge p \equiv -5 \pmod{4}) \\ &\Leftrightarrow p \equiv 5 \pmod{12} \vee p \equiv -5 \pmod{12} \end{aligned}$$

$$(p/3) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv \mp 1 \pmod{12} \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv \mp 5 \pmod{12} \end{cases} \quad \text{وعليه فإن}$$

□

والآن إلى بعض التطبيقات والأمثلة الآتية .

مثال (٤) : أحسب

$$(69/389) \quad (\text{ب}) \quad , \quad (41/89) \quad (\text{أ})$$

الحل :

(أ) $41 \equiv 1 \pmod{4}$, $89 \equiv 1 \pmod{4}$ وكل من $41, 89$ عدد أولي فردي
 إذًا $(41/89) = (89/41)$ حسب نتيجة (٢) مبرهنة (٦-٣-٥) لكن
 $89 \equiv 7 \pmod{41}$. إذًا $(89/41) = (7/41)$ حسب مبرهنة (٦-٢-٢) .
 لكن $(7/41) = (41/7)$ حسب نتيجة (٢) مبرهنة (٦-٣-٥) . كما أن
 $41 \equiv 6 \pmod{7}$. إذًا $(41/7) = (6/7)$ ، وعليه فإن
 $(7/41) = (6/7) = (2/7)(3/7)$. لكن $(3/7) = -1$ حسب مبرهنة
 (٦-٣-٦) ، $(2/7) = 1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٦) . إذًا
 $(41/89) = 1(-1) = -1$.

(ب) $(69/389) = (3.23/389) = (3/389)(23/389)$. لكن
 $389 \equiv 5 \pmod{12}$. إذًا $(3/389) = -1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٦)
 وحيث أن $389 \equiv 1 \pmod{4}$. إذًا $(23/389) = (389/23)$ حسب
 نتيجة (٢) مبرهنة (٦-٣-٥) . لكن $389 \equiv -2 \pmod{23}$. إذًا
 $(389/23) = (-2/23)$ حسب مبرهنة (٦-٢-٢) . لكن
 $(-2/23) = (-1/23)(2/23)$ و $(-1/23) = (-1)^{\frac{23-1}{2}} = -1$ حسب
 مبرهنة (٦-٢-٢هـ) ، $(2/23) = 1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٦) . إذًا
 $(69/389) = (-1)(-1) = 1$ ، وعليه فإن $(69/389) = 1$.

مثال (٥) :

أثبت أن 3 جذر بدائي إلى 17 .

الإثبات :

بما أن $17 \equiv 5 \pmod{12}$. إذاً $(3/17) = -1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٦) .
 لكن $(3/17) \equiv 3^{\frac{17-1}{2}} = 3^8 \pmod{17}$ حسب نتيجة مبرهنة (٦-٢-١) . إذاً
 $3^8 \equiv -1 \pmod{17}$ ، وبالتالي فإن $3^{16} \equiv 1 \pmod{17}$. لكن $\phi(17) = 16$ إذاً
 $\text{ord}_{17}(3) = \phi(17) = 16$ ، وعليه فإن 3 جذر بدائي إلى 17 .

مثال (٦) :

أثبت أن للتطابق $x^2 \equiv 5 \pmod{227}$ حل .

الإثبات :

بما أن للتطابق $x^2 \equiv a \pmod{p}$ حل إذاً وإذا فقط كان $(a/p) = 1$.
 وبمما أن $(5/227) = (227/5) = (2/5) = 1$. إذاً للتطابق
 $x^2 \equiv 5 \pmod{227}$ حل .

مثال (٧) :

هل للتطابق $x^2 \equiv 17 \pmod{299}$ حل ؟

الحل :

بما أن $299 = 13 \cdot 23$. إذاً للتطابق $x^2 \equiv 17 \pmod{299}$ حل إذاً وإذا فقط
 كان للتطابقين $x^2 \equiv 17 \pmod{23}$ و $x^2 \equiv 17 \pmod{13}$ حل . لكن
 $(17/23) = (23/17) = (6/17) = (2/17)(3/17) = 1(-1) = -1$. إذاً ليس
 للتطابق $x^2 \equiv 17 \pmod{23}$ حل . وعليه لا يوجد للتطابق
 $x^2 \equiv 17 \pmod{299}$ حل .

وأخيراً إلى تعريف رمز جاكوبي نسبة للرياضي الألماني (١٨٠٤-١٨٥١) ،
 ودراسة خواصه .

تعريف ٦-٣-١:

إذا كان $a, n \in \mathbb{Z}$ وكان n عدداً فردياً موجباً ، $n = \prod_{i=1}^r p_i$ ، حيث p_i

أعداد فردية أولية ، فيعرف رمز جاكوبي (Jacobi Symbol) كالآتي :

$$(a/n) = \prod_{i=1}^r (a/p_i) \text{ ، حيث أن } (a/p_i) \text{ رمز لجندر .}$$

لاحظ أن : (أ) $(a/n) = 0 \Leftrightarrow (a,n) > 1$.

(ب) $(a/1) = 1$ لكل $a \in \mathbb{Z}$.

مثال (٨) :

(أ) $(3/35) = (3/5)(3/7)$. لكن $5 \equiv 5 \pmod{12}$ و $7 \equiv -5 \pmod{12}$ إذاً $(3/5) = -1$ ، $(3/7) = -1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٦) ، وعليه فإن $(3/35) = (-1)(-1) = 1$.

$$(6/385) = (6/5 \cdot 7 \cdot 11) = (6/5)(6/7)(6/11) \quad (\text{ب})$$

$$= (2/5)(3/5)(2/7)(3/7)(2/11)(3/11)$$

حسب مبرهنة (٦-٣-٦) لكن $5 \equiv -3 \pmod{8}$ ،

$7 \equiv -1 \pmod{8}$ ، $11 \equiv 3 \pmod{8}$. إذاً $(2/5) = -1$ ،

$(2/7) = 1$ ، $(2/11) = -1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٦) . وحيث أن

$5 \equiv 5 \pmod{12}$ ، $7 \equiv -5 \pmod{12}$ ، $11 \equiv -1 \pmod{12}$. إذاً

$(3/5) = -1$ ، $(3/7) = -1$ ، $(3/11) = 1$ حسب مبرهنة (٦-٣-٦) ،

وعليه فإن

$$(6/385) = (-1)(-1)(1)(-1)(-1)(1) = 1$$

مبرهنة ٦-٣-٧ :

إذا كان m, n عددين موجبين فرديين ، وكان $a, b \in \mathbb{Z}$ ، فإن

$$(ab/n) = (a/n)(b/n) \quad (\text{أ}) \quad ، \quad (a, mn) = (a/m)(a/n) \quad (\text{ب})$$

(ج) إذا كان $a \equiv b \pmod{n}$ ، فإن $(a/n) = (b/n)$.
 (د) $(-1/n) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}$ ، (هـ) $(m/n)(n/m) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \frac{n-1}{2}}$
 (و) $(2/n) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}$.

البرهان :

سنبرهن (د) ، (هـ) ، (و) ونترك الباقي للقارئ .

(د) نفرض أن $n = \prod_{i=1}^r p_i$ ، إذاً

$$(-1/n) = \prod_{i=1}^r (-1/p_i) = (-1)^{\sum_{i=1}^r \left(\frac{p_i-1}{2}\right)}$$

لكننا يمكن أن نبرهن بالاستقراء على r ، أن

$$(-1/n) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \text{ إذا } \sum_{i=1}^r \left(\frac{p_i-1}{2}\right) \equiv \frac{n-1}{2} \pmod{2}$$

(هـ) نفرض أن $n = \prod_{j=1}^s q_j$ ، $m = \prod_{i=1}^r p_i$ إذاً

$$(m/n)(n/m) = \prod_{i=1}^r \prod_{j=1}^s (p_i/q_j) (q_j/p_i)$$

$$= \prod_{i=1}^r \prod_{j=1}^s (-1)^{\frac{(p_i-1)(q_j-1)}{4}} = (-1)^{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \left(\frac{p_i-1}{2}\right) \left(\frac{q_j-1}{2}\right)}$$

(حسب مبرهنة (٦-٣-٥) . لكن

$$\sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^r \frac{p_i-1}{2} \cdot \frac{q_j-1}{2} = \sum_{i=1}^r \frac{p_i-1}{2} \cdot \sum_{j=1}^s \frac{q_j-1}{2}$$

$$\text{إذا } \sum_{j=1}^s \frac{q_j-1}{2} \equiv \frac{m-1}{2} \pmod{2} \text{ ، } \sum_{i=1}^r \frac{p_i-1}{2} \equiv \frac{n-1}{2} \pmod{2}$$

$$(m/n)(n/m) = (-1)^{\frac{n-1}{2} \frac{m-1}{2}}$$

(و) إذا كان a, b عددين فرديين ، فإن

$$\frac{(ab)^2 - 1}{8} - \left(\frac{a^2 - 1}{8} + \frac{b^2 - 1}{8} \right) = \frac{(a^2 - 1)(b^2 - 1)}{8} \equiv 0 \pmod{8}$$

وعليه فإن $\frac{(ab)^2 - 1}{8} \equiv \left(\frac{a^2 - 1}{8} + \frac{b^2 - 1}{8} \right) \pmod{2}$ ، إذاً

$$\text{وعليه فإن } \sum_{i=1}^r \frac{p_i^2 - 1}{8} \equiv \frac{n^2 - 1}{8} \pmod{2}$$

$$(2/n) = \prod_{i=1}^r (2/p_i) = (-1)^{\sum_{i=1}^r \frac{p_i^2 - 1}{8}} = (-1)^{\frac{n^2 - 1}{8}}$$

□

تمارين

(١) أحسب كلاً مما يأتي :

• $(15/107)$ ، $(-56/103)$ ، $(30/71)$ ، $(-42/89)$

• $(51/7)$ ، $(22/11)$ ، $(3/97)$ ، $(21/221)$ ، $(-219/383)$

(٢) أحسب (p/q) عندما $p = 7, 11, 13$ ، $q = 227, 229, 1009$

(٣) بتطبيق مبرهنة $(٦-٣-١)$ أحسب كلاً مما يأتي

• $(8/17)$ ، $(5/19)$ ، $(6/31)$ ، $(23/41)$

(٤) (أ) أثبت أن $227 \setminus M_{113}$ ، $179 \setminus M_{89}$ ، $143 \setminus M_{71}$

(ب) أثبت أن $M_n = 2^n - 1$ عدد مؤلف عندما

• $n = 11, 23, 131, 239, 251$

(٥) أثبت بتطبيق مبرهنة $(٦-٣-٣)$ أن :

(أ) 2 جذر بدائي لكل من 107, 227, 467

(ب) 2 - جذر بدائي لكل من 47, 143, 263

(٦) لأي من علاقات التطابق الآتية حل ؟

(أ) $x^2 \equiv 5 \pmod{313}$ ، (ب) $x^2 \equiv 7 \pmod{1009}$

(ج) $x^2 \equiv 121 \pmod{413}$ ، (د) $x^2 \equiv 42 \pmod{97}$

(هـ) $x^2 \equiv -43 \pmod{79}$ ، (و) $3x^2 + 6x + 5 \equiv 0 \pmod{89}$

(٧) إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فأثبت أن

$$(-2/p) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } p \equiv 1 \pmod{8} \text{ أو } p \equiv 3 \pmod{8} \\ -1 & \text{إذا كان } p \equiv 5 \pmod{8} \text{ أو } p \equiv -1 \pmod{8} \end{cases}$$

(٨) أوجد جميع الأعداد الأولية التي تحقق :

(أ) $(5/p) = 1$ ، (ب) $(10/p) = 1$

(٩) إذا كان $p = 2^{4^n} + 1$ عدداً أولياً ، فأثبت أن 7 جذر بدائي إلى p .

"لاحظ أن $p \equiv 5 \pmod{7}$ أو $p \equiv 3 \pmod{7}$ وبالتالي فإن

" $(7/p) = (p/p) = -1$. "

(١٠) (أ) إذا كان p عدداً أولياً فردياً أكبر من 3 ، فأثبت أن :

$$(-3/p) = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{6} \\ -1 & p \equiv 5 \pmod{6} \end{cases}$$

(ب) أستخدم (أ) لإثبات وجود عدد غير منتهي من الأعداد الأولية التي على

الصورة $6m + 1$.

"ملاحظة: أفرض وجود عد منتهي p_1, \dots, p_r ثم ضع $n = (2p_1 \dots p_r)^2 + 3$ "

(١١) (أ) برهن على وجود عدد غير منتهي من الأعداد الأولية التي على الشكل

$8m - 1$.

"ملاحظة: أفرض وجود عدد منتهي p_1, \dots, p_r وضع $n = \prod_{i=1}^r p_i^2 - 2$ "

(ب) برهن على وجود عدد غير منتهي من الأعداد الأولية التي على الشكل
 $8m + 3$.

"ملاحظة: افرض وجود عدد منتهي منها p_1, \dots, p_r وضع $n = \prod_{i=1}^r p_i^2 + 2$

(١٢) إذا كان $F_n = 2^{2^n} + 1$ عدداً أولياً ، فأثبت أن 3 جذر بدائي إلى F_n .
 "ملاحظة: طبق مبرهنة (٦-٣-٦) "

(١٣) أحسب (a/n) عندما $a = -1, -2, 2, 3, 15, 42$ ،

$$n = 7, 11, 13, 91, 215$$

(١٤) (أ) إذا كان aRn ، فأثبت أن $(a/n) = 1$.

(ب) بين بمثال على أنه إذا كان $(a/n) = 1$ ، فإن aN_n .

بعض المعادلات الديوفنتية

Some Diophantine Equations

المعادلات الديوفنتية أو السیالة هي معادلات یقل عددها عن عدد المجاهیل الواردة فیها ، وبالتالي قد یكون لها عدد كبير من الحلول الممكنة (وهي حلول عديدة صحيحة) .

هذا ولم یكن دیوفنتس الأسكندري "بین القرن الثالث والرابع للمیلاد" أول من تعامل مع أمثال تلك المسائل (بل كان أول من بحثها بالتفصیل فی كتابه المسائل العددية (Arithmetica) لأن الفیثاغوریون حلوا المسألة $2x^2 - y^2 = 1$ قبل دیوفنتس بأكثر من قرنین ، وحل هیرون الأسكندري الذي عاش بین ۱۵۰ ق.م و ۲۵۰ للمیلاد ، الكثير من المسائل السیالة مثل : إيجاد مستطیلین محیط الأول یساوي ثلاثة أمثال محیط الثاني ومساحة الأول تساوي مساحة الثاني .

$$xy = zw \quad , \quad x + y = 3(z + w) \quad \text{أی}$$

وتعامل الهنود والصینیون مع أمثال تلك المعادلات ، ویعتقد بأن الهندي أریابهاتا (۴۷۶ ق.م) هو أول من وضع حلاً عاماً للمعادلات الديوفنتية بمجهولين .

وتعامل العرب والمسلمون مع المعادلات الديوفنتية ، فقد تطرق الخوارزمي (۷۸۰-۸۵۰م) فی الجزء الأخير من كتابه "الجبر والمقابلة" وهو الجزء المخصص لمسائل التركة والقسمة إلى بعض المسائل غیر المحدودة إلا أن لاشيء يدل على أهتمامه بالمعادلات الديوفنتية ، أما أبو كامل شجاع بن أسلم المصري (۸۵۰م - ۹۳۰م) فقد یبّن فی كتابه "الطریف فی الحساب" أن بعض المسائل تبقي وحيدة الحل وبعضها له عدة حلول بإعداد صحيحة وهي المسائل السیالة أو الديوفنتية ، وبعضها له عدة حلول بإعداد لیست صحيحة ، وقد أورد العديد من الأمثلة وحلها بطريقة تختلف عن الأسلوب الهندي .

أما في كتابه " كتاب في الجبر والمقابلة " الذي كتبه عام ٨٨٠م ، فقد عالج ثمانية وثلاثون مسألة ديوفانتية من الدرجة الثانية ، وأربعة أنظمة معالات خطية غير محددة ، ومجموعة من مسائل تعود إلى متواليات حسابية.

وتناول الكرخي (ت ١٠٢٠م) في كتابه "البديع في الحساب" نظام خطي يحتوي على خمسة مجاهيل وهو

$$x + \frac{1}{3}(y + z + u) = s \quad , \quad y + \frac{1}{4}(x + z + u) = s$$

$$z + \frac{1}{5}(x + y + u) = s \quad , \quad u + \frac{1}{6}(x + y + z) = s$$

ومعادلات من النوع

$$ax^{2n} \mp bx^{2n-1} = y^2 \quad , \quad ax^{2n} \mp bx^{2n-2} = y^2$$

$$ax^2 \mp bx + c = y^2 \quad , \quad ax^2 + c = y^2 \quad , \quad ax^2 - c = y^2$$

ثم درس أنظمة المعادلات من الشكل $x^2 - b = z^2$ ، $x^2 + a = y^2$

و درس السموال المغربي (ت ٥٧٠ هـ) في كتابه "الباهر في الجبر" معادلات من

$$y^3 = ax^2 + bx \quad , \quad y^3 = ax + b$$

هذا وتعامل المسلمون مع المعادلة $x^2 + y^2 = z^2$ وثلاثيات فيثاغورس أو

المتثالثات العددية القائمة الزاوية ، فقد أشار السموال المغربي في كتابه "الباهر في

الجبر" إلى أبحاث أبو سعيد السجزي (٩٥٠-١٠٢٤م) وابن الهيثم (٩٦٠-١٠٣٩م)

في هذا المجال ، إضافة إلى حل السجزي للمعادلة $x^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$.

ويوجد بحثان آخران يعالجان المتثالثات العددية القائمة الزاوية الأول لأبي جعفر

الخازن (من علماء القرن الرابع الهجري) والآخر لأبي الجود بن الليث

(ت ١٠٠٩م) . فقد أثبت الخازن أنه .

إذا كانت $(x, y) = 1$ ، $x, y, z \in Z$ ، وكان x عدداً زوجياً ، فإن الشروط الآتية

متكافئة .

$$(1) \quad x^2 + y^2 = z^2 .$$

(٢) توجد أعداد صحيحة موجبة m, n ، $(m, n) = 1$ وأحدهما فردي والآخر

$$\text{زوجي بحيث أن } x = 2mn , y = m^2 - n^2 , z = m^2 + n^2 .$$

ثم يثبت قضايا أخرى ، ويحل المعادلة $x^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$. ويدرس المعادلتين

$$x^4 + y^2 = z^2 , \quad x^2 + y^2 = z^4$$

أما أبو الجود بن الليث فقد تطرق في رسالته عن المثلاث العديّة القائمة الزاوية، إلى مسألة تكون تلك المثلاث والشروط اللازمة لتكون المثلاث البدائية "الثلاثيات البدائية" وينشئ جداول لتسجيل أضلاع المثلاث الناتجة ومساحاتها ، ونسبة هذه المساحات إلى المحيطات ، وذلك انطلاقاً من ثنائيات أعداد صحيحة

$$k = 1, 2, 3, \dots , (p, p + k)$$

أما محمد باقر اليزدي (ت ١٦٣٧م) فقد كتب بحثاً صغيراً لحل المعادلة الديوفنتية

$$x^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

أما مسألة تحليل عدد طبيعي إلى مجموع مربعات أعداد طبيعية فقد طرحت من قبل ديوفنش ، وبحثت في القرن العاشر للميلاد من قبل الخازن ، ونعلم اليوم إن هذه المسألة قادت باشيه (١٥٨١-١٦٣٨م) . ثم فيرما (١٦٠١-١٦٦٥م) إلى دراسة تمثيل عدد طبيعي (الأعداد الأولية تحديداً) على شكل مجموع مربعات .

أما المعادلتين $x^3 + y^3 = z^3$ ، $x^4 + y^4 = z^4$ ، فقد بحثت من قبل كل من الكرخي والخجندي (ت ١٠٠٠م) والخازن وابن سينا (٩٨٠-١٠٣٨) والخيام (١٠٤٨-١١٣١) والبيروني (٩٧٣-١٠٥٠م) ، وابن الخوام البغدادي (١٢٤٥-١٣٢٤م) وكمال الدين الفارسي (ت ١٣٢٠م) مؤكدين عدم وجود أعداد صحيحة تحقق أياً منهما . أما المعادلة $x^n + y^n = z^n$ ، $n \geq 3$ فقد درست من قبل فيرما مؤكداً عدم وجود أعداد صحيحة تحقق تلك المعادلة بشرط أن $xyz \neq 0$ ، وقد أثبت الإنجليزي أندرو وايلس صحة ذلك سنة ١٩٩٤م ومنح عليه ميدالية فيلد في الرياضيات .

هذا وتوجد معادلات ديوفنتية مهمة أخرى مثل المعادلة $x^2 - dy^2 = 1$ ، حيث d ليست مربعاً كاملاً والتي تنسب إلى الإنجليزي جون بل (١٦١١-١٦٨٥م) بدلاً من فيرمأ الذي وضعها سنة ١٦٥٧م مخمناً وجود حل واحد على الأقل لتلك المعادلة يختلف عن $x = \mp 1$ ، $y = 0$ ، فمثلاً أقل قيم إلى x, y تحقق المعادلة $x^2 - 5y^2 = 1$ هي $x = \pm 9$ ، $y = \mp 4$ ، أما أقل قيم إلى x, y تحقق المعادلة $x^2 - 43y^2 = 1$ فهي $x = \mp 3482$ ، $y = \mp 531$.

وقد أُثبت تخمين فيرما من قبل الفرنسي لاجرانج (١٧٣٩-١٨١٣م) سنة ١٧٦٨م ونشر الألماني ديركلي (١٨٠٥-١٨٥٩م) سنة ١٨٣٧ طريقة لحساب أقل الأعداد التي تحقق المعادلة $x^2 - dy^2 = 1$ استخدم فيها الدوال المثلثية، وأعطى الألماني كرونكر (١٨٢٣-١٨٩١) سنة ١٨٦٣ طريقة أخرى لحساب أقل الأعداد التي تحقق تلك المعادلة باستخدام الدوال الناقصية (Elliptic function).

أما المعادلة الديوفنتية $x^p - y^q = 1$ التي وضعها كاتلان سنة ١٨٤٤م وخمّن بأنه إذا كان $p, q, x, y \in \mathbb{Z}$ ، فإن الحل الوحيد لهذه المعادلة هو $p = y = 2, q = x = 3$. وقد أثبت ميهيلسكو (Mihailescu) سنة ٢٠٠٣م صحة ذلك التخمين.

أما المعادلة الديوفنتية $n! + 1 = x^2$ ، فيعود تاريخها إلى سنة ١٨٨٥م عندما خمّن بروجارد (Brochard) بأن الحلول الوحيدة لها في \mathbb{Z} هي $4! + 1 = 5^2, 5! + 1 = 11^2, 7! + 1 = (7!)^2$ ، وفي سنة ١٨٩٥م كتب الهندي رامنجين (١٨٨٧-١٩٢٠) نفس التخمين، وقد أثبت كرايچك (Kraitichik) صحة ذلك التخمين لكل $n \leq 5000$.

أما المعادلة الديوفنتية $y^2 = x^3 + k$ والتي تسمى معادلة موردل (Mordell Equation) المكتشفة سنة ١٩٢٢م من قبل الإنجليزي موردل (١٨٨٨-١٩٧٢) والتي تمثل منحياً ناقصاً (Elliptic curve) في المستوى

الأسقاطي الحقيقي (Real projective plane) ، فإن وجود أو عدم وجود أعداد صحيحة تحقق المعادلة يعتمد على قيمة k . فإذا كان $k=1$ ، فإن الحلول الوحيدة في Z للمعادلة $y^2 = x^3 + 1$ هي $(2, \mp 3)$ ، $(-1, 0)$ ، $(0, \mp 1)$. أما إذا كان $k=-5$ ، فليس للمعادلة $y^2 = x^5 - 5$ حل في Z ، وإذا كان $k=-28$ ، فإن الحلول الوحيدة في Z لتلك المعادلة هي $(37, \mp 225)$ ، $(8, \mp 22)$ ، $(4, \mp 6)$.

١-٧ : المعادلات الديوفانتية الخطية Linear Diophantine Equations

يعتبر هذا النوع من أبسط أنواع المعادلات الديوفانتية ، وسنركز اهتمامنا في

هذا الجزء على حل المعادلتين :

$$ax + by = c \quad , \quad ax + by + cz = e$$

ونبدأ بما يلي :

مبرهنة ١-٧-١ :

(أ) يوجد حل للمعادلة $ax + by = c$ ، إذاً وإذا فقط كان $d \mid c$ ، حيث $d = (a, b)$.

(ب) إذا كان x_1, y_1 حلاً للمعادلة $ax + by = c$ ، فإن أي حل آخر لهذه المعادلة يكون على الشكل :

$$. t \in Z \text{ حيث } x = x_1 + (b/d)t , y = y_1 - (a/d)t$$

البرهان:

(أ) نفرض أن x_1, y_1 حل للمعادلة $ax + by = c$. إذاً $ax_1 + by_1 = c$. لكن $d = (a, b)$. إذاً $d \mid a$ و $d \mid b$ ، وعليه فإن $d \mid (ax_1 + by_1)$ حسب مبرهنة (١-٧-٢) ، وبالتالي فإن $d \mid c$.

ولإثبات العكس نفرض أن $d \mid c$. إذاً يوجد $r \in Z$ ، بحيث أن $c = dr$.

لكن $d = (a, b)$. إذا يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث $d = am + bn$ حسب
مبرهنة (٢-١-٥) . إذا $c = rd = arn + brm$ ، وعليه فإن $x = rm$ ،
حل للمعادلة $ax + by = c$ $y = rn$.

(ب) بما أن x_1, y_1 حل للمعادلة $ax + by = c$. إذا $ax_1 + by_1 = c$.
والآن فنفرض أن u, w حل آخر للمعادلة $ax + by = c$. إذا
 $au + bw = 1$ ، وعليه فإن

$$ax_1 + by_1 = au + bw \Leftrightarrow a(u - x_1) = b(y_1 - w) \quad \dots (1)$$

لكن $d = (a, b)$. إذا يوجد $r, s \in \mathbb{Z}$ ، بحيث أن $(r, s) = 1$ و

$$a = dr , b = ds \quad \dots (2) \quad \text{مبرهنة (٢-١-٨)}$$

ومن (1) ، (2) ينتج أن

$$r(u - x_1) = s(y_1 - w) \quad \dots (3)$$

وعليه فإن $s \mid r(u - x_1)$ ، لكن $(r, s) = 1$. إذا $s \mid (u - x_1)$ حسب
مبرهنة (٢-٢-٣) ، وعليه فإن

$$u = x_1 + st = x_1 + (b/d)t \quad \text{، إذا } t \in \mathbb{Z} \text{ ، } u - x_1 = st \quad \dots (4)$$

ومن (3) ، (4) ينتج أن $y_1 - w = rt$ ، وعليه فإن
 $w = y_1 - rt = y_1 - (a/d)t$. لكن

$$ax + by = a[x_1 + (b/d)t] + b[y_1 - (a/d)t] = ax_1 + by_1 = c$$

وعليه فإن $y = y_1 - (a/d)t$ ، $x = x_1 + (b/d)t$ حل للمعادلة $ax + by = c$

□

نتيجة :

إذا كان $(a, b) = 1$ ، وكان x_1, y_1 حلاً للمعادلة $ax + by = c$ ، فإن أي حل
آخر لهذه المعادلة يكون على الصورة $x = x_1 + bt$ ، $y = y_1 - at$ ، $t \in \mathbb{Z}$.
يسمى x_1, y_1 الحل الخاص (Particular solution) للمعادلة $ax + by = c$.

مثال (١) :

حل المعادلة

$$24x + 68y = 36$$

... (5)

الحل :

بما أن $d = (24, 68) = 4$ و $4 \mid 36$. إذا يوجد حل للمعادلة (5) حسب مبرهنة (٧-١-١) ، ولإيجاد الحل . لاحظ أنه باستخدام القسمة الخوارزمية ، نجد أن $d = 4 = 3(24) + 68(-1)$ ، وعليه فإن

$$36 = 9d = 9 \cdot 3 \cdot 24 + 9 \cdot 68(-1) = 27 \cdot 24 + 68(-9)$$

وبالتالي فإن $x_1 = 27$ ، $y_1 = -9$ ، وعليه فإن $t \in \mathbb{Z}$ ، $y = -9 - \frac{24}{4} \cdot t = -9 - 6t$ ، $x = 27 + \frac{68}{4} \cdot t = 27 + 17t$ للمعادلة (5) .

مثال (٢) :

حل المعادلة

$$5x + 13y = 28$$

... (6)

الحل :

بما أن $d = (5, 13) = 1$. إذا يوجد حل للمعادلة (6) حسب مبرهنة (٧-١-١) ولإيجاد ذلك الحل ، لاحظ أن $1 = 5(-5) + 13(2)$ ، إذا $28 = 28(5)(-5) + 28(13)(2) = 5(-140) + 13(56)$ ، وعليه فإن $x_1 = -140$ ، $y_1 = 56$ حل خاص للمعادلة (6) . أما الحل العام هو $t \in \mathbb{Z}$ حيث $x = x_1 + bt = -140 + 13t$ ، $y = y_1 - at = 56 - 5t$

ملاحظة :

قد يكون من المفيد إيجاد الحلول الموجبة للمعادلة $ax + by = c$. ولإيجادها يجب أن يكون $x = x_1 + (b/d)t > 0$ ، $y = y_1 - (a/d)t > 0$.

مثال (٣) :

أوجد الحلول الموجبة للمعادلة

$$499x - 49y = 300 \quad \dots (7)$$

الحل :

بما أن $(499, -49) = 1$. إذاً يوجد حل للمعادلة (7) حسب مبرهنة (٧-١-١)

ولإيجاد ذلك الحل ، لاحظ أن

$$499x - 49y = 300 \Rightarrow 499x \equiv 300 \pmod{49} \wedge -49y \equiv 300 \pmod{499}$$

وبحل التطابق $499x \equiv 300 \pmod{49}$ ، نجد أن $9x \equiv 6 \pmod{49}$ ،

وعليه فإن $3x \equiv 2 \pmod{49}$ وبالتالي فإن $49z \equiv -2 \pmod{3}$ حسب

الملاحظة ص (٩٦) ، ومنها نجد أن $z \equiv -2 \equiv 1 \pmod{3}$ ، وعليه فإن

$$\text{إذاً . } x = \frac{nz + b}{a} \text{ لكن . } t \in \mathbb{Z} , z = 1 + 3t$$

$$y = \frac{499(17 + 49t) - 300}{49} = 167 + 499t , x = \frac{49(1 + 3t) + 2}{3} = 17 + 49t$$

ومن الواضح أن $x > 0$ ، $y > 0$ لكل $t \in \mathbb{Z}^+$ ، وعليه يوجد عدد غير

منتهي من الحلول الموجبة إلى المعادلة (7) .

مثال (٤) :

حدد الحلول الموجبة (أن وجدت) للمعادلة

$$472x + 531y = 1121 \quad \dots (8)$$

الحل :

بما أن $(472, 531) = 59$ و $59 \mid 1121$. إذاً للمعادلة (8) حل حسب

مبرهنة (٧-١-١) . ولإيجاد هذا الحل ، لاحظ أن

$$59 = 472(-1) + 531$$

إذاً $1121 = 19(59) = 472(-19) + 531(19)$ ، وعليه فإن

$$. x_1 = -19, y_1 = 19$$

أما الحل العام فهو

$$x = x_1 + (b/d)t = -19 + \frac{531}{59}t = -19 + 9t$$

$$t \in \mathbb{Z} \text{ لكل } y = y_1 - (a/d)t = 19 - \frac{472}{59}t = 19 - 8t$$

لكن $x > 0$ و $y > 0$ يعني أن $t > \frac{19}{9}$ و $t < \frac{19}{8}$. وعليه فإن $\frac{19}{9} < t < \frac{19}{8}$

ولكن لا يوجد عدد صحيح بين $\frac{19}{9}, \frac{19}{8}$. إذاً لا يوجد حل صحيح موجب

للمعادلة (8) .

مثال (٥) :

أوجد الحلول الموجبة للمعادلة

$$44x + 20y = 600 \quad \dots (9)$$

الحل :

بما أن $d = (44, 20) = 4$ و $4 = 44 + 20(2)$. إذاً

$$600 = 150(4) = 44(150) + 20(-300)$$

وعليه فإن $y_1 = -300$, $x_1 = 150$ ويكون الحل العام هو

$$x = 150 + 5t , y = -300 - 11t , t \in \mathbb{Z}$$

لكن $x > 0$ يعني أن $t > -30$ ، أما $y > 0$ فيعني أن $t < \frac{-300}{11} = -27.27$

إذاً $-30 < t < -27.27$ و $t \in \mathbb{Z}$ ، يعني أن $t = -29, -28$ ، وعليه فإن

الحلول الموجبة للمعادلة (9) هي

$$x = 150 - 145 = 5 , y = -300 + 319 = 19$$

$$x = 150 - 140 = 10 , y = -300 + 308 = 8$$

والآن إلى المثال الآتي . الذي ورد في كتاب "الطريف في الحساب" لأبي كامل

شجاع بن أسلم المصري (٨٥٠-٩٣٠م) ، والذي يختزل فيه نظاماً من معادلتين

ديوفنتين إلى معادلة واحدة بمتغيرين ويحلها .

مثال (٦) :

نُفِعْ إِلَيْكَ مِائَةَ دَرَاهِمٍ ، فَقِيلَ لَكَ ابْتِغِ مِائَةَ طَائِرٍ مِنْ حَمَامٍ وَبَطِّ وَدَجَاجٍ . فَإِذَا كَانَتِ الْبَطَّةُ بِدَرَاهِمَيْنِ ، وَالْحَمَامُ كُلُّ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ ، وَالدَّجَاجُ كُلُّ اثْنَيْنِ دَرَاهِمٍ . فَكَمْ تَشْتَرِي مِنْ كُلِّ نَوْعٍ .

الحل :

نفرض أن عدد الحمام x ، عدد الدجاج y ، عدد البط z . إذاً

$$x + y + z = 100 \quad \dots (1)$$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + 2z = 100 \quad \dots (2)$$

ومن (1) نجد أن $z = 100 - (x + y)$ ، وبالتعويض في (2) ينتج أن

$$10x + 9y = 600 \quad \dots (3)$$

لكن $(10, 9) = 1$ ، $1 = 10 - 9$ ، إذاً $1 = 10(600) + 9(-600)$ ، وعليه

فإن $x_1 = 600$ ، $y_1 = -600$ ، $z_1 = 100$ ، وبالتالي فإن

$$x = x_1 + bt = 600 + 9t \quad , \quad y = y_1 - at = -600 - 10t$$

$$z = 100 - (600 + 9t - 600 - 10t) = 100 + t > 0 \quad \forall t \in \mathbb{N}$$

$$x > 0 \Rightarrow t > -\frac{200}{3} = -66.66 \quad , \quad y > 0 \Rightarrow t < -60$$

إذاً $-66.66 < t < -60$ ، وعليه فإن

$$t = -66 , -65 , -64 , -63 , -62 , -61$$

$$x = 6 \quad , \quad y = 60 \quad , \quad z = 40$$

$$x = 15 \quad , \quad y = 50 \quad , \quad z = 35$$

$$x = 24 \quad , \quad y = 40 \quad , \quad z = 36$$

$$x = 33 \quad , \quad y = 30 \quad , \quad z = 37$$

$$x = 42 \quad , \quad y = 20 \quad , \quad z = 38$$

$$x = 51 \quad , \quad y = 10 \quad , \quad z = 39$$

وهذا ما وجده ابن أسلم المصري .

والآن إلى المبرهنة الآتية التي تضمن وجود حل للمعادلة الديوفنتية بأكثر من مجهولين .

مبرهنة ٧-١-٢ :

يوجد حل للمعادلة الديوفنتية

$$. n \geq 2 , a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = c \quad \dots (10)$$

إذا وإذا فقط كان $c \in (a_1, a_2, \dots, a_n)$

البرهان :

ليكن $d = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ، وليكن y_1, \dots, y_n حلاً للمعادلة (10) .

إذا $\sum_{i=1}^n a_i y_i = c$. لكن $d \mid a_i$ لكل $i = 1, \dots, n$. إذاً $d \mid (\sum_{i=1}^n a_i y_i)$.

وعليه فإن $d \mid c$.

ولإثبات العكس نفرض أن $d \mid c$. إذاً يوجد $r \in Z$ بحيث أن $c = dr$. لكن

$d = (a_1, \dots, a_n)$. إذاً يوجد $y_1, \dots, y_n \in Z$ بحيث أن $\sum_{i=1}^n a_i y_i = d$ حسب

مبرهنة (٧-١-٢) ، وعليه فإن $\sum_{i=1}^n a_i (ry_i) = rd = c$ ، وبالتالي فإن

$$. (10) \text{ حل للمعادلة } x_1 = ry_1 , x_2 = ry_2, \dots, x_n = ry_n$$

□

ملاحظة :

لإيجاد الحل العام للمعادلة الديوفنتية التي تحتوي على أكثر من مجهولين ،

نختزل تلك المعادلة إلى معادلة بمجهولين ، ثم نوجد الحل ، وتوجد طريقتان لحل

مثل تلك المعادلات .

الطريقة الأولى : ليكن

$$. n > 2 , a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = c \quad \dots (10)$$

وليكن $d = (a_1, \dots, a_n)$ ، ولنفرض أن

$$x_{n-1} = \alpha u + \beta v , x_n = \gamma u + \delta v \quad \dots (11)$$

نختار $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ بحيث أن $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ ، وعليه فإن

$$v = -\gamma x_{n-1} + \alpha x_n \quad , \quad u = \delta x_{n-1} - \beta x_n$$

إذا $x_{n-1}, x_n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow u, v \in \mathbb{Z}$

وإذا كان $(\beta, \delta) = 1$ ، فإن $\beta = \frac{a_n}{(a_{n-1}, a_n)}$ ، $\delta = \frac{-a_{n-1}}{(a_{n-1}, a_n)}$

وبالتالي يمكن حل المعادلة $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ وإيجاد α, γ ، وبالتعويض في (10)

نجد أن

$$ax_1 + a_2 x_2 + \dots + a_{n-2} x_{n-2} + (a_{n-1} \alpha + a_n \gamma)u = c \quad \dots (12)$$

وعدد المتغيرات في (12) أقل بواحد من عدد المتغيرات في (10) . ونلاحظ أن

$$a_{n-1} \alpha + a_n \gamma = -(a_{n-1}, a_n) \alpha \delta + (a_{n-1}, a_n) \beta \gamma = -(a_{n-1}, a_n)$$

$$d = (a_1, a_2, \dots, a_{n-2}, (a_{n-1}, a_n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

إذا للمعادلة (12) نفس خواص المعادلة (10) وهذا يعني أن c يقبل القسمة على

القاسم المشترك الأعظم لمعاملاتها ، كما أن معامل من تلك المعاملات لا يساوي

صفرأ .

وإذا كان $n > 3$ ، فيمكن تطبيق ما سبق على المعادلة (12) والحصول على

معادلة عدد متغيراتها $(n-2)$. إذا بإعادة الطريقة أعلاه عدة مرات نحصل

على معادلة بمتغيرين يمكن إيجاد الحل العام لها ، وتوضح الأمثلة الآتية هذه

الطريقة .

مثال (٧) :

حل المعادلة

$$15x + 10y + 6z = 61$$

... (13)

الحل :

بما أن $(15, 10, 6) = 1$. إذا يوجد حل للمعادلة (13) حسب مبرهنة $(7-1-2)$ ،

ولإيجاد ذلك الحل نفرض أن

$$y = \alpha u + \beta v \quad , \quad z = \gamma u + \delta v \quad , \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

$\beta = 3, \delta = -5$ وضع v ولحذف $10y + 6z = (10\alpha + 6\gamma)u + (10\beta + 6\delta)v$
 نجد أن $\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \Rightarrow -5\alpha - 3\gamma = 1$ ، وعليه إذا كان $\alpha = 1$ ، فإن $\gamma = -2$ ، وبالتالي فإن

$$y = u + 3v \quad , \quad z = -2u - 5v \quad \dots(14)$$

ومن (13) ، (14) نجد أن الحل العام للمعادلة (13) هو

$$\begin{aligned} x &= 2t + 1 & , & & u &= 15t - 23 \\ y &= 15t + 3v - 23 & , & & z &= -30t - 5v + 46 \end{aligned}$$

حيث $t, v \in \mathbb{Z}$

وعندما $t = v = 1$ ، نجد أن $x = 3, y = -5, z = 11$ حل للمعادلة (13)

وعندما $t = 2, v = 1$ ، نجد أن $x = 5, y = 10, z = -19$ حل للمعادلة (13)

وعندما $t = 2, v = -1$ ، نجد أن $x = 5, y = 4, z = -9$ حل للمعادلة (13)

مثال (٨) :

حل المعادلة

$$3x - 6y + 5z = 11 \quad \dots (15)$$

الحل :

بما أن $(3, -6, 5) = 1$. إذاً يوجد حل للمعادلة (15) حسب مبرهنة $(2-1-7)$ ، ولإيجاد ذلك الحل ، نفرض أن

$$y = \alpha u + \beta v \quad , \quad z = \gamma u + \delta v \quad , \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

إذاً $-6y + 5z = (-6\alpha + 5\gamma)u + (-6\beta + 5\delta)v = 0$ ، ولحذف v ، ضع

$$\beta = 5, \delta = 6 \quad , \quad \text{نجد أن}$$

$$6\alpha - 5\gamma = 1 \Rightarrow \alpha = \gamma = 1 \quad \dots (16)$$

ومن (15) ، (16) ينتج أن

$$3x - u = 11 \quad \dots (17)$$

وعليه فإن $u \equiv -11 \equiv 1 \pmod{3}$ ، وبالتالي فإن $u = 1 + 3t$ ، وبالتعويض في (17) ينتج أن $x = 4 + t$ ، $t \in \mathbb{Z}$. إذاً

$$v \in \mathbb{Z} ، y = \alpha u + \beta v = 1 + t + 5v \text{ و } z = \gamma u + \delta v = 1 + 3t + 6v$$

وعندما $t = v = 0$ ، نجد أن $x = 4$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ حل للمعادلة (15)

وعندما $t = v = 1$ ، نجد أن $x = 5$ ، $y = 9$ ، $z = 10$ حل للمعادلة (15)

وعندما $t = 1, v = 2$ ، نجد أن $x = 5$ ، $y = 14$ ، $z = 16$ حل للمعادلة (15)

الطريقة الثانية: "طريقة اويلر"

وتعتمد هذه الطريقة على كون مجموع أو الفرق بين عددين صحيحين يكون عدداً صحيحاً ، ونوضح هذه الطريقة بمثالين أحدهما سبق حله بالطريقة السابقة .

مثال (٩) :

حل المعادلة

$$5x + 10y + 6z = 61 \quad \dots (18)$$

الحل :

نختار المجهول الذي قيمه معاملته المطلقة هي الصغرى فنجد أنه 6 ثم نقسم طرفي المعادلة على ذلك المعامل ، فنجد أن

$$\frac{5}{2}x + \frac{5}{3}y + z = \frac{61}{6}$$

ومنها نجد أن

$$z = \frac{61}{6} - \frac{5}{2}x - \frac{5}{3}y = 10 + \frac{1}{6} - 2x - \frac{1}{2}x - y\frac{2}{3}y \quad \dots (19)$$

نأخذ الجزء الكسري ونفرض أنه t_1 ، إذاً

$$t_1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}x - \frac{2}{3}y \quad \dots (20)$$

ومنها نجد أن $6t_1 = 1 - 3x - 4y$ ، وعليه فإن

$$y = \frac{1}{4} - \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}t_1 = \frac{1}{4} - \frac{3}{4}x - t_1 - \frac{1}{2}t_1 \quad \dots (21)$$

نأخذ الجزء الكسري ونفرضه t_2 ، إذاً $t_2 = \frac{1}{4} - \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}t_1$ ، وعليه فإن

$$4t_2 = 1 - 3x - 2t_1 \quad \text{، ومنها نجد أن}$$

$$x = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}t_1 - \frac{4}{3}t_2 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}t_1 - t_2 - \frac{1}{3}t_2 \quad \dots (22)$$

وعليه فإن $t_3 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}t_1 - \frac{1}{3}t_2$ ، ومنها نجد أن $3t_3 = 1 - 2t_1 - t_2$

وعليه فإن

$$t_2 = 1 - 2t_1 - 3t_3 \quad \dots (23)$$

ونتوقف هناك لأن معامل أحد المتغيرات أصبح واحد وهو معامل t_2

ومن (22) ، (23) نجد أن

$$x = 2t_1 + 4t_3 - 1 \quad ، \quad t_1, t_3 \in \mathbb{Z} \quad \dots (24)$$

ومن (21) ، (24) ، نجد أن

$$y = 1 - 3t_1 - 3t_3 \quad \dots (25)$$

ومن (24) ، (25) ، (19) ينتج أن

$$z = 11 - 5t_3$$

وعندما $t_1 = 2$ ، $t_3 = 0$ ، نجد أن

$$x = 3 \quad ، \quad y = -5 \quad ، \quad z = 11$$

وعندما $t_1 = -9$ ، $t_3 = 6$ ، نجد أن

$$x = 5 \quad ، \quad y = 10 \quad ، \quad z = 19$$

وعندما $t_1 = -5$ ، $t_3 = 4$ ، نجد أن

$$x = 5 \quad ، \quad y = 4 \quad ، \quad z = -90$$

وهي نفس الحلول التي حصلنا عليها سابقاً .

مثال (1) :

حل المعادلة

$$15x + 12y + 30z = 24 \quad \dots (26)$$

الحل :

بما أن $(15,12,30) = 3$ و $3 \nmid 24$. إذاً يوجد حل للمعادلة (26) حسب مبرهنة $(7-1-2)$. ولإيجاد ذلك الحل نقسم طرفي المعادلة على معامل y ، فنجد أن

$$\frac{5}{4}x + y + \frac{5}{2}z = 2 \quad \text{، ومنها نجد أن} \quad \dots (27)$$

$$y = 2 - \frac{5}{4}x - \frac{5}{2}z = 2 - x - \frac{1}{4}x - 2z - \frac{1}{2}z \quad \text{، وعليه فإن} \quad \dots (28)$$

$$t_1 = -\frac{1}{4}x - \frac{1}{2}z \quad \text{، وعليه فإن} \quad 4t_1 = -x - 2z \quad \text{وبالتالي فإن} \quad \dots (29)$$

$$x + 2z + 4t_1 = 5 \quad \text{ونتوقف هنا لأن أصغر معامل هو واحد ، وعليه فإن}$$

$$x = -2z - 4t_1 \quad \dots (30)$$

ومن (28) ، (30) ينتج أن $y = 2 + 5t_1$ ، وبوضع $z = t_2$ يكون الحل العام هو

$$x = -2t_2 - 4t_1 \quad ، \quad y = 2 + 5t_1 \quad ، \quad z = t_2 \quad \text{حيث} \quad t_1, t_2 \in \mathbb{Z} .$$

وعندما $t_1 = t_2 = 1$ ، نجد أن

$$x = -6 \quad ، \quad y = 7 \quad ، \quad z = 1 \quad \text{حل للمعادلة (26)}$$

وعندما $t_1 = -1$ ، $t_2 = 1$ ، نجد أن

$$x = 2 \quad ، \quad y = -3 \quad ، \quad z = 1 \quad \text{حل للمعادلة (26)}$$

تمارين

(١) أوجد جميع الحلول لكل من المعادلات الديوفنتية الآتية:

$$24x + 112y = 32 \quad \text{(ب)} \quad ، \quad 14x + 18y = 10 \quad \text{(أ)}$$

$$3x + 5y = 19 \quad \text{(د)} \quad ، \quad 156x + 91y = 130 \quad \text{(ج)}$$

$$701x - 137y = 1434 \quad \text{(و)} \quad ، \quad 20x + 51y = 353 \quad \text{(هـ)}$$

(٢) أوجد جميع الحلول الموجبة لكل مما يأتي:

(أ) $15x + 17y = 113$ ، (ب) $23x + 57y = 765$

(ج) $3x + 5y = 17$ ، (د) $79x + 77y = 1446$

(٣) حل كلاً من المعادلات الديوفنتية الآتية:

(أ) $x + 3y + 2z = 1$ ، (ب) $3x - 2y - 6z = 1$

(ج) $5x + 4y + 3z = 22$ ، (د) $3x + 14y - 38z = 58$

(هـ) $x - 2y + 3z = 50$ ، (و) $5x + 8y - 3z = 10$

(٤) إذا كان $(a, b) = 1$ فبرهن على وجود عدد غير منتهي من الحلول للمعادلة

$$ax - by = 1$$

(٥) أثبت أن $ax + by = a + c$ قابلة للحل إذا وإذا فقط كان $ax + by = c$

قابلة للحل .

(٦) أثبت أن $ax + by = c$ قابلة للحل إذا وإذا فقط كان $(a, b) = (a, b, c)$.

(٧) "ابن أسلم المصري"

دفع إليك مائة درهم فقيل لك ابتع مائة طائر من البط والحمام والقناير والدجاج. كل بطه بدرهمين ، والحمام اثنان بدرهم والقناير ثلاثة بدرهم والدجاج كل واحدة بدرهم. فكم تشتري من كل نوع.

(٨) دفع البنك مائة ريال ، فقيل أشتري ثلاث أصناف من الفواكه برتقال ،

وتفاح وكمثرى . فإذا كان كل ستة تفاحات بخمسة ريالات وكل خمسة تفاحات بأربعة ريالات والكمثرى كل ثلاثة بريالين فما عدد ما تشتري من كل نوع .

٢-٧ : المعادلة $x^2 + y^2 = z^2$ وثلاثيات فيثاغورس .

يعرف البابليون والمصريون بأن المثلث الذي أطوال أضلاعه 3,4,5 قائم الزاوية بل يعرف البابليون أن كل مثلث من المثلثات الذي أطوال أضلاعه (45, 60, 75), (65, 72, 97), (119, 120, 169), (319, 360, 481), (1679, 2400, 2929), (1771, 2700, 3229), (4601, 4800, 6649), (4961, 6480, 8161), (12709, 13500, 18541)

قائم الزاوية ، واستنتجوا من ذلك المبرهنة الآتية: مجموع المربعين المنشأين على الضلعين القائمين في المثلث القائم الزاوية يساوي المربع المنشأ على الوتر .

أي إذا كان x, y طولَي ضلعي الزاوية القائمة وكان z طول الوتر فإن

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \dots (1)$$

أما نسبة هذه المبرهنة إلى فيثاغورس (٥٨٤ - ٤٩٥ ق.م) فيعتقد أنه أول من برهنها ، كما ينسب إلى فيثاغورس وإلى إقليدس وجود عدد لا نهائي من الأعداد التي على الصورة :

$$(1) \quad x = 2n + 1 , \quad y = 2n^2 + 2n , \quad z = 2n^2 + 2n + 1$$

هذا ولقد ترجم وحلّل المؤرخ الألماني فرانز ويك (Franz woepche) (١٨٢٦-١٨٦٤) في القرن التاسع عشر [٥،٤] بحثين لرياضيين من القرن العاشر للميلاد ، يعالجان المثلثات العددية قائمة الزاوية (ثلاثيات فيثاغورس) . الأول لرياضي مجهول الأسم والثاني لأبي جعفر الخازن تؤكد بأنها جديدة ومجهولة من قبل الأقدمين والمعاصرين . إذا يقول كاتب النص مجهول المؤلف بعد أن يعطي مبدأ تكوين المثلثات العددية قائمة الزاوية " هذا هو الأصل في معرفة الأقطار للمثلثات التي هي أصول الأجناس (الثلاثيات البدائية) ، ولم أجد هذا ذكر في شيء من الكتب القديمة ولا ذكره أحد ممن وضع الكتب في الحساب من المحدثين ولا علمت أنه أنفتح لأحد من قبلي " .

بعض المعادلات الديوفانتية

أما الخازن فينص ويبرهن بعض المقدمات المتعلقة بخواص الثلاثيات البدائية ، ثم يثبت أن :

إذا كان x عدداً زوجياً وكان y عدداً فردياً و $x^2 + y^2 = z^2$ فيوجد $m, n \in \mathbb{N}$ بحيث أن $m > n > 0$ و $z = m^2 + n^2$ ، $y = m^2 - n^2$ ، $x = 2mn$.
ثم يوجد الحلول لكل من المعادلتين $x^2 + y^2 = z^4$ ، $x^4 + y^4 = z^2$.

تعريف ٧-٢-١ :

يقال عن ثلاثي من الأعداد الطبيعية x, y, z أنه ثلاثي فيثاغورس (Pythagorean Triple) ، إذا كان $x^2 + y^2 = z^2$.

ويقال عن ثلاثي فيثاغورس (x, y, z) ، أنه : ثلاثي بدائي (Primitive Triple) ، إذا كان $(x, y, z) = 1$.

مثال (١) :

(أ) كل من $(3, 4, 5)$ ، $(5, 12, 13)$ ، $(11, 60, 61)$ ثلاثي فيثاغورس بدائي.
(ب) كل من $(6, 8, 10)$ ، $(10, 24, 26)$ ، $(42, 40, 58)$ ثلاثي فيثاغورس.
ولكي نوجد جميع الثلاثيات الفيثاغورسية البدائية ، نورد الآتي .

مبرهنة ٧-٢-١ :

(x, y, z) ثلاثي فيثاغورس إذا وإذا فقط وجد $d \in \mathbb{Z}^+$ ، وثلاثي بدائي (a, b, c) بحيث أن $x = ad$ ، $y = bd$ ، $z = cd$.

البرهان :

نفرض أن (x, y, z) ثلاثي فيثاغورس ، وأن $d = (x, y, z)$. إذا $d > 0$ و
 $(a = \frac{x}{d}$ ، $b = \frac{y}{d}$ ، $c = \frac{z}{d}$) ثلاثي فيثاغورس بدائي ، لأن

$$(a, b, c) = 1 \text{ و } a^2 + b^2 = \left(\frac{x}{d}\right)^2 + \left(\frac{y}{d}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{d^2} = \frac{z^2}{d^2} = \left(\frac{z}{d}\right)^2 = c^2$$

ولإثبات العكس نفرض أن (a, b, c) ثلاثي فيثاغورس بدائي ، $d \in \mathbb{Z}^+$. إذا
 $(x = ad , y = bd , z = cd)$ ثلاثي فيثاغورس ، لأن
 $x^2 + y^2 = (ad)^2 + (bd)^2 = (a^2 + b^2)d^2 = c^2d^2 = z^2$

□

مبرهنة ٧-٢-٢ :

إذا كان (x, y, z) ثلاثياً فيثاغورس بدائياً ، فإن
 $(x, y) = (x, z) = (y, z) = 1$

البرهان :

نفرض أن $(x, y) = d > 1$. إذا يوجد عدد أولي p ، بحيث أن $p \mid x$ و
 $p \mid y$ حسب مبرهنة (٢-٢-٢) ، وعليه فإن $p \mid x^2$ و $p \mid y^2$ ، وبالتالي فإن
 $p \mid (x^2 + y^2)$. لكن $x^2 + y^2 = z^2$ بالفرض ، إذاً $p \mid z^2$ ، وعليه فإن
 $p \mid z$ ، وبالتالي فإن $(x, y, z) = p > 1$ وهذا يناقض كون (x, y, z) ثلاثياً
 فيثاغورسياً بدائياً . وبنفس الطريقة نبرهن أن $(x, z) = (y, z) = 1$.

□

مبرهنة ٧-٢-٣ : " الخازن "

إذا كان (x, y, z) ثلاثياً فيثاغورس بدائياً ، فإما x زوجي و y فردي أو
 x فردي و y زوجي .

البرهان :

بما أن $(x, y, z) = 1$. إذاً $(x, y) = 1$ حسب مبرهنة (٧-٢-٢) ، وعليه لا
 يمكن أن يكون x, y زوجين معاً . وإذا كان كل من x, y عدداً فردياً ، فإن
 $x = 2m + 1 , y = 2n + 1$ ، حيث $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ، وعليه فإن
 $z^2 = x^2 + y^2 = 4m^2 + 4n^2 + 4m + 4n + 2 \equiv 2 \pmod{4}$
 وهذا غير ممكن .

□

والآن إلى مبرهنات الخازن الآتية التي توضح كيفية إيجاد ثلاثيات فيثاغورس
 البدائية .

مبرهنة ٧-٢-٤ :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ، $(a, b) = 1$ ، وكان ab مربعاً كاملاً ، فإن كلا من a, b مربع كامل .

البرهان :

بما أن $a = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ ، $b = \prod_{j=1}^s q_j^{\beta_j}$ ، حيث p_i, q_j أعداد أولية حسب المبرهنة الأساسية في الحساب ، وبما أن $(a, b) = 1$. إذاً p_i, q_j أعداد أولية مختلفة لكل i, j . لكن $ab = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i} \cdot \prod_{j=1}^s q_j^{\beta_j}$ مربع كامل بالفرض . إذاً كل من α_i, β_j عدد زوجي لكل i, j ، وعليه فإن كلا من a, b مربع كامل .

□

مبرهنة ٧-٢-٥ : " الخازن "

إذا كان $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ وكان x عدداً زوجياً ، فإن ثلاثي فيثاغورس بدائي إذاً وإذا فقط كان وجد $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ، $(m, n) = 1$ ، $m > n$ ، $m \not\equiv n \pmod{2}$ بحيث أن

$$x = 2mn , y = m^2 - n^2 , z = m^2 + n^2$$

البرهان :

نفرض أن (x, y, z) ثلاثي فيثاغورس بدائي و x عدد زوجي . إذاً y عدد فردي حسب مبرهنة (٧-٢-٣) ، وعليه فإن z فردي حسب مبرهنة (٧-٢-٢) ، وبالتالي فإن $x+z, z-y$ عددان زوجيان ، وعليه يوجد $u, v \in \mathbb{Z}^+$ بحيث أن

$$z + y = 2u , z - y = 2v$$

$$x^2 + y^2 = z^2 \text{ . إذاً . لكن } z^2 - y^2 = (z + y)(z - y) = 4uv$$

وعليه فإن $uv = \left(\frac{x}{2}\right)^2$.

والآن لنفرض أن $(u, v) = d$. إذا $d \mid u$ و $d \mid v$ ، وعليه فإن $d \mid (u + v)$ و $d \mid (u - v)$ وهذا يعني أن $d \mid z$ و $d \mid y$ ، وعليه فإن $d \mid (y, z)$. لكن $(y, z) = 1$. إذا $d \mid 1$ ، وعليه فإن $d = 1$.

وحيث أن $uv = (\frac{x}{2})^2$ و $(u, v) = 1$. إذا يوجد $m, n \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $u = m^2$ ، $v = n^2$ حسب مبرهنة (٧-٢-٤) . ولكي نثبت أن $(m, n) = 1$ ، نفرض أن $(m, n) > 1$. إذا يوجد عدد أولي p بحيث أن $p \mid n$ ، $p \mid m$ حسب مبرهنة (٢-٢-٤) ، وعليه فإن $p \mid m^2$ ، $p \mid n^2$ ، وبالتالي فإن $p \mid u$ ، $p \mid v$ ، وعليه فإن $(u, v) = p > 1$ وهذا يناقض كون $(u, v) = 1$ إذا $(m, n) = 1$.

وحيث أن $x^2 = 4uv$ ، $y = u - v$ ، $z = u + v$ ، $u = m^2$ ، $v = n^2$ إذا $x = 2mn$ ، $y = m^2 - n^2$ ، $z = m^2 + n^2$.

وبما أن $(m, n) = 1$. إذا لا يمكن أن يكون m, n زوجين معاً . وإذا كان كل من m, n عدداً فردياً ، فإن ذلك يعني أن كلاً من x, y, z عدد زوجي وهذا يناقض كون $(x, y, z) = 1$. إذا $m \not\equiv n \pmod{2}$.

ولإثبات العكس نفرض أن x عدد زوجي و $x = 2mn$ ، $y = m^2 - n^2$ ، $z = m^2 + n^2$ إذا $m \not\equiv n \pmod{2}$ ، $(m, n) = 1$.

$$x^2 + y^2 = 4m^2n^2 + m^4 - 2m^2n^2 + n^4 = (m^2 + n^2)^2 = z^2$$

ولكي نثبت أن $(x, y, z) = 1$ ، نفرض أن $(x, y, z) = d > 1$. إذا يوجد عدد

أولي p بحيث أن $p \mid d$ حسب مبرهنة (٢-٢-٤) . لكن $m \not\equiv n \pmod{2}$. إذا

$m - n \not\equiv 0 \pmod{2}$ و $m + n \equiv 0 \pmod{2}$ ، وعليه فإن

$y = m^2 - n^2 = (m + n)(m - n) \equiv 0 \pmod{2}$ ، وبالتالي فإن y عدد فردي ،

وعليه فإن $p \neq 2$ ، $p \mid y$ ، $p \mid z$ ، إذا $p \mid (z + y)$ ، $p \mid (z - y)$ ،

وعليه فإن $p \mid 2m^2$ و $p \mid 2n^2$ ، وبالتالي فإن

بعض المعادلات الديوفانتية

، $p \mid n^2, p \mid m^2$ ، وعليه فإن $p \mid n, p \mid m$ ، ومنها نجد أن $(m,n) = p \neq 1$ وهذا خلاف الفرض . إذاً $(x,y,z) = 1$ ، وعليه فإن (x,y,z) ثلاثي فيثاغورس بدائي .

□

ملاحظة (١) :

إن الشرط $m \not\equiv n \pmod{2}$ ضروري في مبرهنة (٧-٢-٥) ، لأنه إذا كان $m = 7, n = 3$ ، فإن $(7,3) = 1, 7 \equiv 3 \pmod{2}$. لكن $z = m^2 + n^2 = 58, x = 2mn = 42, y = m^2 - n^2 = 40$ فيثاغورس غير بدائي .

ونورد في الجدول الآتي بعض ثلاثيات فيثاغورس البدائية :

| m | n | x | y | z | x^2 | y^2 | z^2 |
|---|---|-----|----|-----|-------|-------|-------|
| 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 9 | 25 |
| 3 | 2 | 12 | 5 | 13 | 144 | 25 | 169 |
| 4 | 1 | 8 | 15 | 17 | 64 | 225 | 289 |
| 4 | 3 | 24 | 7 | 25 | 576 | 49 | 625 |
| 5 | 2 | 20 | 21 | 29 | 400 | 441 | 841 |
| 5 | 4 | 40 | 9 | 41 | 1600 | 81 | 1681 |
| 6 | 1 | 12 | 35 | 37 | 144 | 1225 | 1369 |
| 6 | 5 | 60 | 11 | 61 | 3600 | 121 | 3721 |
| 7 | 2 | 28 | 45 | 53 | 784 | 2025 | 2809 |
| 7 | 4 | 56 | 33 | 65 | 3136 | 1089 | 4225 |
| 7 | 6 | 84 | 13 | 85 | 7056 | 169 | 7225 |
| 8 | 1 | 16 | 63 | 65 | 256 | 3969 | 4225 |
| 8 | 3 | 48 | 55 | 73 | 2304 | 3025 | 5329 |
| 8 | 5 | 80 | 39 | 89 | 6400 | 1521 | 7921 |
| 8 | 7 | 112 | 15 | 113 | 12544 | 225 | 12769 |

ملاحظة (٢) :

من مبرهنة (٧-٢-١) ومبرهنة (٧-٢-٥) ، نجد أن ثلاثي (x,y,z) فيثاغورس إذاً وإذا فقط وجد $r,s \in \mathbb{Z}^+$ ، $r > s > 0$ ، $(r,s)=1$ ، بحيث أن :

$$x = 2rs \quad , \quad y = r^2 - s^2 \quad , \quad z = r^2 + s^2$$

والآن إلى بعض التطبيقات والأمثلة الآتية .

مثال (٢) :

إذا كان (x,y,z) ثلاثياً فيثاغورسياً بدائياً ، فإن واحد فقط من العددين x أو y يقبل القسمة على 3 .

الحل :

بما أن (x,y,z) ثلاثي فيثاغورسي بدائي . إذاً يوجد $m,n \in \mathbb{Z}^+$ ، بحيث أن $(m,n)=1$ ، $x = 2mn$ ، $y = m^2 - n^2$ ، $z = m^2 + n^2$. فإذا كان $3 \nmid m$ أو $3 \nmid n$ ، فإن $3 \nmid x$. أما إذا كان $3 \nmid m$ و $3 \nmid n$ ، فإن $m^2 \equiv 1 \pmod{3}$ ، $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$ حسب مبرهنة فيرما ، وعليه فإن $m^2 - n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ ، وبالتالي فإن $y \equiv 0 \pmod{3}$ ، وعليه فإن $3 \mid y$.

مثال (٣) :

أوجد ثلاثيات فيثاغورس (x,y,z) و $x = 8$

الحل :

بما أن $x = 2mn = 8$. إذاً $mn = 4$. لكن $(m,n)=1$ ، $m > n > 0$. إذاً $m = 4$ ، $n = 1$ ، وعليه فإن $y = 4^2 - 1^2 = 15$ ، $z = 4^2 + 1^2 = 17$. لكن ثلاثي فيثاغورس بدائي $(8,15,17)$ حيث $z = ed$ ، $y = bd$ ، $x = ad$. إذاً $a \mid 8$ ، وعليه فإن $a = 1, 2, 4, 8$. فإذا كان أحد هذه القواسم عدداً من ثلاثي بدائي ، فيجب أن يكون على الصورة $a = 2rs$ حسب مبرهنة (٧-٢-٥) . لكن $2rs \neq 1$ كما أن $2rs = 2$. يعني أن $rs = 1$ ، وبالتالي فإن $r = s = 1$ وهذا غير ممكن لأن $r > s > 0$.

أما إذا كان $2rs = 4$ ، فإن $rs = 2$ ، وعليه فإن $s = 1$ ، $r = 2$ ، وبالتالي فإن
 فيثاغورس بدائي ، وبضرب كل عدد من أعداد هذا الثلاثي في 2 نجد أن
 (8,6,10) ثلاثي فيثاغورس .

أما إذا كان $2rs = 8$ ، فإن $rs = 4$ ، وعليه فإن $s = 1$ ، $r = 4$ ، وبالتالي
 فإن $x = 8$ ، $y = 15$ ، $z = 17$. إذاً الثلاثيات المطلوبة
 هي (8,6,10) ، (8,15,17) .

مثال (٤) :

أوجد ثلاثيات فيثاغورس البدائية $(x,21,z)$.

الحل :

بما أن $y = 21$ ، $y = m^2 - n^2$ ، إذاً $(m^2 - n^2) = 21$ ، وعليه فإن
 $(m+n)(m-n) = 21$. إذاً إما $m+n = 21$ ، $m-n = 1$ أو $m+n = 7$ أو
 و $m-n = 3$ ، وعليه إما $m = 11$ ، $n = 10$ أو $m = 5$ ، $n = 2$ ، وعليه
 إما $x = 2mn = 220$ ، $z = m^2 + n^2 = 221$ أو
 وبالتالي فإن الثلاثيات البدائية $x = 2 \cdot 2 \cdot 5 = 20$ ، $z = 5^2 + 2^2 = 29$
 المطلوبة هي (20,21,29) ، (220,21,221) .

مثال (٥) :

أوجد ثلاثيات فيثاغورس البدائية $(x,y,65)$.

الحل :

بما أن $z = 65$ ، $z = m^2 + n^2$ ، إذاً $m^2 + n^2 = 65 = 8^2 + 1^2$ أو
 $m^2 + n^2 = 65 = 7^2 + 4^2$ ، وعليه إما $(m^2 = 8^2, n^2 = 1)$ أو
 $(m^2 = 7^2, n^2 = 4^2)$ ومنها نجد أن $m = 8$ ، $n = 1$ أو $m = 7$ ، $n = 4$
 فإذا كان $m = 8$ ، $n = 1$ ، فإن $y = m^2 - n^2 = 63$ ، $x = 2mn = 16$ ،
 ثلاثي فيثاغورس (16,63,65) .

وإذا كان $n = 4$, $m = 7$, فإن $x = 56$, $y = 33$, $z = 65$ ، وعليه فإن $(56, 33, 65)$ ثلاثي فيثاغورس .

وحيث أن $65 = 5 \cdot 13$. إذا القواسم الفعلية للعددي هي $1, 5, 13$ ، فإذا كان (a, b, c) ثلاثي فيثاغورس بدائي ، فإن $c \neq 1$. إذاً $c = 5, 13, 65$. فإذا كان $c = 5$ ، فإن $r^2 + s^2 = 5 = 2^2 + 1$ ، وعليه فإن $r = 2$, $s = 1$ ، وبالتالي فإن $a = 4$, $b = 3$ و $(4, 3, 5)$ ثلاثي فيثاغورس بدائي وبضرب عناصره في 13 ينتج أن $(52, 39, 65)$ ثلاثي فيثاغورس .

وإذا كان $c = 13$ ، فإن $c = r^2 + s^2 = 9 + 4$ ، وعليه فإن $r = 3$, $s = 2$ ، وبالتالي فإن $a = 12$, $b = 5$ ، وعليه فإن $(12, 5, 13)$ ثلاثي فيثاغورس بدائي ، وبضرب عناصره في 5 نجد أن $(60, 25, 65)$ ثلاثي فيثاغورس . إذاً ثلاثيات فيثاغورس المطلوبة هي

$$(16, 63, 65) , (56, 33, 65) , (52, 39, 65) , (60, 25, 65)$$

مثال (٦) : " الخازن "

أوجد الأعداد الصحيحة الموجبة التي تحقق المعادلة $x^2 + y^2 = z^4$.

الحل :

نفرض أن $r = z^2$. إذاً $x^2 + y^2 = r^2$ ، وعليه إذا فرضنا أن (x, y, r) ثلاثي فيثاغورس بدائي ، فإن

$$x = 2mn \quad , \quad y = m^2 - n^2 \quad , \quad r = m^2 + n^2$$

لكن $r = z^2$. إذاً $m^2 + n^2 = z^2$ ، وعليه يوجد $u, v \in \mathbb{Z}$ ، بحيث أن

$$m = 2uv \quad , \quad n = u^2 - v^2 \quad , \quad z = u^2 + v^2$$

وعليه فإن حلول المعادلة $x^2 + y^2 = z^4$ هي

$$, x = 4uv(u^2 - v^2) \quad , \quad y = 4u^2v^2 - (u^2 - v^2)^2 \quad , \quad z = u^2 + v^2$$


$$. (u, v) = 1 \quad , \quad u > v \quad , \quad u, v \in \mathbb{Z}$$

فإذا كان $x=24$, $y=7$, $z=5$ فإن $u=2$, $v=1$
 وإذا كان $x=120$, $y=119$, $z=13$ فإن $u=3$, $v=2$
 وإذا كان $x=336$, $y=527$, $z=25$ فإن $u=4$, $v=3$

مثال (٧) :

أثبت أن نصف قطر الدائرة المرسومة داخل مثلث فيثاغورس (مثلث قائم الزاوية أطوال أضلاعه أعداد صحيحة) يكون عدداً صحيحاً

الإثبات :



نفرض أن نصف قطر الدائرة يساوي r ، $|AB|=c$ ، $|AC|=b$ ، $|BC|=a$. إذاً $a^2 + b^2 = c^2$

وحيث مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة في الارتفاع ، والمماس عمودي على نصف القطر عند نقطة التماس ، ومساحة المثلث ABC تساوي مجموع مساحات المثلثات BCE ، ABE ، ACE "أنظر الشكل"

إذاً $\frac{1}{2}ab = (\frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr + \frac{1}{2}ar)$ ، وعليه فإن

$$ab = (a + b + c)r \quad \dots (1)$$

لكن $a^2 + b^2 = c^2$ يعني وجود $s, t \in \mathbb{Z}$ بحيث أن $s > t$ ،

$$a = 2st , b = s^2 - t^2 , c = s^2 + t^2 \quad \dots (2)$$

ومن (1) ، (2) ينتج أن

$$r = \frac{ab}{a + b + c} = \frac{2st(s^2 - t^2)}{2st + 2s^2} = \frac{t(s^2 - t^2)}{s + t} = t(s^2 - t^2) \in \mathbb{Z}^+$$

تمارين

(١) أوجد ثلاثيات فيثاغورس البدائية (x, y, z) عندما :

(أ) $x = 16$ ، (ب) $y = 35$ ، (ج) $z = 145$

" لاحظ أن $145 = (12^2) + 1 = 9^2 + 8^2$ "

(٢) أوجد ثلاثيات فيثاغورس (x, y, z) عندما :

(أ) $x = 4$ ، (ب) $y = 45$ ، (ج) $z = 85$

" لاحظ أن $85 = 81 + 4 = 49 + 36$ "

(٣) " الخازن " أوجد حلول المعادلة $x^4 + y^2 = z^2$.

(٤) إذا كان $x^2 + y^2 = z^2$ ، فأثبت أن واحداً من الأعداد x, y, z يقبل القسمة

على 3 وواحداً يقبل القسمة على 5 .

(٥) إذا كان (x, y, z) ثلاثياً فيثاغورسياً بدائياً ، فأثبت أن

$12 \mid xy$ و $60 \mid xyz$.

(٦) إذا كان (x, y, z) ثلاثياً فيثاغورسياً بدائياً ، فأثبت أن $x + y$ و $x - y$

يطابق الواحد أو السبعة قياس 8 .

(٧) إذا كان $n \geq 3$ ، فأوجد ثلاثياً فيثاغورسياً يكون أحد أعدادة يساوي n .

" ملاحظة : إذا كان n عدداً زوجياً فخذ $\frac{n^2}{4} + 1$ ، $\frac{n^2}{4} - 1$ ، n تحصل

على المطلوب . وإذا كان n عدداً زوجياً فخذ $\frac{n^2}{2}$ ، $\frac{n^2 - 1}{2}$ ، n تحصل

على المطلوب " .

(٨) " الخازن " برهن على عدم وجود ثلاثي فيثاغورسي (x, y, z) فيه

$x = 2^m$ ، $y = 2^n$ ، $m > n$.

(٩) برهن أن $(3,4,5)$ هو الثلاثي الفيثاغورسي البدائي الوحيد المكون من ثلاثة أعداد صحيحة متتالية .

" ملاحظة : افرض وجود ثلاثي بالشكل $(x, x+1, x+2)$ "

(١٠) أثبت أن $(3n, 4n, 5n)$ ، $n = 1, 2, 3, \dots$ هي الثلاثيات الفيثاغورسية الوحيدة التي تكون أعدادها متوالية عددية .

"ملاحظة : افرض أن $(x-n, x, x+n)$ ثلاثي فيثاغورس ، ثم أوجد x بدلالة n تحصل على المطلوب ."

(١١) إذا كان (x, y, z) ثلاثياً فيثاغورسياً بدائياً ، وكان $z = x + 1$ ، فأثبت أن $x = 2n(n+1)$ ، $y = 2n + 1$ ، $z = 2n(n+1) + 1$
 $x = 2mn$ ، $y = m^2 - n^2$ ، $z = m^2 + n^2$ ، $z - x = 1 \Rightarrow m = n + 1$

(١٢) إذا كان (x, y, z) ثلاثياً فيثاغورسياً بدائياً ، وكان $z - y = 2$ ، فأثبت أن $m > 1$ ، $x = 2m$ ، $y = m^2 - 1$ ، $z = m^2 + 1$

(١٣) أوجد جميع مثلثات فيثاغورس التي مساحتها تساوي محيطها . " لاحظ أن $(x^2 + y^2 = z^2$ ، $x + y + z = \frac{1}{2}xy) \Rightarrow (x-4)(y-4) = 8$."

(١٤) إذا كان $(x, y, z) = 1$ ، فأوجد حلول المعادلة $2x^2 + y^2 = z^2$.

٣-٧ : حالات خاصة من مبرهنة فيرما الأخيرة

Special cases of Fermats Last theorem

تنص مبرهنة الفرنسي فيرما (١٦٠١-١٦٦٥م) على عدم وجود أعداد

صحيحة غير صفرية x, y, z تحقق المعادلة الديوفنتية

$$x^n + y^n = z^n \quad \dots (1)$$

ويقول فيرما أنه توصل إلى هذه الحقيقة سنة ١٦٣٧م عندما كان يقرأ طبعة

باشيه لأعمال ديوفنتس ولديه إثبات لذلك لكن ضيق الهامش منعه من كتابته ، لكن

جميع الأبحاث في التراث العلمي العربي والإسلامي ، أنظر [٥،٤،٣] ، تؤكد بأن الرياضيين المسلمين كانوا على علم بهذه المبرهنة عندما $n = 3, 4$ ، فمنذ القرن العاشر للميلاد حاول كل من أبو بكر الكرخي (ت ١٠٢٠م) وأبو محمود الخجندي (ت ١٠٠٠م) إثبات مبرهنة فيرما عندما $n = 3$ ، أي عدم وجود أعداد صحيحة غير صفرية x, y, z بحيث أن $x^3 + y^3 = z^3$ وبلغة ذلك العصر " لا يجتمع من عددين مكعبين عدد مكعب " .

ولكن أبو جعفر الخازن أحد رياضي القرن العاشر للميلاد يؤكد بأن برهان الخجندي ناقص وغير صحيح ، ثم يحاول الخازن أن يبرهن القضية الآتية " لا يمكن أن يجتمع من عددين مكعبين عدد مكعب كما قد يمكن أن يجتمع من عددين مربعين عدد مربع ، ولا أن ينقسم عدد مكعب إلى عددين مكعبين ، كما قد ينقسم عدد مربع إلى عددين مربعين " ويبدأ برهانه بإثبات المتطابقة الآتية .

كل عددين مكعبين ، فإن فضل ما بينهما هو الذي يجتمع من ضرب مربع الضلع الأقل في فضل ما بين الضلعين ومن ضرب مجموع الضلعين في فضل ما بينهما ثم في الضلع الأكبر .

أي أنه إذا كان $z > y$ ، فإن $z^3 - y^3 = y^2(z - y) + (z + y)(z - y)z$ ، وحيث أن الطرف الأيمن من المتطابقة أعلاه يقابل حجماً لكنه ليس مكعباً لأنه لم يجتمع من ضرب عدد مربع في ضلعه . إذاً لا ينقسم عدد مكعب إلى مكعبين ، لأنه إذا فرضنا وجود عددين مكعبين ضلعاهما $|ab|$ ، $|bc|$ ، وكان $|bc| > |ab|$ ، فإن $|ab| + |bc| = |bd|$. إذاً إذا كان $|bd|$ ضلع مكعب فإنه إذا نقص من مكعبه مكعب $|bc|$ بقى الباقي مثل مكعب $|ab|$ ، ولكن الفرق بين مكعبين ليس مكعباً ، كما أوضحنا أعلاه . إذاً $|bd|$ ليس بضلع مكعب ولا مجموع مكعبي $|ab|$ ، $|bc|$ بعد مكعب .

لاحظ أن برهان الخازن ناقص أيضاً واعتماده على التعليل الهندسي للمطابقة أعلاه لا يؤدي إلى التعميم لأن الحالة $n = 4$ لا يمكن إعطائها تفسيراً هندسياً .

أما في القرن الحادي عشر للميلاد فقد ذكر ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧م) في كتابه " الشفاء : المنطق - البرهان " أن هذه المبرهنة " أي $z^3 = y^3 + z^3$ لم يتم البرهان عليها ، أما في القرن الثاني عشر للميلاد فنجد عمر الخيام (١٠٤٨-١١٣١م) يذكر دون إثبات استحالة وجود أعداد صحيحة غير صفرية a, b, c بحيث أن $x^3 + y^3 = z^3$ أو $x^4 + y^4 = z^4$.

أما في القرن الثالث عشر للميلاد فيطرح ابن الخوام البغدادي (١٢٤٥-١٣٢٤م) بعض المعادلات الديوفنتية التي منها معادلة فيرما عندما $n = 3$ ، وكذلك يفعل كمال الدين الفارسي في شرحه لجبر ابن الخوام ، أما بهاء الدين العاملي (١٥٤٧-١٦٢٢م) فقد ذكر في كتابه " خلاصة الحساب " استحالة تقسيم المكعب إلى مكعبين أو ضعف المربع إلى مربعين ، وقد جاءت ملاحظة فيرما بعد وفاة العاملي بحوالي خمسة عشر عاماً .

هذا ولقد أثبت فيرما بطريقة التي تعرف بطريقة النزول أو الانحدار أو التناقص اللانهائي *Descente infinie*، كما أثبت كل من أويلر (١٧٠٧-١٧٨٣) وجاوس (١٧٧٧-١٨٥٥) عدم وجود حل في Z للمعادلة $xyz \neq 0, x^4 + y^4 = z^4$ ، وعليه إذا كان $n > 2, 4 \mid n$ ، فإن $n = 4m$ ، وبالتالي فإن $x^n + y^n = z^n \Leftrightarrow (x^m)^4 + (y^m)^4 = (z^m)^4$

لكن $(x^m)^4 + (y^m)^4 = (z^m)^4$ لا تملك حلاً غير تافه في Z . إذاً $x^n + y^n = z^n$ لا تملك حلاً في Z لكل $n = 4m$ بشرط أن $xyz \neq 0$.

أما إذا كان $n = 3$ ، فقد أثبت أويلر سنة ١٧٧٠م صحة المبرهنة في هذه الحالة، لكن إثبات أويلر يحتوي على بعض الأخطاء صححت من قبل لجنر

(١٧٥٢-١٨٣٣) ، وأثبت جاوس (١٧٧٧-١٨٥٥م) هذه الحالة باستخدام خواص الحقل $Q(\sqrt{-3})$ أما الفرنسية صوفي جيرما (١٧٧٦-١٨٣١ Sophie Germain)، فقد أثبتت سنة ١٨٢٠ صحة المبرهنة $x^n + y^n = z^n$ لكل $n > 100$ بشرط أن كلاً من $n, 2n+1$ عدد أولي ، كما أن كلاً من x, y, z لا يقبل القسمة على n ، ثم وسع لجندر طريقته لكل الأعداد الأقل من 197 ، وأثبت عام ١٨٢٣م أن n لا يمكن أن تكون على الصورة

$$2p+1, 3p+1, 8p+1, 10p+1, 14p+1, 16p+1$$

حيث n, p أعداد أولية ، $n \neq 31, 43$.

وباستخدام طريقة النزول اللانهائي أثبت الألماني ديركلي (١٨٠٥-١٨٥٩) سنة ١٨٢٨م صحة المبرهنة عندما $n=5$ ، كما أثبت ذلك لجندر سنة ١٨٣٠م ، وأثبت ديركلي سنة ١٨٣٢م صحة المبرهنة عندما $n=14$ ، وفي سنة ١٨٣٩م قدم الفرنسي لامي (١٧٩٥-١٨٧٠) برهاناً عندما $n=7$ ، لكنه يحتوي على بعض الأخطاء صححت من قبل الفرنسي لبيك Lebesgue (١٨٧٥-١٩٤١) سنة ١٨٤٠م .

وفي ١/٣/١٨٤٧م أبلغ لامي أكاديمية العلوم الفرنسية في باريس أنه أثبت مبرهنة فيرما معتبراً أن

$$x^p + y^p = (x + y) (x + \zeta y) \cdots (x + \zeta^{p-1}y) \in Z[\zeta_p]$$

حيث $\zeta_p = e^{\frac{2\pi i}{p}}$ ، $p \neq 2$ ، $Z[\zeta_p] = \{a + b\zeta_p \mid a, b \in Z\}$ منطقة تحليل وحيد (unique factorization domain) ، لكن الفرنسي ليوفيلي (١٨٠٩-١٨٨٢) لم يقتنع ببرهان لامي ، وبعد عدة أشهر اكتشف الفرنسي كوشي (١٧٨٩-١٨٥٧) أن $Z[\zeta_{23}]$ منطقة ليست وحيدة التحليل .

هذا وقد أثبت الألماني كومر (١٨١٠-١٨٩٣) صحة مبرهنة فيرما الأخيرة

لكل الأعداد الأولية المنتظمة p (Regular Primes) الأقل من 100 ماعدا $p = 37, 59, 67$ " يقال عن عدد أولي أنه منتظم إذا كان p لا يقسم مقام أي من أعداد برنولي B_2, B_4, \dots, B_{p-3} حيث B_n معرفة بالشكل

$$\frac{x}{e^x - 1} = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}$$

وقد منح كומר على ذلك الميدالية الذهبية من قبل أكاديمية العلوم الفرنسية سنة 1850 م .

وأثبت الروسي فيريمانوف سنة 1893 صحة المبرهنة فيما عندما $n = 37$ ، ثم أثبت في 1905 صحة تلك المبرهنة لكل $n \leq 257$.

وأثبت فايفريش (Wieferich) في 1909 أنه إذا وجد حل للمعادلة $x^n + y^n = z^n$ وكل من x, y, z لا يقبل القسمة على n (والتي تسمى الحالة الأولى من مبرهنة فيرما)، فإن $2^n \equiv 2 \pmod{n^2}$ و n عدد أولي .

ثم أثبت كل من ميريمانوف وفروبينيوس (Frobenios) و فانديفر (Vandiver) و پولكزك (Pollackzek) و موريشيما (Morishima) و روسر (Rosser) أنه إذا وجد حل للحالة الأولى من مبرهنة فيرما الأخيرة فإن

$$q^n \equiv q \pmod{n^2} \text{ ، } q = 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43$$

وباستخدام تلك النتائج أثبت الفرنسي لمير (Lehmers) صحة الحالة الأولى من مبرهنة فيرما لكل الأعداد الأولية $n < 2537 47889$.

وفي سنة 1905م وضع اليابانيان شيمورا و تانياما تخميناً (Shimura - Taniyama Conjecture) حول المنحنيات الجبرية الأهلبياحية أو الناقصة (Elliptic curves) وهي منحنيات من النوع $y^2 = ax^3 + bx + c$ ينص على أن " كل المنحنيات الناقصة على Q منحنيات أولية أو قياسية (Modular curves) .

وفي سنة ١٩٨٣م أثبت فلاتنج (Flatings) ، أن لكل $n > 2$ يوجد على الأكثر عدد منتهى من الأعداد الأولية نسبياً مع x, y, z بحيث أن $x^n + y^n = z^n$. لكن فلاتنج لم يستطع أن يثبت في جميع الحالات بأن هذا العدد المنتهي هو الصفر .

وفي سنة ١٩٨٥ وضّح فري (Fery) العلاقة بين تخمين شيمورا - تانياما ومبرهنة فيرما الأخيرة بإثباته أمكانياً إيجاد أو بناء منحنى ناقص غير قياسي سُمي فيما بعد منحنى فري (Frey curve) . لاحظ أن فري لم يبرهن على أن هذا المنحنى غير قياسي (not modular) ، بل أثبت ذلك كين ريبب (Ken Ribet) من بركلي منح عليه جائزة فيرما سنة ١٩٨٩م .

وفي سنة ١٩٨٧م اقترح الفرنسي سار (Serre) وصفاً عاماً لجميع تمثيلات زمر جالوا الثنائية البعد على الحقول المنتهية بدلالة الأشكال أو الدوال المستدقة أو الهلالية (cusp form) " نوع خاص من الدوال يضمحل عند المالانهاية $(f(\infty) = 0)$ " . ثم وضع التخمين الآتي (Serre conjecture) :

كل تمثيل غير قابل للتحليل (irreducible Representation) من الشكل

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n)e^{2\pi n i z} , \quad a(1) = 1 \text{ ، يكون قياسياً .}$$

وبين سار أن صحة هذا التخمين تثبت صحة تخمين شيمورا - تانياما من جهه ، كما يثبت صحة مبرهنة فيرما الأخيرة .

وفي سنة ١٩٩٣م أثبت الإنجليزي أندرو ويلس (A. Wiles) صحة حدس شيمورا - تانياما للمنحنيات الناقصية شبه المستدقة (Semi-stable curves) وأثبت صحتها بصورة عامة ، ريبب من بركلي سنة ١٩٩٩م ، وفي سنة ١٩٩٤م وبمساعدة الإنجليزي تيلور (R. Taylor) من كمبرج ، أثبت ويلس صحة مبرهنة فيرما الأخيرة ومنح على ذلك ميدالية فيلد في الرياضيات سنة ١٩٩٥م .

وسنركز اهتمامنا في هذا الجزء على إثبات مبرهنة فيرما الأخيرة لكل $n \geq 4$ ، إضافة إلى الحالة $x^3 + y^3 = z^3$.

$$\underline{\underline{1-3-7}} : \text{المعادلة } x^4 + y^4 = z^4$$

لكي نثبت مبرهنة فيرما لكل $n \geq 4$ نثبت أن $x^4 + y^4 = z^4$ لا تملك حلاً في Z^+ ، باستخدام طريقة فيرما " طريق الإنحدار أو النزول اللانهائي (Infinite Descent) والتي تتلخص بما يأتي :

لإثبات استحالة علاقة على مجموعة الأعداد الطبيعية N ، نفرض وجود مجموعة $S \subseteq N$ ، $S \neq \emptyset$ تحقق تلك العلاقة ، إذا S تحوي عنصر أصغر a ثم نبرهن على وجود عنصر آخر في S أصغر من a فنحصل على تناقض وبذلك يتم البرهان .

والآن إلى المبرهنة الآتية .

مبرهنة 1-3-7 :

لا يوجد حل في Z للمعادلة الديوفانتية

$$xyz \neq 0 , x^4 + y^4 = z^2 \quad \dots (1)$$

البرهان :

لإثبات عدم وجود حل للمعادلة (1) في Z ، يكفي أن نبرهن على عدم وجود حل لها في Z^+ . ولإثبات ذلك نفرض أن

$$S = \{z \in Z \mid x^4 + y^4 = z^2 , x, y \in Z^+\} \neq \emptyset$$

إذا S مجموعة جزئية غير خالية من N ، وعليه فإن S تحوي عنصر أصغر مثل u حسب قاعدة الترتيب الجيد . إذا $x^4 + y^4 = u^2$.

يمكن أن نفرض أن $(x, y, u) = 1$ ، لأنه إذا كان $(x, y, u) \neq 1$ نقسم علي القاسم المشترك الأعظم للأعداد x, y, u ، فنتحول إلى أعداد أوليه نسبياً .

إذا $(x, y) = 1$ ، وعليه فإن واحداً منها عدد فردي ، وبالتالي فإن

$$u^2 = x^4 + y^4 \equiv 1 \pmod{4} \text{ أو } u^2 = x^4 + y^4 \equiv 2 \pmod{4}$$

لكن $u^2 \equiv 2 \pmod{4}$ ، لكل $u \in \mathbb{Z}_4^* = \{1, 2, 3\}$ ، إذا $u^2 \equiv 1 \pmod{4}$ ، وعليه فإن u عدد فردي ، وأما x أو y عدد زوجي . فإذا فرضنا أن x عدد

زوجي ، فإن (x^2, y^2, u) ثلاثي فيثاغورس بدائي وعليه يوجد $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ، $a > b > 0$ ، $(a, b) = 1$ ، $a \not\equiv b \pmod{2}$ بحيث أن

$$x^2 = 2ab , y^2 = a^2 - b^2 , u = a^2 + b^2$$

والآن إذا كان a عدداً زوجياً و b عدداً فردياً ، فإن $y^2 \equiv -1 \pmod{4}$ وهذا غير ممكن . إذا a عدد فردي و b عدد زوجي ، وعليه فإن $b = 2c$ ، وبالتالي

فإن $x^2 = 4ac$ ، وعليه فإن $(\frac{x}{2})^2 = ac$ ، $(a, c) = 1$ ، إذا يوجد $e, d \in \mathbb{Z}^+$ ،

بحيث أن $a = d^2$ ، $c = e^2$ ، $(d, e) = 1$ ، حسب مبرهنة (٧-٢-٤) ، إذا d عدد فردي ، وعليه فإن $u = a^2 + b^2 = d^4 - 4e^4$ ، $y^2 = a^2 - b^2 = d^4 - 4e^4$ ، ومنها نجد أن

$(2e^2, y, d^2) = 1$ ، كما أن $(2e^2) + y^2 = (d^2)^2$ ، $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ، وعليه يوجد $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ، $(2e^2) + y^2 = (d^2)^2$ ، $2e^2 = 2mn$ ، $d^2 = m^2 + n^2$ ، $(m, n) = 1$ ، $m > n$ بحيث أن

لكن $e^2 = mn$ ، $(m, n) = 1$ ، إذا يوجد $r, s \in \mathbb{Z}^+$ ، بحيث أن $m = r^2$ ، $n = s^2$ ، حسب مبرهنة (٧-٢-٤) ، وعليه فإن $r^4 + s^4 = d^2$. لكن

$d \in S$ و $d \leq d^2 = a \leq a^2 < a^2 + b^2 = u$ وهذا يناقض كون u عنصر أصغر في S . إذا $S = \emptyset$ ، وعليه لا يوجد حل للمعادلة $x^4 + y^4 = z^2$

في \mathbb{Z}^+ .

□

نتيجة (١) :

لا يوجد حل في Z للمعادلة $x^4 + y^4 = z^4$ ، $xyz \neq 0$.

البرهان :

نفرض أن $a, b, c \in Z$ حل للمعادلة $x^4 + y^4 = z^4$. إذاً a, b, c^2 حل للمعادلة $x^4 + y^4 = z^2$ وهذا يناقض ميرهنة (٧-٣-١) . إذاً لا يوجد حل للمعادلة $x^4 + y^4 = z^4$ في Z .

□

نتيجة (٢) :

إذا كان $n \setminus 4$ ، فلا يوجد حل في Z للمعادلة $x^n + y^n = z^n$ ، $xyz \neq 0$.

البرهان :

بما أن $m \geq 1$ ، $m = 4m$. إذاً $(x^m)^4 + (y^m)^4 = (z^m)^4$ $\Leftrightarrow x^n + y^n = z^n$ وعليه إذا كان $a, b, c \in Z$ حلاً للمعادلة $x^n + y^n = z^n$ ، فإن $a^m, b^m, c^m \in Z$ حل للمعادلة $x^4 + y^4 = z^4$ وهذا يناقض نتيجة (١) . إذاً لا يوجد حل في Z للمعادلة $x^n + y^n = z^n$ ، $xyz \neq 0$.

□

ميرهنة ٧-٣-٢ :

لا يوجد حل في Z للمعادلة

$$xyz \neq 0 \quad , \quad x^4 - y^4 = z^2 \quad \dots (2)$$

البرهان :

يكفي أن نبرهن على عدم وجود حل للمعادلة (2) في Z^+ ، ولإثبات ذلك نفرض أن $S = \{x \in Z^+ \mid x^4 - y^4 = z^2 \text{ , } y, z \in Z^+\} \neq \emptyset$. إذاً S مجموعة جزئية غير خالية من N ، وعليه فإن S تحوي عنصر أصغر وليكن u حسب قاعدة الترتيب الجيد . إذاً $u^4 - y^4 = z^2$ ، وعليه فإن $u^4 = y^4 + z^2$

والآن إذا كان $(u, y) = d > 1$ ، فإن $u = du_1$ ، $y = dy_1$ ، وعليه فإن $d^4(u_1^4 - y_1^4) = z^2$ ، وبالتالي فإن $d^2 \mid z$ ، وعليه فإن $z = d^2 z_1$ ، $z_1 \in Z^+$ إذا $u_1, y_1, z_1 \in Z^+$ حل للمعادلة (2) و $u_1 < u$ ، $u_1 \in S$ ، وهذا تناقض . إذا $(u, y) = 1$ و y عدد زوجي أو y عدد فردي .

(أ) إذا كان $(u, y) = 1$ و y عدداً زوجياً ، فإن

$$u^4 = y^4 + z^2 \Leftrightarrow (u^2)^2 = (y^2)^2 + z^2 , (u^2, y^2) = 1$$

(y^2, z, u^2) ثلاثي فيثاغورس بدائي ، وعليه يوجد $r, s \in Z^+$ ، $(r, s) = 1$ ، $r > s$ ، $r \not\equiv s \pmod{2}$ ، $u^2 = r^2 + s^2$ ، $z = r^2 - s^2$ ، $y^2 = 2rs$ حسب

مبرهنة (٧-٢-٥) . فإذا كان r زوجياً ، فإن s فردي . لكن

$(2r, s) = 1$ ، $y^2 = 2rs$ ، إذا يوجد $a, b \in Z^+$ ، بحيث أن $2r = a^2$ ،

$s = b^2$ حسب مبرهنة (٧-٢-٤) . لكن a عدد زوجي . إذا $a = 2c$ ،

$c \in Z^+$ ، وعليه فإن $r = 2c^2$ ، وبالتالي فإن

$u^2 = r^2 + s^2 = (2c^2)^2 + (b^2)^2$ ثلاثي فيثاغورس بدائي .

إذا يوجد $m, n \in Z^+$ ، $m > n$ ، $(m, n) = 1$ ، $m \not\equiv n \pmod{2}$ بحيث

أن $u^2 = m^2 + n^2$ ، $b^2 = m^2 - n^2$ ، $2c^2 = 2mn$ ، لكن $c^2 = mn$

$(m, n) = 1$ يعني وجود $e, f \in Z^+$ ، بحيث أن $m = e^2$ ، $n = f^2$ حسب

مبرهنة (٧-٢-٤) ، وعليه فإن $b^2 = e^4 - f^4$ وهذا يعني أن $x = e$ ،

$z = b$ ، $y = f$ حل للمعادلة (2) . لكن

$e = \sqrt{m} < m^2 + n^2 = u$ ، $e \in S$ يناقض قاعدة الترتيب الجيد . إذا لا

يوجد حل في الحالة .

(ب) إذا كان $(u, y) = 1$ و y عدداً فردياً ، فإن $(u^2, y^2) = 1$ و

$(u^2)^2 = z^2 + (y^2)^2$ ، ثلاثي فيثاغورس بدائي . إذا يوجد

$m, n \in Z^+$ ، $m > n$ ، $(m, n) = 1$ ، $m \not\equiv n \pmod{2}$ بحيث أن

$u^2 = m^2 + n^2$ ، $y^2 = m^2 - n^2$ ، $z = 2mn$ ، وعليه فإن

، $x = m$ وهذا يعني أن $m^4 - n^4 = (m^2 - n^2)(m^2 + n^2) = (yu)^2$
 $x = m < \sqrt{m^2 + n^2} = u$ كما أن حل للمعادلة (2) ، $y = n$ ، $z = uy$
 وهذا يناقض قاعدة الترتيب الجيد . إذا لا يوجد حل للمعادلة (2) .

□

نتيجة :

مساحة مثلث فيثاغورس ليست مربعاً كاملاً .

البرهان :

نفرض أن x, y طولاً ضلعي مثلث فيثاغورس و z طول وتره . ولنفرض أن
 مساحة هذا المثلث تساوي A . إذاً $A = \frac{1}{2}xy$. والآن لنفرض وجود $u \in \mathbb{Z}^+$
 بحيث أن $A = u^2$. إذاً $xy = 2u^2$ ، وعليه فإن $(2u)^2 = 4u^2 = 2xy$.
 لكن $x^2 + y^2 = z^2$. إذاً

$$x^2 - 2xy + y^2 = z^2 - 2xy \Leftrightarrow (x - y)^2 = z^2 - (2u)^2$$

$$x^2 + 2xy + y^2 = z^2 + 2xy \Leftrightarrow (x + y)^2 = z^2 + (2u)^2$$

وعليه فإن $(x - y)^2 (x + y)^2 = (x^2 - y^2)^2 = z^4 - (2u)^4$ ، ومنها نجد
 أن $a^4 - b^4 = c^4$ حل للمعادلة $a = z$ ، $b = 2u$ ، $c = x^2 - y^2$ وهذا يناقض
 مبرهنة (٧-٣-٢) . إذاً $A \neq u^2$.

□

٢-٣-٧ : المعادلة $xyz \neq 0$ ، $x^3 + y^3 = z^3$

لكي نبرهن على عدم وجود أعداد صحيحة غير صفرية x, y, z بحيث أن
 $x^3 + y^3 = z^3$ نحتاج إلى المفاهيم الآتية : الحلقة والحقل ، الأعداد الجبرية ،
 العناصر القابلة للإنعكاس ، العناصر المترادفة والعناصر الأولية في حلقة ،
 ونبدأ بالآتي :

تعريف ٧-٣-١ :

إذا كانت G مجموعة غير خالية و $*$ عملية ثنائية معرفة عليها ، فيقال عن $(G, *)$ أنها زمرة (Group) ، إذا كان :

(أ) $*$ عملية تجميعية أو دمجية (Associative) . أي أن
 $(a * b) * c = a * (a * c)$ لكل $a, b, c \in G$.

(ب) يوجد $e \in G$ بحيث أن $a * e = e * a = a$ لكل $a \in G$ يسمى e العنصر المحايد (Identity element) .

(ج) لكل $a \in G$ يوجد $b \in G$ بحيث أن $a * b = b * a = e$ يسمى b معكوس أو نظير (Inverse) a ويرمز له بالرمز a^{-1} .

ويقال عن زمرة $(G, *)$ أنها إبدالية أو أبيلية (Abelian or Commutative) إذا كان $a * b = b * a$ لكل $a, b \in G$.

مثال (١) :

(أ) كل من $(Z, +)$ ، $(R, +)$ ، $(Q, +)$ ، (R^*, \cdot) ، (Q^*, \cdot) ، (C^*, \cdot) زمرة إبدالية .

(ب) كل من $(N, +)$ ، (Z, \cdot) ، ليس زمرة .

(ج) إذا كان $G = (Z_n, \oplus)$ حيث $[a] \oplus [b] = [a + b]$ لكل $[a], [b] \in Z_n$ ، فإن G زمرة إبدالية .

(د) $G = \left(\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in R, ad - bc \neq 0 \right\}, \cdot \right)$ هي عملية ضرب المصفوفات ، فإن G زمرة ليست إبدالية .

تعريف ٧-٣-٢ :

إذا كان R مجموعة غير خالية ، $+$ ، \cdot عمليتين ثنائيتين معرفتين على R ، فيقال عن $(R, +, \cdot)$ أنها حلقة (Ring) ، إذا كانت :

(أ) $(R, +)$ زمرة إبدالية .

(ب) $a, b, c \in R$ لكل $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

(ج) $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ ، $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ لكل

$a, b, c \in R$

ويقال عن حلقة $(R, +, \cdot)$ أنها إبدالية، إذا كان $a \cdot b = b \cdot a$ لكل $a \in R$

ويقال عن حلقة $(R, +, \cdot)$ أنها ذات عنصر محايد إذا وجد $1 \in R$ بحيث أن

$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ لكل $a \in R$

مثال (٢) :

(أ) كل من $(Z, +, \cdot)$ ، $(R, +, \cdot)$ ، $(Q, +, \cdot)$ حلقة إبدالية ذات عنصر

محايد .

(ب) إذا كانت $R = (Z_n, \oplus, \odot)$ ، $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ،

فإن حلقة R ، $a \odot b = (a \cdot b) \bmod n$ ، $a \oplus b = (a + b) \bmod n$

إبدالية ذات عنصر محايد .

(ج) إذا كان $Z(i) = \{a + bi \mid a, b \in Z, i^2 = -1\}$ حيث لكل

$x = a + bi \in R$ ، $y = c + di$ ، $x + y = (a + c) + (b + d)i$ ،

فإن حلقة إبدالية ذات عنصر

محايد . تسمى $Z(i)$ أعداد جاوس (Gaussian integers) .

تعريف ٧-٣-٣ :

إذا كان R حلقة ، فيقال عن $a \in R$ ، $a \neq 0$ أنه قاسم صفري (Zero divisor) إذا

وجد $b \in R$ ، $b \neq 0$ بحيث أن $ab = ba = 0$.

مثال (٣) :

(أ) إذا كانت $R = (Z_6, \oplus, \odot)$ ، فإن كلاً من 2, 3, 4 قاسم صفري ، لأن

$4 \odot 3 = 3 \odot 4 = 0$ ، $2 \odot 3 = 3 \odot 2 = 0$

(ب) كل من الحلقات (Z_3, \oplus, \odot) ، (Z, \oplus, \cdot) ، $(Q, +, \cdot)$ ، $(R, +, \cdot)$ ،

$(Z(i), +, \cdot)$ ، لا تحوي قواسم صفرية .

تعريف ٧-٣-٤ :

يقال عن حلقة إبدالية ذات عنصر محايد أنها منطقة صحيحة Integral domain ، إذا كانت خالية من القواسم الصفرية .

مثال (٤) :

(أ) كل من $(Z, +, \cdot)$ ، $(Q, +, \cdot)$ ، $(R, +, \cdot)$ ، $(Z(i), +, \cdot)$ ، $(C, +, \cdot)$ ، (Z_p, \oplus, \odot) حيث p عدد أولي منطقة صحيحة .

(ب) $R = (Z(\sqrt{-3}) = \{a + b\sqrt{-3} | a, b \in Z\}, +, \cdot)$ حيث لكل $x = a + b\sqrt{-3}$ ، $y = c + d\sqrt{-3}$ ، $x + y = (a + c) + (b + d)\sqrt{-3}$ ، $xy = (ac - 3bd) + (ad + bc)\sqrt{-3}$ منطقة صحيحة .

تعريف ٧-٣-٥ :

يقال عن منطقة صحيحة F أنها حقل (Field) ، إذا كان لكل عنصر غير صفري معكوس ضربي . لاحظ أن

$(F, +, \cdot)$ حقل إذا فقط كان $(F, +)$ زمرة إبدالية و $(F, *, \cdot)$ زمرة إبدالية والضرب توزيعي على الجمع .

مثال (٥) :

(أ) كل من (Z_p, \oplus, \odot) حيث p عدد أولي ، $(Q, +, \cdot)$ ، $(R, +, \cdot)$ ، $(C, +, \cdot)$ حقل .

(ب) إذا كان p عدداً أولياً ، فإن

$$F = (Q(\sqrt{p}) = \{a + b\sqrt{p} | a, b \in Q\}, +, \cdot)$$

حيث لكل $x = a + b\sqrt{p}$ ، $y = c + d\sqrt{p}$ ، $x + y = (a + c) + (b + d)\sqrt{p}$ ، $xy = (ac + bdp) + (ad + bc)\sqrt{p}$ حقل بينما $(Z(\sqrt{p}), +, \cdot)$ ليس حقلاً .

(ج) $F_1 = (\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}, +, \cdot)$ حقل ، كما أن

$F_2 = (\mathbb{Q}\sqrt{-3} = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}, +, \cdot)$ ، حيث لكل

$$x + y = (a + c) + (b + d)\sqrt{-3}, y = c + d\sqrt{-3}, x = a + b\sqrt{-3} \in F_2$$

$$\cdot xy = (ac - 3bd) + (ad + bc)\sqrt{-3} \text{ حقل .}$$

تعريف ٧-٣-٦ :

يقال عن $r \in \mathbb{C}$ أنه عدد جبري (Algebraic Number) إذا كان r جذراً

$$\cdot f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$$

وإذا كان $a_0 = 1$ يسمى r عدداً صحيحاً جبرياً (Algebraic integer) .

مثال (٦) :

(أ) أي عدد نسبي هو عدد جبري ، لأنه إذا كان $r = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ ، فإن r جذر

$$\cdot f(x) = bx - a \in \mathbb{Z}[x]$$

(ب) إذا كان $r \in \mathbb{Z}$ ، فإن r عدد صحيح جبري ، لأن جذر لكثيرة الحدود

$$f(x) = x - r \in \mathbb{Z}[x]$$

النسبية (Rational integers) .

(ج) $r = i \in \mathbb{C}$ عدد صحيح جبري ، لأن i جذر لكثيرة الحدود

$$\cdot f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{Z}[x]$$

(د) $r = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2} \in \mathbb{C}$ عدد صحيح جبري ، لأن r جذر لكثيرة الحدود

$$\cdot f(x) = x^2 - x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$$

(هـ) $r = \frac{i}{2} \in \mathbb{C}$ عدد جبري لكنه ليس عدداً صحيحاً جبرياً ، لأن r جذر

$$\cdot f(x) = 4x^2 + 1 \in \mathbb{Z}[x]$$

ملاحظة :

أن مجموعة الأعداد الجبرية مع عمليتي الجمع والضرب تكون حقلاً أما مجموعة الأعداد الصحيحة الجبرية مع عمليتي الجمع والضرب تكون حلقه .

تعريف ٧-٣-٧ :

إذا كان m صحيحاً ليس مربعاً كاملاً ، وكان
 $Q(\sqrt{m}) = (\{a + b\sqrt{m} \mid a, b \in Q\}, +, \cdot)$
 $x = a + b\sqrt{m} \in Q(\sqrt{m})$ فيعرف مقياس x (Norm) والذي يرمز له
 بالرمز $N(x)$ كالآتي :

$$N(x) = x\bar{x} = (a + b\sqrt{m})(a - b\sqrt{m}) = a^2 - mb^2$$

مثال (٧) :

- (أ) ليكن $F = (Q(i), +, \cdot)$ ، $x = a + ib \in F$ ، إذاً $N(x) = a^2 + b^2$.
- (ب) $F = (Q(\sqrt{2}), +, \cdot)$ ، $x = a + b\sqrt{2}$ ، فإن $N(x) = a^2 - 2b^2$.
- (ج) $F = (Q(\sqrt{-3}), +, \cdot)$ ، $x = a + b\sqrt{-3}$ ، فإن $N(x) = a^2 + 3b^2$.

تعريف ٧-٣-٨ :

يقال عن عدد صحيح جبري $r \in Q(\sqrt{m})$ أنه قابل للإنعكاس
 (invertible or unit) ، إذا كان $\frac{1}{r}$ عدداً صحيحاً جبرياً .
 إذاً $r \in Q(\sqrt{m})$ قابل للإنعكاس إذاً وإذا فقط كان $N(r) = \mp 1$ وسنرمز
 لمجموعة العناصر القابلة للإنعكاس في $Q(\sqrt{m})$ بالرمز R^\times .

مثال (٨) :

- (أ) إذا كان $F = (Q(i), +, \cdot)$ ، فإن $R^\times = \{-1, 1, i, -i\}$.
- (ب) إذا كان $F = (Q(\sqrt{2}), +, \cdot)$ ، فإن $R^\times = \{(\sqrt{2} + 1)^n \mid n \in Z\}$.
- (ج) إذا كان $F = (Q(\sqrt{-3}), +, \cdot)$ ، فإن $R^\times = \{\mp 1, \frac{1 \mp \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 \mp \sqrt{3}i}{2}\}$.

تعريف ٧-٣-٩ :

يقال عن عنصرين $a, b \in R$ أنهما مترادفان أو متصاحبان أو متشاركان (Associated elements) إذا كان $a = bu$ ، حيث u عنصر قابل للإنعكاس في R

مثال (٩) :

(أ) إذا كان $F = (Z, +, \cdot)$ ، فإن $a \in R$ فإن \bar{a} يرادف a ، لأن $R^\times = \{-1, 1\}$ و $a = a \cdot 1$ أو $a = (-a)(-1)$.

(ب) إذا كانت $F = (Q(i), +, \cdot)$ ، فإن $R^\times = \{-1, 1, i, -i\}$ ، وعليه فإن $a + bi$ ، $-a - bi$ ، $-b + ai$ ، $b - ai$ عناصر مترادفة .

(ج) إذا كانت $F = (Q(\sqrt{-3}), +, \cdot)$ ، فإن $\theta = \sqrt{-3}$ تـصاحب $\bar{\theta} = -\sqrt{-3}$ ، حيث $\bar{\theta}(1 - w)$ ، $\bar{\theta}(1 - w^2)$ ، $\bar{\theta}(w - w^2) = \bar{\theta}\sqrt{-3}$.
 $w = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}$

تعريف ٧-٣-١٠ :

إذا كانت R حلقة فيقال عن $p \in R$ أنه عنصر أولي (Prime element)، إذا كان (أ) $p \neq 0$ ، p غير قابل للإنعكاس .

(ب) إذا كان $p \mid ab$ ، فإن $p \mid a$ أو $p \mid b$.

ملاحظة : إذا كان $N(p) = \bar{p}p$ ، p عدد أولي ، فإن p عنصر أولي .

مثال (١٠) :

(أ) $\sqrt{-3} \in Q(\sqrt{-3})$ عدد صحيح جبري و $\sqrt{-3}$ عنصر أولي ، لأن $N(-3) = 3$ عدد أولي بينما $2 \in Q(\sqrt{-3})$ ليس عدداً أولياً ، لأن $N(2) = 4$ عدد غير أولي .

والآن إلى المبرهنات الآتية ، والتي فيها $\theta = \sqrt{-3}$.

مبرهنة ٧-٣-٣:

إذا كانت $x \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ عدداً صحيحاً جبرياً ، فإن $x \equiv 0 \pmod{\theta}$ أو $x \equiv 1 \pmod{\theta}$ أو $x \equiv -1 \pmod{\theta}$.

البرهان:

بما أن $x = \frac{a+b\theta}{2}$ ، حيث $a, b \in \mathbb{Z}$ ، وكل من a, b عدد زوجي أو كل من a, b عدد فردي . إذاً

$$\frac{a+b\theta}{2} = \frac{(b+a\theta)\theta}{2} + 2a \equiv 2a \pmod{\theta}$$

لكن $2a \equiv 0, 1, -1 \pmod{3}$ و $\theta \nmid 3$. إذاً $x \equiv 0, 1, -1 \pmod{\theta}$.

□

مبرهنة ٧-٣-٤:

ليكن كلاً من $x, y \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ عدداً جبرياً لا يقبل القسمة على θ .

- (أ) إذا كان $x \equiv 1 \pmod{\theta}$ ، فإن $x^3 \equiv 1 \pmod{\theta^4}$.
 (ب) إذا كان $x \equiv -1 \pmod{\theta}$ ، فإن $x^3 \equiv -1 \pmod{\theta^4}$.
 (ج) إذا كان $x^3 + y^3 \equiv 0 \pmod{\theta}$ ، فإن $x^3 + y^3 \equiv 0 \pmod{\theta^4}$.
 (د) إذا كان $x^3 - y^3 \equiv 0 \pmod{\theta}$ ، فإن $x^3 - y^3 \equiv 0 \pmod{\theta^4}$.

البرهان:

بما أن $x \equiv \pm 1 \pmod{\theta}$ حسب مبرهنة (٧-٣-٣) . إذاً

(أ) إذا كان $x \equiv 1 \pmod{\theta}$ ، فإن $x = 1 + b\theta$ ، $b \in \mathbb{Z}$ ، وعليه فإن

$$\begin{aligned} x^3 &= (1+b\theta)^3 = 1 + 3b\theta - 9b^2\theta^2 + b^3\theta^3 \\ &\equiv 1 + 3b\theta + b^3\theta^3 \pmod{\theta^4} \end{aligned}$$

لكن $\theta \nmid b(b-1)(b+1)$ حسب مبرهنة (٧-٣-٣) . إذاً

$$x^3 \equiv 1 \pmod{\theta^4}$$

(ب) إذا كان $x \equiv -1 \pmod{\theta}$ ، فإن $-x \equiv 1 \pmod{\theta}$ ، وعليه فإن $(-x)^3 \equiv 1 \pmod{\theta^4}$ ، وبالتالي فإن $x^3 \equiv -1 \pmod{\theta^4}$.

(ج) بما أن $\theta \nmid x(x-1)(x+1)$. إذاً $x^3 \equiv x \pmod{\theta}$ ، وعليه فإن $x^3 + y^3 \equiv 0 \pmod{\theta}$ يعني أن $x + y \equiv 0 \pmod{\theta}$. فإذا كان $x \equiv 1 \pmod{\theta}$ ، فإن $y \equiv -1 \pmod{\theta}$ ، وعليه فإن $x^3 + y^3 \equiv 0 \pmod{\theta^4}$.

(د) إذا كان $x^3 - y^3 \equiv 0 \pmod{\theta}$ ، فإن $x^3 + (-y)^3 \equiv 0 \pmod{\theta}$ ، وعليه فإن $x^3 + (-y)^3 \equiv 0 \pmod{\theta^4}$ ومنها نجد أن $x^3 - y^3 \equiv 0 \pmod{\theta^4}$.

□

مبرهنة ٧-٣-٥:

لتكن $a, b, c \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ أعداداً صحيحة جبرية ، $a^3 + b^3 + c^3 = 0$. إذا كان $(a, b, c) = 1$ ، فإن واحداً فقط من الأعداد a, b, c يقبل القسمة على θ .

البرهان :

نفرض أن كلاً من a, b, c لا يقبل القسمة على θ . إذاً $0 = a^3 + b^3 + c^3 \equiv \mp 1 \mp 1 \mp 1 \pmod{\theta^4}$ حسب مبرهنة (٧-٣-٤) . وعليه فإن θ^4 قاسم إلى $1, 3, -1$ أو -3 . لكن $\theta^4 = 9$. إذاً واحد على الأقل من a, b, c يقبل القسمة على θ .

وإذا فرضنا أن اثنين من a, b, c يقبل القسمة على θ ، فإن ذلك يعني أن العدد الثالث يقبل القسمة على θ ، وبالتالي فإن $(a, b, c) \neq 1$ ، وهذا خلاف الفرض . إذاً واحد فقط من الأعداد a, b, c يقبل القسمة على θ .

□

مبرهنة ٧-٣-٦:

لتكن $a, b, c \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ أعداد صحيحة جبرية ، $\theta \nmid abc$ وليكن $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ عنصريين قابلين للإنعكاس ، $n \in \mathbb{Z}^+$ ، $n \geq 2$ ، $\alpha = \bar{1}$ ، فإن $a^3 + \alpha b^3 + \beta(\theta^n c)^3 = 0$

البرهان :

بما أن $n > 2$. إذاً $a^3 + \alpha b^3 \equiv 0 \pmod{\theta^3}$ ، وعليه فإن $a^3 + \alpha b^3 \equiv \bar{1} + \alpha(\bar{1}) \equiv 0 \pmod{\theta^3}$ حسب مبرهنة (٧-٣-٤) . لكن

$$\alpha \in \{\bar{1}, \bar{w}, \bar{w}^2 \mid w = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}\} \text{ إذاً .}$$

$$\bar{1} + \alpha(\bar{1}) \in S = \{-2, 0, 2, \bar{1}(1 + \bar{w}), \bar{1}(1 + \bar{w}^2)\}$$

لكن θ^3 لا تقسم أيّاً من عناصر S ما عدا الصفر ، لأن $(1 - w)$ ، $(1 - w^2)$ ، $1 + w = -w^2$ و $1 + w^2 = -w$ عناصر قابلة للإنعكاس و $N(\bar{1}) = 4$ بينما $N(\theta^3) = 27$. إذاً $\bar{1} + \alpha(\bar{1}) = 0$ ، وعليه فإن $\alpha = \bar{1}$. لكن $a^3 + \alpha b^3 \equiv 0 \pmod{\theta^3}$ يعني أن $a^3 + \alpha b^3 \equiv 0 \pmod{\theta^4}$ ، وعليه فإن $\beta(\theta^n c)^3 \equiv 0 \pmod{\theta^4}$ ومنها نجد أن $n \geq 2$.
□

مبرهنة ٧-٣-٧:

لا توجد $a, b, c \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ وعنصر قابل للإنعكاس $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ و $n \geq 2$ بحيث أن

$$a^3 + b^3 + \alpha(\theta^n c)^3 = 0 \quad \dots (1)$$

البرهان :

يمكن أن نفرض أن $(a, b, \theta^n c) = 1$ و $\theta \nmid c$ ، $\theta \nmid a, b$ ، لذا يمكن أن نفرض أن $\theta \nmid b$.

والآن لنفرض وجود أعداد صحيحة تحقق المعادلة (1) وأن S هي مجموعة تلك الأعداد . وحيث أن $N(x) > 0$ لكل $x \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ ، $N(\alpha) = 1$. إذاً يمكننا أن نختار مجموعة T بحيث أن

$$T = \{a, b, c \in S \mid \text{أقل ما يمكن } N(a^3 b^3 \theta^{3n} c^3)\}$$

لكن $n \geq 2$. إذاً $a^3 + b^3 \equiv 0 \pmod{\theta^6}$ ، كما أن

$$w = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} , a^3 + b^3 = (a + b)(a + wb)(a + w^2b) \dots (2)$$

سنبرهن على أن أي عدد أولي p يقسم أي اثنين من $a + b, a + bw, a + bw^2$ يرادف θ . ولإثبات ذلك لاحظ أن إذا كان $p \mid (a + b)$ و $p \mid (a + bw)$ ، فإن $p \mid b(1 - w)$ و $p \mid a(1 - w)$ ، لكن $(a, b) = 1$ و $(1 - w)$ يرادف θ .

وإذا كان $p \mid (a + b)$ و $p \mid (a + bw^2)$ ، فإن $p \mid (1 - w^2)b$ و $p \mid (1 - w^2)a$ ، وعليه فإن $p \mid (1 - w^2)$ ، وبالتالي فإن $p \mid \theta$.

أما إذا كان $p \mid (a + bw)$ و $p \mid (a + bw^2)$ ، فإن $p \mid (w - w^2)b$ و $p \mid (w - w^2)a$ ، وعليه فإن $p \mid \theta$. وبما أن $\theta \nmid b$ و $\theta \nmid a$

$$\dots (3) \quad \theta \text{ ترادف } \bar{\theta} \text{ ، } \bar{\theta} \mid (w - w^2) , \bar{\theta} \mid (1 - w^2) , \bar{\theta} \mid (1 - w)$$

إذاً الفروق بين $a + w^2, a + bw, a + b$ تقبل القسمة على θ لكنها لا تقبل القسمة على θ^2 ، كما أن $\theta^2 \nmid (a + b)(a + bw)(a + bw^2)$.

وبليه إذا كان $\theta^r, \theta^s, \theta^t$ هي أكبر القوى للعدد θ التي تقسم $a + b, a + bw, a + bw^2$ على التوالي ، فإن (1) تعني أن $r, s, t \in \{1, 1, 3n - 2\}$ و أعداد صحيحة في

$\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ لا يوجد بينها قاسم أولي وبتطبيق (3) ، نجد أن

$$\frac{a + b}{\theta^r} \cdot \frac{a + bw}{\theta^s} \cdot \frac{a + bw^2}{\theta^t} = -\alpha c^3 \dots (4)$$

وعليه فإن أي عامل من عوامل الطرف الأيسر في (4) يرادف مكعب عدد صحيح . إذاً

$$a + b = \alpha_1 \theta^r \lambda_1^3, a + bw = \alpha_2 \theta^s \lambda_2^3, a + bw^2 = \alpha_3 \theta^t \lambda_3^3 \quad \dots (5)$$

حيث $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ عناصر قابلة للإنعكاس . لكن

$$(a + b) + w(a + bw) + w^2(a + bw^2) = (a + b)(1 + w + w^2) = 0$$

إذاً

$$\alpha_1 \theta^r \lambda_1^3 + \alpha_4 \theta^s \lambda_2^3 + \alpha_5 \theta^t \lambda_3^3 = 0 \quad \dots (6)$$

حيث $\alpha_5 = w^2 \alpha_3, \alpha_4 = w \alpha_2$ ، وعليه فإن α_4, α_5 عناصر قابلة للإنعكاس ، وبالتالي يمكن أن تأخذ r, s, t القيم $1, 1, 3n - 2$ بأي ترتيب كان لذلك يمكن أن نفرض أن $r = 1, s = 1, t = 3n - 2$. وبالتعويض في (6) والقسمة على $\alpha_1 \theta$ نجد أن

$$\lambda_1^3 + \alpha_6 \lambda_2^3 + \alpha_7 (\theta^{n-1} \lambda_3)^3 = 0 \quad \dots (7)$$

حيث $\alpha_6 = \frac{\alpha_4}{\alpha_1}, \alpha_7 = \frac{\alpha_5}{\alpha_1}$ عناصر قابلة للإنعكاس . لكن $c \neq 0$ ، إذاً $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0$ ، كما أن $\theta + \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$. إذاً $\alpha_6 = \mp 1$ ، $(n-1) \geq 2$ حسب مبرهنة (7-3-7) . لكن للمعادلة (7) نفس شكل المعادلة (1) ، لأن

$$\alpha_6 \lambda_2^3 = (-\lambda_2)^3 \text{ أو } \alpha_6 \lambda_2^3 = \lambda_2^3$$

وحيث أن $N(\theta) = 3, N(a) \geq 1, N(b) \geq 1$. إذاً من (4) ، (5) نجد أن $r + s + t = 3n$ و

$$\begin{aligned} N(\lambda_1^3 \lambda_2^3 \theta^{3n-3} \lambda_3^3) &= N(\theta^{-3}(a+b)(a+bw)(a+bw^2)) \\ &= N(\theta^{3n-3} \cdot c^3) < N(a^3 b^3 \theta^{3n} c^3) \end{aligned}$$

وهذا يناقض كون $N(a^3 b^3 \theta^{3n} c^3)$ أقل ما يمكن .

□

لا توجد أعداد صحيحة غير صفرية $a, b, c \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ بحيث أن $a^3 + b^3 + c^3 = 0$. ولا توجد أعداد صحيحة غير صفرية $x, y, z \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ بحيث أن $x^3 + y^3 = z^3$.

البرهان :

نفرض وجود أعداد صحيحة $a, b, c \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ ، بحيث أن $a^3 + b^3 + c^3 = 0$ ، ولنفرض أن $(a, b, c) = 1$. إذاً بتطبيق مبرهنة (٧-٣-٥) ، نجد أن واحداً فقط من الأعداد a, b, c يقبل القسمة على θ ، ولنفرض أنه c ، كما أن θ^n هي أكبر قوة للعدد θ بحيث أن $c \mid \theta^n$. إذاً $c = \theta^n \cdot r$ و $\theta \nmid r$ ، لكن $n \geq 2$ حسب مبرهنة (٧-٣-٦) و $(a^3 + b^3 + (0^3 r)^3) = 0$ وهذا يناقض مبرهنة (٧-٣-٧) . إذاً لا توجد أعداد صحيحة غير صفرية a, b, c بحيث أن $a^3 + b^3 + c^3 = 0$. لكن $x^3 + y^3 = z^3 \Leftrightarrow x^3 + y^3 + (-z)^3 = 0$. إذاً لا توجد أعداد صحيحة غير x, y, z بحيث أن $x^3 + y^3 = z^3$.

□

تمارين

(١) برهن على عدم وجود حل في \mathbb{Z} لكل من المعادلات الآتية :

(أ) $x^4 + 2y^4 = z^2$ ، (ب) $x^4 + 4y^4 = z^2$

(ج) $x^4 - y^4 = 2z^2$ ، (د) $x^4 - 4y^4 = z^2$

(٢) برهن على وجود عدد غير منتهي من الحلول في \mathbb{Z} للمعادلة

$$x^4 + y^4 = 2z^2$$

(٣) برهن على عدم وجود حل في \mathbb{Z} ، للنظام

(أ) $x^2 + y^2 = z^2$ و $x^2 - y^2 = w^2$ ، (ب) $x^2 + 2y^2 = w^2$ ، $x^2 + y^2 = z^2$

(٤) برهن على وجود عدد غير منتهي من الحلول في \mathbb{Z} ، للنظام

$$x^2 + y^2 = z^2 + 1 \text{ و } x^2 - y^2 = w^2 + 1$$

٧-٤ : مجموع مربعين أو أكثر Sum of two or more than two squares

بدأت دراسة مسألة تحليل عدد طبيعي إلى مجموع مربعات أعداد طبيعية من قبل ديوفانتس ، وطورت من قبل الرياضيين العرب في القرن العاشر للميلاد .

وُدُس تمثيل الأعداد الأولية على شكل مجموع مربعات من قبل الفرنسيان باشيه وفيرما . وسنركز اهتمامنا في هذا الجزء على أثبات بعض قضايا الخازن ومبرهنة جيرارد - فيرما " يمكن التعبير عن عدد أولي فردي p كمجموع مربعين إذا وإذا فقط كان $p \equiv 1 \pmod{4}$ ، ثم نثبت أنه إذا كان $n = k^2 m$ عدد صحيحاً موجباً وكان m ليس مربعاً ، فيمكن التعبير عن n كمجموع مربعين إذا وإذا فقط كانت جميع القواسم الأولية للعدد m ليست على الشكل $4t + 3$ ، ثم ندرس كيفية التعبير عن عدد طبيعي كمجموع أربعة مربعات والتي بدأت دون إثبات مع باشيه ، ثم أثبتت من قبل لاجرانج وأويلر .

ونبدأ بالقضية الآتية والتي أثبت من قبل أبو جعفر الخازن في القرن العاشر للميلاد .

قضية ٧-٤-١ : " الخازن "

إذا كان $m = a^2 + b^2$ ، $n = c^2 + d^2$ عددين طبيعيين ، فيمكن التعبير عن $m n$ كمجموع مربعين بشكلين مختلفين .

البرهان :

بما أن $m = a^2 + b^2$ و $n = c^2 + d^2$. إذاً

$$\begin{aligned} m n &= (a^2 + b^2) (c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ab - bc)^2 \\ &= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \end{aligned}$$

□

مثال (١) :

(أ) بما أن $5 = 2^2 + 1^2$ ، $13 = 2^2 + 3^2$. إذاً

$$\begin{aligned} 65 &= 5 \cdot 13 = (4 + 3)^2 + (6 - 2)^2 = 7^2 + 4^2 \\ &= (4 - 3)^2 + (6 - 2)^2 = 1^2 + 8^2 \end{aligned}$$

$$(ب) \text{ بما أن } 17 = 4^2 + 1^2, 29 = 5^2 + 2^2 \text{ إذاً}$$

$$493 = 7 \cdot 29 = (4^2 + 1^2)(5^2 + 2^2) = (20 + 2)^2 + (8 - 5)^2 = (22)^2 + 3^2$$

$$= (20 - 2)^2 + (8 + 5)^2 = (18)^2 + (13)^2$$

والآن إلى القضية الآتية التي تعود إلى النوريجي ثو "Thue، ١٩٢٢-١٨٦٣".

مبرهنة ٧-٤-٢:

إذا كان p عدداً أولياً ، $a \in \mathbb{Z}$ ، $(a, p) = 1$ ، فإن للتطابق الخطي
 $ax \equiv y \pmod{p}$ حل $x = b$ ، $y = c$ و $0 < |b| < \sqrt{p}$ ، $0 < |c| < \sqrt{p}$.

البرهان :

ليكن $k = [\sqrt{p}] + 1$ ، ولتكن $S = \{ax - b \mid 0 \leq x \leq k - 1, 0 \leq y \leq k - 1\}$ ،
 إذاً $|S| = k^2 > p$ ، وعليه يوجد على الأقل عنصرين $ax_1 - y_1, ax_2 - y_2 \in S$ ،
 " إذا وضع n من الأشياء في m من الصناديق وكان $n > m$ ، فإن أحد الصناديق
 يحوي على الأقل على شيئين منها " . إذاً $a(x_1 - x_2) \equiv y_1 - y_2 \pmod{p}$ ،
 وعليه فإن $c = y_1 - y_2$ ، $b = x_1 - x_2$ ، $ax \equiv y \pmod{p}$ حل للتطابق
 وإذا كان $c = 0$ ، فإن $(a, p) = 1$ ، $ab \equiv c \pmod{p}$ ، يعني أن $b = 0$.
 وإذا كان $b = 0$ ، فإن $(a, p) = 1$ يعني أن $c = 0$ وكلتا الحالتين تناقض كون
 $S \neq \{0\}$. إذاً $0 < |b| \leq (k - 1) < \sqrt{p}$ ، $0 < |c| \leq (k - 1) < \sqrt{p}$

□

والآن إلى المبرهنة الآتية التي تعود إلى كل من جيراد (١٥٩٥-١٦٣٢م) وفيرما
 والتي أثبتت من قبل أويلر سنة ١٧٥٤م .

مبرهنة ٧-٤-٣: " جيراد - فيرما "

يمكن التعبير عن أي عدد أولي فردي p كمجموع مربعين إذاً وإذا فقط كان

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

البرهان: " أويلر "

نفرض أن $p = a^2 + b^2$. إذاً $p \equiv a^2 + b^2 \pmod{4}$. لكن $k^2 \equiv 0 \vee 1$ لكل $k \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$. إذاً $a^2, b^2 \equiv 0 \vee 1 \pmod{4}$. لكن عدد فردي إذاً أما

$(a^2 \equiv 1 \pmod{4} \wedge b^2 \equiv 0 \pmod{4})$ أو $(a^2 \equiv 0 \pmod{4} \wedge b^2 \equiv 1 \pmod{4})$ وعليه فإن $p = (a^2 + b^2) \equiv 1 \pmod{4}$.

ولإثبات العكس نفرض أن $p \equiv 1 \pmod{4}$. إذاً $[(\frac{p-1}{2})!] + 1$ يقبل القسمة على p ، وعليه فإن $[(\frac{p-1}{2})!]^2 \equiv -1 \pmod{p}$ ، وهذا يعني وجود حل للتطابق $a^2 \equiv -1 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $(-1) \in R_p$. لكن $(a, p) = 1$. إذاً للتطابق $ax \equiv y \pmod{p}$ حل وليكن b, c و $0 < |b| < \sqrt{p}$ ، $0 < |c| < \sqrt{p}$ ، حسب قضية (٧-٤-٢) ، وعليه فإن $(ab)^2 \equiv a^2 b^2 \equiv -b^2 \pmod{p}$ ، ومنها نجد أن $b^2 + c^2 = kp$ ، $1 \leq k \in \mathbb{Z}$. لكن

$$kp = b^2 + c^2 = |b|^2 + |c|^2 < (\sqrt{p})^2 + (\sqrt{p})^2 = kp$$

إذاً $k < 2$. لكن $k \geq 1$. إذاً $k = 1$ ، وعليه فإن $p = b^2 + c^2$.

□

نتيجة :

إذا كان $p = 4m + 1$ عدداً أولياً ، فيمكن التعبير عن p بطريقة وحيدة كمجموع مربعين .

البرهان :

نفرض أن $p = a^2 + b^2 = c^2 + d^2$ ، حيث $a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+$. إذاً $ad \equiv bc \pmod{p}$ ، وعليه فإن $a^2 d^2 - b^2 c^2 = p(d^2 - b^2) \equiv 0 \pmod{p}$ أو $ad \equiv -bc \pmod{p}$. لكن كلاً من a, b, c, d أقل من \sqrt{p} . إذاً $ad - bc = 0$ أو $ad + bc = p$. فإذا كان $ad + bc = p$ ، فإن

$$p^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ad + bc)^2 + (ac - bd)^2 = p^2 + (ac - bd)^2$$

بعض المعادلات الديوفانتية

وعليه فإن $ac - bd = 0$ ومنها نجد أن $ac = bd$ ، وبالتالي فإن $ad = bc$ أو $ac = bd$. فإذا كان $ad = bc$ ، فإن $a \setminus bc$ و $(a,b) = 1$ يعني أن $a \setminus c$ ،
وعليه فإن $c = ar$ حيث $r \in \mathbb{Z}^+$ ، وبالتالي فإن $ad = bc = b(ar)$ ومنها نجد
أن $d = br$. لكن $p = c^2 + d^2 = r^2(a^2 + b^2)$ يعني أن $r = 1$.
إذاً $a = c$ و $b = d$. وإذا كان $ac = bd$ فبنفس الطريقة يمكن أن نثبت أن
 $a = d$ ، $b = c$ ، وعليه يمكن كتابة p بطريقة وحيدة كمجموع مربعين .

□

مثال (٢) :

$$(أ) \quad 17 = 4^2 + 1^2 \quad , \quad 17 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$(ب) \quad 5 = 2^2 + 1^2 \quad , \quad 5 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$(ج) \quad 29 = 5^2 + 2^2 \quad , \quad 29 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$(د) \quad 113 = 7^2 + 8^2 \quad , \quad 113 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$(هـ) \quad a, b \in \mathbb{Z} \quad \text{لكل} \quad 3 \neq a^2 + b^2 \quad , \quad 3 \not\equiv 1 \pmod{4}$$

وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي .

قضية ٧-٤-٤ :

لا يمكن التعبير عن العدد الأولي $p = 4m + 3$ ، $m \in \mathbb{Z}^+$ ، كمجموع مربعين .

البرهان :

بما أن $a \in \mathbb{Z}$ لكل $a \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$. إذاً $a^2 \equiv 0 \vee 1 \pmod{4}$ لكل $a \in \mathbb{Z}$ ،
وعليه فإن $a^2 + b^2 \equiv 0, 1, 2 \pmod{4}$. لكن $p = 4m + 3$. إذاً
 $a^2 + b^2 \neq p$.

□

مثال (٣) :

عبر عن العدد 85 كمجموع مربعين بشكلين مختلفين .

الحل :

- . بما أن $85 = 5 \cdot 17$ ، وكل من 5,17 أعداد أولية على الشكل $4m + 1$.
 إذا يمكن التعبير عن كل منها كمجموع مربعين حسب مبرهنة (٧-٤-٣) .
 وباستخدام قضية (٧-٤-١) ، نجد أن

$$85 = 5 \cdot 17 = (2^2 + 1^2)(4^2 + 1^2) = (8+1)^2 + (2-4)^2 = 9^2 + 2^2 \\ = (8-1)^2 + (2+4)^2 = 7^2 + 6^2$$

والآن إلى المبرهنة الآتية التي توضح متى يمكن التعبير عن عدد طبيعي

كمجموع مربعين .

مبرهنة ٧-٤-٥ :

- إذا كان $n = k^2 m$ عدد صحيحاً موجباً وكان m ليس مربعاً ، فيمكن التعبير
 عن n كمجموع مربعين إذا وإذا فقط كانت جميع القواسم الأولية للعدد m ليست
 على الشكل $4t + 3$ ، $t \in \mathbb{Z}^+$.

البرهان :

- . نفرض أن جميع القواسم الأولية للعدد m ليست على الشكل $4t + 3$.
 فإذا كان $m = 1$ ، فإن $n = k^2 + 0^2$ ويتم المطلوب . أما إذا كان $m > 1$ ،
 فافترض أن $m = \prod_{i=1}^r p_i$ حيث p_i أعداد أولية مختلفة ليست على الشكل $4t + 3$.
 إذاً أما $p_i = 2$ لكل $i = 1, 2, \dots, r$ أو $p_i \equiv 1 \pmod{4}$. فإذا كان $p_i = 2$ لكل i ،
 فإن $p_i = 1^2 + 1^2$ ، وإذا كان $p_i \equiv 1 \pmod{4}$ لكل i فإن $p_i = a_i^2 + b_i^2$
 حسب مبرهنة (٧-٤-٣) . لكن

$$p_1 p_2 = (a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2) = (a_1 a_2 + b_1 b_2)^2 + (a_1 a_2 - b_1 a_2)^2$$

حسب قضية (٧-٤-١) . إذا بالأسبقراء على r يمكن أن نبرهن أن

$$n = k^2 m = k^2 (a^2 + b^2) = (ka)^2 + (kb)^2 \quad \text{إذا} \quad m = \prod_{i=1}^r p_i = a^2 + b^2$$

ولإثبات العكس نفرض أن $n = a^2 + b^2 = k^2 m$ ، p قاسم أولي للعدد m .

وليكن $d = (a, b)$. إذا $a = rd$ ، $b = sd$ ، $(r, s) = 1$ ، وعليه فإن

$$n = d^2(r^2 + s^2) = k^2 m$$

$$. u \in \mathbb{Z} \text{ حيث } r^2 + s^2 = \left(\frac{k^2}{d^2}\right)m = pu$$

وعليه فإن $r^2 + s^2 \equiv 0 \pmod{p}$. لكن $(r, s) = 1$. إذا $(r, p) = 1$ أو $(s, p) = 1$ ، وعليه يمكن أن نفرض $(r, p) = 1$ ، إذا يوجد معكوس ضربي للعدد r وليكن v . إذا $rv \equiv 1 \pmod{p}$. لكن $r^2 + s^2 \equiv 0 \pmod{p}$ ، إذا $v^2(r^2 + s^2) \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $(rv)^2 + (sv)^2 \equiv 0 \pmod{p}$ ، ومنها نجد أن $(sv)^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن $p \equiv 1 \pmod{4}$ حسب مبرهنة $(3-6-3)$ ، وهذا يعني عدم وجود أي قاسم أولي إلى m على الصورة $(4t+3)$.

□

مثال (٤) : أيًا من الأعداد الآتية يمكن التعبير عنه كمجموع مربعين ؟

(أ) 425 ، (ب) 783 ، (ج) 2349 .

الحل :

(أ) بما أن $425 = 5^2 \cdot 17$ ، $17 \not\equiv 3 \pmod{4}$ ، إذا يمكن التعبير عن 425

كمجموع مربعين . لاحظ أن

$$425 = 5^2 \cdot 17 = 5^2(4^2 + 1^2) = (5 \cdot 4)^2 + (5)^2 = (20)^2 + 5^2$$

(ب) بما أن $783 = 3^3 \cdot 29 = 3^2 \cdot (3 \cdot 29)$ و $3 \equiv 3 \pmod{4}$ إذا لا يمكن

التعبير عن 783 كمجموع مربعين .

(ج) $2349 = 3^4 \cdot 29 = (3^2)^2 \cdot 29$ ، $29 \equiv 1 \pmod{4}$ ، إذا يمكن التعبير

عن 2349 كمجموع مربعين . لاحظ أن

$$2349 = (3^2)^2 \cdot 29 = (3^2)^2 (5^2 + 2^2) = (3^2 \cdot 5)^2 + (3^2 \cdot 2)^2$$

$$= (45)^2 + (18)^2$$

والآن إلى المبرهنة الآتية التي أثبتت من قبل أبو جعفر الخازن في القرن العاشر للميلاد .

ميرھنة ٧-٤-٦: " الخازن "

(أ) إذا كتب عدد طبيعي كمجموع مربعين ، فإن مربعه يكتب أيضاً كمجموع مربعين .

(ب) إذا كتب عدد مربع كمجموع مربعين ، فإن مربعه يكتب بشكلين مختلفين كمجموع مربعين .

(ج) إذا أمكن التعبير عن عدد كمجموع مربعين ، فيمكن التعبير عن ضعفه كمجموع مربعين .

(د) إن حاصل ضرب عددين ينقسم أحدهما إلى مربعين بشكلين مختلفين ، وينقسم الآخر إلى مربعين بشكل واحد ، ينقسم إلى مجموع مربعين بأربعة أشكال مختلفة .

البرهان :

(أ) نفرض أن $n = a^2 + b^2$. إذاً $n^2 = (a^2 + b^2)^2 = (a^2 - b^2)^2 + 4a^2b^2$.

(ب) نفرض أن $n^2 = a^2 + b^2$ ، حيث $n, a, b \in \mathbb{N}$ ، إذاً $n^4 = n^2 \cdot n^2 = n^2a^2 + n^2b^2 = (na)^2 + (nb)^2$ ، كما أن $n^4 = (a^2 + b^2)^2 = (a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2$.

(ج) نفرض أن $n = a^2 + b^2$ ، $a \neq b$ ، إذاً $2n = (a + b)^2 + (a - b)^2$.

(د) نفرض أن $n = c^2 + d^2$ ، $m = a^2 + b^2 = r^2 + s^2$ ، إذاً $mn = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 = (ad + bc)^2 + (ac - bd)^2 = (rc + sd)^2 + (rd - sc)^2 = (rd + sc)^2 + (rc + sd)^2$.

□

مثال (٥) :

(أ) $17 = 4^2 + 1^2$ ، $289 = (17)^2 = (4^2 - 1^2)^2 + (2 \cdot 4 \cdot 1) = (15)^2 + 8^2$ ،

$(289)^2 = [(15)^2 - 8^2]^2 + (2 \cdot 15 \cdot 8)^2 = (161)^2 + (240)^2$.

$$(ب) \quad 25 = 4^2 + 3^2$$

$$626 = (25)^2 = 25(4^2 + 3^2) = (5 \cdot 4)^2 + (5 \cdot 3)^2 = (20)^2 + (15)^2$$

$$625 = (25)^2 = (4^2 + 3^2)^2 = (4^2 - 3^2)^2 + (2 \cdot 4 \cdot 3)^2 = 7^2 + (24)^2$$

$$(ج) \quad 58 = 2 \cdot 29 = (5 + 2)^2 + (5 - 2)^2 = 7^2 + 3^2, \quad 29 = 5^2 + 2^2$$

$$116 = 2(58) = (7 + 3)^2 + (7 - 3)^2 = (10)^2 + 4^2$$

$$232 = 2(116) = (10 + 4)^2 + (10 - 4)^2 = (14)^2 + 6^2$$

$$(د) \quad m = 65 = 7^2 + 4^2 = 8^2 + 1^2, \quad n = 17 = 4^2 + 1^2$$

$$mn = (65)(17) = 1105 = (7 \cdot 4 + 4 \cdot 1)^2 + (7 \cdot 1 - 4 \cdot 4)^2 = (32)^2 + 9^2$$

$$= (7 + 16)^2 + (7 \cdot 4 - 4 \cdot 1)^2 = (23)^2 + (24)^2$$

$$= (8 \cdot 4 + 1 \cdot 1)^2 + (8 \cdot 1 - 1 \cdot 4)^2 = (33)^2 + 4^2$$

$$= (8 + 4)^2 + (32 - 1)^2 = (12)^2 + (31)^2$$

والآن إلى دراسة كيفية التعبير عن عدد صحيح موجب كمجموع أربعة مربعات والتي بدأت دون إثبات مع الفرنسي باشيه سنة ١٦٢١ م ، ثم أثبتت من قبل لاجرانج سنة ١٧٧٢ م وأويلر سنة ١٧٧٣ م ويعتمد البرهان على القضية الآتية .

قضية ٧-٤-٧: " أويلر "

إذا أمكن التعبير عن كل من m, n كمجموع أربعة مربعات ، فإنه يمكن التعبير عن $m n$ كمجموع أربعة مربعات .

البرهان :

$$\text{نفرض أن } m = \sum_{i=1}^4 a_i^2, \quad n = \sum_{j=1}^4 b_j^2 \text{ إذاً}$$

$$mn = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1 + a_3 b_4 - a_4 b_3)^2 \\ + (a_1 b_3 - a_2 b_4 - a_3 b_1 + a_4 b_2)^2 + (a_1 b_4 + a_2 b_3 - a_3 b_2 - a_4 b_1)^2$$

□

مثال (٦) :

إذا كان $m=154$ ، $n=39$ ، فإن

$$, m = 8^2 + 7^2 + 5^2 + 4^2 , n = 5^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2$$

$$mn = (40+21+10+4)^2 + (24-35+5-8)^2 + (16-7-25+12)^2 \\ + (8+14-15-20)^2 = (75)^2 + (14)^2 + 4^2 + (13)^2$$

مبرهنة ٧-٤-٨:

إذا كان p عدداً أولياً فردياً ، فيوجد $1 \leq m < p$ ، $m \in \mathbb{Z}$

$$. x_i \in \mathbb{Z} , mp = \sum_{i=1}^4 x_i^2$$

البرهان :

بما أن p عدد أولي فردي . إذاً $p \equiv 1 \pmod{4}$ أو $p \equiv 3 \pmod{4}$.

فإذا كان $p \equiv 1 \pmod{4}$ ، فإن للتطابق $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ حل حسب

مبرهنة (٣-٦-٣) ، وعليه إذا كان x_1 حلاً للتطابق $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$

وكان $y_1 = 0$ ، فإن $x_1^2 + y_1^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن

$$. 0 < x_1 \leq \frac{p-1}{2} , mp = x_1^2 + y_1^2 + 1^2 + 0^2$$

أما إذا كان $p \equiv 3 \pmod{4}$ ، فأفرض أن a أصغر باقي موجب غير تربيعي

قياس p . إذاً $(-a/p) = (-1/p)(a/p) = (-1)(-1) = 1$ حسب تعريف رمز

لجنر و نتيجة مبرهنة (٢-٢-٦) ، وعليه فإن $(-a)Rp$ ، وهذا يعني أن للتطابق

$x^2 \equiv -a \pmod{p}$ حل وليكن x_1 ، $0 < x_1 \leq \frac{p-1}{2}$ ، وحيث أن

$0 < a-1 < a$. إذاً $(a-1)Rp$ ، وعليه يوجد $y_1 \in \mathbb{Z}^+$ ، $0 < y_1 \leq \frac{p-1}{2}$ ،

بحيث أن $y_1^2 \equiv a-1 \pmod{p}$. إذاً $x_1^2 + y_1^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ، وعليه فإن

$$mp = x_1^2 + y_1^2 + 1^2 + 0^2$$

$$. 1 \leq m = \frac{1}{p}(x_1^2 + y_1^2 + 1) \leq \frac{1}{p}[2(\frac{p-1}{2})^2 + 1] < \frac{1}{p} \cdot (\frac{p^2}{2} + 1) < p$$

□

يمكن التعبير عن أي عدد أولي كمجموع أربعة مربعات .

البرهان :

إذا كان $p = 2$ ، فإن $2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2$ ، أما إذا كان p عدداً فردياً ، فأفرض أن m هو أصغر عدد صحيح موجب يحقق العلاقة

$$m < p ، \quad mp = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \quad \dots (1)$$

سنثبت أن $m = 1$ ، ولإثبات ذلك نفرض أن $m > 1$. إذاً أما m عد زوجي أو عدد فردي . فإذا كان m عدداً زوجياً فإن mp عدد زوجي وعليه إما x_i زوجية لكل $i = 1, 2, 3, 4$ أو أن x_i فردين لكل $i = 1, 2, 3, 4$ أو أن اثنين منها زوجية والآخرى فردية ، وفي جميع الحالات نجد أن $x_1 \mp x_2 , x_3 \mp x_4$ عددان زوجيان ، وعليه فإن

$$\left(\frac{m}{2}\right)p = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_3 + x_4}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_3 - x_4}{2}\right)^2$$

$0 < \frac{m}{2} < m$ وهذا يناقض كون m أصغر عدد صحيح موجب يحقق

العلاقة (1) .

وإذا كان m عدداً فردياً ، فإن $3 \leq m < p$. ولنعرّف $y_i \equiv x_i \pmod{m}$ ،

$$\sum_{i=1}^4 y_i^2 \equiv \sum_{i=1}^4 x_i^2 \pmod{m} ، \quad i = 1, 2, 3, 4 ، \quad -\left(\frac{m-1}{2}\right) \leq y_i \leq \frac{m-1}{2}$$

لكن $\sum_{i=1}^4 x_i^2 \equiv 0 \pmod{m}$ ، إذاً $\sum_{i=1}^4 y_i^2 \equiv 0 \pmod{m}$ ، وعليه فإن

$$0 \leq n \leq \frac{4}{m} \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 < m ، \quad \sum_{i=1}^4 y_i^2 = mn$$

$y_i = 0$ لكل i ، وعليه فإن $x_i \equiv 0 \pmod{m}$ لكل i ، وبالتالي فإن

$$mp = \sum_{i=1}^4 x_i^2 \equiv 0 \pmod{m^2} ، \quad \text{ومن هنا نجد أن } p \equiv 0 \pmod{m} \text{ وهذا غير ممكن لأن } 3 \leq m < p .$$

إذاً $n > 0$ ، وعليه فإن

وبالتالي فإن $m^2 np = \left(\sum_{i=1}^4 x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^4 y_i^2 \right) = \sum_{i=1}^4 a_i^2$ حسب قضية (7-4-7) . وبالتالي فإن $np = \sum_{i=1}^4 \left(\frac{a_i}{m} \right)^2$ و $0 < n < m$ ، وهذا يناقض كون m أصغر عدد صحيح موجب يحقق العلاقة (1) . إذا $m = 1$.

□

مبرهنة 7-4-10 : "باشية - لارانج"

يمكن كتابة أي عدد صحيح موجب كمجموع أربعة مربعات .

البرهان :

نفرض أن n عدد صحيح موجب . إذا إذا كان $n = 1$ ، فإن $1 = 1^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2$. وإذا كان $n > 1$ ، فلنفرض أن $n = \prod_{i=1}^r p_i$ ، حيث p_i أعداد أولية . إذا يمكن التعبير عن كل p_i كمجموع أربعة مربعات حسب مبرهنة (7-4-8) وباستخدام قضية (7-4-7) يمكن التعبير عن حاصل ضرب أي عددين أوليين كمجموع أربعة مربعات . إذا بالاستقراء على r وتطبيق قضية (7-4-7) ، r من المرات يمكن التعبير عن n كمجموع أربعة مربعات .

□

مثال (7) :

$$(أ) \quad 12 = 3^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 .$$

(ب)

$$513 = 3^3 \cdot 19 = 3^2 \cdot 3 \cdot 19$$

$$= 3^2(1^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2) (4^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2)$$

$$= 3^2 \left[(4+1+1+0)^2 + (1-4+1-0)^2 \right.$$

$$\left. + (1-1-4+0)^2 + (1+1-1-0)^2 \right]$$

$$= 3^2(6^2 + 2^2 + 4^2 + 1^2) = (3 \cdot 6)^2 + (3 \cdot 2)^2 + (3 \cdot 4)^2 + (3 \cdot 1)^2$$

$$= (18)^2 + 6^2 + (12)^2 + 3^2$$

وأخيراً نود أن نذكر تخمين ديوفنتس الذي ينص على أنه " إذا كان $n = 8n + 7$ ، فلا يمكن التعبير عن n كمجموع ثلاثة مربعات " والذي أثبت من قبل الفرنسي ديكارت (١٥٩٦-١٦٥٠) سنة ١٦٣٨ م .

ويقال أن فيرما هو أول من ذكر أنه يمكن التعبير عن عدد صحيح a كمجموع ثلاثة مربعات إذاً. وإذا فقط كان $a \neq 4^n(8m + 7)$ ، حيث $m, n \in \mathbb{Z}^+$. وقد أثبت ذلك كل من لجنر سنة ١٧٩٨م وجاوس سنة ١٨٠١م .

هذا وقد خمن الإنجليزي وارنج (١٧٣٤-١٧٩٨م) سنة ١٧٧٠م أن : أي عدد طبيعي يمكن التعبير عنه كمجموع أربعة مربعات أو تسعة مكعبات أو تسعة عشر عدداً من القوة الرابعة (Biquadratic) . وبرهن ذلك من قبل الألماني هلبرت (١٨٦٢-١٩٤٣) سنة ١٩٠٩م .

تمارين

- (١) عبر عن كل من الأعداد الآتية كمجموع مربعين 137 , 257, 433, 641 .
 - (٢) عبر عن كل من الأعداد الآتية كمجموع مربعين 26, 564, 725, 25493 .
 - (٣) عبر عن العدد 85 كمجموع مربعين بطريقتين مختلفتين ، ثم عبر عن 25 كمجموع مربعين وعن 2125 كمجموع مربعين بأربعة أشكال مختلفة .
 - (٤) " الخازن "
- (أ) إذا أنقسم عدد طبيعي إلى مربعين بشكليين مختلفين ، فأثبت أن مربعه ينقسم إلى مجموع مربعين بأربعة أشكال مختلفة .
- (ب) عبر عن العدد 65 كمجموع مربعين بشكليين مختلفين ، ثم عبر عن
- مربعة كمجموع مربعين بأربعة أشكال مختلفة

- (٥) عبر عن كل من العددين 65,85 كمجموع مربعين بشكليين مختلفين ثم عبر عن حاصل ضربهما كمجموع مربعين بستة أشكال مختلفة .
- (٦) (أ) " الخازن " إذا أمكن التعبير عن عدد زوجي كمجموع مربعين ، فأثبت أنه يمكن التعبير عن نصفه كمجموع مربعين .
 (ب) عبر عن 400 كمجموع مربعين ، ثم عبر عن كل من 200,100,50,25 كمجموع مربعين .
- (٧) (أ) أوجد خمسة أعداد أولية يمكن التعبير عن كل منها بالشكل $n^2 + (n+1)^2$.
 (ب) أوجد خمسة أعداد أولية يمكن التعبير عن كل منها على الشكل $2^2 + p^2$ ، حيث p عدد أولي .
- (٨) (أ) أثبت أنه يمكن التعبير عن 2^n كمجموع مربعين لكل $n \in \mathbb{N}$.
 (ب) إذا كان $m = 2^n \cdot a^2 b$ ، $n \geq 0$ ، a عدد صحيح فردي وكل قاسم أولي من قواسم b على الشكل $4k+1$ ، فأثبت أنه يمكن التعبير عن m كمجموع مربعين .
- (ج) عبر عن كل مما يأتي كمجموع مربعين 3185 ، $2^3 \cdot 5 \cdot 11^2 \cdot 13$.
- (٩) عبر عن كل من الأعداد الآتية كمجموع أربعة مربعات
 . 231,391,2109,6543
- (١٠) أوجد ثلاثة أعداد أولية تحقق العلاقة
 . $n > 0$ ، $p = n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2$

الكسور المستمرة
Continued Fractions

إن أقدم معرفة للكسور الأعتيادية أو الأعداد النسبية ، تنسب إلى البابليين والمصريين فقد أوجد البابليون كسوراً على أساس النظام الستيني : نصف = 30 ، ثلث = 20 ، ربع = 15 .

وكان للمصريين ترقيم للكسر العادي $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{21}$ ، $\frac{1}{98}$ ، وقد جعلوا علامة بيضوية فوق العدد للدلالة على الكسرة نحو $\overset{\circ}{111}$ إلى ثلث وفي أيام أحمر كانوا يكتبون الثمن هكذا $\frac{\cdot}{8}$ ويكتبون واحد إلى عشرين هكذا $\frac{\cdot}{20}$.

ووصف الخوارزمي الكسور على أساس النظام الستيني ووصف عمليات الضرب والقسمة لها بطرق مشابهة لطرق البابليين والمعروفة للإغريق ، ثم ينتقل إلى استخراج الجذر التربيعي .

أما البوزجاني (٩٤٠-٩٩٨م) فقد تناول نظرية الكسور في كتابه " فيما يحتاج إليه الكتاب من علم الحساب " مميّزاً بين ثلاثة أنواع من الكسور الأعتيادية أو العادية وهي الكسور الرئيسية ذات الصورة التي تساوي واحد وهي من نصف إلى عشر والكسور المركبة وهي على الصورة a إلى b ، حيث $a < b \leq 10$ والكسور الوحيدة وهي حاصل ضرب الكسور الرئيسية .

ويسمى أبو الوفاء الكسور الرئيسية والكسور الحاصلة من جمع أو ضرب الكسور الرئيسية " الكسور الناطقة " أما الكسور الأخرى فيطلق عليها أسم الكسور الصماء .

هذا وقد كتب الهندي ليلافتي عام ١١٥٠م الكسر الأعتيادي بالشكل $\frac{a}{b}$ جاعلاً البسط " الصورة " أعلى والمقام أسفل ، أما العدد الكسري المكون من كسر وعدد صحيح فيكتب بالشكل $\frac{a}{b}$ فالشكل $\frac{4}{3}$ يعني أربعة وثلاثين ، ويعود الفضل إلى

المسلمين في تطوير الكسر الأعتيادي ، والعدد الكسري فقد أدخل ابن البناء المراكشي (١٢٥٦-١٣٢١م) الخط الفاصل بين البسط والمقام فيكتب الكسر $\frac{a}{b}$

بالشكل $\frac{a}{b}$ ، وعبر عن العدد الكسري $\frac{a}{b}$ بالشكل $\frac{a}{c}$ ، ونجد في حساب ابن البناء

المراكشي ، وأبو الحسن القصادي (١٤١٢-١٤٩٦م) أنماط من الكسور الأعتيادية كالكسر المنتسب مثل خمسة أتساع وأربع أسباع التسع وثلث سبع التسع وثلاثة أرباع ثلث سبع التسع أي $\frac{475}{756}$ ، والكسر المختلف مثل سبعة أتساع وثلثين وأربعة أخماس الثلث أي $\frac{77}{45}$ ، والكسر المبعوض أو كسر الكسر مثل ثلث من أربعة أخماس من ستة أسباع أي $\frac{24}{105}$ أو $\frac{8}{35}$.

أما بالنسبة للكسور العشرية فإن إجراء عمليات حسابية بواسطة كسور عادية مقامها من قوى العشرة يؤكد وجود تطبيق للكسور العشرية دون الأعراف بها ككسور ، ومنذ القرن العاشر وربما قبل ذلك نجد في مختلف الأبحاث الحسابية العربية قاعدة لتقريب الجذر الأصم (التربيعة ، التكعيبي ، ...) تسمى قاعدة الأصفار وردت في بحث للسؤال المغربي أسمه التبصرة في علم الحساب صيغتها العامة هي :

$$r=1,2,\dots, \quad a^{\frac{1}{n}} = \frac{(a \times 10^{nr})^{\frac{1}{n}}}{10^r}$$

والتقريب الحاصل حسب هذه القاعدة يشمل بالضرورة الكسر العشري ، ولهذا أدخل جورج سارتون إلى تاريخ الكسور العشرية كل من أجرى تطبيقاً لهذه القاعدة مثل أبو الحسن أحمد بن إبراهيم الأقلبيسي الذي أورد قاعدة الأصفار عام ٩٥٢م في الحالات الخاصة للجزر التربيعي للعدد (٢) في كتابه " الفصول في الحساب الهندي " ، وابن طاهر البغدادي المتوفي (١٠٣٧م) في " التكملة في الحساب " ، لكن الدراسات التاريخية الحديثة تؤكد أن الكسور العشرية التي لا يزال ابتكارها ينسب إلى الكاشي يجب أن تكون من عمل جبريي القرنين الحادي والثاني عشر للميلاد أي إلى مدرسة الكرخي والسموال ، ففي بحث للسموال " القوامي في الحساب الهندي ، ١١٧٢م " يوجد عرض للكسور العشرية أعد في سياق مسألة أستخراج الجذر النوني للعدد ، إضافة إلى مسائل التقريب ، وقد سمي المرتبة التابعة لمرتبة الأحاد مرتبة أجزاء العشرات والتالية لها أجزاء المئات والتالية لها أجزاء الألوف وهكذا ...

ونود أن نشير إلى أن افتراض السؤال $10^0 = 1$ ووضع المتتاليتين :

$$10^0 \text{ على جانبي } \left(\dots, \frac{1}{10^2}, \frac{1}{10} \right), (10, 10^2, \dots)$$

$$\dots, \frac{1}{10^2}, \frac{1}{10}, 10^0, 10, 10^2, \dots \quad \text{أي}$$

يعني أن لكل عدد حقيقي r تمثيل عشري (محدود أو غير محدود) هو :

$$r = \sum_{k=m}^n q_k (10)^k \quad \text{حيث أن } m, n \in \mathbb{Z}^+ , k \in \mathbb{Z}$$

أما عمل الكاشي ، فهو تتويج لأعمال بدأها جبريوا القرنين الحادي والثاني عشر للميلاد يحتوي على نتائجهم فقد ورد في كتابه " مفتاح الحساب " عرض للكسور العشرية يشكل بعداً مهماً في تاريخها وفي بحثه " الرسالة المحيطية " عن محيط الدائرة المترجم والمنشور من قبل المؤرخ الألماني لوكي يستخدم الكاشي الكسور العشرية لتقريب العدد π عن طريق إيجاد تقريب للعدد 2π بالنظام الستيني بعد تحديده لمحيط مضلع محاط بدائرة له 3×2^{28} ضلعاً ومحيطاً بالدائرة له نفس عدد الأضلاع ، وأفترضه أن محيط الدائرة يعادل المتوسط الحسابي لمحيطي المضلعين يحصل على النتيجة الآتية :

$$2\pi = 6,16,59,28,1,34,51,46,14,50$$

ثم حول ذلك إلى النظام العشري فوجد أن :

$$2\pi = 6.28318530717958650$$

وعليه فإن :

$$\pi = 3.14159265358979325$$

مع ملاحظة أن عدد الأرقام في النظامين الستيني والعشري واحدة مما يدل على وجود تماثل بينهما ، كما يبين تطبيق الكسور العشرية بالنسبة للأعداد الحقيقية مثل π .

وأخيراً نورد أن نشير إلى أنه إذا كان الكرخي أو السموال أو الأقليديسي أو الكاشي مكتشف الكسور العشرية فإن ذلك يعني أن مكتشفوها هم العرب والمسلمين وليس الفلكي الرياضي الإنجليزي سيمون ستيفن (١٥٤٨-١٦٢٠م) الذي أتى بعد الكاشي بأكثر من (١٨٥) سنة .

أما الكسور المستمرة ، فيعود تاريخها إلى الإيطاليين بومبيلي سنة ١٥٧٢م وكاتالدي (١٥٢٨-١٦٢٦) سنة ١٦١٣م والإنجليزي جون وايلس سنة ١٦٥٣م وأويلر ولاجرانج وجاوس ، والكسر المستمر تعبير على الشكل :

$$i \geq 1 \text{ لكل } a_i > 0 , a_i \in \mathbb{R} \text{ حيث } a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$$

ويرمز له بالرمز $[a_0, a_1, a_2, \dots]$ ، والكسور المستمرة منتهية وغير منتهية ، فالكسر المستمر :

$$[3, 7, 15, 1, 292] = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15 + \frac{1}{1 + \frac{1}{292}}}} = \frac{103993}{33102} = 3.141592653019 \approx \pi$$

كسر منتهي ، أما الكسر المستمر :

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}} = [1, 1, 1, \dots]$$

فهو كسر غير منتهي ، والكسور المستمرة قد تكون بسيطة وغير بسيطة وسنركز اهتمامنا في هذا الفصل على الكسور المستمرة البسيطة ، ويضم هذا الفصل بندين ندرس فيها الكسور المستمرة البسيطة المنتهية وغير المنتهية لأنها تمثل الأعداد النسبية وغير النسبية .

١-٨ : الكسور المستمرة البسيطة المنتهية

Finite Simple continued Fractions

سنركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة هذا النوع من الكسور وعلاقته بالأعداد النسبية إضافة إلى تقارباته وخواصها .

الكسر المستمر المنتهي هو تعبير على الشكل :

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4 + \dots + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n}}}}}}$$

حيث $a_i \in \mathbb{R}$ ، $a_i > 0$ لكل $i \geq 1$ ، وإذا كان $a_i \in \mathbb{Z}$ ، $a_i > 0$ لكل $i \geq 1$

فيسمى الكسر المستمر المنتهي كسراً بسيطاً منتهياً . ويرمز عادة للكسر المستمر

المنتهي بالرمز $[a_1, \dots, a_n]$ أو $\langle a_0, a_1, \dots, a_n \rangle$.

مثال (١) :

$$[1, 3] = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \quad (أ)$$

$$[2, 3, 1, 3, 2] = 2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2}}}} = \frac{77}{34} \quad (ب)$$

ملاحظة :

$$\begin{aligned} [a_0, a_1, \dots, a_n] &= [a_0, a_1, \dots, a_{n-2}, a_{n-1} + \frac{1}{a_n}] \\ &= a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_n]} \end{aligned}$$

مثال (٢) :

$$\begin{aligned}
 [1,3,5,2,7,2,4,6] &= 1 + \frac{1}{[3,5,2,7,2,4,6]} = 1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{[5,2,7,2,4,6]}} \\
 &= 1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{7 + \frac{1}{2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{6}}}}}}} = 1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{7 + \frac{1}{2 + \frac{6}{25}}}}} \\
 &= 1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{7 + \frac{56}{417}}}}} = 1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{417}{890}}} \\
 &= 1 + \frac{1}{3 + \frac{890}{4867}} = 1 + \frac{4867}{15491} = \frac{15491 + 4867}{15491} = \frac{20358}{15491}
 \end{aligned}$$

وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي :

مبرهنة ٨-١-١ :

كل كسر مستمر منتهي بسيط يمثل عدداً نسبياً .

البرهان :

ليكن $x_n = [a_0, a_1, \dots, a_n]$ كسراً مستمراً بسيطاً منتهياً .

سنبرهن بالاستقراء على n بأن x_n عدد نسبي . فإذا كان $n = 0$ ، فإن

$x_0 = [a_0] = a_0$ عدد نسبي ، وإذا كان $n = 1$ ، فإن

$$x_1 = [a_0, a_1] = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1} \in \mathbb{Q}$$

إذا المبرهنة صحيحة عندما $n = 0, 1$.

والآن لنفرض أن $x_m \in \mathbb{Q}$ لكل $m < n$. ولكي نثبت أن $x_{m+1} \in \mathbb{Q}$ ، لاحظ أن

$$x_{m+1} = [a_0, a_1, \dots, a_m, a_{m+1}] = a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_{m+1}]}$$

لكن $[a_1, \dots, a_{m+1}] \in \mathbb{Q}$ حسب فرضية الأستقراء الرياضي . إذاً

$$. x_n \in \mathbb{Q} \text{ فإن } x_{m-1} = a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_{m+1}]} \in \mathbb{Q}$$

□

مثال (٣) :

(أ) إذا كان $x = \frac{31}{11}$ ، فإن

$$x = 2 + \frac{9}{11} = 2 + \frac{1}{\frac{11}{9}} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{2}{9}} =$$

$$= 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{9}{2}}} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2}}} = [2, 1, 4, 2]$$

$$\frac{89}{21} = 4 + \frac{5}{21} = 4 + \frac{1}{\frac{21}{5}} = 4 + \frac{1}{4 + \frac{1}{5}} = [4, 4, 5] \quad (\text{ب})$$

$$\frac{53}{7} = 7 + \frac{4}{7} = 7 + \frac{1}{\frac{7}{4}} = 7 + \frac{1}{1 + \frac{3}{4}} \quad (\text{ج})$$

$$= 7 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{4}{3}}} = 7 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}} = [7, 1, 1, 3]$$

وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي .

ميرهنه ٨-١-٢ :

يمكن التعبير عن أي عدد نسبي ككسر مستمر بسيط منتهي .

نفرض أن $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$. إذا بالقسمة الخوارزمية نجد أن

$$a = ba_0 + r_1 \quad , \quad 0 < r_1 < b \Rightarrow \frac{a}{b} = a_0 + \frac{1}{\frac{b}{r_1}}$$

$$b = a_1 r_1 + r_2 \quad , \quad 0 < r_2 < r_1 \Rightarrow \frac{b}{r_1} = a_1 + \frac{1}{\frac{r_1}{r_2}}$$

$$r_1 = a_2 r_2 + r_3 \quad , \quad 0 < r_3 < r_2 \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = a_2 + \frac{1}{\frac{r_2}{r_3}}$$

.....

$$r_{n-2} = r_{n-1} a_{n-1} + r_n \quad , \quad 0 < r_n < r_{n-1} \Rightarrow \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} = a_{n-1} + \frac{1}{\frac{r_{n-1}}{r_n}}$$

$$r_{n-1} = r_n a_n \Rightarrow \frac{r_{n-1}}{r_n} = a_n$$

$$\frac{a}{b} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\frac{r_1}{r_2}}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\frac{r_2}{r_3}}}} \quad \text{إذا}$$

$$= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \ddots \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n}}}}}$$

□

ملاحظة :

أن التعبير عن عدد نسبي ككسر مستمر بسيط منتهي ليس وحيداً ، لأن

$$\frac{a}{b} = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [a_0, a_1, \dots, a_n - 1, 1]$$

$$\cdot \frac{77}{34} = [2, 3, 1, 3, 2] = [2, 3, 1, 3, 1, 1]$$

والآن إلى دراسة تقارب الكسور المستمرة البسيطة .

تعريف ٢-١-٨ :

يسمى $C_m = [a_0, a_1, \dots, a_m]$ التقارب الميمى للكسر المستمر

$[a_0, \dots, a_n, \dots]$ إذا .

$$\dots, C_2 = [a_0, a_1, a_2] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}}, C_1 = [a_0, a_1] = a_0 + \frac{1}{a_1}, C_0 = [a_0] = a_0$$

$$C_m = [a_0, a_1, \dots, a_m] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_{m-1} + \frac{1}{a_m}}}}}$$

مثال (٤) :

أوجد تقاربات الكسر البسيط $[1, 2, 3, 4, 2, 3]$

الحل :

$$c_0 = [1] = 1, c_1 = [1, 2] = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, c_2 = [1, 2, 3] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}} = \frac{10}{7}$$

$$c_3 = [1, 2, 3, 4] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4}}} = \frac{43}{30}$$

$$c_4 = [1, 2, 3, 4, 2] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2}}}} = \frac{96}{97}$$

$$c_5 = [1, 2, 3, 4, 2, 3] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}}} = \frac{331}{231}$$

ولدراسة خواص التقارب نورد الآتي .

تعريف ٨-١-٣:

تعرف الأعداد الحقيقية p_m, q_m لكل $-2 \leq m \leq n$ كالآتي :

$$p_{-2} = 0, p_{-1} = 1, p_0 = a_0, \dots, p_m = a_m p_{m-1} + p_{m-2}$$

$$q_{-2} = 1, q_{-1} = 0, q_0 = 1, \dots, q_m = a_m q_{m-1} + q_{m-2}$$

مثال (٥) :

بما أن $\frac{331}{231} = [1, 2, 3, 4, 2, 3]$ حسب (مثال ٤) . إذاً

$$p_0 = 1, p_1 = a_1 p_0 + p_{-1} = a_1 a_0 + 1 = 1(2) + 1 = 3$$

$$p_2 = a_2 p_1 + p_0 = 3(3) + 1 = 10, p_3 = a_3 p_2 + p_1 = 4(10) + 3 = 43$$

$$p_4 = a_4 p_3 + p_2 = 2(43) + 10 = 96, p_5 = a_5 p_4 + p_3 = 3(96) + 43 = 331$$

$$q_0 = 1, q_1 = a_1 q_0 + q_{-1} = 2(1) + 0 = 2, q_2 = a_2 q_1 + q_0 = 3(2) + 1 = 7$$

$$q_3 = a_3 q_2 + q_1 = 4(7) + 2 = 30, q_4 = a_4 q_3 + q_2 = 2(30) + 7 = 67$$

$$q_5 = a_5 q_4 + q_3 = 3(67) + 30 = 231$$

$$c_0 = \frac{p_0}{q_0} = 1, c_1 = \frac{p_1}{q_1} = \frac{3}{2}, c_2 = \frac{p_2}{q_2} = \frac{10}{7}, c_3 = \frac{p_3}{q_3} = \frac{43}{30} \text{ وعليه فإن}$$

$$c_4 = \frac{p_4}{q_4} = \frac{96}{67}, c_5 = \frac{p_5}{q_5} = \frac{331}{231}$$

وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي :

مبرهنة ٨-١-٣:

إذا كان c_m تقارباً ميمياً للكسر البسيط المستمر $[a_0, a_1, \dots]$ ، فإن

$$0 \leq m \leq n \text{ لكل } [a_0, a_1, \dots, a_m] = c_m = \frac{p_m}{q_m}$$

البرهان: " بالاستقراء على m "

إذا كان $m = 0$ ، فإن $c_0 = a_0$ ، $\frac{p_0}{q_0} = \frac{a_0}{1} = a_0$ ، وعليه فإن $c_0 = \frac{p_0}{q_0}$ وإذا

كان $m = 1$ ، فإن $c_1 = [a_0, a_1] = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}$ ، $\frac{p_1}{q_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}$ ،

وعليه فإن $c_1 = \frac{p_1}{q_1}$. إذا المبرهنة صحيحة عندما $m = 0, 1$.

والآن لنفرض أن المبرهنة صحيحة عندما $m = k$ ، إذاً

$$c_k = [a_0, \dots, a_k] = \frac{p_k}{q_k} = \frac{a_k p_{k-1} + p_{k-2}}{a_k q_{k-1} + q_{k-2}}$$

ولإثبات صحة المبرهنة عندما $m = k + 1$ ، لاحظ أن

$$c_{k+1} = [a_0, a_1, \dots, a_k, a_{k+1}] = [a_0, a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}]$$

$$= \frac{(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) p_{k-1} + p_{k-2}}{(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) q_{k-1} + q_{k-2}} = \frac{(a_k a_{k+1} + 1) p_{k-1} + a_{k+1} p_{k-2}}{(a_k a_{k+1} + 1) q_{k-1} + a_{k+1} q_{k-2}}$$

$$= \frac{a_{k+1} (a_k p_{k-1} + p_{k-2}) + p_{k-1}}{a_{k+1} (a_k q_{k-1} + q_{k-2}) + q_{k-1}} = \frac{a_{k+1} p_k + p_{k-1}}{a_{k+1} q_k + q_{k-1}} = \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}$$

إذاً $c_m = \frac{p_m}{q_m}$ لكل $0 \leq m \leq n$.

□

ليكن $c_m = \frac{p_m}{q_m}$ تقارباً ميمياً للكسر المستمر البسيط $[a_0, a_1, \dots]$.

$$\cdot 0 \leq m \leq n, \quad p_m q_{m-1} - p_{m-1} q_m = (-1)^{m-1} \quad (أ)$$

$$\cdot 0 \leq m \leq n, \quad p_m q_{m-2} - q_m p_{m-2} = (-1)^{m-2} a_m \quad (ب)$$

البرهان:

(أ) "بالأستقراء على m ". إذا كان $m=0$ ، فإن

$$R.H.S. = (-1)^{-1} = -1, \quad L.H.S. = p_0 q_{-1} - p_{-1} q_0 = -1$$

إذا الطرفان متساويان. وإذا كان $m=1$ ، فإن

$$\begin{aligned} L.H.S. &= p_1 q_0 - p_0 q_1 = (a_1 p_0 + p_{-1}) \cdot 1 - a_0 (a_1 q_0 + q_{-1}) \\ &= a_0 a_1 + 1 - a_0 a_1 = 1 \end{aligned}$$

$$R.H.S. = (-1)^0 = 1$$

إذا الطرفان متساويان، وعليه فإن العلاقة صحيحة عندما $m=0,1$.

والآن لنفرض أن العلاقة صحيحة عندما $m=k$. إذا

$$p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k-1}$$

ولإثبات صحة العلاقة عندما $m=k+1$ ، لاحظ أن

$$\begin{aligned} p_{k+1} q_k - q_{k+1} p_k &= (a_{k+1} p_k + p_{k-1}) q_k - (a_{k+1} q_k + q_{k-1}) p_k \\ &= -(p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1}) = -(-1)^{k-1} = (-1)^k \end{aligned}$$

إذا العلاقة صحيحة عندما $m=k+1$ ، وعليه فإن العلاقة صحيحة لكل

$$\cdot 0 \leq m \leq n$$

(ب) بما أن $p_m = a_m p_{m-1} + p_{m-2}$ ، $q_m = a_m q_{m-1} + q_{m-2}$ إذا

$$\begin{aligned} p_m q_{m-2} - p_{m-2} q_m &= (a_m p_{m-1} + p_{m-2}) q_{m-2} - p_{m-2} (a_m q_{m-1} + q_{m-2}) \\ &= a_m (p_{m-1} q_{m-2} - p_{m-2} q_{m-1}) \end{aligned}$$

لكن $p_{m-1} q_{m-2} - p_{m-2} q_{m-1} = (-1)^{m-2}$ حسب (أ). إذا

$$p_m q_{m-2} - p_{m-2} q_m = (-1)^{m-2} a_m$$

نتيجة :

$$\cdot 1 \leq m \leq n \text{ لكل } (p_m, q_m) = 1$$

البرهان :

نفرض أن $d = (p_m, q_m)$. إذا $d \mid (-1)^{m-1}$ حسب مبرهنة (أ٤-١-٨) .
لكن $d > 0$. إذا $d = 1$.

□

ملاحظة :

باستخدام الكسور المستمرة البسيطة المنتهية ، يمكن إيجاد الحل الخاص للمعادلة الديوفنتية الخطية $ax = by = 1$ ، $(a, b) = 1$ وذلك لأنه عندما $(a, b) = 1$ ، يمكننا أن نفرض أن $p_m = a$ ، $q_m = b$ ، فنجد أن
 $p_m q_{m-1} - p_{m-1} q_m = (-1)^{m-1}$ حسب مبرهنة (أ٤-١-٨) ، وعليه فإن
 $a q_{m-1} - p_{m-1} b = (-1)^{m-1} \dots (1)$

وبضرب طرفي (1) في $c \cdot (-1)^{m-1}$ ينتج أن

$$a[(-1)^{m-1} c q_{m-1}] + b[(-1)^m c p_{m-1}] = c$$

وعليه فإن الحل الخاص للمعادلة $ax + by = c$ هو

$$x_1 = (-1)^{m-1} c q_{m-1} \quad , \quad y_1 = (-1)^m c p_{m-1}$$

أما الحل العام فهو $x = x_1 + bt$ ، $y = y_1 - at$ ، $t \in \mathbb{Z}$

مثال (٦) :

$$\text{حل المعادلة } 44x + 15y = 2$$

الحل

بما أن $(44, 15) = 1$. إذا يوجد حل للمعادلة أعلاه حسب مبرهنة (٧-١-١) ،
ولإيجاد ذلك الحل ، لاحظ أن

$$\frac{44}{15} = 2 + \frac{14}{15} = 2 + \frac{1}{\frac{15}{14}} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{14}} = [2, 1, 14]$$

إذا الحل الخاص هو $x_1 = (-1)^{2-1} \cdot 2 \cdot q_1$ ، $y_1 = (-1)^2 \cdot 2 \cdot p_1$ لكن

$$\text{إذا ، } q_1 = a_1 q_0 + q_{-2} = 1 \text{ ، } p_1 = a_1 p_0 + p_{-1} = a_0 a_1 + 1 = 3$$

$$x_1 = -2 \text{ ، } y_1 = 6$$

والحل العام هو $t \in \mathbb{Z}$ ، $x = -2 + 15t$ ، $y = 6 - 44t$

مثال (٧) :

$$\text{حل المعادلة } 33x + 11y = 4$$

الحل

بما أن $(31, 11) = 1$. إذا يوجد حل للمعادلة أعلاه حسب مبرهنة (٧-١-١)

ولإيجاده ، لاحظ أن $\frac{31}{11} = [2, 1, 4, 2]$. إذا الحل الخاص هو

$$x_1 = (-1)^2 \cdot 4 \cdot q_2 \text{ ، } y_1 = (-1)^3 \cdot 4 \cdot p_2$$

لكن

$$p_0 = a_0 = 2 \text{ ، } p_1 = a_1 p_0 + p_{-1} = 1(2) + 1 = 3$$

$$p_2 = a_2 p_1 + p_0 = 4 \cdot 3 + 2 = 14$$

$$q_0 = 1 \text{ ، } q_1 = a_1 q_0 + q_{-1} = 1(1) + 0 = 1 \text{ ، } q_2 = a_2 q_1 + q_0 = 4 \cdot 1 + 1 = 5$$

إذا الحل الخاص هو

$$x_1 = 4(5) = 20 \text{ ، } y_0 = -4(14) = -56$$

والحل العام هو

$$x = 20 + 11t \text{ ، } y = -56 - 31t \text{ ، } t \in \mathbb{Z}$$

تمارين

(١) عبر عن كل مما يأتي كعدد نسبي :

(أ) $[-1, 2, 3]$ ، (ب) $[3, 5, 1, 3]$ ، (ج) $[1, 2, 3, 4]$

(د) $[1, 7, 49, 7]$ ، (هـ) $[2, 1, 2, 1, 2]$

(٢) عبر عن كل من الأعداد النسبية الآتية ككسر مستمر بسيط :

$$(أ) \frac{12}{5} ، (ب) \frac{28}{13} ، (ج) \frac{169}{17} ، (د) \frac{115}{203}$$

(٣) أحسب التقاربات لكل مما يأتي :

$$(أ) [1,2,3,4] ، (ب) [3,1,5,1,3] ، (ج) [1,4,6,2,1]$$

$$(د) [8,1,1,2,2] ، (هـ) [-2,1,1,1,1,2] ، (و) [0,23,1,6,2]$$

(٤) أوجد الحل العام لكل مما يأتي :

$$(أ) 7x + 11y = 25 ، (ب) 11x - 30y = 29$$

$$(ج) 23x + 51y = 3 ، (د) 66x + 39y = 258$$

(٥) (أ) إذا كان $c_m = \frac{p_m}{q_m}$ تقارباً ميمياً للكسر المستمر البسيط

$$[1,2,3,4,\dots,n,n+1] ، فأثبت أن$$

$$p_n = np_{n-1} + np_{n-2} + (n-1)p_{n-3} + \dots + 3p_1 + 2p_0 + (p_0 + 1)$$

" ملاحظـة : أجمـع العلاقـات $p_0 = 1, p_1 = 3$

$$" m = 2, \dots, n \text{ لكل } p_m = (m+1)p_{m-1} + p_{m-2}$$

(ب) حقق فرع (أ) بالنسبة للكسر $[1,2,3,4,5]$.

(٦) إذا كان $c_m = \frac{p_m}{q_m}$ تقارباً ميمياً للكسر المستمر البسيط

$$[a_0, a_1, \dots, a_n] ، فأثبت أن$$

$$(أ) " لاحظ أن $q_m \geq 2^{\frac{m-1}{2}}$ " $q_m = a_m q_{m-1} + q_{m-2} \geq 2q_{m-2}$$$

$$(ب) \frac{p_m}{p_{m-1}} = [a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0]$$

$$(ج) \frac{q_m}{q_{m-1}} = [a_m, a_{m-1}, \dots, a_2, a_1]$$

٨-٢: الكسور المستمرة البسيطة غير المنتهية

Infinite simple continued Fractions

سنركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة الكسور المستمرة البسيطة غير المنتهية ، والتي تعطي تقريباً جيداً للأعداد غير النسبية .

تعريف ٨-٢-١ :

يقال عن كسر مستمر غير منتهي $[a_0, a_1, \dots]$ أنه كسر بسيط غير منتهي (Infinite simple continued Fraction) إذا كان $a_i \in \mathbb{Z}^+$ لكل

$$a_0 \in \mathbb{Z} , i \geq 1$$

مثال (١) :

كل من $\pi = [3, 7, 15, 1, 292, 1, \dots]$ ، $e = [2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots]$ كسر بسيط مستمر غير منتهي .

ولتحديد قيمة الكسر البسيط المستمر اللانهائي ومعرفة ما هيته نورد ما يلي .

مبرهنة ٨-٢-١ :

ليكن c_m التقارب الميمي للكسر البسيط المستمر $[a_0, a_1, \dots, a_n, \dots]$.

$$c_1 > c_3 > c_5 > \dots \quad (\text{ب}) \quad , \quad c_0 < c_2 < c_4 < \dots \quad (\text{أ})$$

$$c_{2m+1} > c_{2m} \quad (\text{ج}) \quad \text{لكل } 0 \leq m \leq n$$

البرهان :

(أ) ، (ب) بما أن $a_m > 0$ لكل $m \geq 1$. إذا $q_m > 0$ ، وعليه فإن لكل $m \geq 2$ نجد أن

$$c_m - c_{m-2} = (-1)^m \cdot \frac{a_m}{q_m q_{m-2}}$$

إذا كان m عدداً زوجياً ، فإن $r \in \mathbb{Z}$ ، $m = 2r$ ، وعليه فإن $c_{2r} - c_{2r-2} > 0$

وهذا يعني أن $c_{2r-2} < c_{2r}$ لكل $r \geq 1$ ، وعليه فإن $c_0 < c_2 < c_4 < \dots$

وإذا كان m عدد فردياً ، فإن $m = 2r + 1$ ، $r \in \mathbb{Z}$ ، وعليه فإن
 $c_m - c_{m-2} = c_{2r+1} - c_{2r-1} < 0$ ، وهذا يعني أن $c_{2r-1} > c_{2r+1}$ ، وعليه
 فإن $c_1 > c_3 > c_5 > \dots$

(ج) بما أن $p_m q_{m-1} - q_m p_{m-1} = (-1)^{m-1}$ لكل $0 \leq m \leq n$ ، حسب مبرهنة
 (٨-١-٤) . إذاً $c_m - c_{m-1} = (-1)^{m-1} \cdot \frac{1}{q_m q_{m-1}}$ ، وعليه فإن

$c_{2r} < c_{2t+2r} < c_{2t+2r-1} < c_{2r-1}$ ، وبالتالي فإن لكل $t \geq 0$ ،

□

مبرهنة ٢-٢-٨ : " Continued Fraction Limit "

إذا كان c_m تقارباً ميمياً للسكّر المستمر البسيط $[a_0, a_1, \dots]$ ، فإن $\lim_{m \rightarrow \infty} c_m$

موجود .

البرهان :

بما أن $c_0 < c_2 < c_4 < \dots < c_{2m} < \dots < c_{2m+1} < \dots < c_5 < c_3 < c_1$ ، حسب
 مبرهنة (٨-٢-١) . إذاً c_{2m} تكون متتابعة متزايدة باضطراد
 (Monotonically increasing sequence) ومحددة من الأعلى بالعدد c_1 وهذا
 يعني أن $c_{2m} \leq c_1$ لكل $m \geq 0$ ، وعليه فإن $\lim_{m \rightarrow \infty} c_{2m}$ موجود ، ولنفرض أن
 $\lim_{m \rightarrow \infty} c_{2m} = \alpha$ ، $c_{2m} < \alpha$. لكن c_{2m+1} تكون متتابعة متناقصة باضطراد

(Monotonically decreasing sequence) ومحدده من الأسفل بالعدد c_0 .

إذاً $\lim_{m \rightarrow \infty} c_{2m+1}$ موجود ، ولنفرض أن $\lim_{m \rightarrow \infty} c_{2m+1} = \beta$ لكن

$$|c_{2m+1} - c_{2m}| = \frac{1}{q_{2m} q_{2m+1}} \leq \frac{1}{2m(2m+1)}$$

إذاً $\lim_{m \rightarrow \infty} (c_{2m+1} - c_{2m}) = 0$ ، وعليه فإن $\lim_{m \rightarrow \infty} c_{2m} = \lim_{m \rightarrow \infty} c_{2m+1} = \beta$

إذاً $\lim_{m \rightarrow \infty} c_m$ موجود .

□

وبتطبيق مبرهنة (٨-٢-٢) نورد التعريف الآتي :

تعريف ٨-٢-٢ :

إذا كان $x = [a_0, a_1, \dots]$ كسراً بسيطاً مستمراً لا نهائياً ، فإن

$$x = \lim_{m \rightarrow \infty} c_m = \lim_{m \rightarrow \infty} [a_0, a_1, \dots, a_m]$$

مبرهنة ٨-٢-٣ :

إذا كان $x = [a_0, a_1, a_2, \dots]$ كسراً بسيطاً مستمراً لا نهائياً ، فإن

$$(أ) \quad a_0 = [x] ، \text{ حيث } [x] \text{ صحيح } x .$$

$$(ب) \quad x = a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_n, \dots]}$$

البرهان :

$$(أ) \quad \text{بما أن } c_0 < x < c_1 \text{ . إذا } a_0 < x < a_0 + \frac{1}{a_1} \text{ . لكن } a_1 \geq 1 \text{ . إذا}$$

$$. [x] = a_0 \text{ ، وعليه فإن } a_0 < x < a_0 + 1$$

$$(ب) \quad [a_0, a_1, \dots] = \lim_{m \rightarrow \infty} [a_0, a_1, \dots, a_m] = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_m]} \right)$$

$$= a_0 + \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} [a_1, \dots, a_m]} = a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_m]}$$

□

مثال (٢) :

إذا كان $x = [1, 1, 1, \dots]$ ، فإن $x = 1 + \frac{1}{[1, 1, \dots]} = 1 + \frac{1}{x}$ ، وعليه فإن

$$. x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ ، ومنها نجد أن } x^2 - x - 1 = 0$$

مثال (٣) :

إذا كان $x = [1, 2, 2, \dots]$ ، فأفرض أن $y = [2, 2, \dots]$ ، تجد أن

$$y = 2 + \frac{1}{[2, 2, \dots]} = 2 + \frac{1}{y}$$

وعليه فإن $y^2 - 2y - 1 = 0$ ، وبالتالي فإن $y = \frac{2 + \sqrt{8}}{2} = 1 + \sqrt{2}$.

لكن $x = 1 + \frac{1}{y}$. إذاً

$$x = 1 + \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = 1 + \frac{\sqrt{2} - 1}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)} = 1 + \sqrt{2} - 1 = \sqrt{2}$$

وبصورة عامة يمكن أن نبرهن ما يلي .

مبرهنة ٤-٢-٨ :

أي كسر بسيط مستمر لا نهائي يمثل عدد غير نسبي .

البرهان :

نفرض أن $x = [a_0, a_1, \dots]$ كسر بسيط مستمر لا نهائي . إذاً $x = \lim_{m \rightarrow \infty} c_m$ ،

حيث $c_m = [a_0, \dots, a_m]$. لكن $c_m < x < c_{m+1}$. إذاً

$$0 < |x - c_m| < |c_{m+1} - c_m| = \left| \frac{p_{m+1}}{q_{m+1}} - \frac{p_m}{q_m} \right| = \frac{1}{q_m q_{m+1}}$$

وعليه إذا كان x عدداً نسبياً ، فإن $x = \frac{a}{b}$ ، $a, b \in \mathbb{Z}$ ، $b > 0$ ، وعليه فإن

$0 < |a q_m - b p_m| < \frac{b}{q_{m+1}}$. لكن q_{m+1} تتزايد بازدياد m . إذاً يمكن إختيار

m كبيرة كبراً كافياً بحيث أن $b < q_{m+1}$ ، وعليه أن $0 < |a q_m - b p_m| < 1$ ،

لكن $|a q_m - b p_m|$ عدد صحيح موجب . إذاً $0 < |a q_m - b p_m| < 1$ يعني

وجود عدد صحيح بين الصفر والواحد وهذا يناقض مبرهنة (١-٢-١) . إذاً x

عدد غير نسبي .

□

مبرهنة ٥-٢-٨ :

أي كسرين بسيطين مختلفين مستمرين غير منتهيين يمثلان عددين غير نسبيين

مختلفين .

البرهان :

نفرض أن $[a_0, a_1, \dots], [b_0, b_1, \dots]$ كسرين بسيطين مستمرين غير منتهيين ،
وأن $x = [a_0, a_1, \dots] = [b_0, b_1, \dots]$ إذاً

$$a_0 + \frac{1}{[a_1, a_2, \dots]} = b_0 + \frac{1}{[b_1, b_2, \dots]}$$

لكن $a_0 = [x] = b_0$ إذاً $[a_1, a_2, \dots], [b_1, b_2, \dots]$ ، وبإعادة ما سبق نجد أن
 $a_1 = b_1$ و $[a_2, a_3, \dots], [b_2, b_3, \dots]$. وبالأستقراء على n نجد أن $a_n = b_n$
لكل $n > 0$. إذاً أي كسرين بسيطين مختلفين وغير منتهين يمثلان عددين غير
نسبيين مختلفين .

□

والآن إلى المبرهنة الآتية التي تبين أن أي عدد غير نسبي يمثل كسراً بسيطاً لا
نهائياً .

مبرهنة ٦-٢-٨ :

يمكن التعبير بطريقة وحيدة عن أي عدد غير نسبي ككسر مستمر بسيط لا
نهائي.

البرهان :

نفرض أن x_0 عدد غير نسبي ، ولنفرض أن

$$x_1 = \frac{1}{x_0 - [x_0]}, x_2 = \frac{1}{x_1 - [x_1]}, x_3 = \frac{1}{x_1 - [x_2]}, \dots$$

ولنفرض أن $a_0 = [x_0], a_1 = [x_1], a_2 = [x_2], \dots$

وبالأستقراء على m يمكن أن نفرض أن

$$a_m = [x_m], x_{m+1} = \frac{1}{x_m - a_m}$$

إذاً x_{m+1} عدد غير نسبي ، لأن x_0 عدد غير نسبي ، كما أن

$$0 < x_m - a_m = x_m - [x_m] < 1, \text{ وعليه فإن } x_{m+1} = \frac{1}{x_m - a_m} > 1$$

وبالتالي فإن الأعداد الصحيحة $a_{m+1} = [x_{m+1}] \geq 1$ لكل $m \geq 0$.

إذاً a_1, a_2, \dots متتابعة من الأعداد الصحيحة. لكن $x_m = a_m + \frac{1}{x_{m+1}}$

إذاً $a_i > 0$ لكل $i \geq 1$ ،

$$x_0 = a_0 + \frac{1}{x_1} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{x_2}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{x_3}}}$$

$$= \dots = [a_0, a_1, \dots, a_m, x_{m+1}]$$

سـنثبت أن $x_0 = [a_0, a_1, \dots]$ ، ولإثبات ذلك لاحظ أن

$$x_{m+1} = \frac{1}{x_m - a_m} = \frac{1}{t_m} \text{ حيث } t_m = x_m - a_m \text{ ، وعليه فإن}$$

$$x_0 = [a_0, a_1, \dots, a_m, \frac{1}{t_m}] = \frac{\frac{1}{t_m} p_m + p_{m-1}}{\frac{1}{t_m} q_m + q_{m-1}}$$

إذاً إذا كان $c_m = [a_0, \dots, a_m]$ ، فإن

$$x_0 - c_m = x_0 - \frac{p_m}{q_m} = \frac{\frac{1}{t_m} p_m + p_{m-1}}{\frac{1}{t_m} q_m + q_{m-1}} - \frac{p_m}{q_m}$$

$$= \frac{p_{m-1} q_m - p_m q_{m-1}}{q_m (\frac{1}{t_m} q_m + q_{m-1})} = \frac{(-1)^m}{q_m (\frac{1}{t_m} q_m + q_{m-1})}$$

وعليه فإن

$$|x_0 - c_m| = \frac{1}{q_m (\frac{1}{t_m} q_m + q_{m-1})}$$

لكن $a_{m+1} = [\frac{1}{t_m}]$. إذاً $1 < \frac{1}{t_m} \leq a_{m+1}$ ، وعليه فإن

$$|x_0 - c_m| < \frac{1}{q_m(a_{m+1}q_m + q_{m-1})} = \frac{1}{q_m q_{m+1}} \leq \frac{1}{m(m+1)}$$

إذاً $\lim_{m \rightarrow \infty} (x_0 - c_m) = 0$ ، وعليه فإن $x_0 = \lim_{m \rightarrow \infty} c_m$ وهذا يعني

أن $x_0 = [a_0, a_1, \dots] = [b_0, b_1, \dots]$. لكن إذا كان $x_0 = [a_0, a_1, \dots]$ ، فإن $a_i = b_i$ لكل $i \geq 0$ حسب مبرهنة (٨-٢-٥) . إذاً لكل عدد غير نسبي تعبير

وحيد ككسر بسيط مستمر لا نهائي .

□

نتيجة :

إذا كان $c_m = \frac{p_m}{q_m}$ تقارباً ميمياً للعدد غير النسبي x ، فإن $|x - c_m| < \frac{1}{q_m^2}$.

مثال (٤) :

عبر عن العدد $\sqrt{2}$ ككسر بسيط مستمر لا نهائي .

الحل :

بما أن $1 < \sqrt{2} < 2$. إذاً

$$x_0 = \sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1) \Rightarrow a_0 = 1$$

$$x_1 = \frac{1}{x_0 - [x_0]} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1 = 2 + (\sqrt{2} - 1)$$

وعليه فإن $a_1 = 2$. لكن

$$x_2 = \frac{1}{x_1 - [x_1]} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1 - 2} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1 = 2 + (\sqrt{2} - 1)$$

إذاً $a_2 = 2$ ، وبصورة عامة نجد أن

$$x_m = \frac{1}{x_{m-1} - [x_{m-1}]} = 2 + (\sqrt{2} - 1) \Rightarrow a_m = 2$$

وعليه فإن $\sqrt{2} = [1, 2, 2, \dots]$.

مثال (٥):

عبر عن العدد π ككسر بسيط مستمر لا نهائي .

الحل :

بما أن $\pi = 3.141592653\dots$ إذاً

$$x_0 = \pi = 3 + (\pi - 3) \Rightarrow a_0 = 3$$

$$x_1 = \frac{1}{x_0 - [x_0]} = \frac{1}{0.14159265} = 7.0625133\dots \Rightarrow a_1 = 7$$

$$x_2 = \frac{1}{x_1 - [x_1]} = \frac{1}{0.6251330\dots} = 15.99659440\dots \Rightarrow a_2 = 15$$

$$x_3 = \frac{1}{x_2 - [x_2]} = \frac{1}{0.99659440\dots} = 1.00341723\dots \Rightarrow a_3 = 1$$

$$x_4 = \frac{1}{x_3 - [x_3]} = \frac{1}{0.00341723\dots} = 292.63724\dots \Rightarrow a_4 = 292$$

إذاً $\pi = [3, 7, 15, 1, 292, \dots]$

لاحظ أن $c_0 = 3, c_1 = \frac{22}{7}, c_2 = \frac{333}{106}, c_3 = \frac{355}{113}$ لكن $\frac{314}{100} < \pi < \frac{22}{7}$

$$\left| \pi - \frac{22}{7} \right| < \frac{22}{7} - \frac{314}{100} = \frac{1}{350} < \frac{1}{7^2}$$

والآن إلى دراسة الكسور المستمرة الدورية .

تعريف ٨-٢-٣ :

الكسر الدوري المستمر (Periodic continued Fraction) هو كسر مستمر

على الشكل $[a_0, a_1, \dots, a_m, \overline{b_1, b_2, \dots, b_n}]$ ، حيث $\overline{b_1, b_2, \dots, b_n}$ يعني

تكرار الأعداد b_1, b_2, \dots, b_n إلى ما لا نهاية . ويسمى n طول الدورة .

وإذا كان $m = 0$ فيسمى $[b_1, b_2, \dots, b_n]$ كسر دوري مستمر صرف أو

بحت (Purely periodic) .

لاحظ أن $[a_0, a_1, \dots]$ كسر دوري \Leftrightarrow يوجد $r \in \mathbb{N}$ بحيث أن $a_m = a_{m+r}$

مثال (٦):

(أ) $[2, \overline{1, 2, 1, 6}]$ كسر دوري مستمر طوله دورته 4 .

(ب) $[2, \overline{3}]$ كسر دوري مستمر طول دورته 2 ، ولمعرفة قيمة $x = [2, \overline{3}]$

لاحظ أن

$$\begin{aligned} x = [2, \overline{3}] &= [2, 3, 2, 3, \dots] = 2 + \frac{1}{[3, 2, 3, \dots]} \\ &= 2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{[2, 3, 2, 3, \dots]}} = 2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{x}} = 2 + \frac{x}{3x + 1} \end{aligned}$$

وعليه فإن $x(3x + 1) = 2(3x + 1) + x$ ومنها نجد أن $x^2 = 6$ وبالتالي

$$. \quad x = \sqrt{6}$$

تعريف ٨-٢-٤ :

يقال عن عدد حقيقي غير نسبي r ، أنه من الدرجة الثانية أو ثنائي

(Quadratic Irrational) ، إذا كان r جذراً لكثيرة حدود من الدرجة الثانية

بمعاملات نسبية .

مثال (٧):

(أ) $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ عدد غير نسبي تربيعي أو من الدرجة الثانية لأن $\sqrt{2}$ جذر

$$. \quad f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

(ب) $r = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ عدد غير نسبي تربيعي ، لأن r جذر لكثيرة الحدود

$$. \quad f(x) = x^2 - x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$$

والآن إلى المبرهنة الآتية التي توضح العلاقة بين الأعداد غير النسبية من

الدرجة الثانية والكسور الدورية .

" Periodic characterization " : مبرهنة ٧-٢-٨

إذا كان x كسراً مستمراً بسيطاً لا نهائياً ، فإن x كسر دوري إذاً وإذا فقط كان x عدد غير نسبي من الدرجة الثانية .

البرهان:

نفرض أن $y = [\overline{b_1, b_2, \dots, b_n}]$ ، $x = [a_0, a_1, \dots, a_m, \overline{b_1, b_2, \dots, b_n}]$

إذاً $y = [b_1, \dots, b_n, y]$ ، وعليه فإن $y = \frac{yp_n + p_{n-1}}{yq_n + q_{n-1}}$ حسب مبرهنة

$$(٢-١-٨) ، ومنها نجد أن $q_n y^2 + (q_{n-1} - p_n)y - p_{n-1} = 0$$$

لكن y عدد غير نسبي حسب مبرهنة (٤-٢-٨) . إذاً y عدد غير نسبي من

الدرجة الثانية . لكن $x = [a_0, \dots, a_m, y]$ ، إذاً

$$x = c'_{m+1} = \frac{p'_{m+1}}{q'_{m+1}} = \frac{yp'_m + p'_{m-1}}{yq'_m + q'_{m-1}}$$

حسب مبرهنة (٢-١-٨) .

فإذا كان $y = r + s\sqrt{t}$ حيث $r, s \in \mathbb{Q}$ ، $s \neq 0$ ، t عدد صحيح موجب ليس مربعاً كاملاً ، فإن

$$\begin{aligned} x &= \frac{(r + s\sqrt{t})p'_m + p'_{m-1}}{(r + s\sqrt{t})q'_m + q'_{m-1}} = \frac{a + b\sqrt{t}}{c + d\sqrt{t}} = \frac{(a + b\sqrt{t})(c + d\sqrt{t})}{c^2 - td^2} \\ &= \frac{ac - tbd}{c^2 - td^2} + \left(\frac{bc - ad}{c^2 - td^2}\right)\sqrt{t} = u + v\sqrt{t} \end{aligned}$$

حيث $u = \frac{ac - tbd}{c^2 - td^2} \in \mathbb{Q}$ ، $v = \frac{bc - ad}{c^2 - td^2} \neq 0 \in \mathbb{Q}$ ، وعليه فإن x عدد

غير نسبي من الدرجة الثانية .

ولإثبات العكس نفرض أن x عدد غير نسبي يحقق المعادلة

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \dots (1) \quad \text{حيث } a, b, c \in \mathbb{Z} ، a \neq 0$$

ولنفرض أن $[a_0, a_1, \dots]$ كسر مستمر بسيط لا نهائي للعدد x ، ولكل m نفرض

$$r_m = [a_m, a_{m+1}, \dots]$$

متبرهن على وجود عدد منتهى من العناصر r_m ، ولإثبات ذلك ، لاحظ أن

$$\text{إذاً } x = [a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, r_m]$$

$$\dots (2) \quad x = \frac{p_m}{q_m} = \frac{r_m p_{m-1} + p_{m-2}}{r_m q_{m-1} + q_{m-2}} \text{ حسب مبرهنة (٨-١-٢) .}$$

من (1) ، (2) ينتج أن $A_m r_m^2 + B_m r_m + D_m = 0$ حيث

$$A_m = a p_{m-1}^2 + b p_{m-1} q_{m-1} + c q_{m-1}^2$$

$$B_m = 2a p_{m-1} p_{m-2} + b(p_{m-1} q_{m-2} + p_{m-2} q_{m-1}) + 2c q_{m-1} q_{m-2}$$

$$D_m = a p_{m-2}^2 + b p_{m-2} q_{m-2} + c q_{m-2}^2$$

$$D_m = A_{m-1} , A_m, B_m, D_m \in \mathbb{Z}$$

$$B^2 - 4A_m D_m = (b^2 - 4ac)(p_{m-1} q_{m-2} - q_{m-1} p_{m-2})^2$$

$$\text{لكن } B^2 - 4A_m D_m = b^2 - 4ac \text{ إذاً } (p_{m-1} q_{m-2} - q_{m-1} p_{m-2})^2 = 1$$

$$\text{لكن } |x q_{m-1} - p_{m-1}| < \frac{1}{q_m} < \frac{1}{q_{m-1}} \text{ إذاً } |x - \frac{p_{m-1}}{q_{m-1}}| < \frac{1}{q_m p_{m-1}}$$

$$\text{وعليه فإن } |s| < 1 , p_{m-1} = x q_{m-1} + \frac{s}{q_{m-1}} \text{ إذاً}$$

$$A_m = a(x q_{m-1} + \frac{s}{q_{m-1}})^2 + b(x q_{m-1} + \frac{s}{q_{m-1}})q_{m-1} + c q_{m-1}^2$$

$$= (a x^2 + b x + c) q_{m-1}^2 + 2a x s + a \cdot \frac{s^2}{q_{m-1}^2} + b s$$

$$= 2a x s + a \cdot \frac{s^2}{q_{m-1}^2} + b s$$

$$\text{إذاً } |A_m| = |2a x s + a \cdot \frac{s^2}{q_{m-1}^2} + b s| < 2|a x| + |a| + |b| \text{ وعليه فإن}$$

للعدد الصحيح A_n عدد محدود من الاحتمالات .

$$\text{لكن } |D_m| = |A_{m-1}| , |B_m| = \sqrt{b^2 - 4(ac - A_m D_m)} \text{ إذاً يوجد عدد}$$

منتهي من الثلاثيات (A_m, B_m, D_m) وهذا يعني أنه عندما تتغير m يوجد عدد

منتهي من القيم إلى r_m ، وعليه يوجد $t \in \mathbb{N}$ بحيث أن $r_m = r_{m+t}$. إذاً

$$\begin{aligned} x &= [a_0, \dots, a_{m-1}, r_m] = [a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m, \dots, a_{m+t-1}, r_{m+t}] \\ &= [a_0, \dots, a_{m-1}, a_m, \dots, a_{m+t-1}, r_m] \\ &= [a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, a_m, \dots, a_{m+t-1}, a_m, \dots, a_{m+t-1}, r_{m+t}] \\ &= [a_0, \dots, a_{m-1}, \overline{a_m, \dots, a_{m+t-1}}] \end{aligned}$$

وعليه فإن x كسر دوري مستمر لا نهائي .

مثال (٨):

أوجد العدد غير النسبي من الدرجة الثانية والذي يمثل الكسر البسيط المستمر $[2, \overline{3}]$.

الحل :

نفرض أن $x = [2, y]$ ، $y = [\overline{3}]$. إذاً $y = [3, y]$ ، وعليه فإن $p_0 = 3$ ،

$q_0 = 1$ ، $p_{-1} = 1$ ، $q_{-1} = 0$ ، $y = \frac{3y+1}{y}$. إذاً $y^2 - 3y - 1 = 0$ ومنها

نجد أن $y = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$. لكن $x = [2, y] = \frac{yp'_0 + p'_{-1}}{yq'_0 + q'_{-1}}$ ، حيث $p'_0 = 2$ ،

إذاً $q'_0 = 1$ ، $q'_{-1} = 0$ ، $p'_{-1} = 1$.

$$x = [2, \overline{3}] = \frac{2\left(\frac{3 + \sqrt{13}}{2}\right) + 1}{3 + \sqrt{13}} = \frac{8 + 2\sqrt{13}}{3 + \sqrt{13}} \cdot \frac{\sqrt{13} - 3}{\sqrt{13} - 3} = \frac{\sqrt{13} + 3}{2}$$

مثال (٩):

أوجد العدد غير النسبي من الدرجة الثانية والذي يمثل الكسر

الدوري $[1, 2, \overline{2, 1}]$.

الحل :

ليكن $y = [2, 1]$ ، $x = [1, 2, y]$ ، إذاً $y = [1, 2, y]$ ، وعليه فإن $p_0 = 2$ ،
وبالتالي فإن $q_1 = 1$ ، $p_1 = a_0 a_1 + 1 = 3$ ، $q_0 = 1$

$$y = \frac{y p_1 + p_0}{y q_1 + q_0} = \frac{3y + 2}{y + 1}$$

ومن هنا نجد أن $y^2 - 2y - 2 = 0$ ، وعليه فإن $y = 1 + \sqrt{3}$. لكن
إذاً $p'_0 = 1$ ، $q'_0 = 1$ ، $p'_1 = 3$ ، $q'_1 = 2$ ، $x = [1, 2, y]$

$$\begin{aligned} x &= \frac{y p'_1 + p'_0}{y q'_1 + q'_0} = \frac{3y + 1}{2y + 1} = \frac{3(\sqrt{3} + 1) + 1}{2\sqrt{3} + 3} \\ &= \frac{3\sqrt{3} + 4}{2\sqrt{3} + 3} \cdot \frac{2\sqrt{3} - 3}{2\sqrt{3} - 3} = \frac{(3\sqrt{3} + 4)(2\sqrt{3} - 3)}{3} = \frac{6 - \sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

حل آخر :

ليكن $y = [2, 1]$ ، $x = [1, 2, y]$ ، إذاً

$$y = [2, 1, y] = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{y}} = 2 + \frac{y}{y + 1}$$

وعليه فإن $y(y + 1) = 2(y + 1) + y$ ومنها نجد أن $y^2 - 2y - 2 = 0$ ،
وعليه فإن $y = \sqrt{3} + 1$. لكن

$$\begin{aligned} x &= [1, 2, y] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{y}} = 1 + \frac{y}{2y + 1} = \frac{3y + 1}{2y + 1} \\ &= \frac{3(\sqrt{3} + 1) + 1}{2(\sqrt{3} + 1) + 1} = \frac{3\sqrt{3} + 4}{2\sqrt{3} + 3} = \frac{3\sqrt{3} + 4}{2\sqrt{3} + 3} \cdot \frac{2\sqrt{3} - 3}{2\sqrt{3} - 3} = \frac{6 - \sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

ومن تطبيقات الجذور المستمرة إيجاد تقريب للجذور الحقيقية لمعادلة الدرجة
الثانية ، وتوضح ذلك الأمثلة الآتية .

مثال (١٠):

أوجد الجذور الحقيقية للمعادلة $x^2 - 2x - 1 = 0$ مقربة إلى ثلاثة مراتب عشرية .

الحل :

بما أن $x^2 - 2x - 1 = 0$. إذاً $x^2 = 2x + 1$ ، وعليه فإن

$$x = 2 + \frac{1}{x} = 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x}} = 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}} = [2]$$

∴

لكن $p_{-2} = 0$ ، $p_{-1} = 1$ ، $p_0 = a_0$ ، $p_m = a_m p_{m-1} + p_{m-2}$ إذاً

$$p_0 = 2$$

$$p_1 = a_0 a_1 + p_{-1} = 5$$

$$p_2 = a_2 p_1 + p_0 = 2 \cdot 5 + 2 = 12$$

$$p_3 = a_3 p_2 + p_1 = 2(12) + 5 = 29$$

$$p_4 = a_4 p_3 + p_2 = 2(29) + 12 = 70$$

$$p_5 = a_5 p_4 + p_3 = 2(70) + 29 = 169$$

وحيث أن $q_m = a_m q_{m-1} + q_{m-2}$ ، $q_{-2} = 1$ ، $q_{-1} = 0$ ، $q_0 = 1$ إذاً

$$q_1 = a_1 q_0 + q_{-1} = 2$$

$$q_2 = a_2 q_1 + q_0 = 2(2) + 1 = 5$$

$$q_3 = a_3 q_2 + q_1 = 2(5) + 2 = 12$$

$$q_4 = a_4 q_3 + q_2 = 2(12) + 5 = 29$$

$$q_5 = a_5 q_4 + q_3 = 2(29) + 12 = 70$$

$$c_0 = \frac{p_0}{q_0} = 2$$

$$c_1 = \frac{p_1}{q_1} = \frac{5}{2}$$

$$c_2 = \frac{p_2}{q_2} = \frac{12}{5}$$

$$c_3 = \frac{p_3}{q_3} = \frac{29}{12}$$

$$c_4 = \frac{p_4}{q_4} = \frac{70}{29}$$

$$c_5 = \frac{p_5}{q_5} = \frac{169}{70}$$

لكن $|x - c_m| > \frac{1}{q_m^2}$ حسب نتيجة مبرهنة (٨-٢-٦) . إذاً إذا كان $q_m > 44$ ،

فإن $\frac{1}{q^2} < 0.0005$ ، وعليه فإن أي تقارب $c_m = \frac{p_m}{q_m}$ ، $q_m > 44$ يمثل

تقريباً جيداً للجذر المطلوب ، إذاً $c_5 = \frac{169}{70} \approx 2.414$ يمثل تقريباً جيداً لجذر

المعادلة $x^2 - 2x - 1 = 0$. وحيث أن مجموع الجذرين يساوي 2 . إذاً الجذر الآخر يساوي $2 - 2.414 = 0.414$

مثال (١١):

أوجد الجذور الحقيقية للمعادلة $x^2 + 5x - 1 = 0$ مقربة إلى مرتبة عشرية واحدة.

الحل:

بما أن $x^2 + 5x - 1 = 0$ إذاً $x^2 = -5x + 1$ ، وعليه فإن

$$x = -5 + \frac{1}{x} = -5 + \frac{1}{-5 + \frac{1}{x}} = -5 + \frac{1}{-5 + \frac{1}{-5 + \frac{1}{x}}}$$

إذاً $p_0 = -5$, $p_1 = 26$, $p_2 = -135$, $p_3 = 701$

$q_0 = 1$, $q_1 = -5$, $q_2 = 26$, $q_3 = -135$ ، وعليه فإن

$c_0 = -5$, $c_1 = \frac{26}{-5} = 5.2$, $c_2 = \frac{-135}{26} = -5.192$, $c_3 = \frac{701}{-135} = -5.2$

إذاً $x = -5.2$. لكن مجموع الجذرين يساوي -5 . إذاً الجذر الآخر هو 0.2 .

تمارين

(١) حقق مبرهنة (٨-٢-١) لكل من الكسور المستمرة الآتية :

. $[1, 2, 1, 1, 2, 1]$, $[5, 1, 4, 3, 2, 1]$

(٢) أوجد الأعداد غير النسبية التي تمثل كلاً مما يأتي :

. $[\overline{2, 1}]$, $[\overline{2, 5}]$, $[\overline{2, 1, 3}]$, $[\overline{5, 1, 10}]$

(٣) عبر عن كل من الأعداد الآتية ككسر بسيط مستمر دوري :

. $\frac{1 + \sqrt{13}}{2}$, $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$, $\sqrt{5}$, $\frac{5 + \sqrt{10}}{3}$, $\frac{\sqrt{30} - 2}{11}$

(٤) أوجد العدد غير النسبي من الدرجة الثانية الذي يمثل الكسر البسيط المستمر

في كل من : $[\overline{1, 2}]$, $[\overline{1, 3}]$, $[\overline{5, 12}]$

(٥) أوجد جذور كلاً مما يأتي مقربة إلى ثلاث مراتب عشرية :

(أ) $x^2 - 3x - 1 = 0$ ، (ب) $x^2 - 10x - 1 = 0$

(ج) $x^2 + 2x - 1 = 0$ ، (د) $x^2 - 4x + 2 = 0$

(هـ) $x^2 + x - 2 = 0$ ، (و) $x^2 - 5x + 2 = 0$

(٦) عبر عن كل مما يأتي مقرباً إلى خمسة مراتب عشرية :

(أ) $e = [2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots]$

(ب) $\pi = [3, 7, 15, 1, 292, 1, \dots]$

(٧) (أ) أثبت أن $[a, \frac{a}{b}]$ جذر حقيقي للمعادلة $x^2 - ax - b = 0$ بشرط أن

$ab \neq 0$ و $a^2 + 4b$ ليس مربعاً كاملاً .

(ب) أثبت أن $[-\frac{b}{a}, \frac{b}{c}]$ جذر حقيقي للمعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ ،

بشرط أن $abc \neq 0$ و $b^2 - 4ac$ ليس مربعاً كاملاً .

(ج) استخدم (أ، ب) لإيجاد الجذور الحقيقية لكل مما يأتي مقربة إلى مرتبة

عشرية واحدة: $x^2 - 6x - 3 = 0$ ، $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ، $3x^2 - 6x - 4 = 0$

(٨) إذا كان a عدداً صحيحاً موجباً ، فأثبت أن :

(أ) $\sqrt{a^2 + 1} = [a, 2a]$ ، (ب) $\sqrt{a^2 - 1} = [a - 1, 1, 2(a - 1)]$ ، $a > 1$

(ج) عبر عن كل مما يأتي ككسور دورية: $\sqrt{8}, \sqrt{10}, \sqrt{37}, \sqrt{63}, \sqrt{626}$

(٩) إذا كان a عدداً صحيحاً موجباً ، فأثبت أن :

(أ) $\sqrt{a^2 + 2} = [a, a, 2a]$ ، (ب) $\sqrt{a^2 + 2a} = [a, 1, 2a]$

" لاحظ أن: $a + \sqrt{a^2 + 1} = 2a + \sqrt{a^2 + 1} - a = 2a + \frac{1}{a^2 \sqrt{a^2 + 1}}$

(ج) عبر عن كل مما يأتي ككسر بسيط مستمر: $\sqrt{3}, \sqrt{15}, \sqrt{38}, \sqrt{127}, \sqrt{35}$

المراجع العربية

١. فالخ بن عمران الدوسري : نظرية المجموعات : مطابع الصفا ، الطبعة الثانية ٢٠٠١ م ، توزيع : الدار السعودية للنشر والتوزيع .
٢. فالخ بن عمران الدوسري : مقدمة في البنى الجبرية ، الطبعة الثانية ، توزيع : الدار السعودية للنشر والتوزيع .
٣. فالخ بن عمران الدوسري : مقدمة في رياضيات الحضارة الإسلامية وتطبيقاتها، الطبعة الأولى ٢٠٠٣ م، توزيع : الدار السعودية للنشر والتوزيع .
٤. رشدي راشد : "تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب" . مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٨٩ م .
٥. رشدي راشد : التحليل الديوفنطيسي ونظرية الأعداد : موسوعة تاريخ العلوم العربية الجزء الثاني ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٩٧ م (٤٩١-٥٣٨) .

المراجع الأجنبية

1. A. Baker, "A Concise Introduction to the theory of Numbers" Cambridge univ.press (1984) .
2. D. M. Burton, "Elementary Number Theory" Allyn and Bacon Co. (1980) .
3. L. Dikson, "History of the theory of Numbers" Vols I , II , III, Chelsea publishing Co. (1952) .
4. G. H. Hardy and E. M. Wright, " An Introduction to the theory of Number " 5th Edition oxford univ. press (1979) .
5. F. Lemmermeyer, "Introduction to Number theory" Inter Net (2000) .

6. M. E. Lines, "A number for your thoughts" Adam Hilger (1989) .
7. Y. I. Manin and A. A. Panchishkin, " Introduction to Modern Number Theory" 2nd Edition Springer (2005)
8. L. Moser, "An Introduction to the Theory of Numbers" Trillia Group, Indiana (1975) .
9. I. Niven and H. S. Zuckerman: "An Introduction to the Theory of Number" 4th Edition, John Wiley and Sons (1980) .
10. O. Ore: "Number Theory and its History" , Dover Publications (1980) .
11. A. J. Perttofrezzo and D. R. Byrkit, " Elements of Number Theory" , Prentice Hall Inc. (1970) .
12. H. S. Rose, "A Course in Number Theory" Oxford Science Publications (1988) .
13. K. A. Rosen, "Elementary Number Theory" 4th Edition, Addison-wesley (2000) .
14. J. P. Serre, "A Course in Arithmetic" Springer International student Edition (1973) .
15. H. Starke, "An Introduction to Number Theory" MTT Press (1984) .

جدول الأعداد الأولية الأقل من 10.000

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 2 | 167 | 397 | 641 | 887 | 1171 | 1453 | 1733 |
| 3 | 173 | 401 | 643 | 97 | 1181 | 1459 | 1741 |
| 5 | 179 | 409 | 647 | 911 | 1187 | 1471 | 1747 |
| 7 | 181 | 419 | 653 | 919 | 1193 | 1481 | 1753 |
| 11 | 191 | 421 | 659 | 929 | 1201 | 1483 | 1759 |
| 13 | 193 | 431 | 661 | 937 | 1213 | 1487 | 1777 |
| 17 | 197 | 433 | 673 | 941 | 1217 | 1489 | 1783 |
| 19 | 199 | 439 | 677 | 947 | 1223 | 1493 | 1787 |
| 23 | 211 | 443 | 683 | 953 | 1229 | 1499 | 1789 |
| 29 | 223 | 449 | 691 | 967 | 1231 | 1511 | 1801 |
| 31 | 227 | 457 | 701 | 971 | 1237 | 1523 | 1811 |
| 37 | 229 | 461 | 709 | 977 | 1249 | 1531 | 1823 |
| 41 | 223 | 463 | 719 | 983 | 1259 | 1543 | 1831 |
| 43 | 239 | 467 | 727 | 991 | 1277 | 1549 | 1841 |
| 47 | 241 | 479 | 733 | 997 | 1279 | 1553 | 1861 |
| 53 | 251 | 487 | 739 | 1009 | 1283 | 1559 | 1867 |
| 59 | 257 | 491 | 743 | 1013 | 1289 | 1567 | 1871 |
| 61 | 263 | 499 | 751 | 1019 | 1291 | 1571 | 1873 |
| 67 | 269 | 503 | 757 | 1021 | 1297 | 1579 | 1877 |
| 71 | 271 | 509 | 761 | 1031 | 1301 | 1583 | 1879 |
| 73 | 277 | 521 | 769 | 1033 | 1303 | 1597 | 1889 |
| 79 | 281 | 523 | 733 | 1039 | 1307 | 1601 | 1901 |
| 83 | 283 | 541 | 787 | 1049 | 1319 | 1607 | 1907 |
| 89 | 293 | 547 | 797 | 1051 | 1321 | 1609 | 1913 |
| 97 | 307 | 557 | 809 | 1061 | 1327 | 1613 | 1931 |
| 101 | 311 | 563 | 811 | 1063 | 1361 | 1621 | 1933 |
| 103 | 313 | 569 | 821 | 1069 | 1367 | 1627 | 1949 |
| 107 | 331 | 571 | 823 | 1087 | 1373 | 1637 | 1951 |
| 109 | 337 | 577 | 827 | 1091 | 1381 | 1657 | 1973 |
| 113 | 347 | 587 | 829 | 1093 | 1399 | 1663 | 1979 |
| 127 | 379 | 593 | 839 | 1097 | 1409 | 1667 | 1987 |
| 131 | 353 | 599 | 853 | 1103 | 1423 | 1669 | 1993 |
| 137 | 359 | 601 | 857 | 1109 | 1427 | 1693 | 1997 |
| 139 | 367 | 607 | 859 | 1117 | 1429 | 1697 | 1999 |
| 149 | 373 | 613 | 863 | 1123 | 1433 | 1699 | 2003 |
| 151 | 379 | 617 | 877 | 1129 | 1439 | 1709 | 2011 |
| 157 | 383 | 619 | 881 | 1151 | 1447 | 1721 | 2017 |
| 163 | 389 | 631 | 883 | 1163 | 1451 | 1723 | 2027 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 2339 | 2659 | 2927 | 3259 | 3559 | 3877 | 4177 |
| 2039 | 2341 | 2663 | 2939 | 3271 | 3571 | 3881 | 4201 |
| 2053 | 2347 | 2671 | 2953 | 3299 | 3581 | 3889 | 4211 |
| 2063 | 2351 | 2677 | 2957 | 3301 | 3583 | 3907 | 4217 |
| 2069 | 2357 | 2683 | 2963 | 3307 | 3593 | 3911 | 4219 |
| 2081 | 2371 | 2687 | 2969 | 3313 | 3607 | 3911 | 4229 |
| 2083 | 2377 | 2689 | 2971 | 3319 | 3613 | 3917 | 4231 |
| 2087 | 2381 | 2693 | 2999 | 3323 | 3617 | 3919 | 4241 |
| 2089 | 2389 | 2699 | 3001 | 3329 | 3623 | 3923 | 4243 |
| 2099 | 2393 | 2707 | 3011 | 3331 | 3631 | 3929 | 4253 |
| 2111 | 2399 | 2711 | 3019 | 3343 | 3637 | 3931 | 4259 |
| 2113 | 2411 | 2713 | 3023 | 3347 | 3643 | 3943 | 4261 |
| 2129 | 2417 | 2719 | 3037 | 3359 | 3659 | 3947 | 4271 |
| 2131 | 2423 | 2729 | 3041 | 3361 | 3671 | 3967 | 4273 |
| 2137 | 2437 | 2731 | 3049 | 3371 | 3673 | 3989 | 4283 |
| 2141 | 2441 | 2741 | 3061 | 3373 | 3677 | 4001 | 4289 |
| 2143 | 2447 | 2749 | 3067 | 3389 | 3691 | 4003 | 4297 |
| 2153 | 2459 | 2753 | 3079 | 3391 | 3697 | 4007 | 4327 |
| 2161 | 2467 | 2767 | 3083 | 3391 | 3701 | 4013 | 4337 |
| 2179 | 2473 | 2777 | 3089 | 3407 | 3709 | 4021 | 4339 |
| 2203 | 2477 | 2789 | 3109 | 3413 | 3719 | 4027 | 4349 |
| 2207 | 253 | 2791 | 3119 | 3433 | 3727 | 4049 | 4357 |
| 2213 | 2521 | 2797 | 3121 | 3449 | 3733 | 4051 | 4363 |
| 2221 | 2531 | 2801 | 3137 | 3457 | 3739 | 4057 | 4373 |
| 2237 | 2539 | 2803 | 3163 | 3461 | 3761 | 4073 | 4391 |
| 2239 | 2543 | 2819 | 3167 | 3463 | 3767 | 4079 | 4409 |
| 2243 | 2549 | 2833 | 3169 | 3467 | 3769 | 4091 | 4421 |
| 2251 | 2551 | 2837 | 3181 | 3469 | 3779 | 4093 | 4423 |
| 2267 | 2557 | 2843 | 3187 | 3491 | 3793 | 4093 | 4441 |
| 2269 | 2579 | 2851 | 3191 | 3499 | 3797 | 4099 | 4447 |
| 2273 | 2591 | 2857 | 3203 | 3511 | 3803 | 4111 | 4451 |
| 2281 | 2593 | 2861 | 3209 | 3517 | 3821 | 4127 | 4457 |
| 2287 | 2609 | 2879 | 3217 | 3527 | 3823 | 4129 | 4463 |
| 2293 | 2617 | 2887 | 3221 | 3533 | 3833 | 4133 | 4481 |
| 2297 | 2621 | 2897 | 3229 | 3539 | 3847 | 4139 | 4483 |
| 2309 | 2633 | 2903 | 3251 | 3541 | 3851 | 4153 | 4493 |
| 2311 | 2647 | 2909 | 3253 | 3547 | 3853 | 4157 | 4507 |
| 2333 | 2657 | 2917 | 3257 | 3557 | 3863 | 4159 | 4513 |

جدول الأعداد الأولية الأقل من 10.000

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4517 | 4831 | 5167 | 5501 | 5821 | 6151 | 6473 | 6829 |
| 4519 | 4861 | 5171 | 5503 | 5827 | 6163 | 6481 | 6833 |
| 4523 | 4871 | 5179 | 5507 | 5839 | 6173 | 6491 | 6841 |
| 4547 | 4877 | 5189 | 5519 | 5834 | 6197 | 6521 | 6857 |
| 4579 | 4889 | 5197 | 5521 | 5849 | 6199 | 6529 | 6863 |
| 4561 | 4903 | 5209 | 5527 | 5851 | 6203 | 6547 | 6869 |
| 4569 | 4909 | 5227 | 5531 | 5857 | 6211 | 6551 | 6871 |
| 4583 | 4919 | 5231 | 5557 | 5861 | 6217 | 6553 | 6883 |
| 4591 | 4931 | 5233 | 5563 | 5867 | 6221 | 6563 | 6899 |
| 4597 | 4933 | 5237 | 5569 | 5869 | 6229 | 6569 | 6907 |
| 4603 | 4937 | 5261 | 5573 | 5879 | 6247 | 6571 | 6911 |
| 4621 | 4943 | 5273 | 5581 | 5881 | 6257 | 6577 | 6917 |
| 4637 | 4951 | 5279 | 5591 | 5897 | 6263 | 6581 | 6947 |
| 4639 | 4957 | 5281 | 5623 | 5903 | 6269 | 6599 | 6949 |
| 4643 | 4967 | 5297 | 5639 | 5923 | 6271 | 6607 | 6959 |
| 4649 | 4969 | 5303 | 5641 | 5927 | 6277 | 6619 | 6961 |
| 4651 | 4973 | 5309 | 5647 | 5939 | 6287 | 6637 | 6967 |
| 4657 | 4987 | 5323 | 5651 | 5953 | 6299 | 6653 | 6971 |
| 4657 | 4993 | 5333 | 5653 | 5981 | 6301 | 6659 | 6977 |
| 4663 | 4999 | 5347 | 5657 | 5987 | 6311 | 6661 | 6983 |
| 4673 | 5003 | 5351 | 5689 | 6007 | 6317 | 6673 | 6991 |
| 4679 | 5009 | 5381 | 5669 | 6011 | 6323 | 6679 | 6997 |
| 4691 | 5011 | 5387 | 5683 | 6029 | 6329 | 6689 | 7001 |
| 4703 | 5021 | 5393 | 5689 | 6037 | 6337 | 6691 | 7013 |
| 4721 | 5023 | 5399 | 5693 | 6043 | 6343 | 6701 | 7019 |
| 4723 | 5039 | 5407 | 5701 | 6047 | 6353 | 6703 | 7027 |
| 4729 | 5051 | 5413 | 5711 | 6053 | 6359 | 6709 | 7039 |
| 4733 | 5059 | 5417 | 5717 | 6067 | 6361 | 6719 | 7043 |
| 4751 | 5077 | 5419 | 5737 | 6073 | 6367 | 6733 | 7057 |
| 4759 | 5081 | 5431 | 5741 | 6079 | 6373 | 6737 | 7069 |
| 4783 | 5087 | 5437 | 5749 | 6089 | 6379 | 6761 | 7079 |
| 4787 | 5099 | 5441 | 5749 | 6091 | 6389 | 6763 | 7103 |
| 4789 | 5101 | 5443 | 5779 | 6101 | 6397 | 6779 | 7109 |
| 4793 | 5107 | 5449 | 5783 | 6113 | 6421 | 6781 | 7121 |
| 4799 | 5113 | 5471 | 5791 | 6121 | 6427 | 6791 | 7127 |
| 4801 | 5119 | 5477 | 5801 | 6131 | 6449 | 6793 | 7129 |
| 4813 | 5147 | 5479 | 5807 | 6133 | 6451 | 9803 | 7151 |
| 4817 | 5153 | 5483 | 5813 | 6143 | 6469 | 6827 | 7159 |

جدول الأعداد الأولية الأقل من 10.000

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7177 | 7537 | 7867 | 8221 | 8581 | 8887 | 9227 | 9539 | 9883 |
| 7187 | 7554 | 7873 | 8231 | 8597 | 8893 | 9239 | 9547 | 9887 |
| 7193 | 7547 | 7877 | 8233 | 8599 | 8823 | 941 | 9551 | 9901 |
| 7207 | 7549 | 7879 | 8237 | 8609 | 8923 | 9257 | 9587 | 9907 |
| 7211 | 7559 | 7883 | 8243 | 8623 | 8929 | 9277 | 9601 | 9923 |
| 7213 | 7561 | 7901 | 8263 | 8627 | 8933 | 9281 | 9613 | 9929 |
| 7219 | 7573 | 7907 | 8269 | 8629 | 8941 | 9283 | 9619 | 9931 |
| 7229 | 7577 | 7919 | 8273 | 8641 | 8951 | 9293 | 9623 | 9941 |
| 7237 | 7583 | 7927 | 8287 | 8647 | 8963 | 9311 | 9629 | 9949 |
| 7243 | 7589 | 7933 | 8291 | 8663 | 8969 | 9319 | 9631 | 9967 |
| 7247 | 7591 | 7937 | 8293 | 8669 | 8971 | 9323 | 9643 | 9973 |
| 7253 | 7603 | 7949 | 8297 | 8677 | 8999 | 9337 | 9649 | |
| 7283 | 7607 | 7951 | 8311 | 8681 | 9001 | 9341 | 9661 | |
| 7292 | 7621 | 7963 | 8317 | 8689 | 9007 | 9343 | 9677 | |
| 7307 | 7639 | 7993 | 8329 | 8693 | 9011 | 9349 | 9679 | |
| 7309 | 7643 | 8009 | 8353 | 8699 | 9013 | 9371 | 9689 | |
| 7321 | 7649 | 8011 | 8363 | 8707 | 9029 | 9377 | 9697 | |
| 7331 | 7669 | 8017 | 8369 | 8713 | 9041 | 9391 | 9719 | |
| 7333 | 7673 | 8053 | 8377 | 8719 | 9043 | 9397 | 9721 | |
| 7349 | 7681 | 8059 | 8387 | 8731 | 9049 | 403 | 9733 | |
| 7351 | 7687 | 8069 | 8389 | 8737 | 9059 | 9413 | 9739 | |
| 7369 | 7691 | 8081 | 8419 | 8741 | 9067 | 9419 | 9743 | |
| 7393 | 7699 | 8087 | 8423 | 8747 | 9091 | 9421 | 9749 | |
| 7411 | 7703 | 8089 | 8429 | 8753 | 9103 | 9431 | 9767 | |
| 7417 | 7717 | 8093 | 8431 | 8761 | 9109 | 9433 | 9769 | |
| 7433 | 7723 | 8101 | 8443 | 8779 | 9127 | 9437 | 9781 | |
| 7451 | 7727 | 8111 | 8447 | 8783 | 9133 | 9439 | 9787 | |
| 7457 | 7741 | 8117 | 8461 | 8803 | 9137 | 9461 | 9791 | |
| 7459 | 7753 | 8123 | 8467 | 8803 | 9151 | 9463 | 9803 | |
| 7477 | 7757 | 8147 | 9501 | 8819 | 9157 | 9467 | 9811 | |
| 7481 | 7759 | 8161 | 9513 | 8821 | 9161 | 9473 | 9817 | |
| 7487 | 7789 | 8167 | 8521 | 8831 | 9173 | 9479 | 9829 | |
| 7489 | 7793 | 8171 | 8527 | 8837 | 9181 | 9491 | 9833 | |
| 7499 | 7817 | 8179 | 8537 | 8839 | 9187 | 9491 | 9839 | |
| 7507 | 7823 | 8191 | 8539 | 8849 | 9199 | 9497 | 9851 | |
| 7517 | 7829 | 8209 | 8543 | 8861 | 9203 | 9511 | 9857 | |
| 7523 | 7841 | 8219 | 8563 | 8863 | 9209 | 9521 | 9859 | |
| 7529 | 7853 | 8221 | 8573 | 8867 | 9221 | 9533 | 9871 | |

دليل الرموز

| | |
|---|----------------------------------|
| إذا كان فإن | \Rightarrow |
| إذا وإذا فقط | \Leftrightarrow |
| و | \wedge |
| أو | \vee |
| القيمة المطلقة | $ $ |
| a يقبل القسمة على b | $b \mid a$ |
| a لا يقبل القسمة على b | $b \nmid a$ |
| أصغر من | $<$ |
| أصغر من أو يساوي | \leq |
| أكبر من | $>$ |
| أكبر من أو يساوي | \geq |
| مجموعة الأعداد الطبيعية | \mathbb{N} |
| مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة | \mathbb{N}^* أو \mathbb{Z}^+ |
| مجموعة الأعداد الصحيحة | \mathbb{Z} |
| مجموعة الأعداد النسبية | \mathbb{Q} |
| مجموعة الأعداد الحقيقية | \mathbb{R} |
| مجموعة الأعداد المركبة | \mathbb{C} |
| عدد الأعداد الأولية الأقل من أو تساوي x | $\pi(x)$ |
| أكبر عدد صحيح أقل من يساوي x | $\lfloor x \rfloor$ |
| رمز الضرب | π |
| رمز الجمع أو المجموع | Σ |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| يطابق قياس n | \equiv | $(\text{mod } n)$ أو \equiv_n |
| لا يطابق قياس n | $\not\equiv$ | $(\text{mod } n)$ أو $\not\equiv_n$ |
| رتبة العدد a قياس n | $\text{Ord}_n(a)$ | |
| مجموع قواسم العدد n | $\sigma(n)$ | |
| مجموع القواسم الفعلية للعدد n | $\sigma^*(n)$ | |
| عدد قواسم العدد n | $\tau(n)$ | |
| دالة أولر | $\phi(n)$ | |
| دالة موبص | $\mu(n)$ | |
| دالة زيتا | $\lambda(n)$ | |
| دالة ايتا أو دالة ديركلي | $\zeta(n)$ | |
| أعداد فيرما | F_n | |
| أعداد مرسين | M_n | |
| باقي تربيعي قياس n | aRn | |
| باقي غير تربيعي قياس n | aNn | |
| رمز لجنر | (a/p) | |
| رمز جاكوبي | (a/n) | |
| كسر مستمر | $\langle a_0, a_1, \dots \rangle$ أو $[a_0, a_1, \dots]$ | |
| القاسم المشترك الأعظم للعددين a, b | $\text{g.c.d}(a, b)$ أو (a, b) | |
| المضاعف المشترك الأصغر أو البسيط للعددين a, b | $\text{l.c.m}(a, b)$ أو $[a, b]$ | |

دليل المصطلحات

(أ)

| | | |
|--|----------|----------------------------------|
| Integers | ١ | أعداد صحيحة |
| Natural Numbers | ١ | أعداد طبيعية |
| Induction | ٥ | استقراء |
| Transfinite Induction | ٨ | القاعدة العامة للاستقراء الرياضي |
| Division Algorithm | ٢٣ | القسمة الخوارزمية |
| Digits | ٢٦ | أرقام |
| Binary Representation | ٢٦ | التمثيل الثنائي |
| Ternary Representation | ٢٦ | التمثيل الثلاثي |
| Octal Representation | ٢٦ | التمثيل الثماني |
| Decimal Representation | ٢٦ | التمثيل العشري |
| Hexadecimal Representation | ٢٧ | التمثيل الستة عشري |
| Twin Primes | ٤٤ | أعداد أولية توأمية |
| The Fundamental Theorem of Arithmetic | ٥٦ | المبرهنة الأساسية في الحساب |
| Residue systems | ٨٤، ٨٥ | أنظمة البواقي أو الرواسب |
| Residue classes modulo n | ٨٦ | البواقي قياس n |
| Arithmetic Functions | ١٢٧ | الدوال العددية |
| Bernoulli Numbers | ١٥٦ | أعداد برنولي |
| Special Numbers | ١٦١ | أعداد خاصة |
| Fermat Numbers | ١٦١ | أعداد فيرما |
| Mersenne Numbers | ١٦١، ١٦٥ | أعداد مرسين |
| Amicable Numbers | ١٧٨ | أعداد متحابية |
| Numbers of Equal Weight | ١٨٢ | أعداد متعادلة |
| Diophantine Equations | ٢٢٥ | المعادلات الديوفنتية |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Linear Diophantine Equations | ٢٢٩ | المعادلات الديوفنتية الخطية |
| Infinite Descent | ٢٥٨ | الإحذار أو النزولي أو التناقص اللانهائي |
| Regular Primes | ٢٥٦ | أعداد أولية منتظمة |
| Gaussian Integers | ٢٥٦ | أعداد جاوس |
| Continued Fractions | ٢٩٣ ، ٢٨٩ | الكسور المستمرة |
| Finite Simple Continued Fractions | ٢٩٣ | الكسور المستمرة البسيطة المنتهية |
| Infinite Simple Continued Fractions | ٣٠٥ | الكسور المستمرة البسيطة اللانهائية |
| Periodic Continued Fraction | ٣١٢ | الكسر الدوري المستمر |

(ب ، ت ، ث)

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| Quadratic Residue | ١٩٧، ١٩٦، ١٨٥ | باقي تربيعي |
| Quadratic Non-residue | ١٩٧ | باقي غير تربيعي |
| Associative | ١ | تجميعي أو دامج |
| Divides | ٢١ | تقسم |
| Conjecture | ٤٤ | تخمين أو حدس |
| Congruence | ٦٧ | تطابق |
| Goldbach's Conjecture | ٤٤ | تخمين أو حدس جولدباخ |
| Lagrange's Conjecture | ٤٤ | تخمين لاجرانج |
| Gauss Conjecture | ١٩٥ | تخمين جاوس |
| Artin Conjecture | ١٩٥ | تخمين أرتين |
| Serre Conjecture | ٢٥٨ | تخمين سار |
| Primitive Triple | ٢٤٣ | ثلاثي بدائي |
| Pythagorean Triple | ١٤٣ | ثلاثيات فيثاغوس |

(ج ، ح ، خ)

| | | |
|-----------------------|-----|------------------|
| Primitive Root | ١٨٥ | جذر بدائي |
| Congruent Solutions | ٩٢ | حلول متطابقة |
| Incongruent Solutions | ٩٢ | حلول غير متطابقة |
| Ring | ٢٦٤ | حلقة |
| Field | ٢٦٦ | حقل |
| Archimedean Property | ١٩ | خاصة أرخميدس |

(د)

| | | |
|--|----------|-------------------------|
| Zeta Function | ١٥٥ ، ٥٠ | دالة زيتا |
| Euler Phi Function | ١٣٩ ، ٨٩ | دالة أويلر |
| Arithmetic Function | ١٢٧ | دالة عددية |
| Multiplicative Function | ١٢٧ | دالة ضربية |
| Totally or Completely multiplicative Function | ١٢٨ | دالة ضربية كلياً |
| Mangoldt Function | ١٣٠ | دالة مانجولد |
| Möbius Function | ١٤٩ | دالة موبيس |
| Riemann Zeta Function | ١٥٥ | دالة زيتا الريمانية |
| Eta Function | ١٥٨ | دالة إيتا |
| Elliptic Function | ٢٢٨ | دالة ناقصية أو أهليلجية |

(ر ، ز ، ش)

| | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| Order | ١٦٣ | رتبة |
| Legendre Symbol | ٢٠٢ | رمز لجندر |
| Jacobi Symbol | ٢٢٠ | رمز جاكوبي |
| Group | ٢٦٤ | زمرة |
| Abelian or Commutative group | ٢٦٤ | زمرة إبدالية |
| Pseudo Prime | ١١٤ | شبه أولي |

(ع ، غ)

| | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Partial order Relation | ٥ | علاقة ترتيب جزئي |
| Antisymmetric Relation | ٥ | علاقة متخالفة أو تخالفية |
| Reflexive Relation | ٦٩ ، ٥ | علاقة منعكسة |
| Transitive Relation | ٦٩ ، ٥ | علاقة متعدية |
| Symmetric Relation | ٦٩ | علاقة متناظرة |
| Equivalence Relation | ٦٨ | علاقة تكافؤ |
| First or least or smallest Element | ٦ | عنصر أول أو أصغر |
| Highest Common multiple | ٢٩ | عامل مشترك أعلى |
| Prime Number | ٤٢ | عدد أولي |
| Composite Number | ٤٢ | عدد مؤلف |
| Number of Divisors | ١٣٢ ، ١٣١ | عدد القواسم |
| Perfect Number | ١٧١ ، ١٦٨ | عدد تام |
| Abundant Number | ١٦٨ | عدد زائد |
| Deficient Number | ١٦٨ | عدد ناقص |
| Algebraic Number | ٢٦٨ | عدد جبري |
| Algebraic Integer | ٢٦٨ | عدد صحيح جبري |
| Quadratic Irrational | ٢١٣ | عدد غير نسبي من الدرجة الثانية |
| Crible d' Elastosthene | ٤٨ | غربال إيراتوستين |

(ف ، ق)

| | | |
|-------------------------|-------|------------------------------|
| Riemann Hypothesis | ٥٠ | فرضية ريمان |
| Equivalence Classes | ٨٤ | فصول أو صفوف تكافؤ |
| Absolute value | ٣ | قيمة مطلقة |
| Well-ordering principle | ٧ ، ٥ | قاعدة الترتيب الجيد أو الحسن |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Principle of Mathematical Induction | ٨ | قاعدة الاستقراء الرياضي |
| Divisibility | ٢١ | قابلية القسمة |
| Greatest Common Divisor | ٢٩ | قاسم مشترك أعظم |
| Modulo | ٦٧ | قياس |
| Mobics Inversion Formula | ١٥٢ | قانون التعاكس لموبيص |
| Quadratic Reciprocity Law | ٢٠٧ | قانون التعاكس التثاني |
| Gauss Reciprocity Law | ٢١٥ | قانون التعاكس لجاوس |
| Invertible or unit | ٢٦٨ | قابل للإعكاس |
| (م) | | |
| Basic Concepts | ١ | مفاهيم أساسية |
| Partially ordered set | ٥ | مجموعة مرتبة جزئياً |
| Well ordered set | ٦ | مجموعة مرتبة ترتيباً جيداً |
| Fibonacci sequence | ١٣ | متتابعة فيبوناشي |
| Lucas sequence | ١٩ | متتابعة لوكاس |
| Prime Number Theorem | ٤٩ | مبرهنة الأعداد الأولية |
| Least common Multiple | ٦٠ | مضاعف مشترك أصغر أو بسيط |
| Inverse | ٩٣ | معكوس |
| Chinese Remainder Theorem | ١٠١ | مبرهنة الباقي الصينية |
| Euler and Fermat Theorem | ١٠٧ | مبرهنتي أويلر وفيرما |
| Euler's Theorem | ١٠٨ | مبرهنة أويلر |
| Fermat's Little Theorem | ١٠٨ | مبرهنة فيرما الصغرى |
| Ibn Alhythem's Theorem | ١١٩ ، ١١٨ | مبرهنة ابن الهيثم (ولسن) |
| Sum of Divisors | ١٤٣ ، ١٣١ | مجموعة القواسم |
| Mordell Equation | ٢٢٨ | معادلة موردل |
| Elliptic Curve | ٢٢٨ | منحنى ناقص |
| Fermat Last Theorem | ٢٥٣ | مبرهنة فيرما الأخيرة |

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Integral Domain | ٢٦٦ | منطقة صحيحة |
| Norm | ٢٦٨ | مقياس أو معيار |
| Unique Factorization Domain | ٢٥٦ | منطقة تحليل وحيد |
| Sum of two squares | ٢٦٣ | مجموعة مربعين |
| Sum of four squares | ٢٧١ | مجموعة أربعة مربعات |

(ن ، و ، ي)

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|
| Inverse | ٩٣ | نظير |
| Complete Residue System | ٨٦ | نظام بواقي تام أو مكتمل |
| Reduced Residue System | ٨٩ | نظام بواقي مختزل |
| Divisible | ٢١ | يقبل القسمة |
| Unique Factorization | ٦٥ | وحدانية التحليل |
| Congruent | ٦٧ | يطابق أو يوافق |
| Associate | ٢٦٩ | يرادف أو يشارك |

تم بفضل الله